






XXX

S

33-35





XXX

G

33



Museo Pittor. scul. Fr.

HIPPOCRATIS

OPERA OMNIA

EX JANI CORNARIi VERSIONE

U N A C U M

JO. MARINELLI COMMENTARIIS

A C

PETRI MATTHÆI PINI INDICE.

SINGULA SINGULIS TOMIS.

NOVA ET ACCURATISSIMA EDITIO

In qua quid præsttum sit, ad Tomum Primum
Pæfatio docebit.

TOMUS PRIMUS

HIPPOCRATES.



VENETIIS MDCCXXXVII.

F Typographia Radiciana.

SUPEPRUM PERMISSU AC PRIVILEGIIS.

Incunt apud Christophorum Zane.

ARTURO A. GARCIA



JOANNES BAPTISTA PAITONUS LECTORI.



UOD tantum optimorum medicorum proventum
ætas nostra tulit, ut superiorum nulli videatur con-
cedere, cum illis debemus, qui toti sunt in expli-
candis mechanices regulis, tum illis maxime, qui
clinices præcepta ex pluribus experimentis collecta
tradidere. Cum enim artis medicæ finis minime sit rerum naturam
speculari, & naturalium phænomenorum, quæ appellant, ex po-
sito systemate rationem invenire, sed remedia ad morbos aut ex-
pellendos, aut arcendos adhibere; inutilis est theoricæ omnis, quæ
huc non collineet, omnis scilicet doctrina, quæ ad opus non ten-
dat, ut quamquam praxeos studium cum theoricæ studio conjun-
gendum esse, haud inviti fatemur; attamen si alterutra negligenda
sit, practicam theoreticæ medicinæ præhabere futuros medi-
cos, sit optandum. Verum gratulari nos felici huic seculo oportet,
quod utrinque studium æque viget, ac ad formandos medi-
cos invicem sibi opem præstant, ac amice conjurant theoricæ, &
practicæ. Hinc factum est, ut ad utramque illustrandam optimi
libri quotidie prodeant in lucem. Neque enim passim & apud
nos, & apud externos præstantissima tantummodo opera de theo-
ricis tractantia emittuntur, sed eorum etiam, qui clinicen tradi-
dere, cum ex recentioribus, tum maxime ex antiquis optimi au-
tores novis semper prelorum sæturis nova luce donantur. Venit
itaque nobis in mentem novam Hippocratis editionem adornare,
medicorum scilicet principis, cujus vel unius lectio potest peritum
medicum efficere. Is enim, quæ diligentissime ipse in ægris cu-
randis observavit, suis nunquam interituris scriptis consignavit;
quibus nihil habet clinice varietati minus obnoxium, nihil ad
noscendam morborum naturam, atque remedia illis adhibenda
utilius.

utilius. Jure ideo ajebat ille inter medicos celeberrimus, Joannes Crato, quemadmodum de futuris oratoribus Quintilianus dicere non dubitavit: *ille se profecisse sciat, cui Cicero valde placebit, ita de futuris medicis asseri posse: ille se profecisse sciat, cui Hippocrates valde placebit.*

Quoniam vero artis medicæ candidatis præcipue prodesse volumus nova hac Hippocratis editione, nihil prætermittere decrevimus, quod juvare eos possit, ut quam minimo labore se totos ad Hippocratis lectionem applicent. Non solum itaque Hippocratem recudere, sed ipsi conjungere visum est eos, qui plurimum de Hippocrate, ac Hippocratis studiosis meriti sunt, Marinellum, & Pinum. Ex multis enim partibus audivimus, non unum in arte nostra adhuc tironem conqueri, quod si apud aliquem prostant (prostant autem haud ita apud multos) *Joannis Marinelli in Hippocratem Commentaria*, ea tot scatent mendis, ut a legendo sæpe vel cupidissimos deterreant: plures etiam novimus, quibus ignotus omnino erat *Petri Matthæi Pini Index*. Tanta est operis hujus raritas. Cum igitur statuissimus simul cum Hippocrate & Marinelli Commentaria, & Pini Indicem iterum prelo subicere, minime dubitandum fuit, quam Hippocratis versionem cudendam eligeremus. Cum enim uterque Jani Cornarii versionem sequutus fuerit, hanc unam dare nobis opus erat. Ut autem intelligas, quantum in hac editione laborandum nobis fuerit, aliqua statim de hujus Cornarianæ versionis editionibus accipe.

Edidit primum Janus Cornarius Hippocratem suum, e Græco in Latinum sermonem translatum, Basileæ typis Frobenianis anno 1546. At cum deinde ille versionem suam recognovisset, & multis in locis castigasset, iterum eam Basileæ priori longe ex omni parte perfectiorem in lucem emisit anno 1553. Anno autem 1558. Frobenius hanc absolutissimam Cornarii versionem Basileæ itidem maxima cura, & nitidissimis typis exscripsit, atque aliquid ut esset, quod novam Hippocratis editionem magis commendaret, iis, quæ Cornarius Latina lingua donaverat, librum adjecit de *Hominis Structura* ad Perdiccam Macedoniæ Regem, ex interpretatione Nicolai Petreii, nec non singulis Hippocratis libris argumenta quam exactissima Joannis Culmanni, qui editionem curaverat, atque rerum indicem ab eodem Culmanno elaboratum.

Quem Hippocratem e Græco Latinum Cornarius fecit, hunc ob oculos habuere Joannes Marinellus, & Petrus Matthæus Pinus, cum uterque ad Hippocraticam doctrinam novitiis medicis velut faciem præferre conaretur. Marinellus, quæ dispersa in Hippocrate habentur, simul collegit, atque in certas classes dispensavit.

favit. Opus utilissimum *Commentaria in Hippocratis Opera* inscripsit; unaque cum Hippocrate edidit Venetiis apud Valgrisium ex Cornarii versione ad exemplar Frobenianæ editionis omnium optimæ anni 1558. Pinus rem adhuc utiliore aggressus, copiosissimum, atque exactissimum *Indicem* confecit, seu, ut ipse appellat, *Compendium loco Indicis* rerum omnium, quæ in Hippocrate reperiuntur. Verum animum facile quisque forte inducet, ut credat, hunc *Indicem* sibi uni Pinum elaborasse, nec de eo vulgando cogitasse, non solum quod illum primæ omnium Cornariani Hippocratis editioni anni 1546. longe aliis inferiori, quam fortasse unam præ manibus habebat, accommodavit, sed multo magis quod ad inveniendâ Hippocratis loca sibi finxit prolixiores libros in plures sectiones divisos, harumque sectionum, quas mente tantum designaverat, lineas numeravit, intra quasquæri oporteret, quidquid inveniendum erat. Certum est nihilominus, non alia de causa *Indicem* suum Pinum ita confecisse, quam quod non sibi, sed nobis etiam illum confecit. Visum enim illi est, posse *Indicem* suum hac ratione non Basileensi primæ tantummodo, sed omnibus Hippocratis editionibus accommodari. Quippe inquit: Cum *Indicem* hunc in Hippocratis opera, quæ Basileæ Anno Domini Millesimo quingentesimo quadragesimosexto, impressa sunt, confecerim, cuperemque, ut non solum huic codici, sed omnibus tum impressis, tum imprimendis inserviret, tandem in mentem venit, non paginas operis, ut mos est, sed versus cujuslibet libri particularis citare, ut facilius lectores possent sententias ab ipsis requisitas adinvenire, numerando versus a principio librorum usque ad finem, illorum scilicet, qui non sunt divisi in sectiones: aut a principio singularum sectionum ad finem earum, librorum videlicet illorum, qui in sectiones divisi sunt. Ridet hoc Pini consilium Lindenius in præfatione ad Lugd. Bat. Hippocratis editionem, miraturque, quod minime ille animadvertit, nullam esse editionem alteri verluum numero parem. Pinus, ait, in Præfatione ad Lectorem non obscure indicat, *Indicem* a se confectum esse, primo ut responderet Operibus Hippocratis Basileensibus Latinis: deinde, se cogitasse eum ita componere, ut aliis quoque Editionibus omnibus adaptari possit. Quamobrem, ait, non paginas operis, sed versus cujuslibet libri se citasse. Sed bonus ille vir, (non male alioquin de Hippocrate meritis) non animadvertit, nullam Editionem extare, in qua versus aut particulis Numeri sint adjuncti; quod illi faciendum esset, qui ad dictam Basileensem, aut aliam quamcunque, vellet *Indicem* Pini adhibere. Deinde non cogitavit, ab aliis quosdam libros in Sectiones distinguere, quibus tamen sectionum distinctionibus illud Basileense

leense exemplar caret. Ipse autem modum se excogitasse ait, quò suæ G. L. Hippocratis editioni Pini Indicem aptaret. Nunc vero, inquit, repertus est commodissimus utendi hoc Indice modus. Qui enim numerus designantur a Pino, illos quærere oportet in Numeris, lateri versionis Latinae appositis, ibique in textu juxta posito designatus a Pino locus reperietur. Non est autem, cur se nimium de hoc novo invento Lindenius jactet. Id enim faciendum esse illis, qui uti Indice suo vellent, admonuerat Pinus. Inquit enim: facile poterit lector invenire numerum omnium operum in suo codice, huic meo Indici respondentem, & in suis marginibus annotare, signando numerum cujuslibet libri, aut sectionis de quinque in quinque, aut de decem in decem, hoc modo, 5. 10. 15. 20. &c. quemadmodum & ego feci, incipiendo a principio librorum illorum, qui in sectiones divisi non sunt: in divisis autem a principio cujuslibet sectionis, usque ad finem libri, vel sectionis: & sic paucò negotio poterit quis invenire quod quærit, licet diversarum impressionum Hippocratis opera habeantur. Si enim plures versus in suo codice fuerint, quam in catalogo apparet, forte sex vel septem pro quinque poterit numerare: si vero pauciores, quatuor forsitan versus pro quinque supplebunt, & sic conjectura facta, poterit numerum respondentem adinvenire. Verum ut hoc etiam fastidio Hippocratis studiosos levaremus, statuimus nos, molestam omnem libenti animo subire.

Primum itaque Cornarii Hippocratem iterum prelo subicere necesse fuit, primæ ejusdem editioni anni 1546. quam ob oculos Pinus habuit, ita conformem, ut linea lineæ responderet, quod operarum diligentia, ac nostra potissimum assiduitate consequuti sumus. Præterea quas sibi sectiones Pinus confinxit, non divinando, sed attento examine deprehendimus, & singulos Hippocratis libros in totidem partes secuimus, in quot ille ment fecuerat. Deinde linearum, quibus sectiones circumferibuntur rationem, quinta quaque collecta, subduximus, ac numerorum notas margini appinximus. Ita fiet, ut leviter attendenti nulli negotio inveniantur, quæ quota sectione, quoto sectionis versu extent, Index docebit.

Quamquam vero, quod ad typos spectat, primam Basileensem hæc nostra editio fideliter reddit; attamen, quod ad textum spectat, alteri a Cornario recognita omnino similis est, & ad eam emendata. Præterea ne quid reliquum esset, quod Hippocratis studiosis desiderandum videretur, ex tertia etiam supra memorata Frobeniana editione ad ceterorum caleem librum de *Structura Hominis* ad Perdiccam adjecimus, & singulis opusculis Culmanni

Argu-

Argumenta. Indicem tamen ejusdem Culmanni omisimus, longe utiliorem daturi Indicem Pini. Nec deesse passim sumus quidquid nostro hoc seculo in novis veterum autorum editionibus commendari solet, sive ad earum ornamentum, sive ad eos, qui illis autoribus oblectantur, erudiendos. Hic propterea occurrent quæ attulit Lindenius de Vita & Familia Scriptisque Hippocratis Testimonia. Etenim plura de eo, qui per tot secula satis vel solo nomine commendatur, congerere minime visum est. Catalogum quoque adjecimus præcipuarum totius Hippocratis editionum, quæ ad nostram notitiam pervenere. Tis autem, qui medicinæ student, ac sibi optimos Hippocratis interpretes parare cupiunt, ut statim ab optimis magistris hanc artem discant, eorum, qui in singulis Hippocratis libris illustrandis, atque explicandis majorem laudem promeriti sunt, elenchum confecimus. Hujus etiam voluminis frontem una atque altera Hippocratis effigie ornavimus ex multis, quæ passim visuntur inter se variantes. Alteram desumimus ex editione Lug. Bat. ubi comatus, ac barbatus pingitur, alteram ex Fulvii Ursini gemma, ubi pene imberbis apparet, ut tanti Viri, cujus lectione fieri vis doctior, cui tantum debemus medici omnes, juvenis, ac senioris imaginem, & vultus lineamenta intuearis, aut intueri te credas. Antequam vero ad alia progrediamur, pauca adhuc de Jano Cornario, cujus est hæc Hippocratis versio, præfari libet.

Janus Cornarius natus est Zvicaviæ anno 1500. Gentile nomen ei fuit Haynpol, aliis Haiapol, seu Hagenbut, aliis Haguembuit, Hanbot aliis, & Hagenbot. Quod autem Germanico hoc & patrio abdicato, Cornario sibi nomen asciverit pure Italicum, & gentis apud nostrates Venetos nobilissimæ, hanc refert causam Konigius in sua Biblioth. *Nomen ei fuit in lingua patria Hanbot, vel ut plenius dicamus Hagenbot; quod sonus, & denotat Cynosbati fructum, quem cum non satis ea in re peritus, neque diligens præceptor quidam ejus Cornorum appellatione recte reddi posse, falso opinaretur; vertens hoc (ut plurimi ambitiose solent) Cornarii nomen ei indidit: ac puero Corna esse Latinis Cynosbati fructus illos, quos Hagenbotem nos nominamus, imperito adhuc persuasit: in qua opinione cum ille longo tempore deinceps, multum tribuens suo præceptori, mansisset: sero tandem agnovit errorem, & quidam tum dæmon, cum jam inclinarerat Cornarii nomine ita, ut retinere etiam tandem usurpatum; quam sero immutare, postea videretur consultius.* Hæc Konigius ex Michaelæ Barthio. Insubidus autem hic etymorum venator unus ille fortasse fuit, qui privatim Cornarium docuit. Quamquam enim nullum litterarum genus est, quo ille

non fuerit oblectatus, idem tamen ait in epistola ad Senatum Populumque Augustæ Vindelicorum, *post prima Grammaticæ rudimenta nullo se unquam privato præceptore usum esse*. Annos viginti cum ageret, erat ex Petri Mosellani, viri eruditi, & in primis *facundo eloquenti facundia ornati auditoribus*, ut ex laudata epistola novimus. Cum vero non satis commoda valetudine juvenis uteretur, & vario morborum genere subinde affligeretur, ut ipse sibi opem asserere posset, statuit se totum medicinæ studio tradere, fato suo ad hujus artis amorem tractus. Itaque unum & viginti annos natus, VVittembergæ Magister Philosophiæ salutatus est, atque anno insequenti ibidem Medicinæ Licentiatus, ac deinde Ticini in Italia Medicinæ Doctor inauguratus est, & laurea donatus.

Qui autem Græcæ, & Latine sciebat, cum animadvertisset, nonnisi Arabum medicinam in scholis explicari, cepit serio cogitare de optima, hoc est Græca medicina in lucem revocanda. Nulli erant tunc temporis in Germania Græci medicorum codices, eorum propterea quærendorum studio Italiam, Galliam, Angliam, Belgium peragravit, ac cum eorum nonnullos Basileæ tandem invenisset illuc ex Italia deportatos, per annum in ea civitate commoratus est, ut invento thesauro uteretur, ac frueretur. Dubium potest esse nemini, quin Hippocraticam M. Fabii Calvi versionem Basileæ in manus sumserit, iterum ibi a Cratandro ex bona parte impressam, ac forte etiam Phalacri codicem, quo Calvus usus, transumptum scilicet ex transumpto; quamquam & Hippocratem a Calvo editum, & exscriptum ab ipso codicem potuerat Romæ vidisse. Puto autem Græcos codices sua, aut aliorum opera descriptos secum Basilea detulisse, cum illinc reversus, statim se totum vertendis Græcis autoribus tradiderit, nec solum medicis, & philosophis, sed etiam Patribus. Singulos enumerat Gesnerus in Biblioth. qui de ipso ait: *ex Græcis scriptis Latina fecit multo plura, quod sciam, quam quisquam alius nostro seculo*. Ex Patribus quidem Cornario debet lingua Latina Chrysostomum, Epiphanium, Basilium Magnum, ex medicis vero, & philosophis Aretæum, Aetium, Aeginetam, Dioscoridem, Artemidorum, Galenum, ac præ ceteris Hippocratem, quo vel uno optime de re medica meritis esset. In hoc vertendo seruat quindecini annos insumsisse, quem tandem absolutum cum Senatui Populoque Imperialis urbis Augustæ Vindelicorum dicasset, centum aureis donatus est. Ceterum haud multorum manu exaratorum codicum, eorumque haud optime notæ in vertendis Græcis copia illi fuit, ideoque & in Hippocratis versione Calvi codice, & in aliorum versione editis, aut de-

teriori-

terioribus MSS. uti debuit. Huic reitribuendum putat Georgius Hieronymus VVelschius *Curat. Propr. & Consil. Medic. Dec. 4. Curat. 5.* quod non undequaque perfectas versiones dedit. Ita ille: *Nec alia causa fingenda est, quod postea Cornarius, solum illum (Calvi codicem) scrupulosius adfectatus, subinde cessitaret.* Erat enim non tantum Græce eruditissimus, sed etiam medicinae scientia multis aliis præcellerat: sed quia Latinas suas versiones ad contextus editos tantum conformabat, MSS. ope destitutus, usque nonnihil infelix, imperfectas nobis utique dedit, quod vel sola Aretæ recensio ab Henischo quondam nostro, & Petito Parisiensi satis docuerit, nos quoque de Paulo Ægineta aliisque ostendimus in Variis nostris.

Qui tamen totus videtur fuisse in Græcis in sermonem Latinum transferendis, haud omnia nobis ingenii sui monumenta invidit. Refert Gesnerus duas ejusdem Orationes extare una cum aliquot Hippocratis libellis ab ipso conversis, impressas Basileæ per Oporinum anno 1543. in 8. Alteri est titulus: *Hippocrates, seu Doctor verus*; alteri: *De rebus Medicinæ studiis amplectendis.* Cum autem inimicitia cum Leonh. Fuchsio exerceret, qui super ejus versionibus litem ei moverat, in illum investus est opere, quod inscripsit: *Vulpecula excoriata.* Fuchsius enim, ut ajunt, vulpem Germanice significat. Reposuerat illi Fuchsius libellum inscriptum: *Cornarius juvenis.* At Cornarius novam in illum satiram conscripsit, ejus inscriptio: *Nivram, ac Brabyla pro vulpecula excoriata asserenda.* Alia etiam Cornarii Opuscula recensent Lindenius, & Lippenius. Ejus vero eloquentiæ, & multijugæ eruditionis specimen lector noster capiet ex duabus epistolis nuncupatoriis, quarum primam prius, alteram alteri Hippocratis sui editioni præfationis loco præmisit; utramque enim in nova hac Cornariana versionis editione damus, quod & autore suo digna visa est, & multa utraque continet, quæ medicus haud contemnat.

30 Laboris autem patientissimum; ut perhibent; Cornarium fuisse illud argumento est, quod licet tam multa scripserit, nunquam tamen tempus ei defuit, quo alibi viva voce doceret, aut quo clinicum ageret. Artem grammaticam tradidisse, & poetas, ac oratores Græcos publice enarrasse, testatur ipse idem in supra memorata epistola nuncupatoria; medicinam vero in Academiis Marpurgensi, Rostochiensis, & Jenensi publice docuit. Hanc quoque magna cum laude diversis in locis exercuit, nimirum apud Livones, Rutenos, in Principum Magaloburgicorum ditione, atque aula, nec non Northusii in Thuringia, deinde Francofurti ad Mœnum publicæ Reipublicæ salario conductus, tandemque in patria. Jenæ,

ait Komigius, diem supremum obiisse anno seculi decimi sexti, ætatisque suæ quinquagesimo octavo, ibique sepultum esse; Thuanus tamen Historiæ suæ l. 21. aliquæ Zvvicaviæ in patriâ vita functum referunt. Duos post se filios reliquit, Achatem, & Diomedem, medicinæ doctores. Hæc de Jano Cornario: jam porro de ejus Hippocratica versione pauca.

Antequam universa Hippocratis Opera in Latinum sermonem conversa publici juris Cornarius faceret, Hippocratis Epistolas Latio donatas Coloniz in lucem ediderat per Gymnicum in 8. anno 1542. nec non Basileæ per Oporinum libellos aliquot anno 1543. Cum autem anno 1546. totum Hippocratem daret, nescio, an sibi visus fuerit omnium primus, qui vertendo Hippocrati operam dedisset. Ita enim ait loco sæpius citato. *Cum per viginti ferme jam annos medicina Græca reviviscere cæperit: reducti sint Hippocrates, Galenus, Aetius, Paulus, Dioscorides: & hi non sua solum lingua, sed Latini etiam magna ex parte (uno Hippocrate hætenus saltem excepto) tum per doctos alios viros, tum per nos quoque facti.* Id certe Lindenio visum, neminem ante Cornarium hanc provinciam in Latinum sermonem convertendi Hippocratis occupasse. Inquit hic de Script. Med. *Hippocratem supra bis mille illos totos annos desideratum nemo unquam ante Cornarium Latinum reddere tentavit.* Ante Cornarium, quod neque ipse, neque Lindenius ignorare ullo modo potuit, non plura modo Hippocratis Opuscula fuere Latio donata, sed universa etiam plurium interpretum labore in Latinum conversa, ac in unum corpus digesta, quin ab uno eodemque interprete M. Fabio Calvo Latine reddita omnia, & simul prelo commissa. Consulantur hic, quos infra dabimus, plurium editionum Catalogi. Post Cornarium Hieronymus Mercurialis, ac Anutius Foesius Hippocratem convertere aggressi sunt, atque eorum uterque versionem suam e regione contextui Græco apposuit, exitu tamen dispari. Mercurialis enim paucis, nulli non probatus Foesius. Multis hic, quam Cornarius pluris est: alii, uter utri præferendus, in dubio relinquunt. Id affirmari libere potest, melioribus fatis in lucem prodixisse Cornarii versionem. Hæc enim omnium manibus vulgo teritur, neque ulla alia toties prela fatigavit.

PRÆSTANTIORES OMNIUM
HIPPOCRATIS
 OPERUM EDITIONES
 QUÆ AD NOSTRAM NOTITIAM
 pervenire potuere.

GRÆCÆ.

- I.  **MNIA** Opera Hippocratis. Venetiis in
 aedibus Aldi, & Andree Asulani Soceri.

Menſe Maii. M.D.XXVI. fol.

Joanni Georgio Trifſino, Vicentino, poetæ illi clariffimo, tam dedicat Franciſcus Aſulanus, qui brevi etiam ad Lectorem præſatione Inſtituti ſui rationem reddit.

II. *Hippocratis Cui Medici Veſuſſimi, & Omnium Aliorum Principis, libri omnes, ad utroſque Codices ſummæ ſtudio collati & reſtaurati. Baſileæ apud Hieronymum Frobenium, & Nicolaum Episcopium. MDXXXVIII. fol.*

Hanc editionem ſuperiori longe præſtantiorem, ut quique Græce ſcientiſſimus affirmat, Janus Cornarius curavit, de qua hæc ideam habet in ſua ad Matthiam Helk præſatione: Quam aliquot retro annis, non ſolum obſcuritas, & difficultas obſtiterit, quo minus Hippocrates ſtudioſorum manibus teneretur, ſed etiam penuria exemplarum, eorumdenque corruptio temporum injuria inſeſta: uſum eſt mihi hac parte ſui medici ſtudioſi juvare, quo Hippocratis etiam uiderem, tamque quanto caſtigatiſſimam expoſitionem habere. Atque hic non tam meum beneficium apud ſtudioſos implere uolo, quam Hieronymi Frobenii, & Nicolai Episcopii ſtadium, & ſedulitatem, immo incomparabilem erga bonæ ſtudia juvanda animi propenſionem, qui nulla impenſa parcimonia, curavit, ut Hippocrates ad tria uenüſſima exemplaria (quorum unum inſignis Medicus Adolphus Œco Auguſtenſis, alterum Jo. Dallwagii bibliotheca, poſterum Hieronymus Gouſſon, cuius etiam opera in hoc conferendo Frobenii non parum ſervant adjuvi, Pariſiis commodatè acceptum ab excellenti medico Nicolao Capo Guilielmi illius. Edictiſſimo, pridem Galliarum regis archiatro, exhibi-

bere) & nobis correſtus, adhibito ad hoc etiam Galeno, ex ipſorum officina quam caſtigatiſſimus prodiret, pluribus quater mille locis redintegratis, qui in priorè Venetæ editione aut deſuerunt ex toto, aut uitiati habebantur, atque hoc ea tamen religione a me factum eſt, ut nihil temere firmatum, niſi palam mendofum, ita ut in ambiguis quaque leſionibus, eas poſſimum ſequutus ſum, quas ipſam Galenum recepiſſe deprehendi.

LATINÆ.

Versionem Latinam antiquam Hippocratis, & Galeni commendat Caſſiodorus c.31. Div. ſcſi, quæ intercedit.

Pellegrinus Antonius Oelandus in Opere Italico de Ortu, & Progreſſibus Artium Typographicarum p. 544. meminit editionis Operum Hippocratis cum Com. Per. Ven. 1487. 20. Aug. per Bapt. de Torſis, fol. Nuſquam ipſi editionem hanc offendiſſimus. Facile tamen eſt credere, nihil aliud per Baptiſtam de Torſis actum, quam ſimul in unum volumen collecta haud ita multa Hippocratis Opuscula, quæ id temporis inventa fuerant, & Latino donata.

I. *Hippocratis Cui Medicorum Omnium longe Principis, octoginta Volumina, quibus maxima ex parte, annorum circiter duo miſſia Latina caruit lingua, Græci vero, Arabes, & Præſci noſtri Medici, plurimis tamen milibus prætermiſſis, ſcripta ſua illuſtraverunt, nunc tandem per M. Fabium Caluum Rhænnatæm virum undecunque doctiſſimum latinitate donata, Clementi VII. Pontific. Max. dicata, ac nunc primum in lucem edita, quo nihil humano generi ſalubrius fieri potuit. Romæ ex Aedibus Franciſci Miniſtri Calui Novocomenſis, Anno, a Partu Virginis MDXXV. fol.*

Hæc

HIPPOCRATIS

Hæc omnium, quas novimus, prima est
pocus Hippocratis Latini editio. Errat Fa-
bricius, pace viri eruditissimi dixerim, in
sua *Bibl. Græc.* ubi hujus editionis meminit
his verbis: *M. Fabius Calvus jussu Clem. VII.
Pontific. ex MSS. Græcis Patavici Hippocratem
convertit circa A. C. 1530. licet eisdem denotat
Romæ 1549. Neque enim Calvi Hippocrati-
ca versio primum edita est Romæ A. 1549.
quod, post Bartholinum de lib. legend. p. 117.
Fabricius affirmat, nimirum ut hanc edi-
tionem ea, quæ prodiit Parisi Interpretibus
Basileæ apud Andream Cratandrum A. 1526. po-
steriorem faciat, ut perliuasum videtur fuisse
etiam Lindenio de Script. Med. Præterea
hæc in Hippocratem vertendum curam in-
veniebat Calvus A. 1530. quem vita fun-
ctum scimus A. 1537. Sed Calvus ipse, ut
de hoc nemini sit dubitandum, asserit, se
totum in Hippocrate vertendo fuisse anno
1515. Editio Calvi copiosissimo Indice in-
structa est. De Ravennatis versione hæc
habet in sua *Bibl. Gesnerus*: *M. Fabius Calvus
Ravennat omnia Hippocratis opera vertit, sed ru-
dissimè, nec satis clare, Græci quoque dissimu-
lus saepe relictis: nullus est tamen vel hoc nomine
eius translatio, quoniam, ut legitur in Prefatione
eius, vultus Græci Codices diversarum lectio-
num in promptu habuit. Sed operæ pretium
est audire hic Georgium Hieronymum
VVellichium, Curat. Prop. & Cons. med. Dec. 4.
C. 5. qui cum in quamdam dictionem
Græcam incidisset, quam male versam a
Cornario putat, quod nimium fideret co-
dice, quo Calvus usus, ita de illo codice
judicat: *Fabii Calvi, sive Phaleri Codicem nos
in Patavica Bibliotheca nulla antiquitatis pri-
vativa conspeximus, sed ab ipsiusmet Calvi manu
ex MS. uno apographum quidem, non tamen opti-
mum, adeoque, ut conjicimus, nec ex optimo ex-
emplari descriptum, quamvis id antiquissimum vo-
casset. In eboris enim tantum non veteri, sed no-
strate, & vulgari exaratum est: Ut ideo Poesius
Prefatione Operis sui, dum membranas nominabat,
valde hallucinatus est, nec se vidisse, aut certe
non probe commeminasse, ipse prodiderit: quod an-
nus quoque adscriptus contestatur, qui ætatem
Ære, nostra Christianæ, nullissimam, quingentesi-
mum, duodecesimum denotat, qui sane a vetustate
longius abest, neque exceptionem ab industria Cal-
vi admittit, ut librum antigrapho parem existime-
mus, dum certe nobis de illa, quemadmodum &
de perissa L. Græca in Firv. castroque optimo non
satis constat.***

II. Hippocratis Cui Medicorum
Omnium longe principis opera: qui-
bus maxima ex parte annorum circi-
ter duo millia. Latina caruit lingua:
Græci vero & Arabes, & Prisci
nostri Medici, plurimis tamen utili-
bus prætermis, scripta sua illustra-
runt: nunc tandem per M. Fabium
Rhavennatem, Gulielmum Coperni-

Basileensem, Nicolæum Leonicensem,
& Andream Brentium, viros do-
ctissimos latinitate donata, ac jam
primum in lucem edita: quo reuera
humano generi nihil fieri potuit salu-
brius. Basileæ in Officina Andree
Cratandri, A. M.D.XXVI. fol.

Eadem est cum Romana editione anni
superioris, modo excipias Aphorismos, quos
vertit Nicolaus Leonicens, libros Presa-
porum, & Rationis Pili. in Morbus Acut. ex
versione Guil. Copi, & librum de No-
stra Hominis, Andree Brentio interprete.

III. Hippocratis opera omnia,
in que quidem Galeni extant com-
mentaria, hæclemus latio donata.
Nempe, Aphorismorum sectiones se-
ptem, Nicolao Leonicensio interprete.
Predictionum libri tres, a Lauren-
tio Laurentiano traducti. Ra-
tio victus in morbis acutis ex Joā-
nis Vassei Meldensis translatione. Ra-
tio victus privatorum ex Joānis
Guinterii Andernaci versione. De
natura humana liber unus, alter de
morbis popularibus, quos ambos fecit
latinos Hermannus Cruserius Cam-
pensis. Galeni in hæc omnia enar-
rationes jam recens emaculate, ac scho-
liis doctissimis ornate, a Joāne bā-
ptista Ferrario medico peritissima,
Lugduni apud Scipionem de Sabia-
no. 1535. Voll. 2. 8.

Editio rarissima, cujus mentio nulla aut
apud Lindenium de Scriptis Medicis, aut a-
pud Fabricium *Bibl. Græc.*

IV. Hippocratis Cui Medicorum
Omnium longe Principis, Opera,
quæ ad nos extant omnia. Per Ja-
num Cornarium Medicum Physi-
cum latina lingua conscripta. Ba-
sileæ, per Hieronymum Froben. &
Nicol. Episcopium. Mense Martio
M.D.XLVI. fol.

Hujus editioni Petrus Matthæus Pinus
suum Indicem accommodavit, ut supra me-
mini-

OPERUM EDITIONES.

minimus. Opus suum ad Senatum Populumque Imperialis urbis Augustæ Vindelicorum misit Cornarius elegantissima, & satis proluxa epistola, ubi multa eruditissime scribit de instituti sui ratione, ac de artis medicæ a primis ad sua tempora vicibus. Non deest huic editioni copiosus Index.

V. Eadem. Venetiis, apud Hieronymum Scottum, eodem anno 1546. fol.

Fugit hæc Lindenium, & Fabricium.

VI. Eadem. Parisiis, apud Carolum Guillard, eodem pariter anno, in 8. ex Lindenii testimonio.

VII. Eadem. Venetiis, apud Joannem Gryphium. 8. T. 2.

Lindenius, & Fabricius prodixisse typis Gryphii Hippocratem Cornarii ajunt, anno 1545. Id si constaret, præcessisset Veneta Basileensem editionem ab ipso Cornario procuratam, quod dicendum ne sit, alii videant. Ipse id scio, epistolam nuncupatoriam Basileensis editionis datam a Cornario *Atopurgi Hafforum Calend. Septemb. anni Christi M.D.XLV.* editionem vero tandem absolutam *Menſe Martio MDXLVI.*

VIII. Hippocratis Coi, Medicorum Omnium longe Principis Opera, quæ ad nos extant omnia: per Janum Cornarium Medicum Physicum Latina lingua conscripta, & demum ex toto recognita. Basileæ, per Hieron. Frobenium, & Nicol. Episcopium, anno M.D.LIII. fol.

Altera est hæc Cornariæ versionis editio, ad quam ceteræ omnes, quæ postea sequuntur.

IX. Eadem. Per eisdem Typographos Frobenium, & Episcopium, anno 1554. in 8. T. 2.

X. Hippocratis Coi Medicorum omnium longe Principis, Opera quæ ad nos extant omnia, per Janum Cornarium Medicum Physicum Latina lingua conscripta, & recognita. Cum accessione Hippocratis de

Hominis Structura libri, antea non excusi. Recens illustrata cum Argumentis in singulos libros, tum Indice insuper copiosissimo, per Joannem Culmā. Geppingen. nunc primè editis. Basileæ, per Hieron. Frobenium, & Nicol. Episcopium, anno M.D.LVIII. Menſe Sept. fol.

Nullam ex Cornariæ versionis editionibus hac habemus absolutiorem.

XI. Lugduni editum Hippocratem A. 1564. in 8. referunt Lindenius, & Fabricius. Repetitam illic puto Basileensem editionem anni 1558.

XII. Hippocratis Coi Medicorum omnium facile principis opera quæ extant omnia, Jano Cornario Medico Physico Interprete, novis & Argumentis in singulos libros, & Indice copiosissimo per Joann. Culman. Geppingen. editis, illustrata: postremoque ad fidem castigatissimorum veterum Græcorum exemplarium collata, & quam diligentissime restituta. Lugduni, apud Haeredes Jacobi Junctæ, 1564. fol.

Editio hæc nitida est, & satis emendata.

XIII. Hippocratis Coi Medicorum omnium facile principis Opera, quibus addidimus Commentaria Joann. Marinelli, in quibus morbi omnes, eorumque causæ, signa, ac curationes, quæ in libris Hippocratis dispersim scribuntur, una copulantur, atque tractantur. Deinde voces, ac loca in Hippocratis libris obscura, & difficilia, ex Galeni sententia declarantur: postea sententia plurimæ, quæ ab Hippocratis dignitate ob translationes perperam factas alienæ videntur, antiquorum auctoritate sunt correctæ: præterea multa, quæ sæpe leguntur in ejusdem libris,

HIPPOCRATIS

GRÆCO - LATINÆ.

bris, quæ a se ipsis alijs dissentire videntur, ea conciliata sunt. Ac tandem Index omnium copiosissimus. Nova & argumenta in singulos libros per Joan. Culman. Gepingen. sunt addita. Venetijs, apud Joban. Valgrisiun, 1575. fol.

Sæpius hæc editio repetita est. Verum præter hanc Valgrisianam, nullam magni faciendam puto; adeo recentissimæ quæque prioribus sunt maculatiores. Valgrisianæ autem vix unum modo exemplum reperies.

XIV. Magni Hippocratis Medicorum omnium facile principis, Opera omnia quæ extant in VIII. Sectiones ex Erotiani mente distributa. Nunc recens latina interpretatione donata, ac denuo separatim in lucem edita, Amutio Foesio Mediomatico Medico Authore: adjecta sunt ad VI. Sectionem PALLADIJ Scholia in lib. de Fracturis nondum antea excusa, & nunc primum e Græco in Latinum conversâ. Cum Indice amplissimo, & utilissimo. Francofurti, apud Hæredes And. VVechelii. M.D.XCVI. 8.

Quem anno superiore Hippocratem Græco-Latinum emiserat VVechelius, eundem novis formis Latinum dumtaxat hoc anno emisit.

XV. Ex Versione Cornarii cum Commentariis Marinelli. Vincentiæ, sumptibus Francisci Leunii, & Orlandi Jadre, 1610. fol.

XVI. Eadem. Venetijs, apud Hieronymum, & Alexandrum Polum, 1619. fol.

XVII. Eadem. Venetijs, typis Abbundij Menafolii, 1679. fol.

Simon Collinæus, typographus Parisiensis, varia Hippocratis Opuscula, alia alijs interpretibus, edidit, neque uno anno omnia, fol. 44. maj. Singula in singulorum operum ctencho memorabimus.

I. Hippocratis Cui Opera quæ extant Græce, & Latine, Veterum codicum collatione restituta, Novo Ordine in quatuor Classes digesta, Interpretationis latine emendatione, & scholiis illustrata, a Hieron. Mercuriali Foroliviensi. Venetijs, industria, ac sumptibus Junctarum, 1588. fol.

Michael Columbus Indicem addidit rectissimum. Omnibus tamen minime probatur Mercurialis, viri aliquam eruditissimi, ac medici doctissimi industria in Hippocrate vertendo. Bartholinus de legend. lib. 216, male se Mercurialem in numerum Interpretum ingressisse, judicio Castrensis.

II. Magni Hippocratis Medicorum omnium facile Principis, Opera omnia quæ extant in VIII. Sectiones ex Erotiani mente distributa. Nunc recens latina Interpretatione, & Annotationibus illustrata, Amutio Foesio Mediomatico Medico Authore. Adjecta sunt ad VI. Sectionem PALLADIJ Scholia Græca in lib. de Fracturis, nondum antea excusa, & nunc primum Latinitate donata. His præterea accessere varia in omnibus Hippocratis libros Lectiones Græcæ, ex reconditissimis manuscriptis exemplaribus summa diligentia collectæ, nec non etiam quorundam doctissimorum Virorum in aliquot Hippocrat. libros Observationes. Cum Indice quadruplici longe amplissimo & utilissimo. Francofurti apud And. VVecheli heredes, in fol. 1595. atque iterum 1621. tertio etiam 1624. & quarto 1645.

Eandem editionem exscripsit Samuel Chouet Gervæ 1657. in fol. quæ tamen longe abest a prima anni 1593. omnium optima. Ceterum, teste Andrea Ottom. Gœlicke in Hist. Med. Fossiana editio omnibus reliquis palmam non tam disputat, quam præcipit.

III. Hip-

O P E R U M E D I T I O N E S .

III. Hippocratis Cei, & Claudii Galeni Pergameni Archiatron Opera Renatus Charterius, Vindocinensis, Doctor Medicus Paris. Regis Christianissimi Consiliarius Medicus, ac Professor, plurima interpretatus, universa emendavit, illustravit, notavit, auxit, secundum distinctas Medicinæ Partes in tredecim Tomos digessit, & conjunctim Græcæ, & Latine primus edidit, Lutetiae Parisiorum, apud Andream Pralard, anno MDC.LXXIX. in fol.

Nihil est, quod in hac vere magnifica, & numeris omnibus absolutissima Hippocratis, & Galeni editione desideres, præter copiosissimum rerum Indicem, quem Charterii mors nobis invidit.

IV. Magni Hippocratis Col Ope-

ra Omnia. Græcæ, & Latine Editæ, & ad omnes alias Editiones accommodata. Industria, & diligentia Joann. Antonide Vand. Linden. Lugd. Batav. apud Gaadsbrechtios, 1665. in 8. T. 2.

Commendant hanc editionem varia ornamenta, tum forma minus ad utentium commodum, sed præcipue non levis Interpretis eruditio. De hac tamen ita sentit Andreas Ottom. Gœlick. l. c. Nescio, quæ animi intemperie studiosi Medicinæ vulgo ruant in editionem Vanderlindianam, eamque inmani prætio redimant, cum hæcenus perspicere mihi non licuerit, quid Lindenius singulare præstiterit præ aliis.

In alias linguas conversum Hippocratem memorant, ac præcipue in Arabicam. Ex vulgaribus Gallica lingua donatum novimus ab Andrea Dacero, consultis MSS. Bibliothecæ Regiæ, atque editum Enchiridii forma Parisius Poll. 2. anno 1697. instructum annotationibus criticis, ac addita Hippocratis Vita.



SINGULORUM HIPPOCRATIS OPUSCULORUM EDITIONES ALIQUÆ

CUM EORUMDEM INTERPRETIBUS

Qui magis Commendantur:

UNIVERSA Hippocratis Opera, quæ Græcè, & Latine edidere, perpetuis notis illustravit Hieronymus Mercurialis, & Anatinus Foesius. Hæc Hippocratis studiosus operæ pretium facturus est, si perlegat, simulque eis jungat, quæ sequuntur:

1. *Lingugum*, hoc est, obsoletarum Hippocratis Vocum explanationes Græco-latina Galeni, Erotiani, & Hierodoti. Extant ad calcem Hippocratis G. L. ejusdem Mercurialis, & inter Opera G. L. Hippocratis, & Galeni edita à Charterio, T. 2.

2. *Hieronymi Mercurialis Variarum Lectionum*, in *Medicine Scripioribus*, & aliis, Lib. 91. Pæet, apud Justas, in 2. 84 fol. Quæ pauca in hoc opere ad Hippocratem spectant, ad eum intelligendum plurimum conferunt.

3. *Oeconomia Hippocratis*, Alphabeti serie distincta, in qua Distinctionum apud Hippocratem terminum, præsertim obscurarum, usus explicatur, & velut ex emplificatione penitus deprimitur: Ita ut

Lexicon Hippocrateum merito dici possit. Anatinus Foesius Auctor, à Francofurti apud Andrea VVetzelii Haeredes 1588. in fol. Editio hæc omnium optima jure censetur.

4. *Joannis Gorrae Definitionum Medicarum libri XXIV*, à Joan. Gorrae filio locupletati, & accessitque magna augmenti. Parisiis apud Societatem Medicam, 1622. fol.

5. *Adversus Hippocratem Ooni*, Prosperi Martini Alcantarionis explicatus, Roma typis Jacobi Mezzardi, 1626. in fol. Venetiis apud Guersilios, 1635. in fol. Hoc opus sibi proposuit Martini, quatenus alii aut præterierant, aut sponte misererant, perperamque (eo iudice) intellexerant, & exasperant dicerent, & ad verum sensum reducerent.

Singula Hippocratis Opera, eorumque Commentarii jam recensenda. Quoniam vero offendi ipse adhuc neminem, qui in libris de *Superfutatione*, de *furis in utero mortui Exfectione*, de *Dentitione*, de *corporum Resfectione*, de *Quarta de Officiis Natura*, de *Affectionibus*, de *Natura muliebri*, de *sterilibus*, de *Indicationibus*, de *Dieta critica*, sive *indicationibus*, de *Fistulis*, de *Hæmorrhoidibus*, de *videndi Acie*, de *hominis Structura* illustrandis, lucis aliquid attulerit, medicinæ candidatus, donec quispiam occurrat, sic auctore, laudatis celeberrimorum virosum annotationibus contentus erit.

JUS JURANDUM

UTILE æque opus, ac jucundum. Hinc discimus, vel ab antiquissimis temporibus cautum fuisse, ne medicina nisi ab honestis, & diligentibus hominibus exerceretur, præscriptumque, quo animo ad hanc proficiendam accedendum esset. Hippocratis Jusjurandum haud semel impressum est ad calcem Fabularum *Æsopicarum*: Habet enim multa cum aliarum artium professoribus communia, ideoque dignum, quod à prima statim ætate puerorum etiam ante oculos versetur, ac omnium manibus teneatur. Vulgatum est hoc opusculum latine Venetiis anno 1493. una cum libris de *Natura fortis*, & de *Lege*, itemque simul cum aliis opusculis Francofurti anno 1587. in 12. eva, ac diligenter Joan. Opposi. In Italicam linguam translaturum est à Lucilio Philaltheo, ac una cum *Apophorismis* editum est Papiæ anno 1552. in 8. Notas adjecit Joan. Francisc. Martinionus.

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

In Hippocratis Jusiurandum hæc præ ceteris legenda:

1. Blasii Hollerii in Jusiurandum Hippocratis Commentarius. Basilea, 1558. in 8.

2. Hippocratis Jusiurandum, Commentario illustratum a Petro Afemonio. Rostochii, 1577. in 8.

3. Hippocratis Jusiurandum Tabula illustratum, studio, & conatu Theod. Zuingeri. Extat G. L. cum Hippocratis Cui Viginti duobus Commentariis, Tabulis ab eodem Zuingero illustratis, Basilea, 1579. in fol. pag. 56. & seqq.

4. Hippocratis Jusiurandum cum Paraphrastica Persone, & brevibus Commentariis Jo. Huruii. Extat G. L. inter Hippocratis Prolegomena. Lugd. Bat. 1597. in 4. Hæc Hippocratis Prolegomena, ac eius propterea Jusiurandum habebis etiam inter Opera ejusdem Heurnii, quorum optima editio est Lug. Bat. anni 1609. in 4.

5. Hippocratis Jusiurandum, interpret Jo. Gorraei. Accesserunt ejusdem Interpretis Annotationes. Extat G. L. cum ejusdem Gorraei Operibus. Parisiis, 1622. in fol.

6. Francisci de Francisci Commentarius in Hippocratis Jusiurandum. Extat Tomo Primo Prælectionum Altopelensium ejusdem Interpretis. Geneva, 1618. in 8.

7. Francisci Raschini in Hippocratis Jusiurandum Commentarius. Extat inter ejusdem Raschini Opuscula Medica. Lugdani, 1627. in 4.

8. Hippocratis Magni Jusiurandum, recensitum, & libro commentario illustratum a Joanne Henrico Aseibonio. Lug. Bat. 1643. in 4. Aurea Mcibonii Commentaria ceteris omnibus præstare si quis dicat, falli hunc, ipse minime dicam.

L E X

OPUSCULUM hoc quæ præcipue illustrant, hæc sunt opera:

1. Hippocratis Novum Tabula illustratum, studio, & conatu Theod. Zuingeri. Extat G. L. cum Hippocratis Cui Viginti duobus Commentariis pag. 51. & seqq.

2. Rodricii a Fonseca in Hippocratis Legem

Commentarium, quo perfecti Medici natura explicatur. Romæ 1586. in 4.

3. Hippocratis Lex cum Paraphrastica Persone, & brevibus Commentariis Jo. Huruii. Extat G. L. inter memorata Hippocr. Prolegomena.

D E A R T E

Liber I.

OPUS hoc, quod nemo Hippocrati abjudicat, legentibus haud levi erunt utilitati

1. Hippocratis de Arte Commentarium Tabula illustratum, studio, & conatu Theod. Zuingeri. Extat G. L. cum Hippocratis Cui Viginti duobus Commentariis pag. 1. & seqq.

2. Hippocratis de Arte Liber unus, Interpretæ Joan. Gorraei. Accesserunt ejusdem Interpretis An-

notationes. Extat G. L. cum ejusdem Gorraei Operibus. Parisiis 1622. fol.

3. Hippocratis de Arte Liber I. cum Paraphrastica Persone, & brevibus Commentariis Jo. Huruii. Extat G. L. inter Hippocratis Cui Prolegomena.

D E V E T E R I M E D I C I N A

Liber I.

SOLIDA hujus operis doctrina solidam parietem est utilitatem. Magnos illos viros Zuingerum, Gorraeum, Heurnium, quos legendos in librum de Arte proposuimus, & in librum de Veteri Medicinâ laudatis locis legendos proponimus. Adde

Guillelmi ren Romæ Meditationes in Magni Hippocratis Textum XXIV. de Veteri Medicina &c. Lugduni Batavor. 1672. in 12.

D E M E D I C O

Liber I.

HUJUS libri neque Galenus meminit, neque Erotianus. Hinc non nemo de ejus auctore dubitat. Qui tamen Hippocratis esse sentiunt, haud male de Hippocrate sentiunt, Franciscus Feureus, qui Chirurgicos Hippocratis libros cum Commentariis Vidi Vidi Gallice vertit, elegantissima in Hippocratis librum de Medico Commentaria Gallice conscripsit. Præter hunc versandi sunt etiam locis citatis Theod. Zuingerus, Joan. Heurnius, & Joan. Gorraeus, cujus Annotationes, & Scholia in hunc Hippocratis librum & seorsum excula sunt Parisiis A. 1543. in 8.

Hipp. Opera.

HIPPOCRATIS DE DECENTI ORNATU

Liber I.

QUAMVIS Hieronymus Mercurialis, alique acerrime contendant, falso tribui hunc librum Hippocrati; utilem nihilominus medicis esse, diffusetur nemo. Illum illustrarunt Zuingerus, & Heurnius.

PRÆCEPTIONES

NEC Galeno, neque Erotiano innotuisse Hippocratica Præceptiones Foelso videntur, cum nullas inde dictiones eos attigisse, & explicasse, satis constet. Prosper Martianus librum hunc omnium Hippocraticorum obscurissimum iudicat. Lucem ei propterea afferre maximopere conatur suis Commentariis. Eodem tamen teste, magnam laudem merentur, quæ Zuingerus in illum commentatus est, inæst Viginti duo Hippocratis Commentaria. Inter Hippocratis toties laudata Prolegomena extant etiam Hippocratis Præceptiones G.L. cum Paraphrastica Persone, & brevibus Commentariis Joan. Heurnii.

DE NATURA HOMINIS

Liber I.

IN hunc librum, indubitatum Hippocratis sortum, suoque autore dignum, Fagoueus Commentarium Gallice conscripsit. Maximam capiet utilitatem, qui Theodorum Zuingerum, & Heurnium in illum perleget. Querendi præterea

1. Hippocratis de Natura humana libellus geminus, & elegans, novo Gymnasio Bremensi propositus a Joan. Evvicio. Brema, 1584. in 4.

2. Blasii Hölzerii in Hippocratis librum de Na-

tura hominis Commentarius. Argentorati, 1558. in 8.

3. Hippocratis de Natura hominis liber, latine versus, & paraphrasi explicatus a Hieronymo Massario. Argentorati, 1564. in 8.

DE SALUBRI DIÆTA

Liber I.

ADESCRIBENDUM Polybo, Hippocratis discipulo, opus de Salubri Diæta censebat Galenus. Jo. Guinterio Andernaco interprete, impressum fuit Parisiis apud Cbrist. VVechelum A. 1528. fol. cum Gal. lib. de Plenitudine ab eodem Guinterio converso. Parisiis etiam edidit Jacobus du Puy anno 1577. in 16. cum Thesaurio sanitatis Joan. Liebauhii. Albanus Torinus cum aliis ejusdem Polybi opusculis hoc quoque in Latinum vertit, quæ Basilea Oporinus edidit an. 1544. in 8. sic inscripta: Polybi Opuscula aliquot, nempe de Tuenda Valetudine, seu de Ratione Vitis Sanorum Lib. 1. de Seminibus Humani Naturæ Lib. 1. de Morbis, seu Affectionibus Corporis Lib. II. Latine, Albano Torino interprete. Eadem etiam Græco vertit Italice Petrus Laureus Mutinensis, quæ publici juris fecit Venetiis Cominus de Trino A. 1545. in 4. Lucem huic operi afferunt præter Galeni Commentaria,

1. Hieremia Thriverii in Polybum, aut Hippocratem de Ratione Vitis Moratorum, aut Privatorum Commentarius. Lugduni, 1548. in 8.

2. Polybi de Diæta Salubri, seu de Vitis Privatorum Libellus, ex Græco translatus, & brevibus Scholiis illustratus a Job. Placotomo. Ac-

cessit Doctrina Græc. Antwerpæ, 1561. in 16.

3. Hiermanni Cræserii Commentarius in Hippocratis librum de Salubri Diæta. Extat cum ejusdem Interpretis Commentario in Hippocratis 1. & III. de Morbis Pulgaribus, Basilea 1570. in 8.

DE GENITURA

Liber I.

ET hunc librum Polybo, discipulo, & genero Hippocratis, adjudicant. Quæ in illum & Zuingerus, & Gorraus scripsere, utilissima sunt.

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

DE NATURA PUERI

sive F O E T U S.

Liber I.

SI de hujus libri autore judicandum sit, non una ratio pro Polybo pugnabit. A. 1493. Latine editum esse *Penetius* una cum *Jurejurando*, & libro de *Legē*, supra memoratis. Anno 1502. typis Octav. Scoti *Penetius* prodire *Dini de Garbo Recollectiones in Hippocratem de Natura Fetus*, una cum aliis ejusdem argumenti libris. Utrum præter Zuingerum, & Goræum, ad hunc librum illustrandum alii, qui legi mereantur, suas curas contulerint, diligentiam meam omnino fugit.

DE CARNIBUS

Liber I.

VERUM esse hujus libri titulum de *Principiis*, Prosper Martianus, atque alii multi validis argumentis evincunt. Etsi nonnulla hic inveniantur, quæ non satis videntur cum iis convenire, quæ alibi Hippocrates docuit, inter ejus tamen opera hunc librum recensendum, idem Martianus judicat. Nemo occurrit, qui faciem præferat hoc opusculum evolventibus, præter Zuingerum in *Hippocratis Vaginti duobus Commentariis*, & Heurnium in *Hippocratis Prolegomenis*, nunquam e manibus dimittendos.

DE SEPTIMESTRI AC OCTIMESTRI PARTU

Libri II.

ZUINGERUS unus, quantum satis est, viam monstrat ad hos libros legendos accedentibus. In eos tamen scripsit & Hieronymus Cardanus, cujus *Commentaria* extant cum ejusdem autoris *Commentariis in Hippocratis Prognostica*. Basilea, 1568. fol. Quæ in unum de *Septimestri Partu* librum commentatus etiam est Ferdinandus a Mena, extant cum ejusdem *Methodo curatoria febrium omnium*. Antverpiæ, 1568. 4.

DE GLANDULIS

Liber I.

EROTIANUS nullam hujus operis mentionem facit, Galenus autem illud juniori cuidam tribuit. Inter *Viginti duo Hippocratis Commentaria* invenies, quæ Zuingerus ad librum hunc illustrandum attulit.

MOCHLICUS LIBER sive VECTIARIUS

LIBER hic, ut optime animadvertit Foesius, ad *Chirurgiam ut maxime accommodatus, ita valde necessarius esse videtur*. Paraphrasticè illum interpretatus est Nicolaus Florentinus; nihil tamen æque utile invenies ad ipsum intelligendum, ac Srephani Manialdi *Commentaria*, quæ extant cum *Hippocratis Cui Chirurgia, nunc primum Græcè restituta, Latinitate donata, & Commentariis illustrata*. Parisiis, 1616. 8. Rarissimum opus, & magno pretio redimendum.

DE LOCIS IN HOMINE

Liber I.

EX iis, qui hunc librum illustrare conati sunt, post Zuingerum, cui primas nemo non deferret, unum delige Leonardum Bansehium, qui *Commentarios in librum de Locis in Homine* una cum aliis in *Libros de Medicamento Purgante, de Usu Venætri, ac de Diæta* edidit *Matriti ex Officina Regia*, 1594. in fol.

HIPPOCRATIS

DE AERE AQUIS & LOCIS

Liber I.

PARAPHRASTICE præclarum hoc Hippocratis opus exposuit Camillus Flavius, & publico donavit ipse Robertus Adelphi Pincellus, 1596. in 4. Galenum in hunc librum leges, sed præterea quæ legantur, digna sunt:

1. Hippocratis, Medicorum omnium Principis, de Aere, Aquis, & Locis liber olim inuentus, nunc integer, qui Galeno de Habitacionibus, & Aquis, & Temporibus, & Regionibus inscribitur, Commentariis quatuor illustratus à Adriano Alemanno, Parisiis, 1557. in 8.

2. Hieronimi Cardani in Hippocratis de Aere, Aquis, & Locis Opus Commentariis, quibus & alia antea non impressa accedunt. Basilica, anno 1570. fol.

3. Hieronimi Cardani in Hippocratem de Aere, Aquis, & Locis Commentariis. Accedunt & Basilica, 1570. fol. Estat etiam cum eiusdem Cardani Operibus omnibus in decem Tomos digestis, Geneva, 1624. fol.

4. Baccii Baldini in librum Hippocratis de Aere, Aere, & Locis Commentaria. Florentia, 1586. in 4.

5. Ludovici Septalii in librum Hippocratis Col de Aetibus, Aquis, & Locis Commentarii v. Appositus est Græcus Hippocratis Contextus ope antiquarum Exemplarium restitutus, & in multis locis emendatus; una cum nova eiusdem in Latinum Versione. Colonia, 1590. fol. Francofurti, 1645. fol. Opus vete autem, & medicorum manibus nunquam non terendum.

6. Ioan. Martini Praefectianus in librum Hippocratis Col de Aetibus Principis de Aere, Aquis, & Locis. Parisiis, 1646. in 4. Omnia hic lectu dignissima.

Inter huius libri interpretes locus sit etiam Zuingero in illis & hic memorandis Duobus & Viginti Hippocratis Commentariis.

DE FLATIBUS

Liber I.

Non dubites Hippocratem huius libri autorem fateri. Quæ legentem iuvare possint, invenies apud Zuingerum cit. Commentar. Præterea adicit Adrianus Alemannus. Huius est: Hippocratis, Medicorum Omnium Principis, de Flatibus liber Commentariis illustratus. Parisiis, 1557. 8.

DE MEDICAMENTIS PURGANTIBUS

Liber I.

GRÆCE editus est Basilea, anno 1544. in 4. cum aliquot Galeni Opusculis. Junius Paulus Crassus Latinum fecit, illumque addidit operi Theophili Protospatarii de Corporis Humani Fabrica. Mizisice cum illustrant

1. Leonardi Bouschii Commentarius, qui extat cum ejusdem Commentariis in alios libros Hippocratis. Metz, 1594. fol.

2. Ioan. Ficurnius in Hippocratis Prolegomenis. Nihil apud elarissimum Henrjum offendes, ut id hoc loco dicam, quod te non oblectet, & erudiat quam maxime. Gratia esse debet Genevensibus editoribus, qui eius Commentaria cum Hippocrate G.L. prelo iterum commiserunt.

3. Ferdinandi a Mena Medebodui Februm Om-

nium &c. Accessit liber de Purgantibus Medicinis &c. Antwerpia, 1568. in 4. Commentum in libro proprio de Venæ sectione, & Purgatione, 1558. in 8.

4. Hippocratis de Pharmacis Purgantibus libellus. Ex Cujatiano Codice a R. P. S. J. expressus, hactenus in plerisque Hippocratis Editionibus desideratus; quem & Latine vertit, & notis illustravit. Parisiis, 1621. in 24. Opusculum auro contra æstimandum, sed inventu perquam difficile.

DE DIÆTA five VICTUS RATIONE

Libri III.

HAUD pauci sunt, qui opus hoc Hippocraticum negligunt, quod forte illis salebrosum, & obsebrum videtur. Magnæ tamen utilitati est legentibus. In hoc illustrando se ipsum superasse visus est multis Zuingerus opere toties laudato. Lucem etiam eidem

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

eidem luculentam attulere *Leonardi Banseii Commentarii*, editi cum aliis *Marriti*, ut supra monuimus.

DE INSOMNIIS

Liber I.

GRÆCÆ impressus *Perisii apud Avellem* an. 1586. in 8. Sed haud paulo ante, nimirum an. 1497. *Venetis apud Olier.* Scotum cuius fuerat Latine in fol. interprete *Andrea Brentio*, qui etiam suas in eum *Commentationes* adiecit. *Theodorus Zuingerus* nemini posthabendus est, qui eum explicavit. Eruditissimos etiam habemus in hunc librum *Iulii Caesaris Scaligeri Commentarii*, pluries variis in locis impressos.

DE ALIMENTO

Liber I.

CONTRA Galenum, qui huius libri autorem Hippocratem habet, alii *Thessalo*, alii *Herophilo*, nonnulli *Philistionis*, *Pharecydi* aliqui tribuunt. Hippocratem, ut ipse arbitror, minime pueret suum appellare. Eius doctrinam assecuturis facem præferent

1. *Antonii Franciscani in librum Hippocratis de Alimento Commentarius*, *Venetis*, anno 1566. in 4.
2. *Hippocratis de Alimento liber*, latinitate donatus, & Scholiis illustratus a *Stephano Goumelino*. *Lutetiae*, 1572. in 8.
3. *Hieronymi Cardani in librum Hippocratis de Alimento Commentaria*. *Roma*, 1574. in 8. *Basilæ*, 1582. in 8.
4. *Commentaria in Hippocratis librum de Alimento*, *Antibori Francisco Fallezio*. Extant G.L. cum ejusdem in *Aphorismos Hippocratis Commentarii*. *Colonia*, 1589. in fol. pagg. 213. 214. & seqq.

His omnibus adde, qui & hic recurrit, præstantissimum *Zuingerum*.

DE HUMIDORUM USU.

Liber I.

HIC libellus, Galeno, & *Erotiano* ignotus, est valde notus, quemadmodum sentiunt saniores interpretes, & utrumque consorcium ex se habet. Inter *Figuræ duo Hippocratis Commentarii* & in hunc librum *Zuingeri* doctissimi *Annotationes* invenies. Has perlege.

DE HUMORIBUS

Liber I.

EX *Erotiani*, & *Galeni* auctoritate quisquis Hippocrati hoc opus adidicat. Scripsit in illud doctissimos *Commentarios* clarissimus *Ludovicus Dureus*, impressos *Parisiis*, 1631. in 8. quocunque pretio parandos, si forte alicubi venales reperiantur.

DE MORBO SACRO

Liber I.

FALSO hunc librum Hippocrati adscribi, putant aliqui. Eum tamen illustravit *Antonius Ponce de Sancta Cruce*, cujus in hunc librum *Prælectiones Vallisletanae* curæ sunt *Medicini*, 1631. in fol.

non fuerit oblectatus, idem tamen ait in epistola ad Senatum Populumque Augustæ Vindelicorum, *post prima Grammatica rudimenta nullo se unquam privato præceptore usum esse*. Annos viginti cum ageret, erat *en Petri Mosellani, viri eruditi, & in primis soave loquenti facundia ornati auditoribus*, ut ex laudata epistola novimus. Cum vero non satis commoda valetudine juvenis uteretur, & vario morborum genere subinde affligeretur, ut ipse sibi opem asferre posset, statuit se totum medicinæ studio tradere, fato suo ad hujus artis amorem tractus. Itaque unum & viginti annos natus, VVitembergæ Magister Philosophiæ salutatus est, atque anno insequenti ibidem Medicinæ Licentiatus, ac deinde Ticini in Italia Medicinæ Doctor inauguratus est, & laurea donatus.

Qui autem Græce, & Latine sciebat, cum animadvertisset, nonnisi Arabum medicinam in scholis explicari, cepit serio cogitare de optima, hoc est Græca medicina in lucem revocanda. Nulli erant tunc temporis in Germania Græci medicorum codices, eorum propterea querendorum studio Italiam, Galliam, Angliam, Belgium peragravit, ac cum eorum nonnullos Basileæ tandem invenisset illuc ex Italia deportatos, per annum in ea civitate commoratus est, ut invento thesauro uteretur, ac frueretur. Dubium potest esse nemini, quin Hippocraticam M. Fabii Calvi versionem Basileæ in manus sumserit, iterum ibi a Cratandro ex bona parte impressam, ac forte etiam Phalacri codicem, quo Calvus usus, transumptum scilicet ex transumpto; quamquam & Hippocratem a Calvo editum, & exscriptum ab ipso codicem potuerat Romæ vidisse. Puto autem Græcos codices suos, aut aliorum opera descriptos secum Basilea detulisse, cum illinc reversus, statim se totum vertendis Græcis autoribus tradiderit, nec solum medicis, & philosophis, sed etiam Patribus. Singulos enumerat Gesnerus in Biblioth. qui de ipso ait: *ex Græcis scriptis Latina fecit multo plura, quod sciam, quam quisquam alius nostro sæculo*. Ex Patribus quidem Cornario debet lingua Latina Chrysostomum, Epiphanium, Basilium Magnum, ex medicis vero, & philosophis Aretæum, Aetium, Aeginetam, Dioscoridem, Artemidorum, Galenum, ac præ ceteris Hippocratem, quo vel uno optime de re medica meritis esset. In hoc vertendo ferunt quindecim annos infumisse, quem tandem absolutum cum Senatu Populoque Imperialis urbis Augustæ Vindelicorum dicasset, centum aureis donatus est. Ceterum haud multorum manu exaratorum codicum, eorumque haud optimæ notæ in vertendis Græcis copia illi fuit, ideoque & in Hippocratis versione Calvi codice, & in aliorum versione editis, aut de-

teriori-

terioribus MSS. uti debuit. Huic rei tribuendum putat Georgius Hieronymus VVelfchius *Curat. Propr. & Consil. Medic. Dec. 4. Curat.* 5. quod non undequaque perfectas versiones dedit. Ita ille: *Nec alia causa fingenda est, quod postea Cornarius, solum illum (Calvi codicem) scrupulosius adfectatus, subinde cespitaret. Erat enim non tantum Græce eruditissimus, sed etiam medicinae scientia multis aliis præcellerat: sed quia Latinas suas versiones ad contextus editos tantum conformabat, MSS. ope destitutus, usuque nonnihil infelix, imperfectas nobis utique dedit, quod vel sola Aretæi recensio ab Henischio quondam nostro, & Petito Parisiensi satis docuerit, nos quoque de Paulo Ægineta aliisque ostendimus in Variis nostris.*

Qui tamen totus videtur fuisse in Græcis in sermonem Latinum transferendis, haud omnia nobis ingenii sui monumenta invidit. Refert Gesnerus duas ejusdem Orationes extare una cum aliquot Hippocratis libellis ab ipso conversis, impressas Basileæ per Oporinum anno 1543. in 8. Alteri est titulus: *Hippocrates, seu Doctor verus*; alteri: *De rectis Medicinæ studiis amplectendis*. Cum autem inimicitias cum Leonh. Fuchsius exerceret, qui super ejus versionibus litem ei moverat, in illum invectus est opere, quod inscripsit: *Vulpecula excoriata*. Fuchsius enim, ut ajunt, vulpem Germanice significat. Reposuerat illi Fuchsius libellum inscriptum: *Cornarius furens*. At Cornarius novam in illum satiram conscripsit, cujus inscriptio: *Nitrum, ac Brabyla pro vulpecula excoriata asservenda*. Alia etiam Cornarii Opuscula recensent Lindenius, & Lippenius. Ejus vero eloquentiæ, & multijugæ eruditionis specimen lector noster capiet ex duabus epistolis nuncupatoriis, quarum primam primæ, alteram alteri Hippocratis sui editioni præfationis loco præmisit; utramque enim in nova hac Cornariana versionis editione damus, quod & autore suo digna visa est, & multa utraque continet, quæ medicus haud contemnat.

50 Laboris autem patientissimum, ut perhibent, Cornarium fuisse illud argumento est, quod licet tam multa scripserit, nunquam tamen tempus ei defuit, quo alibi viva voce doceret, aut quo clinicum ageret. Artem grammaticam tradidisse, & poetas, ac oratores Græcos publice enarrasse, testatur ipse idem in supra memorata epistola nuncupatoria; medicinam vero in Academiis Marpurgensi, Rostochiensis, & Jenensi publice docuit. Hanc quoque magna cum laude diversis in locis exercuit, nimirum apud Livones, Rutenos, in Principum Magaloburgicorum ditione, atque aula, nec non Northusii in Thuringia, deinde Francofurti ad Mœnum publico Reipublicæ salario conductus, tandemque in patria. Jenæ,

ait Konigius, diem supremum obiisse anno seculi decimi sexti, ætatisque suæ quinquagesimo octavo, ibique sepultum esse; Thuanus tamen Historiæ suæ l. 21. aliique Zvvcaviæ in patria vita functum referunt. Duos post se filios reliquit, Achatem, & Diomedem, medicinæ doctores. Hæc de Jano Cornario: jam porro de ejus Hippocratica versione pauca.

Antequam universa Hippocratis Opera in Latinum sermonem conversa publici juris Cornarius faceret, Hippocratis Epistolas Latio donatas Coloniz in lucem ediderat per Gymnicum in 8. anno 1542. nec non Basileæ per Oporinum libellos aliquot anno 1543. Cum autem anno 1546. totum Hippocratem daret, nescio, an sibi visus fuerit omnium primus, qui vertendo Hippocrati operam dedisset. Ita enim ait loco sæpius citato. *Cum per viginti ferme jam annos medicina Græca reviviscere cæperit: reducti sint Hippocrates, Galenus, Aetius, Paulus, Dioscorides: & bi non sua solum lingua, sed Latini etiam magna ex parte (uno Hippocrate hætenus saltem excepto) tum per doctos alios viros, tum per nos quoque facti.* Id certe Lindenio visum, neminem ante Cornarium hanc provinciam in Latinum sermonem convertendi Hippocratis occupasse. Inquit hic de Script. Med. *Hippocratem supra bis mille illos totos annos desideratum nemo unquam ante Cornarium Latinum reddere tentavit.* Ante Cornarium, quod neque ipse, neque Lindenius ignorare ullo modo potuit, non plura modo Hippocratis Opuscula fuere Latio donata, sed unversæ etiam plurium interpretum labore in Latinum conversa, ac in unum corpus digesta, quin ab uno eodemque interprete M. Fabio Calvo Latine reddita omnia, & simul prelo commissa. Consulantur hic, quos infra dabimus, plurium editionum Catalogi. Post Cornarium Hieronymus Mercurialis, ac Anutius Foësius Hippocratem convertere aggressi sunt, atque eorum uterque versionem suam e regione contextui Græco apposuit, exitu tamen dispari. Mercurialis enim paucis, nulli non probatus Foësius. Multis hic, quam Cornarius plurius est: alii, uter utri præferendus, in dubio relinquunt. Id affirmari libere potest, melioribus fatis in lucem prodisse Cornarii versionem. Hæc enim omnium manibus vulgo teritur, neque ulla alia toties prela fatigavit.

PRÆSTANTIORES OMNIUM
HIPPOCRATIS
 OPERUM EDITIONES
 QUÆ AD NOSTRAM NOTITIAM
 pervenire potuere.

GRÆCÆ.

I.  **MNIA** Opera Hippocratis. Venetiis in ædibus Aldi, & Andreae Asulani Soceri.

Menſe Maii. M.D.XXVI. fol.

Joanni Georgio Trifſino, Vicentino, poetæ illi clariffimo, tam dedicat Franciſcus Aſulanus, qui brevi etiam ad Lectorem præſatione inſtituti ſui rationem reddit.

II. *Hippocratis Coi Medici Veriſſimi, & Omnium Aliorum Principis, libri omnes, ad vetuſtos Codices ſumma ſtudio collati & reſtaurati. Baſileæ apud Hieronymum Frobenium, & Nicolaum Epiſcopium. MDXXXVIII. fol.*

Hanc editionem ſuperiori longe præſtantiorem, ut quilibet Græce ſcientiſſimus affirmat, Janus Cornarius curavit, de qua hæc idem habet in ſua ad Matthiam Helvetii præſatione: *Quam aliquot retro annis, non ſolum obſcuritas, & difficultas obſtiterit, quo minus Hippocrates ſtudioſorum manibus treretur, ſed etiam penuria, exemplarum, eorumdemque corruptio temporum injuria inſecta: niſum eſt mihi hac parte miſericordie ſtudioſos juvare, quo Hippocratis copiam uberem, tamque quam caſtigatiſſimam expoſitam haberent. Atque hic non tam meum beneficium apud ſtudioſos inſillare ſolo, quam Hieronymi Frobenii, & Nicolai Epiſcopii ſtudio, & ſedulitatem, immo incomparabilem erga bona ſtudia iuvanda animi propenſionem, qui nulla impenſa parcimonia, curavit, ut Hippocrates ad tria uſuſſima exemplaria (quorum nomen inſignis Medicus Adolphus Oeco Anguſtini, æterni ſo. Dalbergii bibliobæva, poſſidentium Illuſtriſſimo Genuſiano, cuius etiam opera in eâ conferenda præſentibus non parum ſuaviter adjuti, Pariſiis commodatè acceptum ab excellenti medico Nicolao Copo Gallienus illius Baſilienſis præſentem Gallienum regis archiatrum ſuo, exhibere)*

juvare) a vobis correctus, adhibito ad hoc etiam Galeno, ex ipſorum officina quam caſtigatiſſimus prodiret, pluribus quater mille locis reſintegratis, qui in priorè Venetæ editionis aut deſuerunt ex toto, aut vitiatæ habebantur, atque hoc ea tamen religione a me factum eſt, ut nihil temere ſit mutatum, niſi palam mendofum, ita ut in ambiguis quoque lectionibus, eas poſſimum ſequatur ſui, quas ipſum Galenum recepiſſe deprehendi.

LATINÆ.

Verſionem Latinam antiquam Hippocratis, & Galeni commendat Caſſiodorus c. 31. *Dir. leſt, quæ interdicat.*

Pellegrinus Antonius Orlandus in Opere Italico de *Ortu, & Progreſſibus Artis Typographicæ* p. 544. meminit editionis Operum Hippocratis cum *Com. Ver. Ven. 1487. 20. Aug. per Bapt. de Tortis, fol.* Nuſquam ipſi editionem hanc offendiſſimus. Facile tamen eſt credere, nihil aliud per Baptiſtam de Tortis actum, quam ſimul in unum volumen collecta hæud ita multa Hippocratis Opuscula, quæ id temporis inventa fuerant, & Latino donata.

I. *Hippocratis Coi Medicorum Omnium longe Principis, octoginta Volumina, quibus maxima ex parte, annorum circiter duo miſſia Latina caruit lingua, Græci vero, Arabes, & Priſci noſtri Medici, plurimis tamen uſibus prætermiſſis, ſcripta ſua illuſtraverunt, nunc tandem per M. Fabium Calium Rhodennatem virum undecunque doctiſſimum latinitate donata, Clementi VII. Pontific. Max. dicata, ac nunc primum in lucem edita, quo nihil humano generi ſalubrius fieri poterit. Romæ ex Aedibus Franciſci Miniſtri Caii Nouocomenſis, Anno, a Partu Virginis MDXXV. fol.*

Hæc

HIPPOCRATIS

Hæc omnium, quas novimus, prima est
 totius Hippocratis Latini editio. Errat Fa-
 bricius, pace viri eruditissimi dixerim, in
 sua *Bibl. Græc.* ubi hujus editionis meminit
 his verbis: *M. Fabius Calvus iussu Clem. VII.*
Pontificis, ex MSS. Græcis Patiens Hippocratem
conversit circa A. C. 1530. hanc editionem
Roma 1549. Neque enim Calvi Hippocrati-
ca vetustissimum edita est Romæ A. 1549.
 quod, post Bartholinum de lib. legend. p. 117.
 Fabricius affirmat, nimirum ut hanc edi-
 tionem ea, quæ prodit Parisi Interpretibus
Basileæ apud Andream Cratandrum A. 1526. pos-
 teriorem faciat, ut persuasum videtur fuisse
 etiam Lindenio de *Script. Med.* Præterea
 hæud in Hippocratem vertendum curam in-
 tendebat Calvus A. 1530. quem vita fun-
 ctum scimus A. 1527. Sed Calvus ipse, ut
 de hoc nemini sit dubitandum, asserit, se
 totum in Hippocrate vertendo fuisse anno
 1515. Editio Calvi copiosissimo Indice in-
 structa est. De Ravennatis versione hæc
 habet in sua *Bibl. Gesnerus: M. Fabius Calvus*
Ravennat omnia Hippocratis opera vertit, sed ru-
dissime, non satis clare, Græcæ quoque diffini-
tibus sæpe relictis: nullis est tamen vel hoc nomine
eius translatio, quoniam, ut legitur in Prefatio-
nula, multos Græci Codices diversarum lectio-
num in promptu habuit. Sed operæ pretium
 est audire hic Georgium Hieronymum
 VVelschium, *Curs. Prop. & Curs. med. Dec. 4.*
Cur. 5. qui cum in quamdam dictionem
 Græcam incidisset, quam male versam a
 Comario putat, quod nimium fiderit co-
 dice, quo Calvus usus, ita de illo codice
 iudicat: *Fabii Calvi, sive Phelacri Codicem nos*
in Patiens Bibliotheca nulla antiquitatis præro-
gativa conspeximus, sed ab ipsiusmet Calvi manu
ex MS. uno apographum quidem, non tamen opti-
imum, adeoque, ut coniecit, nec ex optimo ex-
emplari descriptum, quævis id antiquissimum vo-
zasset. In eburnæ talem talem non veteri, sed no-
strate, & vulgari exaratum est: Ut ideo Poesius
Prefatione Operis sui, dum nominibus nominabat,
valde hallucinatus est, nec se vidisse, aut certe
non probe commemorasse, ipse prodiderit: quod an-
ime quoque ascriptum contestatur, qui annus
Est, nostra Christiana milleimum, & quingentesi-
mus, duodecimus denotat, quæ sane a veritate
longius abest, magis eximium ab industria Cal-
vi atque, ut librum antigrapho parem existimi-
mus, quoniam certe nobis de illa, quemadmodum &
de peritis L. Græca in Puv. catoplogis optimo non
satis constat.

II. Hippocratis Cui Medicorum
 Omnium longe principis opera: qui-
 bus maxima ex parte annorum circi-
 ter duo millia Latina caruit lingua:
 Græci vero & Arabes, & Prisci
 nostri Medici, plurimus tamen utili-
 bus prætermisiss, scripta sua illustra-
 runt: nunc tandem per M. Fabium
 Rheumatem, Guilielmum Copium

Basileensem, Nicolaum Leonicum,
 & Andream Brentium, viros do-
 ctissimos latinitate donata, ac jam
 primum in lucem edita: quo reuera
 humano generi nihil fieri potuit salu-
 brius. Basileæ in Officina Andree
 Cratandri, A. M.D.XXVI. fol.

Eadem est cum Romana editione anni
 superioris, modo excipias *Aphorismos*, quos
 vertit Nicolaus Leonicens, libros *Præsa-*
giorum, & Rationis Pili. in *Modis Acut.* ex
 versione Guil. Copi, & librum de *Natu-*
ra Humani, Andree Brentio interprete.

III. Hippocratis opera omnia,
 in que quidem Galeni extent com-
 mentaria, hætenus latio donata.
 Nempe, *Aphorismorum sectiones se-*
ptem, Nicolao Leonicensio interprete.
Predictionum libri tres, a Lauren-
tio Laurentiano traducti. Ra-
 tio victus in morbis acutis ex Jua-
 nis Vassæi Meldensis translatione. Ra-
 tio victus privatorum ex Joannis
 Guinterii Andernaci versione. De
 natura humana liber unus, aliter de
 morbis popularibus, quos ambos fecit
 latinus Hermannus Crusenius Cam-
 pensis. Galeni in hac omnia enar-
 rationes jam recens emaculatæ, ac scho-
 liis doctissimis ornata, a Joanne ba-
 ptista Ferrario medico peritissimo,
 Lugduni apud Scipionem de Sabia-
 no. 1535. Voll. 2. 8.

Editio rarissima, cujus mentio nulla aut
 apud Lindenium de *Scriptis Medicis*, aut a-
 pud Fabricium *Bibl. Græc.*

IV. Hippocratis Cui Medicorum
 Omnium longe Principis, Opera,
 quæ ad nos extant omnia. Per Ja-
 num Cornarium Medicum Physi-
 cum latina lingua conscripta. Ba-
 sileæ, per Hieronymum Froben. &
 Nicol. Episcopium. Mense Martio
 M.D.XLVI. fol.

Huic editioni Petrus Matthæus Pinus
 suum Indicem accommodavit, ut supra me-
 mini.

OPERUM EDITIONES.

minimus. Opus suum ad Senarum Populumque Imperialis urbis Augustæ Vindellicorum milit Cornarius elegantissima, & satis proluxa epistola, ubi multa eruditissime scribit de instituti sui ratione, ac de artis medicæ a primis ad sua tempora vicibus. Non deest huic editioni copiosus Index.

V. Eadem. Venetiis, apud Hieronymum Scottum, eodem anno 1546. fol.

Fugit hæc Lindenium, & Fabricium.

VI. Eadem. Parisiis, apud Carolum Guillard, eodem pariter anno, in 8. ex Lindenii testimonio.

VII. Eadem. Venetiis, apud Joannem Gryphium. 8. T. 2.

Lindenius, & Fabricius prodisse typis Gryphii Hippocratem Cornarii ajunt, anno 1545. Id si constaret, præcessisset Veneta Basileensem editionem ab ipso Cornario procuratam, quod dicendum ne sit, alii videant. Ipse id scio, epistolam nuncupatoriam Basileensis editionis daram a Cornario *Marpurgi Historem Calend. Septemb. anno Christi M.D.XLV.* editionem vero tandem absolutam *Mense Martio MDXLVI.*

VIII. Hippocratis Coi, Medicorum Omnium longe Principis Opera, quæ ad nos extant omnia: per Janum Cornarium Medicum Physicum Latina lingua conscripta, & demum ex toto recognita. Basileæ, per Hieron. Frobenium, & Nicol. Episcopium, anno M.D.LIII. fol.

Altera est hæc Cornariæ versionis editio, ad quam ceteræ omnes, quæ postea sequuntur.

IX. Eadem. Per eisdem Typographos Frobenium, & Episcopium, anno 1554. in 8. T. 2.

X. Hippocratis Coi Medicorum omnium longe Principis, Opera quæ ad nos extant omnia, per Janum Cornarium Medicum Physicum Latina lingua conscripta, & recognita. Cum accessione Hippocratis de

Hominis Structura libri, antea non excusi. Recens illustrata cum Argumentis in singulos libros, tum Indice insuper copiosissimo, per Joannem Culmæ. Geppingen. nunc primæ editis. Basileæ, per Hieron. Frobenium, & Nicol. Episcopium, anno M.D.LVIII. Mense Sept. fol.

Nullam ex Cornariæ versionis editionibus hæc habemus absolutiorem.

XI. Lugduni editum Hippocratem A. 1562. in 8. referunt Lindenius, & Fabricius. Repetitam illic puto Basileensem editionem anni 1558.

XII. Hippocratis Coi Medicorum omnium facile principis opera quæ extant omnia, Jano Cornario Medico Physico Interprete, novis & Argumentis in singulos libros, & Indice copiosissimo per Joannem Culman. Geppingen. editis, illustrata: postremoque ad fidem castigatissimorum veterum Græcorum exemplarium collata, & quam diligentissime restituta. Lugduni, apud Hæredes Jacobi Junctæ, 1564. fol.

Editio hæc nicida est, & satis emendata.

XIII. Hippocratis Coi Medicorum omnium facile principis Opera, quibus addidimus Commentaria Joann. Marinelli, in quibus morbi omnes, eorumque causæ, signa, ac curationes, quæ in libris Hippocratis dispersim scribuntur, una copulantur, atque tractantur. Deinde voces, ac loca in Hippocratis libris obscura, & difficilia, ex Galeni sententia declarantur: postea sententiæ plurimæ, quæ ab Hippocratis dignitate ob translationes perperam factas alienæ videntur, antiquorum auctoritate sunt correctæ: præterea multa, quæ sæpe leguntur in ejusdem libris,

HIPPOCRATIS

bris, quæ a se ipsis aliàs dissentire videntur, ea conciliata sunt. Ac tandem Index omnium copiosissimus. Nova & argumenta in singulos libros per Joan. Culman. Gepingeni. sunt addita. Venetiis, apud Johan. Valgrisiun, 1575. fol.

Sæpius hæc editio repetita est. Verum præter hanc Valgrisianam, nullam magni faciendam puto; adeo recentissimæ quæque prioribus sunt maculatiores. Valgrisianæ autem vix unum modo exemplum reperies.

XIV. Magni Hippocratis Medicorum omnium facile principis, Opera omnia quæ extant in VIII. Sectiones ex Erotiani mente distributa. Nunc recens latina interpretatione donata, ac denuo separatim in lucem edita, Anutio Foesio Mediomatrico Medico Authore: adjecta sunt ad VI. Sectionem Palladii Scholia in lib. de Fracturis nondum antea excusa, & nunc primum e Græco in Latinum conversa. Cum Indice amplissimo, & utilissimo. Francofurti, apud Haeredes And. VVecheii. M.D.XCVI. 8:

Quem anno superiore Hippocratem Græco-latium emiserat VVecheius, eundem novis formis Latinum dumtaxat hoc anno emisit.

XV. Ex Versione Cornarii cum Commentariis Marinelli. Vincentiæ, sumptibus Francisci Lenii, & Orlandi Jadra, 1610. fol.

XVI. Eadem. Venetiis, apud Hieronymum, & Alexandrum Polum, 1619. fol.

XVII. Eadem. Venetiis, typis Abundij Menafolii, 1679. fol.

Simon Collinæus, typographus Parisiensis, varia Hippocratis Opuscula, aliis aliis interpretibus, edidit, neque uno anno omnia, fol. 48 maj. Singula in singulorum operum elencho memorabimus.

GRÆCO - LATINÆ.

I. Hippocratis Coi Opera quæ extant Græce, & Latine, Veterum codicum collatione restituta, Novo Ordine in quatuor Classes digesta, Interpretationis latinæ emendatione, & scholiis illustrata, a Hieron. Mercuriali Foroliviensi. Venetiis, industria, ac sumptibus Junctarum, 1588. fol.

Michael Columbus Indicem addidit fertissimum. Omnibus tamen minime probatur Mercurialis, viri alioquin eruditissimi, ac medici doctissimi industria in Hippocrate vertendo. Bartholinus de legend. lib. ait, male se Mercurialem in numerum Interpretum ingressisse, judicio Castrensis.

II. Magni Hippocratis Medicorum omnium facile Principis, Opera omnia quæ extant in VIII. Sectiones ex Erotiani mente distributa. Nunc recens latina Interpretatione, & Annotationibus illustrata, Anutio Foesio Mediomatrico Medico Authore. Adjecta sunt ad VI. Sectionem Palladii Scholia Græca in lib. de Fracturis, nondum antea excusa, & nunc primum Latinitate donata. His præterea accessere variæ in omnes Hippocratis libros Lectiones Græcæ, ex reconditissimis manuscriptis exemplaribus summa diligentia collectæ, nec non etiam quorundam doctissimorum Virorum in aliquot Hippocratis libros Observationes. Cum Indice quadruplici longe amplissimo & utilissimo. Francofurti apud And. VVecheii heredes, in fol. 1595. atque iterum 1621. tertio etiam 1624. & quarto 1645.

Eandem editionem exseripsit Samuel Chouet Græce 1657. in fol. quæ tamen longe abest a prima anni 1598. omnium optima. Ceterum, teste Andrea Ottom. Gœllicke in Hist. Med. Fossiana editio omnibus reliquis palmam non tam disputat, quam præripit.

III. Hip-

OPERUM EDITIONES.

III. *Hippocratis Coi, & Claudii Galeni Pergameni Archiasaron Opera Renatus Charterius, Pindocemensis, Doctor Medicus Paris. Regis Christianissimi Consiliarius Medicus, ac Professor, plurima interpretatus, universa emendavit, illustravit, notavit, auxit, secundum distinctas Medicinae Partes in tredecim Tomos digessit, & conjunctim Graece, & Latine primus edidit. Lutetiae Parisiorum, apud Andream Pralard, anno M.DC.LXXIX. in fol.*

Nihil est, quod in hac vere magnifica, & numeris omnibus absoluteissima Hippocratis, & Galeni editione desideres, praeter copiosissimum rerum Indicem, quem Charterii mors nobis invidit.

IV. *Magni Hippocratis Col Ope-*

ra Omnia. Graece, & Latine Edita, & ad omnes alias Editiones accommodata. Industria, & diligentia Joann. Antonide Vand. Linden. Lugd. Batavo. apud Gaasbeeckios, 1665. in 8. T. 2.

Commendant hanc editionem varia ornamenta, tum forma minor ad utentium commodum, sed praecipue non levis Interpretis eruditio. De hac tamen ita sentit Andreas Ottom. Goelick. l. c. *Nescio, quae animi intemperie studiis Medicinae vulgo rursus in editionem Vanderlindianam, eamque inhumani pretio redimant, cum haecenas persisteret mihi non liceret, quid Lindenius singulare praestiterit praeter alios.*

In alias linguas conversum Hippocratem memorant, ac praecipue in Arabicam. Ex vulgaribus Gallica lingua donatum novimus ab Andrea Dacero, consultis MSS. Bibliothecae Regiae, atque editum Enchiridii forma Parisius Poll. 2. anno 1697. instructum annotationibus criticis, ac addita Hippocratis Vita.



SINGULORUM HIPPOCRATIS OPUSCULORUM EDITIONES ALIQUAE

CUAM EORUMDEM INTERPRETIBUS

Qui magis Commendantur.

UNIVERSA Hippocratis Opera, quæ Græcè, & Latine edidere, perpetuis notis illustrarunt Hieronymus Mercurialis, & Anstus Foesius. Has Hippocratis studiosus operæ pretium facturus est, si perlegat, simulque eis jungat, quæ sequuntur:

1. *Lingugrum*, hoc est, aboletarum Hippocratis Vocum explanationes Græco-latina Galeni, Erotiani, & Herodoti. Extant ad calcem Hippocratis G. L. eiusdem Mercurialis, & inter Opera G. L. Hippocratis, & Galeni edita a Charterio, T. 2.

2. *Hieronymi Aferualis Variarum Lestimonum*, in Medicina Scripioribus, & aliis, Tabulæ vi. Pueri, apud Iuntas, in 4. & fol. Quæ pauca in hoc opere ad Hippocratem spectant, ad eum intelligendum plurimam conferunt.

3. *Oeconomia Hippocratis*, Alphabeti serie disposita, in qua Dictionum apud Hippocratem omnium, præsertim obscurorum, usus explicantur, & velut ex amplissimo pons deprehenditur. Ita ut

Lexicon Hippocratem merito dici possit. Anstus Foesio Autore. Francofurti apud Andrea VVechellii Haeredes 1588. in fol. Editio hæc omnium optima jure censetur.

4. *Joannis Gorraii Definitionum Medicarum libri XXIV. a Joan. Gorraio filio locupletati, & accessisse magna adjunti. Parisiis apud Societatem Miniman, 1622. fol.*

5. *Magnus Hippocratis Com, Prosperi Martini Dictionibus explicatus. Romæ typis Jacobi Mascardi, 1626. in fol. Venetiis apud Guvillius, 1652. in fol. Hoc opus sibi proposuit Martini, ut quicquid alii aut præterierunt, aut sponte neglectum, perperam (eo judice) illustraret, & ad verum sensum reduceret.*

Singula Hippocratis Opera, eorumque Commentaria jam recensenda. Quoniam vero offendi ipse adhuc neminem, qui in libris de *Supernatante*, de *factu in utero mortui Exstitione*, de *Denticione*, de *cugorum Rejectione*, de *Corde*, de *officiis Natura*, de *Affectionibus*, de *Natura muliebri*, de *Sterilibus*, de *Indicationibus*, de *Dialutis criticis, sive indicatoriis*, de *Fistulis*, de *Hæmorrhoidibus*, de *videndi Acie*, de *hominis Structura* illustrandis, lucis aliquid attulerit, medicinæ candidatus, donec quispiam occurrat, hic autore, laudatis celeberrimorum virorum annotationibus contentus erit.

JUS JURANDUM

UTILE æque opus, ac jucundum. Hinc discimus, vel ab antiquissimis temporibus cautum fuisse, ne medicina nisi ab honestis, & diligentibus hominibus exerceretur, præscriptumque, quo animo ad hanc profitendam accedendum esset. Hippocratis Jusjurandum haud semel impressum est ad calcem Fabularum Æsopiarum: Habet enim multa cum aliarum artium professoribus communia, ideoque dignum, quod a prima statim ætatula puerorum etiam ante oculos versetur, ac omnium manibus teratur. Vulgatum est hoc opusculum latine Pnetii anno 1493. una cum libris de *Natura factus*, & de *Lege*, itemque simul cum aliis opusculis Francofurti anno 1587. in 12. evra, ac diligenter Joan. Opsopai. In Italicam linguam translaturum est a Lucilio Philaltheo, ac una cum *Apborismis* editum est Papiæ anno 1552. in 8. Notas adjecit Joan. Francisc. Martinionus.

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

In Hippocratis Jusjurandum hæc præ ceteris legenda:

1. Blasii Hælleri in Jusjurandum Hippocratis Commentarius, Basileæ, 1558. in 8.
2. Hippocratis Jusjurandum, Commentario Illustratum a Petro Asemio. Rotobii, 1577. in 8.
3. Hippocratis Jusjurandum Tabula Illustratum, studio, & conatu Theod. Zuingeri, Extat G. L. cum Hippocratis Cui Viginti duobus Commentariis, Tabulis ab eodem Zuingero illustratis. Basileæ, 1579. in fol. pag. 56. & seqq.
4. Hippocratis Jusjurandum cum Paraphrastica Versione, & brevis Commentariis Jo. Heurnii. Extat G. L. inter Hippocratis Prolegomena. Lugd. Bat. 1597. in 4. Hæc Hippocratis Prolegomena, ac ejus propterea Jusjurandum habebis etiam inter Opera ejusdem Heurnii, quorum optima editio est Lug. Bat. anni 1609. in 4.
5. Hippocratis Jusjurandum, interprete Jo. Gorrao. Accesserunt ejusdem Interpretis Annotationes. Extat G. L. cum ejusdem Gorraei Operibus. Parisiis, 1622. in fol.
6. Francisci de Francisci Commentarius in Hippocratis Jusjurandum, Extat Tomo Primo Prolegomenum Atuspolicensium ejusdem Interpretis. Genevæ, 1618. in 8.
7. Francisci Ranchini in Hippocratis Jusjurandum Commentarius, Extat inter ejusdem Ranchini Opuscula Medica. Lugduni, 1627. in 4.
8. Hippocratis Magni Jusjurandum, recensitum, & libro commentario illustratum a Joanne Heurnio Atrebomio. Lug. Bat. 1643. in 4. Aurea Atrebomii Commentaria ceteris omnibus præstare si quis dicat, falli hunc, ipse minime dicam.

L E X

OPUSCULUM hoc quæ præcipue illustrant, hæc sunt opera:

1. Hippocratis Novum Tabula Illustratum, studio, & conatu Theod. Zuingeri. Extat G. L. cum Hippocratis Cui Viginti duobus Commentariis pag. 51. & seqq.
2. Roderici a Fossecæ in Hippocratis Legem Commentarius, quo persæli Atedici natura explicatur, Roma 1586. in 4.
3. Hippocratis Lex cum Paraphrastica Versione, & brevis Commentariis Jo. Heurnii. Extat G. L. inter memorata Hippocr. Prolegomena.

D E A R T E

Liber I.

OPUS hoc, quod nemo Hippocrati abjudicat, legentibus haud levi erunt utilitati

1. Hippocratis de Arte Commentarium Tabula Illustratum, studio, & conatu Theod. Zuingeri. Extat G. L. cum Hippocratis Cui Viginti duobus Commentariis pag. 1. & seqq.
2. Hippocratis de Arte Liber unus, Interprete Joan. Gorrao. Accesserunt ejusdem Interpretis Annotationes. Extat G. L. cum ejusdem Gorraei Operibus. Parisiis 1622. fol.
3. Hippocratis de Arte Liber I. cum Paraphrastica Versione, & brevis Commentariis Jo. Heurnii. Extat G. L. inter Hippocratis Cui Prolegomena.

D E V E T E R I M E D I C I N A

Liber I.

SOLIDA hujus operis doctrina solidam paritura est utilitatem. Magnos illos viros Zuingerum, Gorraum, Heurnium, quos legendos in librum de Arte proposuimus, & in librum de Petri Medici laudatis locis legendos proponimus. Adde Guiljelmi ten Rhine Meditationes in Magni Hippocratis Textum XXIV. de Petri Medici Cura, Lugduni Batavor. 1672. in 12.

D E M E D I C O

Liber I.

HUJUS libri neque Galenus meminit, neque Erotianus. Hinc non nemo de eius autore dubitat. Qui tamen Hippocratis esse sentiunt, haud male de Hippocrate sentiunt. Franciscus Feureus, qui Chirurgicos Hippocratis libros cum Commentariis Vidi Vidu Gallice vertit, elegantissima in Hippocratis librum de Medico Commentaria Gallice conscripsit. Præter hunc versandi sunt etiam locis citatis Theod. Zuingerus, Joan. Heurnius, & Joan. Gorraus, cujus Annotationes, & Scholia in hunc Hippocratis librum & seorsum excusa sunt Parisiis A. 1543. in 8.

Hipp. Opera.

HIPPOCRATIS

DE DECENTI ORNATU

Liber I.

QUAMVIS Hieronymus Mercurialis, alique acerrime contendant, falso tribui hunc librum Hippocrati; utilem nihilominus medicis esse, diffitetur nemo. Illum illustrarunt Zuingerus, & Heurnius.

PRÆCEPTIONES

NEC Galeno, neque Erotiano innotuisse *Hippocratica Præceptiones* Foefio videntur, cum nullas inde diffiones eos attrixisse, & explicasse, satis constet. Prosper Martianus librum hunc omnium Hippocraticorum obscurissimum iudicat. Lucem ei propterea afferre maximopere conatur suis Commentariis. Eodem tamen teste, magnam laudem merentur, quæ Zuingerus in illum commentatus est, inter *Plurimi duo Hippocratis Commentaria*. Inter *Hippocratis* toties laudata *Prolegomena* extant etiam *Hippocratis Præceptiones* G. L. cum *Paraphrastica Persone*, & *breuibus Commentariis* Ioan. Heurnii.

DE NATURA HOMINIS

Liber I.

IN hunc librum, indubitatum Hippocratis scriptum, suoque autore dignum, Fagoueus Commentarium Gallice conscripsit. Maximam capiet utilitatem, qui Theodorum Zuingerum, & Heurnium in illum perleget. Querendi præterea

1. *Hippocratis de Natura humana libellus generatus, & elegans; novo Gymnasio Breuensi propositus a Ioan. Eruicio. Brema, 1584. in 4.*

2. *Blasii Hollerii in Hippocratis librum de Na-*

tura hominis Commentarius. Argentorati, 1558. in 8.

3. *Hippocratis de Natura hominis liber, latine versus, & paraphrasi explicatus a Hieronymo Masserio. Argentorati, 1564. in 8.*

DE SALUBRI DIÆTA

Liber I.

ADESCRIBENDUM Polybo, Hippocratis discipulo, opus de *Salubri Diæta* censelet Galenus. Jo. Guinterio Andernaco interprete, impressum fuit *Parisiis apud Cibriss. VVetzelium A. 1528. fol.* cum Gal. lib. de *Plenitudine* ab eodem Guinterio conuerso. *Parisiis* etiam edidit Jacobus du Puy anno 1577. in 16. cum *Thesoro sanitatis* Ioan. Liebaulii. Albanus Torinus cum aliis ejusdem Polybi opusculis hoc quoque in Latinum vertit, quæ *Basilea* Oporinus edidit an. 1544. in 8. sic inscripta: *Polybi Opuscula aliquot, nempe de Turba Valetudine, seu de Ratione Vilius Sanorum Lib. 1. de Seminis Humani Natura Lib. 1. de Morbis, seu de Affectionibus Corporis Lib. II. Latine, Albano Torino interprete. Eadem etiam e Græco vertit Italice Petrus Lausus Mutinensis, quæ publici juris fecit Venetiis Cominus de Ttino A. 1545. in 4. Lucem huic operi afferunt præter Galeni Commentaria,*

1. *Hieronymi Thoricæ in Polybum, aut Hippocratis de Ratione Vilius Iditarum, aut Privatorum Commentarius. Lugduni, 1548. in 8.*

2. *Polybi de Diæta Salubri, seu de Vilius Privatorum Libellus, ex Græco translatus, & breuibus Scholiis illustratus a Joh. Placotomo. Ac-*

cessit Dordrini &c. Antuerpiæ, 1561. in 16.

3. *Hieronymi Cræsterii Commentarius in Hippocratis librum de Salubri Diæta. Extat cum ejusdem Interpretis Commentatio in Hippocratis I. & III. de Morbis Pulgeribus, Basilea 1570. in 8.*

DE GENITURA

Liber I.

ET hunc librum Polybo, discipulo, & genero Hippocratis, adjudicant. Quæ in illum & Zuingerus, & Goræus scripsere, utilissima sunt.

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

DE NATURA PUERI

sive F O E T U S

Liber I.

SI de hujus libri autore judicandum sit, non una ratio pro Polybo pugnabit. A. 1493. Latine editum esse *Pnetis* una cum *Jurjurando*, & libro de *Lepo*, supra memoratis. Anno 1502. typis Octav. Scoti *Pnetis* prodire *Dini de Garbo Recollesiones in Hippocratem de Natura Fetus*, una cum aliis ejusdem argumenti libris. Utrum præter Zuingerum, & Gottæum, ad hunc librum illustrandum alii, qui legi mereantur, suas curas contulerint, diligentiam meam omnino fugit.

DE CARNIBUS

Liber I.

VERUM esse hujus libri titulum de *Principiis*, Prosper Martianus, arque alii multi validis argumentis evincunt. Easi nonnulla hic inveniuntur, quæ non satis videntur cum is convenire, quæ alibi Hippocrates docuit, inter ejus tamen opera hunc librum recensendum, idem Martianus judicat. Nemo occurrit, qui faciem præferat hoc opusculum evolventibus, præter Zuingerum in *Hippocratis Pignis duobus Commentariis*, & Heurnium in *Hippocratis Prolegomenis*, nunquam e manibus dimittendos.

DE SEPTIMESTRI AC OCTIMESTRI PARTU

Libri II.

ZUINGERUS unus, quantum satis est, viam monstrat ad hos libros legendos accedentibus. In eos tamen scriptis & Hieronymus Cardanus, cujus *Commentaria* extant cum ejusdem autoris *Commentariis in Hippocratis Prognostica*. Basileæ, 1568. fol. Quæ in unum de *Septimestri Partu* librum commentatus etiam est Ferdinandus a Mena, extans cum ejusdem *Aetobodo curatoria febrium omnium*. Antuerpiæ, 1568. 4.

DE GLANDULIS

Liber I.

EROTIANUS nullam hujus operis mentionem facit, Galenus autem illud juniori cuidam tribuit. Inter *Pignis duo Hippocratis Commentaria* invenies, quæ Zuingerus ad librum hunc illustrandum attulit.

MOCHLICUS LIBER sive VECTIARIUS

LIBER hic, ut optime animadvertit Foësius, ad *Chirurgiam ut maxime accommodatus, ita valde necessarius esse videtur*. Paraphrastice illum interpretatus est Nicolaus Florentinus; nihil tamen æque utile invenies ad ipsum intelligendum, ac Seephani Maniardi *Commentaria*, quæ extant cum *Hippocratis Cui Chirurgia*, nunc primam Græce restituta, Latinitate donata, & *Commentariis illustrata*. Parisiis, 1616. 8. Rarissimum opus, & magno pretio redimendum.

DE LOCIS IN HOMINE

Liber I.

EX iis, qui hunc librum illustrare conati sunt, post Zuingerum, cui primas nemo non deferret, unum delige Leonardum Banschium, qui *Commentarios in librum de Locis in Homine* una cum aliis in *Libros de Medicamento Purgante, de Usu Peratri, ac de Dieta* edidit *Matriti ex Officina Regiæ*, 1594. in fol.

21401 HIPPOCRATIS

DE AERE AQUIS & LOCIS

Liber I.

PARAPHRASTICE præclarum hoc Hippocratis opus exposuit Camillus Flavius, & publico donavit typis Roberti Meietus Venetiis, 1596. in 4. Galenum in hunc librum leges, sed præterea quæ legantur, digna sunt:

1. Hippocratis, Medicorum omnium Principis, de Aere, Aquis, & Locis liber olim mansu, nunc integer, qui Galeno de Habitationibus, & de Aquis, & Temperibus, & Regionibus inscribitur, Commentariis quatuor illustratus & Adipiscio Alemanno, Parisiis, 1557. in 8.

2. Hieronymi Gardini in Hippocratis de Aere, Aquis, & Locis Opus Commentarii, quibus & alia antea non impressa accedunt. Basilea, anno 1570. fol.

3. Hieronymi Gardini in Hippocratem de Aere, Aquis, & Locis Commentarii. Accedunt &c. Basilea, 1570. fol. Exat etiam cum ejusdem Gardini Operibus omnibus in decem Tomos digestis. Genevæ, 1624. fol.

4. Bacci Baldini in librum Hippocratis de Aquis, Aere, & Locis Commentaria. Florentia, 1586. in 4.

5. Ludovici Septalii in librum Hippocratis de Aere, Aquis, & Locis Commentarii v. Apollinis & Græci Hippocratis Contextus ope antiquorum Exemplarium restitutus, & in multis locis emendatus; una cum nova ejusdem in Latinum Versio. Colonia, 1590. fol. Francforti, 1645. fol. Opus vere aureum, & medicorum manibus nunquam non terendum.

6. Joan. Martini Prælectiones in librum Hippocratis de Medicorum Principis de Aere, Aquis, & Locis. Parisiis, 1646. in 4. Omnia huc lectu dignissima.

Inter hæc hujus libri interpretes locis sit etiam Zuingero in illis & hic memorandis Duobus & Vaganti Hippocratis Commentariis.

DE FLATIBUS

Liber I.

Non dubites Hippocratem hujus libri autorem fateri. Quæ legentem juvare possint, invenies apud Zuingerum cit. Commentar. Præterea aderit Adrianus Alemannus. Hujus est: Hippocratis, Medicorum Omnium Principis, de Flatibus liber Commentariis illustratus. Parisiis, 1557. 8.

DE MEDICAMENTIS PURGANTIBUS.

Liber I.

GRÆCE editus est Basilea, anno 1544. in 4. cum aliquot Galeni Opusculis. Junius Paulus Crassus Latinum fecit, illumque addidit operi Theophili Protospatrii de Corporis Humani Fabrica. Mirifice eum illustrant

1. Leonardi Bauschii Commentarius, qui exat cum ejusdem Commentariis in alios libros Hippocratis. Martini, 1594. fol.

2. Joan. Hieronymi in Hippocratis Prolegomenis. Nihil apud clarissimum Henrjum offendet, ut id hoc loco dicam, quod te non oblectet, & erudiat quam maxime. Gratia esse debet Genevensibus editoribus, qui eius Commentaria cum Hippocrate G. L. prelo iterum commiserunt.

3. Ferdinandi a Alena Metibodus Febrium Om-

niam &c. Accessit liber de Purgantibus Medicinis &c. Antwerpia, 1568. in 4. Commentum in libros proprios de Venæsectione, & Purgatione, 1558. in 8.

4. Hippocratis de Pharmacis Purgantibus libellus. Ex Consulari Codice a R. P. S. J. exscriptus, hæc in plerisque Hippocratis Editionibus desideratus; quem & Latine vertit, & notis illustravit. Parisiis, 1621. in 24. Opusculum auro contra æstimandum, sed inventu perquam difficile.

DE DIÆTA sive VICTUS RATIONE

Libri III.

HAUD pauci sunt, qui opus hoc Hippocraticum negligunt, quod forte illis salebrosum, & obscurum videtur. Magnæ tamen utilitati est legentibus. In hoc illustrando se ipsum superasse visus est multis Zuingerus opere toties laudato. Lucem etiam eidem

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

eidem luculentam attulere *Leonardi Banfchii Commentarii*, editi cum aliis *Mauriti*, ut supra monuimus.

DE INSOMNIIS

Liber I.

GRÆCE impressus *Parisiis apud Morellum* an. 1586. in 8. Sed haud paulo ante, nimirum an. 1497. *Prætiis apud Offic. Scotum* cuius fuerat Latine in fol. interprete *Andrea Brenio*, qui etiam suas in eum *Commentationes* adiecit. *Theodorus Zuingerus* nemini posthabendus est, qui eum explicavit. Eruditissimos etiam habemus in hunc librum *Iulii Casaris Scaligeri Commentarii*, pluries variis in locis impressos.

DE ALIMENTO

Liber I.

CONTRA Galenum, qui huius libri autorem Hippocratem habet, alii Theffalo, alii Herophilo, nonnulli Philistioni, Phærecydi aliqui tribuunt. Hippocratem, ut ipse arbitror, minime pueret suum appellare. Eius doctrinam assecutus faciem præferent

1. *Antonii Franciscani in librum Hippocratis Alimento Commentaria. Roma, 1574. in 8. de Alimento Commentarius. Prætiis, anno 1566. in 4.*

2. *Hippocratis de Alimento liber, latinisatè donatus, & Scholiis illustratus a Stephano Comæliano. Lutetia, 1572. in 8.*

3. *Hieronymi Cardani in librum Hippocratis de Alimento Commentaria. Colonia, 1589. in fol. pagg. 213. 214. & seqq.*

His omnibus adde, qui & hic recurrit, præstantissimum Zuingerum.

DE HUMIDORUM USU.

Liber I.

HIC libellus, Galeno, & Erotiano ignotus, est valde notus, quemadmodum sentiunt faniore interpretet, & necnon consuecimus ex schedis. Inter *Figinti duo Hippocratis Commentarios* & in hunc librum Zuingeri doctissimi Annotationes invenies. Has perlege.

DE HUMORIBUS

Liber I.

EX Erotiani, & Galeni autoritate quisquis Hippocrati hoc opus adiudicat. Scripsit in illud doctissimos *Commentarios* clarissimus *Ludovicus Durerus*, impressos *Parisiis, 1631. in 8.* quocunque pretio parandos, si forte alicubi venales reperiantur.

DE MORBO SACRO

Liber I.

FALSO hunc librum Hippocrati ascribi, putant aliqui. Eum tamen illustravit *Antonius Ponce de Sancta Cruce*, cujus in hunc librum *Prælectiones Vallisoleanae* cunctae sunt ascriptae, 1631. in fol.

HIPPOCRATIS

DE MORBIS

Libri IV.

QUOD ad eorum Auctorem spectat, inquit Martiannus, an Hippocrates fuerit, nec ne, parum refert mihi videtur, dummodo sanam doctrinam. Aselepricumque dogmatibus consonam eos continere, coisset. A. 1540 edita est horum librorum Latina versio Parisiis in 4. Georgio Psylandro Zueravirisi Germano interprete, qui emendasse se ait quamplurima loca, depurata tam in Aldina, quam in Germanica impressione Græca, ex collatione peritissimi Mænsuripsi voluminis. Edidit Petrus Salius Diverfius Francofurti in fol. curas suas in hos libros, quas sic inscripsit: *Commentaria in Hippocrati libros quatuor de Morbis luculentissima. Quibus non solum difficillima artis medicæ capita explicantur sed Hippocratis quoque obscuriora loca quamplurima ita enarrantur, ut his delibatis, ad reliqua etiam videretur scripta facili Lectori pateat adiuta.* Magni jure sunt a doctis viris hæc Commendaria.

DE INTERNIS AFFECTIONIBUS

Liber I.

VIDETUR hic liber Foesio a quodam Gnidio conscriptus. Quicunque tamen ejus sit autor, ejusdem Sebola est, teste Martiano, cuius & ceteri libri, qui Hippocratis nomine circumferuntur. Prodiere in lucem Parisiis anno 1637. in 4. Prælectiones in librum Hippocratis Cui de Morbis Internis, Auctore Joanne Martino, quas nemo sine utilitate leget.

DE MORBIS VIRGINUM

Liber I.

MAJORIS Voluminis Fragmentum admodum exiguum, opus hoc Martiannus putat. Legendum tamen, præcipue doctorum virosum studio illustratum. Hujusmodi sunt

- 1 Hippocratis Cui libellus de iis, qua Virgibus accidunt. Mauricio Cordato Rheino interprete. Ad hoc Opusculum accesserunt ejusdem interpretis Annotationes. Parisiis, 1574. in 8. Haud obest, quod amplius desideres.
2. Joan. Bapt. Donatii Commentaria in Magni Hippocratis Cui librum de Morbis Virginum. Francofurti, 1597. in 8. Extant cum ejusdem Donatii opere inscripto: *Rei Aditæ Studi Sive* pedia Sex.

DE MORBIS MULIERUM

Liber II.

PRÆSTANTISSIMUM inter Hippocratica opus hoc, & autore suo vere dignum. Una cum libris de Natura Mulieribus, ac de Menstruibus impressi duo hi libri sunt Parisiis 1526. in 16. M. Fabii Celsi Ravennatis interprete. Cordatus priorem librum exposuit, magna parva laude apud omnes. En tibi ejus operis inscriptio: *Hippocratis Cui, Medicorum Principis libri Prioris de Morbis Mulierum interpretatio, & explicatio.* Maurilio Cordato Rheino interprete. Parisiis apud Dionis. Durvalinum, 1587. in fol. Extat etiam in Gynæcium libris ab Ifr. Spacchio editis, sed hi pluribus mendis lætetur.

DE MORBIS POPULARIBUS

Liber VII.

HUJUS nunquam satis commendati operis libros primum, & tertium, longe ceteris præstantiores, conscripsisse videtur Hippocrates, ut publici juris faceret; secundus vero, & sextus legitimi quidem Hippocratis foetus censentur, verum sibi uni ab ipso conscripti, ac deinde a Theffalo, seu ex ejus discipulis alio in publicum emissi. Quintum, ac septimum suppositos aperte asserit Galenus. Ex omnibus tamen compactum est aggregum hoc opus, ex quo medicus magnam capiet utilitatem.

Primus, & tertius liber cum Commentariis Galeni, Hermannus Crusferio interprete, in lucem exiit Parisiis apud Simonem Collinæum, 1534. fol. maj. Ejusdem Galeni extant etiam Commentaria in li.

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

in librum sextum, & fragmenta in secundum. Præter Galenum, sæpius a medicinarum studio in manus sumenda

1. Francisci Vallesii in lib. Hippocratis de Morbis Popularibus Commentaria. Madridi, 1577. fol. Colonia, 1588. fol. Colonienſis autem editio, ad quam contulit operam, & industriam Jo. Petrus Ayroldus Marcellinus, longe prior fidelior est, & elegantior, ad quam multæ deinde prodire. Tanti a medicis facta sunt Vallesii hæc Commentaria, ut ex illis novum opus concinnarit Petrus a Castro, sic inscriptum: *Imber Aureus, sive Chilias Aphorismorum ex libris Epidemion Hippocratis, eorumque doctissimis Francisci Vallesii Commentariis extracta.* Verona, 1652. in 12. Ulmæ, 1661. in 12.

2. Petri Jacobi Seeve Commentarii in Hippocratis librum II. Epidemiorum. Valentia, 1551. fol. Vix ullus modo opus hoc Petri Jacobi Seeve, nisi maximo fortunæ favore, invenit. Eam autem laudem editis Commentariis consequutus est auctor, ut non defuerint invidi, qui in vulgus jactaverint, inventa ab eo fuisse in quorundam scriptis latentia, quæ Galenus in Hippocratem scripserat, ac pro suis ab ipso supposita.

3. Hieronymi Mercurialis opera duo, quorum alterum inscribitur: *In secundum librum Epidemiorum Hippocratis Prælectiones Bononienses.* Forlivi, an. 1626. fol. Alterum: *Commentarii in Hippocratis Epidemias Historias.* Exant hic cum ejusdem Commentariis eruditissimis in Hippocratis *Coi Prognostica, Prædicta, &c.* Omnia hæc complectitur volumen unum, cui titulus: *Prælectiones Pisana, impetum Venetiis, 1597. & Francofurti, 1602. in fol.*

4. Petri Francisci Pibrigii Commentarii in Historias Epidemicas Hippocratis, in tres partes digesti. Lugduni, 1644. in 4. Nulla est hæc præstantior editio.

5. Hieronymi Cardani libellus, cujus titulus est: *Examen Vingtium durum Aegrorum Hippocratis, ad calcem Commentariorum ejusdem Cardani in librum Hippocratis de Alimentis.* Romæ, 1574. in 8. Basileæ, 1582. in 8.

6. Hermannii Crutii Commentarius in Hippocratis I. & III. de Morbis Pulgaribus. Basileæ, 1580. in 8.

7. Joan. Bapt. Montani in tertiam primi Epidemiorum sectionem Explanations, a Valentino Lumbino collectæ. Prætiis, 1554. in 8.

8. Ludovici Duretii Constitutionis prima lib. II. Epidemiorum Hippocratis interpretatio, ad calcem Commentariorum Ludovici Duretii in Hippocratis librum de Humoribus purgandis, & in libros tres de Dieta Acutorum. Parisiis, 1631. in 8.

9. Breves Palledii Interpretationes Sexti libri de Morbis Popularibus Hippocratis. Exant cum Medicis Antiquis Græcis a Junio Paulo Crasso Latinitate donatis. Basileæ, anno 1581. in 4. Exant etiam G. L. cum Hippocratis, & Galeni operibus a Charterio editis, T. IX.

10. Hippocratis Epidemion liber sextus latinitate donatus, & luculentissima enarratione illustratus, Autore Leonardo Fuchſio, in 4. & fol.

11. Joannis Freind Commentarii de Febribus, ad libros I. & III. Hippocratis de Morbis Popularibus accommodati. Variis temporibus, & locis sæpius impecti.

DE RATIONE VICTUS IN MORBIS ACUTIS

Liber I.

MAIOREM utilitatem ad praxim ex hoc libro se percipisse, quam ex quovis alio Hippocratis opere, Prosper Martianus fateatur. Prodit cum Comment. Gæli, Jo. Passio interpretæ, Parisiis apud Simon. Collinam, A. 1531. fol. maj. Commentationes suas in illum edidit

1. Antonius Musa Bravolus. Circumferuntur ejus in libros de ratione Victus in Morbis Acutis Hippocratis, & Galeni Commentaria, & Annotationes. Prætiis apud Hieron. Scotum, 1546. fol. Opus maxime utilitatis, sed nimis, ut verum fateamur, prolixum.

2. Ludovicus Duretius, cujus in libros Hippocratis de Dieta Acutorum Commentarii juncti sunt Commentariis similibus in Hippocratis librum de Humoribus purgandis. Parisiis, 1631. 8.

3. Joan. Heurnius, cujus in hunc librum curas invenies inter ejus opera.

4. Hieronymus Mercurialis. Cum aliis tanti viti Commentariis in Hippocratis Prognostica, Prædicta, & ceteris supra memoratis, habetur quoque Commentarius in Hippocratem de Victus Ratione in Morb. Acut.

5. Hieremias Thiverius. Eius sunt Commentarii in Hippocratem de Ratione Victus in morbis acutis. Lugd. 1552. in 8.

6. Franciscus Vallesius. Una cum Commentariis in Aphorismos Hippocratis edidit Commentaria in libros Hippocratis de Ratione Victus in Morb. Acut. quæ quam accuratissime & prelis suis Colonia emisit Ciottus in fol.

HIPPOCRATIS APHORISMORUM

Sessiones VII

HOSNE Aphorismos descripsit Hippocrates, inter doctos viros lis est. Utrinque validissimis rationibus pugnatur. Prosper Martianus consarcinatum a minus attento quodam ex aliis Hippocratis operibus opus hoc arbitratur, eo præcipue quod inenest apæres quamplurimes sententias ex aliis Hippocratis libris in præsentis opus translatis longe perfectiores in proprio fonte reperiri, quam hoc in libro, non paucasque esse, quæ aphoristice descriptæ, mendatio non carent, quæ juxta proprii loci descriptionem, indubitatum veritatem continent. Qui enim eas collegit, ut brevem sententiam redderet, in multis veram Auctoris mentem minime assequutus voculas quasdam adimi posse ratus, orationem deseflufam, falsamque sententiam reddidit, ex quo factum est, ut omnium Aphorismorum lectionem tueri, sit impossibile; unde Galeus etiam aliquos tanquam spurios rejicere coactus est. Utilissimam tamen nemo non dicit hanc Aphorismorum collectionem, quæ pluries ullius opus typis impressum, in plures linguas versum, ac a pluribus autoribus illustratum sit, nescio.

Quod ad Aphorismorum editiones spectat, improbi laboris, ac nullius utilitatis esset, velle omnes recensere. Aliquot tamen liber enumerare, quæ aut aliquibus in eos notis, aut aliquo extrinsecus addito, nonnihil possunt ad eorum intelligentiam, eorumque usum conferre.

1. Antiqua Hippocratis translatio, quæ est Constantini Aphricani, seu Monachi supra septem Sessiones Aphorismorum; una cum eruditissima Galei commentatione. Nova ejusdem Hippocratis Translatio supra easdem septem Sessiones per Theodorum Gazem habita, cum Jacobi Forlivi, Marsilii, quæ Expositionibus. Quæstiones eorundem Jacobi, & Marsilii supra prædictas septem Sessiones. Demum nova castigatio textuum Hippocratis: Commentationis Galei: Expositionisque Jacobi Forliviensis, nec non omnium Auctoritatum fida collatio per Christoph. Cassanum, Ludov. Penitii apud Lozællum 1495. fol. Aliis deinde titulis hæc editio repetita est.

2. Hippocratis Cui Aphorismorum Sessiones VI. Nicolæ Leonicensi Vicentino Interprete, Accessit Olfæva ex Ant. Atysa Brasavoli Commentariis, Cuingemio Aphorismorum, ac verum indice Francisci Oglierii. Item Prognosticorum lib. III. Guilielmo Copo Interprete. Patavii typis Pauli Frambutti, 1649. in 12. Leonicensi versio vulgarior est, quam alia illa.

3. Aphorismorum Hippocratis ex diversorum Græcorum Codicum collatione Recognitio. Parisi eorundem lectionibus passim ad margines annotatis, auctore Rutgero Rescio. Lovanii, 1533. 8.

4. Hippocratis Cui Aphorismorum, & sententiarum medicarum libri septem, in eum ordinem, in quem antebac nunquam disposuit quisquam, digesti. Juxta quem facile quævis materiam quamcumque medicam, quam inquirere cupiveris, exemplo invenies. Adjecta insuper enarrationes sententiarum singularium perquam familiari, atque compendiosa. Auctore Joh. Agricola Ammonio. Ingolstadtii, 1537. 4.

5. Hippocratis Aphorismorum gemina lectio ab eruditissimis omnibus mire desiderata. Eorundem fidelis interpretatio, cum Galei censura in eas omnes, qui minus erant absoluti. His accesserunt annotationes in Corn. Celsum, ne tanti viri auctoritas officeret iis, qui memoria essent Aphorismorum complexorum. Auctore Joan. Marfote. Basilea apud Joh. Oporinum, 1547. 8.

6. Hippocratis Aphorismi & Guilielmi Plantii interpretatione, & Joh. Logi Annotationibus il-

lustrati. Parisiis, 1551. in 16. Lugduni, 1581. in 16. Geneva, 1590. in 16.

7. Sententiarum omnium; ac verborum, quæ in divinis Hippocratis Aphorismis continentur, in novum ordinem alphabeticumque digestio: ut quævis in ipsis commemorata, nunc facilis, & celerius quam antea inveniri queat, ut ita Medicina studiosis, majori nimirum, quam prius usui futura sint. Bartholomæi & Petrus Rostinus edit. Venetiis, 1555. 8.

8. Hippocratis Aphorismi Græci, & Latine ita digesti in ordinem, ut nunc se se explicare, & ad morborum curacionem singuli suo & loco prædire videantur, cum brevi expositione ex Galeni Commentariis desumpta. Insyniæ aliquæ sententia ex libris Averlii Cornelli Celsi, Medici inter Latinos eloquentissimi; Cura Joan. Bulini. Lugduni, 1580. 12.

9. Archilei Carcani in Aphorismos Hippocratis Lucubraciones. Ticini, 1581. 8.

10. Hippocratis Aphorismi, ordine quem antea meliori, & Latini fassii ab Oliverio Poparda. Rochella, 1580. 16.

11. Hippocratis Cui Aphorismorum Sessiones VIII. Juxta Græcorum, & Latinum contextum, re-novavit Joh. Opsopous. Lectionum varietate, & Cornelli Celsi, versione talis subdita. Francofurti, 1587, in 12. Extant cum aliis Hippocratis operibus.

12. Constantini Luca subtilissima in Hippocratis Aphorismos per eum in ordinem redactis Expositio, & Propositum ad artæ usum Mamudædici. Ticini, 1607.

13. Pauli Offredi in librum Aphorismorum Hippocratis Commentatio Aphoristica, ad Methodum Analyticam redacta, Cum Græco textu, Latinaque ejus interpretatione. Aræ. Allibr. 1607. in 12.

14. Vere auctorum Aphorismorum Hippocratis Enarrationes, & Commentaria Aphoristica, nova Methodo ejusmodi in ordinem digesta, quæ generalibus præcedentibus Tabulis, quilibet Aphorismi ad proprium suum redacti locum; Physiologici in Physiologia &c. juxta minus cujusque præfices partibus Sessiones petriantur seriem; ex hisdemque

pri-

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

prima principia, & præcipua ævum Actis medicæ polere eliciantur fundamenta, & consilium gravissima decidentur controversia. Autore Emannelle Stupano. Basilea, 1615. 8.

15. Aphorismi Hippocratis, Extræcognitione A. Porcii M. P. Lugduni Batavi, ex Officina Elzeviriana, 1628, in 32. Accessit liber Hippocratis, de Lege.

16. Aphorismi Hippocratis Methodice dispositi a Nicolo Fontana. Amstelodami, 1633. 12.

17. Thesaurus Hippocratis, sive Aphorismi Hippocratis in classes, & ætius titulos ordine dispositi, atque sacculis rationibus illustrati a Bernharda Longvodello. Hamburgi, 1639. 12.

18. Aphorismi Hippocratis facili methodo a Jo.

Tilenano digesti, cum ipsa textu aliisque insuper therapeutici pro curatione morborum omnium totius humani corporis. Marpurgi, 1643. 24.

19. Manuale Medicorum, seu Syntaxis Aphorismorum Hippocratis, Prænotionum, Coarctum, & Prædilectum, secundum propriam morborum omnium nomenclaturam alphabetica digesta ordine. Auctore Honorato Bileisio. Laudini, 1659. 24.

20. Aphorismi Hippocratis novo ordine digesti a Jo. Læno. Parisiis, 1664. 4.

21. Aphorismi Hippocratis, Variorum Aulorum, maxime Hippocratis, & Celsi locis parallelis illustrati. Subjiciuntur Celsi sententia, Stadii, & cura Theod. Janssoni ab Almelooven, Lugd. Batavi. 1732. in 24.

Lugduni An. 1684. editi sunt Aphorismi Hippocratis Novi hoc titulo: Jacobi Spauli Aphorismi Novi ex Hippocratis Operibus collecti, & in suas quique classes digesti, Notisque illustrati. Novi jute appellantur; neque enim ii sunt, qui singulari libeo editi, sed quos Spaulius pro universa Hippocratis opera dispersos collegit.

Si fermo autem sit de hujus operis versionibus, non id solum sæpe editum est Græce, sed sæpius Græce, & Latine, sæpiusque vero Latine tantummodo. Hebraice etiam a duobus Codicibus MSS. itemque Græce, & Latine M. A. Cajottius Romæ editum anno 1647. Sed nullam esse inter cultiores nationem puro, quæ in linguam suam translatos Hippocratis Aphorismos non legat. Mirò Belgas, Anglos, Hispanos, nobis Iralis Italicos fecit una cum Jurejurando Lucillus Philotheus, notisque instruxit Jo. Franciscus Martinionus. Prodiere in lucem, ut supra meminimus ad Jursurandum, Pæpia apud Franciscum Mæsthemum 1552. 8. Joseph Rosaccius quoque Italica lingua Aphorismos donavit, inserensque libro suo, quem inscripsit: *Il Medico*, editum Venetiis apud Petrum Ferrum 1621. 4. Eos vero, qui ad Chirurgiam spectant, in nostram linguam transtulit Bernardinus Genga. Quoniam vero hac nostra ætate omnia haud pauci Gallicè, non absidum erit, & Gallicas versiones referre.

Antiquissima omnium, quas vidi, ea est, quæ Lugduni prodit 1576 in 16. cujus Autor J. Brech, qui Aphorismos e Græco in Gallicum transtulit, unaque Galeni Commentarium in librum primum, in quem suas etiam notas adjecit, ac paraphrasim, seu breves Commentarios in libros reliquos. Is junxit etiam, pariter a Jo. translatos, Aphorismos Joan. Damasceni medici Arabis, ac eptomen quendam trium librorum Galeni de temperamentis. Gallicæ versionem sunt, atque editi cum notis, Parisiis, A. 1685. in 12. In Aphorismos scripsit lingua Gallica Commentarium Michael Longhins, in eos vero, qui Chirurgiam respiciunt, Commentarium item Gallicè scripsit Carolus Chillemau.

Antequam ad eos accedam, qui integra in Aphorismos Commentaria edidit, rei medicæ tyronibus eorum catalogum subiciam, qui versibus eisdem constiterunt. His enim uti poterint illi, qui facilius ligatur, quam spiritum orationem memorie mandant.

1. Aphorismi Hippocratis hexametro carmine conscripti ab Alaisio Lusino. Venetiis apud Jamban, 1552. 8.

2. Hippocratis Aphorismorum, idest selectarum, maximeque rararum sententiarum Paraphrasis Puvica, Autore Andrea Ellingro. Accordant Corneli Celsi aliqui Aphorismorum Hippocratis corrupta Latina, Morborum, & Symptomatum in Aphorismos Index. Oratio in Aphorismos Hippocratis, Francfurti, 1579. 8.

3. Aphorismi, seu Axiomata Hippocratis septem libris comprehensa, versibusque explicata, Autore Joan. Bapt. de Conde. Bruxell. 1647. 12.

4. Hippocratis Aphorismi, versibus heroici latinis redditi a Joan. Dubravio. Exant cum eisdem Dubravii libris quinque de Piseinis, &

Piseinis, qui in eis alantur, naturis. Norimbergæ, 8.

5. Hippocratis Aphorismi carminibus, Autore Joh. Ludovico Gansio. Vicina, & Argentorati, 12.

6. Hippocratis Aphorismi versibus heroici expressi. Autore Joh. Pfauilo. Basilea, 1642. 8.

7. Lærentij Spani Aphorismorum Hippocratis Paraphrasis metrica. VVratislavia, 1570.

8. Aphorismi Hippocratis versibus redditi a Paulo Diamio. Vicina, 1599. 4.

9. In septem libros Aphorismorum Hippocratis Paraphrasi Poetica, ad illorum memoriam summe utilis. Autore Reginaldo Sturmiio. Lugduni apud Gryphum, 1583. 8.

10. Aphorismorum Hippocratis Enarratio Poetica. Autore Sim. Provancheria. Senon. 1603. 8.

Italico etiam metto cecinit Aphorismos Anselmus Lariolus, medicus Viterbiensis. Commentarios in Aphorismos, atque eorum in Italicum metrum versionem sic inscripsit: *In Hippocratis Aphorismos omnes perbreves Commentarii, eorum in versus vernaculos versis, sub ea serie; quæ de Græco habetur latini ex Textu. Atque excerptæ omnes A. C. Celsi versibus, translationisque, hic vero possessis planisque in Aphorismis eisdem. Viterbi, 1668. 8.* In suæ lingue poemæ medicum convertere etiam Aphorismos Galli, Joannes Bonvert, & Jo. Cassal.

Libro Opera.

d 2 Sol

HIPPOCRATIS

Sed tandem qui luculentissimam lucem studiis suis huic tam medicis necessatio Hippocratico operi attulere, hi sunt:

1. Claudius Galenus, illud medicinae lumen, quo non alium mentis suae interpretem maluisset Hippocrates. Huius Commentarii in Aphorismos & inter alia Galeni opera, & scorsim ab aliis toties editi, nullibi venales non prostant. Sed Galenum ipsum Aphorismorum illustratorem, curis suis illustrarunt aliqui. En eorum opera: Galeni in Aphorismos Hippocratis Commentarii septem, recens per Guilielmum Plantum latinitate donati, eiusdemque annotationibus illustrati. Lugd. apud Guilieim. Rovillium, 1554. 16.
- In octo libros Aphorismorum Hippocratis, & Galeni Commentaria, & Annotationes Antonii Musa Brasavoli. Venet. & Basil. fol.
- Claudio Campanis nova Hippocratis Aphorismorum Interpretatio. Eiusdem in Aphorismos Annotationes, quibus illustrantur evidentissima Galeni errata. His deinde annexa sunt animadversiones simul cum Apologia in Galenum &c. Lugduni, 1579. 8.
2. Hieronymus Cardanus. In septem Aphorismorum periculis Commentaria. Basilea, 1564. fol. Ut ut Cardanus prolixior nonnullis videatur, optima tamen doctrina scaterere fateamur, necesse est.
3. Foresius. Hippocratis Cui Aphorismi, Commentarii successit, ac dilucidati illustrati: editi per Ad. Lonicerum. Francof. 8.
4. Leonardus Fuchsius. Hippocratis Aphorismorum Sessiones septem, & latinitate donata, & luculentissimis Commentariis illustrata: adiectis Annotationibus, in quibus, quotquot sunt in Galeni Commentariis loci difficiles, ad usum explentur. Basilea in 4. & Lugd. in 8.
5. Jo. Heurnius. Hippocratis Cui Aphorismi Graece, & Latine; brevi enarratione, fideque interpretatione ita illustrati, ut ab omnibus facile in-

- tellegi possint. Cum historici, observationibus, cautionibus, & remediis selectis. Lugd. Batav. & Hagae Comit. in 12. Extant etiam cum eisdem Heurnii operibus omnibus.
6. Jacobus Hollerius. In Aphorismos Hippocratis Commentarii septem per Joh. Libautium in lucem editi, eiusdemque scholasticis doctissimis illustrati. Parisiis, Lipsia, Francofurti, Lugduni, & Geneve, in 8.
 7. Tobias Knoblochius. Hippocratis Cui Aphorismi Graeco, & Latino sermone expressi, breviter, & nervose secundum rationem, & experientiam ductum enodati. Noribergae, 1641. 8.
 8. Hieronymus Mercurialis. In omnes Hippocratis Aphorismorum libros Praelectiones Patavinæ. In quibus innumeri pene ipsius Hippocratis obscuriores loci, ac sententiae elucidantur, problemataque permulta abstractiora facili methodo evadunt. Cum Peucratii Marcellini notis marginedibus. Forolivii, 1625. in fol.
 9. Oribasius Sardinus. Commentaria in Aphorismos Hippocratis haftenus non visa, Jo. Guntarii Andernaci industria, velut: profundissimis tenebris eruta. Parisiis, Venetiis, & Basilea in 8.
 10. Philothens. Commentaria in Aphorismos Hippocratis. Ludovico Conrado interprete. Veneriis, & Spira, in 8.
 11. Salvius Sclanus. Commentaria in Aphorismos Hippocratis. Venetiis, in 4.
 12. Hieremias Thriverius. Commentarii in VII. libros Aphorismorum Hippocratis. Lugduni, in 4.
 13. Franciscus Vallesius. In Aphorismos Hippocratis Commentarii septem. Colonia apud Joan. Bapt. Cierum, 1589. fol.
 14. Christophorus a Vega. Commentaria in librum Aphorismorum Hippocratis, in 8. & fol.

P R Æ N O T I O N U M

Liber I.

NESCIO, an ullum inter Hippocratis opera hoc sit praestantius, magisque medicis necessarium. Eius certe utilitas efficit, ut quavis se ipso satis clarum, multi tamen clariori adhuc luce perfundere conati sint. Parisiis editum est cum Galeni Commentariis, Laurentio Laurentino interprete, in edibus Claudii Chevallonii 1526. 8. reculum vero apud Simonem Collinaum, 1532. fol. maj. Sed praeterea ad hoc illustrandum curas suas contulere

1. Hieronymus Cardanus. In Hippocratis Cui Prognostica, atque in Galeni Prognosticorum expositionem Commentarii absolutissimi. Basilea, fol.
2. Joan. Heurnius. Hippocratis Prognosticorum libri III. cum Paraphrastica Persione, & brevibus Commentariis. Extant cum Hippocratis Cui Prolegomenis, in 4.
3. Hieronymus Mercurialis. Commentarii eruditissimi in Hippocratis Cui Prognostica. Venetiis, & Francofurti, in fol.

4. Franciscus Vallesius. In Praenotionum Hippocratis librum Commentarii. Extant cum eisdem Vallesii Commentariis in Aphorismos Hippocratis. Colonia, in fol.
5. Jacobus Antonius Phrygius. In magni Hippocratis Prognostica Explanatio. Apposita cuoque fere loco ex libris Epidemiarum privata exempla ad confirmandas Auctoris sententias, & ad praxim exercendam apprime utilis. Ticini, & Venetiis, in 8.

Suum etiam pretium est Thomæ Mouseti industriae, qui sub hoc titulo Hippocratis Praenotiones edidit: *Nysmanica Hippocratica, seu Hippocratis Prognostica cuncta, ex omnibus ipsius scriptis methodice digesta.* Francofurti, 1588. 8.

P R Æ.

INTERPRETES PRÆSTANTIORES

P R Æ D I C T I O N U M

Libri II.

P R Æ D I C T I O N U M libri si minus omnium primi, certe inter primos sunt, quia Romana civitate donari sunt a Gulielmo Copo. Eorum prior cum Commentariis Galeni, Joann. Fallopi interprete, editus est Parisiis ex Officina Simonis Collinai, 1535. fol. maj. Galeno addes Mercurialem, & Heurnium. Anutus Foësius adeo de singulis Hippocratis operibus meritis, de hoc melius, quam de aliis videtur esse meritis.

C O A C Æ P R Æ N O T I O N E S

A U R E U M hoc opus legat, & perlegat, qui in peritum medicum cupit evadere, nec curet scire, quinam ejus autor sit. Sibi potius pareat, quæ sequuntur opera, ut majorem fructum ex Hippocratica doctrina capiat.

1. *Hippocratis magni Coacæ Prænotiones.* Opus admirabile in tres libros distributum, interpretæ, & enarratore Ludovico Dureto. Parisiis, 1588. 1621. fol.

2. *Magni Hippocratis Coacæ præfagia,* opus plane divinum, & vere Medicinæ tanquam thesaurus, cum Interpretatione, & Commentariis Jacobi Hallerii, nunc primum Desiderii Jacotii opera in lucem editis. Eiusdem Desiderii Jacotii Commentariorum ad idem opus libri tresdecim, tribus sectionibus distincti, in quibus symptomatum rationes,

quæ in agris apparent, causa, vires, & significationes demonstrantur. Lugduni, apud Gulielmum Revillium, 1576. fol.

3. *Magni Hippocratis Coacæ Præfagia,* brevi enarratione illustrata, excerpta a Galeno, Hallerio, Dureto, Foëzio, Jacotio, & aliis non inferioris notæ viris. In formam Enchiridii ad usum faciliorem compoſita. Authore D. Lud. Ferrant, discrepantes reconciliante, variantes explicante, dubios denique obſervante. Lutetia Parisior. 1657. in 12.

Gregorius etiam Horſtius præter hos non sine utilitate legeret. Inter ejus enim opera tomo 3. invenitur *Febris continuæ, & malignæ prægnosis,* iuxta textum Hippocraticum, in principio Coacæ Prænot. cum brevissimis ad eandem notis. Giffæ, 1622. 4.

D E V U L N E R I B U S C A P I T I S

Libri I.

D I G N U M autore suo opus, ut Galenus etiam, & Erogianus sentit. Franciscus Dislaudean Gallicè notas scripsit in hunc Hippocratis librum. Illud tamen evolventibus clarissimam faciem præferent

1. *Julius Cæsar Arantius.* In *Hippocratis librum de Vulneribus Capitis* Commentarius brevis, ex ejusdem Arantii Lectionibus collectus per Claudium Perallium, una cum ejusdem notationibus marginalibus. Lugduni 1580. in 8. & Lugd. Batavorum 1639. 1641. in 12.

2. *Joannes Baptista Coreſius.* *Traſſatum de Vulneribus capitis,* in quo omnia, quæ ad cognitionem, curationemque læſionum calvaria attinent, accuratè considerantur, & singula quæ ab Hippocrate tradita sunt in libro de Capitis Vulneribus, aberrant Commentariis illustrantur. Adjecti sunt in calce duo Traſſatus: alter de *Conſueſſione Calvaria in Pueris:* alter de *coramdem Adrocephalo.* Atſſana, 1633. 4.

3. *Gabriel Fallopius.* *De parte medicina,* quæ Chirurgia nuncupatur, nec non in librum Hippocratis de *Vulneribus Capitis* dilucidissima Interpretatio. Venetiis, 1571. in 4. Extat quoque cum ejusdem Fallopii operibus.

4. *Petrus Paav.* *Succenturiatus Anatomicus.* Continens Commentaria in Hippocratem de *Capitis Vulneribus.* Lugduni Batavorum, 1616. 4.

5. *Franciscus Vertonianus.* *Hippocratis Cui de Capitis Vulneribus liber* latinitate donatus, & Commentariis illustratus, addito Græco textu a Joſepho Scaligero castigato, cum ipsius Scaligeri castigationum suarum explicatione. Lutetia, 1578. 8.

Ceterum tum hunc, tum sequentes tractatus, qui omnes ad Chirurgiam pertinent, nempe de *Officina Medici,* de *Fracturis,* de *Articulis,* ac de *Ulceribus* mirifice illustrant Stephanus Manialdi, ac Vidi operibus. Quæ prioris sunt, hunc titulum præferunt: *Hippocratis Cui Chirurgia,* nunc primum Græcè restituta, latinitate donata, & Commentariis illustrata. Parisiis, 1619. 8. quæ alterius, hunc: *Chirurgia Hippocratis & Græco in Latinum conversa.* Prodiit Parisiis 1544. atque extat etiam cum ejusdem Vidi operibus omnibus. In singulos etiam Hippocratis Chirurgicos libros scripsit Commentaria alter ille medicinz parens Galenus, sed quæ in libros erant de *Capitis Vulneribus,* ac de *Ulceribus,* deperdita

HIPPOCRATIS INTERPR. PRÆSTANTIOR:

ditæ sunt, alia extant magno rei medicæ bono. In Foesiani Hippocratis editionibus ex-
tant *Palladii in Hippocratis librum de Fracturis Scholia G. L. ex interpretatione Jacobi Santalini*

EPISTOLÆ

GRÆCÆ extant cum Variorum Epistolis Græcis, quas collegit, & edidit Aldus
Manutius *Veneris*, 1499. fol. In Epistolas Hippocratis scripsit Gallice Com-
mentarium Marcellinus Bompert. In Epistolam *ad Demagretum* interpretationem, & para-
phrasim edidit etiam Alardus Anselmedamus, *Salvignaci apud Joan. Soterum*, 1730. in 8.



D E V I T A
E T F A M I L I A
S C R I P T I S Q U E

HIPPOCRATIS TESTIMONIA

E X

J O A N N E A N T O N I D E
V A N D E R L I N D E N

*Ad calcem Tomi 2. Hippocratis G. L. ejusdem industria & diligentia
editi Lugd. Bat. 1665.*

J O A. T Z E T Z E S.

Hist. VII. Chilad. CLP. 945.

PAULO LACISIO, VERONENSI,
interprete.



STE Cous Medicus, magnus
Hippocrates,
Patre quidem erat Heraclida,
matre autem Phænareta,
Existens septimus decimus, ex
Æsculapii progenie.

Post enim Trojæ captionem, in trækione
Rhodi.

Podalirius filius Æsculapii existens,
Hippolochum genuit, ex quo Sostratus na-
tus est,

Ex quo Dardanius, ex quo Crisamis, ex
quo Clemyrades,

Cujus filius Theodorus, ex hoc autem So-
stratus alius,

Ex quo Sostrato Crisamis secundus natus
est.

Crisamide Theodorus secundus rursus na-
tus est.

Ex Theodoro hoc autem Sostratus tertius,
Ex quo Nebris, ex quo Gnosidicus, ex quo
Hippocrates.

Primi Hippocratis autem, filii Gnosidici,
Filius erat Heraclidas: ex quo, & Phæna-
reta,

Ille magnus, qui & secundus, fuit Hippo-
crates.

Quem pater Heraclidas, quæ medicorum
sunt, docet:

Quique ex Selybria Herodicus, cum hoc.
Gorgias Leontinus vero artem rhetoricam,
Philosophiam post ipsos Democritus ille.

In Coe autem librorum custos designatus
Hippocrates,

Antiquos medicorum exussit libros,
Et librorum armentarium, quapropter fu-
giens illinc

In Hedonis moratus est, Græcia, Thessa-
lia,

Arraxerxæ contemporaneus existens, &
Perdicæ.

Filii Hippocratis autem, Thessalus atque
Dracon,

Quos, & Praxagoræ Com, atque alios,
Medicinam docuit, scriptisque libros

Tres & quinquaginta. Deinde morum au-
tem,

Annorum existens centum simul atque qua-
tuor.

Mortuus autem sepultus est medio inter La-
rissam, atque Gyrtonem.

Septem Hippocrates autem scito fuisse:

Gnosidici primum quidem, Heraclidæ au-
tem secundum,

Illum Thessali, illum Draconis, duos fi-
lios Thymbræi,

Et illum Praxianactis septimum Hippocra-
tem.

Septem Hippocrates quidem: iste autem
pingebatur.

Contegens suum caput suo cum vestimento,
Quatuor autem causas hujus dicunt esse:

Vel enim dolens caput, vel velut peregrin-
us,

Vel tamquam ostendens ratiocinationis in-
strumentum id esse,

Vel quo modo in chirurgiis oporteat caput
operire.

Hoc faciebat vir, & sic depingitur.

Male autem quidam dicunt, empyricum
virum.

Ex

HIPPOCR. GENUS & VITA.

Ex Epheso Sorano res Hippocratis exposui.
 Qui Hippocrates Medicus, Heraclidae, Cous,
 Jubebat (sententiis erudiebas medicorum genera)
 In alienis calamitatibus proprias vindemiare tristitias.

VI. 2. SVIDAS

Lexico

ÆM. PORTO interprete.

Cos: insula. Unde Hippocrates medicus.
 Quæ & Mæropis vocatur.

STEPHANUS

de Urbibus

JO. A. VANDER LINDEN interprete.

Cos urbs, & insula. Hinc vero cognomen Hippocrates, & Erasistratus medici acceperunt. Erat autem Hippocrates ex Nebris dictis. Nebris enim fuit nobilissimus Asclepiadarum: cui & Pythia testimonium perhibuit, cujus, Gnosidici: Gnosidici, Hippocrates, & Ænii, & Podalirius, Hippocratis, Heraclides. cujus, Hippocrates ille celeberrimus, qui & admirabiles libros reliquit.

ISIDORUS HISPALENSIS,

Geograph. sive Orig. xiv. 5.

Cos insula, adjacens provincie Atticæ, in qua Hippocrates medicus natus: quæ, ut Vatro testis est, arte lausifici prima in ornamento foeminarum inclauit.

SVIDAS

Lexico

ÆM. PORTO interprete:

Hippocrates Cous medicus, Heraclidae filius, artis medicæ peritissimus. Præsertim enim etiam avo, & patri Heraclidæ, quamvis ejusdem nominis esset, quod tanquam fidus, & lumen fuerit medicinæ, quæ vitæ est utilissima. Fuit autem unus ex posteris Chrysi, & Elaphi, illius filii, qui & ipsi fuerunt medici. Hæc primum quidem fuit discipulus patris, postea vero Herodici Selybriani, & Gorgiæ Oratoris ac philosophi. Ut vero quidam tradunt, Democriti Abderitæ. Ipsum enim adolescentem ad illum jam senem accessisse ferunt. Ut vero quidam dicunt, fuit & Prodicæ discipulus. Commoratus est in Macedonia Regi Perdiceæ admodum charus. Duos habuit filios, Thesalum, & Draconem. Obiit autem ætatis anno CIV. Sepultus est Larissæ in Thessalia. In imaginibus autem tra-

ditur ipsum habere caput vestis involutum, & rectum: vel quod hic esset ejus mos, vel propter peregrinandi studium, quo flagrabat, vel ob peculiarem in chirurgia morem. Hic multa scripsit, & apud omnes clarus evasit: adeo ut magnus ille Persarum rex, qui vocabatur Artaxerxes, scriptis ad Hyllanem litteris, & cetera. Libri autem ab Hippocrate scripti omnibus medicinæ studiosis sunt notissimi, cosque adco amplectuntur, tantique sequuntur, ut divinas, non autem ex humano ore progressas voces esse putent. Præcipuos tamen & ipsi recensebimus: Primus igitur liber est ille qui medicum jurandum continet; Secundus vero, qui prædictiones explicat; Tertius Aphorismorum, qui superat ingenium humanum: Quartum locum teneat celeberrimum illud, & valde admirabile opus, quod a.LX. librorum numero vocatur Hexæcontabibulus, quod omnem medicam scientiam, & sapientiam continet.

Hippocrates, Gnosidici filius, Cous, pater Heraclidæ, patris Hippocratis, medicus & ipse, e familia Asclepiadarum, Artem medicam scripsit.

Hippocrates, Thesali F. Cous medicus, nepos Hippocratis secundi, filii Heraclidæ, scripsit & ipse medica.

Hippocrates quartus Draconis F. Cous medicus, ejusdem & ipse generis, qui curavit Roxanem. Sub Callaneto autem, Antipatri filio, de vita decessit, scripsit & ipse medica.

Hippocrates duo, quintus, & sextus medicus, Thymbraei filii, Cos & ipsi, ejusdem generis, scripserunt ambo in eandem scientiam.

Hippocrates septimus, Cous, & ipse medicus, Praxianactis filius, ejusdem & ipse generis, scripsit & ipse de eadem arte.

JOH. TZETZES

Hist. x. Chil. cccclx. 722. ut & xxi.
 Chil. cccclxxxiv. 638.

PAULO LACISIO VERONENSII interprete.

ASCLEPIADÆ igitur vocantur quidem proprie, Quotquot trahunt seriem a genere hoc, Sive medici, sive aliam excoercentes vitam, Quemadmodum Hippocrates, atque alii complures. Medici vero dicuntur magis abusive Asclepiadæ omnes, ab arte hujusmodi: Quemadmodum & Nicomachus, pater Aristotelis.

A. CORN. CELSUS

Præfat. pag. edit. Linden. 3. lin. 3.

Democriti autem, ut quidam crediderunt, discipulus Hippocrates Cous, prius ex omnibus memoria dignus ab studio

HIPPOCR. GENUS & VITA.

diſo ſapientię diſciplinam hanc ſeparavit,
vitæ & arte, & ſacundia inſignis.

SVIDAS

Gorgia

ÆM. PORTO interprete.

Gorgias Charmantidæ filius, Leontinus, Rhetor, Empedoclis diſcipulus, magiſter Poli Agrigentini, & Peticlis, & Iſocratis, & Alcідamantis Eleatę, qui & in ſchola ipſi ſueceſſit. Frater autem fuit Herodici medici.

SVIDAS

Democrito

ÆM. PORTO interprete.

Ipſius vero diſcipulus inſignis fuit Metrodorus Chius. Cuius viceſſim auctores fuerunt Anaxarchus, & Hippocrates medicus.

EUSEB. PAMPHILUS

Chron. lib. 1. pag. edit. Scal. 55. l. 8. 12. 17.

V. L. interprete.

Sub Artaxerxe Longimano etiam Peloponneſiacum bellum fuit patratum. Tunc Hippocrates Couis medicus innotuit.

IDEM ibid. p. 55. l. 28.

Macedonibus impetante Perdica, Hippocrates Couis medicorum optimus innotuit, genus Aſclepiada.

EUSEB. PAMPHILUS

Chron. can. p. edit. Scal. 172.

D. HIERONYMO interprete.

l. 11. p. ed. Scal. 133.

Olymp. LXXXVI Democritus Abderites, & Empedocles, & Hippocrates medicus, Gorgias, Hippiaſque, & Prodicus, & Zeno, & Parmenides. Philoſophi inſignes habentur.

LUCIANUS

Philopſoudi

JOH. BENEDICTO interprete.

Et mihi, o Enerates, eſt æreus Hippocrates, magnitudine ferme cubitali, qui dumtaxat extincta lucetna, totam domum in orbem ambit, ſtrepens, & pyxides evertens, & pharmaca commiſcens, & oſſum ſubvertens, imprimis ſi ſacrificium diſſeramus, quod ei quotannis facimus. Poſtulat ergo, inquam ego, etiam Hippocrates medicus jam ut ſibi ſacrificetur, in
Hipp. Opera.

dignaturque niſi in tempore juſtorum ſacrificiorum epulis accipiat? quem boni conſulere oportebat, ſi quis et liberaret, aut miſſum inſunderet, aut caput coronaret.

MAX. TYRIUS

Serm. VII.

COSMO PACCIO interprete.

Hocum igitur aliquis ſi ſignum audiat dicentem, homines huiusmodi, quod ea ratione compoſiti eſſent, ut nequaquam Hippocratis curationibus egerent, oportere Hippocratem ipſum coronatum vellere, ac delibutum unguentis, in alium locum amandare, ubi vigentes morbi, ejus operam expoſcerent, & medicinam honorabilem redderent.

PLINIUS SECUNDUS

Hiſt. nat. XXIX. 1.

Diis primum inventores ſuos aſſignavit, & cœlo dicavit. Nec non & hodie multariam ab oraculis medicina petitur. Auxit deinde famam etiam crimine, idum fulmine Œſculapium fabulata, quoniam Tyndaridem revocaſſet ad vitam. Nec tamen ceſſavit narrare alios revixiſſe opera ſua, clara Trojanis temporibus, quibus fama certior, vulnere tamen dumtaxat remediis. Sequentia ejus (mirum dictu) in nocte denſiſſima latuere uſque ad Peloponneſiacum bellum: tunc eam revocavit in lucem Hippocrates, genitus in inſula Coo, imprimis clara ac valida, & Œſculapio dicata. Is, cum fuiſſet mos, liberaſſe morbis ſcribere in templo ejus Dei, quid auxiliatum eſſet, ut poſtea ea ſimulando proficeret, exſcripſiſſe ea traditur, atque (ut Varro apud nos credit) jam templo cremato, inſtituiſſe medicinam hanc, quæ Clinice vocatur.

ISIDORUS HISPALENSIS

Orig. IV. 3. 4

Medicinę autem artis auctor ac repertor apud Græcos perhibetur Apollo. Hanc ſilius ejus Œſculapius laude vel opere ampliavit. Sed poſtquam fulminis ictu Œſculapius interit, interdita fertur medendi cura, & ars ſimul cum auctore deſecit, latuitque per annos pene quingentos uſque ad tempus Artaxerxis regis Perſarum. Tunc eam revocavit ad lucem Hippocrates Aſclepio patre genitus in inſula Coo.

Itaque tres viſi totidem hæreſes invenerunt. Prima Methodica inventa eſt ab Apolline, quæ remedia ſecatur, & carmina. Secunda Empirica, id eſt experientiſſima, inventa eſt ab Œſculapio, quæ non indiciorum ſignis, ſed ſolis conſtat experimentis. Tertia Logica, id eſt, rationabilis, inventa ab Hippocrate. Iſte enim diſcuſſus
c eta-

HIPPOCR. GENUS & VITA.

ætatum, regionem, vel ægritudinum qualitatibus, artis curam rationabiliter perscrutatus est.

Auctor Adelsi, c. 1.

JO. ANDERNACO interprete.

Perfectam medicinam, & omnibus numeris absolutam, illam divinam scilicet, Æsculapius solus invenit. Illam vero, quæ inter homines versatur, hujus successores, Æselepiadæ posteri veluti hæreditario acceptam tradiderunt, maxime Hippocrates, qui omnibus facile præcelluit, primusque perfectam apud Græcos medicinam in lucem protulit.

PHILOSTRATUS

de Vita Apollon. Tyanci III. 14.

FED. MORELLO interprete.

Iarchas multa bona erga homines divinationem efficere dixit. Inter quæ præcipuum est medicinæ donum. Non enim, inquit, illi, qui sapientes in hac arte habiti sunt, Æsculapii filii tam multum profecissent, nisi Apollinis filius Æsculapius, juxta patris vaticinia morbis proficua remedia composuisset: quæ ille demceps filios docens, atque illi nepotibus posterisque tradentes, amicis tandem, familiaribusque eadem demonstravit.

SORANUS EPHESIUS

Pref. in Artis med. lib.

Medicinam quidem invenit Apollo, amplificavit Æsculapius, perfecit Hippocrates: quem mihi hominis ducem, & iudicem omnium causarum, & questionum oportet accipere, tamquam parentem, & inventorem omnium bonorum operum, per quem Logica nobis juxta rationem est facta traditio.

AUCTOR

l. de Cathartici c. 1.

Hippocrates liberos, amore medicinæ per diversas civitates, provincias, & singulas regiones proficiscens, experimento cognoscitur collegisse, & artificiose vitam & thesaurum consummasse: & quomodo ordinando nobis medicinam derelictam, voluisset perquirere, ut posteris traderet.

ÆLIANUS

Varia hist. IV. 20.

JUSTO VULTEJO interprete.

Dicunt etiam in primo congressu cum Democrito Hippocratem de ipso tamquam

de stulto sensisse. Postquam vero ipsis familiaritas intercesserat, mirum in modum admiratum esse hominis sapientiam.

JOA. TZETZES

Hist. I. Cbil. lxi. 978.

PAULO LACISIO

Veronenſi interprete.

Abderites Democritus, filius Hegestrati, Leuceppi autem discipulus, discipuli Molliſi, Tamquam vere philosophus, omnia pulere sciens, Semper vanitatem vitæ deridebat. Abderitæ autem arbitrati insanire virum, Decem talentis dono missis Hippocrati, Rogabant eum venire medicum Cœm. Medicus autem profectus navi, & absque pecunia, Conspicatus Democritum ipsum; iterum reversus est, Plus ipse curatus, quam qui curasset hunc: Confessisque gratias omnibus Abderitis, Quod talem propter sapientem virum agnovit.

DIOGENES LAERTIUS

Democrito I. IX.

FR. AMBROSIO interprete.

Refert autem Athenodorus in VIII. Deambulationum libro, quum ad Democritum Hippocrates venisset, jussisse afferri lac, inspectoque lacte dixisse, Et capelle primi partus & nigra est. Unde maximum diligentie suæ miraculum Hippocrati fecisse. Sed & puellam Hippocratis comitem, primo die ita salutasse, salve virgo: postridie vero, salve mulier. Fuerat enim puella nocte illa vitata.

SVIDAS

Democrito.

ÆMYL PORTO interprete:

Democritus Abderites non adiit Athenas, sed tantam urbem contempsit. Nam non a loco gloriam accipere volebat: sed loco gloriam conciliare studebat. Cum autem Hippocrates ad Democritum venisset, ait jussisse lac afferri: quod cum vidisset, dixisse, lac esse capræ primiparæ & nigra. Hippocratem vero admiratum fuisse ipsius acutitatem rerum cognitionem. Quin etiam puellam, quæ eum Hippocrate ad ipsum accesserat, primo quidem die ab ipso sic salutatam: salve puella. Postridie vero, salve mulier. Illa enim puella noctu fuerat stuprata.

HIPPOCR. GENUS & VITA.

PLINIUS

Hist. nat. VII. 37.

Hippocrates (enituit) medicina: qui venientem ab Illyriis pestilentiam prædixit, & discipulos ad auxiliandum circa urbes dimisit: quod ob meritum honores illi, quos Herculi, decrevit Græcia.

VARRO

de Re rust. 1. 4.

Annon ille Hippocrates medicus in magna pestilentia, non unum agnum, sed multa oppida, scientia servavit?

BARTHOL SYLVANIUS

interpres.

Hippocratis apud Græcos omnes memoria in ævum durabit, quandoquidem publice est de omnibus benemeritis.

AETIUS AMIDENUS

tetrab. 11. ferm. 1. c. 94.

JANO CORNARIO interprete.

Sed & rogo ingenti exstructo & incenso aerem ad caliditatem & siccitatem transmutare quis potest, humidum & frigidum factum, quemadmodum Hippocratem Athenis fecisse dicunt, itemque Acro-nem Agrigentinum.

NICOMEDIS,

sive ut alii.

BASSI

in Hippocratem distichum recurrens,

ex Anthol. Epigrammat. l. 1. c. 39.

Hippocrates fuit arx miseris, ac gentibus ^{agris}

Reddidit hic vires: Dis, tibi pauperies

Recurrens.

Pauperies tibi, Dis: vires hic reddidit ^{agris}

Gentibus, ac miseris arx fuit Hippocrates. *Tab. Coccinea.*

AUCTOR

l. de Ther. ad Pison. c. 16.

JUL. MART. ROTA interprete.

Quocirca summis laudibus prosequor admirandum Hippocratem, qui pestem illam

Hipp. Opera.

ex Æthiopia ad Græcos venientem non alio præsidio repulit, quam aerem purum faciendo, ne ab hominibus (qualis tunc erat) infectus hauriretur. Præcepit itaque ut per totam civitatem ignis accenderetur, qui non solum ex simplici materia constaret, sed bene olentes coronas & flores haberet. Talia siquidem ignibus alimenta subministrari consuevit, ut & unguenta quam pinguisima infunderent, & id genus alia bonum odorem fundentia: ut hoc pacto cives aerem purum inspirantes ab imminenti huc tuti forent.

JOH. ACTUARIUS

Method. med. v. 6. qua de Antid.

CORN. HENR. BRUGESIO interprete

Antidorum Hippocratis, quo usus corona Athenis est donatus. fronti ex vino illitum capitis dolorem mitigat, & aurium dolori prodest, ex oleo vellum stocco injectum, nec secus ore detentum, ejus dolorem sedat. Dandum est autem ex hydromelite, nucis avellane magnitudine, insistentibus, lienosis, jecimorosis, sanguinem expuentibus, calculosis, laterum inflammationibus, Ægyptiæ fabæ magnitudine, ex oxymelite mero, eyathis tribus, ischiadicis, intestinorum dolore vexatis, lupini magnitudine in decocto pæoniæ, a prima luna usque ad extremam: a larvis demoniisque occupatis, nucis Ponticæ magnitudine, in lacte asinino: quartana laborantibus ex aceto mulso, desinente luna.

Calami odorati, junci odorati, sabine singulorum triens: seminis viticis, cardamomi, cyperis, crocomagmaris, singulorum quincunx, nardi Celticæ selibra, aspalathi septuonx, ammoniaci uncia, pilularum eupressi quadrans, rosarum triens, ladanii, myrrhæ, thutis, singulorum libra, baccæ juniperi minoris quadraginta: hæc simul privatim tundito: spicæ nardi selibra, costi triens, folii bes, cassiæ selibra amomi quadrans: hæc quoque privatim tundito: mastiches triens, & hoc forcum in mortario teritur: stytiacis dextaus, styrax paulatim bellariis in mortario adiciatur: terebinthinæ libæ tres, mellis Attici libæ quinque, veli veteris quod ad bellaria maceranda satis est, munde & sedulo melle excipiens confice.

GALENUS

l. Quæ opt. med.

LUD. BELLISARIO interprete.

An nostris seculis quemquam memorare possumus, qui tantum habere cupiat, quantum sit ad usum vitæ necessarium? qui non verbis tantum effingere, sed etiam propriis vitæ exemplis docere possit divitiarum certantem, qui quidem sit secundum naturam, nec ultra, quam ut fames, sitis, frigus absit,

c a progre-

HIPPOCR. GENUS & VITA.

progredi. Sed, si quis tamen ejusmodi est, is & Artaxerxis & Perdicæ potestatem contemnit, nec unquam in conspectum hujus ibit: huic vero sic ægrotanti, ut Hippocratis artem desideret, medebitur quidem, non tamen semper eum eo esse vult, sed Cranonem & Thasum, aliaque ad oppida multa proficiscetur, ut pauperibus his locis ægrotantibus curationes adhibeat. Cois hominibus civibusque suis Polybum aliosque discipulos relinquet: ipse Græciam peragans omnem perquiret, (vel occupabit) ut naturam locorum, sicut oratione (vel narratione) didicit, sic experimentis comprobet.

SCRIBONIUS LARGUS

Epist. ad C. Jul. Cæsarum.

Hippocrates conditor nostræ professionis initia disciplinæ ab Jurejurando tradidit: in quo sanctum est, ne pręgnantiquid medicamentum, quo conceptum excutitur, aut detur, aut demonstretur a quoquam medico, longe præformans animos discen- tium ad humanitatem.

OCTAVIANUS HORATIANUS

ad Pistoriam 111. 6.

Abortivum dare nulli unquam fas est. Ut enim Hippocratis attestatur adjuratio, tam duri reatus conscientia medicorum in- nocens officium non debet maculari.

TERTULLIANUS

de Anima c. 25.

Atquin & in ipso adhuc utero infans truci- datur, necessaria crudelitate, quum in exitu obliquatus denegat partum; matrici- da, ni moriturus, itaque & inter arma medicorum & organon est, quo prius pa- tescere secreta coguntur, tortili tempera- mento, cum anulo cultrato, quo intus membra caduntur, anxio arbitrio; cum habere iuncto, quo totum facinus extrahi- tur violento puerperio. Est etiam æneum spiculum, quo signatio ipsa dirigitur, cæ- go latrocinio: *ipsumque* appellant, de infanticidii officio utique viventis infantis peremptorium, hoc & Hippocrates habuit, & Asclepiades, & Erasistratus, & ma- jorum quoque professor Herophilus, & mi- nor ipse Soranus, certi animal esse conce- ptum, atque ita miseri infelicissimæ hu- jusmodi infantia, ut prius occidatur, ne viva lanietur.

SORANUS EPHESIUS

Jeg. Art. med. c. 3.

Memor etiam sit juramenti Hippocratis, ut ab omni culpa se abstinere, maxime ve- nerec; & corruptibili actu. Ea que in do-

inibus aguntur, & dicuntur, tamquam my- steria celanda existunt. Sic enim tibi & arti ampliore laudem acquirere. Habeat etiam digitorum elegantiam & subtilita- tem, ut suavis omnibus videatur, & in- tangendo subtilior appareat: hæc enim & ipse Hippocrates dixit.

D. HIERONYMUS

ad Nepotianum de Vita Clericorum cap. 18.

Hippocrates adiurat discipulos, antequam doceat, & in verba sua jurare compellit, extorquet sacramento silentium, sermo- nem, incessum, habitum, moresque præ- scribit: quanto magis nos, quibus anima- rum cura commissa est, omnium Christia- norum domos debemus amare quasi prop- rias?

A VENZO AR

11. Theisr. 1. 5.

Quilibet medicus tenetur observare præ- cepta Hippocratis: quæ sunt, quod medi- cus non debet discipulum docere, nisi prius jurare ipsum faciat, ne utatur medicinis mortiferis, vel venenosis ullo modo.

M. ANTONINUS

Imp. de Rebus suis lib. 111. §. 3.

TH. GATAKERO interprete.

Hippocrates, ubi multos sustulerat mor- bos, morbo tandem & ipse sublatu est.

I G N O T I

Epitaphium Hippocratis.

Ex Anthol. Epigrammat. scilicet. 111. c. 15.

Thestalus Hippocrates, Cois genere, hæc jacet urna,

Phœbi immortalis femine progenitis.

Crebra trophæa tulit morborum armis me- dicinæ,

Lais cui, magna, nec id forte, sed arte fuit.

Tb. Morn, Anglus.

Æ L I A N U S

Par. hist. iv. 20.

JUSTO VULTEJO interprete.

Dicunt præterea, Hippocratem fuisse Doriensem: sed in gratiam Democriti Jo- nica lingua suos libros scripsisse.

HIPPOCR. GENUS & VITA.

C. PLINIUS SECUNDUS

Nat. hst. XXVI. 3.

Hippocrates certe, qui primis medendi præcepta clarissime condidit, reserta herbarum mentione invenimus volumina.

M. AUR. CASSIODORUS

Divin. lect. t. 31.

Post hæc legite Hippocratem, atque Galenum latina lingua conversos, id est, Therapeutica Galeni ad philosophum Glaucodem destmata. Deinde Cæli Anreliani de medicina, & Hippocratis de Herbis & cutis.

D. AUGUSTINUS

contra Arianismum XXXIII. 5.

Nonne, ut alios omittam, sub Hippocratis medici nobilissimi nomine quidam libri prolati in auctoritatem a medicis non recepti sunt? Nec eos adiuvit nonnulla similitudo rerum, atque verborum, quando comparati eis, quos vere Hippocratis esse constaret, impares judicati sunt, & quod ab eo tempore, quo & cætera scripta ejus, non innotuerunt, quod vere ejus essent. Hos autem libros, quibus illi, qui de transverso proferuntur, comparati respondent; unde constat esse Hippocratis, unde si quis hoc neget, nec saltem resellitur, sed ridetur, nisi quia sic eos ab ipso Hippocratis tempore usque ad hoc tempus, & deinceps successione series commendavit, ut hinc dubitare dementis sit.

A. CORN. CELSUS

de Medic. VIII. 4. p. edit. Linden, 515. Li.

A futuris se deceptum esse, Hippocrates memorie prodidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multaque nihilominus habituro, convenit etiam simplex veritatis confessio, præcipueque in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur; ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus est. Sed hæc quidem aliquin memoria magni professoris, uti interponetinus, effecit.

M. F. QUINTILIANUS

Instit. Orat. III.

Nam & Hippocrates clarus arte medicinæ, videtur honestissime fecisse, qui quosdam errores suos, ne posteris errarent, confessus est.

PLUTARCHUS

de Prof. in virtute.

Qui vero re ipsa proficit, exemplum Hippocratis sibi imitandum ducet, qui errorem suum de futuris capitis professus est, inque litteras retulit. existimabitque indignum fore, si (cum tantus vir, ne alii eodem erroris venissent, suam testatam fecerit ignorantiam) ipse salutis suæ studio non audeat fluctitiam incertitiamque suam detegere atque confiteri.

PAUSANIAS

Phocic. x.

ROMULO AMASÆO interprete.

Phocenses ejus fratri Phayllo summa cum potestate imperum decreverunt. Et vixdam ad imperandum aggresso talis oblata est per somnium species. Inter Apollinis donaria pervetus effigies quidam fuit, ex ære, hominis, cui duntimore morbo carne consumpta, sola essent reliqua ossa. aiebant Delphi ab Hippocrate medico dedicatam. Huic Phayllus se similem factum videre visus est: ac paucis post diebus macie contabescens somnii eventum implevit.

SUIDAS

Lexico.

ÆM. PORTO interprete.

Thessalus, Cous medicus, illius illustris Hippocratis filius, cujus iterum filii fuerant Gorgias & Hippocrates. Scripsit libros de re medica sex.

Dracon, nepos Hippocratis illius insignis medicus, ex Thessalo s. pater Hippocratis, ex quo rursus natus est Dracon, & ipse medicus, qui Rhoxanen Alexandri Macedonis conjugem curavit.

GALENUS

de Viti. rat. in morb. acut. III. 42.

JOA. VASSÆO interprete.

Erasistratus malitiose satis criminatur Hippocratem, discipulos ipsius prope accusans, Apollonium, & Dexippum: quos ait cereos cyarhos duodecim in sextantali corylæ cyatho effinxisse, atque unum ex illis, aut duos febrientibus admeciri. Verum Erasistratus de Apollonio quidem & Dexippo mentionem facit, nec ullum eorum librum ostendere potest.

FRAGMENTA & ELOGIA:

S V I D A S

Lexico.

ÆMIL PORTO interprete.

Dexippus, Cous, medicus, Hippocratis discipulus. Qui accessit ab Hecatomo Carum rege, ut ipsius filios desperatos, Mausolum & Pixodarum, curaret, eos ea conditione sanavit, ut bellum, quod tunc adversus Catas gerebat, deponeret. Scripsit unum medicum librum, & de præcognitionibus duos.

PLUTARCHUS

de Stoic. repugn.

Enimvero nobilissimi medicorum testimonium Platonem perhibent, Hippocrates, Philistio, Dioxippus Hippocraticus.

JOH. MANDEVYLE

de Itinerario cap. 6. De filia Hippocratis mirabile.

Exinde itinerando itit ad insulam de Orecia, & postea ad insulam, quæ Franco dicitur, & ad insulam de Lango. de quibus insulis Hippocrates exiit dominus. Et dicitur adhuc, quod in insula de Lango testat adhuc filia Hippocratis, in effigie magni Draconis, qui centum tosyas continet longitudinis, sicut dicitur (nam ipse non vidi) inclusa, quam habitatores dictæ insulæ vocant Dominam patriæ. Jacet autem in quodam castello antiquo: & aliquando ostendit se quibusdam personis, eis minimè nocendo, nisi eam aliquis læserit. Fuit autem dicta filia aliquando nupta de pulchra puella in draconem, per unam deisam, quæ Diana vocabatur, & dicitur quod aliquando reduceretur ad gradum pristinum, quando videlicet inventus aliquis miles, in tantum audax, quod osculetur eam ore ad os. Sed quando conversa fuerit in mulierem, non vivet ulterius.

Unde modico tempore transacto quidam miles de hospitali de Rodis, valens & audax dixit, quod eam deoscularetur: & ascendens cursorum suum transiit se additum castrum. Et ingrediens cavernam Draconis, incepit Draco caput suum contra militem erigere. Cernens igitur miles Draconis vultum horribilem, atque terribilem nimis, tedit de caverna: at equus militis hostore tanto perterritus, super tippam altam profliciens ascensotem projecit in mare, & ita cum equo suo demersus interiit.

Iterum juvenis quidam Draconem prædictum ignotans exiens de navi per medium insulæ incedens, & dictum ingrediens castellum, & cavernam Draconis processit ulterius, & in quadam interiori caverna vidit puellam capillos capitis parantem præ-

misso speculo ante faciem dictæ domicellæ. Circa quam thesaurus huiusmodi erat appositus. Cogitantque penes se credere eam fuisse mulierem communem. Expectans tandem juvenis, quousque ejus umbram cerneret, puella quasi, quæ esset juvenis ille. Qui respondebat, quod intendebat esse se spontatus tam pulchra puellæ. Quæ quasi, sicut a juvene, si miles esset? & respondit, non. Quæ dixit, nullo modo amicitium eum ab eadem prius se obtinere, quousque ordini adscriptus fuisset militari. Et dixit, redeundo ad fœdalis tuos facies te militari ordini adscribit, & etas exeundo cavernam præcedam te, & veniens dabis mihi osculum, & de turpitudine mea noli terri, quod non tibi nocebo, & quantumcumque conspexeris me horribilem, ne timeas, quod per incarnationes transfigurationem talem recepi, & deformitatem, quam cernis. Quod si osculati me poteris, thesaurum, quem vidisti, recipies, & sponsus meus eris, & istius insulæ dominus. Rediens tandem ad consocios suos, & ordinem assumens militarem in crastinum ad puellam redire cupiens osculari. Ipsa vero in deformitate horribilissima exeunte perterritus fugam cepit, & usque ad navem properans puella persequitur, cernensque militem tedit ad eam nolle, clamare terribiliter cepit, & quasi tristis ad cavernam suam reverla est, & miles in continenti moriebatur: nec ausus fuit quisquam ex illa die dictam puellam aspicere, quin statim moriatur. Quando vero aliquis fuerit audax eam osculari, non morietur, sed convertetur puella in pulchritudinem, & osculator erit dominus patriæ.

FRAGMENTA ET ELOGIA,

ex eodem Lindenio ibid.

PLATO

Phædo

MARSILIO FICINO interprete.

SOCR. Animæ veto naturam absque totius natura sufficienter cognosci posse existimas? *Phæd.* Si Hippocrati Æsculapio successori credendum est, neque etiam corporis naturam, sive doctrinam huiusmodi comprehendendi posse putabimus. *Socr.* Scire loqueris, o amice. Oportet autem præter Hippocratem confiderare, utrum disputationis nobis ratio consonet. *Phæd.* Assentior. *Socr.* De naturæ igitur perquisitione quid Hippocrates, & vera ratio dicat, attende.

IDEM

FRAGMENTA & ELOGIA.

I D E M

Protagora.

Dic age, o Hippocrates, si ad Hippocratem tibi cognominem Coum illum, *Æsculapii stirpe natum*, proficisci velles, pro te mercedem erogaturus, & aliquis quæreret, Dic mihi, o Hippocrates, mercedem Hippocrati dabis? Qualinam homini, & cujus ratione? quid responderes? *Hip. Ut medico. Socr. Qualis & ipse futurus, idest cujus gratia? Hip. Ut medicus evasurus.*

ARISTOTELES

Politie. VII. 4.

Quemadmodum Hippocratem non hominem, sed medicum quis eo majorem dixerit, qui illum corporis magnitudinem superat.

CLEMENS ALEXANDRINUS

Stramat. II.

GENTIANO HERVETO interprete.

Fit autem exercitatio, ex sententia Cui Hippocratis, non solum corporis sanitas, sed etiam animæ, impigra laborum suscepcio, & non nimia nutrimenti exsaturatio.

I D E M

Stram. vii.

Quin etiam cum medicus scripsisset Hippocrates, Respicere oportet & tempus, & regionem, & ætatem, & morbos, dicit Euripides in hexametro.

qui volunt mederier,
Ut unaquæque possit urbs & incolæ,
Hos terram oportet nosse, sic morbo manus demum admoveat.

THEODORETUS

de nat. hum. ferm. v.

JACOBO SIRMONDO interprete.

Quanta item inter eos controversia sit in collocanda principaliori animæ vi, facile est videre. Hippocrates enim, & Democritus, ac Plato in cerebro sitam esse affirmant.

GREG. NAZIANZENUS

Orat. fun. Cesaris fratris x. II.

JAC. BILLIO PRUNÆO interprete.

Qui cum ob pudicitiam & temperantiam omnibus charus esset, & quæ de causis pretiosarum curam susceperit, nec adiutore

Hippocrate ullo modo opus haberet, adeo ut nihil prorsus esset Cræteis simplicitas, si cum illius simplicitate conferretur.

ISIDORUS PELUSIOTA

Epist. II. 16.

JAC. BILLIO PRUNÆO interprete.

Medicus, Hippocrates incurabili morbo correptus manum admoveat.

I D E M

Epist. II. 79.

Verum Hippocrati morem gerens, ut incurabili morbo laboranti manum haudquam admoves. Quamvis in corporibus verum hoc esse quidam existimant (et si alioqui per sepe falsum inventum sit: complures enim medici, admodum manu is, qui incurabili morbo affecti esse videbantur, rem ex sententia gesserunt) in animis tamen hoc magis adhuc falsum esse reperitur.

PLUTARCHUS

de Plat. Philof. v. 18.

GUL. XYLANDRO interprete.

Hippocrates dicit, si uterus impleatur septem mensibus, tunc foetum se exierere, ac in lucem edi, quod si se exierens non alatur ob umbilici languorem, laboriose gestato foetu, tunc cum non nutiri: si vero novem menses in utero maneat, tunc se promere, integrumque nasci.

I D E M

l. Non posse succurrere viis sec. Epiciuri decr.

Est enim, inquit Hippocrates, ad summum progressa corporis bona affectio periculosa.

I D E M *ibid.*

Sed, sicut inquit Hippocrates, e duobus doloribus minorem a majore obducari: sic voluptates etiam corporeæ a voluptatibus agendo & honesti studio partis ob animi lætitiâ ingentem ac incomparabilem oblitentur & extinguuntur.

A U C T O R

Prog. de Decem. ex Adaltem. c. 1.

JAC. ANTON. MARISCOTTO interprete.

Hippocrates igitur, & vetustate admodum notus, & scientia admirandus, inquit: Quicumque exercentes medicinam, Physis-

FRAGMENTA & ELOGIA.

Phyſiognomoniz ſunt expertes, horum
mens in tenebras devoluta torpet.

A U C T O R

l. de Spermate c. 14. De Concept. puri alterata.

Philoſophi indubitanter aſſerunt, teſte
Hippocrate, quod omnis ſubſtantia corpo-
rea animata juncta ſit, & ligata in plane-
tis, & ſignis, quatuorque elementorum ne-
xibus.

I D E M

c. 22. De qualis, & efficacia planetarum.

Dicit Hippocrates in Phyſica, quod ter-
ra eſt appoſita generare naturam corporum.

I D E M

*c. 23. De nat. Conjuncti. & adjuncti. quatuor
elementorum.*

Dicit Hippocrates: ſicut nulla ſubſtan-
tia incorporea habet nutrimentum a diffe-
rentia corporea, ſic nulla ſubſtantia corpo-
rea poteſt nutriri a differentia incorporea.

S E X T U S E M P I R I C U S

adv. Matbem. VII.

Vinum autem, hominem: ſpecie abu-
tens pro genere. Speciem namque hominis
conſtituit vir. Solet vero etiam Hippocra-
tes hoc loquendi modo uti: ut cum dicit,
Mulier ambidextra non naſcitur: hoc eſt,
fœminæ in dextris partibus uteri non conſi-
ſtunt.

I D E M

Pyrrhon. hypot. 1.

Sed & (canis) Hippocraticum præceptum
valde bene obſervat. Quum enim pedis
medela ſit quiet; ſiquidem vulnus in pede
habuerit, eum ſublimem ponit, quantum-
que poteſt, immotum ſervat.

J O H. S T O B Œ U S

ſerm. cexlIII. 801.

Cibi, potus, ſomni, venus, omnia mo-
derata ſint, inquit Hippocrates.

I D E M

ſerm. XIII. Apophthegma.

Hippocrati ſuadebat quis ad Xerxem pro-
ficiſci, bonum eſſe regem dicens. At ille,
non eſt opus mihi, inquit, bono domi-
no.

A L I U D

ſerm. cexlIII.

Verumtamen aliquo opus habet mulier,
a quo caſtigetur. Habet enim in natura
ſalivam, quæ niſi quotidie amputetur,
luxuriatur, & ſilveſcit inſtar arborum.

J O H. T Z E T Z E S

Hſt. VII. chil. cl. 884.

JO. ANT. VAN. LINDEN interprete.

Mœrore quotquot occupantur, quibus &
mens labat,
Tum quotquot indomitum ſunt, ut Hip-
pocrates notat,
Hominem exiunt, & procul ab hominum
notis degunt,
Æque peroliſi notos ut vultus incognitos.

J U L P O L L U X

Onno. IX. 6.

RUD. GUALTHERO interprete.

Et ſane, cum Hippocrates inquit, Fri-
gidum infeſtum eſt nervis, oſſibus, denti-
bus, & cerebro: manifeſtum eſt, quod ca-
lida dentibus offerenda ſunt.

N E M E S I U S

de nat. hom. c. 2.

Galenus videtur probare magis, animam
eſſe temperamentum: id enim ſequitur mo-
rum differentia: quod ex Hippocratis dictis
confirmare nititur.

I D E M

cap. 22.

Veteres tamen etiam os ventris coruſur-
pant, ut Hippocrates, & Thucydides in
deſcriptione peſtis.

A L E X A N D E R T R A L L I A N U S

lib. 1. cap. 16.

JOH. GUINT. ANDERNACO interprete.

Quemadmodum divus Hippocrates ait:
Confluxus unus, conſpiratio una, omnia
conſentientia.

I D E M

VII. 2.

Et, ſiquidem intra thoracem pus illa-
pſum diutius intus manſerit, & non fue-
rit expurgatum, ut diviniſſimas ait Hip-
pocrates, in phtiſin pervenit.

IDEM

FRAGMENTA & ELOGIA.

IDEM IX. 3.

Nam, quæ Hippocraticæ artis methodi vocantur, hæ sunt: nempe contraria contrariorum semper esse remedia.

DEMETRIUS PEPAGOMENUS

de Podagra in Proem.

HADRIANO TURNEDO interprete.

Ut diu multumque reculare non poterim, cum præsertim scirem, quæ maximus omnium magister Hippocrates dicat, Naturæ a nascis multum differunt, & a locis loca.

ATHENÆUS

Deipn. II. 7.

JAC. DALECHAMPIO interprete.

Vinum subdulce caput non gravat, inquit Hippocrates lib. de rat. victus. quem quidam inscripserunt De morbis acutis, alii vero, Adversus Cnidias sententias. Ejus hæc verba sunt: Vinum dulce capiti grave minus est, quam vinosum, mentemque minus rentat; per intestina citius meat, & excernitur alio quovis.

IDEM *ibid.*

Hippocrates leviores semper illam esse judicat, quæ promptius incalcescit ac refrigeratur: malam, quæ tardius coquantur legumina, nimirum quia falsa vel nitrosa sit. Idem Auctor lib. de Aquis, optimam esse statuit multum exercitatum, & agitatam, noxias autem residas & pigras, quales sunt paludum, & stagnorum: præterea fontignæ aquas esse maxima ex parte duriores.

Et Mox.

Hippocrates libro de Locis optimam esse aquam pronunciat e locis sublimibus, & aridis emulsis profluentem, ut quæ candida sit, dulcis, nec limi trahere multum possit, & aestare frigida, hyeme tepere. Idem aquam maxime laudat, cujus procurus orientem solem versus erumpit, præsertim æstivum, quia levis, limpida, & maribus grata sit.

IDEM LII. 16.

Hippocrates vero Coccalos, in lib. de Præfana, cujus pars dimidia spuria est, & ut quidam censent, totum opus.

IDEM LIX. 13.

Idem quoque meminit sanctissimus Hippocrates.

Hipp. Opera.

ORIBASII

ad Aph. II. 28.

Novenarius, qui criticus sine dubio est, a Galeno non immerito additus est: non quod ab Hippocrate hoc ignoratum sit (nihil enim in hominis natura tantum philosophum latuit) sed quod inter cetera ab eo prætermisum sit. Non enim quidquid prætermittitur, etiam ignoratur.

THEOPHILUS

de Urinis

FED. MORELLO interprete.

Ergo primum aggrediamur optime substantiæ præparationem. Optimum autem est a sapientissimo Hippocrate hanc ordini.

A. CORN. CELSUS

de Med. LI. *Præf. p. Edit. Linden.* 17. L. 28.

Ergo etiam vetustissimus auctor Hippocrates dixit, mederi oportere, & communiæ, & propria intuentem.

IDEM

LII. præf. p. Edit. Linden. 41. L. 23.

Instantis autem valetudinis signa complura sunt: In quibus explicandis non dubitabo, auctoritate antiquiorum virorum uti, maximeque Hippocratis; cum recentiores quoque medici, quamvis in curationibus mutarint, tamen hæc illum optime prælagisse fateantur.

IDEM XL c. 14. p. 88. L. 7.

Neque dubitari potest, quin latius quidem, & dilucidius, ubi, & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades præceperit: nihil tamen reperit, quod non a vetustissimo auctore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit, qui dixit: Frictione, si vehemens sit, durari corpus: si leni, molliari: si multa, minus: si modica, impleri.

IDEM

VIII. 15. p. 549. L. 18.

Multas esse alias rationes, scire facile est, uno Hippocrate lecto; sed non alia magis usu comprobata est.

IDEM

VIII. 20. p. 554. L. 4.

Sed Hippocrates, & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores.

f APU.

HIPPOCR. GENUS & VITA.

A P U L E J U S.

Aselepiades ille, inter præcipuos Medicorum, si unum Hippocratem excipias, ceteris princeps,

CÆLIUS AURELIANUS

Acut. morb. l. 12.

Hippocrates igitur solum nomen videtur retigisse passionis, libro quem de pituita scripsit, item libro prædictivo, quem prothæticum appellavit; nam curationem nullam tradidit,

I D E M.

Acut. morb. III. 15.

Item Hippocrates inagis phreneticos memoravit, non hydrophobas, parvibulos. Nam inquit, eos, quod in quibusdam phreneticis frequentare videmus, aut fastidio possessos, non solum cibum, verum etiam potum refugere: vel certe traductos visis, quæ Græci phantasmata appellant (ut ait Eudemus) ut accipiendum non existiment fororum: vel suspitione delirationis affecti, admixta putent venena liquori,

I D E M

Tard. pass. II. 1. quæ de Paralyti.

Veterum autem Medicorum Hippocratis, atque Erophili sectatores memorant ea quæ in passione constitutos sequuntur, curationem vero nullam tradiderunt.

I D E M. Tard. II. 10.

Alii vero eruptiones, ut Hippocrates, Eurypho. Sed Hippocrates solarum venarum, Eurypho vero etiam arteriarum.

I D E M. Tard. v. 1.

Utilem inquit Hippocrates ischiadicis dysenteriam. Habet enim imitationis quiddam recorporationis faciundæ, quamquam plurima vexatione corpus afficere videatur.

SORANUS EPHESIUS

Præf. in Hæc. Art. med.

Medicinam quidem invenit Apollo, amplificavit Æsculapius, perfecit Hippocrates; quem mihi hominis ducem, & iudicem omnium caussarum, & questionum oportet accipere, tamquam parentem, & inventorem omnium bonorum operum; per quem Logica nobis, juxta rationem, est facta traditio, & tamquam visibilis facta doctrina, ut per eam meliores fiant & acutiores, qui introducuntur ad medicinam, quos Græci *νεγρηδες* appellant.

I D E M

Hæc. Art. med. c. 14.

Hippocrates quoque ait: Medici quidem fama multi, sed opere valde pauci. Vult enim Hippocrates, & præterita medicos cognoscere, & præsentia scire, & futura prædicere.

PLINIUS VALERIANUS

de Re med. IV. 17. 20.

Suffito alio foeminarum secundas evocari Hippocrates auctor est. Porro capitato ad multa corporis vitia Hippocrates usus est.

OCTAVIUS HORATIANUS

ad Esopum, II. 7.

De his igitur Hippocrates noster, hujus professionis auctor, sic sua sententia indicavit. Apoplecticos, inquit, graviter occupatos, nullo penitus pacto curari posse, leviores autem, licet difficile, liberari,

ad Esopum. III. 14.

Hippocrates quem primum medicorum appellamus.

Et Alex.

Ut beatissimus Hippocrates affirmat.

GARIOPONTUS

III. 43.

Hoc enim nostri Hippocratis docuit auctoritas, quia nervorum causis omnia semper frigida nocuerunt.

I D E M VI. 11.

Similiter decimum diem Hippocrates omnium periculosissimum in uno tantum invenit eriticum, & ideo etiam ipsum incertum observamus.

C I C E R O

de Orat. III. 33.

An tu existimas, cum esset Hippocrates ille Coud, fuisse tum alios medicos, qui morbis, alios, qui vulneribus, alios, qui oculis mederentur.

de Nat. Dew. III. 38.

Nec ego multorum ægrotum salutem non ab Hippocrate, quam ab Æsculapio datam judico.

ad Alex.

FRAGMENTA & ELOGIA.

ad Attic. xvi. 15.

Sed desperatis etiam Hippocrates vetat
adhibere medicinam.

L. A. SENECA

Epist. xcv.

Maximus ille medicorum, & hujus scientiæ conditor foeminis nec capillos desluere dixit, nec pedes laborare. Atqui hæc jam & capillis destituuntur, & pedibus aegre sunt. Non mutata foeminarum natura, sed vita est: nam cum virore licentiam aquaverint, corporum virilium viria aquaverunt: Non minus pervigilant, non minus potant, & oleo, & mero viros provocant: æque invitis ingesta visceribus per os reddunt, & vinum omne vomitu remittuntur: æque nivem rodunt, folatium stomachi æstuantis. Quid ergo mirandum est, maximum medicorum, ac naturæ peritissimum, in mendacio prehendi, cum tot foeminae podagricæ, calvarque sint? Beneficium sexus sui vitii perdidit, & quia foeminam exuerunt, damnatae sunt morbis vitilibus.

I D E M

de Brevit. vite c. 1.

Maximi medicorum exclamatio est, Vitam brevem esse, longam artem.

I D E M *ibid.*

Itaque alia est Hippocratis secta, alia Asclepiadis, alia Themisonis.

P L I N I U S

Hist. nat. vii. 51.

Jam signa lethalia: in furoris morbo tum: sapientie vero agri tudine, fimbriarum curam, & stragule vestis plicaturas, a somno moventium neglectum, præfandi humoris & corporis effluviū: quæque alia Hippocrati principi medicinæ observata sunt.

I D E M

Hist. nat. xxix. 1.

Diis primum inventores suos assignavit, & cælo dicavit: nec non & hodie multifariam ab oraculis medicina petitur. Anxius deinde famam etiam crimine, idem fulmine Æsculapium fabulata, quoniam Tyn-daridem revocasset ad vitam. Nec tamen cessavit narrare, alios revivisse opera sua, clara Trojanis temporibus, quibus fama certior, vulnerum tamen curatæ remediis. Sequentia ejus (mirum dictu) in nocte densissima latere usque ad Peloponnesum.

Hipp. Opera.

fiacum bellum: tunc eam revocavit in lucem Hippocrates, genitus in insula Coo, in primis clara, ac valida, & Æsculapio dicata. Is cum fuisset mos, liberatos morbis scribere in templo ejus Dei, quid auxilium esset, ut postea similitudo proficeret, exscripsisse ea traditur, atque (ut Varro apud nos credit) jam templo cremato, instituisse medicinam hanc, quæ Clinice vocatur.

T E R T U L L I A N U S

l. de Anima c. 15.

Sed plures... Medici adversis Andream, & Asclepiadem, Herophilus, Erasistratus, Diocles, Hippocrates, & ipse Soranus... & esse principale in anima, & certo in corporis recessu consecratum. Si enim scrutatorem, & disceptatorem Cordis Deum legimus... simul utrumque dilucet, & esse principale in anima, quo intensio divina conveniat, idest, vim sapientialem, atque vitalem; quod enim sapit, vividum est, & in eo thesauro corporis haberi, ad quem Deus respicit, ut neque extrinsecus agitari putes principale istud secundum Heraclitum... neque in cerebro cubare secundum Hippocratem.

A U G U S T I N U S

de Civ. Dei v. 2.

Cicero dicit, Hippocratem nobilissimum medicum scriptum relinxisse; quosdam fratres cum simul ægrotare cœpissent, & eorum morbus eodem tempore ingravesceret, eodem levaretur, geminos suspicatum. Quos Posidonius Stoicus multum Astrologiæ deductus, eadem constitutione astrorum natos, eademque conceptos solebat asserere. Ita quod medicis pertinere credebat ad simillimam temperiem valetudinis; hoc philosophus astrologus ad vim, constitutionemque syderum, quæ fuerat quo tempore concepti natique sunt. In hac causa multo est acceptabilior, & de proximo credibilior conjectura medicinalis: quoniam parentes ut erant corpore affecti dum concumberent, ita primordia conceptorum affici potuerunt, ut consecutis ex materno corpore prioribus incrementis pariter valetudinis nascerentur: deinde in una domo eisdem alimentis nutriti, ubi aerem, & loci positionem, & vim aquarum plurimum valere ad corpus, vel bene vel male accipendum medicina testatur, eisdem etiam exercitationibus assueti, tam similia corpora gererent, ut etiam ad ægrotandum uno tempore eisdemque causis similiter moverentur. Constitutionem vero cœli, ac syderum, quæ fuit, quando concepti, sive nati sunt, velle trahere ad istam ægrotandi paritatem, cum tam multa diversissimi generis animalia, diversissimorum affectuum, & eventuum eodem tempore in unius regionis terra eadem cœlo subdita, potuerint

FRAGMENTA & ELOGIA.

tuerunt concipi, & nasci: nescio cuius sit insolentia. Nos autem novimus, geminos non solum actus, & peregrinationes habere diversas, verum etiam dispares agitudines perpeti. De qua re facillimam, quantum mihi videtur, rationem redderet Hippocrates, diversis alimentis, & exercitationibus, quæ non de corporis temperatione, sed de animi voluntate veniunt, dissimiles eis accidere potuisse valetudines.

CYPRIANUS

Epist. lxxvi.

Porro autem, quod quidam eos salutari aqua, & fide legitima Christi gratiam consecutos, non Christianos, sed Clinicos vocant, non invenio, unde hoc nomen assumant, nisi forte qui plura, & secretiora legerunt apud Hippocratem, vel Soranum, autem istos deprehenderunt.

POLLUX

Onom. II. I.

RUD. GUALTHERO interprete.

Septem sunt ætates secundum Hippocratem. Prima, ab anno primo ad septimum. Secunda, a septimo ad decimumquartum annum. Tertia, a decimoquarto usque ad vicessimum primum. Quarta, a vicessimoprimo usque ad vicessimum octavum. Quinta, a vicessimooctavo ad tricesimum quintum. Sexta, a tricesimo quinto ad quadragesimum secundum. Septima, a quadragesimo secundo ad quadragesimum nonum. Prima quidem, Puerulus; secunda, Puer; tertia, Adulescens; quarta, Juvenis; quinta, Vir; sexta, Senex; septima, Decrepitus dicitur.

MARTIALIS

Epigr. IX. 96.

DE HIPPOCRATE,

Santonica medicata dedit mihi pocula virga:

Os hominis, mulsum me rogat Hippocrates.

Tam stupidus nunquam nec tu, puto, Glaucæ, fuisti,

Chalceæ donanti Chryseæ qui dederas. Dulce aliquis munus pro munere poscit amaro?

Accipiat, sed si potat in helleboro.

INCERTI AUCTORIS,

GALENUS.

Dempseris Hippocratem, medicorum primus habebor.

Debeo multa illi, debet & ille mihi. Nam, quæ nota parum reliquis dedit, omnia feci

Mille libris claro læcidiora die.

I D E M,

Hippocratem magnum brevis insula, me dedit ingens

Terra Asiæ, plus nos scripsimus, ille minus:

Ille elementa dedit, nos inde extruximus aram,

Quam servar medici præsul Apollo chori.

In Iconem

HIPPOCRATIS.

ex Floril. Epigr. sect. IV. cap. xxi.

SYNESII SCHOLASTICI.

Unde is, qui posuit? quo nomine? Byzantinus

Eusebius. Tu quis? Coëlis Hippocrates.

Quare is re pinxit? Pro verbis patriæ munus

Picturæ nostræ grata rependit ei.

Et cur ille suam non protulit icona? Maior

Illi honor est proprio prætulisse meum.

I N C E R T I.

Vel vocem Pæan tibi finxit vel medicinæ

Illius restis magnus es, Hippocrates.

J. A. Vander Linden.

A N O N Y M I.

Ille vias meruit rectas aperire medendi,

Ille hominum Pæan Coius Hippocrates.

J. A. Vander Linden.

A M B R O S I U S

Epist. VII. 39.

Celebretur itaque hebdomas, eo quod per septem ætatum cursus vita hominum usque ad senectutem transcurritur, sicut Hippocrates medicinæ magister scriptis explicuit suis. Prima ætas infantia est, secunda pueritia, tertia adolescentia, quarta juvenus, quinta virilis ætas, sexta avi maturitas, septima senectus. Est ergo infans, puer, adolescens, juvenis, vir, veteranus, senex. Ergo Hippocrates vel septem ætates, vel hebdomadas ætatum novit, in illis se hebdomadas præferet.

M A C R O B I U S

in Somn. Scip. I. 6.

Hoc cum a Physicis deprehensum sit, Hippocrates quoque ipse, qui tam fallere, quam falli nescit, experimenti certus asservit, referens in libro, qui de natura pueri inscribitur, tale feminis receptaculum de utero ejus ejectum, quam septimo post conceptum die gravidam intellexerat. Mulierem enim femine non effuso, ne grvida maneret, orantem, imperaverat salubus

CONSENTIENTIA.

tibus concitari; atque septimo die saltem septimum ejciendum cum tali folliculo, qualem supra retulimus, fuisse conceptum: Hæc Hippocrates.

A. G E L L I U S

Noël. Attic. III. 16.

Mense nonnunquam octavo editum esse partum M. Varro in lib. xiv. rerum divinarum scriptum reliquit. Quo in libro, undecimo mense aliquando nasci posse hominem dicit. Ejusque sententiæ, tam de viii. quam de xi. mense, Aristotelem laudat auctorem. Sed hujus de mense viii. dissensionis causa cognosci potest in libro Hippocratis, qui inscriptus est *de temporibus*; Ex quo libro verba hæc sunt: *ἔτι 3 ἢ 4 ἡμέρας ἀπὸ τῆς μήνης*. Id tam obscure, atque præcise, tamque adverse dictum Sabinus medicus, qui Hippocratem commodissime commentatus est, his verbis enarravit: *ἔτι 3 ἡμέρας ἢ 4 ἡμέρας ὅτι τὰς 3 ἢ 4 ἡμέρας ἀπὸ τῆς μήνης*. Id tam obscure, atque præcise, tamque adverse dictum Sabinus medicus, qui Hippocratem commodissime commentatus est, his verbis enarravit: *ἔτι 3 ἡμέρας ἢ 4 ἡμέρας ὅτι τὰς 3 ἢ 4 ἡμέρας ἀπὸ τῆς μήνης*.

Et postea.

Hippocrates autem in eo libro, de quo supra scripsi, cum & numerum dierum, quibus conceptum in utero coagulum conformatur, & tempus ipsius partitionis nono aut decimo mense definisset: neque id tamen semper eadem esse fini dixerit, sed alias ocus fieri, alias serius; hisce ad posterum verbis usus est: *ἢ ὅταν 3 ἢ 4 ἡμέρας ὅτι τὰς 3 ἢ 4 ἡμέρας ἀπὸ τῆς μήνης*. Quibus verbis significat, quod aliquando ocus fieret, non multo tamen fieri ocus: neque quod serius, multo serius.

CENSORINUS

de Die natali c. 6.

Nec Hippocrates Caus decimo partum posse fieri contendit.

I D E M cap. II.

Hippocrates quoque, alique medici in corporum valetudinibus non aliud ostendunt.

I D E M cap. 14.

Hippocrates medicus in septem gradus ætates distribuit: finem prima putavit vii. annum; secundæ xiv. tertiæ xxix. quartæ xxxv. quintæ xlii. sextæ lvi. septimæ novissimum annum vitæ humanæ. Solon autem partes fecit decem; & Hippocrates gradum tertium, & sextum, & septimum, singulos bisariam divisit, ut unamque ætatem annos haberet septenos.

JUS CANONICUM

III. Decret. ex Hieronymi ad-versus Iovinianum lib. II. diff. v. c. 29.
Notales.

Hippocrates in aphorismis docet, crassa, & obesa corpora, quæ crescendi mensuram compleverint, nisi cito ablatione sanguinis imminuantur, in paralyfin, & pessima morborum genera erumpere: & idcirco esse necessariam demptionem, ut rursus habeant, in quæ possint crescere; non enim manet in uno statu naturam corporum, sed aut crescere semper, aut decre-scere, nec posse vivere animal, nisi crescendo capax sit.

P A U L U S I^{us}

L. II. ff. de Statu hominum.

Septimo mense nasci perfectum partum, jam receptum est propter auctoritatem doctissimi viri Hippocratis; & ideo credendum est, cum, qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum filium esse.

U L P I A N U S I^{us}

L. 3. §. 12. ff. de Suis, & legit. her.

De eo autem, qui centesimo octogentesimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit, & D. Pius Pontificibus rescriptis, iusto tempore videri natum, nec videri in servitutem conceptum, cum mater ipsius ante centesimum octogentesimum secundum diem esset manumissa.

B A R T O L U S I^{us}

l. III. ff. Si certa per.

Scandum est libris Hippocratis tamquam authenticis.

CONSISTENTIA,

EX

G A L E N O.

G E N U S.

l. de Aristot. IV. 42.

VIDO VIDIO interprete:

HIPPOCRATES, quemadmodum & Cretas Cnidius cognatus ejus, genere Asclepiades erat.

CONSENTIENTIA.

l. de Villu in morb. etur. 11. 18.

JO. VASSÆO interprete.

Loquor autem de Hippocrate Heraclide filio, qui librum hunc confecit. Nam avus ipsius Gnoſidies filius Hippocrates, quorundam iudicio, nihil omnino ſcripſit.

l. 2. Præſcriptis. 111. 18.

JO. VASSÆO interprete.

Duo magni Hippocratis filii fuiſſe perhibentur, Draco, & Theſſalus: quorum utriuſque rurſum filius Hippocrates.

l. de Reſpir. diffi. 11. 18.

JANO CORNARIO interprete.

Quintus vero Epidemiorum non magis Hippocratis, Heraclide filii, ſed junioris filii Draconis eſt.

l. de Nat. hom. 1. 1.

VICT. TRINCAVELLIO interprete.

Theſſalus illius filius, vir & ipſe admirabilis: is tamen in patria non eſt, ut Polybus, diu moratus: Archelao etenim Macedoniæ regi adhaſit.

l. 111. Epidem. 11. init.

HERM. CRUSERIO interprete.

Erat ille Hippocratis filiorum clariffimus, Theſſalus nomine, qui exacte ſententiam patris eſt æmulatus.

PATRIA, HABITATIO.

l. de ſanit. tuenda 11. 7.

THO. LINACRO interprete.

Optime temperata eſt Hippocratis patria: etenim ea tum hyeme, tum æſtate medicorum temperiem exhibet.

l. de Articul. 1. 22.

VID. VIDIO interprete.

Eſt autem Smyrna urbs multo maior illa, cuius ubique meminit Hippocrates, ut qui plurimum in ea verſaretur.

in l. de Artic. 1. 23.

VID. VIDIO interprete.

Urbes, quarum meminit Hippocrates, ubi diutius egit, non plures incolunt, quam Romæ vicum unum.

Æ T A T I S,

ſeu ſæculi mos.

l. de Artic. 1. 22.

VID. VIDIO interprete.

Hippocratis ſæculo medici optime artis præcepta diſcebant, atque ea præſertim, quæ ad manus operam pertinent: ea nunc a medicis vel nullo modo addiſcuntur, vel cæte exiguo tempore ſpatio.

l. Quod opt. med. ſit philoſ.

LUD. BELLISARIO interprete.

Noſtræ ætatis medici ita ab ſtudio rationalis medicinæ averſi ſunt, ut eos etiam, qui in ea te operam conſumunt, quaſi inutilia tentantes, reprobant.

L I N G U A

l. de Humor. 1. 2. f.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Atticorum lingua Hippocrates aliqua ex parte utitur.

in l. de Fractur. 1. 1.

VID. VIDIO interprete.

Atticis enim hoc præſus eſt uſitatum, quorum linguam Hippocrates aliquantum uſurpat, ita ne ejus ſermo a nonnullis priſcus Atticus exiſtimeretur. Nos autem in alio parvo libello, quid de ſermone Hippocratis iudicemus, ſecurum demonſtravimus.

P H R A S I S

in l. 111. Epidem. 111. 32.

HERM. CRUSERIO interprete.

Non eſt Hippocratis inſtitutum, inuſitatis, & infrequentibus uti nominibus.

ibidem, initio.

Etenim Hippocrates, cuius etiam Apolloniſmos eſſe, & Præſagia autumant, uſitatiffimis eſſe uſus, & proinde claris vocabulis videtur, quæ vocare rethorici civilia ſolent.

l. Expoſ. obſolet. voc. Hipp.

MARIO NIZOLIO interprete.

Sic & Hippocrates ex nominibus, quæ uſitata non ſunt, aliqua aſſumit, aliqua & ipſe facit, aliqua autem novis adjunctis ſententiis mutat.

in l.

CONSENTIENTIA:

in l. de Offic. med. 11. 23.

VID. VIDIO interprete.

Quod ab Hippocrate effertur, præcise dicitur, nisi quod aliud subintelligitur.

in lib. Aphor. VII. 63.

NIC. LEONICENO interprete.

Dicta Hippocratis exquisita sunt.

in l. de Artic. 1. 69.

VID. VIDIO interprete.

Solet Hippocrates quasdam figuras, ac linguarum proprietates usurpare, quamvis consuetam locutionem sequatur.

in l. Aphor. VI. 58.

NIC. LEONICENO interprete.

Commune huic cum aliis ab Hippocrate dictis, ut perpetuum quiddam ex figura dictionis ostendatur, quamvis res ipsæ non semper eodem modo eveniant; sed, licet raro, interdum etiam aliter eveniant.

l. de Comate cap. 3.

AUG. GADALDINO interprete.

Somnolentia tentabo distinguere, ut possis invenire dictam ab Hippocrate differentiam. Non enim vir iste erat eorum, qui vane imponunt nomina; neque stulte adiecit cataphoræ, pigra: neque dicit, sicut Homerus, lac album, sed unumquodque vocabulum, & syllaba omnis rem aliquam significat apud eum.

in lib. de Vitis. acut. IV. 67.

JO. VASSÆO interprete.

Dictio, quæ symptomatum multorum, quæ non in omni agro coeunt, & conveniunt, complicationem habet, utilis est; cum doctrina ab universalibus recipiat commoditatem: quo Hippocrates modo facere consuevit.

in lib. de Vitis. acut. IV. 10.

JO. VASSÆO interprete.

Legitimi appellationem secundum morborum ideas inferre consueverunt cum alii medicorum probatissimi, tum Hippocrates ipse.

SCRIBENDI MOS

in l. VI. Epid. 1. 3. f.

JUN. CRASSO interprete.

Hippocrates sibi ipsi, ut memoria subveniret, nonnulla scripsit, prout unumquodque aut experientia comprehendisset, aut rationali meditatione excogitasset.

in l. 1. Epid. 37.

HERM. CRUSERIO interprete.

Solet Hippocrates frequenter antedicta in summam colligere.

in l. de humor. 1. 7.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Hippocrates omnibus in locis adferre demonstrationes conatur.

in l. de Nat. hum. 1. 9.

VICT. TRINCAVELLIO interprete.

Semper sane Hippocrates ea sectatur, quæ evidentia sunt.

in lib. de Nat. hum. 11. 7.

VICT. TRINCAVELLIO interprete.

Hippocratem videmus non modo omnia adamussim in commentarios retulisse, quæ cunctis plane conspicua sunt, verum etiam ea, quæ ad videndum sunt difficiliora.

l. de diffie. Respir. 11. 8.

JANO CORNARIO interprete.

Hippocrates nihil eorum, quæ etiam aliis manifeste cognoscuntur, scribit.

l. de Dieb. decret. 11. 13.

JO. GUINThERIO interprete.

Hippocrates aliquando solum id, quod creberrime oculis usurpatum est, nihil faciens, id quod raro evenit, pronunciat.

l. de Venas. abstr. Erasistraton, c. 4.

JOS. TECTANDRO interprete.

Hippocrates cum in plurimis suis operibus brevitati summopere studeat, tamen quod ad venæ sectionem attinet, non est gravatus scribere, tum partem corporis, in qua secari vas oporteat, tum evacuationis mensuram, una cum occasione ipsa.

l. de

CONSENTIENTIA.

l. de Offic. med. 111. 8.

VIDO VIDIO interprete.

Hippocratis mos est, ex unius, vel alterius rei exemplo res universas complecti, quum id, quod proponitur evidenter antecellit ea, quæ sunt ejusdem generis, sic ut ex ipso intelligantur.

l. de Elem. 1. 3.

VICT. TRINCAVELLIO interprete.

Hippocrates si aliquando unum quippiam ex eorum numero proferat, quæ eandem naturam continent, reliqua deinde, quæ eandem vim habent, nobis ad rationem addenda relinquit.

l. 1. Prætor. 111. 7.

JOH. VASSÆO interprete.

Medicinalis speculationis doctrina ab Hippocrate in legitimis omnibus libris per universalia facta est, expromente etiam aliquando particularia quedam, gratia exempli, ad eorum, quidvisent, perspicuitatem.

l. Aphorif. vi. 25.

NIC. LEONICENO interprete.

Videtur Hippocrates dixisse multa veluti exempla sermonum universalium, a quibus ejus, quod solet evenire, experientiam possumus habere manifestiorem. Talia etenim exempla oportet esse.

l. de Diff. resp. 11. 8.

JANO CORNARIO interprete.

Hippocrates, quum consuetæ species symptomatum extiterint, tunc sane solo universalis morbi nomine contentus est, quum vero aliquid ex variis incidit, post universalem & communem totius morbi appellationem, statim illud ipsum discriminat.

l. de Fractur. 11. 71.

VIDO VIDIO interprete.

Solet Hippocrates, ubi de una specie pertractat, complura docere ex iis, quæ communia sunt, ac generalia, monens ea non esse propria unius speciei, sed ad omnes, vel multas, vel aliquot pertinere.

l. de Artis. 11. 35.

VIDO VIDIO interprete.

Consuetudo ex Hippocratis in iis præceptis, quæ singulis communia sunt, eum semel unius mentionem facit, exponere vim rei communem esse omnium similium.

l. de Diff. resp. 11. 7.

JANO CORNARIO interprete.

Existimant veteres, omnia quæ agris contingunt, Hippocratem conferbere, velut Thucydidem: verum res non ita habet, sed hoc ipsum est, in quo vel maxime contraria sunt Hippocratis, & Thucydidis scripta. Thucydides enim omnia scribit, etiam idiotis nota, nihil ipsorum penitus prætermittens. Hippocrates vero pauca ex iis, quæ ad totam affectionem pertinent, circa quam agrotus est periclitatus; multa vero alia ab idiotis quidem neglecta, artificiosam vero, & exactam cognitionem exhibentia, & quæ optimos medicos sæpe latere possunt.

Et mor.

Thucydides quidem, quæ circa agrôs contingunt, velut idiota idiotis conscripfit; Hippocrates vero ut artifex artificibus.

in l. de Piliu. acut. 11. 18.

JOH. VASSÆO interprete.

Medicos eulpat Hippocrates, qui languentes ipsos in absoluta ciborum abstinentia servant; non ramen mentionem eorum facit, qui cibos validiores ante morbi conceptionem ministrant. Consuevit siquidem interdum, prætermittis, quæ maxima sunt, erratis, culpæ minora; & eam quæ ex illis oritur, demonstrare offensam.

l. de Diff. resp. 11. 8.

JANO CORNARIO interprete.

Hippocrates, eum breviloquus sit, hunc morem habet, ut ad unum nomen, & eapud partialia semper reducat. Neque verisimile eum in presenti fortuito scribere, qui haud unum aliquod temere scribat.

DOCTRINA.

in l. de Alim. 111. 21.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Hippocrates cum in aliis rebus omnibus ornandus est laudibus, tum vel maxime in hoc, quod censet, usque eo progredi medicum oportere, quousque pervenire ipsius ars potest.

in l.

CONSENTIENTIA.

in l. de Pich. aut. l. 17.

JOH. VASSÆO interprete.

Ob id iuste venit laudandus Hippocrates, qui de sola secundum rei veritatem meminir controversia, quam, quialiquam constituere artem volunt, patiuntur, cum secum, suoque in animo differenter opinantur, & non verbo tenus simulate, ac subdole id agunt, ob gloriæ, vel lucri cupiditatem.

in lib. de Humor. l. 7.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Hippocrates, vir admirabilis, multa potius experientia, quam ratione videtur cognovisse.

in l. de Aric. l. 3.

VIDO VIDIO interprete.

Hippocrates, cum quid nunquam vidit, commentitias causas scribendas esse minime credidit, ubique magis fide dignum existimans, quod evidenter apparet, quam quod a ratione ducitur. Sic &, quæcunque ipse ad curationem excogitavit, priusquam nos doceat, experimento comprobavit, non, sicut nonnulli ex junioribus medicis, qui in scriptis de ratione medendi nobis ea imperarunt, quæ ipsi nunquam ante sunt experti.

in l. Prorrh. III. 33.

Videtur Hippocrates ex multa experientia, quam ex particularibus sibi fecit, universalia collegisse.

l. de Dieb. decret. II. 14.

JO. GUINTHERIO interprete.

Hippocrates non ratione quadam persuasus decimum septimum decretorium esse statuit, vicesimo autem primo efficaciam admittit, sed usu, & experientia doctus.

in l. Aph. l. 15.

NIC. LEONICENO interprete.

Verum est, quod quidam hyeme non modo melius concoquant cibum, sed etiam quod pauca assumentes refrigerantur, atque ideo offenduntur: si vero plura assumerint, in nullo plethoricos morbos incidere, ipse eventus ostendit manifeste. Cuius causæ inquisitio enim omnes fatiget, tu animadvertes, numquid hac in parte alius quidem omnibus ratio sit inexplicabilis, soli vero Hippocrati, atque ejus sectatoribus explicabilis.

Hipp. Opera.

INVENTA.

in l. de Humor. II. 30.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Hippocrates omnium bonorum inventor.

l. de Crisib. III. 11.

NIC. LEONICENO interprete.

Hippocrates nobis omnium fuit dux, atque autor optimarum disciplinarum.

l. Quod Animi mor. 7. f.

JUN. PAUL. CRASSO interprete.

Sed ad divinum Hippocratem medicorum omnium, philosophorumque primum humane contemplationis inventorem accedere licet.

in l. de Humorib. l. 1.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Hippocrates princeps omnium eorum, quorum nomen fama ad nos pertulit, principia demonstrationum, quibus postea Aristoteles usus est, ipse prior monumentis mandavit literarum.

in l. Aphorist. IV. 76.

NIC. LEONICENO interprete.

In his itaque, sicuti & in aliis, Hippocrates dignus est admiratione, cum ipse eorum inventor existerit, quæ ne pluribus quidem medicis ad hunc usque diem fuere compta.

l. de Arte cur. ad Glauc. l.

NIC. LEONICENO interprete.

Artifex plus aliquid, quam ii, qui arte carent assequitur. Quid vero hoc ipsum plus sit, primus omnium quos novimus, & hoc memoravit Hippocrates.

l. de Dieb. decret. II. 3.

JO. GUINT. ANDERNACO interprete.

Pulchrum omne, & ordinatum, & artificiosum ex supernis innasci, inordinatum contra, & erraticum ex materia, quæ hic versatur, provenire, primus omnium, quorum memoria ad nos pervenit, græcorum Hippocrates credidit, post eum philosophum præcipui.

CONSENTIENTIA.

l. de Elem. 1. 9.

VICT. TRINCAVELLIO interprete.

Primus profecto omnium Hippocrates videtur naturæ rerum omnium elementa excogitasse, atque, quantum satis esse possit, demonstrasse.

l. de Nat. facult. 1. 2.

THO. LINACRO interprete.

Hippocrates primus omnium tum medicorum, tum philosophorum, quorum utique fama ad nos pervenit, demonstrare tenuit, quatuor esse omnes, quæ mutuo in se agerent, qualitates: a quibus quæ genitum, interitumque agnoscent, omnia gignantur, ac permantur. Quæ etiam miseri eas munio totas per totas, primus omnium, quorum fama ad nos percrebuit, Hippocrates novit: principiaque demonstrationum, quas Aristoteles postea pertraxit, scripta apud eum priorem inveniat.

in l. de Alim. 111. 22.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Hippocrates ut qui primus Naturæ opera novit, hanc admittat, & perpetuo prædicat, & iustam nominat, & solam animalibus ad omnia sufficere dicit, & ipsam ex se sine doctore, quæ opus sunt, efficere.

l. Meth. med. 1. 2.

THO. LINACRO interprete.

Audisti Platonem simili methodo Animæ naturam inveniri debere esse censere, quæ corporis naturam Hippocrates. An adhuc vis, multas hominis dictiones ex multis librorum eius locis deligam, in quibus ille Hippocratem omnium, qui ante se fuerunt, maxime admiratur?

l. Quod an, moris. c. 8. f.

JUN. PAULO CRASSO interprete.

Hippocrates primus consuetudini, quæ possent crederetur, initium dedit, omnium, quisquis esset, arteriarum motum, pulsum nominans.

l. de Fibriis fuit. c. 1.

JOH. BERN. FELICIANO interprete.

Hippocrates primus omnium, quos scimus, de Formatione sæculum vera conscripsit, non ratione tantum nixis opinionibus questionem hanc persequens, sed sensui expostis evidentiis, atque his non paucis.

l. de Decr. Hipp. & Plat. VIII. 1.

JO. BERN. FELICIANO interprete.

Et Hippocrates, & Erasistratus, Eudæmus, Herophilus, Marinus, omnes post veterum memoriam dissectorum speculationem, negligentia posteritatis interlapsum, pro se quodque restituerunt.

l. de Præcep. ad Paph. c. 1.

JUL. MART. ROTA interprete.

Præcognoscendi ars ab antiquorum multis, & in primis ab Hippocrate, qui nobis bonorum omnium auctor existit, conscripta est.

l. de Theriac. ad Paph. c. 4.

JUL. MART. ROTA interprete.

Magistrum Hippocratem exactissimam medicinarum, ut reliquorum omnium, artificem fuisse, molea probant.

in l. VI. Epidem. VIII. 1.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Quemadmodum Hippocrates bonorum omnium, quæ ad faciendam medicinam, quæque ad morbos cognoscendos, & causas indagandas pertinent, omniumque, quibus ad tuendam sanitatem opus est, & ad recuperandam eam, quæ jam perditæ sit, inventor fuit: ita eum ipse princeps fuit, quem victus rationem recte instruisse cognovimus.

l. de Hipp. & Plat. decr. IX. 6.

JO. BERN. FELICIANO interprete.

Atque has utraque methodos ex omnibus veteribus medicis, & philosophis pulcherrime, atque optime Hippocrates, & Plato invenerunt, multaque opera ab auctoribus, qui communia a propriis distinguere nesciebant, falso fuisse conscripta, demonstrarunt.

l. de Tempor. II. 14.

THO. LINACRO interprete.

Sane ejusmodi signorum auctor, æque ut reliquorum omnium, mirus est Hippocrates.

in l. III. Epid. 1. 8.

HERM. CRUSERIO interprete.

Omnium, quæ ad prædictionem, princeps est divinus ille Hippocrates.

CONSENTIENTIA.

in *L. Prognost.* III. 1.

LAUR. LAURENTIANO interprete.

Ceterum cognovit non primus solum, sed etiam maxime, admirandus Hippocrates decretorium dierum naturam.

L. de Dieb. decret. I. 2.

JO. GUINT. ANDERNACO interprete.

Cum igitur non solum mihi, tot annis observanti, huiusmodi quedam dierum differentia, sed Archigeni etiam in artis operibus diligenter admodum versato, inventa sit: insuper hoc superiori Tarentino Heraclidi, qui experientia speculationem collegit, postremo etiam Philotimo, & Diocli, aliisque veteribus; tum ante hos universos Hippocrati divinissimo: quomodo non quis iure in dierum numero differentiam quandam statuatur?

in *L. Prognost.* III. 69.

JO. VASSÆO interprete.

Hippocrates quantum superiores suos in virium cujuslibet simplicis medicamenti inventionem superaverit, in omnibus suis libris demonstratum est.

L. de Comp. a. prim. IV. 5.

JO. ANDERNACO interprete.

Rite fasciandi primus, quorum ad nos memoria pervenit Hippocrates inventor extitit, quam in ea omnes ante ipsum peccarent.

L. Meth. med. VII. 2.

THO. LINACRO interprete.

Cum ab Hippocrate discessetis, qui nobis omnium salutarium praeceptorum fœmina præbuit, reliquorum certe nemo vel conatus est methodo curare. Postulant atque, quæ ipse Hippocrates reliquit, non malos agricolas, qui ea tum seminant commodè, tum augeant, tum perficiant.

L. Meth. med. IX. 8.

THO. LINACRO interprete.

Hippocrates omnem ad medicationem viam aperuisse videtur, sed ita ut ea curam, & diligentiam ad absolutionem desideret.

L. de Atra bile c. I.

BART. SYLVANIO interprete.

Hippocrates primus id, quod ad artis officia pertinet, prodidit.

L. Meth. med. v. 10.

THO. LINACRO interprete.

Omnium methodorum nobis auctor Hippocrates.

L. Meth. med. IV. 6.

THO. LINACRO interprete.

Hippocrates omnium, quos novimus, primus indicationem adinvenit.

L. Meth. med. XI. 15.

THO. LINACRO interprete.

Hippocrates ab ipsa rei natura idoneum curationis modum invenit.

L. Meth. med. v. 3.

THO. LINACRO interprete.

Nam & hæc, derivatio, & revulsio scilicet, Hippocratis quoque inventa sunt, omnis scilicet immodicæ vacationis communia remedia.

L. de Comp. a. v. v. VI. 5.

JANO CORNARIO interprete.

Omnia enim respectu ad aliquid, tum emolumentum, tum detrimentum in se habent. Quod ipsum etiam cum Hippocrates dixerit primus omnium, quos seiam, ii, qui post ipsum fuerunt, insequuti sunt.

L. de Resp. diff. II. 1.

JANO CORNARIO interprete.

Hippocratem inventorem, ac veluti patrem dogmatum venerabimur. Hoc est enim iustum, simulque decens præmium eorum, qui quodcumque tandem in vita bonum invenerunt, ut videlicet inventa ipsorum non occultentur, neque hominibus sint ignota, sed tum ipsa appareant, tum ratio, & methodus, quæ ipsa invenit, cognoscatur. Sic enim & pro dignitate ipsos in admiratione constitui contingeret.

CONSENTIENTIA.

DILIGENTIA.

in l. de Alim. III. 25.

JO. BAPT. RASARIO interprete,

Hoc autem non omnes medici norunt; cum tamen Hippocrates & hoc ipsum, & alia multa perspicue docuerit,

l. de Nat. hom. II. 7.

Hippocratem videmus non modo omnia adamussim in commentarios retulisse, quæ cunctis plane perspicua sunt, verum etiam ea, quæ ad videndum sunt difficiliora.

l. de Dich. decret. II. 13.

JO. GUINT, ANDERNAÇO interprete,

Si quid optime dividi potest, Hippocrates præter ceteros hoc mihi fecisse videtur,

l. de Natur. fac. II. 8.

THO. LINACRO interprete,

De succorum generatione, haud scio, an aliquis exactius quicquam asserre in medium possit iis, quæ Hippocrates, Aristoteles, Praxagoras, Philorimus, alique veterum non pauci reliquerunt,

in l. 1. Provrb. II. 40.

JOH. VASSÆO interprete,

In agris utilissimum est omnia contemplari; nihique prætermittere: quod utrumque fecit Hippocrates,

l. de Resp. diff. II. 3.

JANO CORNARIO interprete,

Apparet enim Hippocrates confessione, ac suffragio omnium medicorum, ad eorum, quæ agris accidunt, observationem diligentissimus fuisse,

in l. de Humor. I. 12.

JO. BAPT. RASARIO interprete,

Hippocratis diligentiam tum in aliis rebus omnibus, tum vel maxime in eo commendo, quod scopum eum, qui non in uno, alterove morbo solum, sed in omnibus ad purgationem indicandum præter ceteris, non omiserit.

l. Aetib. med. IV. 6.

THO. LINACRO interprete,

Hippocratem sane diligentiam nomine admiror, cum in aliis omnibus, cum vero

quod scopum, qui medico ad indicationem, non in uno, alterove, sed prorsus omni morbo sit spectandus, non omiserit.

l. de Decr. Hipp. & Plat. IX. 2.

JO. BERN. FELICIANO interprete,

Hippocrates, & Plato exempla nobis & ad artes, & ad omnes vitæ actiones utilia tradidere,

l. de Atro bile c. 7.

BARTHOL. SYLVANIO interprete,

Hippocrates ergo vir quidam honestus bonique videtur fuisse, non honoris, aut gloriæ, sed veritatis amator,

L. A U S,

l. de Hipp. & Plat. decr. IX. 5.

JO. BERN. FELICIANO interprete,

Diocles, Hippocrates, Empedocles, alique quamplures ex veteribus, laudantate, & benignitate hominibus medebantur,

l. de Subst. empir. 13.

INCERTO interprete,

His enim officiis Hippocrates omnium posteriorum iudicio Esculapii gloriam adeptus est.

l. Defto. medic. c. 1.

BARTHOL. SYLVANIO interprete,

Veteres quidem, quique ante Hippocratem fuere, in quorum nos volumina incidimus, nec aliqua finiverunt, quæ ad artem pertineant, nec libros complures, sed paucos admodum reliquere. His igitur iure laus debetur, quod animum applicuerint primi, ac vitæ emolumentum aliquod invenire studuerint. Post hos vero exortus Hippocrates medicinam literis prodidit: ille nimirum, qui semper honorum auctor, ac princeps fuit,

l. de Decr. Hipp. & Plat. III. 4.

JO. BERN. FELICIANO interprete,

Hippocrates consensu omnium medicorum facile princeps.

in l. de Fract. I. 1.

VIDO VIDIO interprete,

Magnus Hippocrates maximus inter Græcos habitus est auctor, & medicus,

l. de

CONSENTIENTIA.

l. de Subfig. empir. c. 13.

INCERTO interprete.

Maximus artis medicæ exornator Hippocrates.

l. de Semine 1. 9.

JOH. BERN. FELICIANO interprete.

Hippocrates in omnibus admirabilis.

l. ad Thrasyl. c. 47.

JUN. PAULO CRASSO interprete.

Hippocrates, & Diocles, Praxagoras, Philotimus, atque Herophilus totam corporis præsidem artem, ut ipsorum testantur volumina, callebant.

l. de Diab. decret. 1. 3.

JO. GUINTHERIO interprete.

Hippocrates, vir verax.

l. de Nat. fac. 1. 13.

THO. LINACRO interprete.

Dogmata Hippocratis recta, veraque sunt.

in l. de Fiftu acut. 1. 44.

JO. VASSÆO interprete.

Omnia Hippocratis dogmata verissima sunt.

l. Aetib. med. III. 2.

THO. LINACRO interprete.

Nosti quam longo tempore aphon. xxxi. lib. vi. consideraverim, quamque ex reliqua Hippocratis diligentia speraverim, ne in hoc quidem vel falsum quippiam, vel quod fieri non possit, præcipi idque fuisse quod me ad inquisitionem incitavit, quoad ipsa Hippocratis insitens via, invenit.

l. de Amabile c. 3.

BARTH. SYLVANIO interprete.

Qui in artis operibus versatus est, vera dicere Hippocratem affirmabit.

l. de Subfig. empir. 10.

INCERTO interprete.

Si Hippocratem, & Andream conferas, illum peritissimum, & studiosissimum veritatis invenies, huic eandem, & temerarium, proflusque ab Hippocratis gravitate alienum.

l. Aetib. med. IV. 4.

THO. LINACRO interprete.

Empirici nec antiquis maledicunt, nec Hippocratem pro nihilo habent; immovet ipsum laudant, sereque omnia vere dixisse affirmant.

l. de Diff. respir. 1. 4.

JANO CORNARIO interprete.

Etiā in hac parte, quæ ad respiratorium notitiam spectat, longe reliquos omnes Hippocrates antecellit.

SECTA.

l. Medicus, sive Ifag. c. 4.

JO. ANDERNACO interprete.

Rationalis sectæ auctor Hippocrates Causus fuit, qui & princeps sectæ exitit, & primus constituit rationalem sectam.

l. Quod opt. med. fit philos.

LUD. BELLISARIO interprete.

Quod per genera speciesque ignota sit morborum divisio; idcirco medicis a curandi scopis errare contingat, animadvertit Hippocrates, cum nos ad rationalem contemplationem adhortatur.

in l. de Artic. III. 28.

VID. VIDIO interprete.

In quo Empiricorum impudentiam cognosces, qui audent Hippocratem appellare empiricum. Fuit enim omnium, qui medicinam exercuerunt, maxime experientis, maximèque experimentorum spectator, iisque omnia comprobavit, quæ multis fretus rationalibus argumentis invenit: potissimumque rationi corporum incidendorum operam dedit, ut quæ mirum in modum ad artem conferat.

in l. de Fift. acut. III. 62.

JO. VASSÆO interprete.

Quæ medicum, ait Hippocrates, antea animadvertisse, agro non referente, oportet, plurima sunt. Hæc, qui Hippocratem dogmaticum esse putant, locos affectos esse dixerunt, & affectiones ipsas, & causas. Sed qui Hippocratem empiricum esse existimant, anni tempora esse, regiones, ætates, & ambientis nos aeris condiciones affirmant.

in lib.

CONSENTIENTIA.

in lib. de Offic. med. l. 4.

VID. VIDIO interprete.

Nonnullis placet, ex opinionibus, quas videntur sectarum auctores invenisse, nullam esse novam, sed quæ priori seculo tradita fuerunt, una cum aliorum mente interuisse. Si quis in opinione ad res ipsas animum advertat, neque Pyrrhonis sectam, neque Academicam, Stoicam, Peripateticam, nec quamvis aliam, post Hippocratem summissis initium judicabit, quum Pyrrhonii ad veritissimos auctores suam referant sectam. Quocirca verisimile est, vel adeo non verisimile, sed necessarium, Hippocratis seculo de naturalibus judicandi potentis disceptatum esse, & quosdam nullam talem posuisse, quemadmodum postea Pyrrhonii; quosdam sensum duntaxat; alios nihil huic tribuentes, id vetum putasse, quod vulgatum est. Mens videt, mens audit, cetera surda sunt, & cœca: alios utramque dedisse judicandi potentiam, sensum in iis, quæ sensibus subjiciuntur, mentem in iis, quæ comprehenduntur intelligentia: quosdam alias animi nostri potentias conceperisse. Hippocrates igitur, ut eorum vicaret importunitatem, generatim duarum potentiarum meminit, sensus, & mentis; quas solas in nobis docet cognoscendi, ac judicandi vim habere.

AUTORITAS.

L. de Atra bile c. 7.

BARTHOL. SYLVANIO interprete.

Hippocrate posteriores insatiabiliter immeritæ gloriæ libidine vexati, contradictionibus adversus se vetustiores adductis, proprias sectas pravas conficuerunt.

in L. de Pittu acut. l. 44.

JO. VASSÆO interprete.

At potius culpa eos, qui, cum ea, quæ ab Hippocrate bene præcepta sunt, elaborare, & consicere deberent, laudis appetentia ducti sectam aliam constituunt. Verum nos, qui veritatem honoramus, laudamus Hippocratem cum in ceteris omnibus; tum quod in unoquoque operè proprium scopum ita docuerit, ut huic attentis omnino quispian definitur certamque inventionis auxiliorum habeat viam.

L. An anim. quod in ur. c. 3.

HOR. LIMANO interprete.

Hippocrates antiquus est.

l. Asteth. med. l. 2.

THO. LINACRO interprete.

Si Stoicis philosophis in confessum admissis judicium permittetur, ex iis placitis, quæ ipsimet statuunt, Hippocrati palmam dabunt.

Ibidem paulo post.

Quare Platonis, & Peripateticorum, & Stoicorum judicio, Hippocratis physiologiæ victoria dabitur.

Et max.

Quid si Geometris, Astronomis, Musicis, aut Rhetoribus judicium concedet, putemusne hos, Hippocrate prætermisso, ulli alii palmam daturus?

in L. Prognost. III. 2.

LAURENT. LAURENTIANO interprete.

Quæcumque arti utilia ab Hippocrate didicisse oportet.

L. de Diet. decr. II. 1.

JO. GUINTHERIO interprete.

Hippocrates, vir ut ceteris fide dignior, ita omnium consensu decernendi peritissimus.

L. de Usu part. l. 9.

Hippocratis dictio velut Dei vox est.

L. de Diet. decr. III. 12.

Nihil quicquam ab Hippocrate frustra scriptum invenio.

L. de Diet. Hipp. & Plat. VIII. 5.

JO. GUINTERIO interprete.

Quod sane pituita alba appareat, eo quod in generatione ipsius exigua multa bullæ excitantur, Hippocrates dicere ausus non est, ceu quid ulteriori contemplationis, quam ad artem medicam pertineat.

L. de Respir. diff. II. 1.

JANO CORNARIO interprete.

Ne quis Hippocrati famæ, ac nomini honore habito sectatur, ac citius dictis fidem præbeat priusquam per demonstrationes cogatur.

in L. Epidem. III. 7.

Neque Hippocrati decet diffidere (præferent enim oculis arbitrata hæc conscribere) neque mentiri convenit, dicereque etiam

CONSENTIENTIA.

jam se se vidisse. Quare observandum nobis est sedulo, & experientia de veritate existimandum.

l. Quod animi mor. c. 9.

JUN. CRASSO interprete.

Hippocrates testis sane fide dignus, atque gravissimus est, si quicumque testibus, ut nonnullis mos est, decretorum suorum veritatem asserat. At ego viro huic non tamquam testi, ut plerique assolens, sed quoniam ejus rationes firmas invenio, idcirco fidem adhibeo, eumque laudo.

l. contra Julian. c. 5.

JUL. ALEXANDRINO interprete.

Hippocrati, præter optimos medicos, philosophorum etiam optimi consentiunt.

l. de Usu part. 1. 8.

Imitator, si quis alius unquam, Hippocratis Plato fuit, & ab illo dogmata mutuatus est maxima.

l. de Deer. Hipp. & Plat. VIII. 5.

JO. BERN. FELICIANO interprete.

Neque solus Plato, sed & Aristoteles, & Theophrastus, alique cum Platonis, tum Aristotelis discipuli Hippocratis de Homoribus rationem æmulati sunt. Quin etiam ex medicis gravissimi quique, Diocles, Plifionicus, Mnesicheus, Praxagoras, Herophilus.

lib. Meth. med. c. 2.

THO. LINACRO interprete.

Rationum Hippocratis de natura Aristoteles interpret est.

in l. de Alim. III. 22.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Si quis in Aristotelis, ac Theophrasti libris sit versatus, is ceu commentarios physiologie Hippocratis illos conscriptos esse, arbitrabitur.

l. de Nat. fient. II. 4.

THO. LINACRO interprete.

Hæc omnia, atque etiam alia quamplurima, tum de prædictis facultatibus, tum de morborum generatione, tum remedium inventionem Hippocrates, omnium post hominum memoriam primus recte dixit: Aristoteles post eum recte est interpretatus.

l. Meth. med. 1. 2.

THO. LINACRO interprete.

Testis cæteris Peripateticus, qui & ipse Hippocratis Physiologie principia confirmat.

l. Quod opt. med. initio.

REN. CHARTERIO interprete.

Quod moris patiuntur Athletarum plerique, cupientes quidem Olympiorum victores evadere, nihil autem moliri, quo id consequantur studentes, idem & multis medicis accidit. Nam Hippocratem quo dem laudant, ac omnium principem existimant; ut autem fiant illi inter similes, ipsi omnia potius, quam id agunt.

IMITATIO.

l. Quod opt. med. sit philos. f.

LUD. BELLISARIO interprete.

Certe nos primum studium debemus in philosophis consumere, si veri Hippocratis æmuli esse volumus. Quod si fecerimus, nihil impediet, quo minus eo melificiamur, nedum similes, si, cogatis iis, quæ ab illo bene dicta sunt, cetera, quæ aut defunt, ipsi inveniamus.

in l. de Pissu acut. 1. 17.

JOH. VASSÆO interprete:

Nam quæ ab Hippocrate scripta sunt, etiam prudentibus viris, qui vere artem constitutere student, repetiri possunt.

l. de Tot. morb. temp. c. 8.

JO. GUINTERIO interprete.

Præstat vero artem Hippocratis excolere, quod nemo prope factitavit.

l. de Usu part. 1. 8.

NIC. RHEGINO interprete.

Tur itaque Plato (præsertim cum Hippocratis imitator, si quis alius unquam fuerit, & ab illo dogmata mutuatus sit maxima) tam negligenter de linguarum utilitate locutus est?

CONTRADICTA, & DEFENSA.

CONTRADICTA,

E T

DEFENSA.

ARISTOPHANES *Nobilis.*

JO. ANT. VAND. LINDEN, interpre.

TE filiis Hippocratis
similem, blitum vocant iners.

E U P O L I S *is aequi*

citante Schol. Aristoph. ibi.

JO. ANT. VAND. LIND. interprete.

Hippocratis fuere filii nothi,
Soboles infusa, nullius frugi bonae.

Etymologicon in Zint.

Sues Hippocratis filios dicunt, cum Pa-
natio, & Memnone suillum ingenium ca-
villantes.

A T H E N Æ U S.

Deipnos. III. 17.

ISAC. CASAUBONO interprete.

Deinceps illata est vulva, metropolis re-
vera, & mater filiorum Hippocratis, quos
propter ingenium suillum scio esse Comicis
utros.

G A L E N U S.

I. Quod an, mores c. 4.

JO. GUINT. ANDERNACO interprete.

Hippocratis autem filii ob calorem im-
modicum stulti Comicorum fabulis riden-
tur.

I. adv. Locum, initio.

JUL. ALBXANDRINO interprete.

Qui Hippocratem accensare, aut pro eo
respondere vult, priusquam facit, exerce-
ri eum oportet in sententia senis.

I. de Elem. I. 9.

VICT. TRINCAVELLIO interprete.

Hippocrates solita antiquorum brevitate
utitur.

I. de Usu part. I. 9.

NIC. RHEGINO interprete.

Multa Hippocrates verbis paucis eos do-
cet, qui ipsius dicta assequi possunt.

I. de Crisib. III. 11.

NIC. LEONICENO interprete.

Multi priscam breviterat assequi mi-
nime consuevi, quaedam deficere arbitran-
tur.

I. de Fractur. III. 4.

VID. VIDIO interprete.

Brevitatis Hippocratis proprium est, id,
quod in propositio sermone desideratur, a-
perite ex eo, quod subjicitur, indicare.

I. de Resp. diff. III. 5.

JANO CORNARIO interprete.

Quae est igitur via facultatis? oportet
enim inde initium sumere. Una quidem
communis illa omnibus veteribus familia-
ris brevitudo. Altera vero peculiaris
illa Hippocratis animi altitudo. Monstra-
rum enim nobis est, quam gravis sit saepe
numero hic vir, ut qui ea, quae aliis
medicis nota sunt, praeterat, velut quae
a nemine eorum, qui artem exercent, ig-
norari queant: quae vero talibus ignota
sunt, omnia diligenter, simulque perspi-
cie exponat.

in I. de Artic. IV. 16.

VID. VIDIO interprete.

Iis, qui haec requirunt, respondendum
est, Hippocratem eo tantum intendere, ut
propositam rem exprimat, quod & ipse
Plato faciendum nobis praecipit.

I. de Elem. II. 3.

VICT. TRINCAVELLIO interprete.

Orazio Hippocratis brevis, & concisa
est, quia id, quod evidenter apparet, abs-
que ulla probatione scripsit, haud suspica-
tus fore, qui haec ignoraret, aut negaret.

I. de Purg. facul. c. 5.

JUL. MART. ROTA interprete.

Sunt, qui omnia potius, quam verba
Hippocratis, vera esse voluit.

CONTRADICTA, & DEFENSA.

l. de diff. resp. l. 4.

Sententiam Hippocratis exponere, ac veritatis, quæ in ea est, certitudinem iis, qui in nostra inciderint, exhibere multo melius est, quam præoccupare tempus existimationi, ac famæ venerandi senis.

l. de Suc. bon. & mal. c. 1.

JUL. ALEXANDRINO interprete.

Eorum qui ab Hippocratica doctrina deservire, apud me nonnulli clam confessi sunt, manifesto se quidem cernere cupiditatem contendendi adversus Hippocratem, interim pudore affici, si post quinquagesimum denum annum ad Hippocratem desiciant.

in l. Aph. v. 64.

NIC. LEONICENO interprete.

Non simpliciter, neque semper servare breviter videtur Hippocrates, sed in quibus magnum aliquod periculum imminet, si negligentius, quod ab ipso docetur, accipitur, in his bis terrepere eadem non veretur.

l. Meth. med. ix. 8.

THO. LINACRO interprete.

Hippocrates, seu primus inventor, nec debitum omnibus ordinem dedit, nec cuiusque indicationis dignitatem ad unguem finivit, & quasdam in ipsis discretionibus omisit, obscureque plurima pro analogia dicendi brevitate est interpretatus.

in l. de Piss. acut. l. 36.

JO. VASSÆO interprete.

Fieri nequit, ut uno libro omnia admodum pertinentia, bene scriberet Hippocrates, atque ordine doceret, præcipue cum ipse primas harum inventionem sit molitus.

in l. de Off. med. l. 10.

VID. VIDIO interprete.

Hippocrates breviter loquitur, quum quid existimat eydeps futurum, si qui id ipsum invenire studeant. Non enim rudes docuit, quemadmodum nos nunc, sed admodum in disciplinis assuefactos, sic ut eorum, quæ prius offensa sunt, consequutione, talia per se nullo negotio assequantur.

in l. de Artic. l. 49.

VID. VIDIO interprete.

Si quis prima lectione non intelligit, quæ clare ab Hippocrate scribuntur, ite-
Hipp. Opera.

rum, & tertio, & sæpius diligenti animadversione relegat: quod si faciat, quæ plane ab ipso traduntur, omnino intelliget.

l. de Præcep. ad Pess. c. 12.

JUL. MART. ROTA interprete.

Solam pulsuum scientiam Hippocrates non excoluit.

in l. de Humor. l. 28.

JO. BAPT. RASARIO interprete.

Notitiam a pulsibus profectam vel non habuit Hippocrates, vel certe non exercuit.

in l. de Artic. l. 37.

VID. VIDIO interprete.

Quædam Hippocrates prætermisit, vel quod non ex toto universam eorum naturam fuerit intuitus, vel quod tam diligentem inquisitionem ad propositum pertinere non existimaret.

in l. de Fractur. l. 9.

VID. VIDIO interprete.

Sagittariorum exemplum transferre ad vincendum, existimari debet proflus fatuum, fatiusque fuisset eos ab Hippocrate nullo modo commemorari, quam acerrime refelli: Nam quæ proflus stulta sunt, decidenda magis sunt, quam a scriptoribus confutanda. Non tamen prohibeo, quominus, dum in vivis agunt, redarguantur, ac præsertim ubi, qui hæc nugatur, audientibus persuaderet, ne sibi hominis curationem committant. Fit etiam interdum, ut nos quoque in scribendo stultis opinionibus contradicamus, ubi multos videmus illis credere, quasi veræ sint: quod & nunc accidit Hippocrati, nihil esse commune sagittaris, & vincendis, ostendenti.

in l. de Piss. acut. l. 1.

JOH. VASSÆO interprete.

Logicam magis speculationem sapere videtur, quod ab Hippocrate in questionem disputationemque ponitur, cum & sine huiusmodi speculationibus recte sanare queamus. Nempe morbos recte sanare inest medicis ex faciendorum cognitione, & non ex investigatione causæ: ob quam sunt controversi, qui varias in huiusmodi morbis scripserunt curationes. Est vero secundum veritatem id non commodissimum modo, verum quoque & omnium primum, & quæsitum necessarium, ut procedente exponam sermone: quod enim questione dignum sit quod proponitur, & quo solvitur modo.

h. l. de

CONTRADICTA, & DEFENSA.

L. de Diata Hipp. in acut. c. 11.

AUG. GADALDINO interprete,

Temere Hippocrati adversantur, quia eius scripta imparati accedunt, proutquam litteras didicerint. Suam enim ipsorum ignorantiam accusare cum debuissent, obscuritatem Hippocratis reprehendunt: quippe qui ob propriam imbecillitatem non possint magnitudinem Hippocraticæ virtutis assequi. Ita enim, opinor, affectæ sunt ad Hippocratis scripturas insipientium, abjectorumque hominum animæ, ut oculi ad solem, dum in ipsum intuentur. Ut enim illi de propria imbecillitate cedant, a solis pulchritudine, convincunturque; quippe qui haud possint perseveranter citra laborem in ipsum intueri, sed tandem cecutientes ad tenebrosam se verunt; ita animæ profanorum hominum, quæ prius in encyclopaedis non fuerint educatæ, a pulchritudine scripturarum Hippocratis, & fulgure circumcirca percussæ, ac dogmatum lumine vallatæ, quodam modo cæcæ fiunt, & ab iis, quæ majora sunt, quam ut ipsæ ferre possint, averse, ad parva quedam, & obscura, suæque ipsarum ignorantiae accommodata, accedunt.

L. Meth. med. XL 15.

THO. LINACRO interprete,

Sed aliqui sunt (ut Hippocrates ait) qui ex eo, quod ignorant, non parum lucri faciunt.

L. de Pnel. adv. Erasistr. d. 3.

JOS. TECTANDRO interprete,

Asclepiades adeo contentionis studiosus fuit, ut mortis meditationem cum Hippocratis, tum veterum medicinam nominare non sit veritus.

in l. I. Epid. 11. 30.

HERM. CRUSERIO interprete,

Postquam non parum multos vidi claros medicos jure ob id reprehensos, quod vel in mittendo sanguine, vel lavando, vel medicamento dando, aut vino propinando, aut frigida, offendissent, cogitavi necum fortasse etiam ipsi Hippocrati tale quid usu venisse: necessario itaque multus etiam alius ejus aequalibus medicis.

A. CORN. CELSUS.

111. 4. Edit. Lind. p. 121. l. 9.

Ignit sic ægros nutriebant, ut dierum imparium accessiones expectarent, deinde postea cibum, quasi levioribus accessionibus

instantibus, darent; adeo ut Hippocrates, si alio die febris desisset, recidivam time-re sit solitus.

Id Asclepiades jure ut vanum repudiavit; neque in ullo die, quia par, imparis esset, ægris vel majus, vel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares fiunt, & opportunius post febrium accessiones cibis datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur: sitque gravior, qui remissior esse consueverat. Atque ipsius quartus decimus par est, in quo esse magnam vim antiqui ferebantur.

A. CORN. CELSUS.

111. 4. Edit. Lind. p. 121. l. 34.

Est etiam apud Hippocratem, ei, quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse gravissimum, ita, illo auctore, in die pari & gravior febris esse potest, & certa futuri nota.

Atque idem alio loco quartum quemque diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit, id est quartum, septimum, quartumdecimum, decimumseptimum; in quo ab impare ad paris rationem transiit. Et ne in hiis quidem propositum conservavit; cum a septimo die undecimus, non quartus, sed quintus sit. Adeo apparet, quacunque ratione ad numeros respexerimus, nihil rationis, sub illo quidem auctore, reperiri. Vem in hiis quidem antiquos tum celebres admodum Pythagorici numeri fecerunt.

CÆLIUS AURELIANUS.

Acut. morb. 11. 29.

Hippocrates libro regulari (quem diceteticum vocavit) peripneumonique inquit remedium apendum ex cocco, atque galbano; atque attico melle, vel abrotano, ex aceto mulso, atque pipere admixto, & helleburo nigro. Summum, inquit, est etiam panacem in mulso ex aceto confecto decoquere, & liquatum dare bibendum.

Sed hæc omnia Soranus esse judicavit, & propterea reprobanda, adiciens, quod multum ex aceto factum confringat, & sit inconveniens tumori.

I T E R U M.

Acut. 111. 4.

Antiquiorum Hippocrates libro quem ad sententias Cnidiæ conscripsit, ex utroque oportere, inquit, brachio synanchicos phlebotomari.

Sed hoc erit evitandum. Siquidem coarctata sanguinis effusio animi facit deflectionem, & propterea prohiberetur tantum de-rabii, quantum sufficiat ad relaxandam stric-turam.

I T E R U M.

CONTRADICTA, & DEFENSA.

ITERUM.

Act. morb. III. 6.

Febrem vero secundum Hippocratem in spasmus venientem, salutarem accipimus. Spasmus autem in febrem, perniciosum: quamquam ejus excludant sententiam, dicentes, quia secundum ipsum febres corpora gravant, multo magis geminant incommodum, cum vehementibus doloribus. Laxat enim, inquit, tumorem naturalis, ac mediocri fervor: febrium vero acer, & contra naturam immodicus vexat.

ITERUM.

Act. III. 7.

Hippocrates libro quem ad sententias Cnidias scripsit, cerotum inquit unguentum opisthotonicum, & aqua calida eorum crura fovenda. Jacere jubet in lineis stramentis, utens ad ventrem movendum collyriis, quae appellavit balanos, & potionem ex radice bryoniae, & dauco, atque vino confectis. Offert praeterea latissimam coctam repentem in partem cibi, ut sepius facit, permittens etiam vinum superbibendum, quando voluerint agrotantes. Tetanico vero non advertens adhibendam vere phlebotomiam, sed non solum. Non enim dignum, atque sufficiens tantae passionis unum adjuvium esse probatur. Item collyria, sive balani, & potionem supra memoratam, & vinum intemperatim datum patientibus, contrarium, atque saluti noxium monstratur. Alia enim tempore importuna nervis officunt.

I D E M

Act. III. 8.

Item secundo libro, quem de morbis scripsit, ait esse aliquando conducibile tetanico sine vulnere effecto, atque primo corpore, & habitudine vigenti, aestate tempore plurimam frigidam abluionem, siquidem fervorem reclamet, ac evocet. Dat etiam nigrum helleborum cum pipere, & lacte alnino carne concocto potat, atque remutamentum commovet.

Mirandum igitur, quod in his, qui tali passione afficiuntur, frigida utendum existimat Hippocrates, qui jam dudum ait, frigida quaeque esse inimica ossibus, nervis, dentibus, & cerebro. Sternutamenta etiam commovere tumores, nulli non dubium est. Item asinum lac nulla ratione laxare tumentia probatur. Dehinc stomachum everret, siquidem sit tetri odoris, & saporis. Item helleborum nigrum nervos obidet, atque purgando, vel deducendo corpus exagitat.

Ellip. Opera.

I D E M

Act. III. 17.

Veterum autem medicorum, Hippocrates secundo libro de morbis, communiter inquit refrigeranda superiora, particulariter autem adhibenda vomitica medicamenta, & phlebotomia ex brachio, & capite. Tunc facculum aqua calida plenum deponendo jubet agrotantes: facere etiam collyrium decem digitorum, quem appellavit balanum, atque hunc summo tactu felle taurino unguendum: tunc si nihil profecerit, clysterem adhibendum. Vel si hoc quoque minus valuerit, folliculo artis aëriarii immittendum, inquit, venum per podicem, quo distantia ventris intestinorum replicatis folliculis fiat, tunc statim adhibendum clysterem probat, detracto supradicto folliculo, & podicem cum spongia obtinendum, atque in aquam calidam agrotantem deponendum. Utendum inquit primo tempore passionis melle decocto, atque vino.

Secundo libro epidemion multum vini meraci, atque frigidi dati jubet, donec somnus, vel dolor fiat crutum, suspicio causarum exstimator: existimat enim vel constituit fieri passionem incendio superiorum, & frigore inferiorum.

Contrarias igitur virtute materias adhibendas judicavit, non intuens passionem ex tumore fuisse confectam. Denique principio vomitus, quem adhibendum probat, asperat ejus celeritatem: siquidem disciendi corpora commovet. Phlebotomare autem convenit non post vomitum, sed laxamenti causa, non ut Hippocrates affectandum putat, obfrigidandum corpus. Dehinc ex brachio, non ex capite, neque simul ex multis partibus phlebotomare oportet. Etenim repentina sanguinis effusio vitium defectum faciens, non sinit congruam fieri detractionem, vel quantum magnitudini passionis est conveniens. Collyrium autem felle taurino perunctum, omnifariam nocens accipimus: Etenim ob acrimoniam fellis, atque mordicationem tumentia provocat in fervorem, & ob longitudinem digitorum decem immixtum premit eas partes, quae neque tenuem liquorem sine gravatione accipere, vel ferre valent. Nam ex aërio folliculo quid dicere oportet, si ubi inflationis metus est, immittendum extrinsecus existimat venum, atque, quod est maximi peccati, frigidum his partibus, quae etiam naturali tactu praegravantur, non aliter quam si quinquam in tetanica passione constitutum cum sit potestatis laxativis curare virtutis, eundem organum distendere contendamus. Advertendum igitur, quod magis roborat vexationem, vel duplicat corporis inflationem, adiciens graviora, quo etiam per clysterem liquoribus magis praegravet corpus,

h 2

CONTRADICTA, & DEFENSA.

corpus, ut tumentia importune vento vexata, etiam liquoris percussu intemporaliter sentiantur. Item spongia apponenda quam probat, extenta magis premit, Utitur autem vino, malis quidem, sed sui similibus consiliis. Neque enim temporaliter declinationem passionis observavit. Præterea usu immodico, siquidem plurimum dari jubet, & intemperato, quod sæpe in sanitate constitutos alienari, mente perficit, tunc etiam incongrue, siquidem frigidum. Omne etenim frigidum tumentia auget. Repugnanti ergo iudicio viuum dare perspicitur, effectum somno, atque dolori citrum ascribens, somnus etenim levigata atque soluta passione, efficitur, dolore autem pejorante, & asperato tollitur. Quod ita manifestum est, ut demonstratione non indigeat.

I D E M

Tert. iv. 3.

Hippocrates enim libro, quem ad sententias Cnidas scripsit, helleborandos principio ægros ordinavit, ultimum adiutorio ceteris anteponebat. Dat præterea panem ita curatum, ut neque ab hominibus recte valentibus posse digeri facile videatur. Item pulentum, atque fœni græci semina.

Cum sint hæc qualitate contraria, alia enim astringunt, alia relaxant, & nulli adiutorio tempus adiunxit.

I D E M

Tert. pass. iv. 8.

Hippocrates libro Prognostico significare inquit lumbricos intersectionem agrotantis, quoties mortui fuerint exclusi omnibus in morbis.

Herophilus vero libro, quem ad Hippocratis Prognosticum scripsit, siue vivos, siue mortuos excludi negat incongruum.

Et Mos.

Chrysippus Asclepiadis sectator, libro tertio de lumbricis, sic inquit Hippocratem ferri, dicentem suo libro, eos qui in agnitudo declinatione cum stercorebus egeruntur, nihil græve significare.

Sed neque inquit Dioctem Hippocrati contrariam protulisse sententiam, dicendo mortuos vel inanes esse meliores: siquidem hic in febribus solutionum hoc dixisse videtur, Hippocrates autem mortem significare in febribus struere.

I D E M

Tert. v. 1.

Hippocrates vero libris, quos ad sententias Cnidas scripsit, magis utendum dicit egestate, atque vaporazione, & continentia, & danda sicca, vel arida queque, & acriora mandenda. Si enim asjubilis æger fiat, hoc est, urina facilior, ac si spiratio difficilis fuerit, quam dyspnoeam vocant, & tempus æstatis, & æstas media, dicit ex brachio phlebotomandos, & post detractionem factam dat panem calidum vino infusum, atque oleo, & carnem suillam ex acetis decoctam. Dat etiam cantharides terro detracto capite, & pedibus, & primis in tribus cyathis aquæ cum tritas.

Sed neque quo tempore exercitio utendum sit manifestat, neque usque quo mandenda sint acriora, vel quando vaporationes adhibende. Dehinc si phlebotomare oportuerit, non solum æstivo tempore, ac media æstate, sed etiam omni tempore, atque ætati convenire phlebotomiam probamus. Est præterea importunum vinum, ac repugnans eo tempore commodis phlebotomæ. Item cantharides humorem commovent. Carnis quoque offerende tempus significare neglexit.

HENR. CORN. AGRIPPA.

de Ven. scient. c. 82.

Jam vero & Hippocrates, quem ipsi pro Deo colunt, ab aliis in plerisque notitiam diversum sentit, quam suspexit erravit. Nam in libro de nat. infantis ait: Generatur ex luteo ovi avis, nutrimentum autem, & augmentum habet album, quod in ovo est.

Quod falsum probat Aristoteles in lib. de animalibus, & in lib. de generatione animalium, disputans contra Alcmaeonem, qui cum Hippocrate sentiebat, concludit: origo pulli in albumine est, cibus per umbilicum ex luteo petitur: cui sententiæ adhæret etiam Plinius, inquiens: Ipsum animal ex albo liquore ovi corporatur, cibus ejus in luteo est.

Et Mos.

Nonne etiam ille Hippocratis aphorismus mendax est? mulier non podagrizat, nisi menstrua illi defecerint?

Cum muka femina, quibus etiam menstrua fluunt, podagras patiuntur.

CONTRADICTA, & DEFENSA.

JUL. CÆS. SCALIGER.

de Subtil. adv. Card. 61. 18.

Tueris enim, atque etiam profiteris nefandum illud Hippocratis deliramentum, a quo non abluere Galeni trepidationes. Animum nihil aliud esse, quam coeleste calidum. Absurdior ejusdem sententia in primo de ratione victus. *triplex de adpatione* *duplex spiritus & humor* *triplex humor*. Itaque etiam ista veritas est. *de adpatione duplex est adpatione* *adpatione adpatione adpatione*.

Sed tibi contradicere: *de duplex in animi ratione* *de duplex*. Si enim est idem in homine, &

cane, ergo anima hominis augebitur in cane, & canis anima in homine vicissim. Sed & alia libidem contradicere: *de duplex* *animi spiritus* *de duplex* *de duplex*. Similia superioribus in sexto Epidemion: *adpatione duplex de duplex* *adpatione*.

JUL. CÆSAR SCALIGER.

de Subt. adv. Card. cccvii. 5.

Neque mens agrotat, ut falso voluit Hippocrates, cum dolore, quo cruciamur, non sentimus.

Sed quoniam dolentem ad locum, subsidii ergo, distracti spiritus, non representantur imaginationi.



AUGUSTISSIMIS AC PRUDENTISSIMIS, HONESTISSIMISQUE VIRIS,

Senatui Populoque Imperialis urbis Augustæ Vindelicorum,
JANUS CORNARIUS Medicus Phisicus, S. D.



ON alienum, nec ab-re esse arbitror, Augustissime Augustæ urbis Senatus, hoc in loco, hac instituta ad amplitudinem tuam, in Hippocratis Cei medicinæ principis scriptorum, a me in Latinam linguam translatorum editionem, præfatione, paulo altius repetere, qualis fuerit nostro hoc ævo rei medicæ, & simul etiam aliarum artium, ac studiorum status: qualis factus sit progressus: quantum accesserit incrementi: & quid de toto hoc studiorum genere sit sperandum. Nam & necessariam esse Hippocratis librorum editionem, lectionem, ac cognitionem, inde clare constabit: & me hæc vel peractorum laborum gratia, meminisse juvabit: & qui ista legent, non inutilem consequentur hujus narrationis cognitionem: & Amplitudo tua, spero, harum rerum memoria jucunde afficietur, & si quid præsidii, ac opis ad hæc studia conservanda opus fuerit, (sicut revera vestram urbium Imperialium opem desiderant ac implorant) huc libenter incumbet, quo literæ unicum totius vitæ ornamentum durenr, ac vigeant, in Germania nostra, ne si hæc corruant ac jaceant, vere neutra vita vocari mereatur, haud secus quam neutrum corpus Medicis dicitur, quod neque sanum, neque ægrotum appellari potest. Talis autem futura vita mihi videretur, ut miti, ac familiari nobis similitudine, res omnium tristissima, & perpetua nocte obscurior adumbretur, si horum studiorum lux extinguatur, si literarum decus deturpetur, si robur illud, quod & pacem, & rerum publicarum, ac privatarum tranquillitatem retinet, elanguescat. Quum itaque primum animum ad Medicinæ studia adjicerem, magna erat bonorum, & professorum, & librorum penuria: adeo ut Hippocrates & Galenus medicæ sectæ optimæ, rationalis illius, principes, ne nominibus quidem suis justis, in scholis satis noti essent, quum vulgo Hippocras & Galienus a plerisque omnibus appellarentur. Itaque quum essem adolescens viginti natus annos, ex Petri Mosellani, viri & eruditi, & imprimis suaveloquenti sacundia ornatu auditoribus: (Nam neque hunc, neque alium ullum unquam privatum præceptorem habui, post prima grammaticæ rudimenta) in literis utriusque linguae eo progressus, ut non modo grammatica docerem, sed etiam Poetas, ac Oratores Græcos publice enarrarem, plurimum mox ab initio, ab honestissimæ artis discendæ proposito decidebam. Avertebant enim me barbari scholarum magistri, & non multo expositioribus suis potiores scriptores, quibus tum medicorum scholæ pro optimis autoribus utebantur, Avicenna, Rasis, Albucasis, Avenzoar, Mesias, & alii non citra tædium nominandi, Arabicum hominum genus. His accedebant practices scriptores superioris sæculi, ac illius quoque, gens per omnia inepta, sordida, ac impura, & tam spurce latine loquens, ac tam infelicitè id quod docere vult tradens, ut penitus desperarem ex tam putidis libris fore posse, ut unquam ad medicinæ cognitionem pervenirem, eam videlicet quam ex Hippocratis aliquot libellis, aphorismis dico, prognostico, & eo qui De victus ratione in morbis acutis inscribitur, olfecissem: & quam mihi ex Galeni aliquot libellis latine itidem extantibus delineassem. Erant autem hi Leonicensi interpretatione, De febrium differentis libri duo, & Copi versione sex libri De locis affectis inscripti. Et his interpretibus tum extabant quoque Hippocratici illi libelli. Ac in philosophia quidem eo tempore extabat sua lingua Plato, Aristoteles, Theophrastus, Xenophon, & Plutarchus, magno erga bona studia Aldi Manuti beneficiis. Verum in medicina nihil Hippocratis, ac Galeni ipsorum lingua habebatur, præter Hippocratis aphorismos, quos Philippus Melanchthon mihi communicaverat, & unam Galeni methodum, quam

Romæ

EPISTOLA NUNCUPATORIA.

Romæ si recte memini, excusari, apud amicum quandam videram. Hic ego dum ambiguus quid facerem sæpe mecum cogitare, tandem illud statui, quod præsens esset boni consulendum esse, donec aliquando dies meliora proficeret. Proinde relictis magna ex parte Arabibus illis scriptoribus, & ex præcticis quoque paucis aliquot, melioribus ut fieri solet in malorum electione, assumptis: videbantur autem tales esse, Bertrutius, Gatinaris, Guainerius: his ad prædictos libellos Hippocratis ac Galeni additis ac collatis, sed magno interposito intervallo, aliquot annis medicinæ studia sectatus sum, donec cum his simul magister magnus artis venter persuaserit mihi, ut artis periculum facerem, quod jam per annos viginti quinque facere pergo, ab eo tempore quo primum animum ad medicinæ studia, velut dixi, adieci. Quanto vero meo commodo hoc fecerim, aut etiam aliorum utilitate, non est quod multum jactem, Diligentiam meam & fidem, tum in docendo qualiacunque didici, tum in curando qualia ars præstare potuit, multis cognitum esse scio. Opes velut studiorum impedimenta, non anxie quæsi, & eas quoque quæ contingere potuissent, contempsi. Hoc nondum scio an commodum, aut potius incommodum dici debeat, quod totum istud studiorum priorum genus, per totos novem annos a me tractatum, relinquere ac quasi dediscere coactus fuerim, quam jam magnam Europæ partem, rerum medicarum experiendarum gratia pervagatus, Basileam perverissem. Et quod quidem incommodum hoc sit, tot horas male collocasse in studiis dediscendis, nemo non intelligit, etiam ex his quibus non dediscenda, sed amplectenda esse illa adhuc hodie videntur. Quod vero commodum sit, totam barbaram medicinam a me esse relictam, & græcam assumptam, productam, & non parum per me etiam auctam, & ampliatam, nondum persuasum esse scio plerisque, qui adhuc cum Gryllo grunnire malunt, & glandibus vesci frugibus optimis repertis. Profecto horum ingenia velut ineptissima, & judicia velut nihil sani habentia averfatus, tum mox toto pectore ad Hippocratem Græcum, ac Galenum, itemque Paulum me contuli, paulo ante Venetiis ex Aldi iidem officina allatos: quibus etiam alienis ad tempus utebar, atque in his ita versabar, ut vel totum Hippocratem ad Latinos transcribere me posse non desperarem, si tam magni laboris præmium alicunde affulsisset: nedum de Galeno ac Paulo ambigerem, quos faciliores esse, vel leviter græca scientibus constat: si quis modo non penitus rudis eos autores aggredi conetur. Et extant libelli duo Hippocratis eo anno a me conversi, alter de aere, aquis, & locis: alter de flatibus inscriptus, qui animum meum studiosis satis declararunt, quantum voverim medicinam illinc adjutam. Nec deerant nobis inhortatores ad tem tentatam strenue obeundam, inter quos magno erga optima studia merito præcipue mihi nominandus est Des. Erasimus Rotodamensis, cuius etiam scripta ad me epistola extat, qua me ad constanter prosequendum id quod in Hippocratem medicinæ principem orsus essem inhortatur. Ad idem me institutum Frobenius ac Episcopus, qui prius etiam aliquot mihi commentationum fuere auctores, tantum non cogeant: digni profecto propter sua in doctos homines merita, ut ab omnibus bonis viris adversus omnesque æmulos instar ignavorum suorum insidiantes libris ipsorum sumptibus & industria in lucem editis, foveantur & tueantur. Quum igitur hæc mea tunc fuerit voluntas, & non omnino desperata etiam præstandi facilitas, Cur, inquit aliquis ex illis; ad tot annos dilatum est, quod propter communem utilitatem, si ita est veluti ipse dicis, quam primum in vulgari oportuerat. Fatebor sane hic quod res est. Primum quidem voluntatem meam remotata est maxima operis difficultas. Nam ut glossas & voces penitus obsoletas omittamus: ut dicendi genus breve illud, & quo velut per ænigmata, innuere magis quam significare sententiam voluit, ne producamus: adeo ut ne Galenus quidem se ex omnibus extricare valeat: ut nihil etiam dicamus de lectione varia, ac subinde a plurimis præcis Hippocratis expositoribus routata, & temporis insuper injuria corrupta: vel ipsa vetustatis reverendi senis majestas detertere posset, ne quis familiarius versare doctissima, & per omnia gravissima scripta audeat. Quod vero sanæ gravitatis, majestatisque

EPISTOLA NUNCUPATORIA.

tisque scriptor sit Hippocrates, idemque optimus methodi doctor, etiam Plato testatum de ipso reliquit, cujus verba ex Phædro adscribere non pigebit. Fieri ne possit putas, inquit Socrates, ut quis animæ naturam pro dignitate consideret, absque univèrsi natura? Si quidem Hippocrati Asclepiadarum generis credere oportet, inquit Phædrus, neque corporis, citra hanc methodum. Bene, inquit Socrates, amicissime Phædre Hippocrates dicit. Oportet tamen insuper ad Hippocratem, etiam rationem expendere, & an consona est videre. Ita sentio, respondet Phædrus. Proinde de natura considerare, inquit Socrates, quid tandem dicit Hippocrates, & ratio vera? Nonne hoc modo? De cuiuscunque rei natura considerare oportet, primum simplex ne sit, an multarum specierum id, in quo artifices esse volumus, & alios ut tales sint facere. Deinde si simplex est, vim ipsius considerare: quam a natura habeat, ad hoc ut in aliud faciat quid, aut quam ut ab alio patiatur. Si vero plures species habuerit, eis enumeratis, id quod in una, hoc in singulis considerare, re, quid nam a natura facere solet, aut quid ab alio pati. Consequens, inquit Phædrus, hoc est o Socrates. Proinde methodus, ait Socrates, absque his similis est icineti cæci. Hactenus Plato. Et non sunt quidem hæc ita ad verbum in Hippocrate, sed talis est omnino doctrinæ methodus libri De naturæ hominis inscripti, ut de nullo alio loqui hic videatur Plato: quanquam similis methodus etiam in aliis hujus viri scriptis genuinis esse videatur. Quare quum hæc tenus reperti sint, quæ Aristotelem, qui Theophrastum, qui reliquos Græciæ philosophos ac scriptores, ad latinos convertere aggressi sint, & aliquid operæ precii præstitit, in Hippocrate nemo hoc feliciter tentavit, ex toto, ut ne in minutissimis quidem libellis aliqui fati aptos artifices se declaraverint. Non igitur nihil est quod & nos de difficultate hujus scriptoris queramus, qui hæc tenus omnes ex æquo à se avertit: etiamsi nunquam ex toto a nobis desperatum sit, fore ut aliquando omni difficultate superata, latinus a nobis factus Hippocrates legatur. Accessit ad hanc difficultatem alia remora ex temporum infelicitate. Quum enim per viginti ferme jam annos medicina Græca reviviscere cœperit: reducti sint Hippocrates, Galenus, Aetius, Paulus, Dioscorides: & hi non sua solum lingua, sed latini etiam magna ex parte (uno Hippocrate hæc tenus saltem excepto) tum per doctos aliquot viros, tum per nos quoque facti, tamen ea est sæculi infelicitas, ut nemo tante artis, quæ ipsam etiam vitam, qua nihil homini preciosius esse potest, conservat: pretium agnoscat. Vidimus ardens primum studium multorum circa linguas addiscendas: deservisse hoc paucis latinis. Vidimus maximum studiosorum concursum ad discendam theologiam, quum primum in Germania sincerior pietatis doctrina illucesceret: Duravit hic aliquot annis. Transiitum est ad studium juris civilis: Nec puto ullo unquam tempore tot fuisse studiosos, qui leges Imperatorias sequerentur, aut doctorum titulis insignirentur. Sola Medicina ubique contempta jacet, stigent gymnasia, torpent professores, ars ipsa in ære volat, & non nisi apud delicias ancillæ, & recitatos Apellas, & eos qui multorum periculis de sua ignorantia experientia faciunt, ejus usus queritur: paucis quibusdam bonis medicis non in usum publicum, sed in privatum sibi thesaurum, vera medicinæ studia possidentibus. Quanquam ego quidem graviores adhuc, ac similem timeam optimæ arti ruinam, si continget ut alius aliquando evehatur, qualem videlicet Christianæ religionis studium pertrahat, & qualem juris scientia minati videtur. Sicut enim dum pii aliquot viri Evangelium Christi purum ac sincerum reducere conati sunt, factum est ut apud plerosque Christus penitus fabula factus sit, & parum adhuc in paucorum cordibus hæreat: Ita ex magna juris scientia eo pervenitur, ut jus sit in armis ac vi positum, ut sint qui quidvis sibi licere adstant, adulterare, scortari, prædari, prodere, rapere, agere, capere, & cælum ac terram miscere, modo apex sit in jure scripto, qui ut ipsorum cupiditatibus inserviat cogi possit: quomodo summum jus summam injuriam esse, juxta vetus adeo verbum, atque ita omnem optimarum legum doctrinam, usum ac necessitatem intercidere, nemo non sentit. Atque utinam non similis casus maneat rectissimum medi-

EPISTOLA NUNCUPATORIA.

medicinæ studium, si quando etiam hoc ad summum adductum fuerit : & ex
scholæ umbra, ad publici exercitii theatrum productum . Sed quis prohibere
 potest malos, ut ne sui similes sint, in quocunque studiorum genere perverten-
 do? & ea quæ ad multorum salutem inventa sunt, partim per ignorantiam,
 partim ex malitia, ad perniciem abutendo? Propter tales cessandum a nobis
 non est, ut non optima faciamus, doceamus, ac in lucem proferamus, & ar-
 tem per se optimam ad summum statum evehamus . Nos certe ut quod possu-
 mus huc conferremus, & ut & oculi, & negotii nostri ratio publice omnibus
 constaret, sæpe in partialibus editis libellis præmissum, sæpe repositum, sæpe
 repetitum Hippocratem nostrum latinum tandem etiam his infelicissimis tempo-
 ribus, quibus præter ea quæ jam relata sunt, omnia perpetuo metu consternata
 gravantur, insidiis pertentantur, prodicionibus obtinentur, bello expugnantur,
 incendiis consumuntur, edere volumus, atque hunc inestimabilibus labori-
 bus, & non levi sumptu ac rei familiaris iactura, perpetuis quindecim annis
 absolutum . Non quod hos totos in hoc solum opus impenderimus : hoc enim
 vere esset suo sibi jumento malum accerfire : sed quod nunquam hanc curam
 rejecerimus hujus quoque operis absolvendi, dum illa partim de Græcis pluri-
 ma translata, partim a nobis scripta ac commentata, in publicum emisimus,
 non omnino nulla nostra privata utilitate : Fatendum enim & prædicandum
 quoque hoc est, quum & magnorum principum, & præclararum urbium, ma-
 gnificentiam ac liberalitatem simus experti, & ad hæc præstanda, quasi somite
 quodam coacti, ac provecti . Superavimus autem hanc operis difficultatem,
 tum sæpe repetita Hippocratis lectione, tum locorum subinde alibi ab ipso Hip-
 pocrate repetitorum collatione, tum perfecta denuo tota Galeni græca ac lati-
 na editione, eo studio ut totum aliquando editurus sim Galenum, aliqua parte
 ex mea translatione, & reliquis itidem versionibus ad veram Græcam lectio-
 nem correctis . Et profecto longum esset hic declarare, quibus rationibus indu-
 ctus, multa ex lectione Aldini, plurima præter lectionem Frobeniani exem-
 plaris, a nobis ad multa manuscripta exemplaria collati ac editi, in hac no-
 stra latina Hippocratis conversione mutaverimus . Statuimus autem huc im-
 pendere quinquennium plus minus, ut si deus vitam tamdiu prorogarit, to-
 tius nostræ conversionis ratio, ac aliqua expositio extet, in diurnaliorum si-
 ve conjecturarum libris, tot a me scribendis, quot omnino existunt libri
 Hippocratis scriptorum . Interim tamen hunc præcipuum nobis fuisse sco-
 pum, studiosos omnes non celabimus, quem etiam pro justissima lege Gale-
 nus agnoscit, dum sic scribit . Hæc, inquit, Lex mihi in exponendo ac
 „ interpretando observatur, ut uniuscujusque scripta ex illo ipso declarentur,
 „ & non vanis opinionibus, & pronunciata citra demonstrationem senten-
 „ tia, quisque quicquid velit deblateret . Hanc legem nobis in scopum, in
 Hippocratis libris latine conscribendis proposuimus, & omnes obscuros lo-
 cos, collatione ad alios facta, ubi hoc fieri potuit, exposuimus, reddidimus
 ac expressimus, multis immutatis, non paucis rejectis, plurimis apposis, quæ
 nec in impressis, nec manu scriptis codicibus ita habentur : sed tamen
 ut alicubi vestigia veræ lectionis etiam ex illis odorati simus . Quorum om-
 nium iusto opere a nobis ratio reddetur . Atque hæcenus suffecerit pro-
 tulisse me studiorum nostri ævi statum, progressum ac augmentum, & præ-
 cipue rei medicæ, Cujus primum, summum ac maximum auctorem, tan-
 dem ego latinis hominibus non minorem, sed aliquanto, nisi penitus sal-
 lor, meliorem quam græcis extat legendum produco, edo ac publico . At
 ne ego mihi tanti beneficii publici gratiam expetere videar, aut ne tanti
 autoris ac operis patronum, præstare me posse, aliunde considerare puter :
 ad te augustissime Senatus Augustane confugio . Tux amplitudini hanc au-
 toritatem defero, Tux erga literas & literatos benignitati hanc gratiam de-
 beri confiteor, quod Hippocrates latinus noster publice extat, habetur, le-
 gitur : quod rebus mortalium juvenis opus expositum est, ultra duo milia
 annorum ab omnibus in latina lingua desideratum . Nec vero videri pos-

EPISTOLA NUNCUPATORIA.

sum aut velut ignotus, aut temere, ad tantorum virorum præsidium confugisse, dum in publice recepto illo more dedicandorum ac consecrandorum librorum, ad vos viri Augustenses me recipio. Nam quum vestra res publica per omnem non modo Europam, sed orbem tetrarum celeberrima sit, a bonis legibus, a probatis ac gravibus moribus, a severa in malos animadversione, a clementi erga bonos benignitate, a pietissimo religionis cultu, ab ingenti erga literas & bona studia favore, a doctissimis consilioque ac prudentia præstantissimis viris, videri non debeo temere magis quam recto iudicio, ad tam augusti senatus, ad tantorum virorum tutelam, Hippocratis & pariter meum opus attulisse. Nec ignotus ego vobis esse possum, cujus scripta ac opera tot principes viros, tot claras urbes fovere ac tueri nondum, quod sciam, periiit. Hic non referam quibus viris semper respub. vestra floruerit. Non recensebo Fuggaros, non Paungartneros, non Illungos, non Vuelleros, non Herebrotios, non alias magnas familias principum opes adæquantes, & simul pietate, prudentia, fortitudine, magnificentiaque ac summa liberalitate præstantes. Non dicam de Monopoliorum apud vos extantum utilitate, per quæ sit ut Germania ab hominibus sub polo Antarcticò habitantibus, & ab ipsis Antipodibus mercimonia, in quotidiano usu habeat. Non dicam de plebis sedula opera, & laudatissimis operibus, unde lingæ generis, hiliciorum, triliciorum, quadriliciorum variis texturis, multiplicibus tincturis, non modo Germania, sed omnes extere etiam nationes redundant. Nec dicam de urbis magnitudine, splendidis extructionibus ac ædificiis, & populositate, quæ ut peculiare laudes urbium sunt, ita & loci optimum situm, & terræ, ac nascantum omnium copiam ac ubertatem coarguunt. Verum studium vestrum circa literas, bonas artes, pietatem ac rectam religionem conservandam non tacebo. Quum enim videretis studiorum omnium fluctuationem, sursum deorsum omnia jactari, in præcipiti omnes linguas, artes, ac disciplinas consistere, nullo unquam tempore plures in omnibus scriptores extitisse, partim sua magnifice jactantes, partim aliorum & veterum quoque scripta damnantes: Vos optimos semper apud omnes recte sentientes habitos autores Græcos, magna copia per occasionem nuper adeo vobis oblatos non neglexistis, sed velut rem reipub. imprimis utilem, eorum opera ac libros comparastis, coemistis, ac pro ingenti thesauro, velut revera est, reposuistis, habetis, possidetis: non tamen ut privatam utilitatem hinc vobis queratis, sed ut publicum bonum juvenetis, ut si opus sit, inde rebus humanis subsidium afferatis. Neque enim quicquam ad respub. optime instituendas ac retinendas, utilius est bonorum virorum bonis scriptis. Sicut contra mera pestis est, quæ ex malis malorum libris hauritur. Recte enim artes, boni mores, optimæ disciplinæ traduntur ac servantur in bonis libris. At sine rectis artibus, sine bonis moribus, sine optimis disciplinis, & in summa, sine literis vita non est vita censenda, velut supra ab initio dixi, & vetus illud chaos, rudis indigestaque moles reducitur. At vos sane in illo librorum Græcorum thesauro vestro, non unius alicujus liberalis artis aut disciplinæ autores habetis, sed ex tota philosophia, medicina, mathesi, ac Theologia optimos, & eos neque hæcenus typis excusos, neque multis adeo adhuc visos, immo ne nominibus quidem plenique omnibus notos, & fortassis nusquam alibi extantes, velut ex indice cognovi, quem multarum rerum usu ac experientia clarus medicus apud vos Geryon Seilerus ad me misit. Immo non modo indicem hic amicus noster misit, sed quæ vestra est viri Augustens. erga recta studia benignitas, de Vobis eorum librorum etiam usum mihi promissit, multa simul de vestra magnanimitate, ac magnifica voluntate mecum loquutus, ac mihi pollicitus. Quanquam autem antea mihi virtutum vestrarum gloria non ignota esset: (Qui enim ignota esse possit, quæ per totum orbem decantata est?) tamen eo referente plura cognovi, & propius introspexi, quam antea ex auditu & aliorum scriptis intellexeram, Accessit ad hujus narrationem vir excellenti

EPISTOLA NUNCUPATORIA.

cellenti juris scientia, & eximia prudentia præditus Claudius Peutingerus, clariss. Jurisconsulti Conradi Peutingeri filius, non modo in paternis virtutibus referendis, sed in maximis etiam rebus ac negotiis, pro patria obeundis ac gerendis, non jam spem, sed ipsam rem præstans. Cum hoc viro ante paucos annos mutua aliqua cognitio mihi intercessit, quæ sanè iudicium de Vobis meum confirmavit, & in id consilii me adduxit, & breviter effecit, ut non dubitarem Hippocratem hunc latinum meum ad Vos deferre, Vobis inscribere ac dedicare, ære ac libra vestrum facere. Cæterum erunt fortassis qui vel hoc nomine Hippocratem a nobis latine conscriptum impetent, quod præstiterat Græcum legere, ac satis fuerat Græcum extare. His sane larga data est ejus rei faciendæ etiam per me copia. Nam & Græcum exemplar per me editum ex Frobeniana officina, non paucis locis melius ac correctius est quam Venetum. Et si vere Hippocratis studiosi sunt illi, non pœnitebit ipsos vel ambo coernere, habere, ac legere, immo etiam plura inquirere, quo tandem emendatissimus sua lingua loquens Hippocrates habeatur. Quin & ego semper ita sensi, melius esse quovis scriptores in sua lingua, quæ ipsi scripserunt legere, quam optime etiam in aliam translatos. Sed quid facient hi qui Græcum non intelligunt? Antea ostendi hujus autoris difficultatem, breviter, & ænigmatibus similem obscuritatem. Quandiu vero expectandum nobis est hoc sæculum, in quo medicinæ studiosi ex æquo omnes ad legendum ac intelligendum Hippocratem Græcum sufficient? Esse autem Hippocratem talem tei medicæ autorem, ut sine ipso res medicæ integre consistere non possit, & sæpe alias dixi, & nunc non minus asseverantissime affirmo. Totus enim Galenus omnem suam doctrinam, ad Hippocraticam methodum, velut ad amussim direxit. Idem fecerunt & ante, & post Galenum, optimi quique tum medici, tum philosophi, ut ineptissimos pariter ac indoctissimos se esse declaraverint, qui unquam ab Hippocrate desciverunt, aut ipsius dogmata impetiverunt, quorum multos adeo in libris suis hinc inde, ex omni occasione Galenus revellit, ac explodit. Demus autem hoc sæculum spem nobis injicere de futuris. Nam revera nullum antea fuit, in quo per omnem ferme Europam pariter utriusque linguæ cognitio in tantum aliquandiu floruisse. At quid vetat, aut quid adeo obsuerit, hanc etiam accessionem linguæ latinæ contingere, ut Hippocrates latinus pariter & Græcus legatur? maxime quum etiam Græcus ex nostra latina interpretatione clarior evadat, & expositionis Græci vicem latinus supplete possit. Verum mihi, velut antea quoque dixi, videntur omnia nunc ingenia, omnes artes ac disciplinæ in summo ac præcipiti stare: atque utinam sic retinerentur, non retro ut ruerent, & esset aliqua saltem spes in paucis, qui in posterum suis magistris discipuli evaderent præstantiores. Ego profecto quum multis annis a scholis abfuerim, a docendi munere abhorrerem, studiis meis ad scribendum, & ad exercendam medicinam collatis: proximum ferme triennium rursus professor medicinæ consumpsi, non omnino surdo ac muto auditorio, in Hesselsum ac Cassorum principis Academia Marpurgensi. Sed ut verum aperte fatear, longe infra meam spem, & inferiorem successu quam Illustris Herois Philippi Hesselsum principis, vel erga me, vel erga studiosos, magnifica liberalitas deposcere videtur. Non tamen desunt hujus rei causæ. Plerique omnes fugimus immensum studiorum laborem, delicias ac voluptatem in his confectamur. Itaque vel quantum jucundum est, vel minime molestum, didicisse satis esse putamus. Alii ad ea studia se conferunt, unde quam brevissimo tempore, ac minima impensâ assequantur, quo ventri sit consultum, & opes ad alia respiciunt, non cogitantes plerumque quam sint ad ea tractanda appositi. Medicina vero requirit naturam idoneam, a puero institutionem, doctrinam linguarum, literarum, philosophiæ, mathematicarum, & totius naturæ cognitionem; multam insuper industriam ac diligentiam, locum studiis commodum, & longissimum etiam tempus. Si non hæc sunt quæ studiosos a Medicina avertunt, libenter patiar alium potiores cau-

EPISTOLA NUNCUPATORIA.

Gas afferre. Ego Hippocrati in libro De lege hæc referenti accedo. Detineo
 Amplitudinem tuam Augustissime Senatus longius quam propolueram: Unum
 si adhuc retulero dimittam. Non conatus sum in hac mea translatione Ci-
 ceronianus videri, non quod omnino improbem hoc novæ sectæ hominum
 genus, qui per omnia Ciceroni in dicendo similes fieri student; aut quod
 penitus negem fieri posse, ut omnes artes ac disciplinas, Ciceronis dictione
 in imitationem assumpta ac servata, tradantur. Sed ut simpliciter dicam,
 primum quia non placet. Deinde quod videam magna ex parte longum &
 inutilem laborem, & postea etiam omnibus factis, conatum infelicem, ac
 successu carentem, quo plerique ex illis referunt Cicetionem, non aliter
 quam Nero princeps Catonem, aut ut vicinius comparem, cuculus luscini-
 niam. Accedit his servilitas & mancipatio, nullam linguæ, immo ne cogi-
 tandi quidem diversum aliquid, libertatem relinquens. Et quando desinemus
 esse turpitudinis simia, pulcherrimum hominum genus creati? Sed oportuit
 hoc quoque ad reliqua seculi incommoda accedere, ut haberemus qui non
 solum loquendo ac scribendo, Ciceronis simia ut essent, se excruciant,
 sed etiam græcæ omnis generis scripta in latinam linguam convertendo, tan-
 ta sui mancipatione, ut si modo Ciceronis verbis undique conquisitis loqui
 videantur, etiam a sententia subinde excidere nec vereantur, nec animad-
 vertant: quasi magni adeo referat Cicetionem ita exprimere, & quasi nemo
 alius bonus latinus scriptor extet, quem sequi oporteat, ipso etiam Ciceto-
 ne, si cognoscat, rursus supersus præsertim si quomodo se ad Lælios,
 Scipiones, Terentios, atque alios composuerit, in memoriam revocet. Et
 tamen hic nihil dicam de his rebus quas medicus tractat, quas ne ipse qui-
 dem Cicero Cicetioniane eloqui posset, etiamsi a Medico de his edocere-
 tur: quum sane alias non multus sit in rerum naturæ tractatione, nimirum
 intra moralis ac rationalis philosophiæ limites conclusus. At tum demum
 Simia vere simia est, quum etiam supra hominem præstare quid molitur.
 Hoc itaque agant hi quibus istud placet, ac datum est, ego neminem pro-
 hibeo. Sed sic sentio, Hippocratem istos fucatos ornatus averfari, & ama-
 re ut sicut in sua, ita in omni lingua, brevis & verbis, & sententiis, & ta-
 men plenus ac gravis, clarus item ac dilucidus, quantum ad ejus ætatem
 posteris assequi datur, & quod potissimum est, rectus legatur. In hoc si
 quid præstiterit, quod volui sum assequutus: nec est quod verear ullos natos,
 vel præcipuos, quantumvis in cornu exarutos. Quos vero sciunt studiosi ali-
 quam hujus operæ a nobis transactæ partem, Habent in hoc nostro latino
 Hippocrate librum De aere, aquis, & locis, duplo auctum, & nisi fallor
 integrum: Habent libri De capitis vulneribus principium, quod in Græcis
 codicibus impressis deest: Habent librum verum *μυζικόν*, id est Vectiarium,
 eundemque De ossibus inscriptum: quæ omnia in græcis exemplaribus par-
 tim desiderantur, partim alieno loco posita, iustis locis restituta sunt. Quo-
 rum omnium gratiam ut vobis viri Augustissimi, medicinæ studiosos debere
 volo, ita nec pudebit, nec pigebit vos, spero, summum medicum Hippo-
 cratem vestra autoritate tutum, vestro favore commendatum, in publicam
 utilitatem, & meæ erga Augustissimum Senatum voluntatis declarationem,
 vobis inscriptum ac dedicatum prodire. Valete viri magnifici. Marpurgi
 Heissonum, Calend. Septembribus. Anno Christi, M.C.XLV.

AD HONESTOS AC PRÆSTANTES VIROS,

Senatum populumque Zuiccaviensem,

JANI CORNARII

Medici Physici in Hippocratem suum latinum,

P R Æ F A T I O.



T me promississe memini, & de præstando sæpe apud animum meum anxie cogitavi; sed quo minus res hæc ad effectum deducta est, si causas adduxero, ab omni vanitatis suspitione, apud omnes bonos, ac doctos me exempturum esse confido. Promissum autem tale fuit in superiore Hippocratis mei latini editione: statuius autem huc impendere quinquennium plus minus, ut si Deus vitam tandiu prorogaret, totius nostræ conversionis ratio, ac ali qua expositio exter, in diurnaliorum, sive conjecturarum libris, rot a me scribendis, quor omnino existunt libri Hippocratis scriptorum: magnum, fateor, est promissum, & res ipsa apud Græcos a nemine, quod equidem sciam, & cujus memoria ad nos devenisset, tentara, ut omnia Hippocratis scripta unus aliquis illustrare institueret. Nam Galenus bonam quidem, & magnam partem illorum doctissimis commentariis exposuit, sed eam quæ restat ab ipso relicta, neque alius quispiam exponere aggressus est, cujus saltem conatus aliquis ad nos extet, etiamsi multi singularium illius librorum expositores subinde a Galeno commemorentur. Itaque vel hinc magnitudinis, ac difficultatis promissi mei æstinatio fieri potest. Quem enim quis sequatur, aut in imitationem sibi proponat, in aliena maxime lingua, quum nullus extet, qui id tentasset in ea, qua ipse auctor scripta sua prodidit? At ego Galeni quidem exemplum mihi proposueram ex parte imitandum, non tam longis commentationibus usus ad sententiam, & res ipsas declarandas; sed viderem, ac genuinam lectionem indagaturus, ex multis adeo exemplaribus, quibus in convertendo ad Latinos Hippocrate usus sum. Ex hoc enim labore meo futurum sperabam, ut, indicata recta lectione, etiam sententia recta cognosceretur. Nam ad tam longas enarrationes pertexendas, quales sunt Galenicæ illæ, totam unius hominis vitam vix sufficere posse videbam, nedum meam; quidum hanc operam in animo volutarem, & promissionem ejus studiosis facerem, annum agebam ætatis quadragesimum quintum. Proinde hoc quidem quod ego animo volutabam, quinquennium minimum requirere judicabam; aut ad summum non multo plures annos ad id suffecturos esse credebam, quam quot in ista valetudinis firmitate sperare audebam. At Deum immortalem, quam magnum est inter cogitationes, ac actiones intervallum? Inciderunt mox tempora turbulentissima, ac periculosissima, in quibus studioso homini id tempus, quod studiis debebatur, vix ad vitam tutandam satis fuit, etiamsi quis extra teli jactum constitutus esset. At vestra, Viri Zuiccavienses, Urbs, in qua vitam duximus, ab eo tempore in perpetuo obsidionis timore versata est, & perpetuum fere impositi præsidii onus pertulit, gravissimi adeo ab initio, ut ad civitatis tutelam necessarium ab illo judicaretur, ut & suburbia, & proximæ circum circa villæ, ac vicus exurentur, ne haberet hostis, ad obsidionem paratum aliquem locum: quamquam postea compertum fuit, temere productam viuisse ejus consilii necessitatem. Tamen autem per sequentem Cæsaris victoriam pacatæ res viderentur, & firma pax futura speraretur: tamen nunquam postea

EPISTOLA NUNCUPATORIA.

postea certus pacis status fuit, sed semper aut bellici motus, aut militares expeditiones in prociñtu fuerunt, ut in hunc usque diem presidium urbi impostum sustineatis. At in istis motibus, dum turbatis patriæ rebus, in medio ejus mihi Vivendum fuit, & aliquando ad importunissimorum hominum curationem progrediendum, quantum mihi oculi quis superfuisset putaverit, ad addita illa Hippocratis scripta, nostra aliqua commentatione exponenda, ac illustranda? quum præter reliqua mala, & ad bombardarum fulmina, & ad tympanorum tonitrua fere obfurdierimus. Non ferunt has molestias Musæ placidissimum Dearum genus, sed ex turbis, ac tumultibus secedentes, solitudines petunt, & quietos montes incolunt. Non addam hic de insequentium rerum omnium inopia, & maxima annonæ caritate, quam mox excepit ingens per omnes has regiones pestis; quæ ambo mala maxima sunt bonorum studiorum impedimenta. Non addam de immensis exactionibus, per quas ad motus illos bellicos, & ad militas istas expeditiones, omnia publica æraria evacuata sunt, omnes fisci, omnes omnium loculi exhausti. Hinc certe non leve dettumentum ad nos quoque peruenit, cum nec ex arte medendi quæstus accesserit: quid enim ex misella, ac ærumnosa plebe quis exigeret? nec ex librorum scripture quicquam contigerit, aut assulserit, quo ad tantos labores perferendos essent sumptus. Conqueruntur enim, & non falso, typographi, non esse emptores librorum, non distrahi optimorum auctorum optima scripta: alioqui honoris gratia libentissime confiteor, me sæpe pro laboribus meis, & operibus oblati, liberalissimos expertum esse, Hieronymum Frobenium, & Nicolaum Episcopium, præstantissimos citra omnem controversiam Germaniæ typographos. Et hi sunt quos nominare possum, qui fuerunt mihi ad studia illa edendi in publicum mea scripta impulsores in vigesimum quintum nunc annum. Nam studiorum meorum excolendorum nomine, & ut exempla illorum in publicum edere, nullum unquam mihi nec annuum, nec menstruum stipendium ab ullo homine contigit, sed ex solo illo annuo, quod partim ut medicinæ professor, partim ut medicus physicus publicus tuli, jam triginta annos vitam dego, & rem literariam, ac medicinam pro viribus provehere pergo. Atque hæc recensere volui ut studiosi, si forte aliqui in expectatione fuerunt, non amplius inhiant nostris illis diurnaliorum laboribus; quum neque dies, neque noctes superfint mihi ad tantum opus absolvendum. Hanc autem futuro operi inscriptionem ex eo imposueram, quod diurna opera ad illud usus essem: Nam ad lucernam per multos jam annos nihil lucubravi. Ne tamen penitus omnem illorum hac parte spem fallam, revidi, & ac relegi hoc anno totum nostrum latinum Hippocratem diligenter, & ad notas illas, quas de tribus manuscriptis græcis codicibus (ex quibus etiam Basiliensis nostra editio facta est) congesti, exacte contuli, & sane sicut reddidi, & quam latinis verbis, prout potui, & res ipsa expetere visa est, expressi, eam ego judico Hippocratis sententiam genuinam: quam si quis vel ad impresos, vel ad manuscriptos græcos codices conferre voluerit, videbit quam ego sequutus sim, & expresserim lectionem; nec mox damnabit, quod in nostra translatione leget a suo codice diversum. Non enim temere mutatio aliqua a nobis facta est, sed ejus quem semper optimum, ac rectissimum codicem judicavimus, lectionem sequenti, adhibuimus etiam in multis alios Hippocratis locos, quum multæ sententiæ sint, quæ in pluribus illius libris habentur: Et haud scio, an ullam emendationis genus præstantius sit, quam hoc, quo ex ejusdem auctoris iisdem sententiis, aut omnino similibus locis, iudicium fit de vera ac recta lectione. Continget fortassis aliquando (si non ista rerum Germaniæ turbatio, ad literarum, ac omnium bonorum studiorum excidium pertinet) qui aut rei medicæ amore ductus, aut alias melioribus conditionibus usus, onus illud in se recipiet, & studiosi de promisso nostro satisfaciet, & recte facti meritam gratiam ac gloriam consequetur. Mihi satis est si venia contingit de optimo proposito, ad quod, velut diximus, præstandum sacularis nobis defuit, non voluntas: quamquam etiam illa magis ab externis causis impe-

EPISTOLA NUNCUPATORIA.

impedita fuerit, quam e nostris viribus sublata. Quicquid id est operæ, quod in secundam hanc Hippocratis nostri editionem contulimus, id totum vobis viri Zuicciavienſes dedicandum cenſuimus, apud quos mihi hic labor, quantum præ impedimentis, quæ ſupra commemoravi, & nunc etiam aſſicta valetudine contingere potuit, diligentiffime tranſactus eſt. Et apparet ſane in nomine veftro Hippocratis ſcriptorum opus, ſine quo univerſa res medica, non dico manca eſt, ſed penitus nulla, & ſi qua etiam eſſe putatur, ea nullo modo conſiſtere poteſt; ſicut & ea, quæ ab initio fundamentum non habent, & omnem ſubtracto poſtea fundamento ſuperimpoſitam conſtructionem corruere neceſſe eſt. Porro inter ea quæ me in hac ingraveſcente ætate, apud vos in chariſſima patria mea detinent, ac delectant, hoc præcipue prædicandum mihi venit, quod in his bellicis moribus, aſſictionibusque, ac exactionibus, ea animi conſtantia eſtis, ut ſincerum vere pietatis ſtudium, & dextrum artis medicæ uſum, vobis conſervandum cenſeatis. Et quia ſine literatum, ac linguarum cognitione, ad illa ſtudia perveniri non poteſt, ea eſt veſtra in trilingui ſchola conſervanda contentio, ut ipſam vobis etiam augendam judicetis, tantum abeſt, ut aut ab avis conſtituta, aut a patribus ad vos delata, imminui, aut intercipi patiamini. Hæc eſt vera Civitatum laus; hoc unicum magnarum urbium decus, ac ornamentum: Præclare enim dixit Hippocrates ad Senatum, populumque Abderitarum ſcribens: Beati profecto ſunt, inquit, populi, qui ſciunt bonos viros ſua eſſe munimenta, & non turreſ; neque muros, ſed ſapientium virorum ſapientia conſilia. Hac igitur laude maximas civitates æquatis, & plurimas in cæteris vobis pares ſuperatis: quod ipſum & præſens ætas grata vobis agnoſcit, & poſteritas, cui non minus hac parte inſervitis, ac prodeſtis, pro dignitate prædicabit. Zuiccavii Idibus Auguſti Anno Chriſti M.D.LIII.

In Catal. Opuſcul. & Interpr. Hippocr.

Pag. 4. lin. 2. Supra memoratis lege ſupra memoravimus.

Pag. 12. lin. 24. Illud tamen lege Illum tamen.

INDEX LIBRORUM.

H <i>Hippocratis vita, ex Sorano.</i>	Pag. 1	<i>Liber quartus.</i>	174
<i>Hippocratis Injurandum.</i>	2	<i>De Affectionibus.</i>	186
<i>Lex Hippocratis.</i>	3	<i>De Internis affectionibus.</i>	196
<i>De Arte liber.</i>	4	<i>De Virginitate morbis.</i>	216
<i>De Veteri medicina.</i>	8	<i>De Natura muliebri.</i>	217
<i>De Medico.</i>	15	<i>De morbis mulierum, Liber primus.</i>	224
<i>De Decenti ornatu.</i>	17	<i>Liber secundus.</i>	263
<i>Præceptiones.</i>	20	<i>Nota ad finem primi libri de Morbis mulierum</i>	
<i>De Natura hominis.</i>	21	<i>adjecta.</i>	287
<i>De Salubri diæta.</i>	27	<i>De Sterilibus.</i>	289
<i>De Genitura.</i>	29	<i>De Morbis popularibus, Liber primus.</i>	297
<i>De Natura Pueri, seu fetus.</i>	32	<i>Liber secundus.</i>	306
<i>De Carnibus.</i>	41	<i>Liber tertius.</i>	315
<i>De Septimestri partu.</i>	46	<i>Liber quartus.</i>	325
<i>De Oñimestri partu.</i>	48	<i>Liber quintus.</i>	333
<i>De Superfetatione.</i>	49	<i>Liber sextus.</i>	340
<i>De Exfectione fœtus.</i>	53	<i>Liber septimus.</i>	350
<i>De Dentitione.</i>	56	<i>De Villis Ratione in morbis acutis.</i>	365
<i>De Corporum refectione.</i>	56	<i>De Judicationibus.</i>	381
<i>De Corde.</i>	57	<i>De Diebus judicatoriis.</i>	384
<i>De Glandulis.</i>	59	<i>Aphorismi in 7. Sectiones distincti.</i>	386
<i>De Officium Naturæ, tum Adustionis, idest</i>		<i>Præmisiones.</i>	397
<i>Vesicariæ.</i>	62	<i>Prædilectum liber primus.</i>	403
<i>De Locis in homine.</i>	67	<i>Liber secundus.</i>	409
<i>De Aere, Aquâ, & Locis.</i>	79	<i>Quarta præmisiones.</i>	419
<i>De Flatibus.</i>	90	<i>De Capitis vultuibus.</i>	437
<i>De Medicamentis purgantibus.</i>	94	<i>Chirurgia officina.</i>	443
<i>De Diæta sive villis ratione, Liber primus.</i>	95	<i>De fracturis.</i>	446
<i>Liber secundus.</i>	104	<i>De Articulis.</i>	460
<i>Liber tertius.</i>	113	<i>De Ulceribus.</i>	486
<i>De Insomniis.</i>	119	<i>De Fistulis.</i>	490
<i>De Alimento.</i>	123	<i>De Hemorrhoidibus.</i>	492
<i>De Humiditatum usu.</i>	125	<i>De Viscis.</i>	494
<i>De Hemorrhoidibus.</i>	128	<i>Hippocratis epistolæ ad alios, tum aliorum ad</i>	
<i>De Morbo Sacro.</i>	131	<i>ipsum, & alios.</i>	495
<i>De Morbis, Liber primus.</i>	137	<i>Accessit</i>	
<i>Liber secundus.</i>	147	<i>De hominis Structura.</i>	514
<i>Liber tertius.</i>	166		

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la fede di Revisione, ed Approbazione del P. Fr. Tomaso Adria
Gennari Inquisitore, nel Libro intitolato: *Hippocratis Opera Omnia cum Commentario* for
Marinelli, & Indice Mathæi Pini Tomi 2. non v'esser cosa alcuna contro la Santa Fede
Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Prenci-
pi, e buoni Costumi, concedemo Licenza a Zuanne Radici Stampatore, che possi esser
stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie
alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. 20. Settembre 1734.

Andrea Soranzo Proc. Rif.

Lorenzo Tiepolo Kav. Proc. Rif.

Adi 28. Settembre 1734.

Agostino Galadini Segr.

Registrato nel Magistrato degli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Esecutori con-
tro la Bestemmia.

Angelo Legrenzi Segr.

HIP.



HIPPOCRATIS COI

Vita ex Sorano,

JANO CORNARIO

Medico Physico Interprete.

Argumentum in vitam Hippocratis, autore
Joan. Culmano, Geppingen.

- 1 *Hippocratis patria, genealogia, & praeceptores.*
Hippocrates Cnidiorum bibliotheca combusta
criminis falso accusatur. Peregrinationum
eius, & patrie deferenda caussa.
- 2 *Perdiccas tunc ab Hippocrate liberatus. Idem*

Democriti caussa Abderam vocatus. Pestem
Gracia imminentem praevia. Patriam bel-
li periculo liberavit. Quae apud suos, exte-
rosque, honores consequatur. Hippocratis in
docendo dexteritas.

- 3 *Eiusdem obitus, sepultura, & imago.*
- 4 *De scriptis Hippocratis diversa opiniones. Hip-*
pocrates pecuniarum contemptor.



HIPPOCRATES genere Cois fuit, Heraclidæ & Praxithea filii

Phenaretes filius, Ad Herculem autem & Æsculapium originem generis sui referebat, ab alteroque se vigesimum, ab altero decimum nonum se numerabat. Ejus autem genealogia Erato-

stheus mentionem facit, & Pherecydes, & Apollodorus. Ari-

us item Tarsensis. Ceterum parentis sui Heraclidæ discipulus

fuit, deinde Herodici, & ut quidam tradunt, Georgiam Leon-

inum rhetorem audivit, & Democritum philosophum Abderitem. floruit temporibus

Peloponesiacis, natus (velut Istomachus in primo de Hippocratis se-

cta tradit) primo octogesima Olympiadis anno. Soranus vero Cois, qui Co-

rum bibliothecas persecutus est, addit, sub Abriada monarchia, Agriani nensis

septima & vicesima die, in qua etiam usque in hunc diem Coos Hippocrati omnia

sacra facere tradit. Porro quum in arte medica, totoque disciplinarum orbe exer-

citatissimus esset, sanctis vita parentibus, ex patria discessit, ut quidem maligne

de eo Andreas in eo, quem de Medicinæ origine scripsit, libro prodit, propterea

quod publicam Cnidiorum bibliothecam igne concremasset. Alii autem eo propo-

sito eum patriam reliquisse dicunt, ut rei medicæ effectus & successum per mul-

tos locos cognosceret, & in his variis modis exercitaretur. Quemadmodum vero

Soranus Cois narrat, Somnus deus eum per somnum admonuit, quo se ad

Thessalorum regionem inhabitandam conferret.* Ceterum per omnem Graciam

Medicinæ gloria omnibus admirationi fuit, adeo ut etiam a Perdicca Macedonum

rege, qui tunc laborare putabatur, vocatus publice sit, ad ipsumque una cum Eu-

ryphonthe, qui ipso ætate major erat, pervenit, animique hunc regis affectum esse cer-

tis signis deprehendit. Post mortem enim Alexandri parentis, unam ex pellicum

eius numero Phylam nomine Perdiccas deperibat, ad quam quum rem ipsam Hip-

pocrates detulisset, postea ex illius conspectu omnino illum mutari observavit,

atque ita morbo depulso regem conservavit. Vocatus est & Abderam, quo præ-

sens ipse Democritum, ab infania liberaret, atque eo sanato, a tota urbe pestem de-

pelleret. Quin & in Illyricum plurimæque barbaras terras peste ingruente, & il-

larum gentium regibus ipsum ad se vocantibus, quum a legatis ipsorum, qui venti in

illis regionibus vigerent, didicisset, ipsos re infecta dimisit. At vero, quum pru-

dentis ratiocinatione pestem in Atticam grassaturam prævidisset, futurum id prædi-

xit, & tum civitatum, tum discipulorum curam gessit, intantumque Graciæ amator

fuit, ut quum ipsius nominis celebritas usque ad Persas divulgaretur, atque ea gra-

tia ab Artaxerxe per Histanidem Hellesponti præfectum, magnis muneribus &

precibus, ut ad ipsum veniret, invitaretur, ob honestatem, argenticæ contemptum,

ac Graciæ amorem, regi id denegare, quemadmodum & hoc ex epistola ejus ad il-

lum manifeste ostenditur. Propriam porro patriam liberavit, quum Athenienses

Hipp. Opera.

A ei bel.

- ei bellum illaturi essent, Thessalus ad auxilium fetendum rogatis. Quapropter splendidos honores apud Coos consequutus est: imo & apud Thessalos, Argivoeque, & Athenienses, qui eum Eleusiniis sacris secundum ab Hercule publice initiarunt, & civem conscripserunt, atque in Prytaneo alimenta tum ipsi, tum posteris ejus dederunt. Liberaliter autem, & minime invidiose studiosos artem edocuit, decenti jurejurando praeus adstrictos. * Vita sanctus est apud Larissas, quando & Degelesimo quinto, alii centesimo quarto, quidam vero centesimo nono decessisse tradunt. Sepulchrum autem est inter Gyrtonem, & Larissam, ubi usque in hunc diem monumentum ejus cernitur, in quo sane ad multum tempus examen apum mellificantium erat, quo melle ad infantum oris ulcuscula juxta rugulum illito, nutrices ea facile persanebant. Porro in multis imaginibus velato capite pingitur, ut quidam ajunt pteleo, quod nobilitatis signum est: nam hoc modo etiam Ulysses Pileatus cernitur. Alii autem pallio velatum dicunt, atque ex his aliqui, decoris gratia, id fieri asserunt, quandoquidem calvus erat: aliqui vero ob capitis imbecillitatem id fieri perhibent, aliqui autem significanter id ab eo factum volunt, nimirum quod principem rationalis animae sedem probe muniat, & contestam esse oporteat. Alii signum peregrinationes amantis, esse ferunt: alii vero rursus obsecuritatem scriptorum ipsius per hoc significari contendunt. Alii postremum in testificationem id fieri volunt, quod etiam sanitatis tempore ea, quae ledere possunt, cavere debeamus. Quamquam quidem asserunt, quod in administratione rerum gerendarum, ne quid a circumfuso pallio manus ipsius impedirentur, id ipsum complicatum in caput rejicere consueverit. * Ceterum de scriptis ipsius multa dissensio est, quare sit, ut quum alia alii opinentur, non facile sit de ipsis certum quid pronunciare, ob multas praesertim causas, quae iudicii certitudinem obscurant, velut est primum quidem cognomen. Secundo, quod dictionis characterem possibile sit servare. Tertio, quod unus, & idem modo robustiore, modo remissiore dictione per aetatem utatur: neque desunt etiam aliae praeter has causas, si referre libeat. Pecuniarum autem penitus contemptor fuit, moribusque sanctis, ac Graecorum amator, quare etiam gentiles ipsos summa diligentia curavit, adeo ut a peste omnes ipsorum civitates liberaret, quemadmodum supra dixi. Unde & splendidos honores non apud Coos tantum, sed & apud Argivos, & Athenienses est consequutus. Filios a morte reliquit duos, Thessalum, & Draconem, discipulorum vero magnam numerum. Clarissimi vero ipsius filii fuisse perhibentur,


HIPPOCRATIS COI JUSJURANDUM.

Argumentum in Jusjurandum Hippoc.

2 *Egrorum cura. Medici integritas. Chirurgia quatenus tractanda.*

1 *Dii Aedieorum. Praeceptorum cultus.*

3 *Arcana per Aedieum non efficienda.*

- 1  POLLINEM medicum, & Aesculapium, Hygeamque, ac Panaceam juro, deosque omnes, itemque deas testes facio, me hoc jusjurandum, & hanc contestationem conscriptam pro viribus, & iudicio meo integre servaturum esse. Praeceptorem sane, qui me hanc edocuit artem, parentum loco habiturum, vitam communicaturum, eaque, quibus opus habuerit, impertiturum: eos item, qui ex eo nati sunt, pro fratribus masculis judicaturum, artemque hanc, si discere voluerint, absque mercede, & pacto edociturum: praecptionum, ac auditionum, reliquaque totius disciplinae participes facturum tum meos, tum praecptoris mei filios, uno & discipulos, qui mihi scripto eaverint, & medico iurejurando addicti fuerint, alii vero praeter hos nulli. * Ceterum quod ad agros attinet sanandos, dietam ipsis constituam pro facultate, & iudicio meo commodam, & omneque detrimentum, & injuriam ab eis prohibebo. Neque vero ullius preces apud me adeo valide fuerint, ut cuiquam venenum sim propinaturus, neque etiam ad hanc rem consilium dabo. Similiter autem neque mulieri talum vulvae subdiciam, ad corripendum conceptum, vel foetum dabo. Porro praeterea & sancte vitam, & artem meam conservabo. Ne vero calculo laborantes secabo, sed viris chirurgiae operariis ejus rei facienda locum dabo. In quascumque autem domos ingrediar, ob utilitatem aegrotantium intrabo, ab omni injuria voluntaria inferenda, & corruptione cum alia, tum praesertim operum venereorum abstinebo, sive muliebria, sive virilia, liberoscumve hominem, aut servorum corpora nulli contigerint curam-

da.

da: * Quicumque vero inter curandum video, aut audiero, imo etiam ad medicandum non adhibitus, in communi hominum vita cognovero, ea, siquidem efficere non contulerit, tacebo; & tamquam arcana apud me continebo. Hoc igitur iusiurandum mihi integre servanti, & non confundenti contingat & vita, & arte feliciter frui, & apud omnes homines in perpetuum gloriam meam celebrari. Transgredienti autem, & pejeranti his contraria eveniant.

HIPPOCRATIS COI LEX.

Argumenta in Legem Hippocr.

Ad Medicum studentem, quibus dicitur opus.

1 Medicina artium præclarissima, Medicus contemptus inde.

3 Medici veri qui Imperitia eorum malus thesaurus.



MEDICINA omnium artium præclarissima est. Verum propter ignorantiam eorum, qui eam exercent, & ob vulgi rudritatem, quod tales pro medicis iudicant, & habet, iam eo res devenit, ut omnium artium longe vilissima censeatur. At vero hoc peccatum ob hanc potissimum causam mihi committi videtur. Soli namque Medicinæ nulla poena in rebus publicis statuta est, præterquam ignominie, verum hæc ipsa non afficit, neque continet eos, qui ex composito personam ipsius induerunt. Simillimi enim huiusmodi illi figuram quidem, & habitum, ac personam eorum, quos referunt, habent, illi ipsi autem vere non sunt. Sic & Medici fama quidem, & nomine multi, re autem, & opere valde pauci. * Quisquis enim Medicinæ scientiam sibi vere comparare volet, eum his ducibus voci sui competentem fieri oportet. Natura, Doctrina, Loco studiis apto, Institutione a puero, Industria, & Tempore. Primum quidem igitur omnium Natura opus est. Natura enim repugnante, irrita omnia sunt. Si vero natura ad optima viam demonstrat, artis Doctrina facile contingit, quam sane cum prudentia sibi comparare oportet, ita ut a puero institutio accedat, atque id in Loco a natura ad disciplinam apto. Amplius autem & Industriadhibere oportet: eamque ad multum omnino tempus, quo disciplina ipsa insita, feliciter, & cum profectu fructus suos producat. Qualis enim eorum, quæ terra producit, consideratio est, huiusmodi etiam disciplinæ Medicinæ per omnia similiter existit. Natura enim nostra velut ager est, dogmata præceptorum velut semina sunt. Institutio a puero cum eo convenit, quod opportuno tempore semina in arvom eidere oportet. Locus autem, in quo disciplina contingit, est velut ambiens aer, a quo e terra nascentibus nutrimentum accedit. Industria autem cultura est, Tempus postremum hæc omnia corroborat, ut perfecte enutrientur. * His igitur ad artem medicam allatis, & veris ipsius cognitione comparata, tandem per urbes obambulando, non sermone tantum, sed & opere medicos haberi convenit. Imperitia vero malus thesaurus est, & infelices opes his, qui eam repositam habent, & insomnium, aut potius somnium dædum, & maxime verum, sinceritatis, fiduciaque, ac vere emendationis experti, timiditatisque, & avaricie nutritrix. Timiditas equidem impotentiam. Audacia vero ignorantiam artis significat. Duo enim sunt, Scientia, & Opinio, quarum altera quidem scire facit, altera vero ignorare. Ceterum res sacrae hominibus demonstrantur, prophætiæ id fas non est, prius quam scientiæ origis initiatur.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE ARTE.

Argumentum in Librum sequentem,

- 1 Contra artium turpes calumnias, & quod in his sit animadvertendum.
- 2 Artes omnes esse.
- 3 Artes omnia ex speciebus imponi.
- 4 Medicina quid.
- 5 Fortunam in curandis morbis nihil posse.
- 6 Res non naturales curare morbos.
- 7 Ars ex rella, & non rella cognoscitur.
- 8 Alio argumentum Medicinam artem esse cum probat.
- 9 Causa spontanea non est. Sine causa nihil fieri.
- 10 Medicus ex his est, qui propriis quid sunt excoquit.
- 11 Medicorum in aggravidis morbis cura ac studium.
- 12 Aeris quomodo sub morborum principia scilicet.
- 13 Morbi desperati neglecti, Medicinam non impotenti.

- 14 Afflictionum via, non ars curanda est, si Medicum suum suum non consequitur.
- 15 Ratio aliamque sententia obstat.
- 16 Morbi duplices, manifesti, & occulti, & quod bonum esse etiam sine morbo.
- 17 Morbi obscuri qui. Periculi corporis duo, qui eibis suscipiunt, & dimittunt. Aspiculi corporis.
- 18 Arteriarum ingruentia quae.
- 19 Morborum ostensio sine sequitis quibus impeditur.
- 20 Natura in morbis depellendis providentia. Adhibenda causa, nisi, utrumque in petens reprimere, eiusdem est scientia. Quod, & qua ratione a morbo superatur.
- 21 Morborum clandestinorum cura, quod desperatum magis admiranda.
- 22 De extremis, & qua ratione morbi ex his cognoscuntur.
- 23 Atrendi arti car senius fides habeatur, Medicus scilicet, non dicendo praeferat.



UNT quidam, qui artem putant reliquas artes turpiter incedendo dehonore, atque id quidem veluti putant non transigunt, ut ego sane assero, sed propriam cognitionem ac scientiam ambigiose ostendunt. Mihi vero invenire aliquid eorum, quae nupdam inventa sunt, quod ipsum hominum quam occultum esse praestet, scientiae votum ac opus esse videtur. Similiterque & semiperefecta ad finem perducere, & abolvere. Ac veti verborum in honorem arte ad ea, quae ab aliis inventa sunt, confusenda promptum esse, nihil quidem corrigendo, eorum vero, qui aliquid sciunt, inventa apud ignaros calumnians, non suae scientiae votum aut opus esse videtur: sed praedio magis naute suae, aut ignorantiae artis. Solis enim artis ignorantis hoc ipsum factum convocat, qui contentiose quidem gestunt ac conantur, nequaquam vero possunt malitiae sufficere, ad hoc ut aliorum opera, quae quidem recta sunt, calumniantur, quae vero non recta sunt, reprehendant. Eos quidem ingratum, qui in alias artes hoc modo irruunt, quibus haec cura sunt, quodcumque id intercessit, & praestare hoc possunt, prohibeant. Praestans vero sermo his, qui medicinam eo modo invadunt, adversabitur, confidens quidem & animatus propter utilitatem eorum, quos insectatur: copiosus vero ob artem, qua praestat & auxiliatur: potens autem ob sapientiam, qua est eruditus. In nostrorum itaque nulla videtur, nisi ars esse quae non existat. Absurdum enim est aliquid esse putare quod non est, quinam eorum quae non sunt, quamquam substantia inspecta aliquis denunciare possit quod sint? Si enim non existentia videre non datur, quemadmodum existentia, haud equidem scio quomodo quia mente concipere queat ex quae non sunt, quemadmodum ea quae sunt, quae certa oculis videre est, mentisque intelligere quod sunt, verum ut ea nec videas, nec intelligas, non similiter contingere potest. Sed existentia quidem semper videntur ac cognoscuntur: non existentia autem neque videntur, neque cognoscuntur. Cognoscuntur itaque demonstratis iam artibus, & nulla est ars, quae non ex specie quadam seriem videntur, arbitrorque sane ego etiam nominata artibus ex speciebus accipi & imponi. Absurdum enim est existimare ex nominibus species rerum germinare & provenire. Immo etiam impossibile existit. Nomina enim lege quadam naturae indita sunt. Species autem rerum non lege sancitae sunt, sed naturae germina existunt, atque haec quidem si quis ex praedictis non ad plenum intelligat, in aliis sermonibus fortassis clarius edocebitur. De Medicina vero, utpote de qua hic institutus est sermo, claram demonstrationem faciam, & primum sane definitum quod sentio. Medicinam esse morbos ab agris in totum tollere, & morborum vehementes impetus obtundere, & eorum, qui a morbis victi sunt, curationem non aggradi, quum id in confesso sit, quod Medicina tales sanare non possit. Quomodo igitur haec Medicina faciat, & quali omnino facultate praestet, de hoc iam reliquum sermonem instituiam. Ceterum in artis demonstratione simul etiam sermo-

nes illorum, qui eam dehonestare contendunt, quatenus quisque eorum sibi quid transfegisse visus est, revelem. Principium itaque sermonis hoc erit, cui omnes assensus scio. * Quod quidem aliqui a medicina curati sanitati restituerunt, consenserunt. Quod vero non omnes, ob hoc iam ars ipsa vituperatur: ajuntque hi qui eam pejus inesse, quod hi qui a morbis apprehenduntur, eosque evadunt, fortunæ ope evadant, & non auxilio ipsius artis. Ego vero non privabo quidem ipse fortunam, tamquam nihil opere precii faciat, puto enim morbis, qui male curantur, ut plerumque infortunium accedere: qui vero bene, eos bonam fortunam nanasse. Postea vero interrogo: quomodo possibile est, sanatos aliquid, quam artem causari, siquidem ejus usu & ministerio sunt sanati? Nudam enim fortunæ speciem eos respicere ac se qui noluisse, ex hoc apparet, quod seipsum arti concediderunt. Quare a gratia fortunæ referenda liberi sunt: ab ea vero, quæ arti debetur, minime se vindicare possunt, quo minus ei sanitatem acceptam serant. In hoc enim quod se commiserunt ac concediderunt, palam esse ipsos speciem ejus esse contemplatos. Vim vero ejus parato opere cognoverunt. Dicit sane hic adversarius, quod multi jam ægri etiam citra medicorum usum sint sanati: & ego id discentibus credo. Videtur autem mihi omnino fieri posse, ut & qui medicis non usi sunt, in medicinam inciderent, non tamen ut scierint quod in ipsa rectum fuerit, & quod non rectum: alioqui contigisset, ut seipsum eodem penitus modo curassent, quo curati fuissent, si medicos adhibuissent, & hoc tandem magnum signum est substantiæ ipsius artis, nempe Artem esse, & quidem magnam, quando sane etiam hi, qui eam esse non putant, per ipsam servati apparent. Valde enim necessarium est nosse eos, qui medicis etiam non sunt usi, si ægotaverunt, & convalescerent, quod aut facientes aliquid, aut non facientes, sanati sunt. * Aut enim inedia, aut edacitate, aut uberiori potu, aut siti, aut balneis, aut illuvie, aut laboribus, aut quiete, aut somnis, aut vigiliis, aut his omnibus promiscue utentes, convalescerunt. Et sane propterea, quod opem senserunt, valde necessarium est ipsos nosse, quod fuerit aliquid, quod opem tulere. Et rursus si quid detrimenti acceperunt, necesse est & detrimentum nosse, & quod fuerit aliquid, quod damnum dedit ac lesit. Non enim quisvis cognoscere potest ea, quæ commoditate, & detrimento sunt disparata. Si igitur is, qui ægotavit, sive laudare, sive vituperare noverit quid ex dieta, per quam convalescit, omnia hæc Medicinæ esse comperiet, & sunt nihil minus ea quæ damno fuerunt, quam ea quæ opem tulerunt, in testimonium artis, quod Ars ipsa sit. * Quæ enim profuerunt, ob rectum usum profuerunt. Quæ vero nocuerunt, ob id quod non recte usurpata sunt, nocuerunt. Atqui ubi rectum, & non rectum, utrumque suum finem habet, quomodo quis hoc artem esse neget? Hoc enim ego artis expertus esse dico: ubi neque rectum, neque non rectum aliquid existit. Ubi vero utrumque horum inest, quomodo hoc non artis opus, sed potius manifestæ salutis existat? * Amplius autem si ex pharmacis purgantibus, & alvum sistentibus solum, tum Medicina, tum Medici sanationem facerent, infirmus sane sermo meus merito judicaretur. Nunc vero hi, qui inter medicos maxime laudati sunt, & dieta, & aliis medicaminum formis sanant, quas ne idiotæ quidem artis ignarus frustat, nedum Medici, artis esse negare queat. * Ubi igitur nihil neque in ipsis bonis medicis, neque in arte medica inutile est, sed in plurimis eorum, quæ ex terra nascuntur, & eorum etiam quæ sunt, species & formæ insunt medelarum & pharmacorum, non est quod amplius aliquis eorum qui sine medico convalescunt, casum spontaneum vero sermone vehere possit, tamquam causam suæ sanationis. Spontaneum equidem nihil esse apparet ac deprehenditur. Omne enim quod fit, propter quid fieri comperitur, atque etiam in singulis adeo propter quid fieri videtur. Spontaneum vero nullam substantiam habere comperitur, sed nudum tantum nomen. * Medicina autem tum ex his, quæ propter quid de industria excogitata sunt, esse apparet, tum substantiam amplius habere conspicitur. Quare his quidem qui fortunæ sanitatem acceptam serunt, atque derogant, hæc, quæ dixi respondere quis possit. Ceterum eos, qui ob morientium calamitatem artem demoliri contendunt, miror quam memorabili ratione commoti. Intemperantiam quidem morientium causam mortis non statuunt, scientiam vero eorum, qui medicinam exercent, accusant: tamquam sane Medici quidem ea, quæ non convenient, imperare possunt. Ægri vero quæ imperata sunt, transferre non possunt. Atqui longe magis rationi consentaneum est, ægros non posse facere quæ imperantur, quam medicos non convenientia jubere. * Medici namque sana mente, sanoque corpore rem aggredientes, & præsentia considerant, & de præteritis similiter, iuxta præsentia ratiocinantur, intantum etiam ut aliquando palam gloriari soleant ægri, se illorum opera sanitati restitutos esse. * Ægri vero neque qua parte laborent, neque ob quam causam laborent, neque quid ex præsentibus futurum sit, neque quid ex horum similibus fieri scientes, medici imperio subjacent, dolentes quidem ob præsentia, timentes autem futura: & pleni quidem morbo, inanem autem ciborum, ea quæ morbo grata sunt, quam quæ ad sanitatem faciunt, assumere malunt, mori quidem non amantes, sed tolerare tamen non potentes. Hoc modo autem affectos, utrum verisimilius est, hos a medicis imperata facere, an alia facere, quæ mor-

- 110 dici non iusserunt? aut medicos tales, quales superiori sermone declaravi, non convenientia imperare? Nonne multo magis hos, quidem, quæ convenientia iubere? illos autem temere & impotenter nolle obedire? atque sic inobedientes in mortem incidere? Quæ sane qui non recte considerant, causas ad hos, qui inculpabiles sunt, referunt: eos vero, qui maxime accusandi sunt, a culpa liberant, & defendunt. Porro sunt item quidam, qui ob eos, qui victis a morbis curam adhibere noluit, medietatem ipsam reprehendunt, dicuntque, quod morbi, quos sanare aggrediuntur illi, per se ipsos fuissent sanati. Qui vero auxilio opus habent, eos non continent. Oportebat autem, inquit, liquidem ars erat, omnibus aequè morbis sanitatem afferre. Qui igitur hæc dicunt, si medicis indignarentur, quod ipsorum talia dicentium, non ut delirantium, curam habeant, merito sane succedissent magis, quam quod illa reprehendunt: si quis enim ab arte potentiam in ea, quæ non profuerit, aut a natura facultatem in ea, ad quam nata non est, exigat, is ignorat instantiam demeritæ potius, quam ignorantie convenire. Quorum enim instrumentorum sive naturæ, sive artium facultatem obtinemus; per ea sane opifices esse possumus, per alia vero maxime licet. quum igitur homo morbo afficitur, qui vehementior est quam medicinæ instrumenta, ne sperare quidem oportet, ut a medicina exuperetur. Exempli enim gratia, inter ea, quæ in medicina utendi vim habent, ignis extreme uris, venum co minus etiam alia multa. An vero ex eis præstantiora leviores morbos curare non possit, nondum satis constat: valentissimos autem morbos potentissima etiam instrumenta curare non posse, quomodo non sit manifestum? Quæ enim ignis non efficit, quomodo ea, quæ ab illo non sunt domita, non ostendant, quod alia ars opus habeant, & non ea, in qua ignis instrumentum existit? Idem sentio & de aliis instrumentis, quæcumque medicinæ opus adiuvant, quorum omnium singulatum successum si non assequitur Medicus, vim affectionis accusare oportet, mea quidem sententia, non ipsam artem. Qui igitur eos reprehendunt, qui victis a morbo manum adhibere reculant, hortantur etiam, ut ea, quæ non continent, attingant non minus quam ea, quæ contingere interest artis, quod quum faciunt, his quidem, qui nomine medici sunt, admirationi sunt, ab his vero, qui arte præstant, deridentur. Nec vero adeo desipientes huius artis expertissimi, neque viroperatoribus, neque iudicatoribus indigent, sed ratione, ad quam sane actiones opificum absolute plene sunt, & quæ ab ea destituta, maneat. Amplius vero etiam defectus aliquos quidem opificibus imputare oportet, aliquos vero ipsis operibus. Quæ quidem igitur ad alias artes pertinet, aliud tempus, aliisque sermonem requirunt. Quæ vero ad medicinam, qualia sunt, & quomodo iudicanda, partim quidem superiori sermone ostendimus, partim vero præsentis oratione docebimus. Sunt enim hi, qui hanc artem probe norunt, morbi partim non in obscuro positi, & non multi: partim non in manifesto loco hærentes, & multi sunt. Qui enim ad interna vertuntur, in obscuro sit; sunt. Qui vero ad superficiem corporis erumpunt, aut tuncescunt, manifesti sunt, exhibent enim sese, ut nun. vultum, tædum & soliditas, & humiditas ipsorum percipiatur, & quicquid sit quod frigidi sentiantur, qui sane singulorum aut præsentia, aut absentia tales existunt, atque horum quidem omnium in omnibus certis, ac infallibilis index esse oportet, non ob id quod faciles sint, sed quod certo invento consentiant. Neque vero a quibusvis volentibus inveniantur, sed ab his qui volunt, itemque possunt, possunt autem quibus cum disciplina non eminus, sed prope & largiter contingit, tum natura non infelix liberaliter accessit. Ad manifestos quidem igitur morbos hoc modo artem divite facultate præditam esse oportet. Neque vero ad minus manifestos eam inopem ac debili hætere convenit. Sunt autem morbi minus aperti, quique ad ossa, quique ad ventriculum sunt conversi. Habet autem corpus non unum ventriculum, sed plures. Duo enim sunt quæ cibum suscipiunt & demittunt, alique præter hos plures, quos norunt hi, quibus hæc res curæ fuit. Quæcumque enim membra eunem in ordinem circumstant habent, quam musculum appellant, ea omnia ventriculum habent. Omne enim inconvenerunt & quod non coaruit, sive pellicula, sive carne contegatur, cavum est. Impletur autem, dum sanum est, flatu, dum agrotat, fanie. Habent itaque brachia talem carnem, habent & scemora, habent furæ. Quæ & in macilentis & ex carnisibus partem ejusmodi caro inest, similiter ut in carnisibus esse demonstratum est. Nam & qui thorax appellatur, in quo hepar continetur, & caeteris circumfusus, in quo cerebrum concluditur, ipsique adeo dorsum, ad quod palmo vergit, horum membrorum nullum est, quod non & ipsum vacuum sit, ac multis segmentis plenum ac quasi discriminatum existat, quæ parum abest ut vasa existant, quorum tamen aliqua habentem ladam, aliqua vero etiam possunt. Præter hæc autem & venæ multæ, & nervi non in carne sublimes, sed ad ipsa ossa producti ligamentum sunt articulorum: ipsi etiam articuli, in quibus ossium, quæ moventur, committunt involvuntur, & horum nullum est quod non subpulvum sit, & rursus se forulos habeat, quos sanies prodit, quæ deducta ipsis, multa & magno multorum morborum egreditur. Ex prædictis itaque omnibus nullum est quod oculis conspicitur videre, ac cognoscere contingit, quapropter etiam obscura mihi appellata sunt, & ab arte quoque obscura esse iudicata sunt, non tamen quod obscura perneant.

neant, & nos vincant, sed quantum possibile est, cognoscantur, & superentur: possibile autem est, quantum agrorum nature ad considerandum conferunt, & 180 quantum eorum, qui periclitantur sunt, nature ad perferendum apte sunt. Cum multo enim labore, sed ad naturam ipsius agri, itidemque ipsius morbi. Medicus enim, quin non possit malum neque visum assequi, neque audiendo ex aliorum narrationibus cognoscere, ratiocinatione ipsum persequitur. Etenim ipsi quoque agri, qui obscuro morbo laborant, si conentur medicis de morbis suis narrare, ex opinione magis, quam scientia narrant. Nam si scivissent, in ipsos sane medicos non incidissent, quum eiusdem scientie sit morborum causas nosse, & morbos ipsos omnibus medicamentis, quæ augescere morbum prohibent, curare posse. Quando igitur neque ex agri narrationibus ad infallibilem certitudinem pervenire possit, alio certe respicere medicum necesse est. Quare huius tarditatis non ars ipsa, sed corporum natura causa existit. * Hæc enim malum sentiens, mederi magnopere gessit, considerans tamen ne temeritate magis quam consilio, & ut facilitate magis quam violentia medetur. Medicus vero, si quidem suffecerit ad cognoscendum, sufficit etiam ad sanandum. Si vero is, in quo morbus cognoscitur, superetur, ob id sane quod serius medicum accessit, aut ob morbi celeritatem peribit. Si enim ex æquo processerit motibus cum medicina, velocior non est. Si vero præoccupaverit, velocior omnino existit, præoccupat autem tum propter corporum angustiam, in qua non in conspicuo inhabitant morbi, tum propter agrorum negligentiam. Differunt enim & cunctantur, atque ubi jam a morbis ipsis apprehensi sunt, tum demum curari volunt, ac expetunt. * Quare artis potentiam magis ex merito admiremur, si quem ex clandestino morbo agrum restituat, quam si impossibilibus, & desperatis opem ferre molitur. Nequaquam vero in ulla aliqua jam inventarum artium tale quiddam inest. Sed quæ ex eis igne opificum exercent, igne non præserte, ociose sunt. Ubi vero illum contigerunt, operose. Quæ item tractabili rerum materia artem suam exercent, veluti aliæ quidem lignis, aliæ coriis, aliæ ferulendo tum ære, tum ferro, aliisque similibus rebus earum quam plurimæ. Opera porro, quæ ex hac materia, & cum huius materie instrumentis sunt, tametsi facile retractari, ac corrigi possint, tamen non magis velocitate, quam velint decet, perficiuntur, neque desuntorie transiliuntur, verum si quod instrumentum desit, interim quiescent, quamquam etiam illis cunctatio, & tarditas ad opus commodius absolvendum impedimento sit. Attamen opus laudatur, & præfertur. 215 Medicina vero aliquibus quidem ex suppuratione thoracis, aliquibus vero iuxta hepar, & thenes, aliis autem per omnes corporis ventriculos agrotantibus, eorum omnium inspicendi potentia privata est: quod ipsum apud omnes in confesso existit, alias tamen facultates coadjutrices adinvenit. Vocis nimirum claritatem, & tarditatem, itemque fluxiones, quæ singulis locis, per quos exitus eis dantur, destillare consueverunt: quantum modo odores, modo calores, deinde etiam ponderatam tenuitatem, ac crassiciem observat, ex eisque signa tum eorum, quæ agri jam perpetiuntur, tum quæ perpeti possint, colligit. Quum vero hæc significationem de se præbeant, neque ipsa natura voluntaria dimittat, vires amplius, ac necessitates medicina ipsa invenit, quibus natura coacta indennis tamen concedat. * Natura autem stimulata, & impulsæ, artis peritis quæ facienda sunt demonstrat. Cogit autem partim coalitum in nobis calorem, pituitam per ciborum, ac potuum acrimoniam diffundere, quo intelligat, quid sibi visum sit de illis, quæ ut viderentur ipsa machinata est: partim vero spiritum velut delatorem tum vis arduis, tum cursibus accusare, ac prodere cogit. Quin & sudores per prædicta ducens, ac excludens, humorum calidorum exhalationem perficit. Sunt præterea quæ per vesicam pergressa magis morbum ostendere possunt, quam quæ per carnem exhalant. Invenit igitur & tales potiones itemque cibos, qui calidiores alias calefacientibus existentes, illaque & eliquant, & profluere faciunt, quæ sane non profuissent, si non hoc modo tractata fuissent. Alia itaque ex aliis, & alia per alia procedunt, quæ corpus pergressa morbum ipsum produunt. * Ut nihil miri fit ipsis serius fidem haberi, & medendi conatus, ac aggressiones tardiores esse, quum sic per peregrinas interpretationes ad medendi scientiam, ac cognitionem medici perveniant, ac erudiantur. Quod igitur & rationes in seipsa plenas, & ad ferendum auxilium abundantes habet medicina, & quod morbis, qui corrigi non possunt, merito auxiliares manus negat, aut si forte opem ferre molita est, citra culpam eam exhibet, id ipsum tum jam habitus sermo manifestum facit, tum etiam artis peritorum demonstrationes palam documentum præbent, quas sane ex operibus iucundius, quam ex sermonibus ostendunt: utpote qui dicendo non magnopere exercitati, multitudini fidem sinceriores ex his quæ videat, quam quæ audiat, facere malint. 225

8 HIPPOCRATIS COI LIBER DE VETERI MEDICINA.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Qualitates primas neque fundamentum, neque scopum Medicinæ esse.
- 2 Artem confirmant observationes boni & mali. Artificum in Medicina differentia.
- 3 Calidum, ac subterraneam veram scientiam incerta. Medicina antiquitas, & certitudo.
- 4 Medicinam artem esse ex vulgari confessione, & vitii errorum, ac sanorum differentia demonstrat.
- 5 Idiota affectionum accidentia difficultè agnoscunt.
- 6 Medicina necessario inventa.
- 7 Homines ab initio ventorum vitia sunt isti.
- 8 Panis, & Maza prima inventio, & confessio. Medici serinam vitia rationem primi temperant.
- 9 Medicina cur non patitur ars.
- 10 Medicina ex vitia errorum, ac sanorum differentia inventa.
- 11 Sorbitionem invento natura imbecilliores initium dederunt.
- 12 Potus inventum, ac temperamentum. Sorbitiones inconuenientes morbis sacramenta præbent.
- 13 Alimentum secum propter suam similitudinem magis laedit.
- 14 Mansuetam, ac convenientem vitii rationem agra magis ledere, quam ferinam sanis.
- 15 Ars medica methodo quaesita invenitur. Medicina non est res simplex & facilis. Fama vis.
- 16 Vitia modis ex solo corporis sensu colligitur.
- 17 Medicus gubernatori similis.
- 18 Facinationis intemperata non minor esse mala, quam repletionis.
- 19 Vitia permixta mala.
- 20 Cibus semel aie bis assumere consueti quæ ratione laeduntur, si a consuetudine recesserint.
- 21 Natura imbecilles vitia a causis externis, & permixta vitia ratione laeduntur. Ars medica, propter certitudinem exactam, quæ in ea est difficilis, non est rejicienda.
- 22 Qualitates primas neque Medicina propinqua esse fundamentum, neque hominibus ledere.
- 23 De Panis temperatura questio anceps. Panis pro sua natura, naturas tam errorum, quam sanorum varie afficit.
- 24 Medicina Deo scripta.
- 25 Qualitatum secundarum excessus, & def-

ctio hominem laedit. Item cibi & potus incommodi & fortiores.

- 26 Cibi ad voluptatem comparati quæ rationem laedunt. Robor & augmentum corporibus ex temperato contingit. Calidum frigidum, humidum siccum; nihil in seipso purum ac impermixtum invenitur.
- 27 Calidum assumere non potest aegrotis superari. Qualitates secunda primis sunt fortiores.
- 28 Frigidi temperamentum a calido, & contra.
- 29 Corpore sanorum quomodo extreme caliditatis, aut refrigeris per balnea, ac exteriora.
- 30 Febre ardere laborantes non cito, calore liberantur. Calidum non simpliciter febrium, aut afflictionum homini causa.
- 31 Coræ seu gravitatis causa, & curatio. Gravitas ex frigilitate.
- 32 Oris fluxionis transit, & curatio. Concoctionis ratio ex temperatura mutua.
- 33 Fluxionem in sanos ratio. Afororum causa rita quæ sunt. Epilogus de fluxionibus.
- 34 Qualitatum secundarum facultates, omnino malorum homini causa, Bilis arguta facultas.
- 35 Coactionis humorum species varia. Calidum & frigidum a natura non superari. Calidum & frigidum, quid permixtum, & quid non. Homo quando optime dispositus.
- 36 De homine quærent Sopha ac medici aliquid cognoverint.
- 37 Finem meratum large basibus hominum aliquo modo debiliorem reddit. Cæsus gracilibus prodest. Cæsus non toti naturæ humanae malus est; aliquot potius ex aqua ledere.
- 38 Ciborum, balneorum, exercitiorum natura ignorata, medicis erroris causas præbent. Affectiones quæ in homine cognoscenda. Facultas, & sepea quæ.
- 39 Figura quæ ad humiditatem ex corpore trahendum sunt idonea; Figura intra bantium quæ sunt.
- 40 Figura spongiformis. Strepitus de sanis in cervis ac amplis porribus. Torpore, & ex crescentia ex stribus.
- 41 Flatus quomodo circa hepæ coarctantes, eius loci dolorem suppurationes, ac tubercula efficiunt. Septum transversum caræ stribus minus ac variis delect.
- 42 Humor in homine potestas, & motus. Medico necessaria cognoscenda. Opera in quæ re quæant.



omnes in maximis
et alii viles, alii longe præstantes, quod sane si non esset omnino medicina, neque in

QUICUNQUE de medicina dicere, aut scribere aggressi, dicendi scopum sibi ipsi ac fundamentum supponerunt calidum aut frigidum, aut humidum aut siccum, aut aliud quodcumque voluerint, rem in compendium contrahentes, principium causæ tum morborum, tum mortis, hominibus omnibus idem, unum aut duo proponentes, hi in multis quidem, quæ dicunt manifeste errasse deprehenduntur. Justior autem quærela est de arte, quæ utuntur, & bonos artifices maxime colunt. * Sunt autem opifi-

ipsa observationes essent, neque quicquam inventorum, non utique extaret, sed omnes. 10
 aequaliter ejus ignari & inexperti essent, & per fortunam omnes agrotorum res gubernarentur. Nunc vero res non sic se habet, sed quemadmodum aliarum omnium artium opifices multum inter se differunt tum manu, tum mente, sic etiam in medicina. Quapropter non censeo ego ipsam manū fundamento indigere, velut obscura & dubia, 15
 3 de quibus si quis dicere conetur, necesse est fundamento uti. * Velut si quis de sublimibus in aere rebus, aut de subterraneis dicat, & quomodo habeant, sciat, tamen neque dicenti, neque audientibus manifestum satis fuerit verae sint an secus. Neque enim est ad quod quis se conferat, cuique innitatur, ut veritatem cognoscat. Medicina autem jam ab antiquo existit, & principium, & via inventa, per quam inventa & multa & probe habentia comperta sunt, per multum adeo tempus, & reliqua deinceps inventiuntur, si quis sufficiens sit, & jam inventorum gnarus, ex his 20
 4 ad perquirendum procedat. Quicumque vero his rejectis, ac omnibus reprobatiss, alia via, aliaque forma inquirere conatur, & quid invenisse gloriatur, falsus est, & falsitur. Impossibile enim id est. * Verum ob quas necessitates impossibile sit, ego demonstrare conabor, docens ac demonstrans, quod ars existat. Ex hoc autem palam fiet, impossibile esse aliquo alio modo inveniri. Videtur autem mihi maxime, de hac arte dicturum oportere vulgo ac plebei hominibus nota dicere. Neque enim de aliquopiam neque querere, neque dicere convenit, quam de affectionibus, ex quibus illi ipsi agrotant. * Ipsos quidem igitur suas ipsorum affectiones considerare, quomodo fiunt, ac desinunt, & quibus occasionibus augeantur, ac desinant, quum 30
 5 idiotae sint, non est facile, verum ab alio inventas, ac proditas, proclive. Nihil enim libentius quisque recordatur, quam quae sibi ipsi accidisse audiat. Si quis autem idiotarum sententia destitueretur, & audientes non afficeret, ille etiam veritatis compos non fieri, & propterea neque fundamentum, neque seopo opus habet. Etenim Ars medica neque inventa ab initio fuisse, neque quarsa. Nihil enim ea opus erat agrotis hominibus, si eadem dicta uterentur, & assumerent quae sani edunt ac bibunt, 35
 6 imo etiam alterius diatae usus eis profuisset, si non alia fuissent his iustiora. * Nunc autem ipsa necessitas homines eogit Medicinam inquirere, ac invenire. Quoniam agrotis eadem in cibo alimentibus, quae sani solent, non fuit utile, velut neque nunc utile existit. Quin ut rem altius expendamus, neque ipsam sanorum diatam ac alimoniam, qua nunc utuntur, inventam fuisse censeo, si sufficisset homini idem cibus ac potus, qui bovi, ac equo, & omnibus aliis praeter hominem, veluti sunt ex terra nascentia, fructusque, ac herbae, & scenum. Ex his enim nutruntur, & augescunt, & illi degunt, non indigentes alia diata. * Quoniam ego sane ab initio etiam hominem tali victu usum esse putem. Quae vero nunc inventa sunt egilia, multa arte excogitata, & multo tempore producta esse mihi videntur, quum multa & gravia ex fortis ac sereno victu homines paterentur, qui intemperant, & magnas vires habens ingerebatur. qualia sane etiam nunc ex ipso paterentur, doloribus vehementibus, & morbis obnoxii, & brevi etiam morti. Verisimile est autem hac mala tunc minus perpellos ipsos esse, propter consuetudinem, quoniam etiam tunc vehementer afflicti sint, & consentaneum est plurimos, & debiliores natura praeditos perisse, eos vero, qui victum illum superare poterant, longiori tempore durasse, ac resistisse. Quemadmodum etiam nunc ex validis edulis aliqui facile liberantur, alique cum multis doloribus, ac malis. Ob hanc itaque necessitatem etiam illi mihi videntur quassivisse victum naturae convenientem, & inventisse hunc, quo nunc utimur. * Ex triteo igitur macerato, & a corrice purgato, molliorque ac cribrato, & subacto ac assato, panem fecerunt. Ex hordeo vero mazam, aliaque multa ex hoc excoctantes, coxerunt, & assarunt, & miscuerunt, fortiaque & intemperata debilioribus temperarunt, effringentes omnia juxta hominis naturam ac vires, quae quidem fortiora essent, ab ipsa natura non posse superari, si ingesta essent, existimantes: ab his ipsis quoque dolores & morbos ac mortes oriri iudicantes: conera ab his quae natura domare posset, alimentum & augmentum & sanitatem: Porro invento huic quodam iustius, aut magis conveniens nomen quis imposuisset quam medicinam? quandoquidem ad hominis sanitatem, alimentumque ac salutem inventum est, in permutationem illius victus, ex quo dolores, & morbi fiunt. * Si vero ars ipsa esse non putatur, nihil absurdum est. Nam cuius nemo ignarus est, sed scientes omnes, ob usum & necessitatem, ejus non convenit aliquem artificem appellari. Atqui inventum ipsum & magnum, & multae artis ac considerationis existit. Quinetiam in hunc usque diem exercitiorum & reparandarum virum curam gerentes, semper aliquid amplius adveniunt, juxta eandem viam investigantes, quod quis edens ac bibens maxime superet, ac seipso fortior evadat. 70
 9 * Consideremus itaque & confellam ab omnibus medicinam, eam videlicet quae propter agros inventa est, an & nomen & artifices habeat, & ipsa dominari ipsis velit, & unde tandem initium sumpsit. Mihi equidem, velut in principio dixi, nemo ne quassivisse quidem Medicinam videtur, si idem victus & agrotis, & sanis convivisset. Itaque usque in hunc diem hi qui medicina non utuntur Barbari ac Graeci confines, eodem modo quo sani victitant ad volupratem, & a nulla re quam concupiscunt, ablinent, neque quicquam devitant. Ceterum qui Medicinam quassaverunt

- verunt ac invenerunt, eandem cum illis de quibus superiori sermone dictum est, sententiam habuerunt, & primum quidem ex his ipsis cibis copiam detraxerunt, & pro multis paucos statuerunt. * Quum vero ipsis aliquando hoc ad aliquos agros sufficeret, palamque fieret, quod prodesset, non tamen omnibus, sed essent quidam ita habentes, ut neque modicos cibos superare possent, imbecilliore sane quopiam tales indigere illis visi sunt, sorbitionesque invenerunt, pauca ex fortibus multa aqua permiscerent, & robur ipsum temperatura ac coctura detrahentes. * Quod si qui neque sorbitiones superare possent, his detraxerunt etiam ipsas, & ad potiones pervenerunt, observaruntque, ut & haec tum usui, tum copia moderate haberent, & neque plures quam oportet, neque meraciores & inrempiores, neque defectuosiores offerentes. Probe autem nosse oportet, quibus sorbitiones in morbis non conducant. Nam statim ubi hoc fecerint, exacerbantur ipsis febres ac dolores, & manifestum fit, quod assumptum morbo quidem alimentum ac incrementum praebet, corpori vero tates & infirmitas existit. * Quicumque vero homines in hac affectione existentes siccum cibum assument, aut mazam, aut panem, etiam valde modicum, decuplo magis & manifestius laeduntur, quam si sorbitione usi essent, ob nullam aliam causam quam fortitudinem edulii ad affectionem, in quo fortere conducit, edere autem non. Si enim plura comederit, plus utique laederit: si vero pauca, dolebit tamen omnino. Omnes itaque doloris causae ad idem reducuntur, nimium fortissima edulia maxime, & manifestissime hominem ledere, sive sanus sit, sive agrotus. Quid igitur aliud cogitasse videri queat hic appellatus Medicus, & confessus artifex, qui agrorum dietam ad victum adinvenit, quam ille qui ab initio omnibus hominibus victum, quo nunc utimur, ex agresti illo ac ferino reperit ac subornavit? Mihi equidem videtur idem modus, & unum quoddam, ac simile esse inventum. Hic enim ea quae natura humana sanis superare non potuit incidentia & ingesta, propter feritatem intemperantiamque ille vero qualicumque tandem uniusquisque affectione teneretur, ut superare non posset, eadem detrahere quaesivit ac instituit. Quid hoc ab illo differt? praeterquam quod multiplicior, & variegatior ac majoris negotii est haec species. Verum principium tuit illa, quae oculus est producta. * Si vero quis consideret, quae sit agrotorum dieta, comparatione ad sanorum dietam facta, is inveniet hanc agris nocentiorum, quam eam, quae sanorum est & aliorum animalium, sanis. Etenim vir laborans morbo neque difficilis, & intolerabili, neque rursus levi & despicibili, si panem aut eamque, aut aliud quid ex his, quae sani edentes juvantur, comedere volet, non multum, sed multo minus quam sanus poterat, contingat autem ut nec sit qui eum delinquere admo neat. Alius contra sanus naturam habens non omnino debilem, neque rursus fortem, si comederit quid eorum, quae bos aut equus comedens juvatur, & edat sane eorum aut hordeum, aut aliud quid huiusmodi, non multum, sed multo minus quam potest. Sanus utique qui hoc fecerit, minus & dolebit & periclitabitur, quam agrotus ille, qui panem aut mazam in tempestive ingessit. Haec itaque omnia signa sunt, quod ipsa ars medica via ac methodo quaeque inveniri possit. * Si quidem igitur simpliciter, velut aliqui putant, quae fortiora sunt, nocerent, quae debiliora prodesse & nutrent, tum agrum, tum sanum, facilis sane res erat. Multum enim de securo detrahere oportebat, ut ad debilissimum deduceretur. Nunc autem non minus delictum, nec minus laedit hominem, si pauciora & defectuosiora, quam satis est, assumentur. Fames enim magnam potentiam in naturam hominis habet & sanandi & debilitandi & occidendi. Multa vero etiam alia mala, diversa quidem ab his, quae ex repletionem sunt, non minus autem gravia, vacationis sunt, quapropter multo variegatior est, & maiorem diligentiam requirit. Oportet enim modum aliquem conjectare. * Modum autem neque pondus, neque numerum aliquem, ad quem referas, cognoscere: certitudinem enim exactam non reperies aliam, quam corporis sensum. Quapropter operosum est ita exacte condiscere, ut parum in alterutram partem delinquant, quamquam ego etiam cum medicum vehementer laudam, qui parum delinquit. Certitudinem autem exactam raro videri contingit. * Quare plerique Medici eadem, quae mali gubernatores, in se admittere mihi videntur. Etenim illi, quam in tranquillitate gubernantes delinquant, non sunt manifesti: quum veroprehenderit ipsos ventus magnus & tempestas, palam iam conspicui sunt omnibus hominibus, quod ignorantia & culpa erroris sui navem perdididerunt. Sic sane etiam mali & plurimi medicis, quam curant homines nihil grave patientes, in quos si quis etiam maxime delinquit, nihil grave faciat. Sunt autem multi tales morbi, & multo saepius quam graves hominibus accidunt. In talibus sane delinquentes, non sunt manifesti idiotis hominibus. Ubi vero obtingit magnus & fortis & periculosus morbus, tunc ipsorum delicta & ars omnibus in conspicuo sunt. Neque enim longe absunt singulorum poenae ac cruces, sed brevi adsunt. * Quod autem non minores afflictiones ab intempestiva vacatione quam a repletionem hominibus contingant, probe discemus, si in sanis rem expendimus. Sunt itaque aliqui ipsorum, quibus semel in die cibum capere conducit, & hoc propter utilitatem sic observant. Alii etiam praeferunt propter eandem necessitatem, sic enim ipsis conducit: Sed & quidam non propter utilitatem, sed ut ob

voluptatem, aut ob alium aliquem causam aliter utrumque faciunt. Plurimorum enim hominum nihil interest utrum tandem faciant, sive semel tantum edant, sive etiam prae-
 19 deant, hinc consuetudine uti. * Sunt autem quidam, qui non possint extra utilitatem facientes facere degere, sed contingit utrisque ipsorum, per diem unum atque eum non ocio-
 so permittentibus, immensa afflictio. Alteri enim si praevis fuerint, idque eis non condu-
 cat, statim graves & corpore scabies sunt, itemque mente pigri, hiantique, ac oseeatio-
 ne, & dormitatione, & siti pleni. Si vero etiam insuper coenaverint, & flatus, & tor-
 mina, & alvus effringitur, & multis magni morbi principium hoc fuit, si eosdem ei-
 20 bos, quos semel insuper consumuerunt, bis assumant, & nihil his amplius. Alteri ve-
 ro si prandere consueverint, idque ipsis conducatur, & non praefici fuerint, mox ubi
 tempus praeterierit, statim impotentia vehementer, tremor, animi deliquium, possi-
 ca oculi pallidi, urinae crassa & calida, os amarum, & viscera pendere ipsis video-
 tur, vertigo, iracundia, tristitia, haec autem omnia, ubi coenare tentaverint, dein-
 21 de autem praefici consumere non possunt, quae prius coenarunt, atque haec ipsa cum
 tormine ac strepitu descendencia alvum concludunt, ipsisque agere dormiunt, insomnia-
 que conturbata ac tumultuosa habent, plerisque vero etiam morum hoc magni
 morbi principium fuit. Considerare porro oportet ob quas causas haec ipsis acci-
 22 derunt. Ex sane puto his, qui semel cibum sumere consueverunt, quod non expecta-
 verunt iustum tempus, donec ipsorum venter pridie ingessis cibos perfecte consum-
 pisset & exsuperasset, evacuatusque esset, ac quiesceret, sed in ferventem adhuc &
 fermentatum novos ingererunt. Eiusmodi autem ventres multo tardius conco-
 quunt, & maiori opus habent cessatione ac quiete. Hi vero, qui prandere assue-
 23 runt, quod non ubi cessasse alimento corpus indigebat, & jam priora con-
 sumpta erant, nec habebat aliquam amplius fritionem, statim ipsi novum alimenta-
 tum suppeditatum est, delectantem, & consumitur praefatam. Nam omnia, quae tan-
 24 tes homines perpeii dixi, fami impuro. * Dico autem etiam alios omnes homines,
 qui duos aut tres dies iudicium perculerint, eadem passuros esse, quae de impran-
 tis dixi. Ceterum tales naturas, quae curas, & fortiter eiusmodi delictis offenduntur,
 imbecilliores aliis esse, censeo, proximus est autem imbecillis languenti: verum im-
 becillus est languens, & plus laborare contingit ipsum, ubi iustum tempus non
 est assequutus. Quam itaque eiusmodi exacta curatio circa artem existat, diffi-
 25 bile est semper, quod rectissimum est, assequi. Multa autem species in Medicina
 ad tantam certitudinem pervenit, de quibus dicitur, Non censeo itaque pro-
 pter hoc anem velut non existentem, neque probe investigatam, veterem opor-
 26 tere reici, quod non habet circa omnium certitudinem exactam. Verum mul-
 to magis propter quod propinquum est recto, si nique ratione possit ad ipsum
 pervenire, adquirari oportere censeo: ea, quae ex multa ignorantia sunt eruta, & in-
 27 ventae, quod probe & recte adinventae sunt, & non a fortuna aut casu. * Porro ad
 eos, qui novo modo artem ex seipso, ac fundamentis suppositis quaerunt, sermo-
 nem reducere volo. Si enim calidum est, aut frigidum, aut siccum, aut humidum,
 quod hominem laedit, & oportet recte medentem auxiliari, calido quidem
 28 in frigidum permutato, frigido vero in calidum, siccum in humidum, humido in sic-
 cum. Contingat mihi homo non fortis naturae, sed ex debilibus, hic autem tri-
 tium edat, quod ex aere sustulit crudum, & non elaboratum, & carnes, crudas
 29 & bibit aquam. Hoc videtur utrens; fari scio, quod multa, & graviora perperitur,
 Nam & doloribus vexabitur, & corpus debile evadet, & venter corumpetur, &
 multo tempore vivere non poterit. Quod igitur auxilium praeparare oportet sic
 30 habentis calidum, an frigidum, vel siccum, vel humidum, simplex enim est quodcumque
 ex istis. Si enim id, quod ipsum laedit, aliquod ex his est, contrario solvere oportet
 ac liberare, quemadmodum ipsum sermo testatur. Atque certissimum, & mani-
 31 fessimum medicamentum est, victum quo utebatur auferre, & pro teritico panem dare
 pro crudis vero carnibus coctas, insuperque vinum propinare. His permutato, impos-
 sibile est non fieri sanum, nisi penitus fuerit tempore, ac vici corruptus. Quid
 itaque dicemus? Num quod ipsi a frigido afflicti calida haec oblata auxilium tuler-
 32 runt, aut contra? Equidem opinor me multam habitationem interrogato praebitum
 esse. * Nam qui panem ex tritico paravit, calidum, aut frigidum, aut siccum, aut hu-
 midum abstulit panis enim & in ignem, & in aquam datur, & multis aliis elaboratus est,
 quorum singula propriam vim & naturam habent, & aliquam quidem a natura in ipso
 33 existentia abicit, aliis autem temporatur ac permisceatur. Sed & hoc scio, quod in co-
 ctis hominis refert, panis purus, aut cui nihil farisum decessit, & ex tritico non
 decorticato, aut decorticato, & multa aqua subactis, aut contra, & superaffatus
 aut erudior, aliaque praeterca infusa. Similiter etiam de maza, & singulorum adeo
 vires magnas, alteraque alteri nihil simile habet. Quicunque autem haec non considerans
 non novit, haud scio quo modo ille affectiones in homine cognoscere possit, ab
 34 innoquos enim horum afficitur, & alteratur homo vel hoc, vel alio modo, & ex
 his omnis vita & sano, & ex morbo convalescent, & aegroti. Nihil igitur utilius,
 neque magis necessarium, quam haec cognovisse, quod & probe & convenienti ratio-
 35 natione, investigantes, iuxta hominis naturam haec primi inventores invenerunt,
 iudicaveruntque artem dignam quae Deo adscriberetur, quemadmodum etiam est rece-
 36 ptum.

- ti febris febricitans, intusque peripneumonias, & alius fortibus morbis, non cito ex calore liberantur, neque adeit hic frigidum adversus calidum. Atque ego hoc maximum signum esse puro, quod non propter calidum simpliciter homines febricitent, neque hoc sic simpliciter afflictionis causa: sed est & amarum & calidum idem, & calidum ac acidum, & salum ad calidum, & alia infinita, & curius frigidum cum alijs facultatibus conjunctum, hac itaque sunt quae laedunt. Simul adeit autem & calidum robore participans, nunquam dicens & exacerbans & augens simul eum illis, verum nullam potentiam, maioremquam convenit videlicet, habens. Atque haec quidem sic se habent. Signa porro primum, quidem manifestissima producimus, quorum omnes jam sepe experientiam susceperimus. Itaque quibuscunque nostrum 295
- 31 gravedo innaserit, & fluxus per nates provenit, hic se plurimum actior est eo qui prius erit, & quoties ex natis prodibit, & tumescere facie nasum, & exurere calentem & externe ignem, si vero manum admoveas, & diutius perleveraverit, melius exulceratione locus, minime carnosus & durus existens. Sedatur autem aliquo modo affor in naribus, non quum fluxus prodit, & inflammatio consistit, sed postquam sinus crassior, & minus actus, concoctusque & magis permixtus priore fuerit, tunc sane jam etiam ardor cessat. Rursum autem alius ex frigida ipsa sola manifeste gravedo fit, nullo alio accedente. Omnibus autem liberatio hac est, ne ex frigida quidem affectu perturbant, ex ardore vero perfrigerentur, atque hoc brevi accedunt, & concoctione nulla opus habent. Reliquae autem omnes fluxiones, quas propter humorum acrimonias & intemperantias ego fieri sentio, restinguuntur & curantur, ubi temperata fuerint & concocta. Rursum quaecunque fluxiones ad oculos veniunt, ut fortis & omnigenas acrimonias habentes, exulcerant, quidem palpebras, erodunt autem aliquorum genas, & sub oculis partes, ad quascunque tandem insisterent, imponunt etiam & perducunt eam quae oculum 310
- 32 ambrit runcam, dolores autem & ardor, & inflammatio extrema adungi aliquandiu, donec fluxiones fuerint concocta, & crassiores reddita, & semper ab ipsis exiterint. Sic autem concoctus ex permixtione, temperaturaque minus, & de quasi coactura. Quinctiam fluxiones in fauces delabentes, ex quibus taucogenes fiunt, anginae, erysipela, peripneumoniae: Omnes hac primum quidem lasse & humida 315
- 33 aereque descendunt, & in talibus morbi firmanur. Ubi vero crassiores & maturiores factae fuerint, & ab omni acrimonia liberatae, tunc iam & febris, & alia hominem laedentia solvantur. Oportet autem inque causas uniuscuiusque se notare, quae quum adest, talem modum fieri necesse est, quin permittantur in alud temperamentum, cessare. Quando igitur ab ipsa caliditate sincera, aut frigida fluxiones contigerint, & nulla alia facultate participaverint, sic sine sedatione, ubi ex frigida in calidum permixtae fuerint, & ex calido in frigidum. Permittantur autem eo quem dixi modo. Amplius porro etiam alia quaecunque mala homi 320
- 34 no patitur, omnia a facultatum potentia proficiuntur. Itaque dum amaritudo quaedam diffusa fuerit, quam bilem flavam appellare solemus, quales itam anxietates, & aestus & impotentia occupant? Verum ubi liberati fuerint ab illa & purgati, aut sponte, aut per medicamentum, & modo tempelive quid ipsorum hac manifeste & a doliosis & a calore liberantur. Quanto autem tempore eadem elevata fuerit & eruda, & morata, de intemperata, nulla arte neque dolores, neque febris sedare possis. Per quos quidem aditu acutius ac argutius bilis affligit, quales mox tabies, & morbus viscerum ac pectoris, & desperatio? Non 325
- 35 fecatur. Concoquit autem & permittatur, attentiusque ac crassescere in humorum speciem, per menses & omnigenas species contingit. Quapropter & adulationes, & numeri temporum in talibus multum possunt. Haec vero omnia minime contingit calidum aut frigidum perpeti, neque enim hoc putrescentes, neque crassescere poteris. Quid autem ipsum esse diceremus, & temperamurum ipsorum est, verumtamen inter ipsa multum vim habens, quoniam nulli ubi permixtum calidum desunt esse enihum quam febrido, sic rursus non permittatur alio frigidum quam calido. Reliqua omnia in homine quanto pluribus misceantur, tanto meliora ac meliora sunt. At vero homo omnium optimus dispositus est, ubi concoquit & in quiete est, nullam peculiarem vim pra se ferens. De his igitur vident nihil abunde demonstrationem fecisse. Porro Medici quidam utique Sophista dicunt, quod impossibile est medicinam cognoscere autem, qui non novit quid sit homo, & quomodo primum factus & compo 335
- 36 sit sit. Ego vero ea, quae alicui Sophista aut Medico de natura dicta sunt, aut scripta, ininus confido medicis arti convenire quam pictoria. Iudico autem de natura aliquid manifestum ac evidens cognoscere, ex nulla parte aliunde contingere quam ex Medicina, atque hoc tunc condiscere possibile est, ubi quis ipsam medicinam totam recte comprehenderit. Verum quatenus illi prodiderunt, multi mihi cognovisse videntur, cognovisse autem dico, narrationem scilicet hanc, Quid est homo, & ob quas causas nascitur, & reliqua diligenter. Atqui nihil necessarium esse videtur, ut omnis Medicus de natura sciat, & ut mini studio adjuvatur ut cognoscat, si modo aliquid eorum, quae fieri debent, re 345

- 855 de prastare velit. Quid est homo ad ea, quae comedantur, ac bibantur, comparatus, & quid cuique ab unoquoque continget, ac accidet, & non simpliciter sic existimare, quod malum edulium est calens. Dolorem enim afferit repleto ex ipso. Sed quoniam dolorem, & propter quid, & cui potius intra hominem existeret incommodum existit. Nam & alia multa edulia, ac pocula natura mala sunt, & afficiunt hominem non eodem modo. * Proferatur autem mihi verbi causa ali-
- 360 quid, velut vinum nigracum multum plenum hominem aliquo modo debilem reddit, & omnes, qui videntur hoc, farentur, & cognoscunt, quod haec est vis vini, & quod ipsum est causa, & in quas in homine partes maxime possit, novimus. Talem itaque veritatem etiam de aliis ostendere volo, Etenim calens: quandoquidem hunc in exemplum adsumpsi: non omnes homines laedit, sed tunc qui ex ipso repleti, ne tantillum quidem offenduntur, immo gracilibus mirabiliter etiam conferre prodeunt. Sunt autem qui difficulter summoventes ipsum
- 365 ab eo liberantur. Horum vero naturae differunt, differuntque etiam iuxta hoc, quod est in corpore calido contrarium. Nam a calido excitatur, & commoveatur in his, quibus eiusmodi humor multus in corpore existit, & quo magis hic potius est, eo magis verisimile est ipsos male affligi. Si vero tota humanae naturae malis esset, omnes utique lederet. Haec autem si quis novisset, non incurreret ea, neque sane pateretur. In refectionibus convalescentibus ex morbis, insuperque in longis aegritudinibus multa conturbaciones, & praeviationes fiunt, partium sua sponte, partim a quibuslibet temere admissis. * Novi autem medicos multos
- 370 velut idiotas, qui ubi illi die aliqui novi quippiam fecissent, velut si lavissent, aut deambulassent, aut quid alienum comedisent, atque haec omnia melius esset adhibuisse, quam non, nihilominus tamen causam alicui ex his contribuerant, verum quidem causam ignorantes, & fortassis id, quod commodissimum erat, damnautes. Quod ipsum certe facere non oportet, sed scire quid balneum intempestive adhibuit oporetur, quid item fatigatio, & lassitudo. Numquam enim eadem afflictio ab his provenit, neque etiam ex repletione, neque ex cibo tali, vel tali. Quisquis igitur haec non cognoscet, quomodo singula se habeant ad hominem comparata, is neque cognoscere, quia ab ipsis sunt, potest, neque recte uti.
- 375 * Ceterum & haec cognoscere oportere mihi videtur, nimirum quae affectiones homini ex facultatibus, ac potentiis, quae item ex figuris adveniunt. Quod autem dico, tale est. Nempe facultatem quidem esse, humorum summas vires, ac robur, posse. Figuras autem dico, quae in ipso homine insunt. Aliae enim cavae sunt, & ex amplitudine in arcum coactae, aliae expansae, aliae solidae, & rotundae, aliae laevae, & peniles, aliae extensae, aliae longae, aliae densae, aliae rursus & hanaes, aliae spongiformes, ac molles. Quae igitur ex his traheret, ac sese aliae, reque humiditatem ex reliquo corpore maxime possunt? Num cavae, & expansae, an solidae, & rotundae, aut cavae, & in arcum ex amplitudine coactae? Equidem puto tales esse, quae ex cavitate, & amplitudine in arcum sunt coactae. Id
- 380 quod ex manifestis forisfocis condiscere oportet, partim quidem quod ore hians nihil sane humoris attraxerit, ubi vero labra foras protraxerit, contraxeritque, ac compresserit, insuperque fistulam adnoverit, facile sine attraxerit, quicquid voluerit, partim vero, quod cucurbitur, quae corpori apponi solent, ex amplitudine in angustiam attraxerit ad hoc facta sunt; ad trahendum videlicet, & allicendum ex carne. Sunt autem & alia multa ejusdemodi. Verum intra hominem natura, & figura talia sunt, vesicae, & caput, & uterus in mulieribus: atque haec manifeste maxime trahunt, & semper plena sunt attraxerit humoris. At vero cavae, & expansae figurae, insipientem quidem humorem maxime omnium susceperunt, non autem similiter attraxerint. Solidae autem, & rotundae neque attraxerint, neque susceperunt: dilabunt enim, & non habet sedem, in qua maneat. * Spongiformes vero, & molles, velut lien, pulmo, & mammae, ubi admodum maxime fuerint, & adhaeserint, ebibunt, duraque fiunt, ac augescunt, humore accedente, maxime pulmo. Non enim in ventriculo inest, in quo humorem extrinsecus contineat ipse ventriculus, in quo est humor, ut
- 385 quotidie exhauriatur: sed quum bibent, & susceperit ipse in seipsum humorem, & vacua, & rara, ac parva penitus explentur, & pro raro, ac molli, duras, ac densas evadit, & neque consoquit, neque dimittit. Atque haec patitur propter figurae naturam. Quaecumque autem durum, & revolutiones operantur in corpore, ea in cavis, ac amplis, velut ventre, ac pectore, strepitum, ac sonitum facere solent. Etenim quod non sic repleant, ut fient, sed habent transmutationes, & motus, necesse est, ut ab ipsis & strepitus, & manifestae commotiones fiant. Quaecumque vero carnosa sunt, & mollia, in talibus torpores, & excrementa, velut in truncatilis fiunt. * Ceterum quum inciderit status in latum, ac reniteas, & aliquid ipsi
- 390 restiterit, idque natura fuerit, neque forte, ut adversus violentiam durare possit, & nihil mali pati: neque molle, & rarum, ut excipere, ac cedere queat: verum tenerum & floridum, & sanguineum, ac densum, velut hepatis, quod propter densitatem quidem, ac laetitudinem resistit, ac non cedit, status vero subiens arguitur, ac fortius evadit, & adversum reluctans, maxime impetum facit. Propter ceteritudinem autem

tem, & sanguineitatem absque doloribus esse non potest, & propter has causas dolores acutissimi, ac frequentissimi circa eum locum contingunt, lappurationeque, ac tubercula plurima. Fiunt etiam circa seprum tranversum fortiter, sed multo minus. Dissentio enim septi transversi lata est, & renitens, natura autem nervosior, & robustior, quapropter minus dolore affligitur. fiunt tamen & dolores, & tubercula circa ipsum. Mulæ vero etiam alie & extra, & intra corpus figurarum species sunt, quæ magnopere inter se differunt, quod ad affectiones pertinet, tum agrotorum sano, velut capita parva, aut magna, colla tenuia, aut crassa, longa, aut brevia, ventres longi, aut rotundi, pectoris, & costarum latitudines, aut angustie, & alia infinita, quæ omnia nosse oportet, quatenus differant, quo causas singulorum cognitas probe observes. * De potentiis autem humorum perspectrum habere oportet, quid singuli ipsorum in homine facere possint, quemadmodum etiam prius dictum est, quomodo cognationes inter se habeant. Quod dico, tale est. An videlicet dulcis humor in aliam speciem mutetur, non a contempeamento, sed ipse desciscens, & immutatus ab eo, qualis primum fuerat, amarus, aut salus, aut acerbus, aut acidus. Sit sane acidus. Ergo acidus humor reliquos præcellens, maxime incommodus fuerit: si utique dulcis, omnium commodissimus existit. Id quod si quis loriseus querens consequi possit, is semper quod melius est ex omnibus eligere queat. Opertum autem est, quod longissime ab incommodo abest.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE MEDICO.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Medici gubernatio que.
- 2 Astedi officina, & domus situs. Splendor omnis, per quem oculi offenduntur, fugiendus. Oculi debiles a quavis causa facile leduntur. Sellarum structura.
- 3 Chirurgus artis instrumentis non utatur. Adedicamentorum addibendum, & dilagationis ratio diligenter consideranda.
- 4 Deligatio que medicis propria. Sectio velox, aut tarda quando commendatur.
- 5 In sectionibus, gladiis acutis, ac latio proportionem effectuum differentia attendenda.

- Sectioes que, quibus locis conveniant.
- 6 Cucurbitarum figura quomodo formanda.
 - 7 Scarificatio subter cucurbitam quatenus fieri debeat. Vena secanda ratio, & modus.
 - 8 Tuberculorum, & ulcerum majorum morborum deprehensio, & dissolutio, magis est ingenui, & artificii.
 - 9 Ulcerum via quatuor.
 - 10 Cataplasmatum formandarum ratio, eorumque usus.
 - 11 Temporum, & virium cognoscendarum difficultas. Chirurgum militare oportet.
 - 12 Telorum extrahit, artis chirurgica pars præstantissima.



HIC liber Medici gubernatio est, & præceptum, quomodo officinam medicam instruere oportet. Medici equidem gubernationem esse putamus, ut videat, quo bono calore, & bona ac carnosâ corporis habitudine præditus sit, juxta existentem in ipso naturam. Vulgus enim existimat eos, qui non sic bene dispositum corpus habent, neque aliis bene prospicere posse. Deinde ne opinionem capiet apud ipsum vulgus vestiri decono, & unguentis odoratis, non suspectum odorem ad omnia habentibus. Inde enim agrotos jucunde affici contingit. Post ea animadvertere ipsum oportet, ut animum habeat modestum, non solum quod ad taciturnitatem attinet, sed etiam circa reliquam vitam probe compositum. Maxime enim ad opinionem, ac auctoritatem comparandam conducit, bonis, ac honestis moribus præditum esse. Nam quum talis fuerit, omnibus venerandus, ac humanus iudicabitur. Proptermodum enim temeraria, & facilitas contemneretur, etiam si valde commoda existant. Scopum autem præfigere oportet potestatem facultatum suarum. Nam eadem ab iisdem non abundantiâ boni consulantur. Figuram faciei habeat medietatundam, ac suberistem, non tamen amarulem. contumax enim esse videbatur, & hominibus odio habens. Qui vero in risum exolutus est, ac nimium hilari, onerosus iudicatur. Hoc itaque vitandum est vel maxime. Iustum autem ad omnem conversationem esse convenit. Iustitia enim multum auxiliatur. Non exigua autem commercia agris cum medico sunt. Nam se ipsos medicis subditas faciunt, & omni hora uxoribus, virginibus, & opibus maximi precii, illi occurrunt: continenter igitur ad omnia hæc se habere oportet. Animo itaque, ac corpore sic dispositum esse convenit. * Porro præcepta ad artem medicam, per quæ artificiosus esse videbitur, ab initio considerabimus, ex quo primum homo discere incipit. Quæ igitur in officina medica curantur, fere ad ducentes pertinent. Primum quidem locum domus habere oportet, qui sane talis sit,

- lis sit, ut neque ventus ad ipsum accedens molestus sit, neque sol, neque splendor infester. Lux enim splendida medentibus quidem non est molesta, non similiter autem agorantibus. Itaque talem splendorem penitus fugere oportet, per quem occu-
 30 los agrotare contingit. Tale igitur præceptum de luce observetur. Deinde ut nequaquam faciem adversam splendori habear. Infestus enim visum debilem. Omnis autem occasio sufficiens est ad debiles oculos conturbandos. Luce itaque hoc modo utendum est. Sellæ autem æquales altitudine sint, quantum ejus fieri potest, ut in ipsis ægri collocentur. * Aeramento exceptis instrumentis, nullo utatur. Ornatus enim onerosus mihi esse videtur, talibus vasis uti. Aqua exhibenda est ægris
 35 potabilis, & pura. Exterioris utendum est puris, ac mollibus, ad oculos quidem linteis, ad vulnera vero spongii: hæc enim per se probe auxiliari videntur. Omnia autem rite facta ad usum esse oportet, magnitudine, gravitate, ac remanente. Quæ vero offeruntur, omnia considerare oportet, ut conferant, maxime si
 40 agrotæ parti adhibebuntur. Talia autem sunt ligamenta, & medicamenta, & lintea circa vulnus, & cataplasmata: hæc enim longissimo tempore circa agrotantes locos sunt. At vero ablatio horum, refrigeratioque, ac mundificatio, & aquarum affusio, paucio tempore absolvuntur. Diligenter autem considerare, quid horum faciendum sit, oportet, & ubi magis, aut minus ea adhibere convenit. Utrorumque
 45 enim usus opportunus, itemque negligentia, magnam differentiam habet. * Est autem propria, & genuina medicinarum deligatio, ex qua æger opem sentit. Maxime autem profunt duo hæc, quibus utendum est, comprimere videlicet, ubi oportet, & remittere deligare. Juxta horæ vero tempus, quando integrare oporteat, & non, videndum est, ut neque debili, neque fortiori alterutro horum utaris. Concinnas autem
 50 deligaciones ad spectaculum comparas, & nihil juvenes, reprobare oportet. Onerosæ enim sunt, & omnino petulantes, sæpe vero etiam damnum dede-
 runt. Querit autem æger non ornatum, sed auxilium. Cæterum in chirurgiis, quæ per sectionem, aut usionem fiunt, velocitas, ac tarditas æquale laudem merentur. Est enim utriusque usus. Nam in quibus per unicam sectionem chirurgia ab-
 55 solvitur, velocem dissectionem facere oportet, quum enim contingat eos, qui fecerant, dolere id, quod dolorem affert, quam minimo tempore adesse convenit, quod ipsum continget veloci sectione facta. Ubi vero multas sectiones fieri necesse est, tarda chirurgia utendum est. Velox enim continuum, & multum do-
 60 lobrem inducit. Tardus vero, & inermittens, requiem aliquam his, qui curantur, quæ celerem sanguinis fluxum habent, & non facile est eum sistere. Tales autem sunt varices, & quedam alix venæ. Itaque in talibus angustas sectiones fa-
 65 cere oportet, neque enim possibile est, ut fluxus in his sistatur. Conducit autem aliquando a talibus sanguinis detractionem facere. At vero ad locos non periculosos, & circa quos non tenuis est sanguis, horioribus gladiolis utendum est: sic enim sanguis prodierit, aliter nequaquam. Valde autem turpe est non contingere a
 70 chirurgia, quod velis. * Cucurbitarum porro duo modi commodi existunt. Quorum enim fluxus procul ab apparente carne compactus fuerit, circulum ipsius brevem esse oportet, ipsamque non ventrosam, sed prolixam parte ad manum vergente, non gravem. Quæ enim talis est, in directum trahet, & serosos humores se-
 75 paratos, ac distantes probe ad carnem attrahet. Majore autem dolore per carnem disperso, in reliquis quidem consimilem cucurbitam esse oportet, sed circulum magnum. Sic enim ex plurius partibus id, quod dolorem facit, edicere competes, ad locum convenientem. Neque enim magnum esse circulum putant, si non ex plu-
 80 ribus locis caro comprehendatur, ac contrahatur. At si gravis sit, ad superiores locos aspis, inferne autem magis detractionem facit, ut sæpe morbi relinquantur. Latius itaque circuli, una cum incumbentibus fluxionibus, & longe distantibus a super-
 85 nis locis, multa simul attrahunt de alia carne. Contingit igitur humiditatem inde detractam, apponi collecto, inferne sub cucurbita seroso humori, & quæ quidem infestant, relinquere: quæ vero nihil molestant, detrahi. Magnitudinem porro cucurbitæ, quæ commoda sit, juxta corporis partes, quibus admoveere oportuerit, conjectare oportet. * Ubi vero scarificationem subter cucurbitam adhibere velis, sanguinem scarificandorum locorum conspicuum esse oportet, alias neque circulum
 90 affectum scarificare, ac perturbare oportet. Debilius enim est caro loci dolore affecti. Scalpis autem incurvis, in summo non valde angustis utendum est. Aliquando enim feroci, ac saniosi humores viscosi ac crassi veniunt: periculum igitur est, ne in fissuris subleant, ubi arctæ fuerint incisæ. Porro venas in brachiis, funiculorum apprehensionibus constringere oportet. Caro enim contegens in mul-
 95 tis non probe coaptata est venæ: ubi enim lubrica fuerit caro, non contingit sectiones utrorumque juxta seipsas fieri. Nam venam contactam infusillari contingit, & sanguinis fluxum impediri. multis vero etiam propter hoc pus congregatur. Quapropter duo documenta talis chirurgia inducit, secto quidem dolore, secantem vero multam ignominiam. Idem in omnibus venis fieri præceptum est. Hæc quidem
 95 igitur necessaria sunt in officina medica instrumenta, & circa quorum usum arti-
 scio.

ficiofum esse oportet addifcentem. Volfellis autem ruin dentium, tum uvarum qui-
 8 libet uti poteft, fimplex enim ulus ipforum effe videtur. * Cæterum de tuberculis,
 & ulceribus, quæ majorum morborum funt, amplius videndum eft. Tubercula e-
 quidem deprehendete, & diffolvere poffe, maxime artificiofum habetur, itemque
 collectiones ipforum impedire. Confequens eft, ea in confpicuum, & quam brevif-
 100 finum locum contrahere, & compagem ipfam æqualem per totum tuberculum face-
 re: ubi enim inæqualiter fe habuerit, periculum eft, ut rumpatur, & ulus agre cu-
 rabile reddatur. Exæquare itaque oportet, fimiliterque totum maturum facere, & neque
 prius diducere, neque finire, ut fpon te rumpatur. Quæ vero maturum facere æqua-
 105 liter poffint, in aliis libris relata funt. * At vero ulcera quatuor vias habere vi-
 dentur. Unam in profundum, hæc autem funt fiftufofa, & quæ fanie plena funt,
 ac intus excavata. Alteram in altum, quæ videlicet carne fuperexcrescunt. Ter-
 tia via eft in latitudine, atque hæc funt, quæ appellantur ferpiginofa. Quarta via
 eft, quæ fola fecundum naturam motus effe videtur. Carnis itaque calamitates
 hæc funt, omnes autem communem rationem habent ad hoc, quod ipsis conducit:
 & figna quidem horum in aliis relata funt, itemque qua utendum fit curatione:
 per quæ autem concretum diffolvatur, fimiliterque id, quod carne excrescente re-
 110 pletum, aut cavum factum eft, aut quod in latitudinem iter fecit, de his omni-
 bus in aliis fcriptis noftris abunde dictum eft. * Amplius vero de cataplafmatis
 fic res habet. Linteorum, quæ imponuntur, ac induuntur alicubi in morbo, ulus
 exactus effe videtur, & eft fanie ulcers conveniens luteolorum impofitio. Verum cata-
 115 plafmate per ambitum ulceris utaris. Nam hic ulus cataplafmatis & artificiofis
 eft, & multum prodeffe poteft. Videtur enim ulcers opitulati vis eorum, quæ circum-
 ponantur. Linteum autem conterendum eft, ac emolliendum. Verum partibus extra vul-
 nus circumfcriptis cataplafma prodeft. Talem igitur ipforum ufum effe oportet. * Porro
 120 de temporum occafionibus, quando fingulis horum utendum eft, & quomodo præ-
 fcriptorum vires condifcere oporteat, in præfens relictum eft. Talia enim longe præ-
 ftantiffima in ftudio Medicinæ funt, & procul in arte jam progrefsi exiftunt. His
 confequens eft chirurgia vulnenum in milita acceptorum, circa extractionem telorum.
 Nam in urbanis converfationibus modicus horum ulus exiftit. Raro enim per om-
 125 ne tempus civiles, ac hoftiles expeditiones funt, huiufmodi autem fæpe, ac frequen-
 tiſſime circa externas militias fieri folent. Qui igitur hac chirurgia uti volet,
 eum militare oportet, & externos exercitus fequi. Sic enim exercitatus fieri po-
 terit ad eifmodi ufum, ac neceffitatem. * Quod vero circa hæc artificioſiſſimum ef-
 130 fe mihi videtur, referetur. Etenim figna exquirere, ac invenire telorum in corpore
 exiftentium, maxima artis, & chirurgiæ huc pertinentis pars exiftit. Ubi enim
 hoc cognitum fuerit, non relinqui poteft vulneratus ex ignorantia neglectus, quum
 non convenienter tractetur. Solus autem is, qui fignorum expertus eft, hanc chirur-
 giam rite aggreditur. Verum de his omnibus in aliis fcriptum habetur,

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE DECENTI ORNATU.

Argumentum in Librum fequentem:

- 1 Sapiencia in rebus humanis magna utilitas.
- 2 Medicorum verorum, & falſorum differentia.
- 3 Natura præſtans primarium inter hominis virtutes, bonaque locum obtinet. Sapiencia ex doctrina accedit. Medicum opere effe oportet, non ſermonem.
- 4 Opinio in medicina reprehenditur. Artem medicam tempus facilem efficit. Medicina ſapiencia copulanda. Medicus philoſophus Deo æqualis.
- 5 In medicina infunt omnia, quæ ad ſapientiam requiruntur.
- 6 Medicina Deos reverenter habet.
- 7 Medicum morum comitas decet. Medicus inftrumenta omnis generis præparata habeat.

- 8 Chirurgicorum inftrumentorum inftralla ad peregrinationem. Medicina principium, medium, & finis.
- 9 Medicamentorum fingulorum effeſſa, experientia prius cognoscenda. Medico, in viſendis ægrotis, quæ obſervanda.
- 10 Aetio in ſubjecto humido inflabilis. Aetio circa temporis occaſionem neglecti, progreſſu perimunt. Aegrotorum peccata Medico diligenter obſervanda. Decubitus ægrotorum conſideratio ex anni tempore, & ſæxta genera.
- 11 Streptus, & odores circa ægros maxime ſurgendi. Aegri neque de præſentibus, neque de futuris ſunt admonendi.
- 12 Circa ægrotorum curam diſcipulis imperiis nihil committendum.



- ON sine ratione faciunt, qui sapientiam ad multa utilem esse
 præcedunt, eam videlicet, quæ inter homines existit. Mul-
 tæ enim ad superfluam curiositatem factæ apparent, dico au-
 tem eas, quæ de nulla re utili differunt. Alium autem utique pos-
 sunt etiam harum partes ad illas, vel propterea quod neque o-
 ciositas est, neque malitia. Ocium enim, & ignavia malitiam
 querunt, & ad eam distrahuntur, vigilantia vero, & mens ad
 aliquid intentata, irabunt ad se quid eorum, quæ ad vitæ honestatem pertinent,
 etiam ex disputationibus nihil utile tractantibus. Gratiosior est enim sapientia,
 10 & ab aliis quibundam in artem constituta, artem videlicet ad parandum hone-
 stum ornatum, ac opinionem. Omnes enim non cum turpi lucro, & turpitudi-
 ne consistunt. Er illis methodus quædam est artificialis, quæ operatur: quod
 si non innocenter fiat, raptores sunt. Adolecentes enim in ipsos incidunt, verum
 in vigore constituti propter verecundiam, videntes ipsos idiotas, ducunt. Senes
 15 vero propter amarulentiam legislationem in ipsos constituunt, ex civitatibus vide-
 licet expulsionem. Hi enim sunt, qui fora frequentant, ruditate, ac inscitia sua im-
 ponentes, & in circulis civitatum vestantes. * Cognoverit autem quis ex vestitu, & aliis
 lineamentis. Quamvis enim fuerint splendide ornati, multo magis fingendi sunt,
 & a conspiciendis odio habendi. Qui vero contrario modo se gerunt, frugi ho-
 mines iudicandi sunt, quibus non est excogitatus apparatus, neque superflua cu-
 riositas. Ex vestitu enim cognoscet, & docenti in iplo ornatu, ac frugalitate, non
 20 ad superfluitatem parato, sed magis ad bonam opinionem, & meditationem, ani-
 mumque intra se compositum, & ad profectionem. Imo quocumque vestitu, ac ornatu
 tales sunt minime diffidentes, non curiosi, amarulenti ad occursum, & obviam
 25 itiones, appositi ad responsiones, graves adversus resistentes, ad sui similes solum
 res, & familiares, ac affabiles, temperati ad omnes, ad seditiones taciturni, ad ta-
 cendum animo obfirmato, & continentes, ad tempus appositi, & ad occasionem
 arripendam accommodati, ad victum frugales, & contenti, patientes ad temporis
 expectationem, ad sermones expediti, omne demonstratum proferentes, suavilo-
 30 quentia utentes, gratis affecti, & gloria horum omnium corroborati, ac fortifica-
 ti, ad veritatem, ac demonstrationem audientes, ac confisi. Principalissimum quidem
 igitur horum omnium prædictorum est Natura. * Nam si hæc adfuerit his, qui arti-
 bus animam applicant, per omnia prædicta penetrare poterunt. Incognita enim
 utilitas tum in sapientia, tum in arte adhibita, ad principium capiendum edoce-
 35 ri potest. Natura autem defluit, & confunditur cum sapientia ad cognoscendum ea,
 quæ ab ipsa natura facta sunt. Etenim in utrisque sermonibus multi convicti, nul-
 latenus utrisque rebus usi sunt ad demonstrationem. Postquam igitur quispiam ipso-
 rum expendit ad veritatem, quæ retulimus, nullatenus naturæ bona ipsis proce-
 dent. Comperiuntur itaque hi non dissimiles cum illis via progressi, quapropter
 40 deudati, omnem induunt maliciam, ac ignominiam. Honestus est enim ex opere,
 quod quis edoctus est sermo. Quicquid enim artificiose factum est, ex ratione
 profectum est, ac productum. Quicquid autem artificiose dictum est, non autem factum,
 methodi mathematicis demonstrativum existit. Nam putare quidem, non autem
 facere, ignorant, & inartificialitatis signum est. * Opinio enim maxime in Medi-
 45 cina in crimen vertitur cum adhibentibus: his vero, quæ in se usi sunt, perniciosum af-
 fert. Etenim si sibi ipsis in sermonibus persuaserint, & opus ex disciplina se sci-
 re putaverint, quemadmodum aurum adulterinum in igne iudicatum, tales seipso
 esse demonstrant, quamquam talis prædicto nihil comprovet ad prudentiam eos,
 qui sunt eiusdem generis: Quod autem rectus sit finis, cognitio manifestum facit.
 50 Tempus porro etiam artem facilem, ac perviam facit, aut in consimilem viam inci-
 dentibus processum manifestos facit. Quapropter singula prædicta suscipere
 oportet, & sapientiam transferre ad medicinam, & medicinam ad sapientiam. Medi-
 cina enim philosophus est Deo æqualis. Neque enim multa est inter ipsas diffe-
 rentia. * Nam omnia, quæ ad sapientiam requiruntur, insunt in medicina: argenti
 55 contemptus, reverentia, verecundia, habitus submissus, auctoritas, iudicium, quies,
 obviatio, mundicia, doctrina, cognitio ad vitam utilem, ac necessarium puri-
 ficationum, alienitas a meremoniis, alienitas a superstitione, præmentia divi-
 na. Habent enim quæcumque habent ad coercendam intemperantiam, insoriam, avari-
 tiam, concupiscentiam, rapinamque, ac impudentiam. Hæc enim est cognitio acce-
 60 dentium, & usus eorum, quæ ad amicitiam pertinent, & quomodo ad liberos, ac quæcum-
 que res se petere oporteat. * Quatenus igitur cum hæc societatem habet, sapientia quæ-
 dam est. Nam & plurima ex his etiam medicus habet. Etenim scientia de diis vel ma-
 xime animo ipsius implexa est. Etenim in aliis affectionibus, & in symptomatis
 65 accidentibus, Medicina ergo deos valde reverenter se habere comperitur. Medici
 vero deis concedunt. Non enim est potentia in ipsa redundans. Nam & hi multa
 quidem aggrediuntur, multa vero etiam per se ipsa ipsis impugnantur. Quæ vero
 non possidet Medicina, hinc exhibet. Quæ enim via ipsius sit in sapientia, hæ-
 cenus dictum est. Nam & illis ipsi hoc modo se res habet. Quæ vero putant, &
 consueverunt, ac proficuntur, sic habent. Quæ circa corpora adsunt, & adveniunt, quæ
 sane

sane per omnem ipsam artem procedunt, dum illa transformantur, aut transmutantur. 70
 Quae item per chirurgiam sanant, Et quae auxilium, & medelis, aut victu curantur. Summa vero horum omnium tendat ad horum cognitionem. * Quum igitur re-
 lata omnia tali modo se habeant, convenit, ut Medicus comitatem quamdam tibi ad-
 junctam habeat. Austeritas enim & sanis, & aegris diffilem accessum praebet. Ma-
 xime vero adservare ipsum seipsum convenit, ut ne multas corporis partes ostendat, 75
 neque cum imperitis multa fabuletur, sed necessaria. Hoc enim violentia esse con-
 suevit ad curationis provocationem. Facere autem nihil horum debet valde curiose,
 neque ex imaginatione. Haec vero omnia considerato, quo tibi praeparata sint ad
 abundantiam, prout opus fuerit. Sin minus, instante necessitate semper penuria
 fuerit. Procurare autem oportet haec in medicina cum omni submissione: de fractio- 80
 ne, & illitione, & perfusione ad manuum concinnitatem: de lineamentis vulsis, de sple-
 nis, de ligamentis, de his, quae pro temporis constitutione requiruntur, de medica-
 mentis ad vulnera, & ocularia, & ex his ea, quae ad singula genera pertinent: quo tibi
 praeparata sint & instrumenta, & machinae, & consequenter ferrum. Nam in his pe- 85
 nuria detrimentosa est, & artem mancarn facit. * Sit autem tibi alter apparatus, sim-
 pliciter ad peregrinationes instructus, ad manus promptus, & expeditissimus autem per
 methodi rationem. Neque enim fieri potest, ut medicus omnia perecurrat. Firma item
 memoria teneto medicamenta, & simplices facultates, & descriptas, si modo ra-
 tiones expant. Sint & in memoria tibi morborum curationes, & harum modi, quotupli- 90
 citer, & quomodo in singulis se habent. Hoc enim principium est in Medicina, &
 medium, & finis. Praeparata quoque tibi sint malagmarum genera ad singulos usus.
 Poriones, quae incidere possunt, ex descriptione praeparatae juxta genera. In prom-
 ptis sint & quae ad medicationem pertinent ad purgationes, sumpta de locis con-
 gruis, & parata eo, quo convenit modo juxta genera, & magnitudines, ad vetusta- 95
 tem ferendam curata. Recentia vero juxta temporis occasionem, & alia juxta rationem.
 His autem tibi praeparatis hoc commodi erit, ut, ubi ad aggorum introieris, animo
 incertus non sis, quum appositis habeas singula ad id, quod faciendum est. * Aegra
 vero hoc cognitum habeas, quod facere oportet, quam ad aggorum ingrediaris. Pleraque
 enim neque ratiocinatione, sed auxilio rerum opus habent. Itaque eventum ex experi- 100
 rentia prius discernere oportet. Est enim hoc gloriosum, & facile cognosci potest.
 In ingressu vero meminisse convenit sessionis, & habitus submissi, amictus,
 compositi, auctoritatis, brevisloquentiae, ut nihil cum perturbatione facias, assensus,
 diligentiae, responsionis ad ea, quae occurrunt, & ad tumultus sentes compo- 105
 scendis constantiae apud teipsum, interceptionis ad turbas castigandas, prom-
 ptitudinis ad miseria. Et ad haec memores sis primi apparatus. Sin minus, re-
 sponsa citra errorem fiant, quae ad promptitudinem parandam praecipiantur. * Ingres- 110
 su utero frequenter, visita diligentius, his, quae a deceptis per errorem sunt, occur-
 rent, ut mutantur. Facilius enim cognoscas, simulque expeditior eris. Instabi-
 lia enim sunt, quae in humidis consistunt. Quapropter etiam facile & a natura, & a
 fortuna transmutantur. Neglecta enim ea, quae circa temporis occasionem admini- 115
 strare oportebat, impetu suo progressa occupant, ac permittunt. Non enim est
 quod operari ferat. Multa enim sunt, quae simul mali aliquid faciunt. Nam quod
 singularem juxta consequentiam sit, magis opportunum, & frequentius est. Ob-
 servare autem oportet agrotorum quoque peccata, per quae multi saepe mentiri
 sunt, in assumendis his, quae ingerenda exhibentur, postquam exolis potiones non 120
 accipientes, aut pharmacis datis, aut alia curatione adhibita, perempti sunt. Et fa-
 ctum quidem hoc non ad ipsorum confessionem vertitur, verum Medico culpa imputatur.
 Considerare vero oportet etiam decubitus, quosdam ex ipsis juxta anni tempus, quos-
 dam juxta genera. Quidam enim in altis sedibus, quidam in subterraneis, ac tenebro- 125
 sis decumbunt. * Strepitus quoque, & odores maxime vini, deteriores enim hic est, su-
 gere, ac transmutare oportet. Et omnia haec facere placide, expedite, cum ministe-
 rio, ita ut plerique agrotos occultes, & hilari ac sereno vultu ipsum consolentis: quo
 a suis illum cupiditatibus avertas, simul cum amarulentia, & contraria instantia in- 130
 crepando, similique cum commonefactione, ac dexterrate suscipiendo, ac consolando,
 non tamen ut quicquam futurorum, aut praesentium ipsis indices. Plerique enim ob hanc
 causam in utramlibet partem compulsi sunt, propter relaxatam videlicet praedictionem
 praesentium, aut futurorum. Sit autem ex discipulis aliquis praesens, qui instet, ut pra-
 ceptis non amarulenti utatur, & quod mandatum est, faciat. Deligito autem ex ipsis eos, 135
 qui iam in arte progressum fecerunt, quo ea, quae utilia sunt, addant, aut fecere of-
 ferant, ut & in intervallis nihil te lateat. * At vero imperitis nunquam quicquam pro-
 curandum committes. Sin minus, ejus, quod male factum est, vituperium in te reciderit, si
 non ambigue res habeat, ex quibus id, quod recta methodo tractatum est, proced-
 it, & vituperationem tibi non asseret. Sed & quod factum fuerit, ad genus referetur.
 Proinde omnia haec praedicto in his, quae sunt his, quibus ea cognovisse proposui-
 tum est. His igitur ita habentibus ad bonam existimationem, ac decentem oratum, & in 140
 sapientia, & in medicina, & in aliis artibus: oportet medicum distinctis partibus, de
 quibus diximus, semper utrisque amicum ea conservare, ac custodire, & credere, ac
 facere. Quum enim apud omnes homines inclita sint, conservantur. Et qui per

ipsa procedunt, celebres sunt a parentibus, & libetis. Et si quidam ipsorum non multa cognitione prædici sint, ab ipsis tamen rebus ad intelligentiam deveniunt.

HIPPOCRATIS COI

PRÆCEPTIONES.

Argumentum in Librum sequentem,

- 1 *Tempus, & occasio quid. Medela tempore, aliquando occasione contingit. Ratiocinatio quid. Recordatio quomodo fiat. Ratiocinatio que in morbis non reprehendenda.*
- 2 *Naturam omnigenis rebus moveri, ac doceri. Ratione sola in morborum curationibus nisi non licet.*
- 3 *Occasioni fortuita in aggrediendis morbis, quatenus attendendum.*
- 4 *Cum Agrotis cur potestendum, Agroti qui sint negligendi.*
- 5 *Curandi qui, & quando gratis. Amor hominis, amor artis. Cura agrotum, & sanorum quatenus suscipiatur.*
- 6 *Medici qui præceptum Hippocratis percipiendis apti, & qui non. Agrotum duplex delictum.*

- 7 *Medici plures quando adducendi, Medicus a contentumibus alienus esse, decet.*
- 8 *Agri consolationes, Agri ob doloris magnitudinem desperantes seipsos vita exant. Medicus quando suorum laborum remunerationem, & fidem amittit.*
- 9 *Habitus hominis bonus quis. Medicum auri vulgus differrentem non magna laus movet.*
- 10 *Medica qualis natura optanda. Exercitatio in doctrina penuria adhibenda. Dierum attendendum, facinoribus incumbendum.*
- 11 *Vitius non, eademque ratio cur non diu servanda. Aeris repentina turbatio. Etatis vapor.*
- 12 *Lingua obscuritas unde. Etatis differentia, in morborum indicatione, magni sunt momenti. Aetate tranquillitas, Indicatio morbi quid.*
- 13 *Affectio ex consensu. Pocioratio. Excretio fortior. Meritum laus.*



TEMPUS est, in quo occasio est. Occasio vero, in qua tempus non multum. Medela tempore, aliquando etiam occasione contingit. Hæc sane nosse oportet, & non ratiocinationi prius probabili intentionem curam aggredi, sed exercitationi cum ratione. Ratiocinatio enim memoria quedam est, quæ componit ea, quæ per sensum sunt percepta. Imaginatione enim concepta est evidenter, Sensus autem perfectus iam delegator est eorum, quæ subiacent, ac obveniunt ad ipsam cogitationem. Qui vero sensus facit mala perfectus est, & suscepit, quibus, quando, qualiter laesus sit observans, & in seipsum reponeus recordatur. Collaudo quidem igitur etiam ratiocinationem, si quidem ex fortuita occasione initium faciat, & delationem in morbum ex apparentibus persequatur. Si enim ex his, quæ palam perficiuntur, ratiocinatio initium fecerit, in mentis potentia esse compescitur, ita ut ipsa ab aliis singula assumat. * Promde statuendum est, naturam a multis, ac omni generis rebus moveri, ac doceri, ita ut violentia quædam subit. Mens autem, ubi ab ipsa accepit, velut dixi, postea ad veritatem perducit. Si veto non ex evidenti aggressionem, verum ex probabili rationis figmento, sæpe gravem, & molestam invehit affectionem. Tales autem in viam viam arripiunt. Quid enim tandem erat mali, si mercedem auferrent hi, qui medicinæ opera male administrant? Nunc vero agrotis, qui extra culpam sunt, non sufficiens esse apparet violentia morbi, nisi Medici quoque impericia accedat. Et de his quidem hæc dicta satis sunt. At his, quæ ex sola ratione perficiuntur, frui non datat: verum his, quæ ex operis indicatione. Fallax enim est, & ad errorem proclivis affirmatio, quæ fit cum garrulitate. Quapropter in universum his, quæ sunt, inhaerere oportet, & circa hæc vel maxime versari, si quis facilem, ac minime delinquentem habitum, quem sane Medicinam appellamus, sibi comparare velit. Valde enim magnam utilitatem afferret tum agrotantibus, tum horum artificibus. Non tamen cunctandum est, & ab idiosis inquirere, si quid conspicer visum fuerit ad curationis occasionem. Sic enim arbitror universam artem commonstratam esse, eo quod ex unoquoque sine observatio facta est, & consonantia in idem conuerteret. * Attendete igitur oportet fortuitæ occasionis, quæ plerumque se offert, atque hoc cum utilitate, ac leni progressionem, potius quam cum promissione, & excitatione ea, quæ fit cum actione. Utile est autem, & varia prædicatione eorum, quæ agrotis offeruntur. Non enim asseverare oportet, quod aliquid solum exhibitum proderit. Omnes enim affectiones propter multas casuum circumstantias, ac mutationes, mota quadam ditione adherent. Et hoc sane admonitione opus habuerit ad diligenter considerationem faciendam. * Si enim a mercede inceperis, conducit enim hoc universo negotio, agroti quidem huiusmodi cogitationem inducis, quod videlicet non ipso relicto abibis. Si vero non pacifceris, quod ipsam negliges, & de quibusdam in rem præsentem non admoneris. Curare igitur oportet.

oportet de constituenda mercede. Inutile enim esse putamus ejusmodi ægroti ip-
sius cogitationem; multo autem magis in morbo acuto. Morbi autem celeritas, tem-
poris occasionem non præbens ad reversionem, non impellit bonum Medicum ad que-
rendum suam commoditatem, sed ut magis existimationis suæ rationem habeat. Itaque
tunc melius est, ut servatis exprobet, quam ut lethaliter affectos præconcurat. Quoniam
aliqui ægroti id expectant, hospitii jus, & facilem mali depulsionem producentes, di-
gni quidem qui negligantur: non tamen qui assigantur. Quapropter his te merito
oppones cum bolidis iactu in maris turbati fluctibus iter facientibus. Qui enim bo-
nus Medicus est, is per Jovem fide magis, quam duritia medetur. Quare in principio
totam affectionem indagare oportet, & quædam suggerere condicentia ad cura-
tionem, curaque ægrotorum, & non negligere. At vero remunerationis exigendæ acer-
bitatem, absque præparante ad disciplinam cupiditate, hortor, ut ne valde indicas, sed
& ad opulentiam, & facultates respicias. * Quandoque vero etiam gratis cures, ita
ut gratitudinis memoriam potiore, quam præsentem existimationem anseras. Si vero oc-
casio ferendæ opes se obtulerit & peregrino, & egeno, maxime talibus opitule-
ris. Si enim affuerit erga homines amor, adest etiam amor erga artem. Quidam e-
nim ægrotantes, ubi perceperunt affectionem circa se non esse in tuto, per Medici
probatem, ac manifestum gloriantur sanitati restitutos se esse. Laudabile est
autem, ægrotum quidem curam gerere, gratia sanitatis: sanorum vero curam suscipere,
ea gratia, ut sine morbis degant. Sed & sanotum cura habenda est gratia boni, ac
decori ornatus. * Qui igitur in profundo ignorantie artis versantur, prædicta mini-
me perceperint. Nam hi, quum sint non initiati, miserabilesque, ac subito exaltati,
fortunæ tamen indigi, a divitibus quibusdam ex angustiis remissionem acquirunt,
semperque ob opera gloriantes, & in deterius dilabentes, delictorum, artis sincerita-
tem negligentes, ob quam bonus Medicus, qui ab artis conjunctione socius artis
appellatur, in vigore esse possit. Hic autem medelas citra delictum facile perficiens,
nil horum transiliret, non præ facultatis inopia. Non enim indus est, velut in
injustitia. Nam ad curationem hi non accedunt, ubi affectionem perniciosam esse vi-
dent, vitantes aliorum medicorum superinductionem, laudantes ægrotos propter præ-
vii auxilii odium. At ægrotantes afflicti natant in utraque improbate, eo quod po-
riori in arte curationi seipsos non commiserunt ad finem usque. Remissio enim morbi
alicuius magnum ægroti refugium præbet. Quapropter sanam affectionem cupientes,
eundem usum se nper admittere non volunt, medici varietati se assimilantes. Sum-
ptuum equidem opulenta ægroti carent, morum improbate adorantes, & ingrati
sientes. Quum autem consequi possunt, ut dicuntur, de mercede allaverant affir-
mant, santi esse volentes, quæstium nimirum ex usura, aut agricultura affore produ-
centes, & postea de ipsis quæstum facere negligentes. Et de hujusmodi quidem de-
clatatione licet sufficiant. Remissio enim, & intentio ægrotantis, medicam administ-
rationem requirunt. * Nec vero indecore se ille geret medicus, qui in rei præsen-
tis angustia circa ægrum aliqueum, & imperitia tenebras offundente, alios quoque
accidere jussit, quo ex communi consideratione res circa ægrum inquirantur, ac
cognoscantur, & illi cooperatores fiant ad auxilii ferendi facilitatem. Nam in affi-
ctionis assiduitate, augescere affectione, ob consilii inopiam, plurima ad rem præ-
sentem effugiunt. In ejusmodi igitur temporis occasione confidendum est. Nunquam
enim ego tale quid decerno, quod ars ipsa judicat. Et de hoc nunquam contendere
oportet affirmando, ac mutuis inter se conviciis decertando. Hoc enim iurjurando
affirmare possum, quod Medici ratiocinatio nunquam alteri invidere poterit. Imbecil-
lis enim hoc modo apparuerit. Sed hæc magis expedite faciunt hi, qui circa foren-
sis negotia, ac quæstus versantur. Quamquam neque falso hoc cognum fertur, quod
in omni copia inopia inest. * At vero cum his omnibus magnum signum substantiæ
artis apparuerit, si quis recte medicans ab ejusmodi compellatione non destiterit,
jubens ægrotos mente non turbari in eo, quod ad salutis tempus pervenire ge-
stant. Hoc enim non inutile esse dicimus, & hoc sane præcipiens non peccabit.
Ipsi enim ægroti propter dolorificam affectionem desperantes, seipsos vita exunt.
Qui vero ægrum sibi commissum habet, si artis inventa demonstraverit, conservans,
non mutans naturam, præsentem auferet remunerationem, aut contra fidem suam sta-
tim amittet. * Hominis enim bonus habitus natura quædam est, quæ motum non
alienum ex natura acquisivit, sed valde congrua est, & spiritui, & calore, & humo-
rum concorde iniquaque & universa victus ratione, & aliis omnibus compo-
sita, ac constructa: si non aliquis ex nativitate, aut ab initio defectus fuerit. Si vero
etiam quæ fuerit, is si exilis est, conandum est, ut subjicte naturæ assimiletur. Præ-
ter naturam enim est id, quod imminutum est etiam per tempus. Porro fugienda est
& frictio per lintea sudaria propter parandam medendi auctoritatem, itemque odor
curiole ascerus. Propter multam enim peregrinitatem, in calumniam incidet: propter
modicam vero, decentem ornatum consequeris. In parte enim dolor modicus: in to-
to multus. Gratiudinem autem, qua hominibus complacens, non tollo. Digna e-
nim est medico præsidio. At vero appositionis per instrumenta, & indicationis
eorum, quæ significant, & ejusmodi rerum memoriam adesse oportet. Si vero et-
iam vulgi gratia velis dissertationem ad audiendum te facere, non valde gloriose id

- captes : non tamen cum testimonio, ac ostentatione poetica. Impotentiam enim industria laboris offendit. Aversor enim ad alium utrum transferri industriam cum labore partam, quæ propterea in seipso sola gratiosa secta electionem habet. Consequenter enim instat fuci promptam cum comitatus deductione elationem. * Operanda est & ejusmodi dispositio, quæ aliena sit ab eo, quod quis grandis iam natus dicat. Hoc enim præsentium quidem nihil perficit, absentium vero tolerabilis memoria existit. Fit itaque omnia tentans infortunium cum recenti perniciæ, quæ negligit decorum, & in præfixis terminis, & in professione, & in maximis juramentis deorum gratia factis : dum Medicus præest morbo, cum assidua lectione, instructioneque impetitorum fugitivorum, ita ut sermones translatitios imitetur, quietiam antea quam in morbo incertus animo esset, collecti fuerunt. Talium igitur ubi etiam, præfectus essem, non sane in collectitia curatione id facerem. Verum confidenter auxilium peterem. Cognitionis enim decore scientia in his dispersa est. Quum igitur hi necessario sint inficii, ac imprudentes, horror eos, ut commodari habeant exercitationem post dogmatum cognitionis penuriam. Quis enim multifidam dogmatum sectionem se vere cognoscere posse sperare citra exercitationis constantiam ?
- * Quapropter hoc admonéo, ut dicentibus quidem attendant, facientibus autem incumbant, & contractam victus rationem non diu præscribant. Agrotantis enim diuturnam concupiscentiam erigit indulgentia quoque in morbo diuturno. Si quis cæco animum advertat, velut res magni timoris cavendus est, & gratia desperanda, per quam unitas constet. Aeris repentina turbatio vitanda est. Vigor ætatis omnia habet gratiosa. Decrepta vero ætas vice versa. * Obscuritas lingue non satis clara sit aut propter affectionem, aut propter autes, ita ut præquam prius enunciarit, alia adiciat : aut præquam in quod mente concepit, dicat, alia insuper cogitet, & quæ quidem citra affectionem visibilem appellatam contingit lingue obscuritas, his maxime, qui artium studio tenentur, accidit. Ætati etiam quum parvum est aliquando subiectum, valde magna vis inest. In morbo tranquillitas longitudo significat. Judicatio vero est morbi exolutio. Parva causa medelis exsolvit, nisi quid circa locum principalem affectum fuerit. * Quandoquidem affectio per consensum a tristitia inducitur vixit, quidam sane ex alterius consensu vixit. Vociferatio affligit. Fortis laboris studium subterfugiendum est. Matrimonius locus ad sanitatem commodus est.

HIPPOCRATIS CUI

LIBER DE NATURA HOMINIS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Hominem non ex uno aliquo elementorum constare. De hominis natura falsas esse philosophorum opiniones.
- 2 Hominem, unum quiddam, ut sanguinem, pituitam, bilem, esse non posse.
- 3 Hominem unum quiddam statuentes, in quo falluntur.
- 4 Generationem neque ab uno, neque genere differentibus fieri.
- 5 Qualitates prima, homine moriente, in suam naturam revertuntur. Animalium omnium eadem, quæ hominis, & generatioris, & corruptionis ratio, causæque. Humores in homine quatuor sanitatis, & ægritudinis sunt causæ.
- 6 Homo quando maxime sanus.
- 7 Humorum secretis.
- 8 Humorum in homine distinctas esse species, & nomina.
- 9 Humores quatuor homini convenientes esse. Homo cur Mediceis, & Philosophis quibusdam unum idemque esse putatur.
- 10 In superpurgationibus neminem unquam, uno solo humore purgato, mortuum esse.
- 11 Qualitates secunda terra etiam insunt. Animalibus ingulatis qualis sanguis profuerit.
- 12 Pituita cur hyeme augetur. Pituitam hu-

merum omnium esse frigidissimam. Pituita hyeme repleti corpora.

- 13 Sanguis vere ab humoribus supervenientibus augetur. Bilis flava per ætatem in corpore elevatur, manente adhuc sanguine.
- 14 Bilem per ætatem, & autumnum in corpore dominari. Sanguis autumnus cur modicus. Bilis atra autumnus plurima, & fortissima existit. Pituita cur hyeme augetur.
- 15 Corpus humanum ex quatuor humoribus constat.
- 16 Humores pro temperum anni differentis in homine dominari.
- 17 De morborum circuitu. Humoribus ex anni temporum differentis resistendum.
- 18 Contrariorum exalta cognitio, vel sola morborum est solutio. Morborum homini duplex causæ, diæta, & spiritus. Morborum popularium spiritus, seu aer, non autem diæta, causæ existit.
- 19 Diæta morbis popularibus grassantibus non cito permittenda. Aeris, & leucæ in morbis popularibus mutatio utilis.
- 20 Præterea crassissimum quatuor in corpore peria, carumque explicatio. Dorsæ, ac coxendicæ dolent, quæ vena secunda.
- 21 In lumborum, ac testium dolore, quæ vena sectio conveniat.

- 21 *Pena multa, & omnigena ex ventriculo per corpus, alimenti ferendi causa dispersa sunt. Venæ sectio quam longissime a locis dolentibus fieri debet.*
- 22 *Puris spatus, Urine purulenta, Excrementa cruenta, velut in dysenteris, citra febrem.*
- 24 *Pelloris suppuratio ex seroso, ac sanioso humore. Calculi cur pueris in vesica sunt, viris vero minime. Homo primis diebus sui respectu calidissimus, ultimis frigidissimus.*
- 25 *Quando quis sua sponte, ex sanguinis spatu, urinis purulentis, & excrementis sanguinolentis curretur. Atrobi securissimi qui. Atrophia, & tibi in urinis post tubercula post crassam venam euata.*

- 26 *Urina cruenta. Cermula in urinis capilliformes. Furfures in urina pura. Febres plurima a bile sunt.*
- 27 *Febrim quatuor species. Febris continens a bile plurima, ac moracissima. Febris quotidiana, eiusque generatio. Febris quotidiana, continens longior.*
- 28 *Febris tertiana, eiusque generatio. Quartana generatio, & cur aliis diuturnior. Bilis atra omnium humorum viscosissima, ac tenacissima. Febres quartana, atra bilis participet.*
- 29 *Quartana ab anno vigesimoquinto incipiunt, nec ultra quadragessimum, nisi magna causa agente, progrediuntur. Quartana quando non diuturna.*



QUICUMQUE de natura humana amplius differentes audire consuevit, quam ejus ad medicinam pertinet, huic non est commodum hunc meum sermonem audire. Neque enim omnino ex toto aerem dico hominem esse, neque ignem, neque aquam, neque terram, neque quiequam aliud, quia non manifestum est unum in homine esse, sed volentibus tamen hæc dicere permitto. At vero talia dicentes, mihi non recte rem cognoscere videntur. Sententiam enim eandem omnes ineunt, verum non eadem dicunt, sententiae tamen epilogum eundem faciunt. Ajunt enim, unum quid esse, quodcumque tandem est, & id ipsum esse unum, ac totum, juxta nomina autem non consentiunt. Etenim alius ex ipsis aerem esse, hoc unum, ac totum dicit, alius ignem, alius aquam, alius terram, & addit unumquodque ad sermonem suum testimonia, ac signa, quæ nullius momenti existunt. Quia enim eadem sententia omnes utuntur, dicunt autem non eadem, manifestum facit, quod neque cognoscunt ipsa, quod ex eo vel maxime quis cognoverit, qui ipsorum disputationibus interfuerit. Nam quum iidem viri inter se disceptant, isdem auditoribus præsentibus, nunquam ter consequenter idem homo vincit in eodem sermone, sed modo hic, modo alius superat, cuicumque fuerit lingua maxime fluida, ac populo grata. Atqui justum erat, ut is, qui de rebus se recte cognoscere pronunciaret, semper sermonem suum victorem statueret, siquidem vera cognosceret, ac recte sentiret, ac judicaret. Verum hujusmodi homines videntur mihi seipsos oppugnare in verbis sermonum suorum, præ stulticia, & Melissi sermonem approbare. De his igitur sufficiunt mihi, quæ retuli.

* At vero ex Medicis quidam dicunt, quod homo sanguis solum est, alii ex ipsis bilem ajunt hominem esse, aliqui pituitam, epilogum autem & ipsi omnes eundem faciunt. Unum enim quid esse dicunt, quodcumque cuique ipsorum nominare visum est, & id ipsum unum existens, speciem, ac vim transmutare, coactum a calido, ac frigido, fierique & dulce, & amarum, & album, & nigrum, & omnigenum quid aliud. Mihi vero neque hæc sic se habere videntur. Plurimi quidem igitur talia quædam, & amplius his proxima pronuntiant. Ego autem dico, si unum esset homo, nunquam sane doleret. Neque enim esset, unde doleret unum existens. Si vero etiam doleret, necesse esset, & quod mederetur, ac sanaret unum esse. Nunc vero plura sunt. Multa enim sunt in corpore existentia, quæ quum mutuo præter naturam calhant, & frigeant, siccanturque, & humectantur, morbos pariunt. Quare multæ quidem species morborum sunt, multaque etiam medela ipsorum existit. * Atque ego sane cenſeo, eum, qui hominem sanguinem solum esse dicit, & nihil aliud, demonstrare debere, ipsum non transmutare speciem, neque omnigenum fieri, vel falcem horam aliquam anni, aut hominis ætatem, in qua sanguis solus in homine inesse appareat. Verisimile est enim, unum aliquid esse tempus, in quo appareat ipsum in seipſo unum existens. Eadem cenſeo etiam de eo, qui pituitam solum esse dicit, & qui bilem. Ego enim demonſtrabo ea, quæ hominem esse dixero, & juxta receptum morem, & juxta naturam, quod semper ea ipsa similia sint & in juvene, & in sene, & tempore frigido æque, ac calido. Exhibebo insuper signa, & necessitates ostendam, per quas unumquodque augetur, ac minuitur in corpore. * Primum quidem igitur necesse est generationem fieri non ab uno. Quomodo enim unum existens, aliud quid generat, si non alicui miscetur? Deinde neque generantur, si non ejusdem generis existentia miscantur, & quæ eandem vim habeant, neque sane nobis similia perficerentur. Et rurſus, si non calidum, ac frigidum, & siccū, ac humidum, moderate, ac æqualiter inter se haberent, sed alterum alterum multum præcelleret, & fortius debiliore præstaret, generatio fieri non posset. Proinde quomodo verisimile est, ab uno quid generari, quum neque a pluribus generetur, nisi haberint temperamentum inter se probe conveniens? Necesse itaque est tali existente natura cum aliorum omnium, tum humana, nec unum esse hominem, sed singula, quæ ad generationem ejus conferunt, vim quamdam in

- corpore habere, eam videlicet, quam contribuent. * Et rursus necesse est, secedere y
singula in suam ipsorum naturam, homine moriente, humidum nimirum ad humi-
dum, siccum ad siccum, calidum ad calidum, frigidum ad frigidum. Talis autem &
55 animalium esse natura, & aliorum omnium, generanturque similiter omnia, & occi-
dunt similiter omnia. Constat enim natura ipsorum ex his prædictis omnibus, &
desinit iuxta prædicta in id unumquodque, unde est compactum, secedens. At ve-
to corpus hominis habet in seipso sanguinem, & pituitam, & bilem duplicem,
flavam videlicet, & nigram. atque hæc sunt ipsi corporis natura, & per hæc & ægro-
60 tat, & sanus est. * Sanus eodem maxime est, ubi temperamentum hæc inter
se habuerint modetatum tum facilitate, tum copia, & ubi maxime fuerit per-
mixta. Ægrotat autem, quum horum quid minus, aut amplius fuerit, aut separa-
tur in corpore, & non fuerit reliquis omnibus contemperatum. Necesse est enim,
quum quid horum secretum fuerit, & per se steterit, non solum eum locum, unde
65 fecerit, inorbidum fieri, sed etiam eum, in quo stat, & in quem propter nimiam
copiam diffusum est, dolore, ac morbo vexari. Etenim quum quid horum extra
corpus effluxerit amplius, quam redundat, evacuatio ipsa dolorem exhibet. Rur-
sus itaque si idem intus fecerit evacuationem, & transiionem, ac ab aliis secretio-
nem, gemitatum dolorem exhibere, necesse est, velut dictum est, nempe & un-
70 de fecerit, & ubi receptum redundat. Dixi porro, quæcumque hominem esse dise-
ro, semper demonstraturum me esse, quod talia sint, & iuxta receptum morem, ac
opinionem, & iuxta naturam. * Et dico sane, esse sanguinem, & pituitam & bilem fla- 7
vam, ac nigram: & horum primum quidem iuxta receptam opinionem nomina di-
stineta esse dico, & nulli ipsorum idem nomen esse. deinde species iuxta naturam
75 separatas esse, & neque pituitam similem esse sanguini, neque sanguinem bili, neque
bilem pituitæ. Quo enim modo hæc inter se similia sint, quotum neque colo-
res similes videntibus appacent, neque ad manuum tactum similitudo aliqua esse
deprehenditur? Neque enim similiter calida sint, neque frigida, neque sicca, neque
humida. Quum itaque intantum inter se discrepent tum specie, tum facilitate, ne-
80 cesse est ipsa non unum esse, quoadquidem neque ignis, & aqua idem sunt. * Quod autem 8
hæc omnia non unum sunt, sed unumquodque ipsorum vim, & naturam suam habet,
vel hinc cognoscere licebit. Si enim homini alicui medicamentum dederis,
quod pituitam ducit, pituitam tibi vomes, & si pharmacum dederis bilem ducens,
bilem tibi vomet. Eadem ratione & bilem atram purgabit, si medicamentum exhi-
85 bueris, quod bilem atram ducit. * Quod si ipsi partem aliquam faciaris, ut vulnus 9
fiat, effluet ipsi sanguis, atque hæc omnia faciet tibi totam diem, ac noctem & hye-
me, & æstate, donec spiritum in sese trahere potens fuerit; potens autem erit, donec
aliquo horum congenitorum fuerit privatus. Congenita autem sunt prædicta. Quo-
modo enim non congenita essent? Primum etenim manifestum est, hominem
90 in seipso hæc omnia semper habere, donec vixerit. Deinde nata sunt ex homi-
ne hæc omnia habente. Postea nutrita sunt in homine hæc omnia habente, quæ
videlicet ego nunc dico, ac demonstro. Qui veto dicunt, quod unum est homo, vi-
dentur mihi hoc consilio usi esse. Nimirum quum vident eos, qui medicamenta
105 hauserunt in superpurgationibus interisse, alios quidem bilem vomentes, alios
pituitam, unumquodque horum hominem esse putaverunt, quod vidissent his put-
gationum interisse. Et qui sanguinem ducunt hominem esse, eodem consilio utuntur.
Nam quum vident jugulatos homines, & sanguinem ex corpore ipsorum effluen-
tem, hunc ipsum animam in homine esse putant, atque his testimoniis sane omnes
utuntur in testimoniis suis. * Atqui primum quidem in superpurgationibus, nemo 10
unquam mortuus est bile sola purgatus. Vetum quum quis pharmacum biberit,
quod bilem deducit, primum bilem vomet, deinde pituitam, postea per vim etiam
atram bilem, postremum moribundus etiam sanguinem purum vomet. Eadem
perpetiuntur a medicamentis pituitam ducentibus. Primum enim pituitam vo-
met, deinde bilem flavam, postea atram, morientes autem sanguinem purum,
105 & in hoc mox vitam finiunt. Etenim pharmacum, ubi corpus intraverit, primum
quidem ducit id, quod ex omnibus in corpore existentibus, sibi maxime secun-
dum naturam familiare fuerit, deinde vero etiam alia trahit, ac purgat. Quem-
admodum ex terra nascentia, & in ipsam plantata, ac seminata, ubi in terræ pri-
venietint, unumquodque trahit id, quod naturæ suæ familiare in terra existit. * Inest 11
110 autem in terra & acidum, & amarum, & dulce, & salum, & omnigenum. Pri-
mum itaque plurimum ejus trahit in seipsum, quod sibi ipsi iuxta naturam maxi-
me familiare fuerit, deinde trahit etiam reliqua. Hujusmodi sane quiddam etiam
pharmaca in corpore faciunt. Quæcumque enim bilem ducunt, primum metacis-
tiram bilem purgant, postea vero mixtam. Et rursus pituitæ pharmaca, pri-
115 mum meracissimam pituitam ducunt, postea mixtam: Et jugulatis primum qui-
dem sanguis calidissimus, & ruberrimus profluit, deinde pituitosior, ac bilio-
sior. * Porro pituita in homine hyeme augetur. Hæc enim hyeme maxime secun-
dam naturam convenit ex omnibus in corpore existentibus. Frigidissima enim
existit. Signa autem, quod pituita frigidissima est, hæc sunt. Si enim pituitam, &
120 bilem, & sanguinem contingere libuerit, pituitam sane frigidissimam esse compe-
ries,

- ries, quamvis viscosissima sit, & per vim maxime post bilem atram trahatur. 125
 cuæ vero per vim trahuntur, calidiora sunt a violentia coacta, sed tamen supra
 hæc omnia, frigidissima esse apparet pituita ex sua ipsius natura. Quod autem
 hyems corpus pituita repleat, inde cognoscere datur, quod homines paucissimis
 & spumit, & emungunt hyeme, & tumores laxi albilissimi sunt maxime 125
 13 hoc tempore, nemque reliqui morbi pituitosi. * Cæterum vere pituita quidem ad-
 huc fortis in corpore manet, sed sanguis augetur. Nam & frigora remittunt, &
 imbres superveniunt. Sanguis autem juxta hæc augetur, ab imbris videlicet,
 & calidiorum dierum tempore. Hæc enim anni pars maxime juxta naturam ipsi convenit,
 ut quæ calida, & humida existat. Signa autem hinc colligere licet. Quod homines 130
 vere, & æstate maxime dysenterii corripuntur, & sanguis ex naribus ipsis fluit,
 & calidissimi, ac ruberrimi. At vero æstate sanguis adhuc viget, & bilis in cor-
 pore elevatur, & usque in autumnum porrigitur. In autumno vero sanguis modici-
 14 us fit, contrarium enim ejus naturæ id tempus existit. * Bilis autem pro æstate, ac au-
 tumnum corpus possidet, id quod inde cognoscere potes, quod homines sua spon-
 te hoc tempore bilem vomunt, & in medicamentorum potionibus biliosiora purgan-
 tur. Manifestum fit & febribus, & hominum caloribus. Pituita autem æstate debilis
 seipsa est. Contrarium est enim naturæ ejus id tempus, calidum enim est, & siccum. San-
 guis vero autumnum paucissimus fit in homine. Siccus enim est autumnus, & homi-
 nem jam frigidare incipit. Atræ porro bilis autumnus & plurima, & fortissima 140
 est. Postquam autem hyems apprehenderit, bilis flava perfrigerata modica fit, & pi-
 tuita rursus augetur tum ob phlegmatis copiam, tum propter longitudinem noctium.
 15 * Corpus quidem igitur humanum hæc omnia semper habet, verum pro temporis cir-
 cumstantia aliquando plura seipsis sunt, aliquando pauciora, singula tum juxta partem,
 ac copiam, tum juxta naturam. Quemadmodum enim annus omnis omnium particeps 145
 est & caliditatis, & frigiditatis, & siccitatis, ac humiditatis, neque enim quicquam
 horum ne minimo quidem tempore consisteret, ac duraret citra omnia ea, quæ in hoc
 mundo insunt, verum si unum aliquid deficeret, omnia sane abolerentur: ex eadem
 enim necessitate omnia consistunt, & mutuo aluntur. Sic etiam si quid ex homine
 16 deficeret ex his, quæ ipsi congenita sunt, non sane vivere posset homo. * In anno au-
 tem aliquando quidem hyems maxime viget, aliquando ver, modo æstas, modo au-
 tumnus. Sic etiam in homine aliquando pituita prævalet, aliquando sanguis, aliquan-
 do bilis, primum quidem flava, deinde etiam nigra appellata. Quorum omnium evi-
 dentissimum testimonium hinc habes. Si enim eidem homini idem pharmacum quater in
 anno dare velis, vomet tibi hyeme quidem pituitosissima, vere autem humidissima, 155
 17 æstate biliosissima, autumnum nigerrima. * Itaque quum hæc sic se habeant, ipsique
 morbi hyeme auferunt, æstate desinere solent, quicumque vero æstate auferunt,
 hyeme finire consueverint, nisi certo dierum circuitu discedant; & circuitu autem
 rursus dicam. Quicumque autem morbi vere sunt, ad autumnum eorum discessum fore
 expectare oportet. Quicumque postremum autumnales morbi sunt, eorum disces-
 sum necesse est vere fieri. Quicumque vero morbus hæc tempora transgressus fue-
 rit, eum annum fore scire oportet. Porro Medicum sic adversus morbos insti-
 tuere oportet, prout unicuique horum in corpore prævalet, juxta tempus sibi
 ipsi maxime naturæ conveniens existens.

Additicia sunt hæc, non genuina Hippocratis, ut ait Galenus.

- Quin & hæc insuper ad illa nosse oportet, quod quoscumque morbos repletio parat, 165
 evacuatio sanat: & quicumque ex evacuatione sunt morbi, repletio sanat, qui-
 cumque vero a labore sunt, quies sanat. qui autem ab ocio gignuntur, labor sanat.
 18 * In summa Medicum scire oportet, opponere se contrarium instantibus, & mor-
 bis, & naturis, & temporibus, & ætatibus, & dissendentia solvere, & soluta dis-
 tendere. Sic enim vel maxime morbum sedaverit, & mihi sane hoc ipsum sana-
 tio esse videtur. Morbi partim ex dietis, partim ex spiritu, quem attrahentes vi-
 vimus, fiunt. Utrorumque cognitionem sic facere oportet. Quando ab uno mor-
 bo multi homines corripuntur eodem tempore, causam ad id, quod communissi-
 mum est, & quo maxime omnes utimur, referre oportet. Est autem hoc spi-
 ritus, & aer, quem inspirando trahimus. Manifestum est enim jam, quod diæta 175
 unicuique nostrum causa non est, quum morbus omnes consequenter con-
 ingat & juniores, & seniores, mulieresque, ac viros, & tam violentos, quam a-
 que porores, & tam mazam edentes, quam pane vescentes, & tam multum labo-
 rantes, quam parum, nequaquam igitur diæta causa fuerit, quum homines, diver-
 sa victus ratione utentes, ab eodem morbo corripuntur. Quum vero omnis gene-
 ris morbi sunt eodem tempore, palam est victus singulos singulas causas esse, & ci-
 ram sane facere oportet ex contrario instando adversus morbi causam, quemad-
 modum & alibi a me relatum est, & victus rationem permutare. Consuevit
 qui enim diætam, quæ homo uti consuevit, non esse ipsi commodam aut in totum,
 aut magna ex parte, aut unum saltem quoddam ex ipsa: quod ubi cognoveris trans-
 mutare oportet, habitaque consideratione naturæ hominis, & ætatis, & speciei, ho-
 185 ræque

raque, anni, & modi ipsius morbi, curationem facere, aliquando detrahendo, aliquando apponendo, & quemadmodum iamdudum a me dictum est, ad singulas aetates, & horas, & species, & morbos respiciendo, tum in exhibendis pharmacis, tum in constituenda dieta. * At vero quum unius morbi popularis grassatio consistit, manifestum est, dietam non esse culpabilem, sed quem trahimus spiritum in causa esse: palamque est insuper eum ipsum spiritum, sive aerem morbosam aliquam exhalationem habere. Eo itaque tempore homines in hunc modum commone facere oportet, Nimirum ut dietas non permittent, quia morbi causa non existunt, verum ut videant, quod corpus habeant quam minimam molis, ac debilissimum: detrahendi insuper sunt cibi, ac potus, quibus uri consueverunt, idque paulatim facere oportet. Nam si quis cibo dietam permittet, periculum est etiam a permutatione aliquid in corpore novatum iri. Quapropter victu solito quidem utendum est, ubi hominem nihil laedere videtur, providendum vero, ut quam paucissimus aeris influxus in corpus ingrediat, & ut ille ipse, quam peregrinissimus existat. Regionum etiam locos, in quibus morbus consistit, quantum ejus fieri potest, permutare oportet, & corpora attenuare: sic enim minime multo, ac denso spiritu homines opus habuerint. Porro quicumque morbi a fortissima corporis parte sunt, gravissimi existunt. Etenim si isthic, ubi initium sumperint, permanserint, necesse est fortissima parte laborare, totum corpus laborare. Et si a validissima ad quandam debiliorem transierint, difficulter solvuntur. Quicumque a debilioribus partibus ad fortiores transierint, commodius solvi possunt. Nam influenza a vi ipsarum facile consumuntur. * Venae crassissimae sic se habent, Quatuor paria ipsarum sunt in corpore; & unum quidem a capite retro per cervicem, forinsecus ab utraque spinæ parte ad coxendices, & in crura progreditur, deinde per syras, & malleolos forinsecus ad pedes pervenit. Oportet igitur venæ sectiones in doloribus dorsii, ac coxendicum, de poplitibus facere, & de malleolis forinsecus. Alterum par principium ex capite juxta aures habet per cervicem, & sphagitides appellantur, hoc est jugulares; deferunturque utrinque juxta spinam intrinsecus ad lumbos, in testes, ac femora, & per poplites ex interna parte, deinde per suras ad malleolos intrinsecus, & in pedes. * Quapropter in doloribus lumborum, ac testium, venæ sectionem de poplitibus, ac malleolis facere intrinsecus. Tertium par venarum ex temporibus per cervicem sub scapulas tendit, & ad pulmonem deferunt, altera quidem a dextris ad sinistram partem, altera vero a sinistris ad dextram, & dextra quidem sub mammam abit, & in splenem, & in rhenem, sinistra vero in dextram partem tendit a pulmone sub mammam, & in hepar, & in rhenem. Utraque autem in rectum intestinum, ac podicem definit. Quartum par a priore capitis parte, & oculis sub cervicem ad clavículas devenit, deinde super brachia superne in flexuras, postea per cubitos in manuum iuncturas, ac digitos, deinde a digitis rursus, per cubitos, ac manus superne in flexuras, & per brachiorum infernam partem ad alas, unde superne a lateribus altera in lienem pervenit, altera in jecur, postea supra ventrem utraque in pudendum definit. Et crassissimae quidem venae sic se habent. * Sunt autem & ex ventriculo venae per corpus multae, & omnigenae, per quas corpori alimentum accedit, ferunt autem a crassius venis, in ventriculum, ac reliquum corpus & ab externis, & ab internis, & inter se mutuo distribuunt internae extrinsecus, ac vicissim extrinsecus internis. Venae igitur sectiones juxta praedictum sermonem facere oportet. Evitandum est autem, ut sectiones quam longissime a locis faciamus, ubi dolores fieri, & sanguis colligi solet. Sic enim mutatio minime magna de repente fiet, & consuetudinem removebit, ut non amplius in eundem locum colligatur. * Quicumque pus multum spūunt, citra febrem, & quibuscumque in urina pus multum subsidit, citra dolorem, & quibuscumque alpi recrementa cruenta, velut in dysenteria, & tarde, ac diutine procedunt, velut in juvenibus quinq; & triginta annorum, atque etiam senioribus, his omnibus ex eadem causa morbi sunt. Necesse est enim hos labori deditos, ac exercitationis studiosos, & corpore operarios in juventute fuisse, postea vero relictis laboribus, molli carne, & multum a priore differente carnosos redditos esse, & corpus multum discrepans habere, ut id, quod prius exiit, cum eo, quod nunc adepti sunt, nulla parte consentiat. Quum igitur morbus aliquis corripuerit sic dispositos, e vestigio quidem effugiunt, postea autem a morbo progressu temporis corpus colligescit; & serosi, ac saniosi humoris species per venas, qua parte maxime amplas fuerint, fluit. Siquidem igitur in inferiorem ventriculum processerit, fere qualis in corpore inest, tale etiam recrementum prodit. Quum enim declivis sit via, non multo tempore haeret in intestino. * Quibuscumque autem in pectus influxerit, suppurati sunt. Nimirum purgatione acclivi existente, & multo tempore in pectore immorans putrescit, & purulenta redditur, quibuscumque vero eadem serosi humoris species in vesicam propulerit, a loci caliditate, calida, & alba fit, & segregatur, & quod quidem rarissimum est, superstat, crassissimum vero infra mergitur, quod sane pus appellatur. Fiunt autem calculi pueris propter huius loci caliditatem, itemque totius corporis. Viris autem calculi non generantur propter corporis frigiditatem. Nam id probe nosse oportet, quod homo primis diebus calidissimus est.

est sui respectu, ultimis frigidissimus. Necesse est enim, augescens, & ad vim procedens corpus calidum esse. Ubi autem incepit marcescere corpus, delabens in ocium, frigidissimum evadit. Et juxta hanc rationem, quanto amplius primis diebus homo augescit, tanto calidior existit, & quanto plus ultimus datus marcescit, tanto frigidior esse necesse est. * Sani autem sunt sua ipse illi predicto modo dispositi, ac affecti, plurimi quidem ab hora, qua liquefcere incipiunt, quinto, & quadragesimo die. Qui vero hoc tempus transgressi fuerint, anno finito sua ipse convalescent, nisi quid aliud mali gravioris hominem infestet. Quicumque morbi sensum ex modici temporis causa sunt, & quorum causae cogniti faciles sunt, securissimi appellari possunt. Curationem itaque ipsorum instituire oportet, ut causae morbi nos opponamus. Sic enim solvitur utique id, quod morbum in corpore fecit. Quibuscumque arenosa, aut tosi in urinis subsident, his initio tubercula circa crassam venam enata sunt, & suppurata. Postea vero tuberculis non cito effractis, tosi ex pure coaliti sunt, qui per venam foras exprimuntur una cum urina. * Quibuscumque vero cruentae urinae sunt, his venae labomant. Quibuscumque autem in urina crassa existente, carunculae parvae capilliformes simul prodeunt, eas a rhenibus prodire nosse oportet, & ab arthriticis. Quibus vero pura urina est, & alias atque alias velut furfures in urina innatant, horum vesica scabiosa existit. * Febres plurimae a bile sunt. Species ipsarum quatuor sunt praeter eas, quae ab oculis doloribus generantur. Nomina ipsarum sunt: Continens, Quotidiana, Tertiana, Quartana. Contines itaque appellata, a plurima, ac meracissima bile provenit, & judicationes quam brevissimo tempore facit. Corpus enim nullo tempore perfrigeratum cito colliquefcit, nimirum a multae caliditate calefactum. Quotidiana vero post continenter a plurima bile generatur, & praeter reliquis celesterrime discedit, verum longior est continenter, quanto a pauciore bile provenit, & propterea quod requiem habet in ipsa corpus. In continenter vero non quiescit ullo tempore. * Tertiana autem longior est, quam quotidiana, & a pauciore bile gignitur. Quanto vero longiori tempore in tertiana corpus quiescit, quam in quotidiana, tanto diuturnior hae febris est, quam quotidiana. At vero quartanae reliquae juxta eandem rationem habent, sed tertianis diuturniores sunt, quanto pauciore bilis parte participant, unde caliditas augetur, & propterea quod corpus in ipsis plus perfrigerat id, quod ab atra bile ipsis contingit superflue, adeo ut aere frigus depelli possit. Atra enim, bilis inter omnes corporis humores viscosissima est, & sedes diuturnissimas facit. * Quod autem quartanae febres atrae bilis participes sint, vel hinc condicere licet. Autumno enim maxime homines a quartana corrumpuntur, & in aetate a quinque & viginti annis usque ad quadragesimum quinquum. Haec autem aetas praeter omnibus aliis maxime a bile atra infestatur, & autumnus tempus omnium anni temporum ad eandem apertissimum est. Quicumque autem extra hoc tempus, & aetatem a quartana corrumpuntur, pro certo scire oportet, eam febrem non fore diuturnam, nisi quid aliud gravioris mali hominem infestaverit.

DE SALUBRI DIÆTA LIBER

*Additus est ad librum De natura hominis, Polybi
Hippocratis discipuli, ait Galenus.*

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Diæta idiotarum, & privatorum, qualis hyeme, vere, æstate, & autumno esse debeat.
- 2 Diæta ad ætates, ad anni tempus, & ad corporum species constituenda.
- 3 Ambulandum hyeme velocius, æstate tardius, nisi per altum iter facias. Carnosi gracilibus citius ambulent. Balnei quomodo utendum. Vestes paræ hyeme induenda, æstate sordida, & oleo imbuta.
- 4 Gracilitatem corporis quo studio consequeris. Pinguis ex gracili quomodo fiat.
- 5 Vivendum sex mensibus hyernis.
- 6 Quæ infusa, quibus temporibus, quibusque naturis conveniant. Infusa crassa, & tenuia quæ.
- 7 Crassi, & graciles quomodo ad vomitum preparari. His in mense vomere consueti, illi melius est, ut consequenter in duobus diebus quem per majora intervalla vomant.
- 8 Cibis revomere consuetorum, aut quorum alvi non probum transitum habent, curatio.
- 9 Puerosiorum infantium educandi, & cibandi ratio.
- 10 Mulieribus siccioris modi diæta convenit. Exercitiorum ratio juxta temporum anni differentias instituitur.
- 11 Alvi profluvii in ætate utentibus, & extremæ ciborum speciem referentibus, curatio diætetica. Item quibus temperamenti hic morbus sit familiaris. Corpora densam carnem habentia, illi quæ ra-

rum haberi, a carissimum esum magis ledantur.

12 Cibum potissime cruciantes, longiori somno,

& aliis laboribus curantur.

13 Siti correptis cibi, & labores detrahendi,

vinum vero aquosum, & frigidissimum exhibendum.

14 Aquae, aut muci per nares, vel aures eruptio, capitis temporem solvat. Sanitatesque pretiosissima.



IDIOTAS, & privatos homines hac dieta uti oportet. Hyeme quidem comedere quam plurima, bibere autem quam paucissime. Sit potus vinum quam meracissimum: cibi, panis, & obsonia assata omnia. Oleribus quam paucissimis hoc tempore utendum est. Sic enim corpus maxime siccat, ac calidum redditur. Ubi vero ver apprehenderit, tunc sane potum amplius allumere oportet, vinum dilutus, & paulatim: cibis quoque mollioribus, ac paucioribus tum utendum est: & ablato pane, mazam exhibere, & iuxta eandem rationem obsonia detrahere, & ex assatis omnia cocta facere.

Oleribus vero paucis tunc uti oportet, donec ad aestatem perveniat homo, in cibis mollioribus utendo, & obsoniis coctis, & oleribus tam crudis, quam coctis, similiterque potibus quam dilutissimis, ac plurimis: ita tamen, ut paulatim non de repente his utatur, ne videlicet magna mutatio fiat. At vero aestate maza molli nutriatur, & potu aquoso, ac multo, obsoniis omnibus coctis. Sic autem his, ubi aestas fuerit, uti oportet, ut frigidum sit corpus, & molle. Tempus enim calidum est, & siccat, & facit corpora aestuosa, ac squalida. Quapropter tali studio auxiliari oportet. Juxta eandem vero rationem, quemadmodum ex hyeme ad ver, sic ex vere ad aestatem deducendus est, cibo quidem detracto, potu vero aucto. Sic quoque contraria faciendo, ex aestate ad hyemem perducat. In autumno vero rursum cibi plures exhibendi sunt, & sicciores, & obsonia juxta eandem rationem, potus vero pauciores, & meraciores, quo etiam hyems bona fiat, & homo in ipsa utatur potibus meracioribus, ac paucis: cibis vero quam plurimis, ac siccissimis. Sic enim & maxime sanus fuerit, & minime frigore impetetur. Nam tempus hoc valde frigidum, ac humidum existit. Porro habitibus corporum carnosus, & mollibus, acris, plurimo anni tempore, siccioribus dietis uti conducit. Humida enim est ipsorum natura. Verum duros, & graciles, fulvosque, ac nigros, humidior dieta majoris temporis parte viciare oportet. Corpora enim talia sicca existunt. Sed & juvenibus corporibus, mollioribus, & humidioribus dietis uti confert. Nam aetas ipsorum sicca est, & corpora compacta sunt. Seniores autem sicciori victus modo, majori temporis parte degere oportet. Corpora enim in hac aetate humida sunt, & mollia, ac frigida. Oportet igitur & ad aetatem, & ad tempus anni, & ad corporum species, ac habitus dietas constituere, ita ut consistentibus & caloribus, & frigidioribus nos opponamus. Sic enim maxime sani fuerint. Quin & ambulandum hyeme quidem velociter est, aestate autem leniter, nisi per solis aestum iter faciendum sit. Oportet autem & carnosos citius ambulare, graciles vero tardius. Balneis quoque multis aestate utendum est, hyeme paucioribus. Gracilibus autem magis expedit lavari quam carnosis. Vestes autem puras induere hyeme oportet: oleo imbutas, ac sordidas aestate. Caterum pingues, & qui graciles fieri volunt, omnes labores jejuni facere debent, & cibos allumere anhelantes adhuc ex fatigatione, & non refrigerati, praeparo vino diluto, & non valde frigido, & obsonia preparata allumere ex separatim, aut condimentis hortensibus, & aliis hujusmodi. Sint autem obsonia pingua, quae offeruntur: sic enim a quam paucissimis impleri poterint. Sed & seculum in die cibum sumere, & illorum manere, & stratum durum habere, & nudum deambulare oportet, quantum ejus maxime fieri potest. Quicumque vero graciles sunt, & pingues fieri volunt, tum alia his, quae dixi, contraria facere, tum jejunos nullum laborem subire, oportet. At vero vomitibus, & alvi per infusa elocutionibus, hoc modo utendum est. Sex menses hyemem vomendum est. Hoc enim tempus pituitosius est aestivo, & morbi circa caput sunt, & regionem eam, quae est supra septum transversum. Quum vero aestas, ac calor fuerit, infusus utendum est. Hora enim hac aestuosa est, & corpus biliosius, & lumbi, ac genua gravantur, & calores oboruntur, & in ventre tormina sunt. Quapropter corpus perfrigerare oportet, & quae in sublime elevarunt, inferne tubercula ex istis locis. Sint autem infusa pro crassioribus, ac humidioribus saliosa, & tenuiora, pro siccis vero, & gracilibus, ac debilioribus pinguiora, ac crassiora. Crassa autem, & pingua infusa sunt, quae ex lacte sunt, & ciccerum decoctum, & alia hujusmodi. Tenuia vero, & salia sunt muria, & aqua marina, & ejusmodi. At vero vomitus sic facere oportet. Quicumque homines crassi, & pingues sunt, & non graciles, jejuni vomant a cursu, aut ambulatione cita, juxta meridiem. Sit autem dimidia hemina hyssopi in aquae congio contriti, atque hoc ebibat affuso aceto, & adjecto sale, quo jucundius evadat. Bibat autem primum sensim, ac lentius, postea amplius, & citius. Qui vero graciliores sunt, ac debiliores, a cibis vomitus faciant hoc modo. Lotus calida praebat meri heminam, deinde cibos omnigenos edat, & neque dum cibum sumit, neque a cibo bibat, sed continet se, donec quatuor stadia quis percurrat, deinde vina tria permixta ipsi in potu

- potu offerantur, austerum, dulce, ac acidum, primum quidem meracius, & paula- 65
tim, & per multum temporis spatium; deinde vero dilutus, & crenus, & multum.
Quicumque autem bis in mense vomere consuevit, hunc melius est, ut consequenter
in duobus diebus vomat, quam per quintum, & decimum. Verum aliqui penitus con-
trarium faciunt. * Quibuscumque vero commodum est removere cibos, aut quibus alvi 70
non probum transitum habent, his omnibus conducit saepe in die comedere, &
omnigenis edulis uti, & obsoniis variis modis preparatis, vinumque bibere idu-
plex, aut triplex. Qui vero revomunt cibos, aut alvos habent humectas, his om-
nibus contrarium huiusmodi facere conducit. * Ceterum pueros infantes per mul- 75
tum tempus in aqua calida madefacere oportet, & vinum bibendum dare aquo-
sum, & non penitus frigidum. Dandum est & id vinum, quod minime ventrem
elevet, ac inflat. Hæc autem facere oportet, ut & convulsionibus minus corripian-
tur, & majores fiant, ac meliorem calorem adipiscantur. * Mulieres porro, siccioris 80
modi diata uti oportet. Nam & cibi sicciores ad muliebrum carnum molliem
commodiores sunt, & meraciores potus præstabiles utero, ac foetum
nutrimenta. Qui exercitiis intus, hyeme currere, ac luctari debent. Aestate ve- 85
ro luctari quidem parum, currere autem minime, sed multum deambulare secun-
dum venas, ac frigus. Quicumque ex curibus fatigati fuerint, eos luctari opor-
tet. Qui vero ex lucta fatigantur, eos currere expedit. Sic enim laborans, fatigata
corporis parte, vel maxime calefieri, componique, ac recreari queat. * Quoscumque ex- 85
ercitiis utentes, alvi profluvia corripunt, & recrementa ciborum speciem sclerentia ac
cruda habent, his exercitiorum non minus, quam tertiarum partem detrahere oportet,
& ciborum dimidium saltem exhibere. Palam est enim, quod ventriculus consone-
re non potest, quo ciborum multitudo concoquatur. Sint autem his cibi, panis quam
maxime assatus in vino intratus, & potus quam parcellissimus, ac meracissimus, &
deambulationibus a cibo ne utantur. Oportet autem sub hoc tempus semel dum- 90
taxat in die cibum sumere. Sic enim quam maxime concalefcit ventriculus, & ea quæ
ingesta sunt, exsuperaverit. Fit hic profluvium alvi modum maxime his corporibus,
quæ densam carnem habent, quum ad carnium esum homo cogitur, natura ejusmo-
di existente. Venæ enim densata cibos ingestos non suscipiunt. Est autem hæc 95
natura acuta, & in utramque partem vertitur, & ad modicum tempus viget bona
habitus in talibus corporibus. Ac vero rariores, ac hirsutiores corporum species
ac habiunt tum carnium esum suscipiunt, tum labores magis tolerant, & bonæ
habitudines ipsis sunt diuturniores. * Quicumque postredie cibos eructant, & præ- 100
cordia ipsis elevantur, utpote cibis crudis, & ineoctis existentibus, his longiori
quidem tempore dormire conducit, verum & aliis laboribus corpora ipsorum cogere
oportet. Vinum autem meracius, & amplius bibant, & cibis paucioribus sub id
tempus utantur. Palam est enim, quod ventriculus præ imbecillitate, ac frigidita- 105
te, ciborum multitudinem concoquere non potest. * Quoscumque vero sitis corrumpue-
rit, his & cibi, & labores detrahendi sunt, & vinum bibant aquosum, & quam frigi-
dissimum. Quibuscumque autem dolores sunt ex visceribus sive ex exercitiis, sive ex
aliquo alio labore, his quiescere conducit, cibis abstinentes, potione autem utantur,
quæ quam parcellissime in corpus assumpta, plurimam urinam ducat, quo venæ vi- 110
sceribus instat non distendantur repleta. Ex talibus enim tubercula oboriuntur,
ac febres. Quibuscumque vero morbi a cerebro sunt, corporis primum caput occu-
pat, & frequenter mingit ager, & reliqua, velut in urina stillicidio perperitur, 115
atque hæc sane ad dies novem paritur. * Et si quidem erumpat per nares, aut autem
aqua, sive muco, a morbo liberatur, & urina stillicidium sedatur. Mingit autem
multum, & citra dolorem, idque album, donec viginti præterierint dies, & capi-
tis dolor hominem relinquit. Intendenti autem oculos splendor occultatur. Porro
virum prudentem id secum reputare oportet, quod res preciosissima est sanitas, 115
& proinde seire, ut ex suo ipsius consilio in morbis utilitatem percipiat.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE GENITURA.

Hic a Galeno Polybi esse perhibetur.

Argumentum in Librum sequentem.

1 *Providentis nature vis, & genitura proveni-
ens. Cuius voluptas vult. Cur genitura
spumescat.*

2 *Cur valentissimum Venere externatur. Sen-
guis aliquando in genitura profuit. Alium*

*seminis, alium urina meatus. Somnia ve-
neris quomodo fiant, & pollutiones vult.*

3 *Emuncti cur non coeant, ac imbecilliores
sint, & quod rem secundum aures inci-
sa inferendos reddant.*

4 *Quasmodum pueri, & puella semen non ex-
cernant, & menses virginibus juven-
culis*

calis non procedunt.

5 Genituram ab omnibus corporis partibus ex-
cerni. Humores corporis quatuor.

6 Quid mulieribus in coitu accidat, & Vene-
rem cum uterumque, sed majore viro
voluptate fieri.

7 Mulieribus frigens coitus expedit. Adensum
retentorum incommoda. Nota conceptus,
& quod semen masculum, & feminem
utrique infit: & cur nec mares, neque
femina gignantur.

8 Liberosam varietas unde, & qui aliquam re
parentem referant: & cur imbecilles ex
robustis, & non omnes robusti, & mae-
riem parvi, nunc magni edantur. Excer-
plum cucumeris ad puerum in utero. Cur
mutili, & magna scire ex parte integri ex
mutilatis nascantur.

9 Fertus quando perdat. Simile de terra ad
fertus mutilos. Cur integri, & sani
ex mutilatis, & mutilati ex mutilatis
nascantur.



EX quidem omnia corroborat. Verum genitura viri provenit
ab omni humido, quod in corpore existit, ita ut id, quod ro-
bustissimum est, seceratur. Argumentum autem ejus, quod ro-
bustissimum seceratur, hoc est: quod a Veneris usu paucula adeo re-
emissa, imbecilles reddimur. Habet autem res hoc modo. Ven-
nae, & nervi ab omni corpore in pudendum vergunt, quibus,
dum aliquantulum teruntur, & calefcunt, ac implentur, velut pru-
ritus incidit, & ex hoc toto corpori voluptas, ac caliditas accedit. Quim vero pu-
dendum teritur, & homo movetur, humidum in corpore calefcit, ac diffunditur,
& a motu conquassatur, ac spumescit: quemadmodum etiam alii humores omnes
conquassati spumescunt. * Sic autem in homine ab humido spumescente id, quod ro-
bustissimum est, ac pinguius, seceratur, & ad medullam spinalem venit. Ten-
dunt enim in hanc ex omni corpore vias, & diffundunt ex cerebro in lumbos, ac in
totum corpus, & in medullam: & ex ipsa medulla procedunt vias, ut & ad ipsam hu-
midum perferatur, & ex ipsa secedat. Postquam autem ad hanc medullam genitura
pervenit, procedit ad rhenes, hac enim via tendit per venas: & si rhenes fuerint
exulcerati, aliquando etiam sanguis simul defertur: a rhenibus autem transit per me-
dios testes in pudendum. Procedit autem non qua urina, verum alia ipsi via est illi contigua.
Et sane qui somnia venerae habent, propterea per somnum genituram effundunt,
quum humidum in corpore diffusum, & calfactum fuerit, & sive ex labore, sivealiqua
quapiam re spumaverit, dum ab ipso seceratur, coitus imaginem representat. Ha-
bet enim humiditas hac similitudinem ut in coenitibus. Sed non est mihi de his, qui
per somnum semen emittunt, & de toto morbo quid est, & quae operatur, & quare
coitus locum expleat, sermo. Atque haec quidem de hoc dicta sufficiunt. * Ceterum eu-
michi propterea non coeunt, quia geniturae transitus ipsis sublatus est. Est enim per
ipsos testes via ejus, & nervi tenues, ac crebri ex testibus in pudendum tendunt,
quibus & elevatur, & demittitur, atque hi nervi in sectione dam caltrantur, re-
scinduntur, quapropter non sunt utiles eumichi. Nam nervus ipsorum extritis, geni-
turae via obstrata est. Calles enim obducitur testibus, & nervi duri, ac torpen-
tes a callo facti, pudendum neque tendere, neque laxare possunt. Quibuscumque vero
juxta aures venae sectae sunt, hi coeunt quidem, & genituram emittunt, verum mo-
dicam, & debilem, ac infocundam. Nam plurima genitura pars a capite juxta au-
res in spinalem medullam procedit. Ipse autem transitus, cicatrice sectioni induc-
ta, consolidatus est. * At vero puerulis venulae tenues, & repletae existentes, genitu-
rae transitum impediunt, & praeitus ipsi non similiter accedit, & propterea neque
conquassatur in corpore humidum ad geniturae secretionem. Quin & virginibus,
quosque juvenulae fuerint, menses non procedunt propter eandem causam.
Postquam autem adoleverint & virgo, & puer, venae in pudendum pueri ten-
dentes, itemque virginis in uterum, ample sunt praeparatae augmento, & oscula ipsarum
aperiuntur, & via, ac transitus per angustias contingit, & humidum tunc et-
iam agitationem habet: Nam sparsitas ipsi tunc ab agitatione, ac conquassatio-
ne contingit: & pueri sane procedit genitura, ubi plene puber fuerit ob hanc
causam, itemque virgini menses. Atque haec mihi sic demonstrata sunt. * Porro ge-
nituram dico a toto corpore secerari, & a solidis, & a mollibus partibus, & ab hu-
mido omni in toto corpore. Sunt autem humidi species quatuor, Sanguis, Bilis,
Aqua, & Piruita. Tot enim species congenitas homo in seipso habet, & ab
his morbi fiunt, aut etiam ex morbis discretiones. Et haec quidem dicta sunt a me
de genitura, inde fiat, & quomodo, & quare, & quibus genitura non est, & qua-
re non est, & de menses virginum, & quod mulieribus in coitu, dum confrica-
tur, ac teritur pudendum, & uteri moventur, velut praeitus in ipsos incidat, & quod
reliquo corpori voluptas, ac caliditas accedat. * Emittit autem & mulier a corpore
genituram, aliquando in ipsum uterum, qui sane inde humidus evadit: aliquando
foras, si uterum magis quam opportunum est, hiant. Et delectatur mulier, ubi coire in-
ceperit per omne tempus, donec vir semen emisit. Et si quidem appetit viro com-
misceri, prius quam viro emittit, & de cetero non similiter delectatur. Si vero non ap-
petit, simul cum viro delectari desinit. Et habet res hoc modo, quemadmodum si
quis in ferventem aquam, alteram frigidam infundat, illa fervere cessat. Sic geni-
tura

tura viri in uterum illapsa, caliditatem, & voluptatem mulieris extinguit. Exilit autem voluptas, & caliditas simul cum genitura in uteros illabente, deinde definit, quemadmodum si quis in flammam vinum infundat, primum quidem contingit flammam exilire, & per modicum tempus augeri, ad vini infusionem, deinde desinere. Ita etiam mulieri caliditas exilit ad genituram viri, deinde definit. Ceterum multo minus delectatur foemina, quam vir in coitu, & vir etiam tempore longiore. Propterea autem quod vir magis delectatur, fecernitur ipsi de repente ab humido, fortiori rursus, ac agitatione, quam mulieri. Habet autem & haec res hoc modo. * Mulieres si cum viris coeant, magis sanae sunt: si non, minus. Nam & uteri simul humidi sunt in commixtione: qui enim siccus est magis, quam convenit, fortiter contrahuntur; ubi vero fortiter contrahuntur, dolorem corpori afferunt: & simul coitus sanguinem calfaciens, ac humectans, viam faciliorem mensibus facit. Mensibus autem non procedentibus, corpora foeminarum morbofa sunt. Quapropter autem morbofa sunt, in mulieribus morbis referuntur. Et de his quidem haec sunt. Postquam autem coivit mulier, si quidem conceptura non est intra seipsam, pro more foras procedit genitura ab utriusque, ubi foemina volet. Si vero conceptura est, non procedit foras, sed manet in utero genitura. Nam uteri susceperunt, & conclusam in sese continent, osculo nimirum ipsorum praeter humiditatem contracto, ac concluso, simulque permiscuntur, tum quae a viro venit, tum quae a muliere emissa est. Quod si foemina partus perita sit, & cognoverit, quando genitura non exciderit, sed intus manserit, sciet, qua die intra seipsam concepit. Habet autem & hoc sic. Quandoque quidem fortius est semen a muliere emissum, aliquando vero debilius. Similiter etiam quod vir emisit. Et est tum in viro foemininum, itemque masculinum semen, tum idem in muliere. Fortior autem masculinus foemina est. necesse igitur est ipsum a fortiori semine generari, habetque res hoc modo. Si ab utriusque semen fortius proderit, masculus erit partus: si vero debile, foemina nascetur. Utrum autem multitudine, ac copia praevaleat, iuxta illud ipsum partus nascetur. Si enim multo plus fuerit debilis feminis, quam fortioris, superatur forte, & debili permixtum, in foeminam transit. Si vero plus fuerit fortis feminis, quam debilis, superatur debile, & in marem transit. Quemadmodum si quis ceram, & adipem miscet, & de adipem tamen plus conjiciat, enque ad ignem liquefaciat. Quoad quidem liquida fuerint, non apparet, utrum tandem horum imporet, ubi vero congelata fuerint, tunc iam conspicuum est, quod adeps ceram copia exsuperat. Sic habet etiam masculi, ac foeminae genitura. Quod vero & in foemina, & in viro genitura foeminea sit, ac mascula, ex manifestis factis conjectare licet. Multae enim mulieres jam foeminas pepererunt ex propriis viris; verum ad alios viros transgressae, masculos genuerunt. Et viri illi ipsi, apud quos mulieres foeminas pepererunt, ad aliarum mulierum mixturam progressi, masculos genuerunt. & quibus masculus sexus gignebatur, aliis foeminis permixti foemineam sobolem genuerunt. Atque haec sane ratio declarat, tum virum, tum foeminam, & foemineam, & masculam genituram habere. Nam apud quos viros foeminae pariebant, superabatur fortius semen a copia debilioris, & gignebantur foemellae. Apud quos vero masculos pariebant, superabatur debilius, & gignebantur mares. Procedit autem non semper ab eodem viro genitura fortis, sed neque semper debilis, sed alias alia, atque sic etiam in muliere res habet, ut minimè mirandum sit, eandem foeminam, eisdemque viros, sobolem masculam, & foemineam producere. Habet autem & in brutis genitura foemineae, ac masculae ratio eodem modo. Et in ipsa genitura egreditur & foemininum, & masculinum ab omni corpore, & a debilibus debilis, & a fortibus fortis: & necesse est sic in partum distribui. * Et ex quacunque corporis viri parte plus proderit in genitura, quam mulieris, partus ille magis similis erit patri. Undecunque vero a corpore mulieris plus venerit, magis assimilabitur matri. Est autem impossibile, partum per omnia matri similem esse, & patri nihil: aut vice versa, neque alteri quicquam similem esse: sed utrique necesse est in aliquo similem esse: liquidum ab utriusque corporibus semen in partum procedit. Ut autem tandem plus contulerit ad similitudinem, & a pluribus corporis regionibus, illi magis similis est. Contingitque aliquando, ut filia nata maiori ex parte, magis similis sit patri, quam matri, & filius natus aliquando magis similis est matri, quam patri. Atque haec tam multa a me relata declarant superiorem sermonem. Quod & in muliere, & in viro tum mascula, tum foeminea genitura exultat. Contingit autem & hoc. Quandoque partes tenues, & debiles generantur ex patre, & matre crassas, ac robustas: & si quidem multum jam generatis pueris tale quid contingat, manifestum est, quod foetus in utero egrotavit, & ab utero quid de suo ipsius incremento foras prodiret, utero nimirum amplius hians: & propterea debilis factus est. Unumquodque autem animal iuxta proprium robur egrotat. Si vero omnes pueri nati debiles fuerint, utri ipsi in causa sunt, angustiores, quam oportet, existentes. Si enim non habuerint fructuositatem, in qua foetus nutrirī possit, necesse est, ipsum tenuem fieri, utpote qui non habeat satis amplum locum ad incrementum capiendum. Si vero habeat satis amplum locum, & non egrotet, verisimile est, ex magis parentibus magnam sobolem generari. Habet autem res hoc modo. Quemadmodum si quis cucumerem, qui jam desloruit, sit autem adhuc tenellus, & in cucumeratio adhuc adhaereat,

- hæreat, ponat, ac immittat in vas angustum; æqualis, ac similis evadet cavitati ipsius vas. Si vero quis eundem in vas amplum indet, quod verisimile sit cucumeris capax esse, sed non valde multo majus, quam pro cucumeris natura, æqualis eadem, ac similis erit cucumeris vas amplius cavitati. Nam in augescendo cum vas cavitatem contendit, & ferme omnia nascentia sic habent, quo modo quis ipsa cogat. Sic sane & in puero se res habet. Si enim spatiositas ipsi contigerit in augescendo, major evadet: si vero angustia, minor. At vero mutilum in utero puerum, sentio aut confusum ex matris uterum gestantis plaga, aut eiusdem lapsu, aut alio quopiam violento affectu matri accidente, mutilatum esse. Qua vero parte mater plagas acceperit, ea puer mutilatur. * Si vero amplius contundatur foetus, ita ut pellicula ipsum continens rumpatur, perditur foetus. Quia & alia huiusmodi causa pueri mutilantur. Quum in utero juxta locum, in quo mutilatus est foetus, angustia fuerit, necesse est, corpus, quod in angustia movetur, mutilari, juxta illud locum. Quemadmodum etiam arbores quæcumque in terra sunt, & non habent satis amplum locum, verum a lapide, aut aliqua alia re impediuntur, quum emergunt, oblique, ac tortuose sunt, aut hac parte crassæ, altera tenues. Sic accidit etiam circa puerum, si in utero juxta aliquam corporis partem, angustior altera uteri pars altera fuerit. Cæterum quod ex mutilatis hominibus sani, & integri gignantur pueri, ut plurimum contingere solet. Habet enim mutilatum, numero omnia quæ sanum. Ubi vero morbus aliquis ipsis, & humidum ipsorum acciderit, a quo semen provenit (quatuor sane quum species sunt humidi, quæ naturaliter in corpore existunt) genituram non totam exhibent, debiliorem autem juxta mutilatam partem. Quare nihil miri mihi videtur, si etiam mutilentur, quemadmodum parens. Et hæc mihi de hoc dicta sufficiant. Redibo autem rursus retro ad sermonem, quem dicere reliqui.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE NATURA PUERI,

sive foetus:

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Genitura in utero coarctata, & callosa (utpote in calido existens) spiritum habet.
- 2 Omne calidum frigido nutriv moderato, Quæcumque calefunt, spiritum emittunt, & alium frigidum eius loco vicissim attrahunt.
- 3 Genituram non tantum a calido, sed etiam a matre spirante spiritum habere, eoque frui.
- 4 Spiritus transitus extra, ac intro juxta genituram modum per pelliculam fit. Genitura sex dierum foras prolapsa forma, Umbilicus spirationi destinatus, Pellicula genituram ambiens, ac completens, tota ex umbilico scinditur. Genitura a matre, sanguine in uterum descendente, augetur.
- 5 Atenses gravidibus, si puer sanus sit, & permanere debeat, non prodeunt, Pellicularum fatum ambientium eadem, quæ prima, ac æternæ ratio, & generatio. Carnis generatio quomodo fiat.
- 6 Atenses uterum severantes, cur non molestent, Genitura spiratio modica, sanguinem modicum: amplius, copiosorem, & uberius in utero trahit. Atenses recenti, uterum non gestantibus, quare dolorem inducent. Aduliebriæ corpora virilibus sunt humidiora.
- 7 Mulier a sanguine menstruo evacuata in utero concipit, repleta vero minime. Mala, quæ mulieribus ex lunaribus purgationibus

non procedentibus obtineant.

- 8 Pellicula, carne generata, ac augescente in utero sanguine augetur simul. Secunda, quando post genituram susceptam appellatur. Corporis totius, carne augescens, a spiritu articulatio. In corporis articulatione, similia semper ad similia transiunt.
- 9 Ossæ inde durefcunt.
- 10 Genitura, & carnis coarticulatione, simile semper ad simile prodegit. Atendendum discretio quot diebus fiat.
- 11 Primipara, & quæ rariis pariat, in partu, & partus purgationibus maxime laborant. Purgationes mensuræ a partu cur fiant.
- 12 Purgationum mensuram principium. Sanguis a partu, si mulier sana est, aut sana est futura, statim congelatur: si virginitas, contra.
- 13 Mulier, a partu non purgata, in magnam morbum, aut vitæ periculum, si non cito curetur, incidit. Articulationis dies purgationi a partu paræ.
- 14 Sanguinis fluxionem, in utero post semen illapsum, cur primo paucissimam, ac modicam esse, oporteat. Puer paulo ante trigessimam diem perditus, inarticulatus est. Femella cur posteriori fuerit, & articuletur. Purgatio mensura in femella diuturnior.
- 15 Ossæ quo tempore duriores fiant, & a quætuorcentis. Digitorum manuum, ac pedum eadem, quæ in arborum ramificatione, ratio. Pene hominis omnes in manuum, ac pedum digitorum definiunt, Capitis ve-

na totius corporis crassissima.

16 Pena, ac nervi tenuissimi, densissimi, ac plurimi in membris, ac pedibus. Unguibus in digitorum manuum, & pedum extremitatibus usui.

17 De pilorum natura, & alimento. Pili quae corporis parte, & cur in quibusdam posterius nascantur. Cero, genitura prodeunte reversit, & cuticula, & vena aperiantur. Pilorum alimentum inde.

18 Pili in rarissimis cuticula partibus nascuntur, Ennuchi ante pubertatem scilicet, cur neque in pube, neque mento pilos producant. Adulescentes cur mento, & corpore leviter. Calvi ut plurimum sunt piliatissimi.

19 Ennuchi cur non fiant calvi, Cauties inde. Capitis cuticula canorum albidior. Cani ex nativitate parte aliqua, partem illam albidiorum habent. Pili pro humiditate capitis colore inficiuntur.

20 Pueri motus in utero quando. Adulesci quo tempore, & cur citius moveantur. Lac quando matri sui pudicationem praebet. Lac quibus mulieribus citius, & quibus posterius prodeat.

21 De lactis generatione. Lactis persultationem quae citius percipiant. Pecora praegravata cur pinguiora. Naturam omnium hominum, & ex terra nascentium esse similem.

22 Lac quando in mamma procedat. Coitus modus veterem magis inducit. Puer de matre in utero vivit, & quali mater sanitas praedita est, talem etiam puer habet.

23 Fructus unde nutriantur, & concoquantur.

24 Arborei plantandi ratio, & modus.

25 Germinandi diversitas in iis, quae ex semine, & ex plantariis proviniant.

26 Planta aëre, quae necessitate ramos spargant. Terra pars inferna hyeme cur cadit, quam aestate. Finium, atque alia humectata, densius compressa, citius coalescunt.

27 Vestes pellidae fortiter compaëta a se ipsis comburantur. Fontes, ac marinae aquae cur hyeme austiores, & calidiores.

28 Aquam in terra non consistere, sed semper in declive procedere. Terra pars inferna aestate, quam hyeme frigidior.

29 Terra semper plui, aut minus in se aqua habet.

30 Aqua, quae hauritur in puteis, spi-

ritum semper movet.

Aqua consilens cur densior, & calidior.

31 Aqua fortiana hyeme, quam aestate calidior.

32 Arbori neque duo calida, neque duo frigida simul accedere debere. Arbori ex superna, & inferna parte nutiri.

33 Arbor vehementer tenera ciliens, fructus producere nequit. Arbores per tempus solida scilicet, & radicibus firmata, augevere desinunt.

34 Inoculatione in arboribus ratio, & cur arborum rami, aliis arboribus infusi, diversos fructus producere soleant.

35 Puer ex matris sanitate bene, vel male valet. De pueri situ in utero. Repetit disputationem de spiratione genitura per umbilicum.

36 Humana natura ad eam, quae incubantur, similitudo. Ovis volucrum umbilicum inesse.

37 De Partus ratione.

38 Pueri, matre violentam aliquam afflictionem patiente, aut alimento deficiente, ante decimum mensem eduntur. Uteri gestatio ultra decimum mensem (ut mulieribus videtur) quomodo contingat.

39 Conceptus cur faciles a mensium purgatione, Uteri gestatio non ultra decimum mensem ob alimenti, & augmenti, quod a matre descendit, inopiam.

40 Principia ob alimenti defectum saepe antea, citius mensem celsum perierunt. Adulescentes paucos menses dimittentes ut plurimum celsum sine lacte sunt.

41 Volucres ex ovi luto nascuntur. Omniumque adeo est rarum, ut spiritum transmutare possit. Pulli viginti diebus excluduntur.

42 Animalium cadex, quae hominis, & volucrum partus ratio. Partus faciles qui.

43 Principia cur ex partu maxime laborent. Umbilicus postremus omnium membrorum in lucem prodit. Mulieribus in partu mamma, & alia membra humidiora rumpuntur.

44 Gemelli quomodo uno coitu nascantur. Animalia quadam quere plures fetus edunt. Gemelli utriusque sexus quomodo generantur.

45 Genitura non simul, & semel ejaculatur. Genitura non omnis fortis est. Adulescentium gemellorum, & semellarum generatio.



I genitura ab utrisque permanferit in utero mulieris, primum quidem simul mifcetut, utpote muliere non quiefcente, coaccervaturque, ac crassa per calorem evadit. Deinde spiritum concipit, nempe in calido exiftens, & poftea matre fpirante. Deinde ubi fpiritu repleta fuerit, viam hic ipfe fibi ipfi foras facit, & per mediam genituram fpiritus erumpit. Quare autem fpiritus calido via foras facta eft, rurfus alius frigidus a matre fpirat, atque hoc facit per omne tempus. Calefcit enim, utpote in calido exiftens, & frigidum fpiritu concipit a matre fpirante. Omnia autem, quae calefcunt, fpiritu habent. Spiritus autem erumpit, & fibi ipfi viam facit, ac foras procedit. Id autem, quod calefcit, rurfus in feipfum alium fpiritu frigidum trahit per fiffuram, unde nutritur. Atque hoc contingit etiam in lignis, & in foliis, cibisque, ac poribus, fi fortiter calefciant. Ejus rei notionem ligna ardente exhibent: omnia enim ligna hoc faciunt, & maxime vero fubviridia. Eminent enim fpiritu iuxta fectionem. Spiritus autem quum foras procedit, circumcafutam volutat id, quod femper fieri videmus. Manifefta igitur eft ratioeinxatio de fpiritu, quod calidus exiftens in figno; attrahit alterum frigidum, a quo nutritur, & a fe ipfo dimittit,

Hipp. Opera.

C Nam

- Nam si non alterum pro eo, quem a se dimittit, attraheret, non volutaretur spiritus foras prodens. * Omne enim calidum frigido moderato nutritur. Er ubi per-
- 20 calfactum fuerit humidum, quod est in ligno, in spiritum mutatum foras procedit, & qua parte foras exit, ea ipsa calidus, qui inest adhuc in ligno, alterum frigidum spiritum eius loco attrahit, a quo nutrat. Idem faciunt & solia viridia. Quum enim incenduntur, spiritum concipiunt, deinde erumpit spiritus, & vi-
- 25 am facit, forasque prodit, & circumvolvatur: procedens autem strepitum facit, qua parte inspirationem prebet. Quin & legumina, & frumenta, & arborei fructus nucum generis calefacta spiritum habent, qui fissura facta foras prodit, & si humida fuerint, ampliore spiritum emittunt, & rimam maiorem faciunt. Er quid multis verbis opus est? Omnia quaecumque calefiant, spiritum emittunt, & alium frigidum vicissim eius loco attrahunt, a quo nutrimentum sumunt.
- 30 Atque hæc necessitates ea gratia a me productæ sunt, ut cognoscatur, quod genitura in utero calefacta spiritum habet, & emittit. * Simul autem & a matre spirante genitura spiritum habet. Quum enim mater frigidum attraxerit ex aere in seipsam, fruitur eo etiam genitura. Calida autem est, utpote in calido existens, & tunc sane spiritum habet, ac emittit, atque ipsa genitura inflata pelliculam acquirit. Cir-
- 35 cumtenditur enim, quod forinsecus circum ipsam est, continuumque evadit, utpote viscosum existens. Quemadmodum in pane, dum torretur, tenue quidem pelliculæ specie in superficiem abscedit, ac extat. Calefcent enim panis, & inflatus elevatur; qua parte vero inflatur, isthic pelliculæ species excutitur, & confistit. Genituræ autem calefactæ, ac inflatæ ex toto, pellicula forinsecus circumdatur. * Ve-
- 40 rum juxta medium genituræ, spiritui transitus extra, ac intro fit per pelliculam, & hac parte tenuitas pelliculæ a genitura distat, & paucissimum quid de genitura inest. Ipsa autem reliqua genitura rotunda est in pellicula. Atqui genituram, quæ sex diebus in utero manet, & foras prolapsa est, ipse vidi, & qualis tum animo me observabatur, ex illis ipsis reliquorum conjecturam facio. Ut vero ego viderim genituram sex dierum existentem, enarrabo. Mulieris nobis familiaris famula cantrix magnæ existimationis ex virotrum consuetudine erat, quam in ventre concipere non conveniebat, ut ne minoris existimationis redderetur. Audierat autem cantrix ipsa, qualia mulieres inter se dicunt, quod quando mulier concepta est in ventre, genitura non egreditur, sed intus manet. Audierat autem his, atque intel-
- 50 lectis, hoc semper observavit, & quum quandoque sentiret genituram non exeuntem; dominæ exposuit, & sermo statim ad me pervenit, ego vero quum audissem, iussi ipsam ad terram saltare, & postquam septies jam exiliisset, genitura in terram proflavit, & strepitus factus est, atque illa conspecta ipsa ammirata est. Qualis autem erat, ego referam: velut si quis ovo crudo externam testam circum circa adimat; in interna vero pellicula inclusus liquor pellucescat. Modus quidem talis erat, & ut abunde dicam, ruber erat liquor, & rotundus. In pellicula vero fibræ quædam albæ, ac crassæ inesse videbantur cum cruore crasso, & rubro obvolutæ: circum autem pelliculam foris cruenta vestigia instar sigillatorum; juxta medium vero tenue quid eminebat, quod mihi umbilicus esse videbatur, & per illum sane spirationem extra, & intro primum facere apparebat; quin
- 60 & pellicula genituram ambiens, ac complectens tota ex illo tendebatur. Talem sane ego genituram sex dierum existentem vidi. Referam autem & aliam dinotionem omni cupienti de hoc scire, qui mihi paulo post hanc manifeste apparuit, & testimonio esse potest omni meo sermoni, quod verus est, quantum homini de huiusmodi re dicere datur. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. * Quod genitura
- 65 in pellicula est, & spiritum habet intro, & foras, & augetur a matre sanguine in uterum descendente. Menses enim non prodeunt, ubi mulier conceperit intra se ipsam, si puer sanus fuerit, & permanere debet, nisi in quibusdam primo mense modicam sui indicationem faciant. Verum sanguis a toto corpore mulieris descendens, in orbem forinsecus pelliculam circumstat, simulque cum spiritus sanguis intra per pelliculam trahitur, qua parte perforata est, & a genitura distat, congelaturque, & futuro animali augmentum prebet. Quum autem tempus accesserit, rursus alia pellicula intra primam pelliculam tenues, & multæ circumtenduntur eo modo, quo prima pellicula facta fuit. Sunt autem & hæc ab umbilico extensa, & inter se
- 75 mutua ligamenta habent. Quum vero jam hoc factum est, ex descendente a matre sanguine, & congelato caro fit, juxta medium autem carnem umbilicum distat, per quam spirat, & alimentum, ac incrementum capit. * At vero mulier, quum uterum gerit, a mensibus non prodeuntibus propterea non dolet, quod sanguis non contrahatur, acervatum abire solitus singulis mensibus, sed procedit sensim, & modice citra dolorem quotidie in uterum ipsum, & quod inest intus, in utero augetur. Singulis autem diebus ea gratia procedit, & non semel per mensem, quod genitura in utero existens semper a corpore trahit, prout vires tum ipsa, tum spiratio habet. Et primum quidem modica spiratio fit, & sanguis modicus a matre procedit. Quum vero spiratio amplior reddatur, magis sanguinem trahit, &
- 85 uberius in uterum descendit. Atqui in uterum non restantibus, ubi menses non prodierint, propterea dolor oboritur. Primum quidem sanguis in corpore singulis

galis mensibus turbatur ab huiusmodi necessitate, quod mensis a mense multum differt & secundum frigiditatem, & caliditatem, atque hoc percipit mulieris corpus; humidius enim est, quam virile. Ubi autem turbatur est sanguis, & venas implevit, ab ipso descendit, qualis ab initio naturæ fuit. * Quare si quidem evacuatur a sanguine mulier, in ventre concipit; si vero repleta fuerit, non. Nam vacuus uteris, & venis a sanguine factis, mulctes in se foetus concipiunt. Etenim post menstrui sanguinis purgationes mulieres in ventre concipiunt. Causa jam dicta est. Quando autem conturbatur, & secretus sanguis foras non procedit, sed in uteros, utri autem non hauerint, tunc sane a sanguine diutius immorante uteri calefcentes; reliquo corpori calorem transmittunt, quandoque etiam sanguinem in venas corporis distribunt, ut & venæ repletae doleant, & tumores laesos producant. Quandoque etiam periculum est, ne claudicatio ex hoc inducatur. Aliquando & vesicam oblidit, preternuntque, ac claudunt vesicam, & urinæ stili- cidium inducunt. Aliquando pleni quoque sanguinis existentes uteri progreduntur aut ad coxendices, aut lumbos, & dolorem exhibent. Aliquando ubi sanguis quiescit, aut sex menses in utero moram traxit, putrefactus pus fit, & quibundam pus per pudendum exit. Sunt etiam, quibus circa inguen, velut tuberculum fit, illicque suppuratum exit. Sed & alia multa huiusmodi mala mulieribus fiunt, ubi lares purgationes non procedunt. Sed quid opus est ea hic recensere? Referentur enim in mulieribus morbis. Verum jam repetito eo, quod reliqui, sermone absolvam. * Quam autem generatur caro, tunc pellicula, augescere in utero sanguine, etiam ipsa augentur, ac sinuantur, & præsertim externæ. Et sanguis a matre descendens, quem sane caro spirans attraxerit, in incrementum cedit, & si utilis non sit, in sinus pellicularum fecernitur: & ubi sinuatæ factæ fuerint, ac sanguinem susceperint, tunc jam secunda appellatur. Et tantum de hoc mihi dicendum sit. Cæterum caro augescens a spiritu articulatur, & abit in hac unumquodque simile ad simile, densum ad densum, rarum ad rarum, humidum ad humidum, & unumquodque in propriam regionem abit, iuxta cognationem ad id, a quo genitum est, & quæcumque a densis genita sunt, densa sunt: & quæcumque ab humidis humida: & reliqua iuxta eandem rationem fiunt in incremento. * Et ossa durescunt a calore conglutinata. Et sane ramificantur, velut arbor, & tum interna, tum externa corporis adhuc pellicula articulantur, ipsumque caput distantiam acquirat ab humeris, & brachia, ac cubiti a laceribus: & crura inter se disparantur: & nervi exiunt circum naturas articulorum: & os per se diducitur, & nasus, & aures eminent in carne, ac perforantur, & oculi implentur humore puro, & pudendum conspicuum fit, utrum tandem sit: & viscerum coarticulantur: & jam etiam supernis partibus spirationem facit tum ore, tum naribus: & venter inflatur, & intestina inflata superne per umbilicum spiritum allumunt, ac disperdunt: & in podicem via fit a ventre, ac intestinis foras, & in vesicam via foras. Atque hæc omnia a spiritu coarticulantur. Nam inflata disparantur omnia iuxta cognationem. Etenim si velis fistulam vesicæ alligare, & per fistulam immittere in vesicam terram, & harenam, & plumbi tenuia ramenta, insuperque insula aqua in fistulam inflare, primum quidem illa aquæ perinsistentur, deinde vero temporis progressu inflata secedent, & abibit plumbum ad plumbum, harena ad harenam, terra ad terram. Et si quis ipsa archeri permittat, & diffracta vesica contempletur, inveniet simile ad simile progressum esse. Sic sane etiam genitura, & caro coarticulatur, & unumquodque in ipsa simile ad simile abit.

10 * Atque hæc mihi de hoc dicta sunt, & factus jam est puer, & ad hoc pervenit foemella quidem in quadraginta & duobus diebus, ut longissime, primam coagmentationem, ac coarticulationem accipiens. Masculus vero ut longissime, in triginta diebus. Ut plurimum enim hoc tempore, aut paulo brevior, aut paulo longior, articulationi ipsis contingit. Nam & purgatio fit a partu ut plurimum, in foemellis quidem diebus quadraginta & duobus: atque hæc tardissima est, & perfecta. Vacaverit autem periculo, etiam si in viginti quinque diebus purgetur. In masculo vero purgatio fit diebus triginta: atque hæc tardissima est, & perfecta. Circa tamen periculum fuerit, etiam si in viginti diebus mulier purgetur. Postremo autem tempore purgatio quam paucissima procedit, & in junioribus paucioribus diebus purgantur, in senioribus vero pluribus. * Cæterum maxime laborant, ac dolent in partu, & partus purgationibus mulieres primiparæ, & quæ rarius pariant, magis dolent, quam quæ sæpius. Atque purgationes a partu mulieribus ea graviora fiunt, quod primo tempore usque ad dies quadraginta duos in foemella, in masculo vero ad dies triginta, paucissimus sanguis in augmentum pueri descendit. Ab hoc autem tempore copiosior, donec pariat. Oportet itaque purgationem reddi in toto puerperii tempore, & foras exire, ac respondere pro dierum ratione, ac proportionem. * Principium autem huiusmodi purgationis tale mulieri fit. Dum ex partu laborat, conturbatur sanguis mulieri, & a foeti pueri motu vehementer calefcit. Conturbatur autem, primus quidem foras prodit, deinde puer, post puerum vero muco crassus sanguinolentus, & deductio contingit huic, quemadmodum aquæ effusa in mensa. Postea post illum per omnes dies purgatio procedit usque ad prædictum tempus, copia atque heminae unius, & dimidia primum, aut paulo plus, minusve,

- pro eius temporis ratione, donec desinat. Procedit autem sanguis, velut a victima, si sana est, & sana futura est mulier, & statim congelatur. Si vero mulier sana non est, neque sana futura est, purgatio paucior procedit, & specie deterior, & non cito congelatur. Id vero hoc modo habet. Si mulier uterum gestans, morbum habuerit non cognatum, in puerperii purgatione perit. Si vero non purgetur in prioribus diebus uterum gerens, statim sana existens, aut etiam non, commoveatur autem ipsa purgatio sive a pharmanis, sive sua sponte de repente, iuxta diuturnum rationem procedet, quibus non una vice procedit. * Si enim non purgetur mulier a purgationibus partus, morbus magnus ipsam corripit, & periculum vite incurrit, nisi cito curetur, & quis convenienter ipsi purgationem inducat. Hæc propterea prodixi, ut ostenderem, quod in pueris membrorum discretio longissima contingit, in foemella in quadraginta duobus diebus, in masculo in triginta. Argumento est purgatio a partu, quæ in foemella fit in quadraginta duobus diebus, in masculo in triginta, ut tardissime contingat. Repetam autem iterum eandem rem isdem verbis, majoris lucis, ac declarationis gratia. Dico enim talionem rependi, quod genitura in utero existenti paucissimus sanguis a matre in uterum venit, si foemineam genituram habeat, in quadraginta duobus diebus, in his enim coarticularum puerorum membrorum: ab hoc vero tempore copiosior sanguis venit. Et in masculo rursus juxta rationem dierum triginta. Quod vero hæc vera sint, etiam alterum testimonium adest, hoc modo habens. * Primis diebus, ubi genitura in uteros illap̄a est, paucissimus sanguis a muliere in uteros venit, deinde copiosior. Si enim acervatim & multus semel veniret, genitura spirationem habere non posset, sed sanguine multo accedente suffocaretur: Rependitur autem in purgatione vice versa, purgatio enim puerperii in primis diebus plurima procedit, deinde paucior, donec desinat. Multæ autem mulieres puerum masculum jam perdiderunt paulo ante trigessimum diem, & inarticulatus apparuit. Qui vero posterius perdit sunt, aut simul cum trigesimo die, omnes articulati apparuerunt. In foemella itidem juxta rationem quadraginta duorum dierum habet. Nam ubi his absolutis perditur, articulatio membrorum apparet. Sive autem prius, sive posterius perdetur puer, juxta hanc rationem apparet. Nam & secundum rationem, & necessitatem, articulatione contingit in foemella in diebus quadraginta duobus, in masculo in triginta. Testimonium enim præbent abortus puerorum, & a partu purgationes. Quod autem foemella posterius conformatur, ac coarticularum, causa hæc est: quod genitura foeminea debilior est, ac humidior, quam mascula, & juxta hanc rationem necesse est posterius conformari foemellam, quam masculum, atque ea gratia etiam purgatio diuturnior est in foemella, quam masculo. Redibo autem rursus retro, unde digressus sum. * Postquam jam articulatus fuerit puer, speciebus membrorum ipsius augeſcentibus, tunc & ossa duriora fiunt, & cavantur, atque hæc a spiritu fiunt. Cava autem existentia trahunt ad sese a carnibus quod in sanguine est pinguiſſimum: & progressu temporis ramificantur rursus extremitates ossium, quemadmodum arboris extremitates postremum ramos spargunt, sic & in puero digiti manuum, ac pedum inter se disparantur. In ipsis autem extremitatibus ungues enascuntur. Desinunt autem venæ hominis omnes in digitos manuum, ac pedum. Et crassissimæ quidem sunt venæ totius corporis venæ capitis, deinde crurum, & brachiorum, ac cubitorum. In pedibus autem, & manibus tenuissimæ, ac densissimæ, & plurimæ venæ sunt. * Nervi item tenuissimi, ac densissimi, & plurimi, & ossa magnitudine minima, atque hæc maxime in digitis manuum, ac pedum existunt. Verum ex digitis, utpote ossi densa, ac parva habentibus, venas itidem, ac nervos, sic etiam ungues tenui, ac densi nascuntur, & interceptiunt, ac concludunt venarum extremitates, ut ne amplius augeſcant, neque altera alteri præmineat: ut nihil miri sit, ungues in extrema corporis parte densissimos esse, ex densissimis enim constant. Simul autem cum unguibus etiam capilli in capite radicanent. * Cæterum pilorum natura hoc modo se habet. Oriuntur equidem maximi, ac plurimi quæ corporis parte cuticula rarissima est, & ubi pilus moderatum humorem in alimentum habet: & ubi cuticula posterius rara fit, ibi etiam pili posterius nascuntur, velut in mento, & pube, & sicubi alias pili nascuntur. Simul enim ut genitura prodiit, etiam caro rareſcit, & cuticula, & venæ aperiuntur magis, quam prior tempore. Nam dum adhuc puer est, & venæ tenues existunt, non procedit per ipsas genitura. Eadem ratio de mensibus virginum est. Simul autem ut via fit & genituræ, & mensibus virginibus, etiam pilos emitte pube tum pueri, tum virginis, rara nimirum cuticula reddita, simulque pilus moderatam humiditatem in alimentum habet, & non paucior. Sic vero & in mento viri contingit. Rara enim fit cuticula, procedente in ipsam de capite humiditate. Simul enim & in coitu, simulque interfecto tempore, pilus moderatam humiditatem in alimentum habet, & tunc maxime, quum tempus contingit humiditati de capite descendenti in coitu, ad mentum a pectore distans. * Signum autem eius, quod in rarissimis cuticulæ partibus pili enascuntur: si quis velit inuere cutem, & pusillum tantum facere, eamque sanare, cutis densa reddita per cicatricem pilos non producet. Quicumque vero Eunuchi, dum pueri sunt, fiunt, propterea neque in pube, neque in mento pilos producant, levissque toti existunt, quod

- quod via genitura non facta; cuticulam non rarefacit per totam superficiem. Inter-
cepta est enim, ac conclusa genitura paulo antea a me relatum
est. At vero Mulieres leves sunt & mento, & corpore, quod in costu ipsarum hu-
miditas non similiter agitata, velut viri, cuticulam raram non facit. Quicunque au-
tem calvi sunt, hi sane pueritiosi sunt, & pituita in capite ipsorum simul cum costu a-
gitata, & calefacta, ad cuticulam allabens, pilorum radices exurit, & desuunt pili. * Ve-
rius Etmuchti propterea calvi non sunt, quod vehementer motum non faciant, 230
neque pituita in costu calefacta pilorum radices exurit. Ceterum cani ob id sunt,
quod longo tempore pertransiente in homine humiditate, albidissimum ejus se-
cernitur, & ad cuticulam allabitur, & pilus albidior humiditatem trahens,
albidior fit, quam priori tempore, itemque ipsa cuticula, praesertim ubi cani sunt,
albidior alia evadit. Et quicunque ex nativitate canum quid in capite habent, et-
iam illis cuticula summa, ubi cani sunt, reliqua albidior existit. Illic enim al-
bissima est humiditas. Habet autem res hoc modo. Qualemcunque humiditatem ca-
ro attraxerit, sive albam, sive rufam, seu nigram, tali colore etiam pilus inficitur.
Atque hae de hoc dicta sunt. Redibo autem rursus ad sermonem relictum. * Quum
itaque extremitates corporis pueri foras ramos sparserint, & ungues, & pili
itaque egerint, tunc jam etiam movetur, & tempus ad hoc fit, masculo quide-
m mensis tres, foemellae vero quatuor. Sic enim ut plurimum contingit. Sunt au-
tem aliqui pueri, qui ante hoc tempus moventur: Movetur autem primum masculus,
quia fortior est, quam foemella: & primum quoque conformatur impiculis: nam a for-
tiore, & crassiore genitura fit. Quum autem movetur foetus, tunc sane hac indica-
tionem, sui matri praebet. Mammae enim attolluntur, & papillae gliscunt, ac tur-
gent. Lac vero non prodit, & in mulieribus densam carnem habentibus, lac postea
significationem de se praebet, ac prodit: in raram vero carnem habentibus, prius.
Lac autem ob hujusmodi necessitatem fit. Quum uteri tumidi praepueri sunt, ven-
trem mulieris comprimunt: ejus autem pleni, ubi compressio contigerit, pinguissimum
de cibis, ac potibus foras profluit in omentum, ac carnem. Quemadmodum si quis
corium illinat multo oleo, & imbibere permittat, & ubi imbibit, corium ipsum
premat, oleum itaque exilierit foras ex corio compresso. Sic etiam si venter pingu-
itudinem in se habeat a cibis, ac potibus, comprimaturque ab utero, pinguissimum
profluit in omentum, ac carnem. Et si tunc carnis mulier fuerit, citius percipit ejus
perfusionem: si non, postea. Quia & pecora praegrantia, si non agroscent, ab
eodem potu, ac cibo pinguiora propterea sunt. Similiter autem & mulier. Et a pin-
gitudine calefacta, ac alba existente, quod edulcatum est a caliditate, quae ab ute-
ris accessit, expressum venit in mammas, & in uteros quoque parum venit, per eas-
dem venas. Tendunt enim & in mammas, & in uteros venulae hae, & consimiles
aliae. Et ubi pervenerint in uteros de lacte, puer ipso papulum frustur: Mammae
vero suscepto lacte impletur attolluntur. * Et ubi peperit mulier principio motus
facto, hac in mammas ipsas procedit, si lactaverit. Sic enim res habet. Dum mam-
mae lactant, ac exurgunt, venulae in mammas ampliores sunt, ampliores autem
factae, a ventre pinguitudinem trahentes, in mammas distribuunt. Nam & vir si
milium coeat, venae ampliores reddunt, venetum magis inducunt. Habet autem
& hoc eo modo. Alimentum, & augmentum puerozum fit, ubi ea, quae a matre ve-
niunt, in uteros processerint, & prout mater habet juxta sanitatem, aut debilita-
tem, sic & puer habet. * Quemadmodum etiam quae in terra crescunt, a terra nu-
truntur, & prout terra habuerit, sic etiam nascentia in terra habent: Etenim
semen, ubi dejectum fuerit in terram, humiditate quadam ab ipsa impletur. Habet
enim in se terra omnigenum humorem, ut nascentia nutrire possit: impletum autem
humore, semen inflatur, & immiscet, & vis, quae in semine levissima est, ab hu-
more condensari coigit; condensata autem a spiritu vis, & humore folia produ-
cente, semen rumpit, & primum folia foras emergunt. Ubi vero emerferint, quum
non amplius ab humore in semine existente folia nutrire possint, rumpitur infel-
licite semen, itemque folia, & semen a foliis coactum, vim suam ad inferas demit-
tit, quae videlicet in ipso testat propter gravitatem, & sunt radices ex solis dis-
tante. Postquam autem planta jam firmiter radices inferne egerit, & alimentum
a terra sumit, tunc sane totum evanesceit, & in plantam consumitur praeter corte-
cem, qui solidissimus existit. Rursus autem cortex in terra putrefactus progres-
sus temporis evadit fit, & quaedam folia ramos producit. Ex semine itaque tan-
quam ex humido nara planta, donec quidem tenera, & aquosa fuerit, in augmentum
superne, & inferne procedens, fructum excludere non potest. Non enim vim ha-
bet fortis, ac pinguis, ex qua semen condensari queat. Ubi vero solidior fa-
cta est, & progressu temporis radices egerit, tunc jam & venas habet amplas
nisi ad hyperniam, tum ad infernam partem; & tunc sane non amplius aequum
est terra trahit alimentum, sed crassius, & pinguis, ac copiosius, quod calefactum
a sole effervescit in extremitates, & fit fructus juxta cognationem, ex quali etiam
generatus est. Multus autem ex modico propterea fit, quod singula ex terra na-
scentia majorem vim ex terra, quam ex eo, unde generata sunt, trahunt, & efferve-
scent non secundum unum, sed secundum multa. Quum autem fructus proderit,
Epp. Opus, C. 3. a plan-

- a planta sua nutritur. Planta enim a terra trahens, fructui transmittit. Sol autem fructum equit, & solidum facit, quod aquosius in ipso est, ad sese trahens. Atque hac mihi dicta sunt de his, quæ ex semine nascuntur a terra, & aqua. ²⁴ Cæterum ex plantariis ab arboribus arborescunt hoc modo. Ramus vultus habet, quæ parte ab arbore distractus est, in infima ad terram parte, unde radices prodierunt. Pangitur autem, & in terram demittitur hoc modo. Quum planta, quæ in terra existit, humorem acceperit a terra, tumescit, & spiritum habet, quæ vero pars supra terram eminet, non duntaxat. Spiritus autem, & humor condensans in infima plantæ parte vim, quantum eius gravissimum est, in infernam partem eximplat, & ex ipsa radices tenere sunt. Postquam autem in infernam partem receptus fuerit, tunc iam ex radice humorem trahit, & parti supra terram eminenti transmittit: & tunc sane turis superna pars intumescit, ac spiritum habet, & quantum ex vi in planta leve inest, ad ipsum congregatum germinat, ac sola producit, & iam in supernam partem augmentum facit, nempe in infernam. ²⁵ Sic itaque contrarium contingit circa germinationem in his, quæ ex semine, & in his, quæ ex plantariis proveniunt. Ex semine enim prius folium emergit, deinde radices in infernam partem demittuntur. Verum humor prius radices agit, deinde folia acquirit, propterea quod in semine ipso humoris copia inest, & in terra, quum totum inest, alimentum inest primum folio sufficiens, unde folium nutritur, donec radicetur. Verum in ramis non sic fit. Non enim gignitur ex aëre, unde solum primum alimentum habeat, sed ipse ramus est, & velut arbor habet, & multa eius pars supra terram eminet. Quare quum supra terram existeret, humore impleri non potest, nisi ex inferna parte magna quædam vis procedens, in supernam humorem distribuat. Ex plantariis primo necesse est sibi ipsi alimentum sufficere a terra in radices, deinde ubi sic a terra attraxit, sursum distribuere, & folia ad germinem, & augmentum concitare. ²⁶ Quum autem augmentum cepit planta, a tali necessitate ramos spargit, quam fecerat. Quum plus humoris ipsi accesserit ex terra attracti, erumpit præ multitudine quæ parte quam plurimum fuerit, & hac parte planta ramos emittit: augetur autem & in amplitudinem, & in supernam, & in infernam partem, propterea quod inferna terræ pars hyeme quidem calida est, æstate autem frigida. Atque hoc propterea contingit, quod terra humida est in hyeme præ aqua de coelo delabente, & comprimitur in se ipsam, utpote humore graviore existente: densior autem ab hoc ipso est, & nullam transpirationem habet. Non enim amplius magna raritas ipsi inest: & propter hoc inferna terræ pars hyeme calidior est. Nam & summus, densius accumulatus, intus calidior est, quam quod rarum existit: & alias humecta, ac compressa, a se ipsis concalescunt, & brevi calore valde exusta putrescunt, neque enim permeas spiritus per ipsa, nimirum quum densa existant. ²⁷ vero sicca fuerint, ac rare posita, multo minus calefcunt, ac putrescunt. Atque sic sane frumentum, ac hordeum humidum, ac niadactum, intus calidius est, quam si siccum sit, & rare posuit. Ex vestes pelliceæ colligatæ, ac fortiter compactæ, a se ipsis comburuntur, velut ego vidi, quemadmodum ab igne exusta. Sed & alia si quis velit considerare, omnia, quæ comprimuntur a se ipsis, calidiora reperiet, quam quæ rare posita sunt. Non enim habent, unde frigiditatem inspirent a ventis. Sic etiam inferna terræ pars, quum plena sit, & ipsa a se ipsa comprimatur, nimirum gravis, ac densa existens, ab humiditate in hyeme calefcit, nullam enim caliditatis perspirationem habet. Sed ubi de coelo aqua cadit in ipsam, quum spiritus prodierit ab ipsa in terra, non ulterius penetrat, utpote terra densa existens, sed spiritus retro ad aquam abit: & propterea fontes, ac maris aqua hyeme calidiores sunt, & auctiores quam æstate, quia spiritus, dum exhalat, retro ab aqua, quam terra densior existat, & per se spiritum non transmittat. Ex aqua multa existens, quæ contigerit, ea perturbans procedit, & viam sibi ipsi ampliore facit, quam si modica existat. ²⁸ Aqua enim in terra non consistit, sed semper in declive procedit. Si autem spiritum ab aqua procedentem terra per se hyeme transmutat, paucior aqua ex ipsa procederet, & fontes hyeme magni non essent. Atque hæc omnia in hoc dicta a me sunt, quod terras inferna pars calidior esse apparet hyeme, quam æstate. ²⁹ Nunc autem dicere volo, quod æstate frigidior quam hyeme, inferna terræ pars esse videatur. Terra æstate rara est, & levis, nimirum sole vehementius irruente, & ab ipsa humiditates ad sese attrahente. Habet autem terra in se semper aquam plus, aut minus. Spiritus autem omnes nobis sunt ab aqua. Id, quod sic se habere, unde coniectare possis, demonstrabo. Etenim ab omnibus fluminibus, & nebula spiritus semper procedunt. Est autem nebula aqua in aere coherens, & continua. Et tunc sane terra rara est, ac levis æstate, & aquam in se habet, & aqua in declive fluit, procedente autem aqua, semper inde alius ex alio spiritus exhalat. Qui vero exhalat, per terram abit levem, ac raram existentem, & frigiditatem terræ intulit, & ipsa aqua simul perfrigeratur. Habet autem sic. Quemadmodum si quis aquam in utroque existentem foriter comprimat, & per puncturam acus, vel paulo maiorem, perspirationem aqua faciat, & ipsum utrem in sublimi suspendat, nullus spiritus per foramen procedat, sed aqua, non enim habet spatiofitatem, per quam aqua spiritum emittat. Sic sane se habet etiam hyeme aqua in terra. Si autem aqua in utroque locum facis amplum feceris, & utrem in sublimi suspenderis, spiritus per

foramen procedet. Locum enim spiritus habet ab aqua mora, procedendi per a-
 trem, & propterea per foramen spiritus transit. Sic sane se habet etiam ætate
 aqua in terra. Satis amplum enim locum habet, nimirum terra rara existente, & so- 365
 le ab ipsa humorem ad se trahente, & pertransit spiritus, utpote qui frigidus existit,
 ab aqua per ipsam raram existentem, ac levem. Ob hoc itaque inferna ipsius pars æ-
 tate frigida existit, & aqua ipsa adhuc magis, quam spiritus, qui in terra frigida exi-
 stit, & ipsa in se ipsam, & in terram spiritum emittit. * Sed & aqua, quæ hauritur, in 370
 puteo spiritum semper movet, velut stibellum, atque hoc ipsum aquæ frigiditatem in-
 ducit. Quæ vero non hauritur ætate, sed stans densa existit, non similiter spiritum
 in se a terra suscipit, neque in terram a se ipsa distribuit, & simul a sole, & ære in pu-
 teo non disperso, sed stante, ac firmato, primum superficies ipsius calefit, de-
 inde alia eius pars ad aliam deorsum caliditatem distribuit, & propterea aqua, quæ 375
 ætate non hauritur, calidior est ea, quæ hauritur. * Quin & fontes valde profundi
 ætate semper frigidi existunt: & aqua hausta hyeme, terra calida existente, ex
 tali fonte, statim quidem calida est; ubi vero tempus progreßum fuerit, frigida
 est, ab ære, videlicet frigido existente, talis facta. Perflatur enim a vento, & spiri-
 tus per ipsam pertransit. Quemadmodum etiam aqua, quæ ætate hauritur, ubi hau-
 sta fuerit, statim frigida est; calida autem sit postea, propterea quod terra rara exi-
 stente, & spiritu in ipsa existente, perfrigeratur. Ubi autem haustæ tempus accel-
 serit, stabilis sit, & calida conspicitur. Calefit enim ab ære calido existente, quem-
 admodum & aqua, quæ non hauritur, in puteo ætate ob hoc ipsum calida reddi-
 tur. Atque hæc a me de hoc dicta sunt. Reperat autem rursus, quam ætate inferna ter- 380
 ra pars frigida est; hyeme vero calida; superna autem vice versa. * Et oportet ar-
 bori non duo calida simul accedere, neque duo frigida simul, si sana esse debet. Ve-
 rum si quidem ex superba caliditas accesserit, ex inferna frigiditatem ipsi accedere, o-
 portet, & vice versa: si ex superna parte accedat frigiditas, ex inferna caliditatem
 ipsi contingere oportet. Et radices, ubi attraxerint, arbori transmittunt, & arbor
 vicissim radicibus, atque sic & frigidi, & calidi conservatio contingit. Quemadmodum 390
 homini ingelitis cibis in ventrem, qui dum concoquantur, calefaciunt, perfrige-
 rationem a porri facere oportet. Sic & arbori contrarium rependi oportet ex in-
 ferna parte ad supernam, & vicissim, & augetur arbor & in supernam, & in infer-
 nam partem, propterea quod alimentum ex inferna, & superna ipsi accedit. * Et quan-
 diu quidem vehementer tenera fuerit arbor, fructum non producit. Non enim est 395
 in ipsa pinguis vis, neque crassa, quæ ad fructum conferre possit. Progreßu autem
 temporis venæ in ipsa dilatare pinguem, ac crassam influxionem ex terra in ipsam
 faciunt; sol autem ipsam diffundens, ebullire facit, utpote levem existentem, in ex-
 tremis, & fructum producere, & tenuem quidem humiditatem a fructu sol aufe-
 rit, crassam autem concoquens, & calefaciens, edulcat. At vero arbores non fructi- 400
 feræ in se pinguitudinem tantam non habent, quantum eius in fructum est expendun-
 dum. Omnis autem arbor, quum per tempus solida facta fuerit, & ex inferna par-
 te radices firmavit, jam penitus constanter auferere desinit. * Quicumque vero in
 arbores ab aliis arboribus oculos indiderunt, & arbores in arboribus enata vi-
 vunt, & fructificant non similem fructum arboribus, quibus infixe sunt, id ipsum 405
 tali modo contingit. Oculis primum quidem germinat. Alimentum enim habet pri-
 mum ab arbore, ex qua ablatum est, deinde ab ea, inquam insitus est. Ubi autem ger-
 minaverit, sic in arborem radices tenues a se demittit, & primum humore fruatur in
 arbore, in quam insitus est, existente, deinde tempore accedente, demittit radices in
 terram, per eam, in quam insitus est, & fruatur humore, quem a terra trahit, & a- 410
 limentum inde ipsi contingit, ut non mirum sit, insitas arbores, alios fructus producere;
 a terra enim vivunt. Hæc mihi de arboribus, & fructibus dicta sunt ea gratia, quod in-
 dignum mihi factum videbatur, & ne poteram quidem, hanc tractationem semperfe-
 ctam relinquere. * Redibo nunc rursus retro ad illum sermonem, cuius gratia a me hæc 415
 de istis relata sunt. Censeo enim, terræ nascencia omnia vivere ex terræ humore, &
 qualem terræ humorem in se ipsa habet, talem etiam ex ipsa habere. Sic etiam
 puer vivit de matre in utero, & quali mater sanitate prædita est, talem etiam puer
 habet. Quod si quis considerare velit ea, quæ de his dicta sunt ab initio usque in finem,
 inveniet naturam omnem consimilem esse, & ex terra nascentium, & hominum. Et hæc 420
 mihi de hac dicta sunt. Cæterum puer in utero existens manus apud genas habet,
 caput autem prope pedes: & non datur probe, ac certo cognoscere, etiam si puerum
 in utero videas, utrum caput sursum habeat, an deorsum; verum ex umbilico
 pelliculæ tentæ sunt, ipsum continentes. Nunc autem referam dinotionem, quam
 paulo ante me demonstraturum dixi, quantum humanæ menti possibile est manife-
 stum existentem, omni qui de hoc cognovisse velit, quod genitura in pellicula est, 425
 & quod juxta medium ipsius umbilicus est, & per illum sane, primo spiritum in se
 ipsam trahit, & foras emittit, & quod ex umbilico pelliculæ tentæ sunt. Sed &
 aliam pueri naturam, quam dixi, sic totam habere usque in finem teperiet, quomo-
 do videlicet a me in his sermonibus declaratum est, si quis testimonium, & oculati-
 bus inspectionibus a me producendis uti velit. * Etenim si quis ova viginti, aut 430
 plura, quo pulli ex ipsis excudantur, gallinis duabus, aut pluribus subicere ve-

- lit, & singulis diebus a secunda exordiendo, usque ad ultimam, qua excudetur pul-
lus ex ovo subtrahere, confringere, ac videre, inveniet, omnia se habere juxta
meum sermonem, quomodo volucris naturam ad humanam conferre oportet.
- 435 Quod enim pelliculae ex umbilico tentae sunt, & reliqua, quae de puero dicta sunt,
sic se habere in ovo volucris reperies, ab initio in finem. Atqui si quis nondum vi-
dit, mirabitur in volucris ovo umbilicum inesse. Atque haec sic habent, & sic a me
relata sunt. * Quando vero mulieri parvis appropinquat, tunc puero se movente,
& manibus, ac pedibus calcitrante, pelliculam quamdam internam rumpi coar-
440 git, rupta autem una, etiam aliae debiliorem vim habent, & rumpuntur primum quin-
dem illi contiguae, & cohaerentes, postea extrema. Quum autem rupta fuerint pellicu-
lae, tunc foetus a vinculo exolvitur, & agitur foras procedit. Neque enim am-
plius robur habet pelliculis amissis, neque uteri amplius puerum continere pos-
sunt, pelliculis velut dixi amissis, & ab ipsis adruptis. Coharent enim pelliculae
445 etiam uteris, ubi circum puerum obvolvuntur, non adeo vi valida, ac multa. Quan-
do autem procedit puer, violat, & dilatat uteros in exitu, utpote teneros existen-
tes. Procedit autem in caput, si secundum naturam prodierit. Gravissima enim
sunt ipsi supremae partes, si ex umbilico penduntur. Quum autem in uteris est,
magis continens existit usque ad pellicularum rupturam simul cum decimo mense,
450 quando parvis matri propinquat, & adest. * Si vero violentam affectionem perpe-
tiatur puer, etiam ante praefinitum tempus ruptis pelliculis prodit. Quin & si ali-
mentum a matre prius puero defecerit, etiam sic parvis matri prius advenit, & ante de-
cimum mensem puer prodit. Caeterum quae longius, quam decem mensium tempus,
uterum gestare sibi visae sunt; nam hoc jam saepe audivi, illae ipsae hoc modo, quem
455 dicturus sum, deceptae sunt. Quum uteri spiritum acceperint in seipsos, a ventre
statim exhibente, elevantur, ac intumescunt; contingit enim hoc. Videntur sane sibi
mulieres tunc concepisse. Praeterea si menses non procedentes, congregati fue-
rint in utero, & diutius manserint, semper perfluunt in ateros, aliquando una
cum statu a ventre, aliquando etiam calefcentes, & sane tunc quoque in utero habere
460 mulieres sibi videntur, nimirum mensibus non prodeuntibus, & uteris elevatis. * De-
inde aliquando menses sua sponte erumpunt, aut aliis supervenientibus a corpore
in uteros, & priores protrudentibus, & statim egreditur, & multis jam statim
post mendum purgationem uteri biant, & ad pudendum veruntur, & tunc viris
permixtae, ad se geniturae concipiunt eadem die, aut omnino in pueris. Existimant
465 autem inexpertae harum rerum, ac rationum, etiam illo tempore se in utero habuisse,
quando menses non prodibant ipsis, & uteri erant elevati, ac tumentes. Quod
autem non diutius, quam decem mensibus contingat uterum gestare, ego demonstra-
bo. Alimentum, & augmentum, quod a matre descendit, non amplius sufficiens est
puero, ubi decem menses praeterierint, & foetus auctus fuerit. Trahit enim, quod
470 dulcissimum est in sanguine ad sese, simulque etiam lacte modice fruitur. * Quum
autem haec ipsi rariora, ac pauciora sint, & puer plenus, ac maturus existat, cor-
poreus alimentum desiderans, calcitrat, ac pelliculas rumpens, initium partus ma-
tri inducit. Et hoc perpetuntur magis mulieres primiparae: deficit enim pueris
alimentum, ut ad decimum usque mensem sufficere non possit. Deficit autem per
475 hunc modum. Sunt quaedam mulieres, quibus sufficientes menses purgantur,
quaedam quibus pauciores: hoc ipsum si semper fiat in natura, & genere, ma-
ternum ipsis existit. Quae vero menses paucos demittunt, haec etiam pueris postre-
mo tempore, ubi jam maturi fuerint, alimentum rarius exhibentes, ipsos calci-
trare faciunt, ut & ante decimum prodire festinent. Modicus enim sanguis a juven-
480 culis, ac novellis matribus procedit: ut plurimum vero contingit, tales mulieres
etiam sine lacte esse, quae paucos menses demittunt. Sicciores enim sunt, & den-
siores carnem habent. Huic autem rationi, quod videlicet deficiente alimento
prodit puer, etiam si non aliqua violenta affectio ipsi accidat, etiam hoc testimo-
nio esse potest. * Volucris ex ovi luteo nascitur hoc modo. Incubante matre ovum
485 calefit, & quod in ovo inest, a matre movetur, calefcentis autem id, quod in ovo
inest, spiritum habet, & alterum frigidum ab aere per ovum attrahit. Ovum enim
adeo rarum est, ut spiritum, qui attrahitur, sufficientem ei, quod intus est, transmi-
tat: & augefcit volucris in ovo, & coarticulatur modo eodem, ac consimili, velut
puer, quemadmodum jam antea a me relatum est. Nascitur autem ex luteo ovo vo-
490 lucris, alimentum vero, & augmentum habet ex albo, quod in ovo est, atque hoc
jam omnibus manifestum factum est, qui animam adverterunt. Ubi autem defi-
cit alimentum pulso ex ovo, non habens id sufficiens, unde vivat, fortiter movetur
in ovo, uberius alimentum quaerens, & pellicula circum dirumpitur, & ubi ma-
ter sentit pullum vehementer motum, putamen exalpens ipsum excludit, atque
495 haec fieri solent in viginti diebus, & manifestum est, quod ita se habent. Ubi enim
excussa est volucris, nullus humor in ovi testis inest, qui sane memorabilis exis-
tat; expensis est enim in pullum. Sic etiam ubi auctus fuerit puer, matre non am-
plius sufficienti alimentum ipsi exhibere potest. Uberius itaque praesente alimen-
to puer quaerens, calcitrans pelliculas dirumpit, & vinculo exolutus simul so-
500 ras prodit, atque haec ut longissime in decem mensibus sunt. * Et secundum hanc ra-
tionem

tionem etiam pecoribus, ac feris parvus advenit in tempore, quo singula pariunt, non tardius. Et enim unicuique animali necesse est tempus esse, in quo alimentum formi rariis erit, & deficiet, & partus adest. Et quæ quidem paucius alimentum pueris præbent, citius pariunt. Quæ vero uberius, posterius. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Porro disruptis pelliculis, si pueri momentum in caput inclinatum prædominabitur, mulier facile parit. Si autem obliquus, aut in pedes procedet: contingit enim hoc sepe, si momentum huc inclinaret, siue præ uterorum spatiositate: siue si mater in labore ex partu primum non quievit: & si sic procedet, mulier difficile pariet. Multæ autem vel ipsæ petierunt, vel puer, aut simul matres una cum foetibus. * Cæterum ex parentibus, ac puerperis maxime laborant primiparæ propter inexperienceiam dolorum, & dolent quidem totum corpus, maxime vero lumbos, ac coxendices. Nam coxendices ipsarum disparantur, Verum expertæ jam partus, nimis primiparis dolent. Quæ vero multoties pepererunt, multo minus dolent. Si porro in caput processerit puer, caput primum foras prodit, deinde alia membra consequuntur, postremus autem umbilicus. Ex umbilico autem secunda tenta est. Post hæc aquositas, & mucus sanguinolentus tum a capite, tum a reliquo corpore secretus, præ violentia, & dolore, ac calore, atque hic viam fruit purgationi a partu consequenti. Post exitum autem ejus muci cipienti, purgatio fit per tempus antea relatum, Et tum mammæ, tum reliqua membra, quæ humidiore sunt, mulieribus rumpuntur, minime quidem in primo partu, postea vero prope plures pariunt, ita amplius rumpuntur, evacuatis venis præ partus purgatione. Atque hæc a me de hoc dicta sunt. * Gemelli autem sunt ab uno coitu hoc modo. Uteri sinus frequentes, & curvos habent, alios remotiores, alios propinquiores pudendo. Et animalia, quæ multa gignunt, plures sinus habent, quam ea, quæ pauca. Similiter autem habent & pecora, & feræ, & volucres. Ubi itaque contigerit genituram fundi, & in duos sinus pervenire, & uteri genituram susceperint, & sinus alter ad alietum non hiaverit, nec dimiserit, segregata genitura in utroque sinu pellicula induit, & vivificatur eodem modo, quo unus foetus: quapropter vero id hæc, diximus. Quod vero ab uno coitu gemelli gignantur, hoc testimonio constat. Est canis, & lus, & alia animalia, quæ ab uno coitu pariunt de duo, & plura, & unumquodque animal in utero, in sinus, ac pellicula existit: atque hæc ipsi fieri videmus, & hæc omnia eadem die ut plurimum pariunt. Sic enim & mulieri ab uno coitu gemelli facti, uterque in sinu, & pellicula est, & eadem die utrumque parit, & alter prius foras procedit, & pellicula ipsius, siue secunda. Quod autem gemelli, femella, & masculus generantur, hoc causæ esse scio. In muliere, & in viro, & in omni animali, in singulis & debiliore, & fortior genitura inest. * Et non semel, ac simul genitura procedit, sed & bis, & ter ebulit, ac ejaculatur: & non est possibile, omnem esse sortem, tum quæ prius exit, tum quæ posterius. In utrum autem sinum crassiores, ac fortiores genituras ingredi contigerit, illic masculus gignitur. In utrum vero rursus humidiorem, ac debiliorem, illic femella generatur. Si vero in utrumque sortis inpredictur, ambo masculi fiunt. Sin debilis, ambo femellæ. Atque hic sermo sic relatus totum finem habet.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE CARNIBUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Quatenus de Adestoris sit diffusum. Calidum quid Hippocrati esse videatur. Elementorum secretio, eorumque sedes, ac qualitates.
- 2 Quomodo ex elementis turbatis, & permixtis, singula corporis partes sint creatæ. Offium generatio inde. Nervorum generatio, Arteriarum generatio.
- 3 Cavernarum partium ut stomachi, sive gula, ventris, & intestinum generatio. Tumorum ex membranis generatio quomodo fiat. Vesicæ generatio.
- 4 Offium rigidissimarum, & cavernosarum generatio. Calidi est diffundere, frigidi congelare. Cerebrum metropolis glutinosi, ac frigidi. Calidum pinguis sedes, & metro-

polis. Cerebrum cur a calido fundi, non liqueri nequeat.

- 5 Spinalis medulla quid, & quomodo ab aliis differat. Spinalis medulla sola membranas habet. De partium dissimilariis, seu instrumentariarum generatione, & temperamento.
- 6 Cordis constitutio, & situs. Cava vena dua a corde. Vena cava distributio. A vena cava, & arteria alia vena per totum corpus fixa sunt: & quibus hæc locis certissima exstant.
- 7 In venis, ac corde plurimum calidi hest. Cor membranis omnium calidissimum esse, ac spiritum trahere.
- 8 Puerum in utero alimentum, & spiritum trahere.

- 9 *Pulmonis generatio, levis generatio. Secus
fibris exemptis non congelatur. Splinis ge-
neratio.*
- 10 *Renum generatio, Carnis eadem, quæ renum
generatio. Humidum calidum esse. Pelli-
cularum generatio.*
- 11 *De articularum, nervorum, saliva, uo-
guum, ac dentium generatione.*
- 12 *Dentes cur aliis posterius nascantur. Den-
tes primi quando, & quibus de cassis ex-
citant.*
- 13 *Pena supra jejunum intestinum existentes, te-
nissimum ex ventre, & intestinis trahunt.
Corporis partes universas, item qualitates
primas, & secundas ab alimento irriga-
tas, alimentum capere. Maxilla sola
venas habent, & nutrimento uberiore uti-
tutur.*
- 14 *Homo quo tempore, & quamdiu augeat.
Dentes sapientia quibusdam in quarto se-
ptenario nascuntur.*
- 15 *De capillarum generatione, & cur pili qui-
busdam diversis corporis partibus, quibus-
dam toto corpore nascantur.*
- 16 *De auditu ratione. Auris pellicula omnium
pellicularum scississima. Scississimum maxime
resonat. Cerebrum cur sonum non edat.*
- 17 *De Olfactus ratione. Aquam non olfacimus.
Aqua putrefacta crassior fit, & alia om-
nia. Nares humilia olfacere nequeunt.
Cerebri in pulmonem, & reliquas partes
destillatio quomodo contingat.*
- 18 *De Visus ratione, ac constitutione. Album
oculi. Pupilla. Oculi tunica quid. Ocu-
lorum humores glutinosi, ac liquidi. Ocu-
lum qua molestant.*
- 19 *De sermonis facultate. Muti ex nativitate
cur non differant, & unam tantum vocem
indiscretam edant.
Guttur præfatus vox non editur.*
- 20 *Vitam hominis septem esse dierum.*
- 21 *Adulterum a conceptu affectiones. Fames quo-
tius neci,*
- 22 *Pertus septimestres, vitales; octimestres,
lethales. Partus novem menses, & de-
cem dierum cur vitales.*
- 23 *Atorbi acutissimi septenario dierum judican-
tur. Ulcerum magnorum in capite, & re-
liquo corpore inflammatio septenario sedan-
tur.*
- 24 *Quomodo de septimestri partu, erro quip-
piam cognoscere possit. Denarium com-
plexio septimo anno. Natura septenario
subijcta.*

LEO ad hunc usque sermonem communibus sententiis utor tum
aliorum, qui me præcesserunt, tum etiam meis. Necessè enim
est, commune principium sententiis supponere eum, qui ve-
lit hanc de arte medica tractationem componere. Verum de
rebus sublimibus in aere, ac cælo neque opus habeo dicere,
nisi quod quantum ad hominem, & reliqua animantia, quæ
sunt, & nata sunt, pertinet, demonstrabo, & quod anima sunt, &
quod sanguis, & quod morbus, & quod in homine malum, ac bonum, & unde
moriatur. Nunc autem ipse meas sententias profero. Et videtur sane mihi id,
quod calidum vocamus, immortale esse, & cuncta intelligere, & videre, & audire,
& scire omnia tum præsentia, tum futura. Hujus igitur plurima pars, quum
turbata essent omnia, in supernam circumferentiam secessit. Et videntur mihi ip-
sum veteres Æthera nominasse. Altera pars inferna appellatur Terra, frigi-
dum quid, & secum, & multis motionibus obnoxium, & in hac sane multum cali-
di inest. Tertia pars aeris medium locum occupavit, calidum quid, ac humidum
existens. Quarta vero pars terræ proximum locum coepit, humidissimum quid, ac
crassissimum. * Hæc itaque quum turbata essent, & in orbem circumvolverentur,
multa calidi pars in terra conclusa est, alibi major, alibi minor, alibi valde pauca,
alibi copia multa: & temporis progressu terra a calido arefacta, hæc conclusa
in ipsa putredines faciunt, veluti tuniculas, & quantum quidem ex putredine
terræ pingue fuit, & minimum humoris habuit id ipsum per multum tempus
calefcent, celerrime existunt, & in ossa mutantur. Quæ vero glutinosiora fue-
runt, & frigiditate participarunt, ea calefacta exiri non potuerunt, neque vero li-
quida fieri, propterea speciem alieniorem ab aliis acceperunt, & nervi solidi fa-
cti sunt. Neque enim multum frigiditatis ipsis inerat. Verum venæ frigiditatis mul-
tum habebant, atque ejus frigidi, quantum circumcincta glutinosissimum erat, a ca-
lido exarsatum, membrana evasit. Frigidum vero quod erat, a calido superatum,
dissolutum est, & ob id liquidum factum. * Juxta eandem autem rationem etiam saue-
ces, & stomachus, sive gula, & venter, & intestina in podicem usque cava facta sunt.
Quum enim frigidum semper calefcat, quantum ejus circumcincta glutinosum e-
rat, exarsatum est, & membrana tunica facta est. Quod vero inter frigidum erat,
colligatum est, & factum est liquidum. Non enim erat in ipso neque pingue, neque
glutinosum multum. Juxta eandem rationem etiam vesica. Multum frigidum, quod
ipsum circumcincta concludit, a calido calfactum, dissolutum est, & evasit liquidum,
quum neque pingue, neque glutinosum in ipso esset: quod vero supererat, tunica
evasit. Sed & de aliis, quæ cava sunt, eodem modo res se habet. Ubi enim plus
glutinosi, quam pinguis erat, membrana tunica facta est. Ubi vero pinguis plus
quam glutinosi, ossa facta sunt. * Eadem ratio & ossium est. Ubi quidem non inerat
glutinosi, verum pinguis, & frigidi, citius exiit sunt propter pinguitudi-
nem, atque hæc ossa durissima, & rigidissima existunt. Ubi vero pingue, & gluti-
nosum similia sunt, hæc ossa antrofa sunt. Et de his quidem sic habet, Frigidum
quidem

quidem congelat, calidum autem diffundit: in multo, vero tempore etiam exsiccat. Ubi autem pinguitudinis aliquid affuerit, citius exurit, & siccatur. Ubi vero glutinosum affuerit frigido, citra pinguitudinem exuri non vult, sed tempore calefcenti congelatur. Caterum cerebrum sedes, & metropolis est frigidi, ac glutinosi. Calidum vero pinguis sedes, & metropolis est. Quod enim calefit primum omnium quum diffunditur, pingue fit. Et propterea cerebrum, quia maximum pinguitudinis habet, plurimum vero glutinositatis, a calido exuri non potest, sed tempore tunicam, membranam crassam accepit, circum membranam vero ossa, quantum calidum superavit, & in quibus pinguitudo erat. Sed & medulla spinalis appellata a cerebro descendit, & non est in ipso neque pinguis, neque glutinosa multum, quemadmodum & cerebro. Et propterea neque nomen medullae iuste possidet. Non enim est alii medullae similis, quae in aliis ossibus inest. Sola enim membranas habet, quas alia medulla non habet. Signa porro horum manifesta sunt. Si quis enim nervosa, & glutinosa, itemque alia assare vellet, alia quidem cito affantur: verum nervosa, & glutinosa assari non volunt, minimum enim pinguitudinis habent. Pinguissimum autem, & unguinosum celerrime assatur. At vero viscera sic mihi constituta esse videntur: nam de venis prius a me dictum est. Cor multum glutinosi, ac frigidi habet, & a calido calefactum, caro evalit dura, & viscosa, & membrana circum ipsum, & cavum factum est, non quemadmodum venae; & situm est in capite venae cavissimae. Duae enim sunt cauae venae a corde, alteri nomen est arteria, alteri vena cava, iuxta quam cor situm habet. Et plus habet calidi arteria, quam vena cava, & spiritum condit, ac conservat. Verum praeter has duas venas etiam aliae in corpore sunt. Cavissima autem vena, ad quam cor situm est, per ventrem omnem transit, & per septum transversum, & in utrumque rhanem finditur, & in lumbis finditur, & exiit tum in alias partes, tum in crura utrumque. Sed & supra cor ad cervicem, partem in dexteram, partem in sinistram, & tunc in caput ascendit, & interporibus finditur utrique. Possunt autem & numero maximae venae dici. Verum in summa a vena cava, & ab arteria aliae venae per totum corpus filae sunt; cavissimae autem sunt prope cor, & cervicem, ac caput, & infra cor usque ad coxas decurrunt. Et calidum plurimum in venis, ac corde inest, & propterea spiritum cor habet, utpote quod omnium intra hominem membrorum calidissimum existat. Proclive est autem condicere, quod spiritus calidus est. Cor, & venae cauae semper moventur, & plurimum calidi in venis inest, & propterea spiritum contrahit, ex omnibus in homine maxime calidum existens. Potest etiam aliter cognosci. Si quis ignem in domo accendere velit, quum ventus non inspirat, flamma movetur aliquando magis, aliquando minus. Sed & lucerna accensa, & ardens eodem modo movetur, modo magis, modo minus, vento nullo movente, quem sane nos spirantem cognoscere possumus, & alimentum calido frigidum existit. Caterum puer in utero comprimens labra ex utero matris fugit, & tum alimentum, tum spiritum cordi intus trahit, ubi sane mater respiravit. Est enim hoc calidissimum in pueris, & hoc calidum etiam reliquo corpori, & alii omnibus partibus motum praebet. Si vero quis interroget, quomodo hoc quis sciat, quod puer in utero trahit, & sicut, illi sic respondendum est. Pueri nascuntur, steriles in intestinis habentes, & ubi nati fuerint, celerrime vestrem tum homines, tum pecora exonerant. Atqui non haberent sterces, nisi in utero fuissent. Imo neque mammam, statim ut nati sunt, sugere possent, si non in utero fuisset. Et de motu cordis, ac ventriculi sic habet. Porro palmo iuxta cor ita natus est. Cor ex humido quod glutinosissimum erat, calefaciens cito exsiccat, relictum spumam, secernit aurosum, & venulas multas in ipso. Venulas autem ideo fecit. Quantum enim in glutinoso interat frigidi, id ipsum quidem a calido colligatum est, & liquidum evasit. Ab ipso vero glutinoso tunica facta est. At vero securi sic compactum est. Quum una cum calido multum humidi conclusum esset citra glutinosum, ac pingue, frigidum superavit calidum, & congelatum est. Huius signum hoc est. Quando quis victimam mactat, donec calidus fuerit, liquidus est sanguis, postquam autem perfrigeratus est, congelatur. Si vero quis ipsum conquallet, & fibras eximat, non conglutur, fibrae enim frigidae sunt, & glutinosa. Splenem autem hoc modo constitutum est. Cum calido, & glutinoso conclusum fuit, calidum quidem plurimum, & frigidi autem minimum, tantum solummodo, quantum ad glutinosi compactionem satis erat: sunt autem id fibrae in splene existentes, & propter has fibras mollis est splen, & fibrosus. Rheues porro sic producti sunt. Parum glutinosi, parum calidi, multum frigidi conclusum fuit, & ab hoc congelatum est, & durissimum viscus evasit, & minime rubrum, quia non multum calidi simul constitit. Eadem de carnibus ratio est. Frigidum quidem constitit, & compegit, ac fecit carnem, glutinosum autem in foramina transit, in foraminibus autem his humidum est, velut in venis magis. Calidum autem in toto corpore est: plurimum vero & humidum in corpore est, & frigidi multum in humido: tantum autem id frigidi, quantum congelasse humidum, ac liquidum potest, sed superatur a calido: quare etiam ab ipso diffunditur. Quod vero humidum calidum est, hac demonstratione confirmatur. Si quis corpus hominis secet, ubicunque velut, sanguis calidus fuerit, & quan-

- & quamdiu sane calidus fuerit, liquidus erit, postquam vero refrigeratus est, tum
 ab intrinseco frigido, tum extrinseco pellicula fit, & membrana: & si quis hac pel-
 licula detracta, modico tempore linat, aliam pelliculam factam videbit; si vero quis
 hanc semper adimat, alia rursus pellicula a frigido generatur. Ceterum ea gratia
 115 plura dixi, ut ostenderem, quod extremum corporis ad aerem convertum, neces-
 sario pelliculam induit præ frigido, & ventris impetentibus. * At vero triguli sic
 generati sunt. Quum ossa facta essent, quaecumque quidem ex ipsis pingui erant,
 celerrime exusta sunt, quemadmodum etiam prius dictum est superiore sermone.
 120 Quantum autem ex ipsis glutinosum erat, id ipsum exuri non poterat, sed medio
 transiit: quantum autem ex glutinoso liquidissimum erat, hoc calefactum crassius
 redditum est, utpote liquidum existens, & ex hoc saliva facta est: verum ex illo glu-
 tinoso ungues producti sunt, Etenim ab ossibus, & articulis semper liquidissi-
 mum ipsorum discedens, glutinosum redditur, & a calido siccatur, ac arefactum,
 125 foras in ungues delegatur. * Dentes autem postea generantur ex hac causa. Ex
 ossibus capitis, & maxillarum incrementum fit glutinosi, & quod ex pingui in-
 est, a calido siccatur exuritque, & sunt dentes reliquis ossibus duriores, quia in-
 bil frigidi inest. Et prius quidem dentes nascuntur a victu in utero, & post-
 quam natus fuerit, pueri lacteori a lacte. Ubi vero hi existerint a cibis, & potibus
 130 excident autem, ubi ad annos primi alimenti pervenerint, quibusdam etiam prius,
 si a morbo alimentis nati fuerint, plurimis vero, quum septem annos impleve-
 rint. Qui vero postea enascentur, simul consensescunt, nisi præ morbo perirentur.
 Ceterum dentes propterea postea nascuntur, si in maxilla veniunt, & si
 135 & hæc hinc ossi ipsi inter omnia ossa ex inferno ventre alimentum præbent. Ossa
 vero tale augmentum dant, qualia existunt, sed & alia omnia tale augmentum red-
 dunt, qualia ipsa existunt. Etenim venæ ex ventre, ac intestinis, in quæ cibi, ac po-
 tus colliguntur, postquam hi fuerint calefacti, tenuissimum, ac liquidissimum trahunt, cras-
 sissimum autem, & sex isthæ relinquunt, compurescuntque, & fit stercus in inferiori-
 bus intestinis. * Tenuissimum vero trahunt venæ ex ventre, ac intestinis, quæ supra
 140 ipsum intestinum existunt, atque hoc calefactus iam cibus. Ubi autem jejunum inte-
 stinum transierint, & in inferiora intestina collecti fuerint, stercus sunt. At vero
 alimenterum, ubi accesserit, unumquodque talem speciem unicuique reddit, qualia sane
 erant. Singula enim ab alimento irrigata augmentum capiunt, calidum, & frigi-
 dum, & glutinosum, & pingue, & dulce, & amarum, & ossa, & alia universa, quæ
 145 in homine insunt. Et ob id dentes postea nascuntur. Dictum autem a me prius
 est, quod sola ex ossibus maxillæ ipsæ in se ipsas venas habent: & ob id alimen-
 tum amplius in ipsas, quam in alia ossa trahitur, & quia uberius alimentum, &
 densiorem infusum habent, augmentum ipsæ a se ipsis tale pariunt, quales sane
 ipsæ existunt, atque hoc, donec homo integer angelicat, angelicat autem, ubi con-
 150 spiciuntur evadit, conspicuus vero fit maxime a septennio usque ad decemum quar-
 tum annum, & in hoc tempore tum maxime ex dentibus, tum alii omnes na-
 scuntur, postquam exciderint hi, qui ab alimento in utero nati sunt. * Ange-
 licat autem & in tertium annorum septennarium, in quo adolescens fit, usque ad quar-
 tum, & quintum septennarium, Quæ & in quarto septennario dentes enas-
 155 cuntur, plerique hominibus diu, qui sapienter dentes appellantur. * Porro capilli
 sic nascuntur. Ossa sunt, & cerebrum, a quibus tale augmentum venit, utpote glu-
 tinoso circumiecta existente, quemadmodum & nervi, & pinguitudinis nihil inest.
 Si enim pinguitudo affuisset, ex calido sane exusta esset. Fortassis autem mirabi-
 160 li quis, quod etiam sub alis, & in pube pilæ multi, & quibusdam in toto corpore
 existunt. Verum hic sermo de eo est, quod ubicumque in corpore glutinosum est,
 ibi pilæ calore fiunt: * Auditus autem inde contingit: foramina aurium ad os du-
 rum, & siccum lapidi simile pertingunt. Jam vero ad ipsum os est cavitatis intro-
 165 ita: Serepit autem ad durum firmantur: os autem cavum resonat per durum. Pel-
 licula vero in aure iuxta os durum tenuis est, velut aranei tela, & omnium pellicula-
 rum sicillima. Quod autem id, quod sicillimum est, maxime resonat, multa signa
 sunt. Quum igitur plurimum resonat, maxime audimus, Et sunt quidam, qui de
 natura sordentes prodiderunt, quod cerebrum est, quod sonum edit, hoc autem fieri
 non potest. Ipsum enim cerebrum humidum est, & membrana, sive ténica circum ipsum
 170 humida est, & crassa, nempe circum tunicam ossa. Nullum igitur humidum reso-
 nat, sed sicca, resonantia autem auditum faciunt. * Olfacti porro cerebrum humidum
 existens, aridum odorem una cum aere per corpuscula chartilaginea ipsum
 trahens. Cerebrum enim in cavitatem nasi pertingit, atque hæc parte non est ante ip-
 sum os aliquod, sed chartilago mollis, velut spongia, neque caro, necque ossiculum:
 175 & ubi quidem cavitatis nasi sicca fuerit, ipsum seipso exactius arida olfacti. Aquam
 enim non olfacti, humidior est enim, quam cerebrum, nisi sit putrefacta. Putrefacta e-
 nim aqua crassior fit, & alia omnia. Quum vero nares humectæ fuerint, olfacti etiam
 possunt. Non enim aërem attrahit cerebrum ipsum ad se ipsum. Similiter etiam, ubi
 cerebrum ipsum de seipso plurimum liquefecerit in palatum, & fauces, & pulmonem,
 ac reliquum ventrem. Cognoscunt autem hoc homines, & ex capite detillare cheimi,
 & deli-

- 18 defillat autem & in reliquum corpus. Et est modus ejus calidus. * At vero visus pro-
pterea contingit: a cerebri membrana vena in utrumque oculum per os descendit: per
has duas venulas, quod est glutinosissimum tenuissimum, de cerebro percolatur, &
propterea ipsam circum ipsum oculum tunica talem facit, quale est ipsum oculi
pellucidum, quod ad aeterni vergit, ad quod ventri, ac status irruunt, eadem plane
ratione, quemadmodum de aliis membranis, ac tunicis dicit. Sunt autem multae natu-
rice prae oculis pellucidae, quales ipsi existunt. Hinc enim pellucido lumen, &
omnia splendida reuolunt; per hoc igitur reuolens videt: quod vero non splen-
didum est, neque relucet, per hoc non videt. Verum reliquum, quod circum ocu-
los est album, caro est. Quae vero papilla oculi appellatur, nigra apparet ob id,
quod in profundo est, & tunica circum ipsam nigra sunt: tunica autem appel-
lamus id, quod velut pellicula inest. Est autem non nigra, si quis inspiciat, sed al-
ba, ac pellucida: humidum vero oculi glutinosum existit. Saepenum vidimus,
in oculo rupto exire humorem glutinosum, & si quidem adhuc calidus fuerit, liqui-
dus est. Postquam vero perfrigeratus est, siccus evadit, velut thus transparentis.
Atque hoc & in hominibus, & in brutis similiter habet. Ceterum oculum mole-
stia afficit omne, quod incidit, & venti irruentes, & alia, quae splendida sunt,
quam ipse est. Et si quis interroget, respondere licet, propterea quod consimilis
coloris existunt. Quemadmodum os, & lingua, & pelliculus venter, humida sunt,
19 * Sermonis porro facultas inde est. Totum corpus spiritum intro trahit, plurimum ve-
ro in cavitates sibi ipsi accumulat. Is autem, qui per inane foras currit, strepitum fa-
cit: caput enim resonat, lingua vero articulatur, occurrentes in faucibus, obstruuntque,
ac pellem ad palatum, & dentes, elaritate ejus facit. Si autem lingua semper occu-
rens non articularet, non posset homo clare differere, sed singula a natura unam
vocem haberent. Hujus signum est. Muri ex nativitate differere non possunt, sed
unam tantum vocem sonant, etiam si quis spiritum efflans sermonem profecto con-
tulerit. Manifestum autem hoc est. Homines, ubi voluerint magnam vocem ede-
re, attrahentes spiritum forissecum, eum foras propellunt, & magnam vocem e-
dunt, prout spiritus durat, postea vero vox contabescit. Sed & citharædi, quum
iplos vocem intendere oportuerit, spiritum quam plurimum intro trahentes, pronu-
nciationem extendunt, & vociferantur, ac vocem magnam edunt, prout spiritus
durat, ubi vero spiritus defecerit, desinunt. Ex quibus manifestum est, quod spiri-
tus, qui vocem edit, Vidi autem jam quosdam, qui sibi ipsis manu illata guttur
penitus praefecerant, atque hi vivunt quidem: verum nullam vocem edunt, nisi
quis guttur confringat: hi autem sermonem profertunt. Manifestum vero & hoc
est, quod praefecto gutture spiritum attrahere intro in cavitates non possunt, sed
20 per perfectam partem exhalat. Sic sane res de voce, ac sermone se habet. * Porro
vita hominis septem dierum est. Primum etenim, postquam genitura in uteros
pervenit, in septem diebus habet, quæcumque corpus habere debet. Mirari autem
quis possit, quomodo ego id sciam. Verum multa ego vidi hoc modo. Meretricis
publicæ, quæ sepius de seipsis periculum fecerunt, nhi cum viris rem habue-
rint, sciunt, quando in ventre concipiant, & postea conceptum intra se perdunt.
Postquam autem jam perditus est, elabuntur velut caruncula. Hanc carunculam
in aquam coniectam si conficatus consideraveris, omnia membra habere repe-
ries, & oculorum regiones, & aures, & manus, & manuum digitos, & crura, & pe-
des, & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum. * Sa-
tis etiam manifestum est harum rerum peritis, quod mulier, quum in ventre con-
cepit, statim horret, & calor, & denique fridor consequitur, & convulsio occu-
pat tum articulos, tum totum corpus, & uterum segnitie, ac torporis. Et quæ pri-
us sunt, hoc perpetiuntur. Quæ vero crassa, & mucosa hoc perpetiuntur, pleraque
ex his mulieribus non percipiunt, nec cognoscunt. Certe quatenus mihi ostende-
rent, hoc ipsum se cognovisse, eatenus scio, ac prodo. Quod vero vita homi-
nis septem dierum sit, etiam ex hoc manifestum redditur. Si quis in septem diebus
nihil edere, aut bibere velit, plerique quidem in ipsis moriuntur. Sunt autem qui ip-
sos transmittunt, & tamen moriuntur. Sunt etiam quidam, qui persuasi sunt, ut ne
desperarent, se ipsos fame conficientes, sed comederent, ac biberent: verum ven-
ter non amplius suscipit. Ieiunium enim intestinum in his diebus concrevit, mo-
riunturque etiam illi. * Sed & ex hoc conjectare licet, hominis vitam septem dierum
esse. Puer septimestri partu natus, pro ratione natus est, & vivit, & rationem ta-
lis habet, ac numerum ad hebdomadam, ac septenarium exactum. Octimestris autem
natus nullus unquam vixit. Novem vero mensium, & decem dierum partus sit,
21 & vivit, & habet ad hebdomadam numerum exactum. Quatuor enim denarii hebdo-
madum, dies sunt ducenti & octoginta; in denarium autem hebdomadam se-
pentaingenta dies incurrunt. Habet autem & septimestris partus tres denarios, sive
decadas hebdomadarum, & in unaquaque decade septuaginta dies. Tres vero heb-
22 domadam decadas ex toto sunt dies ducenti ac decem. * Quia & morbi acutissi-
mi sic hominibus fiunt, præteritis diebus hebdomadis dimidia, aut unius, in
omnibus judicantur, & moriuntur, aut sani evadunt: & tertii generis in undecim
diebus, hoc est una, & dimidia hebdomade: & quarti in duabus hebdomadis,
& die-

350 & quinti in duodeviginti diebus, hoc est duabus & dimidia hebdomadis. At vero alii morbi non habent, ut cetera sententia pronuntiari possit, quanto tempore homines ab ipsis sani evadant. Ad eundem modum etiam ulcera magna in capite, ac reliqua corpore quarto die inflammata incipiunt, in septem autem inflammatio sedatur, aut etiam quatuor & decem: aut duodeviginti. Si quis autem diligenter medetur, & vulnera in capite magna in hoc tempore non sedentur, homines moriuntur. 355 Ceterum inexpertus quisquam mirari queat, quod septimestris puer nascatur. Ego quidem igitur hoc ipsum vidi, & quidem frequenter, si quis autem hoc deprehendere vult, facile est obstrictis adire, quæ parentibus adfuit, & ex ipsis percipiari. Est autem & aliud signum. Pueri septem annis præteritis dentes expleat. Et in septem annis sunt & ratione, & numero exacte hebdomades 360 trecentæ, ac sexaginta. Necessitatem autem naturæ, quapropter in septem hæc singula dispensentur, ego aliis locis declarabo.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE SEPTIMESTRI PARTU.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 De Septimestri partu, & primo: quod diebus nascatur, & qui ratione septimo mense edatur. Item, cur plurimi ex his pereant, & pauci ex multis superstites manent.
- 2 Oportet menses difficillime utero ferre. Partus dies cur cogniti difficilis. Indicatio omenti menses in prægnantibus difficilis. Mulieribus de partu loquentibus, tamquam expertis, fides habenda.
- 3 Abortus plurimi primis quadraginta diebus.
- 4 Oportet menses manere, aut cæcum graviditibus difficilis: cuiusmodi autem sciam plerumque sunt superstites, ceteri non item.
- 5 Novimestres partus qui supervivunt, & qui non. Decimestres cur maxime educantur. Corporis magnitudo ex temporis longitudine contingit.

- 6 Conceptus, abortus, & partus tempus idem, quod morborum sanitatis, & mortis. Dies primi, & septimi in morbis, & febribus plurimum valent.
- 7 Adversum eadem, quæ dierum in prægnantibus vis, & ratio. Septimus mensis factus perfectioris principium constituit. Decretoriorum dierum eadem, quæ in utero ferentium ratio.
- 8 Dierum in ægrotis medico habenda ratio. Quadragenarius primus in febribus indicat, & quæ si quis transierit, abortus ex omni causa contingens effugit.
- 9 Masculini facti partes omnes post quadagesimum diem completum conspurcæ sunt, femellarum non item. Femelle cur masculis citius pubescant, ac supiant.
- 9 Secundi quadragenarius vis. Tertii quadragenarii completi vis.
- 10 Mortem fatalem Hippocrates existimat. Tempore eadem aliis vita, aliis mortis cunctis.

SEPTIMESTRES autem nascuntur diebus centum & octoginta duobus, ac dimidio, & insuper accedente diei particula. Si enim primus mensis dies quindecim supputaveris, deinde quinque mensium, dies centum quadraginta septem, ac dimidium; in unde sexaginta enim diebus quam proxime duo menses perficiuntur. His igitur sic habentibus, ad septimum mensem superfluit dies non plures, quam viginti. Et est tota summa dimidii anni, una cum aliquantula diei parte, Quam utaque ad hoc perfectionis principium partus pervenerit, maturescere foetus, & robore multum augefcere, in perfectione magis, quam aliis temporibus, pelliculæ, in quibus ab initio nutritus fuit, quemadmodum spigarum membrana laxantur, ad id coactæ, antequam fructus perfecte maturescat, & fortissimi, ac plenissimi foetus violentes, ac dirumpentes pelliculas, partum fieri cogunt, & plurimi ex his pereunt. Quam enim parvi sint, transmutatione maiore, quam alii, veniunt, & quadraginta dierum afflictionem perferre coguntur, ex utero egressi, id quod etiam ex decimestribus multos peremit. Sunt autem ex his septimestribus, qui etiam superstites manent, ex multis pauci. Propterea quod ratio, & tempus, in quod enutriti sunt, in utero consistit, ut omnia participes sint, quorum etiam perfectissimi participes existunt, maxime qui superstites manent, & processerunt de matre prius pariente, ipse in octavo mense ægrotaturi. Si enim in his laboribus succedant, ut in conspectum prodeat puer, impossibile est superstitem esse ob prædictas affectiones, quas ego octimestres perimere dico; immo etiam multos decimestres. Ceterum multi foetus septimestris ætatis, quum pelliculæ laxantur, secedunt in id, quod cedit, & hic alimentum fumunt, primos quidem quadraginta dies laborantes, alii plus, alii minus: propter permutationem autem ex locis, & pelliculis, quæ ipsos aluerunt, transmutantur, & pro umbilico trahunt, & transmutant etiam per matrem labo- 365 res.

res: Pelliculæ enim, dum tenduntur, & umbilicus convulsus, dolores matri inducunt. Et foetus ex antiquo vinculo extoluitur, gravior redditur. Multæ vero mulieres etiam febricitant, his contingentibus, quædam etiam pereunt una cum foetibus, verum omnes in brevi ex hoc contaminantur, ac inquinantur. * Aliant autem & octones menses difficillime uteros ferre, recte id dicentes. Est autem octavus mensis non solum hoc tempus, sed & dies accedunt a septimo mense, & a nono, & ab ipso anno. Verum dies non similiter, neque dicunt, neque cognoscunt mulieres. Decipiuntur enim ex eo, quod non eodem modo sunt, sed aliquando a septimo mense plures dies accedunt ad quadraginta, aliquando a nono. Tunc enim fieri necesse est, prout contigerit mulierem in ventre concipere tum mense, tum tempore. Mensis autem octavus nimis dubius est; secundum hunc enim contingit, ut iudicatio difficilis existat. Et mea sententia pars etiam in undecimo mense nensis est, ut hic satis memorabilis existat. Porro mulieribus de partibus fidem derogare non oportet; dicunt enim omnia, & semper dicunt, & semper proficiunt. Neque enim aut opere, aut sermone persuasæ sunt, sed ex eo, quod cognoverunt in corporibus suis contigisse. Licet autem & volentibus aliud dicere, Quæ vero iudicio prædita sunt, & victoriam de hac sententia pronunciant, semper dicunt, ac testantur, nasci septimestres, & octimestres, & novimestres, & decimestres, & undecimestres, & ex his octimestres non superstites manere. * Dicunt autem, & ab utero plurimos in primis quadraginta diebus fieri, sed & reliqua conscripta his accedere, in quadragenariis, ac in singulis mensibus fieri dicunt. Quum autem septimo mense pelliculæ dirumpantur, & foetus secesserit, labores, qui circa octavum mensem, & sextum quadragenarium in partu fieri traduntur, cortipiunt: hoc autem tempore præterito, quibus bene futurum est, inflammationes tum foetus, tum matris exolvuntur, ut venter molliatur, & tumor a præcordiis, & laterum mollitudine descendat ad locos inferiores, ad faciliem partus tempore progressionem, & septimo sane quadragenario plurimo tempore foetus isthic existunt. Nam loci ipsi molles sunt, & transmutationes ipsi faciliores, ac frequentiores fiunt, & propterea ad partum magis solubiles consistunt, & mulieres per hos ultimos dies ex toto quadragenario facilius uteros ferunt, donec contigerit foetum verti. Postea vero dolores partus, ac labores incumbunt, donec a puero, & a secunda mulier liberetur. * Quicumque vero mulieres multos pueros pepererint, & quidam ex ipsis claudis natus est, aut cæcus, aut aliud quoddam malum habens, aliæ in hoc puero octavum mensem ipsas difficulius transgisse, quam in his, quos pepererunt, nihil mali habentes. Foetus enim manens in octavo mense fortiter agrotavit, ut etiam morbus abscessum, ac ablationem, sive mutilationem alicuius partis fecerit, quemadmodum etiam viris fortes morbi faciunt. Qui vero foetus in alio tempore fortiter agrotant, pereunt prius, quam ipsi abscessus, ejusmodi fiat. Quicumque autem octimestres foetus non valde agrotant, sed iuxta unam aliquam partem, ex secessu afflictionem pertulerunt, quadraginta quidem dies in imbecillitate transigunt, ut plurimum in utero, propter prædictas necessitates, sani autem fiunt. * Quicumque autem natus fuerit in his quadraginta diebus, eum impossibile est superstitem manere, agrotanti enim adhuc ipsi in utero transmutationes, & afflictiones post partum accedunt. * Quicumque vero agrotans in utero ad nonum mensem pervenerit, & in hoc mense natus fuerit, superstes erit. Et supervivunt quidem non minus hi, quam septimestres; verum pauci etiam ex his educantur. Neque enim crassitudinem habent, quam perfectissimi habent, & labores in utero non diu ante toleraverunt, ut tenues evaserint. Servabitur autem vel maxime talis puer, si novem mensium fuerit in exu, fortior autem evadet etiam is, qui plurimum abest a morbo, qui octimestribus accedere solent. Qui enim in septem quadragenariis nascuntur, decimestres appellantur, ob id maxime educantur, quod fortissimi sunt, & plurimum a vulgari puero tempore absunt, in quo assurgunt, quadraginta agrotantes diebus, circa octavum mensem. Declarant autem de morbis, & afflictionibus octimestrium, etiam novimestres tenues nascentes. Iuxta multitudinem enim temporis etiam magnitudo corporis contingit, ex morbotum afflictione progressus, & non velint septimestres carni gignuntur, & crassitudinem probe coactam habentes, ut qui tempus, quo in utero gestabantur, sine morbis transegerunt. * Verum enim vero conceptus, & abortus, & partus mulieribus in eo tempore, in quo etiam morbi, & sanitas, & mors omnibus hominibus sunt: hæc vero omnia partim secundum dies, partim secundum menses, partim secundum dierum quadragenarios, partim secundum annum significationem sui præbent. In omnibus enim his temporibus insunt ad unumquemque et utilia multa, et hostilia multa. Ex utilibus igitur sanitas, et augmentum contingit, ex contrariis morbi, et mors. Dies quidem igitur maximè insignes in plurimis sunt, primi, et septimi, multum potentes in morbis, et multum in foetibus. Nam plurimi abortus in his diebus fiunt; nominantur autem tales effluxus, non abortus. Verum alii dies intra quadragessimum, insignes quidem minus sunt, multi vero iudicant. * Cæterum in mensibus eadem, quæ in diebus sunt, juxta rationem insunt. Menses enim mulieribus suis singulis mensibus apparent, tanquam peculiarem in corporibus vim mensis habeat. Unde sane septimi menses

mentes his, quæ uterum gestant, foetus in principium perfectionis constituunt. Pueris vero, ubi septem menses a natiuitate impleverunt, tum alia utilia in corporibus sunt, tum dentes in eo tempore apparere incipiunt. * Eadem ratio est etiam si de cretoris diebus, si quidem fortassis tunc cum his, quos recensui, coniungere quis velit, historiæ, ac cognitionis gratia referentur. Etenim Medicum, qui ægrotorum salutem recte coniectare volet, animadvertere quidem oportet, et contemplari omnes dies: ex parvis vero decimum quartum, et vigesimum octavum, et quadagesimum secundum. Hic enim terminus ponitur a quibusdam pro harmoniæ ratione, et integer, ac perfectus numerus, verum ob quam causam longius fuerit in præsentem exequi: contemplari autem sic oportet per ternarios, ac quaternarios, ternarius quidem omnibus copulatis, quaternarios autem duobus ad duos connexis. At vero quadragenarii primum in foetibus iudicant. Quisquis enim primos quadraginta dies tranmiserit, abortus effugit ex omni causa contingentes, plures autem sunt in primo quadragenario abortus, quam in aliis omnibus. Hoc autem tempore præterito foetus fortiores sunt, & ipsorum corporis per singula membra discretio fit: & masculinorum quidem partes omnes valde conspicuæ sunt: foemellæ vero in hoc tempus carnes apparent exoeris, ac processus solum habentes. Similia enim longius tempus in simili sunt, & tardius discernuntur, propter consuetudinem, & amicitiam: quamquam alias quam a matre segregata fuerint, filia citius, quam filii pubescant, & sapiant, ac senescant propter corporum imbecillitatem, & vichus rationem. * Alter quadragenarius est, in quo circa octavum mensem foetus in utero ægrotant, de quibus hic totus sermo institutus est. Tertius est, in quo, ubi nascuntur pueri etiam male afflicti, si effugerint quadraginta dies, apparent magis robusti, ac sapientes. Nam & splendores clarius vident, & strepitum audiunt, quod prius non posuerunt, tamquam incrementum habeat hoc tempus, cum iuxta alia, tum iuxta sapientiam ex corpore effluerent. Peculiarem quidem sapientiam in corpore inelle manifestum est in prima fine die. Nam in foemina statim, ubi nati sunt pueri, ridere, & plorare videntur. Vigilantes quoque sua sponte flagim vident, ac plorant, prius quam quadraginta dies transeant. Non robusti autem, etiam si titillentur, ac irriterentur, priusquam hoc ipsum tempus transeat, hebetantur enim vires in mucus. * Quamquam mors etiam per fatum sit forte designata, ut hoc exemplo omnibus sit, quod omnia existentia, quæ naturam ex iisdem habent, transmutationes per tempora venientia habeant. Declaratur autem in singulis, quum alia nascuntur, alia corrumpuntur. Porro anno finiente multi quidem morbi sunt, multæ etiam sanitates iuxta temporis rationem ad menses, & ad singulos dies. Septennarius autem annorum cum alia multa insignia corporibus sunt, tum dentes pueris excidunt, & alii nascuntur. Quæ enim in corporibus sunt, ea scribam,

H I P P O C R A T I S C O I LIBER DE OCTIMESTRI PARTU.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Octimestres partus cur non supersites manent.
- Decimestres cur educuntur maxime.
- 2 Fetus dum in utero vertitur, periculum.
- In caput editi cur seorsum discedant illi, qui in pedes.
- 3 Pueri quidem cur a partu statim maiores existant. Alimentorum, & respirationum mutationes periculosa in pueris. Vellus, locorum, & vestium transmutatio vi-

ria etiam periculosa.

- 4 Umbilicus, per quem puer nutritur, ac spiritum attrahit, solus ex omni corpore utero adhæret.
- Pueri matris, ac perfectis umbilicus, qui prius patebat, conuertit, ac clauditur: reliquæ partes contra.
- 5 Decimestres, & undecimestres partus ex septem quadagenariis nascuntur.
- Adulieres plurimas post mensem purgamenta concipere. Purgationes menstruas brevissimas trium esse dierum.
- 6 Undecimus mensis ante partum contingit.



DE octimestri partu sic sentio. Impossibile esse, ut duas consequenter succedentes afflictiones pueri ferri possint, & propterea octimestres non superstitēs manere. Contingit enim ipsos consequenter affligi tum ea, quæ in utero sit afflictione, tum ea, quæ in partu accedit, & ob id nullis octimestris vitalis est. Insuper & decimestres appellatur in septem quadagenariis dierum magis in lucem edi sentio, & maxime contingere, ut educuntur. Nam perfectissimus est foetus in primis quadraginta diebus, ubi vero plures accesserint, perit. Coguntur enim multa in paucis tempore assumptis, ac perferentes, multum ægrotare, ex quibus mors consequitur. * Incipit autem

tem laborare puer ante partum, & interitus periculum ſubit, quum in utero vertitur. Producentur enim omnes ſurſum habentes caput: pariuntur autem multi in caput, & ſecurius diſcedunt, ac liberantur hiſ, qui in pedes pariuntur. Flexibiles enim corporis partes non impediunt ſunt, pueri in caput exeunte. Verum quum in pedes prodierit, obſtacula contingunt. Verſiones ſcilicet in utero, & alia pericula, & umbilici puerorum jam ſepe circa colla apparuerunt. Si enim juxta partem quamcumque umbilicus fuerit in utero porrectus, magis hac parte puer umbilici circumactionem, dum vertitur, faciet, quam circa cervicem. Si vero juxta humerum, umbilici circumactionem retrahit, hoc autem ubi ſit, etiam matrem magis laborare neceſſe eſt, & puerum aut perire, aut difficilius exire. Quare multi jam pueri principium morbi intus nacti prodire, & conſequenter alii perierunt, alii morbidum ſupervixerunt. Quicumque vero probe, ac tuto prodierint, & in conſpicuum exierint, de repente ex neceſſitate in ventre liberati, & craſſiores, ac majores, quam pro ratione ſtatim exiſtunt, hiſ non ex augmento, ſed laxo tumore id contingit, & multi ſani ex hiſ pereunt. Si enim tumor non reſidat citius, quam tertio die, aut paulo ſerius, morbi ex ipſo ſunt. Quare etiam alimenta, ac reſpirationes periculose mutantur. Si quid enim morbidum inducunt, per os, & per nares inducunt: & pro eo, quod tanta ingerantur edulia, quanta ſufficiunt, & ea etiam non ſuperentur, multo plura ingeruntur: ut neceſſe ſit, & cogantur præ ingeſtorum copia, & præ ipſa adeo affectione, qua pueri corpus aſſectum eſt, alia quidem per os, & nares rurius exire, alia vero per inteſtinum, ac veſicam inferne tranſire, antea nullo horum ita contingente. Sed & pro flatibus, ac ſpiribus, & humoribus ita cognatis, cum quibus neceſſe eſt in utero conſuetudinem, ac benivolentiam habuiſſe, omnibus peregrinis utitur crudioribus, ac ſiccioribus, & minus manſuetis, ut neceſſe ſit dolores abortiri multos, plerique etiam mortes: quandoquidem etiam viris tranſmiſſiones locorum, ac victus, morbos faciunt. Eadem ratio eſt & de veſtibulis. Pro eo enim, quod carne, & humoribus induci fuerint, iſque tepidis, ac liquidis, & cognatis, tales veſtes pueri induunt, quales ipſi viri. At vero umbilicus, per quem alimenti, ac ſpiritus ingreſſus pueris contingunt, ſolus ex omni corpore utero adhaeret, & per hanc introitus, ac ingreſſus ingredientium particeps ſit, reliquæ partes connivent, & non prius apertæ ſunt, quam ubi in exitu fuerit puer ex ventre. Quum autem in exitu fuerit, reliquæ omnes aperiuntur: verum umbilicus attenuatur, & connivet, ac reſecatur. Quemadmodum autem in hiſ, quæ ex terra naſcuntur, fructus pleni, ac maturi ſecernuntur, ac decidunt juxta diſcriminationem, qua parte inhaerent, ſic etiam pueris maturis, ac perfectis, umbilicus quidem connivet, ac clauduntur, reliqua vero aperiuntur, ut & ingredientia ſuſcipiant, & exitus habeant ſecundum naturam, quibus neceſſe eſt viventes uti. Singula enim ſeparantur juxta modum, quo agmina congregantur repentina: optima autem ſunt, quæ maxime ſoli connutritæ ſunt. Caterum decimeſtres, & undecimeſtres partus ex ſeptem quadragenariis eodem modo ſunt, velut ex dimidio anno ſeptimeſtres. Pueris enim mulieribus neceſſarium eſt in ventre concipere poſt menſtrua purgamenta, ubi ab hiſ exolutæ fuerint. Oportet igitur mulieri tempus dare menſis, in quo ipſa purgatio continget: & hoc tempus quibus breviffimum ſit, tres ſunt dies. Plerique autem multo plures. Sunt autem & alia multa impedimenta etiam in viris, ex quibus conceptus retardatur. Oportet autem vel maxime hoc conſiderare. Quod novilunium, quod dies unus exiſtit, exactiſſime trigefima menſis pars eſt: duo autem dies, ſerme quindecima menſis pars ſunt. Tres vero dies, pars menſis decima ſunt, & reliqua juxta horum rationem, & non eſt poſſibile in paucioribus partibus fieri neque menſtruiſſimum ſolutionem, neque ſæctum conceptionem. Ex hiſ igitur omnibus neceſſarium eſt, pleraſque mulieres circa plenilunium, & ultra in ventre concipere, ut ducenti & octoginta dies, ſæpe undecimum menſem apprehendere videantur: tot enim dies ſeptem quadragenarios conſtituunt. Nam quum ultra plenilunium mulier concipit, neceſſe eſt, eum conceptum undecimum menſem attringere, ac apprehendere, quo ad ultimum circuitum perveniat.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE SUPERFOETATIONE.

Argumentum in Librum ſequentem.

1 De Superfetatione. Mulieres qua ſuperfætant.

2 Superfetatio nondum partum diſcriminationem habens non intrinſeciſ, ſed pureſciſ, dicitur exiſtat. Secunda ante editum partum. Hipp. Opera.

rum, partum reddunt difficilem. Secunda cum puero exiſtente partum ſacilem efficiunt. Unquam deſectus in pueris recentem editis.

3 Partuſ auxiliaſ. Partus nonniamquam cibis, ac potibus promoventur.

4 Eſtus mortui quomocumque tandem procedat extractio.

D

Unius

5 Unguis instrumentum in fetu mortuo extrahendo.

De secunda extrahitione. Lasanum quid.

6 De pueri in utero mortui signis;

7 Fluxus multus sanguinolentus ante puerum prodeuntem. Prægnantis stomachus uteri prope extat ante partum.

Prægnans, coitu non utens, facilius a partu liberatur.

Gemelli non die, atque ex una secunda eduntur. Pueri in genitalibus hærenti umbilicus non fecitur, priusquam auferantur, aut vociferetur.

8 Prægnantem mulierem quomodo cognoscas, Prægnantium ex fetu mortuo, aut mox mortuorum signa, & curatio, Pica prægnantium.

9 Mammarum, & oculorum majorum in prægnantibus significatio, Conceptionis experimentum ab appetitis in vulvam. Mulieres quæ maxime concipiunt.

10 Mulieris, quæ facile concipiebat, nec amplius imprægnatur, curatio. Contendici, capitis, manuum, aut aliarum partium doloris in utero conceptu, solutio est. Mulieris, ut facile concipiat, curatio, Galbanum ad conceptum facilius.

11 Liberis operam dari quomodo præparandi, Genitura in utero concepta nota.

12 Equis bimembris aut reticulosis perdenti quomodo mendum.

13 Uteri suppurati aut post partum, aut ex abortu, curatio, Uteri quomodo indurescat.

14 Uteri stomachi præ soliditate genituram

non suscipientis curatio;

15 Fomentum ad uteri conceptionem, Specilli flammæ, & plumbei in corrigendis uteris usus. Specillorum præparatio, Teda desectum.

16 Catulorum ejus. Calida lavacrum siti medetur.

17 Atenium sanis, ac replete habentibus uteris, non adpartum ex toto, vel pauciorum, aut per longius tempus provocatio. Medicamentorum fortium plerique stomachum exulcerant, & corrodiunt.

18 Mulier ob pinguedinem non concipiens atenatur. Ver conceptui aptum. Coitura non dicta, Aferem, aut famellam ne generet, quo tempore coeundum, & uter possim obligandus, Uteri stomachus a sufficientis hians redditur.

19 Suffimenta ad os uteri hians, aut distortum.

20 Adedimenta emollientia, & ad sciendum idonea, quo fortis fiat, purgatio.

21 Adedimenta substituta ad uterum purgandum convenientissima.

22 Glandula album fluxum purgentes.

23 Substituta omnis generis pingere potentia.

24 Atenferi virgini quomodo evocandi, Febris lenis bepulus Græci, Zeta in suffimentis, Adedimentorum substitutum.

25 Puerpera emixa. Substitutum medicamentum.

26 Substitutum purpureum, & mollius. Uteri frequenter prolapsi quomodo reponendi.

27 Prægnantis, menses profluus habentis, curatio.

Ad secundam expurgandam.



U U M. superfœtatur mulier, si primum puerum in medio uteri habuerit, superfœtatio elabitur a primo, ac veteri expulsa. Si vero in altero cornu superfœtationem habuerit, posterius ipsam insuper parit non vitalem, nimirum vitalitate, ubi uteris laxatus, & humectus fuerit, exsoluita. * Si vero non statim secedat superfœtatio, dolores exhibet, & fluxum scetidum, ac febrem; & facies intumescit, tibiæque, ac pedes, & si pereat, magis facile parit. Itemque si puer quidem foras prodit: secunda vero adhærescit, & seipsam retrahit, atque isthuc manet. * Quum puer non vitalis futurus nascitur, caro ipsius ungues supereminet: ungues vero tum in manibus, tum in pedibus deficiunt. Quum vitali puero nascente manus præminuerint, primum retro retrahenda est, donec retruseris: & si ambæ præminuerint, ambæ retrudas. Et si crur præminuerint, etiam hoc repelles. Ubi vero ambo crura in propatulo inauerint, neque alio processerint, fomento uti opus est, a quo humectissimus uteris reddatur: habeat autem odorem ipsum fomentum. Et quum caput in propatulo fuerit, reliquum vero corpus intus erit, etiam sic fomento uteris. Et quum pars corporis in utero, pars in pudendis, pars extra pudenda intumescit, ac manet, etiam sic fomentum adhibebis. Et si quidem a fomento processerit, satis est: sin minus, os uteri elaterio crasso aqua diluto oblines, quo partum producat. Sed & a potibus, ac cibis partus promovendus est, & pudenda ipsa cerato illinenda, si fœcciora, quam ex re est, esse tibi videbuntur. Quum pueri capite ex stomacho apparente, reliquum corpus procedere non vult: puer autem mortuus est, digitos aqua madefactos inter stomachum, ac caput immitte, & in orbem circumducito, deinde subdum sub menium digitum in os intrudito, ac foras trahito. Quum vero reliquum corpus extra pudenda fuerit, caput autem intus, in pedes videlicet prodeunte fœtu, postquam digitos

digitos in orbem circumdlexeris, ambas manus inter stomachum, ac caput aqua præ-
 madefactas immittito, ac extrahito. Si vero extra stomachum fuerit, verum in-
 tra pudenda, immittis manibus apprehenso capite educito. Si porro fœ-
 tus intus maneat mortuus, & non possit neque sponte, neque per medicamenta
 iuxta naturam excidere, manu cerato maxime lubricante uncta, deinde utero
 intus, humeros a collo magni digiti conamine deducito. * Oportet autem
 ad hujusmodi etiam unguem instrumentum in magno digito habere, & distrac-
 tione facta manus edicere, deinde rursus immissa manu, ventrem diffundere,
 & ex dissilio intestina sensim eximere: deinde his exemptis latera confringere,
 quo confidens corpusculum levius, ac expeditius fiat, & facilius exeat non humidum
 existens. Cæterum si secunda non facile excidat, maxime quidem ad foetum appen-
 dere sinenda est, & puerpera velut super sella ventri exonerando destinata, lala-
 num græci vocant, locanda. Sit autem in altum extructa sella, vel simile quiddam,
 quo foetus dependens gravitate sua secundam simul extrahat. Sensim autem hoc fa-
 ciendum est, non violenter, ne præter naturam divulsa, inflammationem inducat. Sub-
 sternere igitur lanas molis, quam maxime recens carminatas foeti oportet, quo
 paulatim remittant, ac confidant. Aut utres duos copulatos aqua plenos suppone-
 re, & supra utres lanas infernere, & supra has puerum, deinde utrumque utrem
 stilo perforare, quo paulatim aqua effluat, effluente autem aqua, utres remittunt,
 ac confidunt: confidentibus autem utribus, foetus umbilicum attrahit: umbilicus vero
 attrahit secundam. Si vero supra lalanum, vel simile quiddam puerpera sedere
 nequeat, super reclinatorum sellam perforatam collocetur. Si vero adeo debilis est,
 ut omnino sedere non possit, lectum quam erectissimum a capitis partibus struendus,
 ut deorsum declinet, ac repat, & sic foetus gravitas quam maxime simul secundam
 erahat. Verum puerperam sub alis, foris ad lectum fascia, aut loro lato, ac molli,
 alligare oportet, ut ne quum erectus sit lectus, corpus ipsius deorsum feratur. Juxta
 eundem autem modum etiam si umbilicus abruptus sit, aut etiam ante tempus recisus,
 moderate gravibus ponderibus appensis, secunde educationem facere oportet.
 * Si cui puer in utero immoriatur, & non egrediatur humido utero existente, & quum jam non ha-
 beat amplius humiditatem, sed siccatu fuerit uterus, primum quidem intumescit
 puer, deinde colliculescunt, ac putrescunt carnes, forasque effluunt, postremum autem
 ossa procedunt: & fluxus aliquando corripit, si non prius moriatur. Quum puer im-
 mortuus fuerit, tum aliis signis conjectare id licet, tum iurare, ut aliquando in de-
 xtero latere jaceat, aliquando in sinistro transmutet. Translabitur enim in utero
 puer eo quo mulier se vertit, velut lapis, aut aliud quiddam, si mortuus fuerit, &
 pectinem frigidum mulier habet. Si vero vivat, & pectem calidus est, & venter to-
 tus translabitur una cum reliquo corpore extensus, & in ipso nihil translabitur
 absque reliquo corpore. * Si cui ex partu laboranti fluxus multus sanguino-
 lentus citra dolorem ante puerum prodeat, periculum est, puerum mortuum exolvendum ef-
 fesse, & non vitalem processurum. Prægnantibus mulieribus plerisque stomachus ute-
 ri prope exiat ante partum. Mulier prægnans si non coitu utatur, facilis a partu
 liberabitur. Quæ gemellos gestat, eadem die parit, velut concepit: habet autem
 utroque pueros in una secunda. Muliere ægre patiente, si puer in genitalibus
 locis hæreat, & non facile exeat, sed cum labore, ac medici machinamentis, tales pue-
 ri modicæ vitæ sunt, horum umbilicum secare non oportet, priusquam mingant, aut ster-
 nant, aut vociferentur: sed sinendi sunt, & mulier proxime apud puerum perman-
 eat: & si fieri, aquam mulsam bibat, & si umbilicus infletur, velut stomachus,
 & moveatur, aut puer sternutet, aut vocem rumpat, tunc sane secetur, dum puer re-
 spirat: si vero non infletur umbilicus, neque moveatur, tempore accedente vivet.
 * Prægnantem mulierem si aliter non cognoscas, oculi tracti, & caviore sunt, & can-
 didum oculorum albedinis naturam non habet, sed lividius existit. Si qua partui vici-
 na sit, & oculos cavos habeat, & facies intumescat, & ipsa rota, itemque pedes
 tument, ut velut a pituita alba apprehensa appareat, & habeat aures albas, &
 summum nasum album, & labia livida, ea ipsa mortuus gestat, quos pariet, aut
 vivos prave, & non vitales, & exangnes, utpote morbosos, aut prius peperit non
 vitales. Huic sanguis in aquositate conversus est. Oportet igitur tali post partum
 odorata in vulvam apponere, & comedere ipsam, ac bibere odorata, & pri-
 mum in facie nasus summus insignis evadit, ac colorem recipit. Si qua prægnans
 terram edere concupiscat, aut carbonem, eaque edit, in capite pueri, ubi na-
 tus fuerit, signum a talibus apparet. * Mulierem id nosse expedit, utra mam-
 ma ipsi maior est, illic enim foetus existit. Similiter autem & oculum considerabit.
 Major enim, & splendidior omnino erit intra palpebram, etiam ejus patris, cujus
 mamma maior existit. Si cui ab appositis in vulvam non valde fortibus do-
 lores in articulis perveniant, & stridor dentium corripit, & membris tendatur
 ac oscitat, hanc magis concepisse spes est, quam eam, quæ nihil tale patiatur. Mul-
 ier, quæ præter naturam crassa est, ac pinguis, & pituita repleta, non concepit hoc
 tempore. Quæ vero ex natura talis est, horum gratia concepit, si non aliud quid-
 dam ipsam impediatur. Mulieribus plerisque, quum menses apparituri sunt, sto-

- machus uteri in seipsum contrahitur, magis quam alias. * Mulier, quæ facile concipiebat, si prægnas esse desit, bis per annum a manibus, ac cruribus veuam fecari sinat. Si cui dolores in coxendice, aut in capite, aut manibus, aut aliqua alia corporis parte fuerint: quum vero prægnans est, desinant; conceptus autem ab utero exulato rursus infans, odorata & bibere, & ad uteri os apponere conducat. Quum mulieri alicui conceptus gratia medeberis, ubi purgata esse videbitur, & os uteri recte habuerit, lavetur, & caput confricetur: nullo autem unguine illinatur: deinde linteum iuodorum lotum circum capillos ipsos circumdantium, reticulo loto, aut nihil olenti obliget, ita ut primum linteum ipsum capiti imponatur, postea quiescat galbano ad uteri stomachum appposito, quod coctum, ac mollium sit ad ignem, & non ad solem. Deinde mane deposito reticulo cum linteo verticem suum alicui olfaciendum exhibeat: & si quidem oluerit, probe purgata est, sin minus, male. Hæc autem jejuna faciat, & si non secunda fuerit, nunquam olebat, neque purgata, neque alias, & si prægnanti idem medicamentum apponatur, neque sic probe olebat. Quæ vero prægnans futura est frequenter, & facile concipit, ac sana existit, etiam si non appolueris, neque purgaveris, vertex ipsius olebit, aliud vero nihil. * Ubi autem omnia probe videbuntur, & ad vitum accedere oportuerit, mulier ipsa jejuna sit: vit autem non ebrius, frigida lotus, & comodo alimento nutritus. Et si cognoverit mulier genituram se concepisse, eo tempore virum non accedat, sed quiescat. Cognoscat autem, si quidem vit se emisisse dixerit: ipsa vero præ fecitate ignoraverit. Si vero uteris rursus in pudenda genituram reddat, ipsaque humectæ fiant, rursus cum viro coeat, donec concipiat.
- * Mulier, quæ concipit quidem: perdit autem sætus bimestres, exacte in eodem tempore, & neque prius, neque posterius, arque iterum atque iterum perpessa fuerit, immo si etiam trimestres, aut quadrimestres, sive vetustiores perdidit, juxta eundem modum. Talibus uteri puero augeſcente, & bimestre, aut trimestre, aut quantumcumque tempus transgrediente, si quando etiam alias augeſcit, in maiorem amplitudinem non porrigunt, ita ut non amplius sufficiant capiendū fecitui, sed propterea perdit eodem tempore. Huic cucumerarium medicamentum in uterum dare oportet, ipsiunque distendere, ac inflare pharnacis appositus hîſce. Cucumeris sylvestris medulla contundatur, ac cribretur, deinde modicum de ipsa melle cocto copiosiori misceatur, addito silphio modico: sit autem, velut dixi, mel coctum, hoc circum specillum oblinatur, crassitudine formata, quanta uteri stomachus suscipere potest: apponatur autem ad os uteri, & impellatur, quo in internam uteri partem penetret. Quum vero colliguerit medicamentum, specillum extrahatur. Sed & elatrum hoc modo præparatum apponere potes. Similiterque colocythidem sylvestrem. Per hoc autem tempus edat alia quam plurima, & silphii caulem, & quicquid statum in ventre indicit. Hoc appositum pharnacum per tertiam diem apponatur, donec probe habere viſa fuerit copia, quantum uterus admittit. Interjectis diebus mollientibus utendum est: postquam autem ex mollientibus præparatum fuerit os uteri, post mensium apparitionem, ubi sicca fuerit, cum viro commisceatur. * Si cui uterus suppuratus fiat, aut post partum, aut ex abortu, aut quomocumque alias, & non in vase alio, ac tunica, velut in tuberculo solet, pus fuerit: huic conducit specillum unctorum in uteri os demittere. Minus enim opus fuerit ulla, si ad specillum processerit, deinde erucas a tithymalide colliges: habet autem velut aculeos quosdam, quos leniter rescindes, ne pabulum internum ex ipsis elabatur: deinde siccabis ipsas in sole, ac teres. Vermes quoque stercorios similiter in sole siccabis, ac teres: & erucas quidem pondus duorum obolorum Aginaotum: vermium vero duplum miscebis, modico aniso addito, aut aliquo ejus generis, nam mali odoris medicamentum evadit. Hæc autem levia facta, ac conerita vino albo odorato diluito. Et postquam biberit, gravitas accedit, & torpor in ventrem irruit. Si itaque accedit, aquam nullam modicam insuper bibat. Si qua liberis carens, imprægnatione, ac puerorum generatione indigeat, arque ea iam prægnans fuit, ac peperit, & hoc ipsi contingat, aut quum stomachus uteri siccus, aut summa parte affectus, aut conclusus fuerit, aut non recte habuerit, sed ad coxendicem alterum distortus, aut ad rectum intestinum occurrans, aut in seipsum contractus fuerit, aut labium stomachi sibi ipsi utcumque incubuerit, aut stomachus uteri asper, & callosus fuerit: durus autem sit & a conclusionē, & a callositate: his menses non apparent, aut pauciores quam oportet, & per longius tempus apparent. * Sunt autem, in quibus etiam menses juxta corporis sanitatem, & uterorum exitum reperiuntur, immo consueto, & iusto modo, & stomacho uteri præ caliditate, ac humiditate mensium non valde laeso.
- Verum genituram non suscipit propter hanc læsionem, quæ impedit susceptionem, stomacho non recte habente. Huic per totum corpus fomentum adhibere oportet, & pharnacum bibendum dare, ac corpore primum purgatum, ac mundum reddere, sive superne, & inferne opus habuerit, sive superne solum. Et si quidem superne purgans medicamentum dederis, fomentum ante purgationem non præmittes. Verum fomentum adhibebis inferne purgatus. Si vero superne purgante medicamento non egere videbitur, præmissis fomento, inferne purgans bibendum dato,

* Quum

- 15 * Quum autem probe purgatum esse corpus videbitur, postea utero fomentum
adhibeto, frequentes infusus ipsis adornans, si ita conferre videbitur. Immitte
autem in fomentum rupesci ramentis, & lauri folia contrita, lavabique
multa, & calida aqua. Ubi vero recens lota fuerit, & fomentum admiserit, uteri os
dilatabis specillo stanneo, corrigesque, ubi opus fuerit: putes & plumbeo uti, initio
per parvum factis, deinde crassiore adhibito, si suscipere poterit, donec recte
habere videbitur. Intinges autem specilla in mollitorio quopiam diluto, aut etiam li-
quido reddito, si conferre videbitur. Specilla ipsa tetro cava facienda sunt, dein-
de circum ligna longiora adaptanda, sicque ipsis utendum. Ceterum hoc tempore bibat
in vino albo odorato dulci, & quam suavissimo decoctam tædam quam paucissimam,
in tenuia segmenta concisam, & apii semen contusum, & cumini Æthiopici semen,
& thus quam optimum, ex hoc bibat jejuna copia, quanta moderata esse videbitur, tot
diebus, quot latis habere videbitur. * Et edat catulos coctos, & polypum in vino
dulci coctum, insculumque ipsum bibat, & brassicam coctam. Vinum autem album
insuper bibat, & ne sitiat, & calida bis per diem lavet. A cibis autem hoc tempore
abstineat, ab eo vero tempore, si quidem processerit per stomachum, & quid purga-
tionis foris apparuerit, adhuc de portione bibendum est unum, atque alterum diem,
& a specillorum usu desistendum, ac conandum, ut uteri apposititis medicamentis
purgentur. * Cuiuscunque autem stomacho recto, ac magno, & sano existente, & probe
habente, & in loco, ubi convenit, & oportet, sito, menses non apparuerint ex to-
ro, aut pauciores, & per longius tempus, & non sani, morbum ipsum investigabis,
quæcumque tandem uteri habent, & si corpus quoque, aliquid conferat, causam per-
scrutaberis, ob quam non concipit: & hæc sic habeant, & curationem facies, si me-
delam suscipere volet, initio a forribus factis, prout opportunitum visum fuerit, ita
ut desinas in molliorum usu, donec uterus visus tibi fuerit probe esse purgatus,
& stomachus recto statui esse constitutus, & rite situs. Si vero potu, ac medicamen-
to menses non processerint, etiam si moderato tempore id biberit, nequa-
quam a potu cessandum est: ubi vero probe habuerit, specillorum usu os sto-
machæ molliendum est, & faciendum, ut hiet, ac viam præbeat appositio me-
dicamento: idque pharmacis suffragis apris, ac mollientibus perficies. Quin autem fa-
cis suffragis, ac mollium esse videbitur, appposito medicamento subditio uteri
purgationem facies, donec rite habere videbitur, a molliibus ad fortiora progres-
sa factis, ita ut rursus in molliibus, ac odoratis desinas. Nam pleraque ex for-
tioribus medicamentis stomachum exulcerant, ac corrodunt. Deinde vero tum sto-
machum ad rectum statum, ac sanitatem redigito, quo apius sit ad suscipiendam geniti-
viam, tum uterum siccum reddito, & statum immutato. * Si mulier præ pinguitudi-
ne uterum ad concipiendum læsum habere videatur, attenuatio quam maxi-
me, & gracilitas inducatur supra reliquam curam. Tempus porro verum apri-
ssimum est ad concipiendum. Vir autem non sit ebrius, necne vinum album bibat,
sed quod fortissimum est, ac meracissimum, itemque edulia fortissima, & calida non la-
vet: robustus autem sit, & sanus, & a cibis abstineat ad rem non consenti-
entibus. Et ubi marem generate voluerit, mensibus desinentibus, aut defectis menses-
tibus, & quam penitissime intrudat, donec deserviat. Ubi vero foemellam genera-
re volet, quam plurimi menses prodierint mulieri, & dum adhuc eunt, coeat,
ac dextrum testem obliget, quantum id tolerare poterit: sed si marem generate expe-
tat, sinister testis obligandus erit. * Stomachus uteri a sustinentis qui-
dem, ubi conclusus fuerit, hians redditur, ab emollientibus vero mullescit. Sus-
sistere autem oportet loci corticem, lauri semen, sive baccas, & folia ejusdem viri-
dia contrusa, thus, myrrham, attemisæ semen, aut solia: item anisum, & adipem,
aut ceram simul contrusa, sulphur, cupressi semen, peucedani radicem, myrthi
folia viridia contrusa, fibri testem, asini masculi stercus, alia, styraeem, adipem (sub-
lum), sed & si distortum os uteri fuerit, his sustinendum est. Sic quidem igitur hians
redditur, ac convertitur. Mollire autem per hæc uteri os oportet, sandaracham
videlicet, adipem caprinum, fici succum, silphii succum, cyclaminii sucum, Thap-
siam, succum tithymalli, cardamomi semen, herbam, quæ peplos appellatur,
fibri testem, lini semen, nitrum, ari radicem, staphidem sylvestrem, calaminthæ
folia viridia, herbæ lanacie, sive struthii semen, scillæ internam parrem.

20. * *Medicamenta emollientia, & ad sciendum idonea, quo foris purgatio fiat.*

Thapsiæ radicem, medullam bovis, adipem asnerinum, rosaceum, hæc trita, ac 230
servata per quatrimum apponat, & bibat porri succum, ac vinum dulce al-
bum. Item resinam, & oleum tepidum, cuminum, nitrum, mel, sordida lana exci-
piat, & per quatrimum utatur, bibatque apii semen, & thuris nucleos quinque, &
cuminum Æthiopicum in vino albo merato, dulci, laverque bis per diem.
Item myrrham, thus, sel bovis, resinam terebinthinam, aut netopon, sive me- 235
topium unguentum, horum singulorum æqualem mensuram misceat, & in hanc pu-
ta, aut linteo tenui apponat. Intingat autem linteum in unguento albo Ægyptio
odorato, & filo obligatum, a balneo subdet, & polypum plagis mollium edat, &

Hipp. Opera.

D 3 apii,

- apii, ac asparagii semen; ac vinum album bibat, ter in die jejuna existens. Aut
 240 myrrham, caliam, thus, cinamonum, netopum, singulorum aëuas portiones la-
 na exceptas, aut in glandes redactas apponat. Aut cucurbitæ sylvestris interio-
 ra, cuminum tostum, anethi semen, cupressi radicem, trita, ac melle cocto sub-
 acta in glandes cogito, easque subdendas exhibeto, & bibat prœniz radicem, a-
 245 pii semen, ac filipii succum cum vino. Sed & Bulbium ipsum subditum purgat.

* *Medicamenta subditiua ad uterum purgandum convenientissima.*

21

- A**ccipe æris florem, ac nitri tertiam partem, melleque cocto subacta in glandu-
 las iustæ magnitudinis, ac crassitudinis redige, atque sic ad uteri osculum ap-
 pone: si vero fortius facere velis, elaterium ammisce ad florem solum, & hoc mo-
 250 do coactas glandulas subdendas præbe. Potes & ramulorum fici corticem de-
 rasum, ac renuicet tritum ammiscere; quum os uteri siccius esse videbitur, dimi-
 dia portione eodem modo. Aliud. Elaterium, & æris florem trita, duabus
 floris partibus, una elaterii acceptis, dilue, & cyclaminum tritum, prout oportu-
 num videbitur, ammisce, & in lana simul coacta subde.

255

* *Glandule album fluxum purgantes.*

22

- A**rtemisiam herbam, nitrum, cyclaminum semiaridum, cuminum subde.
 Alia. Artemisiam herbam viridem tritam, & myrrhæ tertiam partem,
 ammixto vino odorato, in lana alba obvolve, eamque vino rinctam apponendam
 præbe. Ubi vero hiauerit uterius, nitrum, cucumeris sylvestris medallam, cy-
 260 claminum semiaridum in lana appone.

* *Subditiua omnis generis purgare potentia.*

23

- S**taphidem sylvestrem viridem tritam, artemisiz herbæ solia trita melle cocto ex-
 cipe, & in umbra siccata in glandulas coge, ac subdendas exhibe. Aliud. Flo-
 rem æris, & alumeæ Ægyptium cum cyclamino dilue, & vehi priora melle cocto ex-
 265 cipe, aut in caricam inde, cum modica myrrha. Aliud. Cyclaminum tritam vino
 albo odorato ammixto, in luteo tenuissimo puro obliga, & subdendam præbe.
 Aliud. Cyclaminum semiaridum, nitrum, cantharidas, adipem, sandara-
 chen subde.

* *De Virgine.*

24

- S**i virgini menses maturi non prodeant, mulum & febricitat, & dolet, & sitit,
 270 & elurit, & vomit, & surit, & rursus resipiscit: uterus movetur, & quum ad vi-
 scera vertitur, vomitus, ac febris, & delirium accedit: ubi vero sedatur uterus, &
 hæc quiescunt, elurit, ac sitit, & febris lenis, hepatalon græci dicunt, tenet. Huic
 pelles agninas calidas ad ventrem apponere oportet, & sustinere facere in ipsa puden-
 da quam penitissime, ita ut super amphoræ collo desideat, & fumum admittat.
 275 Fiat autem suffitus ex myrrha magnitudine fabæ, & thuris dupla portione, ammi-
 xta etiam zea scrsa, hæc simul suffire debet, & in ignem immittere maxime
 dum jejuna est, & multa calida lavare.

Medicamentum subditiuum

- A**lumen Ægyptium emollium lana involutum subdat. Aliud. Artemi-
 280 siam tritam, & vino albo subactam, apponendam præbe.

* *Puerpera recens curata.*

25

- R**ofaceum, myrrham, ceram, mixta in lana apponenda præbe. Ubi autem
 uterus ipsi procidere, acida, & acerba offerenda sunt, tum poranda, tum so-
 ris adhibenda. Item sicum nigram, allium, nitrum, cuminum, hæc omnia re-
 285 mittere trita in lana apponenda dato. Aliud. Sepiæ testam tusam, & vi-
 no imbutam cum leporinis pilis, lana excipe, & apponendam præbe. Si vero
 post partum uterus doleat, pissinam, & porrum, ac adipem caprinum coquat,
 indeque modicum sorbeat.

* *Subditiuum medicamentum.*

Nitrum, cuminum, sicum, omnium aëuas portiones subde.

Necopum, rosaceum unguentum, adipem anserinum linteis tenuibus excipe. Si menses multi produnt, pæoniæ grana nigra bis septem numero, in vini cyathi duobus bibenda præbe. Si vero uteri frequenter prolabantur, uteros aqua tepida madefacies; ipsam vero mulierem supinam reclinabis, miscebisque mali corum, gallam, & rhoem rpbaram, hisque in vino albo tritis uteros illinies, ac immietes. Postea lauri folia in vino austro bibenda dabis. * Quum autem mulier prægnans menses profusos habet, steruus alini siccum, & rubricam, ac sepia testam, trita, simulque linteis illigata apponat; si vero secunda non purgetur, elaterii oboli Atrici pondus in vini albi cyathi mensura tritum bibendum præbe, & purgabitur.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE EXECTIONE FOETUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Fetus oblique prolapsi, ac manum extensam habentis exellio.
- 2 Capitis extrahio. Dieta, Fætu quo ra-

nione in utero verti, & non in caput ed-
contingat. Manus in fætu extra puden-
dam exerta quid significet.

- 3 Fætu prolapsi quomodo retrahendus.
- 4 Uterum foras prolapsorum curatio.
- Phoca oleum, sive adeps.



DE his, qui non juxta naturalem modum pariuntur, sed excin-
duntur, hoc modo se res habet. Primum quidem sindone supra
mulierem injecta, eam supra mammas circumdato, & caput ob-
velato, ne videns, quod facturus es, timeat, ac exhorrescat. Si
itaque foetus oblique prolapsus manum protensam habuerit, ma-
nu apprehensa foras producere, quam maxime conato, & brachium
ipsum excoriato, atque ubi os brachii denudaveris, squamosam
pellem circum duos manus digitos obligato, ne caro lubricitate sua elabatur. De-
inde vero carnem circa humerum rescinde; ipsumque juxta juncturam exime, post-
ea caput juxta naturam protrusum foras producere tenta; foetum vero ipsum in-
tro prostrudito ferramento per latus, & costas, sive claviculam adacto, quo sta-
tum emittat foetus, & confidat, ac contrahatur, atque ipsi facilior exitus pateat. * Ce-
terum caput, si fieri potest, juxta naturam extrahe, sin minus, confringe; atque sic
foetum una subextrahe. Postea calida large perfusam, & oleo illitam decumbere pilo-
to, pedum situ alternatum variato. Bibat autem vinum dulce, album, & aqua-
cius temperatum. Sed & resina melle trita, ac vino ammixta, in post præbeatur.
De cætero vero curanda est, velut dixi, juxta ea, quæ relata sunt. Quum vero pa-
tientis mulieris foetus oblique prolapsus fuerit; id, quod contingit, dum veniunt
puer, & umbilicus circum collum obvolvitur, & exitum foetus impedit, & caput
in coxendicem incumbit, & manus ut plurimum foras prominēt, quod ipsum
mortui foetus signum est. Quibus autem manus non exerta est, ut plurimum vi-
vunt foetus, periculum autem etiam hoc modo est. Alique enim purgamenta
ante partum mittunt, & necesse est cognoscere ex eo partum siccum, & cum dolo-
re laboriosum esse. Quibus autem purgamenta ante partum non produnt,
hæ in pariendo facilius liberantur, * Concutere porro oportet hoc modo. Sindone
substrata mulierem reclinabis, & aliam superinjicies, quo pendendum ipsius
sit obvolvitur, obvolvique sindonem circum utrumque crus, & circum utramque ma-
nu. Mulieres autem duæ utrumque crus apprehendant, & alia duæ utramque ma-
num, deinde concurant valide ipsam tenentes non minus, quam decies. Postea
iq lectum reclinetur mulier in caput, ita ut cura sursum vergant, & mulieres o-
mnes ipsum pedibus corripant, manibus dimissis, sepeque concutiant, ac respo-
sionem in humeros faciant in lecto, quo foetus in spatiosorem locum retrusus
vertatur, & naturaliter progredire possit. Et si diuturnum crucium habueris,
ipsum bibendum dabis; sin minus, sibi testem in vinum chium detades. * Si ve-
ro uteri foras prodierint sive ex dolore, sive ex partu, si quidem juvenicula fue-
rint, aggressionem facito; sin minus, finito. Aggressio autem hoc modo fiat. Pellis-
culam uteri juxta naturalem modum, & oblique incisam linteis confricato, do-
lope inflammetur, & illinito phocæ oleo, sive adipe, aut pice, aut mali punici so-
re integro, & molles spongas vino resperas apponito, & ex hu-
meris ipsas alligato. Mulier vero decumbat cruribus
quam maxime sursum versus porrectis. Mode-
ratis autem edulis vescatur.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE DENTITIONE.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 De dentitione. Pueri carnosius minus lassis,
minus carnosius multum lassis surgunt.
Pueri qui saniores, qui minus.
- 2 De dentitionum puerorum statum iudicium;

Hyeme dentitionum melior conditio.

Plus mungentes, & bene dormientes parvi
habitores. Abstergeat facile, qui sugen-
tes interim cibum adsumunt.

- 3 Ulcera in tonsillis infantium que periculo-
sa, qua non;

- 1 **P**UERI natura habitiores, non pro carnositate ratione etiam
lac sugunt. Voraces vero, & multum lactis estantes, non pro
ratione carnosius sunt. Pueri sugentes, si multum mungant, mini-
me anaculi sunt. Quibus alvus multum profuit, & bene conco-
quant, hi saniores sunt. Quibus modice profuit, & vora-
ces sunt, & non pro ratione similiter nutriuntur, morbofi. Qui-
bus multum lactis vomitur, hi alvus supprimitur. Qui-
bus in dentitione alvus amplius subducit, minus convelluntur, quam quibus parvi. 2
Quibus in dentitione febris acuta accedit, parum convelluntur. Quicumque denti-
tes habitiores manent, & altiore somno utuntur, periculum est, ne convulsione
corripiantur. Qui hyeme dentunt, reliquis similibus existentibus, melius li-
berantur. Non omnes in dentitione convulsi moriuntur, sed multi etiam ser-
vantur. Qui cum tussicula dentunt, tardius dentes produunt, in perpunctione
autem magis gracilesceunt. Quicumque in dentiendo hyemem habent, si attente
tractentur, dentitionem facilius ferunt. Qui plus mungunt, quam egerunt, pro ratione
habitores sunt. Qui non pro ratione mungant, verum alvus frequenter cruda a
pueris egestit, morbofi sunt. Qui bene dormiunt, & habitiores sunt, multum
alimentum adiungunt, idque adjacet, non sufficienter distributum. Qui dum sugunt,
interim cibum adsumunt, facilius ablationem ferunt. Qui saepe cruenta, ac cri-
da per alvum egerint, plurimi in febre somniculosi sunt. Ulcera in tonsillis ei-
tra febrem facta securiora sunt. Quibus infantibus in sugendo tussis instat, 3
uvam maiorem habere solent. Quibus cito in tonsillis ulcera serpentina consi-
dunt, febribus, ac tussis permanentibus, periculum est rursus generanda esse ulcera
recurrentia. Ulcera tonsillarum in infantibus periculosa. Pueris minorabi-
lis magnitudinis, si ulcera in tonsillis sint, & deglutire possint, salutis signum est.
Quum vero majores prioribus deglutire in tonsillarum ulceribus non possunt, hi
multam bilem revoant, aut per alvum prodire periculosum est. In ulceribus ton-
sillarum si quid araneosum inest, non bonum. In tonsillarum ulceribus post pri-
ma tempora prius tam per os effluere, si prius non fuit, commodum est, & tamen
reducenda est. Si vero incipiat, & omnino remittat, gaudendum est. Si autem non
sic effluat, vereri oportet. Qui tonsillas destillatione vexatas habent, hi alvus am-
plius subducit, siccas tussis solvit. Verum pueris, si quid concocti superne pro-
derit, amplius solvit. Ulcera multo tempore in tonsillis circa augmentum ma-
nentia ante quintum, aut sextum diem periculosa non sunt. Sugentes, qui multum lactis
adiungunt, ut plurimum somniculosi sunt. Sugentes, qui non probe aluntur, ma-
cilentius sunt, & agre vires recolligunt. Ulcera in tonsillis aestate facta, pejora
sunt, quam alius temporibus, citius enim prosperunt. Ulcera in tonsillis circa
uvam prosperentia in hiis, qui servantur, vocem alterant. Ulcera
proserpentina circa fauces graviora, & magis acuta, ut
plurimum spirandi difficultatem inducunt.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE CORPORUM RESECTIONE.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Arteria aspera, pulmonis positio, structura,
forma, & substantia.
Lobi quinque. Cordis, arteria chartilagi-
nosa, vena magna positio, & structura.

- 2 Hepatis, vasorum emulgentium, renum, u-
rinariorum, matrum, vesicae, gula posi-
tio, et forma.

- 3 Septi transversa, lienis, ventris, coli, in-
testini recti positio, structura, forma, &
substantia.

AR-



ARTERIA ex utraque faucium parte exortum faciens, in summam pulmonem desinit, circulis composita, confimilibus rotundis, in superficie se mutuo contingentibus. Ipse autem pulmo testitudinem coadimplet, in sinistram conversus, quaque apices habens, quos lobos, & summitates vocant, emerso colore præditus, notis cavernosis compunctus, naturaque antrosus existens. Ad medium vero ipsius cor simi est rotundius, ac oblongius, quam in omnibus animalibus. A corde vero ad hepar multa chartilaginosa arteria procedit, & cum ipsa vena magna appellata, per quam totum corpus nutritur. * Hepar autem similitudinem quidem cum omnibus aliis habet, verum sanguinolentius, quam alia existit, apices habens duos, quos portas appellant, in dextris locis sitas. Ab hoc vero obliqua vena aserne ad rhenes tendit. Rhenes autem confimiles colore, maiorum speciem præ se ferunt. Ab his canales obliqui, ac ferme triangulares in summum vesicæ apicem tendunt. Vesica autem tota nervosa est, magnaque, ac late se extendens capacitas intra eam a natura disposita est. Et has sex partes intus per medium corpus natura disposuit. Gula autem a lingua principium faciens, in ventrem desinit, quam sane græci etiam œsophagum, & stomachum, id est os ventris significanter appellant. Cæterum a spina retro hepat, septum transversum productum est. * Ex latere vero notho, sinistro videlicet, lien initio sumpto extensus est ad humani vestigii similitudinem. Venter autem hepatis adiacens iuxta sinistram partem, totus quidem est nervosus. A ventre vero extat inestinum ventri consimile, longum cubitorum non minus duodecim, pampino formiter in sinibus involutum, quod aliqui colum vocant, per quod alimenti delatio contingit. A colo autem situm est rectum, ac princeps intestinum postremum, carnem copiosam habens, & in summum anum desinens. Reliqua porro natura ipsa ordinavit, ac disposuit.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE CORDE.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 De cordis figura, colore, ac structura. Cordis tunica, seu vesicæ usus. Cordis humoris tanta est copia, quanta in medellam est satis. Cordis humor unde. Gula, sive stomachus, velut infundibulum, potum, & quæcumque volumus, excipit. Potus in guttur, ac arteriam, quantum epiglottis, sive lingua permiserit, fertur.
- 2 Epiglottidis usus.
- 3 Quomodo tussis, potu avertitum irrumpit, excutitur. Cor humorem per arteriam ad pulmonem illapsum cum aere ad se trahit, non tamquam alimentum, sed ut medellam. Cordis humoris, & spiritus attracti vacuatio.
- 4 Cor musculus est valde fortis, non nervosus, sed densitate. acernis constituitur. Cordis ventriculi duo, eorundemque forma, & positio.
- 5 Pulmo natura frigidus, & inspiratione refrigeratur. Cordis sinister ventriculus receptaculum est spiritus. Cordis sinister ventriculus, cor crassior, ac asperior. Cordis officina quatuor, & quomodo deprehenduntur.

Cor caloris insiti fons, & principium. Cordis fontes resecati, mortis causa se existunt.

- 6 Cordis aures quæ vocentur, Cordis aurium substantia. Cordis aurium utilitas. Cor solium simile quid habet. Cor ex toto ventilari: aures vero privatione tum infari, tum considere, ac contrahi.
- 7 Pena in sinistram cordis ventriculorum, arteria in dextrum respirationem operatur. Cordis sinister ventriculus plus aeris attrahit. Cordis pellicula. Alia in ipsius cordis pellicula. Cordis ventriculorum pellicula, nervi, & vasorum principia auri esse videntur.
- 8 Cordis oculis singulis tres pelliculae sunt subornata. Atenti sedes in sinistro cordis ventriculo relique anime imperat. Anima, sive mentis nutrimentum.
- 9 Arterie magne alimentum. Arteriam magnam sanguinem, quem nos videmus, non nutrit. Cordis pellicula ob arteriam venosam sicut producit.
- 10 Pulmonis vasorum nutrimentum. Sanguis non est natura calidus.



COR figura velut pyramis est, colore autem abunde puniceum, & tunica levi circumdatam habet, & est in ipsa humor modicus, velut urina, ut putare possis in vesica cor diversari. Facta est autem ea gratia, ut sanum in custodia staret. Habet autem humiditatem tantam, quanta satis est estuanti in medellam. Cæterum hunc humorem cor emingit, bibendo ipsum assumens, ac consumens, pulmonis nimirum potum lambens. Etenim homo multo maximam partem in ventrem bibit. Gula enim, sive stomachus velut infundibulum potus copiam, & quæcumque volumus, excipit. Bibit autem & in gut-

- 10 In guttur, ac atheriam, minus vero, & quantum latere possit per rimam illaplum. * O-
perculum enim exactum epiglottis, lingua, siue minor lingua appellata, ne per-
miserit quidem aliquid amplioris potus penetrare. Signum autem huius rei
hoc est. Si quis enim aquam caeruleo colore, aut rubrica temperatam, sitienti val-
de bibendam dederit, maxime sui; hoc enim pecus non est curiosum, neque mundi-
tium deditum. Deinde dum adhuc bibit, ipsius guttur refecit, hoc colore ipsum tin-
ctum reperiet; sed non est iussus hac chirurgiae aggressio. Nequaquam igitur si-
des nostra suspecta esse debet de poti, quod homini in guttur vergat. * Sed quo-
modo aqua acervatim irruens, turbationem, ac tyssim multam exhibet; propterea
inquam, quod contra respirationem fertur. Quod enim per rimam illabitur, tamquam
10 iuxta patientem delabens, aeris elationi non instat, sed levem; ac lubricam quamdam
viam humectatio ipsi præbet. Hunc itaque humorem cor de pulmone una cum aere
abdacit. Aerem quidem igitur, ubi in medulam cessit, necessario oportet retro per
eandem viam, qua adduxit, retere. Verum humorem partim in culeum, ac vaginam
suam expulit, partim rursus una cum aere foras propellit. Quapropter etiam pala-
25 tum elevat, quum spiritus recurret. Merito autem recurret. Non enim humane
naturæ alimenta hæc sunt. Quomodo enim hominis alimentum sint ventus, &
aqua cruda? sed tunc magis cognatæ affectionis castigatio, & medela. * Porro
ut ad institutum sermonem revertamur. Cor musculus est valde fortis non ner-
vus, sed densitate, ac constrictione carnis, & duos ventriculos habet discretos in
30 nino amiculo, ab utraque parte unum. Nihil autem inter se similes sunt. Alter
enim in dextris ad osculum situs est, contingens alteram venam. Alter in sini-
stris. Totum enim cor in his sedem suam firmavit. Sed ille etiam omnino am-
plioris ventris, & magis inanis, quam alter est, neque extremitatem cordis attingit,
sed caudam eius ambit; solidus item est; veluti extrinsecus assutus. Alter autem
35 suber subter sinistram mammam maxime in directum situs est, ubi etiam salus ip-
sius significationem sui præbet. Amiculum autem habet crassum, itemque foveam.
Fovea enim speciem præ se fert similem mortario. * Sed enim hic etiam pulmo-
nem subit cum mastuetagine, & circumiectus ipsius, caloris intemperantiam casti-
gat. Etenim pulmo natura frigidus est, sed & inspiratione perfrigeratur. Ambo
40 autem densi, ac asperi sunt interna sui parte, & velut subcorrosi, magisque sinister,
quam dexter. Nam insitus à natura ignis ipse est in dextro; Quare mitius est sini-
strum asperiorum fieri, ubi intemperatum aerem inspiraverit. Quapropter etiam ro-
boris caloris custodiendi gratia crassius intus contractus est. Oscula autem ipsi
non sunt aperta, nisi si quis cordis auriculas præfecerit, ac caput cordis præciderit.
45 Si autem quis præfecerit, apparebunt duplicia oscula in duobus ventriculis. Crassa
enim vena ex altero excurrens visum decipit, si fuerit resecta. Hi fontes sunt hu-
manæ naturæ, & hic flumina sunt, quibus totum corpus irrigatur; atque hi etiam
vitæ homini consentiunt, & ubi resiccati fuerint, homo moritur. * At vero prope
50 exorum venarum corpuscula circum ventriculos consurgunt, mollia, cavernosa,
quæ auriculæ appellantur. Non sunt autem foramina aurium; non enim claiorem
exaudiunt; verum sunt organa, quibus natura aerem rapit. Et sane videtur mi-
hi boni, ac præstantis artificis opificum esse. Quum enim considerasset figuram
solidam futuram ipsius visceris propter sanguinis ex venis effusi collectionem, ac
concretionem, deinde attractorum ipsum esse totum vidisset, folles ipsi apposuit,
quemadmodum fabri ferrarii fornacibus solent; quo per ipsos spiritum apprehen-
55 deret. Signum autem scriptoris hoc est. Etenim cor videas ex toto ventila-
ri; aures vero privatim tum instari, tum consilere, ac contrahi. * Et propter hoc
etiam dico, quod venæ quidem operantur respirationem in sinistru ventriculum;
arteriæ autem in alterum. Molle enim magis attrahit, & incrementum capit. O-
60 porteabat autem nobis magis incumbentiæ cordis regmina perfrigerari. Est enim
calor non in dextris; quare propter hanc affectionem non acciperunt amplum
organum, ut ne in totum ab ingrediente aere superarentur. Restant dicende
cordis pelliculæ latentes opus dignissimum cognitione. Sunt enim & alæ quædam
in ventriculi pellicula, velut araneorum telæ extente, quæ undiqueque
65 oscula cingunt, & stris, ac segmenta in solidum cor inserunt. Hæ mihi nervi ip-
sius visceris, & vasorum principia aortis esse videntur, est autem ipsarum par
unum. * Cæterum osculis singulis tres pelliculæ subornatæ sunt, rotundæ in sum-
mo, velut circulus semitectus. Et qui rei intelligentes sunt, admirantur, quomo-
do oscula, & aortarum fines cludunt. Et si quis uteris eximendi cor mortui
70 moris gnarus aliam auferat, aliam reclinat, neque aqua, neque status immisus in
cor penetrarit, atque hæc magis in sinistri ventriculi osculi exactius, & merito sa-
ne subordinate sunt. Mens enim hominis in sinistro ventriculo insita est, & reli-
quæ animæ imperat. Nutritur autem neque cibus, neque potibus à ventre, sed pu-
75 ri & illius substantia ex sanguinis discretionem nata. Adsumit autem alimentum
ex proxima sanguinis cisterna radios suos eo immittens, & depascens, velut ex
ventre intestinorum alimentum non naturæ exstat. Quo vero non in mora sit,
qui in arteria est in fluctuatione constitutus cibus, viam in ipsam concludit. * Magna
enim arteria ventrem depascitur ac intestina, plenaque est alimento non principali,
Quod

Quod autem non nutritur sanguine apparente, & quem videmus, arteria ipsa magna, ex hoc manifestum existit, Mactato enim animali, & sinistro ventriculo dissecto, tota desolata apparet, modico seroso humore excepto, flavaque bile, ac pelliculis, de quibus jam mihi dictum est. Arteria autem altera sanguine non est destituta, neque ventriculus dexter. Hoc quidem igitur vas causa fuit, mea sane sententia, ut pellicula producerentur. Id vero, quod ex dextro fertur ventriculo, etiam ipsum quidem commissura pellicularum clauditur, verum non valde saltim imbecillitate. * Sed aperitur quidem in pulmonis vasa, sanguinem exhibens ipsis in alimentum: clauditur autem in cor, non ramen confestim, quo ingreditur quidem aer, non autem multus. Debilis enim est hic calor, frigiditatis facilitate superatus, Sanguis enim non est natura calidus, neque enim alia aliqua aqua, sed calefcit: multis autem videtur natura calidus esse, Et de corde sane talia dicta sint. 90

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE GLANDULIS.

Argumentum in Librum sequentem,

- 1 De Glandularum natura, & substantia. Glandula venas habent. In Glandulis oleosus humor. Glandula non valde per se, sed cum reliquo corpore egrotant. Glandulae fluxionibus maxime sunt obnoxia. Febris ex glandularum copiosa fluxione.
- 2 De duplici glandularum genere, ac usu. Glandulae corporis humiditatem suscipiunt, Glandularum alimentum, & in corpore situs. Glandulae, & pili eadem utilitate participant. Pili ex glandulis nascuntur, & auferunt. Quibus corporibus neque glandulae, neque pili insunt. Item qua glandulae, & pili, & qua glandulae tenentur habeant. Glandula inguinum.
- 3 De ceteris partibus, qua glandulas tantum habent, & earum glandulae intestinum depilet existant. Glandulae intestinum maiores.
- 4 Glandulae renum, etiam maiores, quam aliis partibus. Glandulas alias prater commemoratas esse in corpore.
- 5 De tota glandularum colla natura. Tonsilla. Carni humiditatem ex reliquo corpore complectitur. Corpus vaporis omnis generis in caput retro retrahit. Carni humores quando retineat. Glandula quando, & a quibus fluxionibus infestetur, & a quibus non.

- 6 Strumatum pessimi colli morbi generatio unde, Alarum tubercula unde. Inguinum humor, ac inflammatio. Glandulae intestinum unde. Intestinorum humiditas morbus non facit.
- 7 Glandulae capitis sunt ipsum cerebrum. Cerebri substantia glandularum substantia similis. Capillorum in capite ob cerebri multitudinem, maior esse copia. Cerebrum ob sui magnitudinem morbos maiores, & minores aliis partibus facit.
- 8 De capitis fluxionibus. Capitis fluxiones secundum naturam tres sunt, prater naturam quatuor. Ex fluxionibus intra corpus abeuntibus abscessus ex abscessibus morbi.
- 9 Apoplexia generatio. Lippitudo generatio. Capitis per aures fluxiones. Capitis fluxio pituitosa per palatum in ventrem.
- 10 Polvuli generatio, & tabis. Ex capitis fluxionibus per veras in spinalem medullam morbi. Cerebri affectiones prater jam commemoratas esse plures.
- 11 De glandulis in pectore. Glandula pectoris mamma dicitur, & quibusdam lat facit, quibusdam non. Viri cui lat non faciant. Glandula pectoris in viris cui mamma non sunt, Mulierum corpora laxa, ac mollia.
- 12 Mammarum tubercula, ac inflammationes. Atulieres quomodo post mammam ablatam esse. Ex mammarum ablatione suffocatio consequitur.

DE GLANDULARUM tota natura sic habet. Natura ipsis est spongiosa. Sunt enim taræ, & pingues, & neque carnes sunt reliquo corpori similes, neque aliud quid simile corpori. Sed friabiles sunt, & venas multas habent. Si vero diffices, sanguis largus erumpit, specie albus, & velut prurita. Tangenti autem velut lanæ apparent. Et si multa vi ipsis digitis compressis, glandula humorem oleosum remittit, qui & ipse congeritur ut plurimum, ac disperit. Egrotant autem non valde, sed una cum reliquo corpore. Quum vero proprio morbo egrotant: nam parum etiam cum reliquo corpore egrotant: morbi tubercula sunt, & strumæ resiliunt, & febris corpus occupat. Perpetiuntur autem hæc, ubi humiditate repleta fuerint, ex reliquo corpore in ipsas influente. Influxit autem ex reliquo corpore per venas, quæ per ipsas extenæ sunt multæ & cavæ, ut humor, quemcumque tandem traxerint, facile in ipsas sequatur. Et si multa ac morbosa fuerit fluxio, glandulae reliquum corpus in se distendunt, atque sic febris incenditur, & elevatur ac inflammantur glandulae. * Cæterum glandulae in corpore sunt plures: sive majores, in cavis ipsius partibus, quam in articulis, & quæcumque in aliis

- liis humectis, ac sanguinolentis locis consistunt; atque illæ quidem, ut quod superne in cavas partes influit, suscipientes in se trahant; hæ vero ut rursus nascentem præ laboribus humiditatem in articulis, si quam articuli remittant, ejus multitudinem susceperint: & sic nimia humectatio in corpore non inest. Nam si etiam quid gignatur humiditatis, non statim nimia humectatio inde successerit. Reflectitur enim, & consumitur tum multa, tum modica in ipsas glandulas, atque sic reliqui corporis redundantiam glandulæ sibi lucrifaciunt, & alimentum, hoc est ipsis coalescens. Quare ubi cænosæ partes sunt, & humectæ, ibi etiam glandulæ. Cujus signum est. Quod ubi est glandula, ibi etiam pili. Natura enim facit glandulas, & pilos, utraque eadem utilitate participant: illas quidem, ut quod influit, velut antea dictum est, suscipiant. Pili vero ex glandulis opportunitatem habentes nascuntur, & auferunt, colligentes id, quod in extremitates redundat, ac effervescit. Ubi autem corpus succum est, neque glandula, neque pilus inest. At vero teneræ, & exercitiis deditæ, & humectæ partes glandulosæ sunt, ac pilosæ. Glandulæ porro sunt ab utraque antrum parte juxta jugulares colli venas, & pili etiam ibidem. Item sub alis utrinque & glandulæ, & pili sunt. Inguina, & pubes similiter ut alæ, & glandulas, & pilos habent. Et hæ quidem cavæ corporis partes sunt, & ad humoris redundantiam expositæ. Nam & laborant hæ; & ex omnibus corporis partibus maxime moventur. * Reliquæ vero glandulas tantum habent, velut intestina. Habent enim & hæc glandulas in omentum majores: pilos autem non habent. Nam & in cænosis, ac humectis terræ locis, semen non nascitur, neque supra terram ascendere conatur; sed per redundantiam putrescit, ac suffocatur. Violat enim semen. Violat autem, & in intestinis copia, & multitudo humoris, & pilos nasci non sinit. Glandulæ autem in intestinis majores sunt, quam alibi in corpore, & pascuntur, humectationem nimiam ex intestinis exprimentes. Intestina vero ex valis in omentum suscipiunt, ac remittunt humiditatem. Omentum autem in glandulas distribuit. * Habent præterea etiam rhenes glandulas. Nam & hi multa humiditate exsatiantur. Majores vero etiam hac parte, quam alia glandulæ existunt. Influens enim humor in rhenes non imbibitur, sed perfluit usque in vesicam. Quare quicquid ejus lucrifaciunt de canalibus, hoc ad se trahunt. Sed & alia in corpore glandulæ sunt parvæ valde. Verum non volo hunc sermonem longius evagari perinittere. Nam earum, quæ alicuius momenti sunt gratia, hoc scriptum institutum est. Nunc itaque sermone progressum faciam, & dicam de rota natura glandularum colli. * Collum ab utraque sui parte hine, & hinc glandulas habet, & vocantur hæc glandulæ tonsillæ in hunc usum, atque utilitatem. Caput supra situm est, sursum cavum, ac rotundum existens, & humiditatem ex reliquo corpore complectens, & corpus simul vapores omnis generis sursum in caput demittit, quos caput rursus retro dimittit. Non enim immorari, ac manere potest id, quod influit, non habens, ubi sedem firmer: nisi facit caput agrotet; tunc enim non remittit; sed illuc retinet. Postquam vero attractionem remisit in glandulas, fluxio vergit, & nihil molestat, donec pauca, & moderata fluxio fuerit, & ipsæ glandulæ valide, ac potentes exstiterint. Si enim multa, & aeris influxerit, manseritque acris, & glutinosa, inflammatur, ac intumescit, & collum distenditur, atque sic ad aurem progreditur, & si quidem in utramque partem processerit, utraque auris: sin ad alteram, altera tantum agrotat. * Si autem pituitosa, & multa, ac lenta fuerit fluxio, etiam sic inflammatur, & inflammatio, quum stabilis humor existat, strumas pessimum colli morbum generat. In alas autem etiam tunc quid confluit. Sed ubi copiosi fuerint acres, & serosi humores, etiam sic in ipsis tubercula producantur. Sed & in inguinibus glandula a partibus supra sitis humiditatem trahit; sed ubi multitudo ejus occupaverit, inguina intumescunt, & suppurantur, ac inflammantur, similiter ut alæ, ac collum. Atque hæc sane tum bona, tum mala glandulæ exhibere videntur: & de his quidem hæc suffecerint. Porro intestina multam satietatem ex cibis, ac potibus habent, & præterea humiditatem sub cuticula habent. Sed & hæc rota reflectitur, ac consumitur in glandulas, similiter velut superior. Morbos autem non facit fere, quemadmodum in articulis contingit. Frequentes enim glandulæ & expasæ, ac non cavæ sunt, & altera alterius multitudine non muhum fruitur, & alias, si qua etiam plus habere velit, copiam ejus habere non potest. Sed quod in paucas, ac singulas confluit in articulis, id in multas hic dividitur, & æqualitas ipsis existit. * Caput etiam ipsum glandulas habet, cerebrum nimirum simile glandulæ. Est enim cerebrum album, ac friabile, quemadmodum etiam glandulæ. Et ob id in commoditatem capitis glandulas facit, & per relatas a me, cerebrum, auxilium ferens, humiditatem auferit, & in extremitates foras ablegat, per fluxiones ex magna parte. Majus autem est cerebrum, quam alia glandulæ, & capilli etiam majores, quam alii pili. Majus enim est cerebrum, & in amplo spatio in capite situm est. Facit autem morbos & minores, & majores, quam alia glandu-

- glandulæ : facit autem quum in infernas corporis partes redundantiæ, ac superfluitatem suam ablegarit. * Fluxiones porro de capite usque ad secretionem contingunt per aures secundum naturam, per oculos, per nares, atque hæc tres sunt, & aliæ per palatum in guttur, & in gulam, & aliæ per venas in medullam spinalem, & in sanguinem. Quæ omnes septem humero existunt, hæc fluxiones cerebri fordes, ac purgamenta discedentes existunt, & si non discesserint, morbus ipsi inde oboritur. Sic autem & reliquo corpori aliqui morbi accedunt, si intro abierint, ac discesserint hæc fluxiones, & non foras. Et rursus turbatio multa oboritur, si hiantes, ac affatus attrahat, & acrem quidem fluxionem cerebrum demittat, quæ influxiones corrodit, & exulcerat. Et si id, quod cerebro infuit, copiosum fuerit, fluxio descendens non desinet, donec multitudinem influentis exhauserit, atque sic id, quod infuit, foras demittens, & aliud suscipiens, ac semper in consimili statu consistens, & humores trahit, & morbos facit. Ambo autem magno radio, ac inolestia naturam frangunt, quæ si fuerit affecta, dolorosa afflictio existit. Affectiones enim naturæ sunt prædictæ fluxiones, & multitudinem moleste ferunt, & morium, ac rationem percipiunt ex eo, quod præter rationem, & non consuetum existit. * Cerebrum autem cladem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed si quidem rodatur, turbationem multam sustinet, & mens desipit, & cerebrum convellit, ac distrahit totum hominem, qui in seipso vocem non edit, ac suffocatur, & hæc affectio, sideratio, ac græce apoplexia appellatur. Aliquando vero acris quidem non est fluxio, sed copiosa in cerebrum irruens, ipsum affigit, & mens perturbatur, & homo circum ambulat, aliena cogitans, & aliena videns, perferens morbi mores, visus, risu, & peregrinis imaginationibus. Alia fluxio ad oculos, ophthalmia græcis, latine hippitudo appellatur, & oculi in ipsa intumescunt. Si vero ad nares defluxio fiat, arroduntur nares, & nihil aliud grave accedit, nam viæ ipsarum amplæ sunt, & sibi auxiliari possunt, insuperque non compactum est, quod ab ipsis discedit. At vero aures intortus quidem meatus, & angustus : cerebrum autem prope ipsum ipsis auribus appropinquat. Egrotans vero hoc morbo, plurima excernit, & auris a frequentiori fluxione per tempus vexatur, & pus graveolum effluit. Sic etiam fluxiones ad oculos foris conspiciuntur, & non lethales in totum. Si vero fluxio retro processerit per palatum, & in ventrem pituita pervenerit, fluunt quidem horum venæ : non autem egrotant. Si vero inferne maneat pituita, affectiones volvulosæ sunt diuturnæ. * Alius autem, si per palatum in guttur multa fluxio coningat, ut plurimum morbi tabis oriuntur : replentur enim pulmones pituita, atque ea ipsa pus fit id, quod pulmones excedit, & egroti non facile superstites manent, & mens medici, si bonus, & prudens est, ut plurimum causam intelligit. Alius morbus oritur ex defluxione capitis per venas in spinalem medullam. Inde autem in sacrum os impetum facit, quo medulla ipsa fluxione perditur, & in coxendicum acetabula, five juncturas deponit, & si tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo contabescit, & vivere non expetit. Statim enim scapulæ dolent, amboque pedes, ac crura consequuntur, & semper tandem pereunt multo tempore curari, atque sic deflorescit homo, ac moritur. Hæc mihi de fluxionibus capitis dicta sunt. Sunt autem affectiones cerebri etiam alii morbi, deliria, insanie, omnia periculosa, & ægrotat cerebrum, & aliæ glandulæ. Habet enim & dolorem, & alius congressus corporis hic contingit.
- 11 * Quin & glandulæ in pectoribus mammæ appellantur, & artoluntur, ac lac faciunt : aliquibus vero lac non faciunt. Et faciunt quidem lac mulieres : viri vero non faciunt. Mulieribus enim rara est glandularum natura, quemadmodum etiam reliquum corpus rarum habent, & alimentum, quod in se trahunt, in lac permutant. Et ab utero accedit ad mammas, quod post partum puero celsitum est in alimentum, quod ipsum sane exprimit, ac sursum mittit omentum, ac ad supernas partes ab ipso foetu coarctatum. Verum maribus locorum angustia, & corporis insuper densitas conducit ad hoc, ut glandulæ non sine magnæ. Mas enim plenus est, & velut pallium densius tum ad visum, tum ad tactum : foemina vero rara, & laxa, & velut fluida tum ad visum, tum ad tactum. Quare humiditatem non remittit id, quod est rarum, & molle. Mas autem non amplius quid eius susceperit, quum densius existat, ac coherens, & compactus, sed & labor corpus ipsius corroborat, ut non sit locus, ubi redundancia, ac superfluitates recipiat. Atque hoc modo cogit, ac concludit hæc ratio, & pectora, & manus, & reliquum corpus mulieribus laxa, ac mollia esse, tum ob ocium, ac segnitiam, tum ob alia prædicta. Viris autem vice versa. * Porro faciunt etiam mammæ tubercula, ac inflammationes, lac ipsum putrefaciennes. Commoda autem habent superioribus similia, & reliqui corporis redundanciam auferunt : testimonium abunde præbent mulieres, quibus morbus, aut alia quædam caluitas mammas adimit. Nam & vox ipsarum aspera redditur, & humores in gulam feruntur, & multo sputo vexantur, & caput dolent, & ab his ægrotant. Lac enim proficiens, ac influens ab utero, quemadmodum etiam antea in superna vasa transibat, quum propria vasa non habeat, nec reperiat, utpote ipsis per mammarum ademptionem privatum, in principales corporis partes incurrit, cor videlicet, ac pulmonem, atque sic suffocantur.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE OSSIUM NATURA MOCHLICUS,

idest Vectarius.

Argumentum in Librum sequentem,

- 1 Digitorum ossa, & articuli simplicia sunt: Manus autem, & pedis multa alia, alioque modo coarticulata. Celsitudo unum. Tibie consideratio.
- 2 De femore. Coxa, De Spina natura, De Malleulis lumborum, Cervicis articulus repandus est.
- 3 De Verticulis, Verticulorum coartulationis consideratio. Celsitudo coartulationis consideratio. De Pelliculis ossibus. Clavicularem naturam.
- 4 De humero, De Stapedibus, Scapularum curatio facilis. De Brachio, seu cubito.
- 5 De ossium humani corporis numero. Ossa manus viginti septem sunt, pedis vigintiquatuor. Collis usque ad magnum ventriculum septem: Lumbi quinque: Spinae viginti: Capitis una cum oculorum ossibus octo: Ossium in universum 91. cum unguibus vero centum, & undecim. Verticula supra claviculam una cum magna septem.
- 6 De Semine, & renum venis. Petus per sanctes, ac galam via. Hepatis extremitates quinque, De Felle sita, Cor pellicula est involutum. Intestina hominis crassa, quam in tape sunt majora, Mellecoloni. Rentes ex nervis dependent, Asterionum cor sens est.
- 7 Venarum magnarum (quarundam) in corpore situs. Nervorum exortus ab accipitis.
- 8 De venis in renem tendentibus. Renem constituit. Rentes ventriculos habent. Rentes urinam percolant. Renum corpus ad vesicam spongiforme. Urinae tur rubra.
- 9 De venis circa costas. De clavicularum venis.
- 10 De Vena sanguinea.
- 11 De vena crassa. De Venarum crassissimam quatuor partibus. Primum par.
- 12 Dorso, ac coxendites dolent, vena scissio a popliteis, & malleulis forisfecus est facienda. Secundum par. Sphagmites, seu jugulares. In lumborum, ac testium doloribus vena scissio a popliteis, ac malleulis intrinsecus facienda. Tertium par. Quartum par.
- 13 De Venis ventris, per quas torpori alimen-

tum venit. De Vena scissione in diversarum partium affectionibus. Vena scissio quem longissime a loco dolente, & ubi namque sanguis tolligi solet, facienda.

- 14 De Hepatis venis, carumque distributione.
- 15 De septo transverso, eiusque positione, & venis id ipsum transcurrentibus, tum illi inascentibus.
- 16 De Nervis, qui ex cerebri substantia propagantur.
- 17 Ossium, Nervorum, Carnis, Venarum, Cutis substantia usque, Venarum germina inde dependent, & quo corporis parte desinunt, & quod uis his consentit, & in quibus locis corporis sint extensa.
- 18 Vena crassa altera aures. Linguae venarum processus. Vena humeralis. Vena humeralis sanguinea est, & plena, & agere turatur, si romptatur, aut convellatur.
- 19 De vena principali, que cordi inserta, venam magnam, & arteriam asperam producit. Quare inserta in pulmonis viam delata, non educantur. Callosorum in pulmone duritiam causa.
- 20 Spirandi diffcultas inde, Anhelationum, & tabis secca generatio. Snopurati, ac tabidi inde. Quomodo vena principalis pulmonem, & partes vicinas cernit. Vena sub septem transversum extensa qualis. Vena in spinalem medullam tendentes.
- 21 Vena omnes in corpus distributa, ex omnibus partibus finem petunt. Vena principalis in renem radices suas agit. Vena crassa in talem, seu potendum transit.
- 22 Vena potendum transiens in viris, in mulieribus in utero tendunt. Vena hac cur geminura, ac spiritu referta, eiusque substantia. Seminis collectio ubi fiat.
- 23 Polypus ex cute inde. De Vena per dorsum, & jugulum iuxta spinam sparsa.
- 24 De Vena iuxta ungula processu.
- 25 Ex Vena iuxta patella partem carum dolent. bilis, feroci, ac sanasi humoris collectio.
- 26 De duabus venis inter duas latas extremitates.
- 27 Vena ex sinistris partibus, in reliquis iuxta eandem naturam, velut ea, que in dextris radices agit, prater quam quod hepatis non infertur. Vena splenis. Scelus maxime circa thoracem.
- 28 Colorum in vultu mutationes non de fiant.



SSIIUM natura hæc est. Digitorum quidem ossa, ac articuli simplicia sunt. Manus autem, & pedis multa alia alio modo coarticulata. Maxima vero suprema parte. Calcanei vero unum, velut extra apparet. Ad ipsum autem posteriores tendens tendunt. Tibie vero duo sunt, quæ superne, ac inferne coherent. Juxta medium vero distant. Parvum est, quod extrinsecus est, juxta parvum digitum paulo tenuius. Phirimum autem hac parte distant, & minore momento juxta genu: & tendo ex ipso enascitur, qui circa popliteum foris est. Habent autem inferne communem appendicem, ad quam pes movetur.

vetur. Aliam vero superne habent appendicem, in qua femoris articulus moveretur 10
 simpliciter, & expedire in longitudinem, specie nodosa patellam habens. * Iptum autem
 tenet semur foras, & in anteriore parte incurvum est. Caput autem eius appendix est ro-
 tunda, ex qua nervus, qui in coxæ acetabulo est, nascitur. Subobliquus autem etiam hic
 annexus est, minus vero quam brachium. Coxa vero magno verticillo, quod iux-
 ta os sacrum est, ex ligamento chartilagineo ac nervoso adhæret. Spina vero 15
 a sacro osse usque ad magnum verticillum gibbosa est, & vesica, & genitura, & recti
 intestini pars inclinata in hac parte est. Inde vero usque quo ad septum transver-
 sum pervenit, in directum repanda est, & muscoli lumbares hac parte existunt.
 Hinc vero usque ad magnum verticillum, quod supra supernas humeri partes est,
 e directo gibbosa est. Immo magis esse videtur quam est. Nam posteriores os-
 sum propagines hac parte altissimæ sunt. Cervicis autem articulus repandus est. 20
 * Verticula vero intrinsecus inter se æqualia sunt; ab externis autem chartilagini-
 bus, ac nervis continentur. Coarticulatio vero ipsorum in posteriore medullæ
 spinalis parte est. A posteriore autem parte exortum acutum habent, qui appen-
 dicem habent chartilaginofam, unde nervorum propago prona fertur: quemadmo- 25
 dum etiam muscoli a cervice ad lumbos adnascuntur, costarum, ac spinæ medi-
 um explentes. Costæ vero iuxta discriminationes verticulorum, nervo anne-
 xæ sunt, a cervice usque ad lumbos intrinsecus. Ab anteriore autem parte iuxta
 pectus laxam, ac mollem summam partem habentes, specie præ cunctis animalibus
 maxime obtorta. Hac enim parte angustissimam molem homo habet. Qua 30
 vero parte costæ non sunt, exortus obliquus, brevis, & latus ad singula verticu-
 la nervo annexus est. At vero pectus coherens ipsum sibi ipsi discrimina-
 tiones habet obliquas, qua parte costæ annexæ sunt. Laxum autem est, & chartilagi-
 neum; clavicularæ vero rotundæ sunt ad anteriorem partem, ad pectus quidem bre-
 ves motus habentes; ad summum vero humerum frequentiores. * Summus au- 35
 tem humerus ex scapulis nascitur, in plerisque dissimiliter. Scapula ad spinam
 chartilaginea est, reliqua parte laxa, inæqualem partem foras habens: cervicem
 vero, & acetabulum habet chartilagineum, ex quo costæ motum habent. Facile
 autem ut inter ossa exolvitur, brachio excepto. Huius autem caput ex nervo ex
 acetabulo dependet, chartilaginosis laxæ rotundam appendicem habens. Ipsum ve- 40
 ro brachium incurvum foras, & anteriore parte obliquum, non rectum est ad
 acetabulum. Pars vero ad cubiti gibbum lata est, & nodosa, & repagulo similis,
 & solida, posteriore parte cava, in qua cornix inest ex cubito, quum manus fue-
 rit extensa. Ad hanc etiam torpidus nervus, qui ex cubiti ossum discrimina-
 tione media nascitur, perficitur, ac terminatur. * Ossa manus viginti septem sunt, 45
 pedis viginti quatuor. Colli usque ad magnum verticillum septem, lumbi quinque,
 spinæ viginti, capitis una cum oculorum ossibus octo. In universum nonaginta
 unum: cum ungulibus vero centum ac undecim. Cæterum ut nos ipsi ex homi-
 nis ossibus didicimus, verticula supra claviculam una cum magno septem sunt.
 Iuxta costas autem tot, quot costæ sunt, duodecim videlicet; iuxta laterum molli- 50
 tudinem vero totiescenti ubi coxendices in lumbis quinque. * Semen porro ve-
 lur favius ab utraque vesicæ parte est. Ex ipsis autem rhenibus venæ ab utraque
 meatus urinae parte, in pudendum tendunt; Potius per fauces, ac gulam; larynx
 enim, qui caput arteriæ est, in pulmonem, ac arteriam tendit: ab his in summam
 vesicam. Hepatis extremitates quinque sunt: super quarta autem extremitate
 fel incumbit, quod osculum ad septum transversum, & cor, ac pulmonem profert. 55
 Circum cor pellicula est. Intestina crassa homo majora, quam canis habet, & depen-
 dent autem ex Mesenterii membrana, quæ Mesocolon hac parte vocatur; Mesocolon
 autem ex nervis de spina sub ventrem. Rhenes ex nervis de spina. * Arteriæ
 fons cognatus cor est. Vena tendit per septum transversum, hepar, splenem, 60
 rhenes, ad coxendicem, circa suram ad summum pedem. Altera autem ex corde
 sub alas, clavicular, jugula, caput, nasum, frontem, iuxta aures, humeros, dor-
 sum, pectus, ventrem, per cubitum. Aliæ vero per alias ad cubitum, ad summam
 manum. Nervorum exortus ab occipitio usque ad spinam, ad coxendicem, in pu-
 denda, in femora, pedes, tibias, in manus, Alii in brachia, partim in carnes, 65
 partim ad fibulum in magnam digitum, partim ex carnibus in alios digitos, Alii
 ad scapulas, pectus, ventrem, ossa, ligamenta. A pudendo vero ad princeps intesti-
 num, ac podicem, acetabula coxarum, partim supra femur, partim infra ad ge-
 nua. Inde alius ad genua extensus ad tendinem, pernam, pedes; alius ad fibulum,
 8 alius in rhenes. * Ipsæ porro venæ in utraque partem bisariam maxime finduntur, par-
 tim ab una utriusque rhenis parte, partim ab altera: & perforatæ sunt in rhenes.
 Habent autem cordis formam ipsi rhenes, Nam etiam ipsi ventriculos habent.
 At vero Rhen cavam sui partem ad venas magnas habens situs est. Unde enascuntur
 ex ipso venæ in vesicam, qua parte potius trahitur per venas in rhenes, &
 per ipsi intestina, per quæ procedit. Denique vero velut per qualium, per rhenes 75
 aqua percolatur. Spongiforme enim est ipsorum corpus ad vesicam, & hic percola-
 tur, ac feceritur a sanguine urina, quapropter etiam rubra existit. Neque enim
 in rhenes aliæ procedunt venæ, quam quæ dictæ sunt, neque est alius locus, ubi po-
 tuit

- una existat, a corde quidem in locum quemdam in sinistris magis existens, de-
inde infra arteriam, donec consumatur, & perveniat eo, ubi hepatitis elevata est;
priusquam autem eo venit, iuxta extremas duas costas bifida fit, & altera pars hinc, 150
altera inde ad vertebrae progressa consumitur. Altera vero recta a corde ad clavi-
culas tendens, supra arteriam est, & ab hac (quemadmodum & ea, quae juxta lum-
bum infra arteriam est) in hepar exiit, partim in portas, & extremitatem, partim
in reliquum consequenter procedit paulo infra septum transversum. Septum au-
tem transversum hepatis adnatum est, ut non facile separari possit. * Duplices autem 155
venae a claviculis, alterae hinc, alterae inde, sub pectus ad pubem, ac pectinem
tendant, quo veto inde, nondum novi. Septum veto transversum juxta verti-
culum infra costas ea parte, qua ibi ex arteria conjungitur. Arteriae vero ex thene
oriuntur hinc, & hinc ab arteria nervum habentes. Ex hac parte in recurren-
te a corde hepatitis desinit. Ab hepatitis vero per septum transversum maxime
duae, altera hinc, altera inde sublimes feruntur. Multifidae autem per septum sunt,
& circum ipsum innascuntur. Verum supra septum haec magis conspicuae sunt. 160
- 16 * Duo autem crassi nervi, & cerebro sub os magni verticuli superne, & magis
ad gulam, ab utraque arteriae parte uterque progrediens, inter se committuntur, ut
uni similes existant. Deinde verticula, ac septum transversum hic sunt ubi desin-
unt. Ex quidam dubii, ad hepar, & splenem ab hac societate tendere ipsos, puta-
verunt. Alius nervus utrinque ex verticulis juxta claviculam ad spinam tendit, ex
obliquo verticulorum, & se in costas ingerit; atque hi quemadmodum venae per se-
ptum transversum ad mesenterium mihi tendere videntur: ubi autem haec desinunt,
rursus hinc, ubi septum exoritur, ab eo continui, ac cohaerentes existentes, juxta 165
medium infra arteriam, de caetero ad verticula se ingerunt, quemadmodum venae,
donec totum sacrum os pergressi consumuntur. * Ossa corpori stabilitatem, & re-
ctitudinem, ac speciem exhibent. Nervi flexionem, & contractionem, ac disten-
sionem. Carnes, & cutis omnium colligationem, ac constructionem. Venae
per corpus diffusae spiritum, & fluxum, ac motum exhibent, ab una multae germi-
nae, atque haec una, unde oritur, & ubi desinat, non scio. Circulo enim facti
principium non invenitur. Caeterum rami ac geminae ipsius, unde pendeant, &
quae parte corporis desinant, & quod una his consentit, & in quibus locis corpo-
ris exercentur sunt, ego declarabo. Circa caput juxta medium ex obliquo circum-
fusa est vena lata, & tenuis, non multi sanguinis. In cerebro enim juxta commu-
nitas multae tenues venulae radices egerunt, & circum totum caput extentae sunt,
usque ad frontem, ac tempora. Ipsa autem in rectum extenditur retro caput sinis-
terius juxta spinam cutem: inde vero circa externam, ac internam venam ex his, quae
in jugulis sunt, demittitur. * Ultra aures autem submissa a gena forissecus tendit cras-
sa. Ab hac in linguam multae, & rēnuēs procedunt, excepta ea, quae sub linguam, 185
& sub maxillares dentes fertur. Ipsa autem crassa per claviculam descendit sub scapu-
las: & hac parte ab ipsa germinat per nervum subter summam humeri partem,
sive cuticulam. Vena humeralis appellata. Ipsa autem sanguisuga est, & sanguine ple-
na, & aegre curatur, si rumpatur, aut convellatur. Ab altera enim parte nervus latus
ipsam ambit, ab altera cartilago: medium vero locum ipsa tenet, & pellicula spu- 190
mosa. Quum igitur locus non sit carnosus, facile rumpitur, & carnem circum nasci
non contingit, & si sanguis in hanc partem subtercurrat, nactus spatiosum locum non
discedit, sed induratur. Induratus autem morbum, & dolorum exhibet. Atque hac
quidem finit, ubi prius dixi. Illa vero sub scapulas germina emittit sub mammam
densam, & tenuiorem, ac varie implicatarum inter se venularum, & per humeralem
venam, praetergrediens cartilaginem, ipsam subter subattingens ad brachium ten-
dit, musculum in sinistram habens. Dextra autem ipsa finditur circa humerum, &
cubiti supernam partem. Inde vero cubitum utrumque penetrans, postea manus jun-
cturam, inde autem defluens per totam manum varie vagans radices agit.
- 19 * Caeterum principalis vena juxta spinam parva, per dorsum, & jugulum, 200
guttur, in cor inferitur, & de seipsa venam magnam multorum osculorum in corde
producit: inde vero in os procedens, fistulam facit, quae sane arteria appellatur,
per pulmonem transiens, pauci sanguinis, ac multi spiritus existens. Propter spa-
tiositatem enim, ac raritatem visceris, multis locis per pulmonem derivatur; caetera
vero cartilaginosa facta est. Quapropter sane etiam si quid in has vias pulmonis
delatum fuerit ex inluetis, vel in potu, vel in spiritu, ac sanguinis transitu, 205
utpote venis talibus existentibus, & viscere spongiformi, ac multum humorem
ficipere potente, & sursum procedente: tum humorum ingressorum lex constitui-
ta est, tum sanguis amplius per has venas non multum continetur, neque multum
constringitur, & non cito procedens, illabentia non educit. Ipsis autem non sube-
ductis, sed intus manentibus, callosa concrevit durities. Sic autem destruitur ali-
menti accessio, ac ingessio, quum hac parte arteriae capitis accessus ad externas
partes existat. * Invencepis vero transibitis per callosam duritiem, velocitas, ac dif-
ficultas spirandi oboritur, quum neque emittere, neque attrahere spiritum facile pos-
sint. Ex hujusmodi autem tales morbi fiunt, velut sunt anhelationes, & ta-
bes sicca. Si vero humor amplior in ipsis consistens prevaluerit, ut crassifac- 215
t.

- spissari non possit, & pulmonem putrem facit, & vicinas ipsi partes, suntque sup-
 purati, ac tabidi. Fiunt autem isti morbi etiam ob alias causas. Inde porro
 hac vena pulmonem occupat, & per extremitates duas magnas intro conver-
 120 sas, sub septum transversum extensa est ad spinam, alba, ac nervosa venulis per
 reliquum condensatum corpus spargens: hinc autem per verticula densis venulis in
 spinalem medullam inseritur, ac instar hederæ implicatur. * Et alæ quidem venar
 in corpus distribuitur ex omnibus partibus ad spinam tendentes, unaqueque quod
 tenuissimum, ac fincissimum est, colligens hinc eructat. Hæc vero velut præles im-
 225 posita per demissas plicationes in idem cogit. Inde vero etiam in rhenes radi-
 ces agit, tenuibus, ac fibrosis venulis iuxta spinam costam: hinc autem tendens con-
 densatur, posteaque etiam nervosa fit ad princeps intestinum ac podicem, comprensi-
 que musculos adstrictorios ipsi inseritur. In vesicam etiam, & testes, ac aditus ra-
 dices agit, multiplicibus implicatis, tenuibusque, ac solidis, & fibrosis venis. Inde
 130 vero crassissima, ac rectissima ipsius pars rursus conversa in caulem transit, hoc
 est pudendum. In reflexu autem in illa ipsa adspicitur. Et per pectinem supra sub-
 ter eum ventris, & ipsius venæ, procedunt venæ ad eas, quæ deorsum tendunt,
 quæ in seipsas mutuo derivantur. Penetrant autem & per pudendam venæ crassæ,
 & tenues, & densæ, & curvæ. * At vero in foeminis illa ipsa in uteros tendit,
 235 & in vesicam, ac urinae meatum: hinc autem recta procedit, & mulieribus quidem
 circa uteros pendet, masculis vero circa testes disseminatur. Ob hanc autem
 naturam ipsa vena etiam plurima fecunda, ac genitalia concipit. A plurimis en-
 nim, ac fincissimis partibus connutrita, paucique sanguinis existens, ac cava, &
 densa instar urvi, ac spiritu referta, intentaque a pudendo, demissas ad spinam ve-
 240 nulas cogit: hæc vero velut eucurbita medicinali in seipsas coactæ, omnia in su-
 pernam venam emittunt. Constitit autem & ex aliis corporis partibus in hanc,
 verum multo maxima pars velut dictum est, de medulla hac colligitur. * Vo-
 245 luptas vero accedit, vena hac genitalia explera. Quum igitur solet reliquo rem-
 pore modici sanguinis, ac multi spiritus esse repleta, & calefacta, & semine de-
 onsum condense, ea, quæ in seipsa habet, costringit. Spiritus autem in ipsa exi-
 stens, & præfens violentia, & caliditas, & venarum undique concitatio, trillatio-
 nem inducit. Illa autem, quæ a seipsa germinavit, per dorsum, & lumbum iuxta spi-
 nam sparsa, multis venulis costas intertextit, & verticula per carnes alternatim con-
 densat, ut & probe nutrita, & sanguine plena existat. Ipsa autem iuxta coxendicem
 250 ac nates meat, per musculum sub femore submersa: a natibus vero iuxta acetabu-
 lum femoris iuxta caput in venam perforata est, quæ femori respirationem exhi-
 bet: trans semur autem iuxta flexuram ad genu. * Alteram vero iuxta inguina de-
 mittit frequentibus radiibus, & agit transuentem. Hæc vero per musculum ten-
 dens, & circa genu disseminatur, & per ossis tibialis summitatem venam de se in-
 255 fistulam cavat, quæ medullam nutrit, & derivatur per infimam tibiam iuxta pe-
 dis illigationem, ac connexionem. Ipsa autem per parallam genu ad internam per tibiæ
 musculum submersa extenditur, & per malleolum implicatur intus crassa, & san-
 guine plena, atque hæc circa malleolum, & tendinem, venas agere cognobiles produ-
 cit, ac involvit. Ipsa vero infra ad pedem, sub summum pedem decurrit, & hic se im-
 plectens, & in magnum digitum innuens, duplicem sanguine refertam venam super-
 260 ne sub cutem ex summo pede refertit, & apparet sane crassifecta iuxta externam
 malleoli partem, ac sursum spargitur iuxta oppositum tibiæ radii. Iuxta suram
 autem, velut fundem facit. Inde extenditur iuxta internam genu partem. * Immit-
 tit etiam patellæ venas, & iuxta internam patellæ partem, quæ cava est, venam im-
 plicat, quam si quis doleat, celerrime biliosum, serosum, ac saniosum humorem col-
 265 ligat: procedit autem ipsa iuxta internam genu cavitatem. Distribuit etiam de se in po-
 plices multas implicatas venas. Quæ inde tendentes iuxta nervos sub femore,
 radices agunt in testes, & in rectum intestinum, ac podicem, & circa os sacrum at-
 tenuatæ unitæ circumdantur. Illa vero procedens iuxta internam genu cavitatem,
 270 sursum iuxta internam femoris partem in inguinem transit, & per coxendicem ul-
 tra ad spinam, & lumbum foras veniens, crassa, & lata, ac sanguine plena sursum por-
 rigitur ad hepar, & ubi biddam produxit sanguine refertam venam, dextram he-
 pars extremitatem ad rhenem occupat. Rursus vero subter hepar dispersa in ve-
 nam crassam finditur. Fissa vero in crassitudinem hepatis inseritur, & altera qui-
 275 dem ipsius pars in superficie visceris extat, in qua etiam est sel, habetque multas ra-
 dices instar arborum, ac plicationum per hepar dispersas: altera vero pars per inter-
 nas ipsius partes derivatur. * Dux autem venæ inter duas latas extremitates
 explicantur, & una quidem per vertices, ac cutem penetrans ex umbilico effertur.
 Altera vero premens spinam, in rhenem, ac vesicam, & pudendum, velut an-
 280 coris lætis inseritur. Verum ex coxendice incipiens ascendere ad pubem, multas
 vagabundas producit venas, & costas, ac verticula ad spinam illigat, & propa-
 gines suas multipliciter per venas transmittit, & intestina, ac ventrem involvit, Et
 alia quidem a pube ad mammas, & supra mentum, & summos humeros exporrecta
 285 divagantur. Alia vero procedens iuxta crassitudinem hepatis, ubi sel in fistulam
 coegit, sursum sub spinam dispergitur, per septum transversum scire factu.

- 27 * Cæterum vena ex sinistris partibus, in reliquis quidem juxta eandem naturam, velut ea, quæ in dextris, radices agit. Verum ex sinistris emergens in hepar non se ingerit, sed in splenem inferitur juxta caput, quod in crassitudine ipsius consistit. Inde vero internas splenis partes subit, ipsasque venulis sanguinolentis instat aranearum telæ intetere. Hic vero totus ex omento elevatur, venulis ex se ipso sanguine plenum ipsum reddens. Quæ vero a capite splenis ad spinas accedunt, per septima transeunt penetrant: Inde vero sursum & dextra, & sinistra sub pulmonem extenduntur. Quæ autem sanguine plenæ sunt, sub ipsum, & in ipsum corvantur. Quæ vero pauci sanguinis, & tenues a pulmone interius procedentes, qui natura raris existit, utpote ab ipso emulsi, in cor frenantur circa aurículas ipsius, & in cavitatibus internis dissolunt. Ingerunt autem & priores in ipsum. Etenim in angustis transitus itum est, velut ex omni corpore habonas habens. Quapropter ex omni corpore maxime circa thoracem sensus existit. * Colonum quoque mutationes corde adstringente venas, ac laxante sunt. Laxante quidem igitur rubicundi colores sunt, & bene colorati, ac pellucidi, 300 constringente vero, virides cum pallore, & lividi. Verum tales evariant juxta præsentis in quoquoque colores.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE LOCIS IN HOMINE.

Argumentum in Libris sequentem.

- 1 Corporis principium nullum, sed omnia similiter principium, & omnia sunt. Morborum in toto corpore principium nullum. Corpora sicciora morbus magis recipere, ac magis dolere a natura, atque in eiusmodi corporibus esse languissimos.
- 2 Partes corporis singula, alia aliis quomodo morbus faciat. Quomodo ex effluvio moderata impedita morbi fiant.
- 3 In curandis morbus, morborum causæ quomodo tollende. Corpus sibi ipsi esse simile, ac ex isdem componi. Corporis minima aliqua parte affecta, cum totum corpus affici contingat. Medicinæ artis principium.
- 4 Auditus, Olfactus, Visus ratio.
- 5 Visus unde natiatur, & qua ratione extinguatur. Oculorum membræ tres, & quomodo ex his lesimorbi fiant. Cerebri membræ duæ.
- 6 De venarum ex capite distributione. Vena a capite ad nasum. Vena temporales. Vena temporales sole sanguine non irrigantur, Vena temporales cur sole pulsantur.
- 7 Visus unde turbetur. Vena aurium. Vena in renes, ac testes descendentes. Sanguinem mittere qui soleant. Vena humerales. Vena alia a vertice juxta aures.
- 8 Vena caræ distributio. Venarum sessio qua hominem inscendunt facit. Vena splenis. Vena utriusque manus a vena caræ procedunt. Venarum communicatio.
- 9 Venarum, quæ nervorum morbi leviores. Natura venis in humore est, in caribus. Nervorum substantia, eorumque in corpore similes. Nervorum morbi curati difficiles. Nervis qui morbi familiares. Nervis prement articulos, & per totum corpus sunt extrati. Nervis in quibus robusti, & crassi. Circa faciem, & caput non sunt nervi, sed fibrae.
- 10 De Sutura capitis, & quod alia tres, alia quatuor habent. Sutarum multitudo ad sanitatem utilis. De Periculis, Cæle sepe.
- 11 De Claviculis. De Scapulis.
- 12 De cubito, seu manu. Digitorum articulus sicut effluvia quæcumque inter se committuntur.
- 13 De Coxenditis, verticulis, qui accepta diguntur. De Femore. De Tibiæ. Abole, seu petella mortis.
- 14 In pedibus, & in manibus articularum multi. Offium, & articularum idem nomen. Adhuc in articulis. Articuli pro morbi qualitate vel sani sunt, vel aegrotant.
- 14 Claudicatio quomodo & modo in articulis fiat. De Tribus fluxionibus, fluxiones. Fluxiones propter frigoris, & caliditatem.
- 16 Fluxio omnis caliditas seu venarum, omneque eadem sunt.
- 17 Fluxiones aliquando sunt peribis infernis sunt, superis vero humilis.
- 18 De capitis septem fluxionibus. Fluxiones cur frequenter in thoracem sunt. Latitudine cur affligantur, qui a bilis fluxione inferantur. Supporati, & tabidi ex bilis in thoracem fluxione. Fluxio in medullam talis occulta generatio. Fluxiones in vertebra, & carnes nota. Hydrog a capitis fluxione ad vertebra, & carnes.
- 19 Coxenditis, & articularum ex fluxionibus affectus.
- 20 De Pituita in naves fluxione. De fluxione in aures. Auris fluxiones quomodo curantur.
- 21 De vertis in oculis fluxionibus, eorumque curatio. Oculi post fluxionem statim inflammantur. In oculorum fluxione velut lapilli subtercurrentes. Fluxio lenta cum pruritu.
- 22 Caput, & oculus purgentia medicamenta. Fluxus mucosi a carne, & esse ad oculos emat.

Hipp. Opera.

E 2

ema-

- curatio. Fluxus menses ad oculos nota, & curatio.
- 23 Capitis in fluxu mucoso ad oculos secunda ratio. Humoris in visum, seu humorum quorum fluxus curatio.
- 24 De fluxione capitis in thoracem biliosa, nota. Peripneumonia, pleuritidis generatio a capitis fluxione biliosa.
- 25 Peripneumonia morbus periculosus. Suppurati ex peripneumonia, aut pleuritide, non moriuntur.
- 26 Suppuratio quibus de causis contingat. Suppuratio ab ulcere levior. Suppuratio, aliquando extra pulmonem abrupta, & carne confusa. Pulmonis acria.
- 27 Tussis, & profluvium in pulmone in tabidis unde.
- 28 Suppurati quomodo cognoscantur.
- 29 De capitis fluxione in spinam nota. Bilis fluxio periculosa, si illi in oculis accedat. Altera quomodo in oculis cognoscatur.
- 30 Pleuritidis curatio. Actum mollem, aut actum, & aqua in pleuritide.
- 31 Suppurati quomodo caput purgandum. Tabiderum curatio.
- 32 De fluxione per galam in ventrem, & eius curatio.
- 33 Quomodo ex fluxione retro ad vertebrae, & spinam medullae hydrops contingat, & eius curatio. Fluxione ad loca vicina derivanda.
- 34 De coxendicem dolore a fluxione capitis.
- 35 Febilis ex fluxione retrosum curatio. Lactis infusum. De splene anfractu. Splen ex infusum stercoris, & corpus epistaxis curatio.
- 36 Crurum circa umbilicum, & in ipso utrumque in splene florescente. De puri hydropici curatio.
- 37 De Pleuritidis sicca circa fluxum curatio. Pulmo rursus laevis, & quando gracilescit.
- 38 Febrem a bile, & pituita conclusorem generatio, & curatio. Pharmacum huius datus in febribus recentibus, praesquam in quartanis.
- 39 Febrenti cibum non offerendus, neque sobrietate solum cibum datus. Febrentium potus. Gracilis, ac macilentus a febre utrum quomodo cibandus, & curandus. Ex Cauterio in febrentibus potio.
- 40 De illeri, sive regii morbi curatio. Cucumeris sive ostreus radix in balneo illerico-vum. Medicamentis huius ducuntur in illero non utendum.
- 41 De ulceribus feridis curatio, & generatio.
- 42 De Angina, seu Cynanche generatione, & curatio. Quod morbi a principio curandi.
- 43 De Capitis fracturis, earumque curatio. Ossium capitis periculosa fissura.
- 44 Febreantibus caput non purgandum. Pharmacum purgativa callescent. Alia bilis vomitus in valentia laetitia. Tenuis exilis, & de repente subsidens ab evacuatione decenter moritur. Ulcuscula in debilibus rumpentia laetitia. Ulcuscula livida in debilibus enata, mortale.
- 45 A medicamentis potius egrotantes quando curandi. Bilis fluxus spontaneus difficiliter sedatur. Vomitus in visum non sedatur. Sanguis morbum faciens, dolorem, & pituita mephorum gravitatem facit.
- 46 Morbi incogniti quomodo aggrediendi. Morbi in agrotis fortibus & debilibus autem morbus, & contra, quomodo curandi. Gymnastica Medicina contraria.
- 47 Ulcerum, & quaecumque supra corpus eminent, curatio. Fluxione a capite fluvium vomitus educit. Astringi morbi recentibus difficiliter curantur. Ulceris callosi curatio. Pharmacorum tumefacientium, & attenuantium usus. Ulcerum nondum maturarum confusio.
- 48 Tristes, anxiosus, & si strangulere volentes manducata radix sanat. Convulsione curatur. Febria a convulsione, & a ruptura. Diffinitio manuum, & pedum infanum facit.
- 49 Pena utendi vario. Pena pericula sanguinem non emittit. Sanguis e vena fluxus quomodo augetur. Coarctata diductis difficiliter curantur. Dolores in capite curatio.
- 50 Medicina studium longe difficilissimum. Adhucamentorum facultate non semper ex sua natura assequenda.
- 51 Natura in singulis permixta, ac corrupta, dolores facit. Contraria contrariis curantur. Stimula morbus faciens, ad easdem sedatur. Tussis, & urina stillicidium.
- 52 Vomitus quomodo per vomitum sedatur. Adhucamentorum exhibendorum ratio diversa. Corporis debilitas quomodo contingat.
- 53 Calida usus quatenus conducit. Corpus transmutatum parum efficit, ac potius est. Occasio in Medicina precepti est. Item que Medico sunt consocienda.
- 54 Ex cibis suppurati neque morbi, neque contrarietas sit ex his, quae offeruntur. Adhucamenta omnia praesentem statum transmovent.
- 55 Adhucamenta fortia, & debilia pro egrotorum viribus sunt exhibenda. Vacuationis modus a figura partis afflicta.
- 56 Aluum subducendum. Sanguinolenta calida. Aluum silicentia. Flatus satietas.
- 57 Acida etiam pituitosa. Aluum subducendum. Repletionem facientia maxime pituitosa. Medicina coarsius, ac firma fortior non eget. Fortius fuisse iuris. Scientia imperata facere cogitur, & facile ab imperitis assequitur.
- 58 Medicina fortuna non est opus. Morborum medicamenta manifestia, ac clara esse. Fortuna ex Medicina, aut alia quapiam arte non pellenda. De Merbis malebribus.
- 59 Uteri omnium morborum causa. Menses quando non prodeant.
- 60 Menstruum fluxus infra descendens, & sursum ascendens. Coxendicem, & capitis dolores. Coxendicem, inguinum, & capitis doloris, ex impletis ac timidis meris curatio. Uteri descensus curatio.

61 Uteri ascensus evasio. Uterum averforam

vota.

62 Glandulas subilitatis fortes ad uteroformandi modum. Uteri ofculum humore plenum, ac tumidum. Uterus in anteriorem partem

adversus procedens.

63 Fluxus mulieris nimis quomodo sistendus. Coloris menstruum ratio. Menstrua juniorum, & seniorum in quo differant.

SECTIO I.



III quidem videtur principium corporis nullum esse, sed omnia 1 similiter principium, & omnia finis. Circulo enim scripto principium non reperitur. Similiter etiam morborum in toto corpore. Quod enim liccius est, morbos magis recipere, ac magis dolere a natura solet. Humidum vero minus. Morbus 3 enim, qui in sicco est, stabilitur, & non cessat. Qui vero in humido dissit, & alias aliam corporis partem occupat, & sem-

per transmigrans requiem facit, & citius quoque sedatur, utpote non stabilis.

* Corporis autem singulae partes alteri, ubi hinc, aut illinc processerit, morbum statim facit, venter capiti, caput carnibus, ac ventri, & reliquæ omnes juxta eamdem rationem, quemadmodum venter capiti, & caput carnibus, ac ventri. Etenim quum venter egestionem moderatam non fecerit, & in ipsum cibum ingeratur, humiditate ciborum ingestorum corpus irrigat, Ipsa autem humiditas a ventre obstructa, a-cervatim ad caput viam facit, & ubi ad caput pervenerit, a vasis in capite non recepta, fluit quocumque contigerit, & circum circa caput, & in cerebrum per os tenue, 13 & partim quidem os ipsum subit, partim vero circum cerebrum per os tenue. Et si quidem in ventrem rursus pervenerit, ventri morbum inducit. Si vero ad aliam aliquam partem inebuerit, illi ipsi morbum facit. Ita etiam reliquæ partes altera alteri morbum inducit.

* Et optimum fuerit sic curare ægrotos per has, quæ morbos faciunt. Sic enim quam optime principium ægrotantis quis sanaverit. Corpus poro ipsum sibi ipsi idem, ac simile est, & ex iisdem compositum est. Similiter autem habet & parvas, & magnas partes, itemque infernas, ac supernas. Et si quis minimam corporis partem acceptam male afficere velit, totum corpus affectionem sentiet, qualisicumque tandem ea fuerit: propterea quod minima corporis pars omnia habet quascumque & maxima. Insuper quicquid tandem minima pars pertulerit, ad gentilitatem refert, ac transfert, unaquaque ad suam, sive bonum, sive malum id fuerit: & propterea corpus & dolet, & letatur cum minima gente, quia in minima omnes insunt partes, & hæc ad gentiles sibi ipsi singula transferunt, & omnia denunciant.

* Cæterum natura corporis principium sermonis in arte medicæ primum perforata est, qua parte audimus. Etenim vacua eicem circa aures, non aliud inaudimus, quam strepitum, & clamorem. Quicquid autem per membranam in cerebrum pervenerit, id liquido, & clare auditur. Ob id etiam foramen solum per membranam circum cerebrum extantam est. In nares autem non inest foramen, verum molli laxitas velut spongia, & propterea per longiorem distantiam audit, quam olfacit, odor enim ab olfactu longe dispergitur. * Et in oculis venulæ tenues ad visum ex cerebro per ambientem membranam feruntur. Hæ autem venulæ visum alunt humore de cerebro purissimo, qui etiam in oculis apparet. Eadem venæ etiam visum extinguunt, ubi fuerint exsiccata. Membranz autem tres sunt, quæ oculos custodiunt. Superna quidem crassior, media tenuior, tertia tenuis, quæ humorem conservat. Ex his superna, & crassissima, si lædatur, ac mutiletur, morbos facit. Media vero etiam ipsa periculosa est, & ubi rupta fuerit, prominet foras, velut vesica. Tertia autem tenuissima omnino periculosa est, quæ humorem conservat. Membranz cerebri duæ sunt, altera superna crassior, altera tenuis cerebrum attingens, non amplius eadem permanens, postquam fuerit vulnerata.

* Venæ autem transeunt ad verticem per carnem venientes ad ossiculunt feruntur, & per carnem duæ ex vertice rectæ, qua parte supercilia clauduntur, & desinunt ad angulos oculorum. Una autem a vertice ad nasum fertur, & in utramque nasi cartilaginem finditur. Aliæ vero duæ venæ juxta tempora feruntur in medio temporum, & aurium, quæ premunt oculos, & semper pulsant. Solæ enim hæc ex venis sanguine non rigantur, sed avertitur ex ipsis sanguis. Qui autem a vertitur, insulenti occurrit, & qui quidem avertitur volens discedere: qui vero superne insulit, volens infra procedere, hic impelluntur, ac diffunduntur, ac multo circumagitantur, & pulsum venis exhibent. * Visus humore de cerebro nutritur, quum autem quid eius de venis acceperit, fluxione turbatur, & humor ipse non apparet, & ob oculos moveri ipsi videntur aliquando, velut avicularum imagines, aliquando velut leutes nigræ, & nihil exacte juxta rei veritatem videre potest. Aliæ duæ venæ in medio aurium, & aliarum venarum, quæ feruntur ad aures, & premunt aures. Aliæ duæ venæ ex ossis conchione in aures feruntur. Quardam vero infra ad corpus convertuntur: duæ quidem venæ juxta tendines colli feruntur, & juxta verticula, & desinunt in rhenes: hæc autem etiam in testes penetrant, & quum hæc affectæ fuerint, homo sanguinem mingit. Aliæ duæ venæ a vertice ad humeros feruntur, & sane humerales vocantur.

- tur. Aliæ duæ venæ a vertice iuxta aures, ab anteriore colli parte utrinque ad cavam appellatam venam seruntur. Cava autem vena finitur quidem velut gula: consistit autem inter gulam, & guttur, sive arteriam, ferturque per septum transversum, & per cor, & inter septum, & finditur ad inguina, & ad femora intro, & dispartiones in semioribus facit, & ad tibia intus fertur ad malleolos. Hæ & insequendum faciunt hominem, quam fuerint sectæ, & in magnos digitos desinunt. Ex cava autem vena producitur quidam in sinistram manum: fertur autem subter
- 70 splenem ad sinistri lateris mollitudinem, unde splen propagatur per omentum, & finem foritur ad thoracem. Producitur autem iuxta septum, & cum humerali committitur subter cubiti articulum, atque hæc splenis gratia secatur. Aliæ etiam ad dextram manum eodem modo a cava productæ. Communicant autem omnes venæ, & confluunt inter se mutuo, & aliæ quidem sibi ipsis per se committuntur, ac
- 75 concidunt: aliæ vero per ventilas a venis extantas. Quæ autem carnes nutriunt, ea parte inter se confluunt. Et quicumque morbus a venis oritur, levior est, quam qui nervis: diffusus enim una cum humore, qui in venis inest, & non quiescit. Et natura venis in humore est, in carnibus. Nervi autem siccis sunt, & ventriculos, sive cavitates non habent, & ad ossa consistunt, & maxima ex parte ab ossibus nutriuntur.
- 80 Nutriuntur & a carnibus, & colore, ac robur inter ossa, ac carniem medium habent, & humidiores quidem sunt, ac carnosiores, quam ossa: sicciores autem, ac magis ossi, quam carnes. Quicumque autem morbus in ipsos pervenerit, laboratur, & quiescit in eodem loco, & difficile est ipsum educere. Maxime vero impetunt ipsos distensiones, & alii morbi, a quibus tremor corpus occupat, & qui tremere ipsum faciunt.
- 85 Nervi autem premunt articulos, extantique sunt per totum corpus. Robusti autem maxime, & semper crassissimi sunt in illis corporis partibus, in quibus paucissima carnes sunt. Et corpus quidem omne nervis plenum est. Verum circa faciem, & caput non sunt nervi, sed fibræ coniformes nervis inter ossa, & carnes, tenuiores, & solidiores. Capita sursum habent, alia tres, alia quatuor: & quæ quidem quatuor habent, his sunt utrinque iuxta aures, & tertia ab anteriore, quarta a posteriore capitis parte. Sic quidem in capite quod quatuor habet, in eo vero, quod
- 90 tres, iuxta aures utrinque sunt, & ab anteriore parte tertia. Posteriore vero parte futura nulla est, velut in eo, quod quatuor habet. Seniores autem capite sunt, qui plures futuras habent. Inter supercilia os descendit, ac transit, & mandibularum clausura in medio mento, & superne ad caput est. Verticula alii plura, alii pauciora habent. Qui pauciora habent, his duodeviginti sunt, horum alia sursum ad caput, alia deorsum ad sedem tendunt. Collæ septem a posteriore corporis parte ad verticula connectuntur, anteriore parte in pectore inter se committuntur.
- 95 Claviculæ articulos habent, alios in medio pectoris iuxta guttur, atque hic coarticulatae sunt: alios vero ad humeros reclinatos ad scapulas, qui humeris semper adherent. Scapulae vero ad membra brachii, sive rotius manus coarticulantur, incumbentes in ipsum os, quod in membro est. Iuxta os autem appendices duæ prodeunt, altera intrinsecus, altera forinsecus, quæ ad scapulas ossi adnascuntur, infra coarticulatae sunt. Quæ vero in cubiti flexura sunt, infra quidem radio coarticulatae sunt, iuxta os natura cavum existens: supra autem radium paululum, in cubiti gibbum, & tunc cum os, cum radius in idem commissæ, articulum in cubiti gibbo faciunt. Iuxta ulnam vero appendices prodeunt, tenues valde quatuor, duæ sursum, duæ deorsum, & ad cubiti gibbum quidem duæ appendices consistentes, supra ex osse hærent, hæc cum osse coherentes, iuxta ossis articulum in cubiti gibbum coarticulantur. Quæ vero infra fibræ sunt, & minus reclinatae, hæc utraque
- 100 committuntur ad radium ex superius a membro procedentem, & intus ad membrum coarticulantur, & radium appellatum faciunt hæc sibi ipsis intus in cubito commissæ. Infra autem ad manum os articulum habet. Appendices vero hac parte tenetæ existentes: duæ quidem non exeunt in articulum. Superna autem, & inferna cum osse coarticulantur ad manum. Cæterum manus articulos multos habent. Quicumque enim ossa inter se committuntur, omnia articulos faciunt. Digni articulos habent multos, unusquisque tres. Unum ad unguem, in medio unguis, & nodosæ prominentiæ, alterum in ipsa nodosa prominentia, qua parte etiam digitos consistunt. Tertium quoque parvo digitus a manu exoritur. Ad vero in coxendicibus articuli duo sunt, quæ acetabula appellantur, & femora in hos articula sunt.
- 105 Iuxta femora autem appendices duæ protenduntur, altera intus, altera foris, & in articulum neutra procedit, neque ab altera parte, sed ad os ad semur inferuntur. Femur autem superne, ubi in acetabulum ingruit, bifidum est huiusmodi bicipitate. In ea quidem parte, quæ intro inclinata est, in summitate rotundum est, & leve, quæ etiam in acetabulum ingreditur. Altera autem bicipitatis pars exterior magis foras prominet, & inferius apparet ad nates, & coxendix appellatur. Ad genu vero os femoris ralius biceps est. Bicipio autem huius os tibia appellatur, velut in cardine adscriptum est, supra adaptatum autem mola, sive parella incubuit, quæ humiditatem a carne in articulum expansum descendere prohibet. Iuxta tibia autem ap-
- 110 pendices duæ procedunt, quæ inferne ad malleolos pedis finiunt, superne ad genu non autem perveniunt ad articulum. Ad pedem vero tibia iuxta malleolos articulum habet, & alium infra malleolos. Et in pedibus articuli multi, quemadmodum & in man-

nibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli, & in digitis pedum eodem numero sunt, ac pari modo habent. Articuli insuper multi in corpore parvi sunt, non similiter omnibus, sed alii aliis. Hi autem, qui scripti hic sunt, omnibus simpliciter habent. Aliæ etiam venæ aliis sunt, sed non memorabiles. Mucus omnibus a natura est, & quum hic puris fuerit, articuli sani sunt, & bene moveri possunt, utpote lubrici inter seipsos. Labor autem, & dolor fit, ubi a carne humiditas fluxerit vitiosa. Primum enim articulus stabilitur. Non enim lubrica est humiditas, quæ de carne influxit. Deinde ut multa, & valde sparsa, & ex carne non irrigata, semper reficatur, & ut multa existens, & articulo ipsam non capiente, effluit: & male stabilita elevat nervos, quibus articulus colligatur, ipsosque inconnexos, ac dissolutos facit: & propterea claudi fiunt, quum hoc magis sit, magis: quum minus, minus.

15 * In ventrem porro ea, quæ comeduntur, ac bibuntur, procedunt. Ex ventre autem fibræ in vesicam, qua parte humore percolat, extant sunt. Fluxiones autem, & perfrigerata valde carne, & percalfacta sunt, ac superinflammata. Fluxiones propter frigus fiunt, quum caro in capite, & venæ tensæ fuerint. Hæ enim horrente carne, & ad angustias perveniente, adstrictæque, ac excludente, humiditatem exprimunt. Et simul carnes ipsæ contra exprimunt, ad angustias pervenientes: & capilli sursum erecti fiunt, utpote simul undiqueque fortiter compressi. Quicquid igitur inde expressum fuerit, id ipsum quocumque contigerit, fluit. Fluit autem etiam propter caliditatem, quum carnes rarefactæ transitus præbuerint, & humor calefactus tenuior redditus fuerit. Omnis enim humor calefactus tenuior fit, & omne cedens fluit. Maxime vero ubi valde fuerit inflammatum, propter hanc fluit causam.

16 * Carnes valde plenæ factæ, quum capere non possint, fluit humor, qui capi non potuit: fluit autem, quocumque contigerit. Ubi vero semel fluxit, hæc factæ fuerint fluxiones, diffiunt ad locum, quo tandem contigerit, donec transitus fluxionis compressi fuerint propter gracilitatem. Quum autem corpus fuerit refecatum, & aliqui corpus ipsum sibi ipsi communicans sit, etiam quum sicum est, ducit, & concepit, ac ducit, ubicumque humor tandem obigerit: ducere autem ipsum non difficile est, utpote corpore vacuo, & non intumescente præ gracilitate.

17 * Aliquando autem internæ partes sicæ fiunt: supernæ vero humidæ. Magis autem superna vasa humida sunt. Venæ enim plures supra sunt, quam infra, & carnes in capite minori humiditate opus habent. Ductæ itaque sicæ corporis pars humiditatem ex capite, & simul transitus magis ducendi parent, quam ei, quæ ducitur. Nam ipsi transitus, utpote sicci existentes, eam sibi lucifaciunt, & simul humores a natura deorsum procedere solent, si vel modica quedam necessitas contingat.

18 * Fluxiones de capite septem sunt in nares, in aures, in oculos, atque hæc ex capite fluxiones ob oculos conspicuæ existunt. Postquam autem in thoracem fluxerit præ frigore, bilis fit: Magis autem in thoracem præ frigore fluit, propterea quod facilis est fluxio ad guttur, utpote non contectum: præ frigore vero a bile infestati, propterea lassitudine affliguntur, quia carnes, quum bilem habuerint, non quiescent, sed concutiuntur, & concussæ laborant, ac desistantur, utpote velut in iecine faciendo concussæ, & suppurati fiunt, quum in thoracem fluxerit, itemque tabidi. Quum vero in medullam fluxio contigerit, tabes occulta ac inconspicua oboritur. Quum autem retro ad vertebra, & in carnes defluerit, hydrops fit. Id, quod ex hoc cognoscere datur. Sicæ enim anteriores partes sunt, caput videlicet, & nares, ac oculi: & oculis amplius hebetudo accedit, suntque cum virore pallidi, itemque reliquum corpus: & nihil expuit homo, etiam si multum fluat. Fluxus enim per mediam carnem retro fluens, & ab anteriore aversus, anteriores partes siccas facit: posteriorum vero carnem irrigat, & magis eam, quæ intus est ad ventrem, quam quæ foris est ad nasum. Et propterea corpus foris magis solidum est, quam intus, & angustiores meatus, ac foramina habet. Quare sane quam tenuia sint foramina constringuntur, ipsaque sibi ipsis medentur, & fluxus nullus hac transire potest. Intus vero foramina ampliora sunt, & intermedia tenuiora habent: fluxus vero, utpote ab altioribus procedens, & tenuia impediunt contra se habens, insluit, & carnes humiditate replet. Sed & humiditas a cibis in idem procedens corrumpitur: corrupta autem ipsa præ ammissione, & simul cum ipsa ea, quæ a capite defluit, corpus nutriunt. Carnes vero multo humore nutritæ, & morboso angelescentes, hydropes pleni sunt.

19 * Si autem modicus fluxus fuerit, coxendicum, & articulum diurnam affectionem facit, ubi finire cessaverit. Nam ut modicus, & undiqueque ab omnibus fortioribus depulsus, ad articulos refugium facit. Fiant præterea articulum, ac coxendicum affectiones, a talibus morbis sanatis, quum morbum quidem efficiens sanatur: in carne vero quid relictum fuerit, cui non sit exitus, neque rursus intro, neque foras, sed ad eum egressum tuberculumque fecerit: fugit autem in id, quod cedit, articulos videlicet, & aut articulum, aut coxendicum affectiones inducit.

20 * Si porro intumuerint nares, & pituita plenæ fuerint, atque ea compacta, oportet pituitam compactam, ac congelatam attenuare aut somentis, aut medicamento, & non avertere. Si enim fluxus aversus alio procedet, omnino maiorem morbum faciet. Quum vero in aures fluxerit, primum dolorem exhibet: violenter enim procedit: dolorem autem exhibet,

- donec in fistulam redactus fuerit. Ubi autem fluere consueverit, non amplius dolo-
rem facit. Et vero, quem dolor affligit, medicamentum natura calidum, tepidum fa-
ctum, & netopo dilutum infundendum est, & retro cucurbita medica affigenda, si
205 sinistra auris doluerit, ad dextram: sin dextra, ad sinistram: non autem scarificando
perfundere oportet, sed ut trahatur, solum finienda est. Si vero per hanc dolor non
sedetur, frigiditas a natura frigida infundatur, & medicamentum potandum
præbeat, quod secessum deorsum faciat: sursum autem non, quandoquidem
vomitus non auxiliatur, & de cætero frigidis utendum est, & semper non sanantem
210 variare oportet modum: & si quidem pejus reddiderit malum, ad contrarium te con-
verte: si vero ad sanitatem tendat, omnino nihil ab his, quæ adhibentur, auferre o-
portet, neque quicquam aliud addere, aut apponere: Si vero jam in fistulam reda-
ctus fuerit, & multa purulenta sanies fluxerit, quæ graveolens sit, sic facere o-
portet. Spongiam siccantem quopiam sicco medicamento imbuere, & in aurem quam
215 penitissime inde, & in nares purgatorium medicamentum mitte, quo ea, quæ prius
in aures fluebant, in nares ferantur, & non id, quod morbosum est, in caput rur-
sus recedat. * Cæterum tibi in oculis fluxio processerit, oculi inflammantur, at
aut fortissimo quam infime urito, aut alio quopiam alvum subducere medica-
mento attenuato, vitando ne vomitus facias. Si vero velut lapilli subtercurre-
rint, medicamentum illines, quod plurimam lachrymam ducere potest, & reli-
quum corpus humectabis, ac humidum facies, quo oculi humidiores fiant, ac colluantur,
225 ut lachrymam adstrictam, ac compactam decurrere facias. Quam autem in oculos
pusulum fluxerit, & prurium fecerit, sic affectum molli medicamento illines, quod
siccare potest, simulque modicam lachrymam ducere, & ad nares medicamentum ad-
hibebis, aut singulis diebus, aut alternis eodem utens. Sit autem tale medica-
mentum, quod non plus, quam acetabulum per nares deducat, & idque paulatim,
quod vero oculis adhibetur, resiccet, ut quod oculorum pharmacia resiccat, ac
230 obstruxerit, id ipsum ad nares feratur: Medicamenta caput purgantia, quæ
quidem fortia sunt, a toto capite ducant: quæ vero debilia, ab oculis, & hinc a
vicinis naso partibus. * Si autem a carne, & osse, mucus inter os, & carnem subsi-
stente, fluxus ad oculos fiat, ex hoc manifestum sit, quod inde profuit. Cutis
235 in capite compressa edit, & ulcera in capite enascuntur, & oculi lachryman-
tur, & palpebræ non exulcerantur, nec mordax est fluxus, nec visum hebetat,
sed homo ipse acutius videt. Fluxus enim non est falsus, utpote non de cere-
bro, sed magis mucosus: Hunc sic sanare oportet. Medicamento caput
purgandum est non forti, & corpus attenuandum & cibis, & medicamentis in-
fra corpus subducantibus, donec attenuato corpore fluxus resiccet, aut medica-
240 mento in nares indito emoveatur. Verum ad ipsos oculos nullum pharmaca-
mentum adhibendum est. * Si vero neque sic sanus fiat, caput secare, donec ad os per-
venierit, oportet, non superficialibus, neque transversis, aut obliquis fissuris, incu-
sis, usquequo ad os ipsum pertigeris: frequenter autem secare oportet, ut compa-
ctus humor citius prodeat per ulcera effluens, & simul ut frequentes sectio-
245 nes extensionem carnis ad os faciant. Sic mederi oportet, si huic hoc modo res
succeedat. Si vero hæc non commoda fuerint, & fluxus non eluitur, ut elutus
acutus cernere faciat, semper ab incumbente oculi magis splendescens sunt, &
acutus visus hominis extinguatur. Si in visum, in humorem perum cruen-
tus aliquis humor ingreditur, huic visus intra oculum non rotundus esse appa-
ret, propterea quod in quocumque inest cruentus humor, id ipsum non apparet; huic
250 itaque deficit, ut visus rotundus appareat, & ante oculos aliqua moveri ipsi viden-
tur, & nihil revera videt. Hujus venas visum prementes exurere oportet, quæ vi-
delicet semper pulsant, & inter aurem, ac tempora consistunt: & ibi has obturave-
ris, oculis pharmacia, quæ humectant, adhibe, & lachrymam quam plurimam prole-
255 sta, quod id, quod in oculis compactum est, & morbum facit, eluatur. Si vero oculus tum-
pat, mollibus medicamentis, & acerbis utendum est, ut ulcus adstrictum in angu-
stum coeat, & cucatrix tenuis fiat. Si autem adhuc humoribus plenus fuerit, lachry-
mare oculo conducit. * At vero quum in thoracem fluxerit, & bilis fuerit, ex
hoc manifestum sit. Dolor lateris molliitudinem occupat, & claviculam ejusdem
260 partis, & febris adest, & lingua superne pallida, ac viridis sit, & excreat compa-
cta. Hujus morbi periculum septima, aut nona die instat. Alia bilis. Quum
ambo latera doluerint: reliqua autem similia velut in priore fuerint. Hæc quidem
peripneumonia est; illa vero pleuritis. Hæc autem propterea sunt. Quum
in pulmonem fluxerit ex capite per guttur, & aortas appellatas appendentes
265 partes pulmonis, pulmo tamquam natura rarus, & siccus trahit in se humorem,
quantum ejus capere potest, & ubi influxerit, major fit: & ubi quidem in totum flu-
xerit, extremitas ejus major reddita utrumque latus contingit, & peripneumoniam
pulmonis appellatum morbum facit: quum vero alterum tantum, pleuritis, id est
costalis morbus sit. * Peripneumonia multo periculosior est, & dolores mul-
270 to fortiores sunt, qui ad laterum molliitudinem, & ad claviculas tendunt, & lingua

- multo viridior, ac pallidior, & fauces per fluxione dolens, & lassitudo fortis occupat, & spiritus sexta, aut septima die corripit. Hanc si non septima die febris dimiserit, moritur, aut suffocatur, aut utrumque. Si vero nona die, duabus diebus interpositis, corripiat, ut plurimum etiam hic aut moritur, aut suppuratus evadit. Si vero duodecima die, suppuratus fit. Si quarta & decima, sanus fit. Et quicumque per peripneumonia, aut pleuritide suppurati fuerint, non moriuntur, sed fa-
 26 ni fiunt. * Suppurati ut plurimum fiunt, quum fluxus in idem, velut in bile con-
 tingit: sed in bile quidem multum defluit, & ubi defluxit, sedatur. Suppuratis vo-
 ro minus defluit, & non sedatur. Fiunt etiam suppurati, quum minus excreant,
 quam influit in pulmonem. Hoc enim, quod in pulmone consistit, & quod influit, pus
 fit. Pus autem in pulmone, & in thorace consistens, ac congregatum ulcerat, & pe-
 28 trefacit, & postquam exulcerata fuerint, ab ulcerato influit, & quum excreat, ca-
 put simul concussum magis fluit, simulque ex ulcerato in thorace, ac pulmone ma-
 gis fluit, & nicera agitata refringuntur: ut etiam si fluxus a capite cesset, is, qui ab
 28 ipsius ulceribus venit, sufficiens sit morbum facere. Fit praeterea etiam ab ul-
 cere suppuratus, & levior hic morbus existit. Fit etiam extra pulmonem: maxi-
 mo quidem a ruptura, & ubi caro contusa fuerit, juxta hanc enim pus congrega-
 27 tur, & congregatum fluctuat, si quis corpus concutiat, & strepitum facit, & haec
 uruntur. * Tabes autem fit, quum in idem, velut in suppurato, fluxio fit per gut-
 tur, & appendentes pulmonis partes, appellatas aortas, quae pulmonem, & gut-
 tur continent, ac conjungunt. Fluit autem in pulmonem frequenter, & paulatim, &
 humiditatem in pulmone non multam facit. Resiccatus enim id, quod influit, &
 in gutture compactum, utpote quod non elinitur, sed paulatim influit, ac detinetur,
 tussim excitat, & in aortis id, quod influit detentum, utpote quum angusta forami-
 na aortae habeant, angustum spiritus locum exhibet, & talem spiritum habere fa-
 29 cit, qui velut defectus semper respirare concupiscit. Et in pulmone, velut non
 vehementer humido existente, prius contingit. Quum vero multum de capi-
 te fluxerit, pruritus in pulmone non fit. Multum enim fit, quod in ipsum influit,
 & suppurati ex his tabidis, sive phthysicis graece appellatis fiunt, ubi corpus humo-
 30 rum factum fuerit, & contra, ubi siccius fuerit factum, ex suppuratis tabidi
 28 * Suppurati hoc modo cognoscuntur. Lateris mollitudinem a principio dolor occu-
 pat, Quum vero jam pus collectum est, & dolor similiter habet, & tussis
 fit, & pus excreat, & spiritus corripit. Si vero quondam erumpit pus, in lateris mol-
 litudine conueitur, & velut in utriculo strepitum facit. Si vero horum nihil adit,
 suppuratus autem fit, ex his conjectare oportet. Spiritum multum habet, subrau-
 30 cusque loquitur, & pedes, ac genua intumescunt: magis autem ab ea lateris molli-
 tudinis parte, in qua pus est, & thorax concurrens est, & membrorum dissolutio
 fit, & sudor per totum corpus diffluit, & aliquando sibi ipsi videtur calidus esse, ali-
 quando frigidus, & ungues circumcrescenti sunt, & alvus calida fit. Ex his suppu-
 29 ratos cognoscere oportet. * Porro quum retro in spinam fluxio procciderit,
 haec tabes fit ejusmodi. Lumbos dolet, & anteriores capitis partes vaciae viden-
 tur ipsi esse. Bilis autem periculosa est, si icterus, sive regius morbus in oculis
 accedat, & in anguibz lividitas si fiat, & si corpus ulcera habeat, & par-
 tes circa ulcera lividae sint, & quum sudor non toto corpore erumpit, sed una
 31 aliqua corporis parte, & quum febre adhuc existente excreat ager pallidum viri-
 de, aut si dum adhuc in pulmone inest pallidum viride, excreatio cesset. Sic au-
 tem quum inest, & non inest, cognoscere oportet. Quum inest, in faucibus respira-
 tis strepit, & spiritus periculosus est, & singultus adest, & febris discedit, excrea-
 31 tio adhuc in pulmone harente, & alvus debili jam existenti feculentum fa-
 cit. Haec pleuritidis, & peripneumoniae periculosa indicia existunt.

SECTIO II.

- 1 * **C**eterum pleuritidem hoc modo curare oportet. Febris sedanda non est per septem
 dies. Potu utendum aut aceto mulso, aut aceto, & aqua: haec autem quam plu-
 rima offerre oportet, quo humectatio fiat, & aequae facta excretionem faciat, & dolor
 sedandus est calfactoris medicamentis, & absorbendum dandum est quicquid
 excretionem facit, & balneis utendum quarta die: quinta autem, & sexta oleum il-
 5 lincendum est. Septima lavandum est, si febris dimittere non velit, quo per balneo su-
 dor contingat. Insuperque & quinta, & sexta fortissimis utendum est excretoris
 medicamentis, quo septimam diem quam facillime transigat. Si vero neque septima
 die febris cesset, non cessabit, si non aliud quid periculosum accedat. Postquam
 autem febris dimiserit, sorbitiones quam debilissimae offerantur. Si vero evacua-
 10 tio oboritur, si quidem juvenile adhuc est corpus, potus auferendi sunt. Si vero
 febris dimisit, triacis sorbitionibus utaris. Et eodem modo peripneumonia curat-
 10 ur. * At vero suppuratis caput purgare oportet non fortibus medicamentis,
 sed paulatim avertere in nares, & simul edulis ventrem subducentibus uti. Et quum
 princi-

- 15 principium morbi nondum est, sed eo fluxus vertitur, ac vergit, excreationem facere, & tussim excitare, & medicamentis insulibilibus in nares uti, & cibis simul ingestis. Quum autem excreationem facere oportet, pluribus cibis, & salis, ac pinguibus utendum est, & vino austero, & quum sic habet tussis inducenda. Tabidos item eodem modo, quod ad reliqua attinet, curabis, præterquam quod
- 20 cibi non multi simul ingerendi sunt, & obsonia non plura, quam cibaria frumentacea, & vino inrer edendum utendum est aquoso, ut ne calefaciat, & corpori debili existenti caliditatem exhibeat, & simul ambo calefaciant in eodem tempore, & caliditate mukum fluxum inducant. * Quum porro per gulam fluxus in ventrem 32 processerit, morbus infra sit, aliquando etiam superne. Hinc si quidem in ventre dolor inerit, subducendum est primum medicamento, aut succo, deinde pharmaco fortiore utendum est: cibus vero alvum subducens, donec dolor perseveret. Ubi vero dolor sedetur, cibus validioribus utatur. Eodem modo, ubi morbus multos dies hæserit, curabis. Si vero debilis fuerit, & præ imbecillitate hæc offerri non possint: primum quidem prafane succo per clysterem infuso, alvus eluenda est; post ubi per hunc purgaris, aliquo ex adstringentium numero. * Quum 33 autem retro in carnem juxta vertebra fluxus illapsus hydropem fecerit, sic mederi oportet. Carcin collo inter venas cruritis tribus utatur, & ubi inseritis, constringatur, & cicatrices quam tenuissimæ inducantur, & ubi fluxum obturaris, medicamentum in nares adhibe, ut eo vertatur; & aliud rursus, donec avertatur, & anteriores quidem capitis partes calefacto: posteriores vero perfrigerato. Et postquam anterioribus capitibus partibus excalefactis fuerit, cibos edat quam pituitosissimos, ac minime ventrem subducentes, quo fluxionum meatus in anteriore capitis parte quam maxime dilatentur. Postea ubi obturaris, & averteris influxionem, si quid prius, quam curaris fluxum, in corpus pervenerit, sic mederi oportet. Si quidem 40 magis ad cutem fecerit, externis partibus fomentum adhibebis. Si vero intro ad ventrem: foris autem non conspicuum sit, medicamentum bibendum dabis. Si vero in utramque partem, ab utraque detrahes. Verum hoc studio habere oportet, ut proximum exitum facias sive inferne, sive superne, aut etiam alia aliqua corporis parte, ubi exitus sint. * Quum coxendicum morbus a fluxione fiat, cucurbitam 34 medicam affigere oportet, & foras trahere, & non scarificando perungere, & calefactis medicamentis in potu exhibitis intus calefacere, quo exitus fiat tum foras ad cutea per cucurbitæ tractionem, tum intus ad ventrem per caliditatem. Nam quum obturatus fuerit fluxus, & non habeat, quo iter faciat, viam ad articulos facit, & in id, quod cedit, influit, & sic coxendicum morbum inducit.
- 50 * Tabes ex fluxione retrorsum. Qui hac affectus est, ei caput est purgandum debili medicamento, donec fluxus avertatur: dieta autem utere, velut in tabe superiore. Medicamentum posandum præbe: elaterium deorsum purgans, & inferne alvum lacte infuso elue, de cætero fomentum utere. * Quum splen præ febre 36 magnus factus fuerit: sit autem, quum corpus attenuatur. Ex istdem enim, & splen florescit, & corpus contabescit. Quum autem corpus tenue fuerit, & splen floruerit, & omentum simul cum corpore attenuatum fuerit, pinguitudo in omento colloquescit. Ubi vero vasa pinguitudine vacua facta fuerint, & a splene florente, ac augescente in omentum defluerint, utpote vicinum valde existens, & ut vasa habens, eaque vacua excipit, & ubi morbus semel in corpore factus fuerit, ad id, quod est morbosum, vertitur, nisi quis probe disponat, ac curet. Nam etiam si quis bene tractet, periculo non vacat. Hunc sic sanare oportet. Medicamenta in potu exhibenda sunt, quæ aquam purgent; & edulia quam pituitosissima offerenda. Si vero neque sic levior fiat, inurenda sunt crustæ quam tenuissimæ, & quam maxime in superficiei, quo aquam continere possit, circum circaumbilicem, & una in umbilicum, & emittere singulis diebus. Quum enim morbus periculosissimus sit, in his periclitari oportet. Si enim successerit, sanum facies: sin minus, quod etiam alias futurum erat, id ipsum perpetitur. Cæterum in puero hydropem sic curare oportet. Partes tumidæ, & aqua plenæ aperiendæ sunt scalpello, & frequenter, ac parum educendum est. Educendum autem est a singulis corporis partibus, & fomentis utendum, & semper locum apertum; unde eduxeris, calefactorio medicamento illines. * Pleuritis sicca extra fluxum sit, quum pulmo valde exsiccatum fuerit præ siti necessaria. Pulmo enim natura siccus existens, ubi amplius quidquam pro natura siccatus fuerit, gracilis sit, & impotens redditus, & ad latus præ impotentia reclinatus, latus contingit, & postquam contigerit ipsum humidum existens, cohaeret, & adglutinetur, & pleuritidem, hoc est lateris morbum facit. Tunc vero & dolor fit in latere, et in clavicula, et febris, et albus excreat: hunc multis potibus curare oportet, et lavare, et doloris medicamentum præbere, et alia, quæ excreationem faciunt. Hic in septem diebus sanus fit, et morbus minime periculosus est, & cibos præbere non oportet. * Febres porro propterea fiunt, 38 quum corpore superinflammato carnes intumuerint, et pituita, ac bilis conclusa quieverit, et neque refrigeretur quicquam, neque exeat, neque moveatur, neque aliud quid subeat. Quum itaque lassitudo occuparit, et febris, ac repletio, lavare multa aqua oportet, et oleo illinere, et quam maxime calefacere, quo caliditas apertocor-

pore præ sudore egrediatur : consequenter autem hæc facienda sunt per tres, aut quatuor dies : & si non sedetur, ac cesset, pharmacium in potu exhibendum est, quod bilem educat, & febris perfrigeranda est, præterquam si quartana existat. Medicamentum tamen, donec corpus floridum est, ne propinato : non enim vacatur, nisi parum, utpote corpore turgente. Quum autem gracilis, ac macilentus fuerit, tunc bibendum exhibe, & evacuabitur. * Febricenti cibum ne offeras, neque forbitionibus subitis alvum ducas. In potu dabis aquam calidam, & aquam nullam, & acetum cum aqua : hæc autem quam plurima bibat. Si enim non frigidus ingressus fuerit potus calidus existens, ac manens, ex corpore agroti detrahet, & vel per urinam ejiciet, vel exsudabit. Undiquaque autem apertum, & respirans, ac motum corpus id, quod conducibile est, faciet. Quum vero gracilem existentem febris urat, manifestum est, quod non propter corporis tumorem febris occupet, & si non cesset, nutrire oportet, ac stimulum facere, & si neque sic conducatur, pilam est quod non oportuerit febrem inducere. Hunc itaque medicamentum potare oportet, quod educat, quia parte febris magis hæret, sive superne, sive inferne, & si quidem superne hæreat, superne, sin inferne, inferne. Nihil autem minus oportet etiam debiles fortia medicamenta potare, sed similiter : aut solum sic, ut fortibus quidem forte, debilibus vero debile exhibeas. Ardores vero portionibus, & forbitionibus, quemadmodum febrem frigefactorio medicamento exolvere oportet : cammaro videlicet, aut alio quopiam hujuscemodi : & si nauseam contrahat a frigefactorio, calefactoriis utere consequenter. Ubi vero non cesset, frigefactoriis rursus utere. * Iterum, sive regum morbum sic curare oportet. Quum susceperis, nutrita & balneis, & pinguescentibus, potibusque, ac cibis humectato per tres, aut quatuor dies. Postquam autem humectatum fuerit corpus, purgato, & reficito ipsum, pinguetudinemque derepente exhaurito, & undiquaque, si possibile sit, medicamentum adhibens, humiditatem educito : ad caput vero purgatoria debili utitor : & urinam cientia bibenda dato, & ea ante cibos hoc tempore, quo turbatam humiditatem purgaveris, in potu præbe, ne ab eo tempore corpus nutriatur. Quum vero attenuatum fuerit, etiam balneis purgato, & contula cucumeris sylvestris radice, & ea in aquam coniecta, inde lavato. Cæterum medicamenta bilem ducentia ne propinato, ne corpus magis conturbes. Ubi vero siccum fuerit id, quod conturbatum fuit, nutritio, nullo alvum subducente medicamento, neque urina ciente utens, sed vino vinoso, & his, quæ rubicundiores hominem faciunt. Si vero viridis, ac luteus sit, rursus exhaurito, nequaquam vero siccato, ut ne is color stabilis reddatur. * Ulcus serinum in corpore propterea venit. Postquam caro tumida, & inflammata circum circa fuerit, & margins ulceris magni extiterint, & ulcus ipsum humidum, & in ulcere sanies resiccata inerit, aut ulcus constrictum fuerit, Sanies computrescens ab ulcere defluens, foras prodire a constricto ad carnem ulcere prohibetur. Caro autem suscipit, utpote elevata existens ab inflammatione, & quum in ipsam pervenerit sanies subterfluens, putrefacit, & attollit. Hunc medicamentis humectantibus ipsum ulcus illinere oportet, ut ex humectato ulcere fluxus foras effluat, & non subter carnem. Insueta etiam in ulcus frigefacientibus pharmacis illinenda sunt, quo perfrigerata caro existat, & non dirupta rursus fluxione immittat. Sed & alia ulcera frigefacientibus oblinenda sunt, & super ipsa humectantia imponenda. * Angina, quam cynanchen græci vocant, a sanguine fit, quum sanguis in venis, quæ in collo sunt, compactus fuerit. Sic affectus a venis, quæ in brachiis sunt, sanguinem detrahes, & simul alvum inferne subduces, quo id, quod motum exhibet, detrahat. Lingua quoque, quum magnâ ulcera habuerit, similiter curanda est. Morbos a principio curare oportet, & si quidem a fluxionibus sunt, primum fluxiones sedare : si vero ab alia causa, principium morbi sedare, ac curare : deinde id, quod influxit, si quidem multum fuerit, educere, sin modicum, per dietam moderati, ac componere. * Capitis fractura. Si quidem os fractum fuerit ac contritum, periculo vacat, & curare oportet hunc humectantibus medicamentis. Si vero rumpatur, & fissura fiat, periculosum est. Hinc serratam adhibere oportet, ut in ossis scissuram sanies influens, membranam cerebri putrefaciat. Nam, ut per angulum intrans, non autem exiens, assilgit, & furere hominem facit. Huic itaque serratam adhibere oportet, ut sanies exitum habeat, non solum ingressum, ampla serratura facta. Medicamentis autem utendum, quæ humorem in se trahunt, & lavandum. * Febricitanti caput ne purgato, ut ne humilis fiat. Calefaciunt enim caput pharmaca purgativa, & fæce ad caliditatem febrilem accedens ea, quæ in medicamento est, insaniam facit. Ex quacumque causa male affligente quis atram bilem revomuerit, moritur, qui vulnus habet. Et qui ab evacuatione detinetur, & debilis est, & tenuis existens, derepente siccus subfidit, moritur. Quum a caliditate detento ulcuscula exasperit debili existente circum circa livida, moritur. Quum a morbo quopiam detento, debili jam existenti livida ulcuscula enata fuerint, mortale. * Quum quis a medicamenti potu superagrotarit, & inferne, & superne ab ipso secesserint, vinum sorbeat, primum quidem dilutum, deinde meracum frequenter, & sanabitur. Medicamentum autem neque evacuativum, neque vomitorium

- mitorium fumat. Bilis, ubi sua sponte eruperit aut iuferne, aut superne, difficil-
 ius sedatur. Quæ enim sponte procedit, præ violentia corpori facta impellitur. Si
 vero a medicamento fluat, non a gentilitatis cognatione violatur. Quum susce-
 155 peris vinosum, & vomentem, vomitum ne sedato. Vomitus enim evacuationem sed-
 dat: facilius autem vomitus postea sedabitur. Si vero debilis fuerit, qui hæc pati-
 tur, somnificum medicamentum a vomitu præbebis. Sanguis, quum morbum facit,
 dolorem exhibet; pituita autem gravitatem ut plurimum. * Morbum si quis non cogno-
 160 scat, medicamentum bibendum præbeat non forte. Si itaque levior inde fiat, demonstra-
 ta via est, quod gracilitatem inducendo curandus est. Si vero non levior reddatur, sed
 peius habeat, contraria facienda sunt. Si non profuerit gracilem facere, tumidum fa-
 cere conducet, & frequenter permutare, ita ut hoc consilio utaris. Si quis in mor-
 bis quid permutaturus est, forti quidem agrotò, debili autem morbo, tunc quidem
 165 confidenter fortiore quam morbus est, medicamento utendum est. Nam etiam si quid
 de sano abducatur una cum debili, ac agrotò, nullum detrimentum est. Si vero mor-
 bum fortiorem, agrotum autem debilem acceperis, debilibus pharmacis curabis, quæ ip-
 sum morbum superent, & abducant, verum agrotum nihilo debiliorem reddans. Ars
 exercitandi corpora, & Medicina contrariæ sunt. Ars enim exercendi corpora,
 170 gymnasticæ græcis appellata, non opus habet permutacione, sed Medicina. Sa-
 no enim non auxiliatur transmutatio ex præsentis statu, verum agrotò. * Morbi
 quicumque ulcera sunt, & super reliquum corpus eminent, eos simul cum medicamen-
 tis etiam fame curare oportet. Fluxione ex capite fluente vomitus conducit.
 Antiqui morbi difficiliter curantur quam recentes, verum morbos antiquos pri-
 175 mum recentes facere oportet. Ulcus callosum factum, ejecta primum duritia per
 putrefactorium medicamentum, constringere deinde oportet. Pharmaca, quæ tu-
 naefacere maxime solent, ea pura ulcera adstringunt; quæ vero attenuant, ea pur-
 gant. Si vero quis constringat ulcera nondum matura, corpus agrotum nutrit,
 quod ulcus habuerit. Et si quidem adstringere oporteat ulcus, ac implere, tumefa-
 180 cere prodest, etiam si in capite carnem velis. Renuitrita enim a cibus caro, pro-
 pulsatur eam, quæ a medicamento putrefacta est, & simul cum natura debellat. Ve-
 rum elevatam, aut levem carnem, cibus gracilem reddere oportet. * Tristes, anxios, &
 185 agrotos, ac se strangulare volentes, mandragoræ radice mane in potu data minore
 pondere, quam quod insanire facit, curabis. Convulsioni sic mederi oportet. Ignis
 ab utraque lætæ parte succendatur, & mandragoræ radix in potu præbeatur mino-
 re pondere, quam quod insaniam facit. Et ad tendines posteriores sacculi calidi im-
 ponantur. A convulsione si febris invaluerit, sedatur eadem die, aut sequenti, aut
 omnino tertia. A ruptura febris non corripit amplius quam tres, aut quatuor dies.
 Si vero corripiat, & quis putat se a ruptura habere, ab alia sane quapiam causa
 190 corripitur, & non oportet ipsam, velut a ruptura curare. Quum honio manibus
 ac pedibus dissentius, ac tortus fuerit, insaniam sibi ipsi facit. * Venam porro sic
 urere convenit commodam ad morbum, ex quocumque tandem quis agrotarit. Si is-
 tus fuerit homo, & fluxerit sanguis, ita ut hoc non periculum sit ipsi, aumbo
 hæc facere licet. Si vero percusseris ipsam in dolore, cuius gratia urebatur, non
 195 coalescit, utrum fluxui prodest. Si enim perusta fuerit, non fluit. Nam postquam
 perusta est, extremitas utraque venæ recurrit, quæ parte perusta est, & exarscit.
 Si vero quid relictum fuerit, præ relictò perfluente fluxum humectatur. At si
 sanguis ex vena fluit, per transversum peruratur. Si vero non cesset, ad hæc su-
 pra, ac infra utrinque dissecato, quo sanguinis fluxus avertatur. Diductum enim
 200 facilius est medicamento sedare, quam coarctatum. Doloris in capite gra-
 tia sanguinem de venis detrahito, si vero non sedetur, & durior sit, peru-
 rare venas, & sanus evadit. Si vero caput purgaveris, magis affliges. * Medi-
 cinam cito discere non est possibile, propterea quod impossibile est statim, ac
 certam doctrinam in ipsa fieri, velut verbi gratia, qui scribere didicit, iuxta u-
 205 num modum, quem omnes docent, novit, & scientes omnes similiter noverunt,
 propterea quod idem, & similiter factum, & nunc, & non nunc, non potest fi-
 eri contrarium, sed semper exacte simile est, & non opus habet occasione.
 Medicina vero & nunc, & statim non idem facit, & ad eundem contraria facit,
 & hæc etiam contraria sibi ipsis. Primum alvum subducentia non semper
 210 hoc faciunt, & alvum subducentia utrumque faciunt. Fortassis autem neque sic se
 habent alvum subducentia, velut alvum sistentibus contraria. Resistente enim
 alvo, propter vehementem stabilitatem corpus intumescit, pituita in ventrem
 perveniente, sic stabilitas fecessum facit. Ubi enim pituita in ventrem ingres-
 sa fuerit, evacuatio contingit. Insuper vero alvum subducentia ex natura, stabili-
 215 tatem faciunt in ventre, si quidem non subducentia feceris. Si autem exolvatur,
 & humectetur id, quod morbum facit, postquam exolutum fuerit, sanus evadit.
 Et sic ventrem sistentia, subducentibus stabilitatem ventris faciunt, & vicissim
 subducentia ventrem sistentibus. Eodem modo res se habet circa rubicun-
 dos, & pallidos. Nam & pituitosa, ac tumefactientia & pallidos faciunt, &
 220 boni coloris. Itemque attenuantia, utriusque autem medicamentum sunt contraria
 contrario, Verbi causa. Quum intumuerit pallidus existens, exolvitur sane à
 quod

- quod medicamentum attenuans adhibitum fuerit, atque hic tumentem attenuans opitularur. Rursum autem quod aliquando utilitatem cepit, nunc hic opitulanti opitulatur, quum sane ipse gracilitate decolor, & pallidus factus fuerit. Si quis enim pituitosum, ac tumefaciens medicamentum exhibuerit, pallor sedatur. 225
- 51 Insuper vero etiam dolor & propter frigiditatem fit, & propter caliditatem, & propter valde exuperans, & propter imminutum; & in perfrigeratis quidem natura extra corpus ad cutem propter calfaciens valde dolor fit, in calidis vero natura propter frigidum. Et in siccis natura, si humefcentur, & in humidis natura, si resiccantur. In singulis enim, quorum natura penituratur, ac corrumpitur, dolores fiunt. Sananturque dolores contrariis, idque etiam unicuique morbo proprium est. Nam in calidis natura propter frigiditatem agrotantibus, dolores calefiunt, & reliqua iuxta hanc rationem fiunt. Alius porro modus hic est, per similia morbus fit, & per similia adhibita ex morbo sanantur. Velut urinae stillicidium idem facit, si non sit, & si sit, idem sedat. Et tussis eodem modo, velut urinae stillicidium ab idem fit, & sedatur. Alius rursus modus hic est. Febris, quae propter tumefactionem ex pituita fit, aliquando quidem ab idem fit, & sedatur, aliquando autem a contrariis. Aliquando enim, si quis vult aqua calida lavare, & multum potum exhibere, sanus aeger fit, & febris, quae propter tumefactionem facta est, pituitosis, ac tumefactionem facientibus obstat, & adhibitis minuitur. Et si quis vult medicamentum bibendum dare, alvum subducens, & vomitorium, eodem modo & a facientibus sedatur, & a sedantibus fit. Nam si quis homini vorienti, aquam multam bibendam dare velit, eluentur ea, propter quae vomit una cum vomitu. Et sic quidem per vomitum vomitus sedatur. Rursum autem propterea quod sedatur, quia insecte procedere ipsi fecit, 245
- 52 fit. Et si quidem sic in omnibus haberet, stata sane ac certa medicina esset. Itaque alia quidem contrariis curare oportet, qualia tandem sint, & a qua causa sunt: alia vero similibus, qualia tandem sint, & a qua causa sunt. Huius autem rei causa corporis debilitas existit. Corpus enim a cibis aequalibus aequaliter nutritur: a corpore vero cibi superatur. Postquam vero plus, aut minus in ipsum ingestum est, aut alia quapiam transmutatio facta est, superatur, superant autem cibi. Et quum sane superatur corpus ab his, quae ipsi offeruntur, florere haec ipsa facit, & superant haec simul 250
- 53 corpus, & contraria ipsi faciunt. Et calida lavati, donec quidem corpus superat eius exhibitionem, floret corpus facit. Quum vero superatum fuerit, gracile corpus facit. Et convivari similiter, ut lavari facit. Haec enim, donec superantur, florere corpus faciunt. Ubi vero superaverint, & alvi secessus, & varia vitia inducunt. Quum autem id, quod offertur, transmutatur, necesse est, & id, cui offertur, transmutare. Etenim corpus transmutatum parum efficit, ac potens est, & ab omnibus offensiones percipit. Hoc autem faciunt & alvum subducuntia, & florere ipsum facientia, gra- 260
- 54 vissima non contrariissima. Occasio autem haec est, ut cibos offeramus ea copia, quam corpus, cui offeruntur, superare valeat. Nam si quis sic fecerit, omnino necesse est cibum alvum subducuntem oblatum, subducuntem esse, & pituitosum, pituitosum. Si igitur superaverit corpus ipsos cibos, neque morbus, neque contrarietas fit ex his, quae offeruntur, & haec est occasio, quam medicum nosse oportet. Quum vero occasionem supergressus fuerit, contrarium fit, & antequam ei excessum factum esse putant, 270
- consequens est, ut caleat. Donec enim corpus id, quod oblatum est, superaverit, corpus nutritur. Ubi vero hanc occasionem transmiserit, contrarium fit, & nam attenuatur, & gracilescit. Sed & alia omnia, & quae tumefaciunt, donec quidem superaverit corpus, ampliusque pro occasione offeruntur, etiam iuxta naturam suam singula faciunt, & pituitosa, si tumefaciunt tumefaciunt: ubi vero occasionem transmiserint, contraria sunt. Medicamenta sunt omnia, quae praesentem statum transmovent. Omnia autem fortiora transmovent. Licet autem, si velis, medicamento transmo- 280
- 55 vere, & rursus, si velis, alimento, ac cibo. Omnia vero ex praesenti statum transmovent, agrotanti opitulatur. Si enim id, quod morbum facit, non transmovent, auferit. Medicamenta fortia a natura, in debilibus morbis dare non oportet, 285
- 56 neque paucitate medicamenti debilitas ipsius facienda est. Sed fortibus natura fortibus pharmacis utendum est: debilibus vero pharmacis non fortibus. Neque parciendum est medicamentum, sed singulis secundum naturam: debilibus quidem debilia a natura: fortibus vero morbis, fortis naturae pharmaca exhibenda sunt. Ceterum morbi ea parte, qua proximi sunt, educendi sunt, & qua parte singulis exitus quam proximus est, extrahendi. Alvum autem subducuntia talia sunt, quaecumque lubrica, & incisiva sunt, & quaecumque in calidis attenuantur. Venter enim calidus est, & reliqua, quae saluginosa sunt, & quaecumque ex talibus plurimum participant. Contra alvum non subducuntia, sed sistencia sunt, quae statum exhibent: humida enim resiccata statum faciunt: & quae adstringunt, & quae a calo- 290

- te compacta sunt, & friabilia, & sicca. * Omnia autem, quæ foris extenuant, intra corpus assumpta tumefactionem inducunt: eadem autem, & ventrem silentia, & pituitosa, ac tumefactione existunt. Et quæ alvum subducunt, ac extenuant, cum calefacientibus eadem sunt. Insuper autem etiam acida pituitosa sunt. Omnia vero, quæ frigefaciunt ea, quæ in ventre sunt, talia alvum subducunt. Item quæ frigida sunt, & quæ humida. Quum autem non alvum subducant fuerint, calefaciunt: frigefaciunt autem & calida in ventrem assumpta, & cito secessum faciunt, si vero secessum non faciunt, calida in ventre existunt. Ex his quæcumque repletionem faciunt, maxime pituitosa sunt. Quæ vero plurima assumpta repletionem non faciunt, alvum subducunt. Medicina itaque mihi iam nota inventa esse videtur, quæ sic habet, & quæ docet singulas & consuetudines, & occasiones. * Qui enim sic Medicinam novit, minime fortunam respicit, aut expectat, sed & citra fortunam, & cum fortuna recte facit. Constans enim, ac firma est tota medicina, & doctrinæ optimæ in ipsa compositæ, minime fortuna egere apparent. Nam fortuna sui juris est, & nullius imperio subest, neque operantis est ad ipsam pervenire. Scientia vero imperata facere cogitur, & facile est, ipsam feliciter assequi: si quis sciens uti velit. Deinde vero quid opus est Medicinæ fortuna? Si enim morborum medicamenta clara sunt, & manifesta, velut equidem arbitror, non expectant sane fortunam ad sanandos morbos: si quidem sunt medicamenta. Si vero cum fortuna exhibere ipsa prodest, non magis medicamenta, quam ea, quæ non sunt medicamenta, una cum fortuna adhibita, sanos faciunt. Quicumque vero fortunam ex Medicina, aut alia quapiam arte expellit, dicique eos, qui probe rem aliquam sciunt, fortuna non uti, & contrarium mihi iudicare videtur. Mihi enim soli hi fortunæ assequi, itemque infortunatæ non assequi videntur, qui recte quid, & male facere sciunt. Fortunatæ enim assequi, est recte facere: hoc autem hi, qui sciunt, faciunt. Non assequi autem hoc est, si quis non sciat, hoc non recte faciat. Indoctus autem qui est quomodo fortunatæ assequi possit? Si quid enim etiam assequatur, non memorabilem sane successum habebit. Qui enim non recte quid facit, non fortunatæ assequi poterit, quin reliqua, quæ æquum est facere, non faciat. * MORBI MULIEBRES.
- Ut uti omnium morborum causas sunt, hi enim, ubi ex natura transmoti fuerint, morbos exhibent, sive ascenderint, sive descenderint: Et quum quidem uter osculum suum non demittentes, & pudendi eminentias non contingentes, transmoti fuerint foras, levissimus morbus est. Quum vero in anteriorem partem promoti fuerint, & osculum in pudendi eminentias, ac labra impulerint, primum quidem ipso contactu dolorem uteris percipit, ac exhibet: deinde obrutatus, & velut operculo conclusus ex eo, quod pudendi eminentias incumbit, fluxus non contingit, qui mensuræ nomine venit. Hic vero fluxus congregatus tumorem, ac dolorem exhibet. * Et si quidem infra descendens & averius, in inguen se immiserit, dolorem exhibebit. Si vero sursum ascendens, averius, & obtutus fuerit, etiam si propter raritatem, ac coarctationem dolorem exhibet. Quum vero propter hoc agrotarit, coxendicium, ac capitis dolorem facit. Ubi vero uteri implenti intuerint, nihil sunt, & pleni sunt: quin autem pleni facti fuerint, coxendicelique contingunt, dolores exhibent, & in coxendices, & in inguen, & velut pile in ventre discurrunt, & caput dolore affligunt, modo altera ipsius parte, modo totum, prout contingit ipsi morbus. Hæc itaque sic curanda sunt. Si quidem descendit solum, & illini possit, utere, quocumque libet, ex graveolentium genere, aut cedro, aut alli merito, myrtoto græcis appellato, aut aliquo alio ex graviter, & male oleum numero, eoque sursum facito, & fomenta ne adhibeto, neque cibo, neque potu urinam ciente hoc tempore ut iror, neque calida lavato. * Si autem sursum ascenderit, & non averia fuerit, medicamentis appositis bene oleutibus, & quæ simul calefaciunt, utere. Velut sunt myrrha, aut tinguentum, aut aliud quoddam odoratum, similique calefactorum. Et his quidem subdatis uteris, fomentum amenti ex infusis ex vino adhibebis, & calida aqua lavabis, & nrimam cientes uteris. Ex hoc autem manifestum sit, averia sit, nec ne. Si enim sursum progredia averia non fuerit, fluxus procedit, si vero averia sit, fluxus, menstrina appellata, non contingit. Hunc morbum fomento primum tali curare oportet. In vinum grossos immittito, ipsumque vinum calcificato, & cucurbitam circum osculum vasis, in quo calefit, addito hoc modo. Cucurbitam per medium dissectam evariato, & immittite ipsius modice recessa, velut in utriculis fieri solet, hæc ipsi vasi, velut operculum circumdato, quo odor per angustiam means ad uterum perferatur. Insuper autem & calida aqua fovere, & calefacientibus medicamentis subdatis uti oportet. Calefacientia autem sunt ea, quæ dicunt ex superius relatis, itemque hæc. Stercus bubulum, fel bubulum, myrrha, alumen, galbanum, & si quod aliud eiusmodi est. Plurimis etiam ipsarum per purgantia inferne medicamenta alvus subducenda est, & per debilia, quæ vomitum faciunt, ne evacuatio ex supervacuatione fiat. * Cæterum subdititias glandulas sic facere oportet, si fortes facere velis. Mel semicodum facito, & ex præscriptis subdititis pharmacis ea, quæ valde efficacia sunt, immittito, & ibi unguentis, glandulas formato instar earum, quæ in fedem induuntur, verum longas facito has, ac tenues. Mulierem vero supinam reclinato, lo-

cis a pedibus lecti alenus instigatis, deinde apponito, & panniculo intecto, aut a-
 lia quadam re consimili calefacto, donec colliquefact. Si vero debiliorem glandu-
 lam subdere velis, in linteculum illigato. Sed & si humore pleni uterj oculum
 tumidum habuerint, & non fluxerint, fluxionem facere oportet, & subditiis phar-
 macis sanare, atque fomentis, velut scriptum est, ita faciendo, velut in priore flux-
 ione suppressa. Quin & si in anteriorem partem procedens, uterus aversus fue-
 63 rit, fluxionem facere oportet, velut in superiore fluxione suppressa. Quum vero
 fluxus nimis fuerit, neque calida aqua, neque alio quopiam calefacere oportet, neque
 urinam cientibus uti, neque cibis alvum subducentibus. Lecti autem partes a pedi-
 bus altiores esse oportet, ut ne declinatio fluxui facilitatem præbeat. Utere au-
 tem simul etiam subditiis adstringentibus. Fluxiones porro, quum confectum
 venerit, purgatio, statim suberuentz sunt, quum vero tardius prodierit, purulentz.
 Er junioribus subcruenta magis prodeunt. Seniores vero magis mucosa menstrua
 habent.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE AERE, AQUIS, ET LOCIS.

Argumentum in Librum sequentem.

1. Anis temporatio, Pluviarum, Aquarum, Civitatum situ, Terrarum differentia, Diata hominum diligenter a Medico observanda.
2. Affronomia cum medicis cognatio. De Ventorum ratione in genere. De civitatum Adferionalium situ, eorumque ventis, aquis, & morbis, singulis utatibus, atque anni temporibus vernaculis.
3. Urbium bene sitarum commoditas. Aestate sicca morbi citius sedantur, Phlegmæ hyeme humida oriantur. Eodem frigida quæ morbos faciat. Boni potores qui, Crapula.
4. Morbi in hac constitutione mulieribus, pueris, & viris semiliares. Convulsiones, & anhelationes pueris familiares morbi. Morbus facit convulsiones frigoris. Alvo liquida morbi acuti non procedunt. Lippitudines humida non grauat, nec diuturnæ. Symptomata ex cerebri deflexionibus.
5. De Civitatum septentrionalium situ, aquis, & ventis.
6. Morbus acutus obnoxius qui, Lippitudines dura, ac vehemens. Sanguinis a morbis fluxiones. Morbi facit. Longa vita homines: Morbis feris.
7. Morbi mulieribus familiares. Sterilitatis causa. Lac, aquarum duritia, & cruditas extinguunt. Tabes a partu frequentes. Morbi pueris semiliares. Hydrocephalum.
8. De civitatum Orientalium situ, & accidentibus. Aquæ Orientalium omnes splendida, odorata, molles, & amabiles. Sol aquas illustres, & calidas. Corporum eorum constitutiones. In civitatibus Orientalibus morbi pauciores, ac debiliores. Afflicti in Orientalibus facile parant.
9. Civitatum ad occasum sitarum consideratio. Aquæ Occidentales cur decoloræ, infirmæ, ac voce gravi plerumque præditi. Ventus occidentales autem similes.
10. De aquarum differentia in genere. Splenes magni, ac pleni: ventres duri, ac calidi ex aquis lacustribus. Hæmori, clavicula, & facies attenuata ex aquis palustribus.

11. Aquæ palustres edaces, ac fisticulos facinas. Hydropes pluvii, ac latibillissimi. Morbi afflicti occidentales familiares. Dysenteria, Alvi profluvia. Febres quartana.
12. Morbi hyemales in occidentalibus. Præputum. Infantia morbi. Febres ardentes propter ventris duritiem. Tumores in mulieribus. Pituita alba. Sterna puerorum. Venites virorum. Ulcera in gibis. Adulterio cur in se in uero habere sapit falso credant. Aquæ palustres autem unum rem improba.
13. De Aquis fontanis. Aquæ dura quæ. Erit, argenti, auri, &c. generatim causa.
14. Aquæ optima. Aquæ salæ, truda, cedura. De equis quibusdam morbis, & naturis commodis.
15. Aquæ prima. Aquarum discrimina sanis non observanda.
16. Quæ aquæ alvum solvant, aut sistant. Cur aquæ salæ alvum (ut vulgo putatur) non solvant.
17. De Aquis pluvialibus, & ex his leuissimæ, dulcissimæ, tenuissimæ, ac splendidissimæ. Sol quid tenuissimæ est in aquæ, item in basinum corporibus eductæ, & fusæ rapit. Partes corporis soli expostæ cur non exsident.
18. Aquæ pluvialis cur cito periret, & odorem malum habeat. Cætera enim dulcia sunt.
19. Pluvie generatio. Aquæ pluviales cur coquenda, & excolenda.
20. De aquis ex nive, & glacie generatis. Aquæ completæ.
21. Aquæ a nive, aut glacie liquetæ. Aquarum multigenarum, & de maris fluminibus, & stagnorum, qui morbi peculiariter. Aquæ incalidæ. Aquam aquæ hancque quæ esse similem.
22. Aquis, ventorum differentia sapit rebus exhibent. Urinam qui facile, & difficulter eiciant.
23. Calculi generatio. Cur pueri calefacti podenda fricent, ac trahant. Calculoso-

- spissari non possit, & pulmonem pariem facit, & vicinas ipsi partes, simulque sup-
 puratur, ac tabidi. Funt autem hi morbi etiam ob alias causas. Inde porro
 hac vena pulmonem occupat, & per extremitates duas magnas intro conver-
 210 fas, sub septum transversum extenta est ad spinam, alba, ac nervosa venulas per
 reliquam condensationem corporis spargens: hinc autem per verticula densis venulis in
 spinalem medullam infertur, ac instar haderae inspicitur. * Et aliae quidem vena
 215 corpus distribuit ex omnibus partibus ad spinam tendentes, unaqueque quod
 sensuissimum, ac sincerissimum est, colligens biceruat. Hac vero velut praesens im-
 posita per demissas plicationes in idem cogit. Inde veto etiam in rhenes radice-
 220 as agit, tenuibus, ac fibrosis venulis iuxta spuriam costam: hinc autem tendens con-
 densatur, posteaque etiam nervosa fit ad princeps intestinum ac podicem, compriment-
 que musculos adstrictorios ipsi inferitur. In vesicam etiam, & testes, ac aditus ra-
 225 dices agit, multiplicibus implicatis, tenuibusque, ac solidis, & fibrosis venis. Inde
 veto crassissima, ac rectissima ipsius pars rursus conversa in caulem transit, hoc
 est pendulum. In reflexu autem in illa ipsa adaptatur. Et per pectinem supra sub-
 230 ter eum ventris, & ipsius vena, procedunt vena ad eas, quae deorsum tendunt,
 quae in seipsas mucos derivantur. Penetrant autem & per pudendum vena crassa,
 & tenues, & densae, & curvae. * At vero in foeminas illa ipsa in utero tendit,
 235 & in vesicam, ac urinae meatum: hinc autem recta procedit, & mulieribus quidem
 circa uteros pendet, masculis vero circa testes disseminatur. Ob hanc autem
 naturam ipsa vena etiam plurima secunda, ac genitalia concipit. A plurimis e-
 nim, ac sincerissimis partibus connutrit, paucaeque sanguinis existens, ac cava, &
 240 densa instar urinis, ac spiritu referta, intentaque a pudendo, demissas ad spinam
 venulas cogit: hac vero velut ecurbita medicinali in seipsas coactae, omnia in su-
 pernam venam emittunt. Constitit autem & ex salis corporis partibus in hanc,
 verum multo maxima pars velut dictum est, de medulla hac colligitur. * Volu-
 245 ptas vero accedit, vena hac genitura expleta. Quum igitur soleat reliquo tem-
 pore modici sanguinis, ac multi spiritus esse repleta, & calefacta, & semine de-
 osum condente, ea, quae in seipsa habet, confringit. Spiritus autem in ipsa ex-
 istens, & praesens violentia, & caliditas, & venarum undique coniectatio, trillatio-
 nem inducit. Illa autem, quae a seipsa germinavit, per dorsum, & jugulum iuxta spi-
 250 nam sparsa, multis venulis costas intertexit, & verticula per carnes alternatim con-
 densat, ut & probe nutrita, & sanguine plena existat. Ipsa autem iuxta coxendicem
 ac nates meat, per musculum sub femore submersa, i a natis vero iuxta acetabulum
 255 femoris iuxta caput in venam perforata est, quae femori respirationem exhi-
 bet: trans semur autem iuxta flexum ad genu. * Alteram vero iuxta inguina de-
 mittit frequentibus radicibus, & aggre transuentem. Hac vero per musculum ten-
 dens, & circa genu disseminatur, & per ossa tibialis summam venam de se in
 260 fistulam cavat, quae medullam nutrit, & derivatur per infimam tibiam iuxta pe-
 dis illationem, ac connexionem. Ipsa autem per patellam genu ad internam per tibiam
 musculum submersa extenditur, & per malleolum implicatur intus crassa, & san-
 guine plena, atque hac circa malleolum, & tendinem, venas aggre cognobiles produ-
 265 cit, ac involvit. Ipsa vero infra ad pedem, sub summum pedem decurrit, & hic se im-
 plectens, & in magni digiti immittens, duplici sanguine refertam venam super-
 nem sub eum ex summo pede refoctur, & apparet sane crasselasta iuxta externam
 270 malleoli partem, aorsum spargitur: iuxta oppositum tibiae radium. Iuxta suram
 autem, velut fundam facit. Iado extenditur iuxta internam genu partem. * Inmit-
 tit etiam patellae venas, & iuxta internam patellae partem, quae cava est, venam im-
 plicat, quam si quis doleat, celerrime bifidum, scotum, ac saniosum humorem col-
 275 ligat: procedit autem ipsa iuxta internam genu cavitatem. Distribuit etiam de se in po-
 plices multas implicatas venas. Quae inde tendentes iuxta nervos sub femore,
 radices agunt in testes, & in rectum intestinum, ac podicem, & circa os sacrum at-
 tenuatae unitae circumtenduntur. Illa vero procedens iuxta internam genu cavitatem,
 280 sursum iuxta internam femoris partem in ignem transit, & per coxendicem ult-
 tra ad spinam, & lumbum foras veniens, crassa, & laeta, ac sanguine plena sursum por-
 rigitur ad hepar, & ubi bifidam produxit sanguine refertam venam, dextram he-
 paris extremitatem ad rhenem occupat. Rursus veto subter hepar dispersa in ve-
 285 nam crassam finditur. Fila vero in crassitudinem hepatis inferitur, & altera qui-
 dem ipsius pars in superficie visceris extat, in qua etiam est fel, habetque multas ra-
 dices instar errorum, ac plesationum per hepar dispersas: altera vero pars per inter-
 290 nas ipsius partes derivatur. * Duae autem venae inter duas lateras extremitates
 explicantur, & una quidem per vertices, ac eum penetrans ex umbilico effertur.
 Altera vero premens spinam, in rhenem, ac vesicam, & pendulum, velut an-
 295 coris iactis inferitur. Verum ex coxendice incipiens ascendere ad pubem, multas
 vagabundas producit venas, & costas, ac verticula ad spinam illigat, & propa-
 gines suas multipliciter per venas transmittit, & intestina, ac ventrem involvit. Et
 aliae quidem a pube ad mammas, & supra mentum, & summos humeros exporrectae
 300 divagantur. Aliae vero procedens iuxta crassitudinem hepatis, ubi fel in fistulam
 coegit, sursum sub spinam dispergitur, per septum transversum itinere facto.

- 27 * Ceterum vena ex sinistris partibus, in reliquis quidem iuxta eandem naturam, velut ea, quæ in dextris, radices agit. Verum ex sinistris emergens in hepatis non se ingerit, sed in splenem inferitur iuxta caput, quod in crassitudine ipsius consistit. Inde vero internas splenis partes subit, ipsasque venulis sanguinolentis instar aranearum tela intertexit. Hic vero totus ex omniro elevatur, venulis ex se ipso sanguine plenum ipsam reddens. Quæ vero a capite splenis ad spinam accedunt, per septum transversum percurrent. Inde vero sursum, de dextra, & sinistra sub pulmone extenduntur. Quæ autem sanguine plene sunt, sub ipsum, & in ipsum corrivantur. Quæ vero pauci sanguinis, & tenues a pulmone intrinsecus procedentes, qui natura raris existit, nepote ab ipso emulset, in cor frenantur circa aurículas ipsius, & in cavitatem internam disfluunt. Ingerunt autem & priores in ipsum. Etenim in angustis transituum est, velut ex omni corpore habenas habens. Quapropter ex omni corpore maxime circa thoracem sensus existit. Colorum quoque imitationes corde adstringente venas, ac laxante sunt. Laxante quidem igitur rubicundus colores sunt, & bene colorati, ac pellucidi; constringente vero, virides cum pallote, & lividi. Verum tales evariant iuxta præsentem in quocunque colores.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE LOCIS IN HOMINE.

Argumentum in Libris sequentem.

- 1 Corporis principium nullum, sed omnia similiter principium, & omnia sunt. Atorbi-ram in toto corpore principium nullum. Corpora siatura morbis magis recipere, ac magis dolere a natura, atque in custodi corporibus esse longissimum.
- 2 Partes corporis singula, alia aliis quomodo morbos faciant. Quomodo ex effusione moderata impedita morbi fiant.
- 3 In curandis morbis, morborum causa quomodo tollenda. Corpus sibi ipsi esse simile, ac ex ipsa componi. Corporis minima alique parte affecta, cur totum corpus affici contingat. Medicinæ artis principium.
- 4 Auditus, Olfactus, Visus ratio.
- 5 Visus unde nutriatur, & qua ratione extinguatur. Oculorum membrana tres, & quomodo ex his lesis morbi fiant. Cerebri membrana due.
- 6 De venarum ex capite distributione. Vena a capite ad nasum. Vena temporales. Vena temporales sole sanguine non irrigantur. Vena temporales cur sole pulsantur.
- 7 Visus unde turbetur. Vena aurium. Vena in renes, ac testes desinens. Sanguinem mingere qui solent. Vena humerale. Vena alia a vertice iuxta aures.
- 8 Vena cava distributio. Venarum sessio qua hominem inspicendum facit. Vena splenis. Vena utriusque manus a vena cava producantur. Venarum communicatio.
- 9 Venarum, quam nervorum morbi leviores. Natura venis in humore est, in carnibus. Nervorum substantia, eorumque in corpore simi. Nervorum morbi curatu difficiles. Nervis qui morbi familiares. Nervus premoit articulus, & per totum corpus sunt extensi. Nervus in quibus robusti, & crassi. Circa faciem, & caput non sunt nervi, sed fibra.
- 10 De Suetis capitis, & quod alia tres, alia quatuor habent. Sutorum multitudo ad sanitatem oculis. De Periculis. Cella septem.
- 11 De Claviculis. De Scapulis.
- 12 De cubito, seu manu. Digitorum articulos faciant ossa omnia quocunque inter se committuntur.
- 13 De Coxarum articulis, qui acetabula dicuntur. De Femore. De Tibia ossa. Abole, seu patella manus.
- 14 In pedibus, & in manibus articuli multi. Ossium, & articularum idem nomen. Mucus in articulis. Articuli pro muci qualitate vel sani sunt, vel agrotant.
- 14 Claudicatio quomodo a muto in articulis fiat. De Tribus fluxionum causis. Fluxiones propter frigida, & caliditatem.
- 16 Humor oculi calidus si tenax, omneque eadem fuit.
- 17 Fluxiones aliquando sunt partibus inferius siccis, superius vero humidis.
- 18 De capitis septem fluxionibus. Fluxiones cur frequenter in thoracem fiant. Lassitudine cur affligantur, qui a bilis fluxione infiantur. Suppurari, & tabidi ex bilis in thoracem fluxione. Fluxio in medullam tabis occulta generatio. Fluxiones in vertebra, & carnes nota. Hydroa a capitis fluxione ad vertebra, & carnes.
- 19 Coxarum, & articularum ex fluxionibus affectiones.
- 20 De Pituita in nates fluxione. De fluxione in aures. Auris fluxiones quomodo curantur.
- 21 De viris in oculis fluxionibus, earumque curatione. Oculi post fluxionem statim inflammantur. In oculorum fluxione veluti lapilli subtercurrentes. Fluxio levis cum prurit.
- 22 Caput, & oculus purgantia medicamenta. Fluxus mucosi a carne, & esse ad oculos.

Hipp. Opera.

E 2 cura-

- curatio. Fluxus, manifesti ad oculos nota, & curatio.
- 23 Capitis in fluxu mucoso ad oculos secundi ratio. Humoris in visum, seu humorem purum fluxus curatio.
- 24 De fluxione capitis in thoracem biliosa, nocte. Peripneumonia, pleuritidis generatio a capitis fluxione biliosa.
- 25 Peripneumonia morbus periculosus. Suppurati ex peripneumonia, aut pleuritide, non moriuntur.
- 26 Suppuratio quibus de causis contingat. Suppuratio ab ulcere levior. Suppuratio, quando extra pulmonem arripitur, & carne curiosa. Pulmonis aorta.
- 27 Tussis, & profluvium in pulmone in tabidis unde.
- 28 Suppurati quomodo cognoscantur.
- 29 De capitis fluxione in spinam nota. Bili fluxio periculosa, si illius in oculis accedat. Alterius quomodo in oculis cognoscatur.
- 30 Pleuritidis curatio. Acutum multum, aut acutum, & aqua in pleuritide.
- 31 Suppurati quomodo caput purgantur. Tabidorum curatio.
- 32 De fluxione per gulam in ventrem, & eius curatio.
- 33 Quando ex fluxione retro ad cerebrum, & spinam medullae hydrops contingat, & eius curatio. Fluxiones ad loca vicina derivande.
- 34 De coxendicium dolore a fluxione capitis.
- 35 Febri ex fluxione retrosum curatio. Lactis infusum. De splene cancro. Splen ex infuso flarescit, & corpus epistaxis curatio.
- 36 Crustarum circa umbilicum, & in ipso istarum infusio in splene flarescente. De pueri hydropici curatione.
- 37 De Pleuritidis sicca circa fluxionem curatione. Pulvis raturus siccus, & quando gracilescit.
- 38 Febrium a bile, & pituita conclusarum generatio, & curatio. Pharmacum bilem ducens in febribus recentibus, praeterquam in quatuor.
- 39 Febrienti cibum non offerendus, neque solitionibus subire cibum datus. Febrientium potus. Gracilis, ac macilentus a febre infusum quomodo cibandus, & curandus. Ex Cammaro in febrientibus potus.
- 40 De Mili, sive regii morbi curatione. Cucumeris silvestris radix in balneo iberico-tum. Adedicamentis bilis ducendis in febre non utendum.
- 41 De ulceribus ferri curatione, & generatione.
- 42 De Anthrax, seu Cynarcha generatione, & curatione. Quid morbi a principio curandi.
- 43 De Capitis fracturis, earumque curatione. Offensa capitis periculosa fissura.
- 44 Febrientibus caput non purgandum. Pharmacata purgativa calascium. Altra bilis vomitus in vulnere lethali. Tenuis ex illis, & de repente subsident ab evacuatione deventus moritur. Ulcensula in debilibus a vomitione lethalis. Ulcensula livida in debilibus enata, mortale.
- 45 A medicamentis potu agrestes quomodo curandi. Bili fluxus spontaneus difficiliter sedatur. Vomitus in pingui non sedatur. Sanguis morbum faciens, dolorem; pituita implurimum gravitatem facit.
- 46 Morbi incogniti quomodo aggredendi. Morbi in ageris fortissimi; debilibus autem morbis, & contra, quomodo curandi. Gymnastica Medicina contraria.
- 47 Ulcerum, & quaecumque supra corpus emittuntur, curatio. Fluxioni a capite fluenti vomitus evadit.
- 48 Antiqui morbi recentibus difficiliter curantur. Ulceris callosi curatio. Pharmacorum insusfacientium, & attenuantium usus. Ulcerum nondum maturarum confusio.
- 49 Tristes, anxios, & se strangulare volentes morbi, quia radix sanat. Convulsivis curatio. Febri a coxendicium, & a rotatoria. Diffusio maxillae, & pedum insaniam facit.
- 50 Venam urandi ratio. Pena pericula sanguinem non emittit. Sanguinis & venae fluxus quomodo auferatur. Cauterizata diductis difficiliter curantur. Dolores in capite curatio.
- 51 Medicina studium fore difficillimum. Adedicamentorum facultatis non semper ex sua natura assumenda.
- 52 Natura in singulis primata, ac corrupta, dolores facit. Contraria contrariis curantur. Similia morbos faciunt, ac eosdem sedant. Tussis, & urina stillicidium.
- 53 Vomitus quomodo per vomitum sedatur. Adedicamentorum exhibendorum ratio deinceps. Corporis debilitas quomodo continetur.
- 54 Calide usus quatenus conducit. Corporis transmutationem per unum efficacem, ac potens est. Occasio in Medicina precepti est. Item quae Medici sunt cognoscenda.
- 55 Ex cibis suppuratis neque morbi, neque contrarietas fit ex his, quae offerantur. Adedicamenta omnia praesentem statum transmutant.
- 56 Adedicamenta fortia, & debilia pro apertorum viribus sunt exhibenda. Vacuationis modus a figura partis affectae.
- 57 Aluum subducens. Sanguinea calida. Aluum silentia. Fluxus sacriat.
- 58 Acida etiam pituitosa. Aluum subducens. Repletionem facientia maxime pituitosa. Medicina constans, ac firma fortuna non eget. Fortium sui esse iuris. Scientia imperata facere cogitur, & facile ad industrius assequitur.
- 59 Medicina fortuna non est opus. Absurdum medicamenta mollesca, ac clara esse. Fortuna ex Medicina, aut alia quapiam arte non pellenda. De Morbis muliebribus.
- 60 Uteri omnium morborum causa. Menstris quando non procedunt.
- 61 Menstrum fluxus infra descendens, & siccum ascendens. Coxendicium, & capitis dolores. Coxendicium, inguinum, & capitis doloris, ex impletis ac nimidis uteris curatio. Uteri defensus curatio.

61 Uteri ascessus curatio. Uterorum aversum
note.

62 Glándulas subilitatis foras ad uteros for-
mendi modus. Uteri ofculum humore pleuum,
ac tumidum. Uterus in anteriorem partem

adversas procedens.

63 Fluxus mulieris nimium quomodo selen-
das. Coloris mensuratum ratio. Aden-
sura juniorum, & seniorum in quo dis-
ferant.

SECTIO I.



1 **M** IHI quidem videtur principium corporis nullum esse, sed omnia i
similiter principium, & omnia finis. Circulo enim scripto
principium non reperitur. Similiter etiam morborum in toto
corpore. Quod enim siccius est, morbos magis recipere, ac
magis dolere a natura solet. Humidum vero minus. Morbus
enim, qui in secco est, stabilitur, & non cessat. Qui vero in hu-
mido dissinit, & alias aliam corporis partem occupat, & sem-
per transmigrens requiem facit, & citius quoque sedatur, utpote non stabilis.

2 **C**orporis autem singulæ partes alteri, ubi hinc, aut illinc processerit, mor-
bum statim facit, venter capiti, caput carnibus, ac ventri, & reliquæ omnes juxta eam-
dem rationem, quemadmodum venter capiti, & caput carnibus, ac ventri. Etenim
quum venter egestionem moderatam non fecerit, & in ipsum cibum ingerat, humidi-
tate ciborum ingessorum corpus irrigat. Ipsa autem humiditas a ventre obstrueta, a-
ccetvatim ad caput viam facit, & ubi ad caput pervenerit, a vasis in capite non rece-
pta, fluit quocumque contigerit, & circum circa caput, & in cerebrum per os tenue,
& partim quidem os ipsum subit, partim vero circum cerebrum per os tenue. Et si
quidem in ventrem tectus pervenerit, ventri morbum inducit. Si vero ad aliam ali-
quam partem incubuerit, illi ipsi morbum facit. Ita etiam reliquæ partes altera alteri
morbum inducit.

3 **E**t optimum fuerit sic curare ægrotos per has, quæ morbos for-
ciunt. Sic enim quam optime principium ægrotantis quis sanaverit. Corpus por-
to ipsum sibi ipsi idem, ac simile est, & ex iisdem compositum est. Similiter autem
habet & parvas, & magnas partes, itemque infernas, ac supernas. Et si quis mini-
mam corporis partem acceptam male afficere velit, totum corpus affectionem sentiet,
qualiscumque tandem ea fuerit: propterea quod minima corporis pars omnia ha-
bet quæcumque & maxima. Insuper quicquid tandem minima pars pertulerit, ad
gentilitatem refert, ac transfert, unaquæque ad suam, sive bonum, sive malum id
fuerit: & propterea corpus & dolet, & lætatur cum minima gente, quia in minima
omnes insunt partes, & hæc ad gentiles sibi ipsi singula transferunt, & omnia
denunciant.

4 **C**æterum natura corporis principium sermonis in arte medica,
primum perforata est, qua parte audimus. Etenim vacua circum aures, non
aliud inaudimus, quam strepitum, & clamorem. Quicquid autem per membranam in ce-
rebrum pervenerit, id liquido, & clare auditur. Ob id etiam foramen solum per mem-
branam citum cerebrum extentum est. In nares autem non inest foramen, verum mol-
lis laxitas velut spongia, & propterea per longiorem distantiam audit, quam olfacit;
odor enim ab obfactu longe dispergitur. Et in oculis venulæ tenues ad visum
ex cerebro per ambientem membranam feruntur. Hæ autem venulæ visum alium
humore de cerebro purissimo, qui etiam in oculis apparet. Eadem venæ etiam
visum extinguunt, ubi fuerint exsiccatæ. Membranz autem tres sunt, quæ o-
culos custodiunt. Superna quidem crassior, media tenuior, tertia tenuis, quæ hu-
morem conservat. Ex his superna, & crassissima, si lædatur, ac mutiletur, mor-
bos facit. Media vero etiam ipsa periculosa est, & ubi rupta fuerit, prominet for-
as, velut vesica. Tertia autem tenuissima omnino periculosa est, quæ humorem con-
servat. Membranz cesebti duæ sunt, altera superna crassior, altera te-
nuis cerebrum attingens, non amplius eadem permanens, postquam fuerit vulnera-
ta. Venæ autem transeunt ad verticem per carnem venientes ad officulum feruntur,
& per carnem duæ ex vertice rectæ, quæ parte supercilia clauduntur, &
desinunt ad angulos oculorum. Una autem a vertice ad nasum settur, & in utraque
nasi cartilaginem finditur. Aliæ vero duæ venæ juxta tempora feruntur in
medio tempotum, & aurium, quæ premunt oculos, & semper pulsant. Sole enim
hæ ex venis sanguine non rigantur, sed avertitur ex ipsis sanguis. Qui autem a-
vertitur, influenti occurrit, & qui quidem avertitur volens discedere: qui vero su-
perne influunt, volens infra procedere, hic impelluntur, ac diffunduntur, ac mu-
tuo circummagitantur, & pulsus venis exhibent. Visus humore de cerebro nutri-
tur, quum autem quid eius de venis acceperit, fluxione turbatur, & humos ip-
se non apparet, & ob oculos moveri ipsi videntur aliquando, velut avicularum
imagines, aliquando velut lentes nigræ, & nihil exacte juxta rei veritatem videre
potest. Aliæ duæ venæ in medio aurium, & aliarum venarum, quæ feruntur ad
aures, & premunt aures. Aliæ duæ venæ ex ossis conclusionem in aures ferun-
tur. Quarum vtro ipsæ ad corpus convertuntur: duæ quidem venæ juxta
tendines colli feruntur, & juxta verticula, & desinunt in rhenes: hæ autem et-
iam in testes penetrant, & quum hæ affectæ fuerint, homo sanguinem mingit.
Aliæ duæ venæ a vertice ad humeros securrunt, & sane humerales vocan-
tur.

- tur. Aliæ duæ venæ a vertice juxta aures, ab anteriore colli parte utrinque ad cavam appellatam venam feruntur. Cava autem vena finitur quidem velut gula: consistit autem inter gulam, & guttur, sive arteriam, ferturque per septum transversum, & per eor, & inter septum, & finditur ad inguina, & ad femora intro, & disparationes in femoribus facit, & ad tibias intus fertur ad malleolos. Hæ & infecundum faciunt hominem, quum fuerint sectæ, & in magnos digitos desinunt. Ex cava autem vena producit quædam in sinistram manum; fertur autem subter splenem ad sinistram lateris mollitudinem, unde splen propagatur per omentum, & finem sortitur ad thoracem. Producit autem juxta septum, & cum humerali committitur subter cubiti articulum, atque hæc splenis gratia secatur. Aliæ etiam ad dextram manum eodem modo a cava producit. * Communicant autem omnes venæ, & conflunt inter se mutuo, & aliæ eundem sibi ipsis per se committuntur, & concidunt: aliæ vero per venas a venis extensas. Quæ autem carnes nutriunt, ea parte inter se conflunt. * Et quicumque morbus a venis oritur, levior est, quam qui nervis: dissiluit enim una cum humore, qui in venis inest, & non quiescit. Et natura venis in humore est, in carnibus. Nervi autem sicci sunt, & ventriculos, sive cavitates non habent, & ad ossa consistunt, & maxima ex parte ab ossibus nutriuntur.
- 80 Nutriuntur & a carnibus, & colore, ac robur inter ossa, ac carnem medium habent, & humidiores quidem sunt, ac carnosiores, quam ossa: sicciores autem, ac magis ossei, quam carnes. Quicumque autem morbus in ipsos pervenerit, roboratur, & quiescit in eodem loco, & difficile est ipsum educere. Maxime vero impetunt ipsos dissolutiones, & alii morbi, a quibus tremor corpus occupat, & qui tremere ipsum faciunt.
- 85 Nervi autem premunt articulos, extentique sunt per totum corpus. Robusti autem maxime, & semper crassissimi sunt in illis corporis partibus, in quibus paucissime carnes sunt. Et corpus quidem omne nervis plenum est. Verum circa faciem, & caput non sunt nervi, sed fibræ confimiles nervis inter ossa, & carnes, tenuiores, & solidiores. * Capita suturas habent, aliæ tres, aliæ quatuor: & quæ quidem quatuor habent, his sunt utrinque juxta aures, & tertia ab anteriore, quarta a posteriore capitis parte. Sic quidem in capite quod quatuor habet, in eo vero, quod tres, juxta aures utrinque sunt, & ab anteriore parte tertia. Posteriore vero parte sutura nulla est, velut in eo, quod quatuor habet. Saniores autem capite sunt, qui plures suturas habent. Inter supercilia os descendit, ac transit, & mandibularum clausura in medio mento, & superne ad caput est. Verticula alii plura, alii pauciora habent. Qui pauciora habent, his duodeviginti sunt, horum alia sursum ad caput, alia deorsum ad sedem tendunt. Costæ septem a posteriore corporis parte ad verticula connectuntur, anteriore parte in pectore inter se committuntur. * Claviculæ articulos habent, alios in medio pectoris juxta guttur, atque hic coarticulate sunt: alios vero ad humeros reclinatos ad scapulas, qui humeris semper adherent. Scapulæ vero ad membra brachii, sive totius manus coarticulantur, incumbentes in ipsum os, quod in membro est. Juxta os autem appendices duæ prodeunt, altera intrinsecus, altera forissecus, quæ ad scapulas ossi adnascens, infra coarticulate sunt. Quæ vero in cubiti flexura sunt, infra quidem radio coarticulate sunt, juxta os natura cavum existens: supra autem radium paululum, in cubiti gibbum, & tunc tum os, tum radium in idem commissa, articulum in cubiti gibbo faciunt. Juxta ulpam vero appendices prodeunt, tenues valde quatuor, duæ sursum, duæ deorsum, & ad cubiti gibbum quidem duæ appendices consistentes, supra ex offe hærent, hæc cum offe cohærentes, juxta ossis articulum in cubiti gibbum coarticulantur. * Quæ vero infra sitæ sunt, & intus reclinatæ, hæc utraque committuntur ad radium ex supernis a membro procedentem, & intus ad membrum coarticulantur, & radium appellatum faciunt hæc sibi ipsis intus in cubito commissæ. Infra autem ad manum os articulum habet. Appendices vero hac parte teneræ existentes: duæ quidem non exeunt in articulum. Superna autem, & inferna cum offe coarticulantur ad manum. Cæterum manus articulos multos habent. Quicumque enim ossa inter se committuntur, omnia articulos faciunt. Dignati articulos habent multos, unusquisque tres. Unum ad unguem, in medio unguis, & nodosæ prominentiæ, alterum in ipsa nodosa prominentia, quæ parte etiam digitos constituunt. Tertium qua parte digitus a manu exoritur. * At vero in coxendicibus articuli duo sunt, quæ acetabula appellantur, & femora in hos inarticulata sunt. Juxta femora autem appendices duæ protenduntur, altera intus, altera foris, & in articulum neutra procedit, neque ab altera parte, sed ad os ad femur inferuntur. Femur autem superne, ubi in acetabulum ingruit, bifidum est hujusmodi bicipite. In ea quidem parte, quæ intro inclinata est, in summitate rotundum est, & leve, quæ etiam in acetabulum ingreditur. Altera autem bicipitis pars exterior magis foras prominet, & inferius apparet ad nates, & coxendix appellatur. Ad genu vero os femoris taliter biceps est. Bicipitis autem huius os tibia appellata, velut in cardine adaptatum est, supra adaptatum autem mola, sive patella incubit, quæ humiditatem a carne in articulum expansum descendere prohibet. Juxta tibiam autem appendices duæ procedunt, quæ inferne ad malleolos pedis finitur, superne ad genu, non autem perveniunt ad articulum. * Ad pedem vero tibia juxta malleolos articulum habet, & alium infra malleolos. Et in pedibus articulum multum, quemadmodum & in manibus

nibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli, & in digitis pedum eodem numero sunt, ac pari modo habent. Articuli insuper multi in corpore parvi sunt, non similiter omnibus, sed alii aliis. Hi autem, qui scripti hic sunt, omnibus similiter habent. Aliæ etiam venæ aliis sunt, sed non memorabiles. Mucus omnibus a natura est, & quum hic purus fuerit, articuli sani sunt, & bene moveri possunt, utpote lubrici inter seipsos. Labor autem, & dolor fit, ubi a carne humiditas fluxerit vitiosa. Primum enim articulus stabilis est. Non enim lubrica est humiditas, quæ de carne influxit. Deinde ut multa, & valde sparsa, & ex carne non irrigata, semper reficcatur, & ut multa existens, & articulo ipsam non capiente, effluit: & male stabilita elevat nervos, quibus articulus colligatur, ipsosque inconnexos, ac dissolutos facit: & propterea claudi fiunt, quum hoc magis sit, magis: quum minus, minus, 135

15 * In ventrem porro ea, quæ comeduntur, ac bibuntur, procedunt. Ex ventre autem fibræ in vesicam, qua parte humorem pereolat, extente sunt. Fluxiones autem, & perfrigerata valde carne, & percalfacta fiunt, ac superinflammati. Fluxiones propter frigus fiunt, quum caro in capite, & venæ tensæ fuerint. Hæ enim horrente carne, & ad angustias perveniente, adstrictæque, ac excludente, humiditatem expriment. Et simul carnes ipsæ contra expriment, ad angustias pervenientes: & capilli sursum erecti fiunt, utpote simul undiqueque fortiter compressi. Quicquid igitur inde expressum fuerit, id ipsum quocumque contigerit, fluit. Fluit autem etiam propter caliditatem, quum carnes rarefactæ transitus præbuerint, & humor calefactus tenuior redditus fuerit. Omnis enim humor calefactus tenuior fit, & omne cedens fluit. Maxime vero ubi valde fuerit inflammatum, propter hanc 140

16 fluit causam. * Carnes valde plenæ factæ, quum capere non possint, fluit humor, qui capi non potuit: fluit autem, quocumque contigerit. Ubi vero semel fluidæ factæ fuerint fluxiones, diffiunt ad locum, quo tandem contigerit, donec transitus fluxionis compressi fuerint propter gracilitatem. Quum autem corpus fuerit reficcatum, & aliqui corporis ipsi sibi ipsi communicans sit, etiam quum siccum est, ducit, & concipit, ac ducit, ubicumque humor tandem obtigerit: ducere autem ipsum non difficile est, utpote corpore vacuo, & non intumescente præ 145

17 gracilitate. * Aliquando autem infernæ partes sicæ fiunt: supernæ vero humidæ. Magis autem superna vasa humida sunt. Venæ enim plures supra sunt, quam infra, & carnes in capite minori humiditate opus habent. Dicitur itaque sicca corporis pars humiditatem ex capite, & simul transitus magis ducenti patenti, quam ei, quæ ducitur. Nam ipsi transitus, utpote sicci existentes, eam sibi lucrifaciunt, & simul humores a natura deorsum procedere solent, si vel modica quadam necessitas contingat. * Fluxiones de capite septem sunt in nares, in aures, in oculos, atque hæ ex capite fluxiones ob oculos conspicuæ existunt. Postquam autem in thoracem fluxerit præ frigore, bilis fit: Magis autem in thoracem præ frigore fluit, propterea quod facilis est fluxio ad guttur, utpote non contextum: præ frigore vero a bile infestari, propterea lassitudine affliguntur, quia carnes, quum bilem habuerint, non quiescunt, sed concutuntur, & concussæ laborant, ac delassantur, utpote velut in itinere faciendo concussæ, & suppurati fiunt: quum in thoracem fluxerit, itemque tabidi. Quum vero in medullam fluxio contigerit, tabes oculis ac in 175

18 conspicua oboritur. Quum autem retro ad vertebra, & in carnes defluerit, hydrops fit. Id, quod ex hoc cognoscere datur. Sicca enim anteriores partes sunt, caput videlicet, & nares, ac oculi: & oculis amplius hebetudo accedit, fiuntque cum virore pallidi, itemque reliquum corpus: & nihil expuit homo, etiam multum fluat. Fluxus enim per mediam carnem retro fluens, & ab anteriore aversus, anteriores partes siccas facit: posteriorum vero carnem irrigat, & magis eam, quæ intus est ad ventrem, quam quæ foris est ad nasum. Et propterea corpus foris magis solidum est, quam intus, & angustiores meatus, ac foramina habet. Quare sane quam tenuia sint foramina constringuntur, ipsaque sibi ipsis medentur, & fluxus nullus hac transire potest. Intus vero foramina ampliora sunt, & intermedia tenuiora habent: fluxus vero, utpote ab altioribus procedens, & tenuia impedimenta contra se habens, insluit, & carnes humiditate replet. Sed & humiditas a cibis in idem procedens corrumpitur: corrupta autem ipsa præ ammissione, & simul cum ipsa ea, quæ a capite defluit, corpus neriunt. Carnes vero multo humore nutritæ, & morbofo augescens, hydrope plenæ sunt. * Si autem modicus fluxus fuerit, coxendicum, & articulorum diuturnam affectionem facit, ubi finire cessaverit. Nam ut modicus, & undiqueque ab omnibus fortioribus depulsus, ad articulos refugium facit. Fiunt præterea articulorum, ac coxendicum affectiones, a talibus morbis natas, quum morbum quidem efficiens sanatur: in carne vero quid relictum fuerit, cui non sit exitus, neque rursus intro, neque foras, sed ad cutem egressum tuberculum utique fecerit: fugit autem in id, quod cedit, articulos videlicet, & aut articulo- 185

20 rum, aut coxendicum affectiones inducit. * Si porro intumuerint nares, & pituita plenæ fuerint, atque ea compacta, oportet pituitam compactam, ac congelatam attenuare aut sumentis, aut medicamento, & non avertere. Si enim fluxus aversus alio procedat, omnino maiorem morbum faciet. Quum vero in aures 200 fluxerit, primum dolorem exhibet: violenter enim procedit: dolorem autem exhibet,

- donec in fistulam redactus fuerit. Ubi autem fluere consueverit, non amplius dolo-
rem facit. Ei vero, quem dolor affligit, medicamentum natura calidum, tepidum fa-
ctum, & necropo dilutum infundendum est, & retro curcubita medica affigenda, si
205 sinistra auris doluerit, ad dextram: sin dextram, ad sinistram: non autem scarificando
pertundere oportet, sed ut trahatur, solum finenda est. Si vero per hanc dolor non
fedetur, refrigerantia a natura frigida infundantur, & medicamentum porandum
præbeatur, quod fecesum doctum faciat: sursum autem non, quandoquidem
vomitus non auxiliatur, & de cætero frigidis urendum est, & semper non sanantem
210 variare oportet modum: & si quidem pejus reddiderit malum, ad contrarium te con-
verte: si veto ad sanitatem tendat, omnino nihil ab his, quæ adhibentur, auferre o-
portet, neque quicquam aliud addere, aut apponere. Si vero jam in fistulam reda-
ctus fuerit, & multa purulenta sanies fluxerit, quæ graveolens sit, sic facere o-
porter. Spongiam siccantem quopiam sicco medicamento imbue, & in autem quam
215 penitissime inde; & in nares purgatorium medicamentum mitte, quo ea, quæ prius
in aures fluebant, in nares ferantur, & non id, quod morbosum est, in caput rur-
sus recedat. * Cæcerum tibi in oculis fluxio processerit, oculi inflammantur, 21
& tument. Sic autem affectum hominem medicamento liquido, aut sicco in-
spersili curare oportet. Si vero statim inflammati fuerint, nihil omnino illine, sed
220 aut fortissimum quam infime urito, aut alio quopiam alvum subducere medica-
mento attenuato, vitando ne vomitus facias. Si veto velut lapilli subtercurrer-
int, medicamentum illines, quod plurimam lachrymam ducere potest, & reli-
quum corpus humectabis, ac tumidum facies, quo oculi humidiores fiant, ac collan-
tur, ut lachrymam adstrictam, ac compactam decurrere facias. Quum autem in oculos
225 paulatim fluxerit, & pruritus fecerit, sic affectum molli medicamento illines, quod
siccare potest, simulque modicam lachrymam ducere, & ad nares medicamentum ad-
hibebis, aut singulis diebus, aut alternis eodem intens. Sit autem tale medica-
mentum, quod non plus, quam acetabulum per nares deducatur, & idque paulatim;
quod vero oculis adhibetur, resiccet, ut quod oculorum pharmacum resiccat, ac
230 obstruxerit, id ipsum ad nares feratur: Medicamenta caput purgantia, quæ
quidem fortia sunt, a toto capite drentur: quæ vero debilia, ab oculis, & hinc a
vicinis naso partibus. * Si autem a carne, & osse, magis inter os, & carnem subsi-
235 stente, fluxus ad oculos fiat, ex hoc manifestum sit, quod inde profluit. Cutis
in capite compressa cedit, & ulcera in capite enascuntur, & oculi lachryman-
tur, & palpebræ non exulcerantur, nec mordax est fluxus, nec visum hebetat,
sed homo ipse acritus videt. Fluxus enim non est falsus, urpote non de cere-
bro, sed magis mucosus. Hunc sic sanare oportet. Medicamentum caput
purgandum est non forti, & corpus attenuandum & eibus, & medicamentis in-
240 sta corpus subducenibus, donec attenuato corpore fluxus resiccet, aut medica-
mento in nares indito emoveatur. Verum ad ipsos oculos nullum pharma-
cum adhibendum est. * Si vero neque sic sanus fiat, caput secare, donec ad os per-
venieris, oportet, non superficialibus, neque transversis, aut obliquis fistulis, incu-
sis, ulquequo ad os ipsum pertigetur: frequenter autem secare oportet, ut compac-
tus humor citius prodeat per ulcera effluens: & simul ut frequentes sectio-
245 nes extensionem carnis ad os faciant. Sic mederi oportet, si huic hoc modo res
succeedat. Si vero hæc non commoda fuerint, & fluxus non elutur, ut elurus
acutus cernere faciat, semper ab incumbente oculi magis splendescens sunt, &
acutus visus hominis extinguatur. Si in visum, in humorem porum cruen-
tis aliquis humor ingreditur, huic visus intra oculum non rotundus esse appa-
250 ret, propterea quod in quocumque inest cruentus humor, id ipsum non apparet; huic
itaque deficit, ut visus rotundus appareat, & ante oculos aliqua moveri ipsi viden-
tur, & nihil revera videt. Huius venas visum prementes extirpare oportet, quæ vi-
delicet semper pulsant, & inter autem, ac tempora consistunt: & ibi has obturave-
ris, oculis pharmaca, quæ humectant, adhibe, & lachrymam quam plurimam prole-
255 cta, quo id, quod in oculis compactum est, & morbum facit, eluat. Si vero oculus tum-
patur, mollihus medicamentis, & acetbis utendum est, ut ulcus adstrictum in angu-
stum coeat, & cicatrix tenuis fiat. Si autem adhuc humoribus plenus fuerit, lachry-
mare oculo condecet. * At veto quum in thoracem fluxerit, & bilis fuerit, ex
hoc manifestum sit. Dolor lateris molitudinem occupat, & clavicularum ejusdem
260 partis, & febris adest, & lingua superne pallida, ac vitidis sit, & exstecat compa-
cta. Huius morbi periculum septima, aut nona die instat. Alia bilis. Quum
ambo latera doluerint: reliqua autem similia velut in priore fuerint. Hæc quidem
peripneumonia est; Illa vero pleuritis. Hæ autem properea sunt. Quum
in pulmonem fluxerit ex capite per guttur, & aortas appellatas appendentes
265 partes pulmonis, pulmo tamquam natura rarus, & siccus trahit in se humorem,
quantum ejus capere potest, & ubi influxerit, major sit: & ubi quidem in totum flu-
xerit, extremitas ejus major reddita utrimque latus contingit, & peripneumoniam
pulmonis appellatum morbum facit: quum vero alterum tantum, pleuritis, id est
costalis morbus sit. * Peripneumonia multo periculosior est, & dolores mul-
270 to fortiores sunt, qui ad laterum molitudinem, & ad clavículas tendunt, & lingua

- multo viridior, ac pallidior, & fauces præ fluxione dolent, & lassitudo totius occupat, & spiritus sexta, aut septima die corrumpit. Hunc si non septima die febris dimittit, moritur, aut suffocatur, aut utrumque. Si vero nona die, duobus diebus interpositis, corrumpat, ut plurimum etiam hic aut moritur, aut suppuratus evadit. Si vero duodecima die, suppuratus fit. Si quarta & decima, sanus fit. Et quicumque præ peripneumonia, aut pleuritide suppuratus fuerit, non moriuntur, sed sanantur. * Suppurati ut plurimum fiunt, quum fluxus in idem, velut in bile contingit: sed in bile quidem multum defluit, & ubi defluxit, sedatur. Suppuratis vero minus defluit, & non sedatur. Fiunt etiam suppurati, quum minus excreant, quam influit in pulmonem. Hoc enim, quod in pulmone consistit, & quod influit, pus fit. Pus autem in pulmone, & in thorace consistens, ac congregatum ulcerat, & putrefacit, & postquam exulcerata fuerint, ab ulcerato influit, & quum excreat, caput simul concitum magis fluit, simulque ex ulcerato in thorace, ac pulmone magis fluit, & ulcera agitata resurguntur: ut etiam si fluxus a capite cesset, is, qui ab ipsis ulceribus venit, sufficiens sit morbum sagere. Fit præterea etiam ab ulcere suppuratus, & levior hic morbus existit. Fit etiam extra pulmonem: maxime quidem a ruptura, & ubi earo contusa fuerit. Juxta hanc enim pus congregatur, & congregatum fluctuat, si quis corpus concutiat, & strepitum facit, & hæc uruntur. * Tabes autem fit, quum in idem, velut in suppurato, fluxio fit per guttur, & appendentes pulmonis partes, appellatas aortas, quæ pulmonem, & guttur continent, ac conjungunt. Fluit autem in pulmonem frequenter, & paulatim, & humiditatem in pulmone non multam facit. Resectum enim id, quod influit, & in gutture compactum, utpote quod non elinitur, sed paulatim influit, ac detinetur, tussim excitat, & in aortis id, quod influit derentum, utpote quum angusta foramina aortæ habeant, angustum spiritui locum exhibet, & talem spiritum habere facit, qui vel defectus semper respirare concupiscit. Et in pulmone, velut non vehementer humido existente, prius contingit. Quum vero multum de capite fluxerit, prius in pulmone non fit. Multum enim est, quod in ipsum influit, & suppurati ex his tabidis, sive phthisicis præce appellati fiunt, ubi corpus humectius factum fuerit, & contra, ubi siccus fuerit factum, ex suppuratis tabidi. 300
- 28 * Suppurati hoc modo cognoscuntur. Lateralis mollitudinem a principio dolor occupat. Quum vero jam pus collectum est, & dolor similiter habet, & tussis fit, & pus excreat, & spiritus corrumpit. Si vero nondum erumpit pus, in lateris mollitudine concutitur, & velut in periculo strepitum facit. Si vero horum nihil addit suppuratus autem sit, ex his conjectare oportet. Spiritum multum habet, subreptuque loquitur, & pedes, ac genua intumescunt: magis autem ab en lateris mollitudinis parte, in qua pus est, & thorax concurvatus est, & membrorum dissolutio fit, & sudor per totum corpus distillat, & aliquando sibi ipsi videtur calidus esse, aliquando frigidus, & ungues circumcrescenti sunt, & alvus calida fit. Ex his suppuratos cognoscere oportet. * Porro quum vero in spinam fluxio procedat, huic tabes fit ejusmodi. Lumbos dolet, & anteriores capitis partes vacuæ videntur ipsi esse. Bili autem periculosa est, si icterus, sive regius morbus in oculis accedat, & in anguibus lividitas si fiat, & si corpus ulcera habeat, & partes circa ulcera livide sint, & quum sudor non toto corpore erumpit, sed una aliqua corporis parte, & quum febre adhuc existente ager pallidum viridius, aut si dum adhuc in pulmone inest pallidum viride, excreatio cesset. Sic autem quum inest, & non inest, cognoscere oportet. Quum inest, in faucibus respirantis strepit, & spiritus periculosus est, & singultus adest, & febris discedit, excreatio adhuc in pulmone hærente, & alvus debili jam existenti secessum facit. Hæc pleuritidis, & peripneumoniarum periculosa indicia existunt. 320

SECTIO II.

- 1 * Ceterum pleuritidem hoc modo curare oportet. Febris sedanda non est per septem dies. Potu utendum aut aceto mulso, aut aceto, & aqua: hæc autem quam plurima offerre oportet, quo humectatio fiat, eaque facta excretionem faciat, & dolor sedandus est calfactoriis medicamentis, & absorbendum dandum est quicquid excretionem facit, & balneis utendum quarta die: quinta autem, & sexta oleum illinendum est. Septima lavandum est, si febris dimittere non velit, quo præ balneo sudor contingat. Insuperque & quinta, & sexta fortissimis utendum est excretoriis medicamentis, quo septimam diem quam facillime transigat. Si vero neque septima die febris cesset, non cessabit, si non aliud quid periculosum accedat. Postquam autem febris dimiserit, sorbitiones quam debilissimæ offerantur. Si vero evacuatio oboriatur, si quidem juvenile adhuc est corpus, potius auferendi sunt. Si vero febris dimiserit, triticeis sorbitionibus utaris. Et eodem modo peripneumonia curato. * At vero suppuratis caput purgare oportet non fortibus medicamentis, sed paulatim avettere in nares, & simul edulis ventrem subducentibus uti. Et quum princi-

- 35 principium morbi nondum est, sed eo fluxus vertitur, ac vergit, excreationem facere, & nullum excitare, & medicamentis insusilibus in nares uti, & cibis simul ingestis. Quum autem excreationem facere oportet, pluribus cibis, & salis, ac pinguibus utendum est, & vino austero, & quum sic habet tussis inducenda. Tabidos item eodem modo, quod ad reliqua attinet, curabis, præterquam quod
- 20 cibi non multi simul ingerendi sunt, & obsonia non plura, quam cibaria frumentacea, & vino inrer edendum utendum est aquoso, ut ne calefaciat, & corpori debili existenti caliditatem exhibeat, & simul ambo calefaciant in eodem tempore, & caliditate multum fluxum inducant. * Quum porro per gulam fluxus in ventrem
- 31 processerit, morbus infra sit, aliquando etiam superne. Hunc si quidem in ventre dolor inerit, subducendus est primum medicamento, aut succo, deinde pharmaco fortiore utendum est: cibus vero alvum subducenibus, donec dolor perseveret. Ubi vero dolor sedetur, cibus validioribus utatur. Eodem modo, ubi morbus
- 35 multos dies hæserit, curabis. Si vero debilis fuerit, & præ imbecillitate hæc offerri non possint, primum quidem prisanæ succo per clysterem misilo, alvus eluenda est; post ubi per hunc purgaris, aliquo ex adstringentium numero. * Quum
- 33 autem retro in carnem juxta vertebra fluxus illapsum hydropem fecerit, sic mederi oportet. Carotem collo inter venas cistitis etibus utatur, & ubi ulseris, constringatur, & cicatrices quam tenuissimæ inducantur, & ubi fluxum obcuratis, medicamentum in nares adhibe, ut eo vertatur; & aliud rursum, donec avettatur, &
- 35 & anteriores quidem capitis partes calefacto: posteriores vieto perfrigerat. Et postquam anterioribus capitis partibus excalefactus fuerit, cibos edat quam pituitosissimos, ac minime ventrem subducen-tes, quo fluxionum meatus in anteriore capitis parte quam maxime dilatentur. Postica ubi obiuraris, & averteris influxionem, si quid prius, quam curaris fluxum, in corpus pervenerit, sic mederi oportet. Si quidem
- 40 magis ad cutem secesserit, externis partibus fomentum adhibebis. Si vero intero ad ventrem: foris autem non conspicuum sit, medicamentum bibendum dabis. Si vero in utramque partem, ab utraque detrahes. Verum hoc studio habere oportet, ut proximum exitum facias five interne, five superne, aut etiam alia aliqua corporis parte, tibi exitus sunt. * Quum coxendicium morbus a fluxione fiat, cucurbitam
- 34 medicam affigere oportet, & fotas trahere, & non scarificando pertundere, & calefactis medicamentis in potu exhibitis intus calefacere, quo exitus fiat tum foras ad cutem per cucurbitæ tractionem, tum intus ad ventrem per caliditatem. Nam quum obcuratus fuerit fluxus, & non habeat, quo iter faciat, viam ad articulos facit, & in id, quod cedit, insinit, & sic coxendicium morbum inducit.
- 50 * Tabes ex fluxione retrorsum. Qui hac affectus est, ei caput est purgandum debili medicamento, donec fluxus avertatur: dieta autem tene, velut in tabe superiore. Medicamentum potandum præbe, elaterium deorsum purgans, & inferne alvum lacte insilo elue, de cætero fomentum utere. * Quum splen præ febre
- 36 magnus factus fuerit: sit autem, quum corpus attenuatur. Ex iisdem enim, & splen florescit, & corpus contabescit. Quum autem corpus tenue fuerit, & splen floruerit, & omentum simul cum corpore attenuatum fuerit, pinguetudo in omento colliquefcit. Ubi vero vasa pinguitudine vacua facta fuerint, & a splene florente, ac augescere in omentum defluerint, utpote vicinum valde existens, & ut vasa habens, eaque vacua excipit, & ubi morbus semel in corpore factus fuerit, ad id,
- 60 quod est morbosum, vertitur, nisi quis probe disponat, ac curet. Nam etiam si quis bene tractet, periculo non vacat. Hunc sic sanare oportet. Medicamenta in potu exhibenda sunt, quæ aquam purgent, & edulia quam pituitosissima offerenda. Si vero neque sic levior fiat, intus sunt crustæ quam tenuissimæ, & quam maxime in superficie, quæ aquam continere possis, circum circumbilibicum, & una inumbilicum, & emittere singulis diebus. Quum enim morbus periculosissimus sit, in his periclitari oportet. Si enim successerit, sanum facies: sin minus, quod etiam alias futurum erat, id ipsum perpetitur. Cæterum in puero hydropem sic curare oportet. Partes tumide, & aqua plenæ aperiendæ sunt scalpello, & frequenter, ac parum edicendum est. Educendum autem est a singulis corporis partibus, &
- 70 fomentum utendum, & semper locum apertum; unde eduxeris, calefactorio medicamento illines. * Pleuritis sicca cæra fluxum sit, quum pulmo valde excisicatus fuerit præ siti necessaria. Pulmo enim natura siccus existens, ubi amplius quidquam pro natura siccatus fuerit, gracilis sit, & impotens redditus, & ad latus præ impotentia reclinatus, latus contingit, & postquam contigerit ipsum humidum existens, cohaeret, & adglutinetur, & pleuritidem, hoc est lateris morbum facit. Tunc
- 75 veto & dolor fit in latere, et in clavicula, et febris, et album excreat: hunc multis potibus curare oportet, et lavare, et doloris medicamentum præbere, et alia, quæ excreationem faciunt. Hic in septem diebus sanus sit, et morbus minime periculosus est, et cibos præbere non oportet. * Febres porro propterea fiunt,
- 80 quum corpore superinflammato carnes intumuerint, et pituita, ac bilis conclusa quieverit, et neque refrigeretur quicquam, neque exeat, neque moveatur, neque aliud quid subeat. Quum itaque lassitudo occupari, et febris, ac repletio, lavare multa aqua oportet, et oleo illinere, et quam maxime calefacere, quo caliditas aperto cor-

pore,

- porē prae sudore egeat: consequenter autem haec faciendū sunt per tres, aut quatuor dies: & si non sedetur, ac cesset, pharmacium in potu exhibendum est, quod bilem educat, & febris perfrigeranda est, praeterquam si quartana existat. Medicamentum tamen, donec corpus floridum est, ne propinato: non enim vacatur, nisi parum, utpote corpore turgente. Quum autem gracilis, ac macilentus fuerit, tunc bibendum exhibe, & evacuabunt. * Febricenti cibum ne offeras, neque forbitionibus subitis alvum ducas. In potu dabis aquam calidam, & aquam mulsam, & acetum cum aqua: haec autem quam plurima bibat. Si enim non frigidus ingressus fuerit potus calidus existens, ac manens, ex corpore agrotō detrahet, & vel per urinam eiciet, vel exsudabit. Undiquaque autem apertum, & respirans, ac motum corpus id, quod conducibile est, faciet. Quum vero gracilem existentem febris urat, manifestum est, quod non propter corporis tumorem febris occupet, & si non cesset, nutrire oportet, ac timidum facere, & si neque sic conducatur, palam est quod non oportuerit febrem inducere. Hunc itaque medicamentum portare oportet, quod educat, quā parte febris magis haeret, sive superne, sive inferne, & si quidem superne haereat, superne, sin inferne, inferne. Nihil autem minus oportet etiam debiles fortia medicamenta portare, sed similiter: aut solum sic, ut fortibus quidem forte, debilibus vero debile exhibeas. Ardores vero poisoning, & forbitionibus, quemadmodum febrem frige-factorio medicamento exolvere oportet: cammaro videlicet, aut alio quopiam huiusmodi: & si nauseam contrahat a frige-factorio, calefactoriis utere consequenter. Ubi vero non cesset, frige-factoriis rursus utere. * Lactem, sive regum morbum sic curare oportet. Quum fulceperis, nutrito & balneis, & pinguescentibus, potibusque, ac cibis humectato per tres, aut quatuor dies. Postquam autem humectatum fuerit corpus, purgato, & resiccato ipsum, pinguitudinemque derепente exaurito, & undiquaque, si possibile sit, medicamentum adhibeas, humiditatem educito: ad caput vero purgatorio debili utitor: & urinam cientia bibenda dato, & eaue ante cibos hoc tempore, quo turbatam humiditatem purgaveris, in potu praebe, ne ab eo tempore corpus nutriatur. Quum vero attenuatum fuerit, etiam balneis purgato, & conula cucumeris sylvestris radice, & eaue in aquam coniecta, inde lavato. Ceterum medicamenta bilem ducentia ne propinato, ne corpus magis conturbes. Ubi vero sicum fuerit id, quod conturbatum fuit, nutrito, nullo alvum subducente medicamento, neque urina cientie utens, sed vino vinfolo, & his, quae rubicundiorē hominem faciunt. Si vero viridis, ac luteus sit, rursus exaurito, nequaquam vero siccato, ut ne is color stabilis reddatur. * Ulcus seruum in corpore propterea venit. Postquam caro tumida, & inflammata circum circa fuerit, & margines ulceris magni existerint, & ulcus ipsum humidum, & in ulcere sanies reliqua inierit, aut ulcus constrictum fuerit. Sanies computrescens ab ulcere defluens, foras prodire a constricto ad carnem ulcere prohibetur. Caro autem suscipit, utpote elevata existens ab inflammatione, & quum in ipsam pervenerit sanies subterfrens, putrefacit, & avollit. Hunc medicamentis humectantibus ipsum ulcus illinere oportet, ut ex humectato ulcere fluxus foras effluat, & non subter carnem. Insufflata etiam in ulcus frige-faciētibz pharmacis illinenda sunt, quo perfrigerata caro existat, & non dirupta rursus fluxione immittat. Sed & alia ulcera frige-faciētibz oblinenda sunt, & super ipsa humectantia inponenda. * Angina, quam cynanchen graeci vocant, a sanguine fit, quum sanguis in venis, quae in callo sunt, compactus fuerit. Sic affectus a venis, quae in brachiis sunt, sanguinem detrahes, & simul alvum inferne subduces, quo id, quod morbum exhibet, detrahatur. Lingua quoque, quum magna ulcera habuerit, similiter curanda est. Morbos a principio curare oportet, & si quidem a fluxionibus sunt, primum fluxiones sedare: si vero ab alia causa, principium morbi sedare, ac curare: deinde id, quod insinxit, si quidem multum fuerit, educere, sin modicum, per dietam moderari, ac componere. * Capitis fractura. Si quidem os fractum fuerit ac contritum, periculo vacat, & curare oportet humectantibus medicamentis. Si vero rumpatur, & fissura fiat, periculum est. Huic ferram adhibere oportet, ut in ossis scissuram sanies influens, membranam cerebri pertresfaciat. Nam, ut per angulum intrans, non autem exiens, affligit, & furere hominem facit. Huic itaque ferram adhibere oportet, ut sanies exitum habeat, non solum ingressum, ampla serratura facta. Medicamentis autem utendum, quae humorem in sese trahunt, & lavandum. * Febricitanti caput ne purgato, ut ne furiosus fiat. Calefaciunt enim caput pharmaca purgativa, & sane ad caliditatem febrilem accedens ea, quae in medicamento est, insaniam facit. Ex quacunque causa male affligente quis atram bilem revoverit, moritur, qui vulnus habet. Et qui ab evacuatione detinetur, & debilis est, & tenuis existens, derепente siccus subfidit, moritur. Quum a caliditate detento ulcuscula exuperit debili existenti circum circa livida, moritur. Quum a morbo quopiam detento, debili iam existenti livida ulcuscula enata fuerint, mortale. * Quum quis a medicamenti potu superagrotarit, & inferne, & superne ab ipso secesserint, vinum sorbeat, primum quidem dilutum, & deinde metacum frequenter, & sanabitur. Medicamentum autem neque evacuativum, neque vomitorium

- mitorum fumat. Bilis, ubi sua sponte eruperit aut inferne, aut superne, diffi-
 cilis sedatur. Quæ enim sponte procedit, præ violentia corpori facta impellitur. Si
 155 vero a medicamento fiat, non a gentilitatis cognatione violatur. Quum susce-
 peris vinosum, & vomentem, vomitum ne sedato. Vomitus enim evacuationem se-
 dat: facilius autem vomitus postea sedabitur. Si vero debilis fuerit, qui hæc pati-
 tur, somnificum medicamentum a vomitu præbebis. Sanguis, quum morbum facit,
 dolorem exhibet; pituita autem gravitatem ut plurimum. * Morbum si quis non cogno-
 160 scat, medicamentum bibendum præbeat non forte. Si itaque levior inde fiat, demonstra-
 ta via est, quod gracilitatem inducendo curandus est. Si vero non levior reddatur, sed
 pejus habeat, contraria facienda sunt. Si non profuerit gracilem facere, tumidum fa-
 cere conducet, & frequenter permittate, ita ut hoc consilio utaris. Si quis in mor-
 bis quid permittaturus est, forti quidem ægroto, debili autem morbo, tunc quidem
 165 confidenter fortiore quam morbus est, medicamento utendum est. Nam etiam si quid
 de sano abducatur una cum debili, ac ægroto, nullum detrimentum est. Si vero mor-
 bum fortiozem, ægroto autem debilem acceperis, debilibus pharmacis curabis, quæ ip-
 sum morbum superent, & abducant, verum ægroto nihilo debiliorem reddant. Ars
 exercitandi corpora, & Medicina contrariæ sunt. Ars enim exercendi corpora,
 170 gymnastice græcis appellata, non opus habet permittationis, sed Medicina. Sano
 enim non auxiliatur transmutatio ex præfenti statu, verum ægroto. * Morbi
 quicumque ulcera sunt, & super reliquum corpus eminent, eos simul cum medicamen-
 tis etiam fame curare oportet. Fluxione ex capite fluente vomitus conducit.
 Antiqui morbi difficilius curantur quam recentes, verum morbos antiquos pri-
 175 mum, recentes facere oportet. Ulcus callosum factum, ejecta primum dritia per
 putrefactorium medicamentum, confringere deinde oportet. Pharmaca, quæ tu-
 mefacere maxime solent, ea puta ulcera adstringunt, quæ vero attenuant, ea pur-
 gant. Si vero quis confringat ulcera nondum matura, corpus ægroto nutrit,
 quod ulcus habuerit. Et si quidem adstringere oporteat ulcus, ac implere, tumefa-
 cere prodest, etiam si in capite carnem velis. Renutrita enim a cibus caro, pro-
 180 pulsat eam, quæ a medicamento putrefacta est, & simul cum natura debellat. Ve-
 rum elevatam, aut levem carnem, cibus gracilem reddere oportet. * Tristes, anxios, &
 ægros, ac se strangulare volentes, mandragoræ radice mane in potu data minore
 185 pondere, quam quod insanire facit, curabis. Convulsioni sic medici oportet. Ignis
 ab utraque lædæ parte succendatur, & mandragoræ radix in potu præbeat ut muo-
 re pondere, quam quod insaniam facit. Es ad tendines posteriores sacculi calidi im-
 ponantur. A convulsione si febris invaserit, sedatur eadem die, aut sequenti, aut
 omnino tercia. A ruptura febris non corripit amplius quam tres, aut quatuor dies.
 Si vero corripit, & quis putat se a ruptura habere, ab alia sane quapiam causa
 190 corripitur, & non oportet ipsam, velut a ruptura curare. Quum homo manibus
 ac pedibus distentus, ac tortus fuerit, insaniam sibi ipsi facit. * Venam porro sic
 urere convenit commodam ad morbum, ex quocunque tandem quis ægrotare. Si u-
 flus fuerit homo, & fluxerit sanguis, ita ut hoc non periculosum sit ipsi, ambo
 hæc facere licet. Si vero percussus fuerit in dolore, cuius gratia urebatur, non
 195 coalescit, utrum fluxui prodest. Si enim perusta fuerit, non fluit. Nam postquam
 perusta est, extremitas utraque venæ recurrit, quæ parte perusta est, & exarescit.
 Si vero quid relictum fuerit, præ relicto persuente fluxum humectatur. At si
 sanguis ex vena fluit, per transversum peruritur. Si vero non cesserit, ad hæc su-
 pra, ac infra utrinque dissecto, quo sanguis fluxus avertatur. Ductum enim
 200 facilius est medicamento sedare, quam coactum. Doloris in capite gra-
 tia sanguinem de venis detrahito, si vero non sedetur, & diuturnus sit, peru-
 rare venas, & sanus evadit. Si vero caput purgaveris, magis affliges. * Modi-
 cinam cito discere non est possibile, propterea quod impossibile est statim, ac
 certam doctrinam in ipsa fieri, velut verbi gratia, qui scribere didicit, iuxta u-
 205 num modum, quem omnes docent, novit, & scientes omnes similiter noverunt,
 propterea quod idem, & similiter factum, & nunc, & non nunc, non potest fieri
 contrarium, sed semper exacte simile est, & non opus habet occasione.
 Medicina vero & nunc, & statim non idem facit, & ad eandem contraria facit,
 & hæc etiam contraria sibi ipsis. Primum alvum subducentia non semper
 210 hoc faciunt, & alvum subducentia utrumque faciunt. Fortassis autem neque sic se
 habent alvum subducentia, velut alvum sistentibus contraria. Resistant enim
 alvo, propter vehementem stabilitatem corpus intumescent, pituita in ventrem
 perveniente, sic stabilitas fecerit. Ubi enim pituita in ventrem ingres-
 sa fuerit, evacuatio contingit. Insuper vero alvum subducentia ex natura, stabili-
 215 tatem faciunt in ventre, si quidem non subducentia feceris. Si autem exolvatur,
 & humectetur id, quod morbum facit, postquam exolutum fuerit, sanus evadit.
 Et sic ventrem sistens, subducentibus stabilitatem ventris faciunt, & vicissim
 subducentia ventrem sistentibus. Eodem modo res se habet circa rubicun-
 dos, & pallidos. Nam & pituitosa, ac tumefacta & pallidos faciunt, &
 220 boni coloris. Itemque attenuantia, utriusque autem medicamentum sunt contraria
 contrario, Verbi causa. Quum intumescit pallidus existens, exolvitur sane si
 quod

- quod medicamentum attenuans adhibuit fuisse; atque hic tumenti attenuans opit-
 ulatur. Rursum autem quod aliquando utilitatem corporis, nunc hic opitulanti
 opitulatur, quum sane præ fragilitate decolor, & pallidus factus fuerit. Si
 quis enim pituitosum, ac tumefaciens medicamentum exhibuerit, pallor sedatur. 215
- 51 Insuper vero etiam dolor & propter frigiditatem fit, & propter caliditatem,
 & propter valde exuperans, & propter imminutum; & in perfrigeratis quid-
 dem natura extra corpus ad eum propter calfaciens valde dolor fit; in calidis
 vero natura propter frigidum. Et in sicis natura, si humectentur, in humidis
 natura, si resiccentur. In singulis enim, quorum natura permutatur, ac corrumpitur,
 dolores fiunt. Sananturque dolores contrariis, idque etiam unicuique morbo
 proprium est. Nam in calidis natura propter frigiditatem agrotantibus, do-
 lores calefiunt, & reliqua iuxta hanc rationem fiunt. Alius porro modus
 hic est, per similia morbus fit, & per similia adhibita ex morbo sanantur. Vel
 ut urinae stillicidium idem facit, si non sit, & si sit, idem sedat. Et tussis eodem
 modo, velut urinae stillicidium ab idem fit, & sedatur. Alius rursus mo-
 dus hic est. Febris, quæ propter tumefactionem ex pituita fit, aliquando quidem
 ab idem fit, & sedatur; aliquando autem a contrariis. Aliquando enim, si quis
 vult aqua calida lavare, & multum potum exhibere, sanus ager fit, & febris,
 quæ propter tumefactionem facta est, pituitosis, ac tumefactionem facientibus
 obstat, & adhuc infestatur. Et si quis vult medicamentum bibendum dare,
 alvum subducens, & vomitorium, eodem modo & a facientibus sedatur, & a sedan-
 tibus fit. Nam si quis homini vomenti, aquam multam bibendam dare velit, elen-
 tur ea, propter quæ vomit una cum vomitu. Et sic quidem per vomitum vomitus
 sedatur. Rursum autem propterea quod sedatur, quia infestare procedere ipsi fecit,
 ex illo id, quod intus est, vomitum facit, & ambobus contrariis modis homo sanus
 fit. Et si quidem sic in omnibus haberet, statim sane ac certa medicina esset. Ita a-
 lia quidem contrariis curare oportet, qualia tandem sint, & a qua causa fiunt: alia ve-
 ro similibus, qualia tandem sint, & a qua causa fiunt. Huius autem rei causa corpo-
 ris debilitas existit. Corpus enim a cibis aequalibus aequaliter nutritur: a corpore
 vero cibi superatur. Postquam vero plus, aut minus in ipsum ingestum est, aut alia
 quæpiam transmutatio facta est, superatur, superant autem cibi. Et quum sane su-
 peratur corpus ab his, quæ ipsi offeruntur, florere hæc ipsa facit, & superant hæc simul
 corpus, & contraria ipsi faciunt. Et calida lavari, donec quidem corpus superat
 eius exhibitionem, florere corpus facit. Quum vero superatum fuerit, gracile corpus
 facit. Et convivari similiter, ut lavari facit. Hac enim, donec superantur, florere
 corpus faciunt. Ubi vero superaverint, & alvi secessus, & varia viria inducunt. Quum
 autem id, quod offertur, transmutatur, necesse est, & id, cui offertur, transmutare.
 Etenim corpus transmutatum parum efficax, ac potens est, & ab omnibus offensiones
 percipit. Hoc autem faciunt & alvum subducencia, & florere ipsum facientia, gra-
 cile corpus faciunt, & reliqua omnia contraria his facientia. At vero Medicina brevis
 occasionem habet, & qui hoc novit, illa statim ac certa habet, & scit, quæ con-
 fecta sint, & quæ non confecta, ad quæ cognoscenda non est occasio in medicina, & quod
 alvum subducencia non subducencia sunt, & reliqua, quod contraria sunt, & contra-
 rissima non contrariissima. Occasio autem hæc est, ut cibos offeramus ea copia, quan-
 tam corpus, cui offeruntur, superare valeat. Nam si quis sic fecerit, omnino necesse
 est cibum alvum subducenem oblatum subducenem esse, & pituitosum, pituitosum.
 Si igitur superaverit corpus ipsos cibos, neque morbus, neque contrarietas fit ex his,
 quæ offeruntur, & hæc est occasio, quam medicum nosse oportet. Quum vero occa-
 sionem supergressus fuerit, contrarium fit, & antequam ei excessum factum esse putant,
 consequens est, ut calefeat. Donec enim corpus id, quod oblatum est, superaverit, cor-
 pus nutritur. Ubi vero hæc occasionem transierit, contrarium fit, nam attenua-
 tur, & gracilecit. Sed & alia omnia, & quæ tumefaciunt, donec quidem superave-
 rit corpus, ampliusque pro occasione offeruntur, etiam iuxta naturam suam singula
 faciunt, & pituitosa, si tumefaciunt tumefaciunt: ubi vero occasionem transmi-
 serint, contraria sunt. Medicamenta sunt omnia, quæ præsentem statum transmo-
 vent. Omnia autem fortiora transmovent. Licet autem, si velis, medicamento trans-
 movere, & rursus, si velis, alimento, ac cibo. Omnia vero ex præsentem statum transmo-
 vere, agrotanti opitulatur. Si enim id, quod morbum facit, non transmoveris, au-
 gescit. Medicamenta fortia a natura, in debilibus morbis dare non oportet, neque
 paucitate medicamenti debilitas ipsius facienda est. Sed fortibus natu-
 ra fortibus pharmacis utendum est: debilibus vero pharmacis non fortibus. Neque
 partendum est medicamentum; sed singulis secundum naturam: debilibus quidem debi-
 lia a natura: fortibus vero morbis, fortis uaturæ pharmaca exhibenda sunt.
 Cæterum morbi ea parte, quæ proximi sunt, educendi sunt, & quæ parte singu-
 lis exitus quam proximus est, extrahendi. Alvum autem subducencia talia sunt,
 quæcumque lubrica, & incisiva sunt, & quæcumque in calidis attenuantur. Venit e-
 nim calidus est, & reliqua, quæ salustiosa sunt, & quæcumque extralibus plurimum par-
 ticipant. Contra alvum non subducencia, sed sistencia sunt, quæ statim exhibe-
 rent: humida enim resiccata statum faciunt: & quæ adstringunt, & quæ calo-
 re com-

- re compacta sunt, & stabilia, & sicca. * Omnia autem, quae foris extenuant, intra corpus allumpta tumefactionem inducunt: eadem apertis & ventrem sustentia, & pituitosa, ac tumefaciencia existunt. Et quae alvum subducunt, ac extenuant, eum calefacientibus eadem sunt. Insuper autem etiam acula pituitosa sunt. Omnia vero, quae frigidificant ea, quae in ventre sunt, talia alvum subducunt: item quae frigida sunt, & quae humida. Quum autem non alvum subducencia fuerint, calefaciunt: frigidificant autem & calida in ventrem allumpta, & cito fecesum faciunt: si vero fecesum non faciunt, calida in ventre existunt. Ex his quaecumque repletionem faciunt, maxime pituitosa sunt. Quae vero plurima allumpta repletionem non faciunt, alvum subducunt. Medicina itaque mihi iam tota inventa esse videtur, quae sic habet, & quae docet singulas & consuetudines, & occasiones. * Qui enim sic Medicinam novit, minime fortunam respicit, aut expectat, sed & citra fortunam, & cum fortuna recte faciet. Constant enim, ac firma est tota medicina, & doctrinae optima in ipsa composita, minime fortuna egere apparent. Nam fortuna sui juris est, & nullius imperio subest, neque optantis est ad ipsam pervenire. Scientia vero imperata facere cogitur, & facile est, ipsam feliciter assequi: si quis sciens uti velit. Deinde vero quid opus est Medicae fortuna? Si enim morborum medicamenta clara sunt, & manifesta, velut equidem arbitror, non expectant sane fortunam ad sanandos morbos: si quidem sunt medicamenta. Si vero cum fortuna exhibere ipsa prodest, non magis medicamenta, quam ea, quae non sunt medicamenta, una cum fortuna adhibita, sanos faciunt. Quicumque vero fortunam ex Medicina, aut alia quapiam arte expellit, dicitque eos, qui probe rem aliquam sciunt, fortunam non uti, is contrarium mihi iudicare videtur. Mihi enim soli hi fortunae assequi, itemque infortunati non assequi videntur, qui recte quid, & male facere sciunt. Fortunati enim assequi, est recte facere: hoc autem hi, qui sciunt, faciunt. Non assequi autem hoc est, si quis non sciat, hoc non recte faciat. Indoctus autem qui est quomodo fortunae assequi possit. Si quid enim etiam assequatur, non memorabilem sane successum habebit. Qui enim non recte quid facit, non fortunati assequi poterit, quin reliqua, quae aequum est facere, non faciat. * MORBI MULIEBRES.
- Uteri omnium morborum causa sunt: hi enim, ubi ex iactura trahitior fuerint, morbos exhibent, sive ascenderint, sive descenderint. Et quum quidem uteri osculum suum non demittentes, & pudendi eminentias non contingentes, transmoti fuerint foras, levissimus morbus est. Quum vero in anteriorem partem promoti fuerint, & osculum in pudendi eminentias, ac labra immiserint: primum quidem ipso contactu dolorem uteri percipit, ac exhibet: deinde obstruitur, & velut operculo coarctatus ex eo, quod pudendi eminentias incumbit, fluxus non contingit, qui mensium nomine venit. Hic vero fluxus congregatus tumorem, ac dolorem exhibet. * Et si quidem infra descendens & averfus, in inguen se immiserit, dolorem exhibebit. Si vero sursum ascendens, averfus, & obstruitur fuerit, etiam hic propter raritatem, ac coarctationem dolorem exhibet. Quum vero propter hoc agrotarit, coendendum, ac capitis dolorem facit. Ubi vero uteri impleri, intumuerint, nihil fluit: & pleni sunt: quum autem pleni facti fuerint, coenditque contingunt, dolores exhibent, & in coendidos, & in inguen, & velut pile in ventree discurrunt, & caput dolore affligunt, modo altera ipsius parte, modo totum, prout coarctat ipsi morbus. Haec itaque sic curanda sunt: Si quidem descendit solum, & illini possit, utere, quocumque libet, ex graveolentium genere, aut cedro, aut alii iureto, myrtoto graeci appellato, aut aliquo alio ex graviter, & male olentium numero, eoque sursum facito, & fomenta ne adhibito, neque cibo, neque potu utinam ciente hoc tempore utitor, neque calida lavato. * Si autem sursum ascenderit, & non averfa fuerit, medicamentis oppositis bene oleantibus, & quae similia calefaciunt, utere. Velut sunt myrrha, aut tinguentium, aurialud quoddam odoratum, sinuque calefactorum. Et his quidem subditis uteris, fomentum autem ex infusis ex vino adhibebis, & calida aqua lavabis, & utinam cientes uteris. Ex hoc autem manifestum fit, averfa sit, nec ne. Si enim sursum progressa averfa non fuerit, fluxus procedit, si vero averfa sit, fluxus, menstrua appellata, non contingit. Hunc morbum fomento primum tali curare oportet. In vinum grossos immittito, ipsumque vinum calfacto, & cucurbitam circum osculum vasis, in quo calefit, addito hoc modo. Cucurbitam per medium dissectam evanato, & immittite ipsius modice rescissa, velut in utriculis fieri solet, hanc ipsam vasi, velut operculum circumdato, quo odor per angustiam means ad uterum perferatur. Insuper autem & calida aqua fovere, & calefacientibus medicamentis subditis uti oportet. Calefacientia autem sunt ea, quae ducunt ex superius relatis, nemque haec. Stercus bubulum, fel bubulum, myrrha, alumen, galbanum, & si quod aliud eiusmodi est. Plurimis etiam ipsarum per purgantia inferne medicamenta alvus subducenda est, & per debilia, quae vomitum faciunt, ne evacuatio ex supervacuatione fiat. * Ceterum subditis glandulas sic facere oportet, si fortes facere velis. Mel semicolum factio, & ex praescriptis subditis pharmacia ea, quae valde efficacis sunt, immittito, & ubi immiseris, glandulas formatio instat earum, quae in sedem induuntur, verum longas facito has, ac tenues. Mulierem vero supinam reclinato, lo-

eis a pedibus lecti altius insignatis, deinde apponito, & panniculo intecto, aut a-
lia quadam re confusim calfacito, donec colliquecat. Si vero debiliorem glan-
dulam subdere velis, in linteolum illigato. Sed & si humore pleni utri osculum
tumidum habuerint, & non fluxerint, fluxionem facere oportet, & subditiis phar-
macis sanare, utemque fomentis, velut scriptum est, ita faciendo, velut in proce flux-
ione suppressa. Quia & si in anteriorem partem procedens, uterus averius fue-
rit, fluxionem facere oportet, velut in superiore fluxione suppressa. Quum vero
fluxus nimis fuerit, neque calida aqua, neque alio quopiam calefacere oportet, neque
urinum cientes uti, neque cibis alvum subducentibus. Lecti autem partes a pedi-
bus altiores esse oportet, ut ne declinatio fluxui facilitatem præbeat. Utere au-
tem simul etiam subditiis adstringentibus. Fluxiones porro, quum confestim
venerit purgatio, statim subruentz sunt; quum vero tardius prodierit, purulentz.
Et junioribus subruentia magis prodeunt. Seniores vero magis mucosa menstrua
habent.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE AERE, AQUIS, ET LOCIS.

Argumentum in Labrum sequentem.

- 1 Anni temporum ratio, Prætorum, Aquarum, Civitatum situs, Terrarum differentia, Diata hominum diligenter a Medico observanda.
- 2 Affirmitas cum medicina cognatio, De Ventorum ratione in genere, De civitatum Additionaliis, seu eandem ventis, aquis, & morbis, singulis atatibus, atque anni temporibus vermetulis.
- 3 Urbium bene sitarum commoda. Aestate sicca morbi citius sedantur. Phlegedena hyeme humida oriantur. Hyems frigida quos morbos faciat. Boni potiores qui. Crapula.
- 4 Morbi in hac constituitur mulieribus, pueris, & viris familiares. Convulsiones, & arbolesationes pueris familiares morbi. Morbus sacer convulsiones signat. Alvin liquida morbi acuti non proveniant. Lippitudines humida non graves, nec durantes. Semper considerati ex cerebri destinationibus.
- 5 De Civitatum septentrionalium situ, aquis, ventis.
- 6 Morbis acutis obnoxii qui. Lippitudines duræ, ac vehementes. Sanguinis e naribus fluxiones. Morbi præ. Longæ vita homines. Morbus scilicet.
- 7 Morbi mulieribus familiares. Sacrilicatus causa. Lac, aquarum duritia, & cruditas extinguunt. Tabes a partu frequentes. Morbi pueris familiares. Hydrocephalum.
- 8 De civitatum Orientalium situ, & accidentibus. Aquæ Orientalium omnes splendide, odorata, molles, & amabiles. Sol aquas illustrat, & castigat. Corporum eorum constitutiones. In civitatibus Orientalibus morbi paviores, ac debiliores. Mulieres in Orientalibus facile patiunt.
- 9 Civitatum ad occasum sitarum consideratio. Aquæ Occidentales cur decoloræ, infirmi, ac vocis gravis plerumque præditi. Ventis occidentales autumno similes.
- 10 De aquarum differentis in genere. Splenes magni, ac pleni: ventres duri, ac calidi ex aquis lacustribus. Flumen, clavicula, & facies attenuata ex aquis palustribus.

- 11 Aquæ palustres edaces, ac sterculosas faciunt. Hydrops pluvialis, ac lathelissimus. Morbi alivales occidentales familiares. Dysenteria. Alvi profluvia. Febres quartana.
- 12 Morbi hyemales in occidentalibus. Peripneumonia. Infans morbi. Febres ardentes propter ventris duritiam. Tumores in mulieribus. Pituita alba. Hæmorrhæmorrhæ, Varices virorum. Ulcera in ipsis. Adulieres cur in se in utero habere sape falso credant. Aquæ palustres ad omnem rem improba.
- 13 De Aquis fontanis. Aquæ duræ quæ. Aeris, argenti, auri, &c. generationis causa.
- 14 Aquæ optima. Aquæ salsa, cruda, ac dura. De aquis quibusdam morbis, & naturis commotis.
- 15 Aquæ pessima. Aquarum discrimina sanis non observanda.
- 16 Quæ aquæ alvum solvant, aut fistant. Cur aquæ salsa alvum (in vulgo putatur) non solvant.
- 17 De Aquis pluvialibus, & cur hæ levissimæ, dulcissimæ, tenuissimæ, ac splendidissimæ. Spl. quod tenuissimum est in aqua, item in hominum corporibus edunt, & sanum rapit. Partes corporis soli exposta cur non exsulent.
- 18 Aquæ pluvialis cur cito putrefcat, & odorem malam habeat. Cætera omnia dulcia sunt.
- 19 Pluvia generatio. Aquæ pluviales cur coquenda, & excolenda.
- 20 De aquis ex nive, & glacie generatis. Aquæ coactata.
- 21 Aquæ a nive, aut glacie eliquata. Aquarum contriventionem, & de magnis fluminibus, & stagnorum, qui morbi peculiares. Aquæ invectiva. Aquam aquæ huiusmodi esse similem.
- 22 Aquis, ventorum differentia sape robur exhibent. Urinam qui facile, & difficulter evocant.
- 23 Calculi generatio. Cur pueri calculosi putenda fricant, ac trahant. Calculoso-

rum urinae est splendidissima.

- 24 Quale hoc pueris calculum generet. Visum a-
quosum lacte puris saluberrimum. Mulieres
enim non sicut calculosa. Mulieres enim pueris
plus bibunt. De anni salubritate, aut
morbosi praenotione.
- 25 Annus saluberrimus qui sit. Hyems sicca,
& borealis: ver autem pluviosum, &
australe quos morbos adferat. Febris pitui-
tissima quando omnibus, maxime vero pitui-
tiosis accidant.
- 26 Dysenteria viris, & mulieribus quando i
Tempestas ex aqua, & Ectharum spiratione
circa canaliculum. Hydrops ex quartanis.
Hyems australis, & pluviosa morbi.
Mulieres abortiunt. Pueri tenues, ac
debiles eduntur.
- 27 Dysenteria, & Lippitudinis causa. Deflu-
xiones in valde febribus qua de causa
contingant. Intestinarum levitates, & a
qua interius.
- 28 Aestas pluviosa, & australis morbi peculiar-
res. Hyems morvida. Febris ardens, &
Cochlearum inflammationes. Pleuritis. Peripneumonia.
Aestas sicca, & borealis. Capitis dolores. Cerebri corruptiones.
- 29 Autumni borealis, & siccus constitutio. Pitui-
tiosi quando saluberrime decessant. Biliosi
quod anni tempus incidunt. Lippitudines
aride. Febris acuta, ac diuturna. Billis
atra.
- 30 In magnis temporum mutationibus neque Medici-
nae exhibenda, neque chirurgica admini-
stranda. Solstitia, & Equinoctia periculosa.
Abstrahi observatio ad morborum
iudicium necessaria.
- 31 Quantum Europa, & Asia inter se differant.
Asian ab Europa secundum naturas omnium
plurimum differre. Cur Asiani mansuetiores,
benigniores, & ceteriores.
- 32 Regiones in medio solis cuncta sua cum omni-
um fertilissima. Homines palestiores, &
minime differentes quantum ad formam,
& corporum proceritatem atque in Asia.
- 33 Asia ab naturam regionis optime temperata
proxime accedere.
- 34 De his qui ad dextram Hyberni ortus solis
usque ad Atlantidem paludem habitant.
Europa, ac Asia terminari. Temporum
magna, ac frequentissima mutationes, re-
giones aereales, & inaequales. Varias item,
& multiplices hominum formas producant.
Homines regionum naturas referunt.
- 35 De Generatione, qua plurimum legibus, ac
consuetudinibus inter se differunt, ac pri-
mum de Adaeocephalis, Maeurocephali-
bus.
- 36 Semen ex omnibus corpora partibus procedere.
- 37 De Phasidis incolis, eorum regione, consue-
tutine, moribus, ac vita. Phasis fluvium
flagrantissimum. Prælium.
- 38 Phasidarum corpora status. Aeris obscuritas.

- Phasis. Cenchras.
- 39 Asiatici cur imbelles. Mutationes temporum
mentem semper excitant, nec quiescere si-
nunt.
- 40 Leges, ipsaque cur homines imbelles reddant.
- 41 Viriles, ac angusti leges avertantur. Gre-
corum, & Barbarorum in Asia, qui for-
tes, & bellicosi credantur. Asiani mo-
dum ipsi inter se differunt.
- 42 De Europæis, ac primo de Sarmatis, eo-
rum visum, moribus, anni temporibus, ac
furnis. Sarmatarum feminae sunt equi-
tiss. Aetoris palus.
- 43 Scytharum forma. Solitudo Scythica. Scy-
tha cur Nomodes vocentur. Scythicarum
curram descripio.
- 44 Bores in Scythia cornibus carent praeregi-
nis ipsius frigore. Pilus Scytharum ratio.
Hippæi quid, Scytharum quemadmodum,
& Argosiorum gens inter se similis exi-
sit. Scytharum femina infensanda.
- 45 Scythica regionis situs. Scythia hyems fere
perpetua.
- 46 Fera in Scythia cur parva. Scytharum ven-
triculi omnes: maxime vero inferior abius
humida.
- 47 Scytharum corpora humida, fluida, ac lata
esse.
- 48 Scythicarum mulierum corpora praeter modum
flaxa. Scytharum gens subter valde coloris.
Scythica gentis viri cur infensandiores.
Scytharum mulierum cur infensanda.
- 49 Cur famula apud Scythas facundiores diviti-
bus. Eunuchi plurimi Scytharum, & quo-
modo fiant.
- 50 Articulationum dolores diuturni ab equitatione.
- 51 Sterilitas ex venarum retro auctu incisione.
Equitatio continua quando Scythis sterili-
tatem inducat. Eunuchorum effluem de-
vinitus Scythis non contingere.
- 52 Scythia cum omnium ad coitum impotentissimi.
Anaxipides, braccarum gentis.
- 53 De reliquis Europæis. Temporum mutationes
circa generationem sentiri, & saepe semi-
nis corrupti causas esse.
- 54 Europæi cur feri, magnanimi, & bellicosi.
Timiditas a desidia, & otio arguitur.
Leges quomodo plurimum ad magnanimitatem
conferant.
- 55 De Europæis, qui animo, & corpore pluri-
mum inter se differunt. Atlantici majora
corpora gerunt. Corpora, & pili nigri a
bile copiosiores.
- 56 Regionem aliam, & planam, ac ventis ex-
positam habitantes quales. Tempora natu-
ras permutant.
- 57 Formae, ac mores hominum regionis natu-
rae plerumque concordant. Regio pinguis, mol-
lis, & aquosa.
- 58 Regionem induram, & asperam natu-
ra. Ex terra nascentia terram respi-
ciant.

SECTIO I.



QUICUMQUE artem medicam integre adsequi velit, primum quidem temporum anni rationem habere debet, quantum potentia quodlibet eorum valeat: non enim simile quicquam in illis existit, verum differunt invicem propter varias, quae in eis sunt mutationes. Deinde ventorum, calidorumque, & frigidorum, maxime qui ex his omnibus hominibus sunt communes, & mox qui in unaquaque regione sunt indigenae, & proprii.

Neque vero negligentem se circa aquarum facultates cognoscendas exhibere convenit. Quenadmodum enim gustu differunt, & pondere, ac statione, sic quoque virtute aliae aliis longe praestant. Quare si quis ad urbem sibi incognitam perveniat, circumspicere oportet ejus situm, quo modo scilicet ad ventos, & solis exortus jaceat: non enim aequales vires sunt ad Septentrionem sitae, & vergentis ad Austrum: neque ejus, quae solem exorientem, & quae eundem occidentem spectat. Haec itaque diligenter oportet perscrutari, ac simul quo modo habeant circa eam aquae: num ne palustribus utantur, & mollibus, aut duris, & ex sublimi loco prolabantibus, & lacerantibus ex petris, sive salis, & crudis. Terra etiam ipsa consideranda, nudane sit, & aquis carens, aut densa, & aquosa, & an concava sit, & aestuosa, vel alta, & frigida, hominum insuper diata perquirenda, quae maxime capiantur. An bibuli sint, & lurgones, & otio dediti, aut exercitiis variis utentes, & tolerantiores laborum, ciborumque plus adperentes, quam poculorum. Ex his enim singula sunt investiganda. Nam qui haec omnia probe, quantum fieri potest, cognoverit, aut horum plurima, cum non latere possint, quam in urbem etiam ignotam sibi pervenerit, neque morbi regioni peculiare, & parvi, neque communis regionis natura, quaecumque tandem ea fuerit, ut quoniam possit in cognoscendis morbis dubius haerere, aut errare, sicubi ad morborum-medicationem adhibeatur. Quae ambo illis evenire solent, qui non prius providi haec diligenter cognoverunt. Quare qui ea studiose rimatus fuerit, uniuscuiusque temporis, ac anni futuri constitutionem praedicere poterit, qui videlicet morbi communis adfectione civitatem sint invasuri tum aestate, tum hyeme, & quaecumque pericula unicuique sint timenda ex diata, ac victus immitatione: quum enim temporum mutationes, & astrorum ortus, ac occasus observaverit, quenadmodum singula horum eveniant, praenoscet utrique & de anno, qualis hic sit futurus: hoc namque modo si quis rimatus fuerit, ac praecognoverit temporum occasiones, maxime de singulis sciet, ut plurimumque sanitatem adsequetur, & recta via procedet, non minima artis suae gloria. * Quod si cui haec sublimiora videantur, is, si ab hac sententia discedat, dicet sane non minimam partem conferre, ad rem medicam ipsam Astronomiam, sed omnino plurimam, quum una eum temporibus & ventriculi in hominibus mutantur. Quomodo autem singula, quae diximus, scrutari ac explorare oporteat, deinceps dicam manifeste. Quaecumque quidem civitas ad ventos sita est calidos: puto autem eos, qui inter brumale solis exortum, itidemque occasum perflant: huic hi venti sunt peculiare. A Septentrionalibus autem ventis tuta, ac prosecta ea civitas existit: Aquae vero ejus multae, & sublimae sunt, & necessario non sublimis: aestate quidem calidae, hyeme frigidae. * Et quae quidem urbes bene sitae sunt ad solem, & ad ventos, & aquis bonis utuntur, haec minus a calibus mutationibus afficiuntur. Quae vero aquis palustribus, ac lacustribus utuntur, & non bene sitae sunt ad ventos, & ad solem, haec magis. Et si quidem aestas sicca fuerit, citius sedantur morbi. Si vero pluviosa, diuturni sunt: & phagedaenas adedentes ex omni occasione oboriri verisimile est, si ulcus fiat. Si vero hyems frigida sit, homines capita humida, ac pituitosa habere par est, & ventros ipsorum frequenter exturbati, pituita a capite influente, & formas ipsorum usquehominum debiliores esse, ipsosque ad edendum, ac bibendum non appositos esse. Nam qui capita debilia habent, non fuerint boni potores. Crapula enim magis gravat. * Morbi vero hi ipsis vernaculi sunt. Primum quidem mulieres morbofae, ac fluxionibus obnoxiae sunt: deinde multae steriles sunt ex morbo, non a natura, & frequenter abortiunt. Pueris vero iucidunt convulsionem, acanthelationes, quae morbus puerorum, & facer esse putantur. Viris autem dysenteriae, & alvi profluvia, & sepes lenes, diuturnae, hyemae, & pustulae nocturnae multae, & haemorrhoides in sede. Pleuritides autem, & peripneumoniae, & febres ardentes, & quicumque acuti morbi putantur, non multum proveniunt. Non enim fieri potest, ut isti morbi vigeant, ubi alvi liquidae existunt. Lipitudines vero oboriturum humidae, non graves, nec diuturnae: si non ex mutatione temporum morbis aliquis omnibus communis occupet. Et ubi quinquagesimum annum transgressi fuerint, defluxiones ex cerebro accedentes, homines semisphydetatos faciunt, ubi caput derepente insolanum, aut frigore correptum fuerit. Atque hi quidem morbi ipsi vernaculi sunt: praeterquam si morbus aliquis omnibus communis ex temporum mutatione oboritur, nam & huius participes sunt. * Quaecumque vero civitates his

- ex opposito sita sunt ad ventos frigidus, inter occasum solis æstivum, & orientem æstivum: etiam ipsi hi venti vernaculi, ac indigeni sunt: ab austro vero, & calidis ventis protectæ sunt. Et de his urbis sic se res habet. Primum quidem aquæ & duræ, & frigide ut plurimum dulcescunt. Homines autem vegetos, & siccos esse necesse est; & plures ventres infernos crudos, ac duros habere: supernos vero fluidiores, biliososque magis, quam pituitosos esse. Capita vero sana, ac dura habent, & plerumque vasa ipsi rumpuntur. Morbi autem populares ipsi hi sunt pleuritides, & quos acutos esse receptum est. Necesse est autem ita habere, quum alvi duræ existant, & lippurati multum ex omni occasione sunt. Huius autem causa est corporis extensio, ac ventris duritia. Siccitas enim, & aquæ frigiditas facit, ut vasa rumpantur. Edaces autem tales naturas esse necesse est, & non multum bibaces. Non enim fieri potest, ut simul multum edant, ac bibant, Lippitudineque his fieri ex temporis intervallo necesse est, duras autem, ac vehementes, & statim oculis rumpi. Sanguinis item ex naribus fluxiones vehementes æstate fieri junioribus triginta annis. Morbos etiam fieros appellatos, paucos quidem, verum vehementes. Longæ vero vitæ magis, quam alios, hos homines esse par est, & ulcera non pituitosa oboriri, neque essetari. Mores vero magis feros, quam mansuetos. Ac viris quidem hi morbi vernaculi sunt, præterquam si quis omnibus communis ex temporum mutatione ingruat. Ex mulieribus vero, primum quidem multæ steriles sunt propter aquas, quæ duræ sunt, ac crudæ, & frigide. Purgationes enim mensium non contingunt commodæ, sed paucæ, ac pravae. Deinde parituri difficiliter, & non valde abortiunt. Ubi vero pepererint, pueros nutrire non possunt. Lac enim ab aquatum duritia, ac cruditate extinguitur; & tabes frequentes a partu sunt. Præ violentia enim ruptiones, ac vulluras habent: pueri autem hydropes in testibus sunt, quamdiu parvi fuerint; deinde ætatis progressu evanescent. Pubescent autem sero in hac civitate. Et de calidis quidem ventis, ac frigidis, & urbibus ad hos sitis, hoc modo, velut dictum est, res se habet. Quæcumque vero civitates sitæ sunt inter æstivos, ac hybernos solis ortus, & quæcumque ex opposito harum, de his ita habet. Quæ quidem ad orientem solem sitæ sunt, eas par est esse salubriores his, quæ ad septentrionem conversæ sunt, & his, quæ ad calidos ventos sitæ sunt, etiam si stadium solum inter sit. Primum enim moderator est caliditas, ac frigiditas; deinde aquas, quæ ad solis ortus sunt, omnes splendidas esse necesse est, & odoratas, & molles, & amabiles oriri in hac civitate. Sol enim emergens, ac illustrans ipsas castigat. Matutinum enim tempus ipse aer ut plurimum semper occupat. Et hominum formæ boni coloris sunt, & magis floridæ, si non quis alius morbus prohibeat. Et clara voce præditi sunt homines, & ad iram, ac intelligentiam præstantiores septentrionalibus, si quidem & alias, quæ in ipsa nascuntur, meliora existunt. Et civitas, quæ hoc modo sita est, veri maxime similis est iuxta caliditatem, ac frigiditatem moderationem. Et morbi pauciores sunt, ac debiliores, similesque sunt morbis, qui in civitatibus ad ventos calidos conversis oriuntur. Et semina isthic valde fecundæ sunt, ac facile pariunt. Et de his quidem ita habet. Quæ vero ad occasum sitæ sunt, & ipsæ a ventis ab oriente spirantibus protectæ sunt, & tum calidi venti leviter assant, tum frigidi ab Ursis præterflant; eas urbes necesse est situ morbosissimo politas esse. Primum enim aquæ non sunt splendida. Causa vero est, quod aer matutinum tempus ut plurimum occupat, qui aquæ immixtus claritatem eius disperdit. Sol enim, priusquam elevetur, non illustrat. Æstate vero, mane quidem autæ frigide spirant. & ros decedit, de cætero vero sol ad ipsas occidens, quam maxime homines persequitur. Quapropter etiam decolores, ac infirmos ipsos esse par est, & ex omnibus prædictis morbis participare. Nulla enim ab ipsis separantur. Verisimileque est ipsos gravi voce præditos, ac raucosos esse propter aerem, eo quod impurus plerumque isthic est, & morbosus. Neque enim ab aquilonatibus valde expurgatur. Non enim perseverant venti. Qui vero perseverant, ac ipsis incumbunt, aquosissimi existunt. Nam venti occidentales similes sunt autumnis. Et huiusmodi civitatis situs est ad diæ mutationes, eo quod multum temporis inter matutinum, ac vespertinum intercedit. Et de ventis quidem, qui commodi sunt, ac incommodi, ita se res habet. Cæterum de aquis deinceps narrare volo, quæ morbosæ sunt, & quæ saluberrimæ: & quæ mala ab aqua fieri verisimile est, itemque quæ bona. Plurimam enim partem conferunt ad sanitatem. Quæcumque igitur palustres sunt, & stabiles, ac lacustres, eas necesse est æstatem esse calidas, ac crassas, & calentes. Quum enim non desistant, sed aqua pluvia semper nova inferatur, & sol urat, necesse est ipsas decolores esse, & pravas, ac biliosas. Hyeme vero glaciatas, & frigidas, ac turbatas præ nive, ac glacie, ut pituitosissimæ, ac raucosissimæ existant: Bibentibus autem splenes semper sunt magni, ac pleni: & ventres duri, tenues, ac calidi. Humeri vero, & claviculæ, & fauces atrenuata. In splenem enim etiam colliguntur, quapropter graciles existunt. Edaces autem esse tales, ac feticulosos par est, ventresque tum supinos, tum infernos calidissimos habere, ut etiam fortioribus medicamentis opus habeant. Atque hic morbus ipsis & æstate, & hyeme familiaris est. Ad hæc etiam hydropes plurimi, ac lethaliissimi sunt. Æstate enim dysenteria molesta, ac alvi profluvia incidunt, & febres quartanæ diuturnæ. Hi autem morbi prolongati, tales naturas ad hydropas deducunt;

- 12 eunt, ac occidunt. Et hi quidem morbi ipsis aestate fiunt. * Hyeme veto junioribus qui- 135
dem peripneumoniae, & infantiae morbi. Senioribus vero febres ardentes pro-
pter ventris duritiem. Mulieribus autem tumores oboriuntur, & pueritia alba, & vix
in ventre concipiunt, ac difficulter pariunt, & foetus magnos, ac tumidos: deinde
ex alimentis tabescentes, ac depravati fiunt, & purgatio commoda post partum
mulieribus non congruit. Pueris vero herniae accedunt, & viris varices, & ulce- 140
ra in tibia. Quare fieri non potest, ut tales naturae longaeve sint, sed ante temporis
adventum senescunt. Praeterea foeminae se in utero habere putant, & ubi partus tem-
pus adest, ventris moles illa, ac plenitudo evanescit. Hoc autem contingit ex aqua,
quum uteri ex aqua concepta laborant. Atque has quidem aquas ad omnem rem
- 13 improbas esse, censeo. * Secundo vero loco eas, quarum fontes e petris scatu- 145
riunt, duras enim esse necesse est; aut isthuc, ubi calidae aquae existunt, aut ferrum
nascitur, aut aes, aut argentum, aut aurum, aut sulphur, aut alumen, aut bitumen,
aut nitrum: haec enim omnia pra violentia caloris nascuntur. Non itaque ex hu-
jismodi terra aquae bonae prodeunt, sed durae, & aestuosae, quae & difficulter
- 14 minguntur, & ad alvi egestionem contrariae sunt. * Optimae vero sunt, quae ex 150
sublimibus locis, ac terreis collibus fluunt. Haec enim & dulces sunt, & albae, &
vinum modicum ferre possunt, & hyeme calidae sunt; aestate vero frigidae. Ta-
les enim fuerint ex profundissimis fontibus. Maxime vero laudare eas oportet,
quarum fluxiones ad solis exortus erumpunt, & praesertim ad aestivos. Necess-
e est enim odoratas esse, ac leves. Quaecumque vero salinae, & crude, ac du- 155
rae sunt, ad hoc quidem ut eas omnes bibant, non bonae sunt. Sunt tamen ali-
quae naturae, & morbi, quibus tales aquae in potu commode sunt, de quibus
statim dicam. Habet autem & de his hoc modo. Quae quidem aquae fon-
tes suos ad orientes habent, haec pra omnibus optimae sunt. Secundum ab his
locum habent, quae inter aestivos solis exortus, ac occasus emergunt, & magis 160
haec, quae ad orientes. Tercio locum sunt; quae inter occasus aestivos, ac hybernos
- 15 scaturiunt. * Pessimae vero, quae ad austrum, & quae inter aestivum ortum, & occa-
sum. Et haec quidem ad australes partes valde pravae sunt, ad boreales vero me-
liores. His autem hoc modo uti convenit. Quisquis sanus est, ac valet, is nul-
lum discrimen faciat, sed semper eam, quae praesens est, bibat. Quicumque vero mor- 165
bi gratia eam, quae commodissima est, bibere volet, is, si ita fecerit, maxime sani-
tatem assequi poterit. Quorum quidem ventres duri sunt, & idonei ad hoc, ut
amburantur, his dulcissimae, & levissimae, ac splendidissime conducunt. Quo-
rum vero molles ventres, & humidi, ac puitosi sunt, his durissimae, & crudissi- 170
mae, ac subsalsae aquae conferunt. Sic enim maxime resiccare poterint. * Quaecumque
- 16 enim aquae optimae coctae sunt, ac facillime liqueunt, eas par est & ventrem ma-
xime exolvere, ac eliquare. Quae vero crude sunt, & minime coctae bonae, haec
magis costringunt ventres, ac resicant. At enim mentiuntur homines de salis aquis
propter imperitiam in eo, quod per alvum secedere, eamque solvere putantur. Maxi-
me enim contrariae sunt ad alvi egestionem, ac secessum. Sunt enim crude, & coqui non 175
possunt. Quare ventri magis ab ipsis adstringitur, quam eliquatur. Et de fontanis
quidem aquis hoc modo res se habet. De pluvialibus autem, & quae a nive sunt,
ut habeat, deinceps dicam. * Aquae igitur pluviales levissimae, & dulcissimae, &
tenuissimae, ac splendidissimae sunt. Primum enim sol, quod tenuissimum, ac levis- 180
simum est, in aqua educit, ac sursum rapit. Clarum autem hoc ipsum mare facit. Quod
enim salum est, isthuc relinquitur pra crassitudine, ac gravitate, & fit mare. Quod
vero tenuissimum est, sol sursum rapit pra levitate. Rapit autem tale non solum ab
aquis stagnantibus, sed etiam ex ipso mari, & ex omnibus, in quibus aliquid hu- 185
moris inest. Inest autem in omnibus rebus. Et ex ipsis hominibus tenuissimum,
ac levissimum humorem ducit. Eius rei maximum signum inde sumere licet, ubi ho-
mo vestibus indutus in sole iter fecerit, aut sederit. Quasque enim corporis par-
tes sol aspicit, haec non exsunt. Sol enim quicquid comparat sudoris, sursum ra- 190
pit. Quae vero sub veste coactae sunt, aut sub aliqua alia re, haec exsunt. Edu-
citur enim, ac domatur a sole sudor, servatur autem ex tegmentis, ut ne disperda-
tur a sole. Quum vero in umbram devenerit, totum corpus similiter sudore per-
fluit. Non enim amplius sol affulget. * Quapropter etiam ex omnibus aquis haec cissi- 195
sime putrescent: & odorem malum pluvialis aqua habet, eo quod ex plurimis
congregata est, ac permixta, ut cississime putrescat. Ad haec vero, ubi rapta est, &
in sublime elevata, dum circumfertur, & ad aetrem permiscetur, quod turbidum est
in ipsa, ac noctem refert, id excernitur, ac decedit, & fit aer, & nebula. Quod 195
vero tenuissimum est, ac levissimum in ipsa, hoc relinquitur, ac discescit, dum a sole
uritur, ac coquitur. Fiunt autem & alia omnia, quae coquuntur, semper dulcia.
- 19 * Quando igitur dispersa fuerit, & nondum congregata, fertur sublimis; ubi vero
coacta fuerit, ac simul congregata repente a ventis inter se adversariis, tunc
deorsum prorumpit, qua parte plurima collecta fuerit: tunc enim hoc magis 200
fieri verisimile est, quum nebulas a vento stabilitatem non habente concitatas, ac pro-
cedentes, repente ventus contrarius, ac aliae nebulae resisterent: atque tunc qui-
dem prima ipsius pars congregatur; quae vero a posteriore parte sunt, insuper

- accedunt, & sic crassescunt, & nigrescunt, ac simul congregantur, & præ gravitate deorsum prorumpunt, & pluviae fiunt. Atque hæc quidem aquæ optimæ sunt secundum hanc rationem. Verum opus habent, ut decoquantur, ac excolantur. Similius, odorem prævium habent, & raucecines, & vocis gravitatem bibentibus inde accedere par est. * At vero aquæ ex nive, ac glacie hentes, omnes malæ sunt. Quæ enim semel concretæ fuerint, non amplius in pristinam naturam restituntur. Sed quod quidem in ipsa clarum, ac leve, & dulce est, excernitur, ac disperditur. Quod vero turbidissimum est, ac pouderosissimum, relinquatur. Hoc vero cognoveris hoc modo. Si enim volueris hyemis tempore vasculum, certa aquæ mensura infusa, sub dio exponere, quo maxime congeletur, deinde postmodum in locum calidum deportatum sinere, quo maxime glacies liqueat, & ubi exoluta fuerit, a-
- quam meriti reperies aquam multo pauciorē. Atque hoc signum est, quod a congelatione id, quod levissimum, ac tenuissimum est, disperditur, & non quod gravissimum, ac crassissimum existit. Non enim hoc disperdi poterit. Hæc igitur de causis has aquas, quæ a nive, ac glacie eliquantur, pessimas esse puto ad omnes res. Itemque eas, quæ ad has sequuntur. Atque sic quidem de pluvialibus, & nivibus, ac glacialibus aquis res se habet. * Calento vero maxime laborant homines, & ex rheumatis affectionibus, & urinae stillicidio, & coxendicium morbo corrigiuntur, & heruæ fiunt, ubi aquas omnigenas bibunt, & de magnis fluminibus, in quæ alia deferuntur: & de stagno, in quod fluxiones multæ, ac omnis generis deveniunt. Er qui aquis invecitis utuntur, quæ ex longo, & non brevi locorum intervallo afferuntur. Non enim fieri potest, ut alia aqua similis sit alii. Sed aliæ dulces sunt, aliæ salæ, & aluminosæ, aliæ de calidis fiunt. Ubi vero hæc simul inter se miscuerint, dissident: & quæ forrissima est, semper superat. Prævalet autem non semper eadem, sed alias alia. * Sed & ex venis, alii quidem Boreas robur exhibet, alii vero Austro, & de reliquis eadem ratio existit. Talibus igitur necesse est humum, & arenam in valis subdere, & ab his, si poterint, morbi prædicti fiunt. Quod autem non omnibus, consequenter declarabo. Quorum quidem alvus satis fluida est, ac laeta, & vesica non ardens, neque stomachus vesicæ valde coarctatus, hic facile urinam ejicitur, & in vesicâ nihil ipsis congregatur. Quorum vero alvus ardens, ac servida fuerit, in his necesse est etiam vesicam idem perpeti. Quum enim magis, quam pro natura fuerit calefacta, stomachus ipsius inflammatur. Ubi vero hæc perperit, urinam non dimittit, sed in seipsa concoquit, & adurit: & quod quidem tenuissimum in ipsa est, excernitur: & quod purissimum est, transiit, & emingitur. * Quod vero crassissimum, ac turbidissimum est, coacervatur, & concrecit: primum quidem parum, deinde magis fit. Dum enim volvitur ab urina, quicquid crassum compactum fuerit, ad seipsum adaptat, atque sic appesceat, & in rosam concrecit. Et quum urinam emittit, ad vesicæ stomachum allabitur ab urina impulsus, & urinae vehementem impedit, & dolore vehementem exhibet. Quare pueri calculosi fruant, ac trahunt pendula. Videtur enim ipsis causa mictionis eo loco esse. Signum autem ejus, quod hæc ita se habent, hoc est. Urinam splendidissimam calculosi mingunt ad similitudinem feri, eo quod id, quod crassissimum est, ac biliosissimum isthic manet, & coacervatur, ac concrecit. Er plerique sane hoc modo lapidem, & calculum contrahunt. * Fit autem pueris etiam ex lacte, si non salubre id fuerit, sed valde calidum, ac biliosum. Venrem enim percalefacit, & vesicam. Quare tempa, dum aduritur, hæc paritur, & sane senio melius esse pueris vinum quam aquam quodissimum dare. Minus enim venas adurit, ac resiccat. Muliebribus autem pudendis non simpliciter contingit. Meatus enim urinæ in vesicâ brevis est, & amplius, ut facile urina impellatur. Neque enim manu pudendum fricat, veluti masculis, neque urinæ in vesicâ mearum contingit. Ad pendula enim perforatus est. Et quia meatus sunt amplius, etiam plus bibunt, quam pueri. Et de his quidem sic res se habet, ant his quam proxime. * Cæterum de annis hoc modo consideratione facta quis cognoscere possit, qualisnam annus sit futurus, salubrisque, an morbosus. Si enim secundum rationem fiant signa in astris occidentibus, ac orientibus: & in autumno aquæ fiant: & hyems sit moderata, & neque valde clemens, neque modum excedens frigiditate: & in vere, ac in æstate tempestive pluat: sic sane saluberrimum esse annum, par est. Si vero hyems quidem sicca sit, & borealis: ver autem pluviosum, & australe, necesse est æstatem febriolosam fieri, & lipitudines inducere. Quum enim æstus de repente accedat, terra humida existente a vernis imbribus, & ab austro: necesse est, æstus duplicatum esse & a terra irrigua, ac calida, & a sole urente: quum ventres in hominibus nondum contracti sint, neque cerebrum resiccatum. Non enim fieri potest, quum ver rale existat, ut corpus, & caro non humore fluida fiant, adeo ut febres acutissimæ in omnes iterant: maxime autem in pituitosos. At dysenterias par est fieri & mulieribus, & viris humidioribus. * Et si quidem circa canis exortum accedat aqua, ac tempestas, & Erefiæ spiraverint, spes est cessationis, & ut autumnus salubris fiat. Sin minus, periculum est, ne & pueri, & mulieres moriantur: Minime vero senes: & ne qui superstites evadunt, in quartanas desinant, & ex quartanis in hydropas. Si vero hyems australis fiat, & pluviosa, & clemens: ver autem boreale, & sicuni, & tempe-

tempestuosum: primum quidem mulieres, quæ uterum gestant, & partus ipsæ ad
ver insit, abortum facturas esse verisimile est. Quæ vero etiam pepererint, im-
potentes, ac morbosos pueros parere, ita ut aut statim pereant, aut tenues, & debi-
les, ac morbofi vivant. Atque hæc quidem mulieribus; reliquis vero dysenterias, &
27 lippitudines siccas, & aliquibus defluxiones a capite in pulmone. * Pituitosis igitur
dysenterias fieri verisimile est, & mulieribus, pituita de cerebro defluente,
propter naturæ humiditatem. Biliosis vero lippitudines siccas, propter carnis calidita-
tem, ac siccitatem. Valde autem senibus defluxiones, propter raritatem, ac eliqua-
tionem ventrum, adeo ut aliqui quidem derepenre pereant: alii vero semisidera-
ti aut dextra, aut sinistra parte fiant. Quum enim hyems sit australis, & pluvio-
sa ac calida, & corpus non adstringatur, neque venæ: vere accedente boreali, &
siccio, ac frigido: cerebrum postquam ipsum dissolvi, ac purgari contigit, a gravedi-
ne, ac rancidine tunc simul eum vere stabilitur, ac construngitur. Quare derepen-
te æstare accedente, & ardore, ac mutatione contingente, hi morbi incidunt. Et
28 intestinorum levitates, & aqua intercus fere reliquis morbis desinentibus superve-
niunt, quum non queat facile venericuli a concepta humiditate exsiccati. * Si
autem æstas pluviosa sit, & austro multum persfletur, similis sequatur autumnus,
necesse est hyemem morbidam esse, & his, qui pituita abundant, & qui quadragesi-
mum annum excesserint, febres ardenfes fieri verisimile est, qui vero bile abun-
dant, costarum inflammationes, & pulmonis, pleuritidas, ac peripneumonias di-
ctas. Si vero æstas sicca existat, & borealis: sequens vero autumnus pluviosus, &
australis, capitis dolores ad hyemem expectare convenit, & cerebri corruptiones,
29 ampliusque rancedines, gravedines, & tussis, aliquibus etiam tabes. * Quod
si Borealis sit autumnus, ac siccus, & neque sub caniclam, neque sub Arcturi occasum
pluviosus, confert pituitosis uatura, & maxime qui natura sunt humidi, & mulieri-
bus. Biliosis autem infestissimum hoc tempus existit. Valde autem exsiccantur, acci-
dantque eis lippitudines aridæ, & febres acutæ, ac diuturnæ, & aliquibus bilis atra,
siquidem quod liquidissimum, & aquosissimum in bile est, consumitur: densissimum ve-
ro, & acerrimum relinquitur, quod idem accidit secundum eandem rationem, & circa
sanguinem, unde hi morbi his accidunt: pituitosis autem hæc omnia commoda sunt.
Exsiccantur enim, & in hyemem perduntur, minime humecti, sed reficcati. Hæc igitur
si quis mente concipiat, & considerabit, is præcognoscat plurima omnino, quæ
30 ex huiusmodi mutationibus sint futura. * Maxime autem observare oportet magnas
temporum mutationes, ut neque medicinas in illis libentes exhibeamus, neque uramus
quæ circa ventrem, neque secemus, priusquam prætereant dies decem, aut plures, &
non pauciores. Periculosissima sunt etiam ambo solstitia: maxime vero æstivum. Peri-
culosum etiam æquinoctium utrumque: magis vero autumnale. Oportet autem & astro-
rum exortus considerare, præcipue canis, deinde arcturi, & Plejadum occasum. Mor-
bi enim in his maxime diebus judicantur, aliqui perimunt: alii vero desinunt, aut
in aliam speciem, aliumque statum transmutantur. Et circa hæc quidem, sicut dixi, habet,

SECTIO II.

31 * Volo autem & de Asia, & Europa demonstrare, quantum differant inter se
per omnia, & de gentium formis quid distent, & nihil invicem simile habeant. Verum
de omnibus si quis dicere velit, in immensum exeresceret sermo, quare de maxi-
mis, & plurimum differentibus diversitatibus dicam, quantum saltem mihi in ea re est
comptum. Ac dico quidem plurimum differre Asiam ab Europa secundum naturas
omnium ex terra nascentium, itemque hominum. Longe enim pulchriora, & maiora
omnia nascuntur in Asia. Estque regio ipsa hæc nostra multo mansuetior, sunt etiam
hominum mores benigniores, & cultiores. Causa vero horum est temporum an-
ni temperata mixtura. Siquidem in medio solis exortu sita est ad auroram, a fri-
giditate, ac caliditate omni remotior. Incrementum autem, & benignitatem inde pro-
ficifici, omnibus in confesso est, quum nihil sit præcellens, & cogens violentem, sed
per omnia aequalitas vigeat, quamquam non habeant ubique per omnem Asiam om-
nia secundum eundem modum. * Quicumque enim in ea regio in medio sita est calidior,
32 & frigidi, ea omnium fertilissima existit, & arboribus refertissima, & maxime se-
rena, aequique utitur & coelestibus, & ex terra peomanantibus. Neque enim a calo-
re combusta est valde, neque a squalore, & aquarum inopia exsiccat, neque a frige-
re oblaeditur. Verum anstris perfatur, & irrigua est tum propter imbres multas,
tum propter nives. Fructus autem suo tempore maturos multos in ea nasci par est,
sive ex sparsis seminibus hi proveniant, sive terra ipsa per se sponte producat eor-
um plantas, quarum fructibus utuntur homines, eas ex agrestibus cicures, & dome-
sticas facientes, & pro commoditate sua transplantantes. Pecora etiam ipsa ple-
niora proveniunt, quæ & parit sæpius, & pulcherrime educantur. Quin & homi-
nes habitiores esse, ac specie pulcherrimos, & magnitudinis eximie, minime
que differentes, quantum ad formam, ac corporum proceritatem attinet, constat,
33 * Certumque est, hanc regionem proxime accedere ad naturam, ac temperaturam optimæ
Hipp. Opera. F 3 consti-

- constitutionis, verum vitilitatem, laboris tolerantiam, ac audaciam, non verisimile est huic naturæ innasci. Sicut neque eiusdem, neque diversi generis constantes, ac perpetui sunt amatores. Vincit enim in ipsis voluptas, quæ ratio est multiformes generari partiu, præcipue in feris. Atque sic quidem de Ægyptiis, ac Lybæis mihi habere videtur. * Qui vero ad dexteram hybèrni ortus solis usque ad Macro-
- 30 tidem paludem habitant: hic est enim Europa, & Asia terminus: sic habent. Multo maior diversitas est inter illas ipsas gentes, quam de quibus iam dixi, quum propter varias temporum mutationes, rum ob regionis naturam. Habet autem eodem plane modo, quemadmodum & circa aliorum hominum terras accidit. Ubi enim tem-
- 35 pora magnas mutationes faciunt, & irequentissimas, illic & regio agrestis, & maxime inæqualis existit, inveniasque & montes plurimos, & densos, itemque campos, & prata. Ubi autem non valde variant tempora, illic aequalissima regio est, quod idem & de hominibus ipsis est intelligendum. Si quis enim recte consideret, videbit quorundam naturam, montanis, sylvis, ac asperis locis similem esse: aliorum vero a-
- 40 quosâ, ac exilia loca referre: sicut quidam pratorum, ac paludum naturam præ se ferunt, atque alii sunt, a quorum planitiebus, nudisque, ac siccis terris consuetudo similis existit. Tempora enim, quæ formarum naturam variant, sunt diversa: quum ergo inter sese fuerint maxime diversa, varias, & multiplices formas producent. Porro quæ parum inter se differunt, gentes relinquant. * Quæ autem plurimum non natura solum, sed &
- 45 legibus, ac consuetudinibus discrepant, de illis referam, quomodo habeant. Ac primum omnium de Macrocephalis, quum nulla omnino alia gens sit, quæ similia capita habeat. A principio quidem consuetudo in causa fuit, ut tam longis capitibus essent. Nunc autem natura ipsa cum consuetudine conspiravit. Si quidem generosissimum apud eos putatur, caput habere quam maxime longum: consuetudinis autem hoc initium fuit,
- 50 quum recens infans natus est, caput ejus adhuc tepetum, ac molle existens, quam celerime constringunt manibus, coaptantesque cogunt in longitudinem augeri, quin & vinculis connectunt, ac aptis instrumentis colligant, quo rotunditas capitis prohibeatur, ac longitudo augeatur. Ea consuetudo tantum esset, ut ejusmodi natura capitum existeret. Temporis vero progressu natura quoque tales produxit, ut non esset necesse
- 55 se consuetudine priore cogere. * Quum enim semen genitale ab omnibus corporis membris procedit, a sanis quidem sanum, a morbidis morbosum, fiatque, ut ex calvis calvi gignantur, ex cæcis cæci, & ut plurimum distortus distortum generet, eademque ratio sit circa reliquas formas: quid prohiberet, ut non ex Macrocephali Macrocephali gignerentur? Nunc autem non nascuntur ita magnis capitibus, quemadmodum prius,
- 60 quum consuetudo non amplius daret, per incuriam hominum intercepra. Et de his quidem hæc sufficiant. * De illis autem, qui Phasim accolunt, adiciam. Regio eorum palustris est, calida, aquosa, & densa, imbræque in eam decidunt omnibus temporibus & magni, & impetiosi: homines vero ipsi vitam agunt in paludibus, domosque ligneas, & ex arundinibus in ipsis aquis habent extructas, neque multum inde prodeunt, ut adeant vel emporia, vel urbes. Verum naviculis ex uno ligno fabricatis permancant
- 65 sursum, ac deorsum: habent enim fossas, ac ductus aquarum plurimos. Bibunt autem aquas calidas, & stagnantes, quæ & a sole sunt putrefactæ, & ab imbrum casu autæ. Ipseque fluvius Phasis omnium fluviorum stagnantissimus est, & qui lentissimo cursu profuit: fructus autem, qui illic nascuntur, omnes insalubres sunt, evirati, imperfectique præ multitudine aquarum, neque unquam maturescunt. Atque quum multus aer ab aquis regionem occipit ob hanc ipsam causam, quodam formam, ac corporum speciem attinet. Phasiani sunt a reliquis hominibus longe diversi. * Sunt enim
- 70 magnitudine ingenti, ac corpulentia valde excellenti, neque junctura eorum ululæ, neque venæ comparent, pallidumque præ se ferunt semper colorem, quemadmodum qui regio sunt obnoxii morbo: loquuntur aptem, ut si qui alii omnium hominum gravissime, nimirum acie utentes non sereno, sed obscuro, & maxime humectaro. Sunt insuper ad laborem a natura ipsa segniores, annique tempora non varias habent neque ad æstum, neque ad frigus permutationes. Veni autem eis sunt plurimi austrii omnes præter unum ejus regionis proprium, & indigenam, qui aliquando
- 75 violentior, ac molestior calidus existens spirat, quem Cenchrona patrio vocabulo appellant. Verum Boreas non valde ad eos pertransit, quod si aliquando spiret, debilis tamen existit, ac valde lenis. De natura ergo, ac diversitate, & forma eorum, qui Asiam, & Europam incolunt, ita habet. * Quod autem timidiore, effeminatiore, ac imbelles præ Europæis Asiatici existant, moribusque manifestiores, tempora ipsa
- 80 anni in causa sunt, quæ non magnas permutationes faciunt neque calor, neque frigoris, sed semper aequalia permanent: unde neque mentes stupore percussuntur, neque corpora fortem transmutationem incurrunt. A quibus verisimile est iram exasperari, cognitionemque, & calorem amplius excitari, quam si semper in eodem statu quis persistat. Mutationes enim sunt, quæ hominis mentem semper excitant, neque
- 85 sunt quiescere. Propter quas sane causas imbelles universum Asianorum genus existit, atque adhuc amplius propter leges. Multo maxima enim Asia pars sub regibus est. * Ubi autem non in sua potestate vivunt homines, neque sui juris sunt, sed dominis subiecti, ibi non multum curiosi sunt, quomodo se ad bellum apparent, sed magis hoc curant, ut ne bellicosi videantur. Pericula enim eis non aequalia instant,
- 90 Nam

Nam hi in militiam proficisci, laboreque perferre, ac mortem oppetere pro domi-
nis suis coguntur, reliquis interim domi liberis, uxoribus, ac reliquis amicis, atque
siquidem viriliter, & feliciter bellum gesserint, dominis inde comoda succedunt, eo-
rumque facultates inde augentur. Verum ipsis præter pericula, & cades nihil demetur.
Proinde neque his hominibus regionem frequenter habitaram esse necesse est. Imo eam
41 propter inertiam bellicam, ac otium a plerisque relinqui. * Ut enim quisque maxime 100
a natura virilis, & magnanimus est, ita plurimum ejus animus leges avertit: cu-
jus rei magnum indicium vel inde habere licet. Quod quicumque in Asia Græci, item-
que Barbari dominis non subfunt, sed jure suo degunt, sibi ipsique omnes labores su-
crificant, illi bellicosissimi omnium existunt. Perichitantur enim ipsi sibi, virilitati-
que præmia ipsi reportant, sicut timiditatis, ac ignaviae penam hunc pariter. Un-
42 venias autem & Alianos ipsos inter se plurimum differentes, generosiores alios, alios
degeneres, quorum omnium causa ad temporum mutationes est referenda, quemad-
modum & in precedentibus dixi. Atque sic quidem habet in Asia. * In Europa vero ge-
42 nus hominum est Scythicum, circa paludem habitans Mæotini, quod a reliquis gen-
tibus maxime differt, Sauromatae appellantur. Horum scemina equites sunt, arcu-
bus utuntur, ac sagittas jaculantur ex equis, cum hostibus congregientes, dum virgines
existunt, neque devirgantur prius, quam hostium tres confecerint, neque prius ma-
ritis colabunt, quam sacra Deo patrio more fecerint. Quod si qua sibi vitium acceperit,
ah equitatu libera est, nisi necessitas cogat communi expeditione omnes examina-
ri. Dextera autem manum non habent. Nam puellæ adhuc infantibus matres æreo 115
instrumento in hunc usum parato, igneque candefacto eam auferunt, ac exarunt, ne
iterum succrescere contingat, atque ut omnis vis, ac robur in dextram humerum, &
43 brachium deferatur. * Cæterum reliqui Scythæ, quod ad formam attinet, ipsi sibi
similes sunt, aliis dissimiles. Sicut quoque Ægyptii ipsi inter se præterquam quod
hi a vehementi calore, illi ab intenso frigore sunt compressi. Verum solitudo, quæ Scy-
thica dicitur, in planitie sita est, pratis abundans, sublimis, & mediocriter aquo-
44 sa. Sunt enim fluvii in ea magni, in quos aqua ex campis per rivus deducitur. * In hac
itaque Scythæ degunt, qui Nomades vocantur, propterea quod nullas habeant domos,
sed in curribus habitant. Sunt autem currus, ex quibus minimi quatuor rotis, telu-
44 qui sex circumagiuntur. Sunt etiam luto obturati, ac instar domorum fabrefacti, a-
liqui simplici, aliqui etiam triplici tabulato, unde robur illis inest adversus omnes
iniurias aquarum, nivis, ac ventorum propellendas. Trahunt currus alioquin quidem
bœum paria duo, aliquos tria, atque hi cornibus carent, quum præ frigore regionis
cornua eis non evascentur. In his itaque curribus degunt mulieres. In equis autem ve-
huntur viri. Sequuntur autem simul oves, boves, & equi. Tandem deinde in uno
45 subsistunt loco, dum sufficit ipsis pecoribus pabulum, quo deficiente, in aliam
regionem commigrant. Vescuntur autem ipsi carnibus coctis, bibuntque lac equinum,
comediunt etiam Hippocam, id autem est caseus equinus. Hæcenus ergo de victu, &
morbis diximus, temporibusque anni, ac formis, quæ a reliquis hominibus longissi-
me sunt Scythiæ genti diversæ. Ipsa enim sibi inter se gens similis existit, quemad-
modum & gens Ægyptiorum. Minime autem fecunda ea gens est, regioque ipsa mi-
45 nime ferax enutrit, neque numero, neque specie insignes. * Sub ipsis enim Urhis, Ri-
phoræque montibus sita est, unde Boreas spirat, Sotique ipse supremo æstivo soliti-
tudo deficiens, proxime accedit, ac tum quidem exiguo tempore calefacit. Neque vero
venti a calidis locis spirantes valde ad eam regionem penetraunt, nisi parumper & dehi-
46 les. Verum ab Urhis venti procedentes sunt illic perpetui frigidi, a nivibus, gla-
cies, imbribusque condensati. Qui nunquam a montibus decedunt, ut propterea etiam
inhabitabiles fiant. Aëque ipse totum fere diem nubilus campos occupat. Ipsi vero in hu-
midis locis degunt. Et fere perpetua est ipsis hyems, æstas autem paucissimis diebus,
atque illis non valde multa. Sunt enim planities eminentiores, & nudæ, neque ullis
46 montibus circumsepæ, sed fere sub ipsis Urhis acclives. * Neque feræ nascuntur ipsæ
magnæ, sed quales possibile est sub ipsa terra contegi. Prohibet enim hyems, &
nuda terra, quæ & diverticula, & nimbis caret propter temporum anni
mutationes, neque multas, neque fortes, sed similes semper, vel parum admodum di-
versantes, unde & formas corporum inter se similes habent, quum eodem utantur vi-
ctu, & amictu, æstatis, & hyemis tempore, attrahuntque ærem aquosum condensatum, a-
quam insuper bibentes a nivibus, & glacie resolutam, nullo etiam corporis exercitio ac-
cedente, quoniam non verisimile sit corpus, aut animum ullis exercitationibus apra fieri,
ubi non mutationes temporum hunc fortes. Propter quas causas forme eorum sunt
crassæ, & carnosæ. Juncuntur vero humectæ, & inefficaces, venterculique humidi om-
47 nes, maxime omnium tamen inferior alvus. Nequit enim ipsa efficari in ejusmo-
di cum regionis, tum naturæ, & temporis constitutione. Sed pinguedine, & ni-
ditate carnis formæ invicem sunt similes masculorum masculis, & foeminarum fo-
emellis. Tempora enim, quum sint inter se similia, nullas corruptiones, neque maligni-
tates inferunt in feminis genitalis mixturam, ac compactionem, nisi quiddam aliud for-
47 tuito, vel casu contingat, aut a morbo. * Magnum autem argumentum humiditatis cor-
porum Scytharum hoc exhibebo. Multos enim ipsorum, præcipue qui Nomades
sunt, reperias exussos humeros, ac brachia habentes, manuumque juncturas, pecto-

- ra, coxas, & lumbos, nullam sane aliam ob causam, nisi ob humoris, & mollitiei natura detractiōnem. Nam neque arcus incendere, neque telum torquere possunt præ potentia humiditatis humorum: quum autem uruntur, humor ipse a iuncturis exolvitur, suntque corpora ipsorum validiora, melius nutriuntur, & magis redduntur articulorum usu potentia. Fluida vero sunt, ac lata primum propterea, quod fasciis non colligantur, quemadmodum fieri solet in Ægypto. Deinde quod non animalia vertunt, quomodocunque inter equitandum equis insideant. Postremum etiam propter delidiam perpetuam, Maseuli enim eorum, antequam potentes fiant, equos concendere, atque in illis vehi, plurimum temporis desident in curribus, raroque prodeunt, ut inambulent, propter exilia, ac perpetuas circulationes. * Muliebrum autem corporum formæ ad miraculum usque fluxæ existunt. Porro Scytharum gens sulyi valde coloris existit propter frigus ingens. Non enim vehemens accedit ad eos sol: a frigore vero albedo exurit, & fit sulva. Neque vero possibile est fecundam esse eorum naturam, quum viri minime cupidi sint cum foeminis commisceri ob nimiam corporis liquiditatem, ventriculi molliem, ac frigiditatem, quæ causæ apparent minime viros ad coitum incitari. Accedit his lassitudo ex continua equitatione contracta, quæ eos ad commisionem reddit impotentiores, atque hæc sunt causæ, cur viri infecundiores putentur. Mulieres pinguedo carnis, & humiditas steriles facit, præ quibus uteri earum genitale semen nequeunt continere. Lunares namque purgationes eis non eveniunt, quemadmodum esse necesse, sed minus. & intempestive per longus tempus, ipsumque amplius uteri os præ pinguedine concluditur, ut nequeat semen suscipere. Sunt enim otiosæ, & pingues, ventresque earum frigidi, & molles, unde necessario sequitur non multum fecundam Scytharum gentem esse, cuius rei famulæ earum indicium exhibent. * Nam hæc viris misceri plurimum gaudent, in uteroque conceptum continet propter corporis exercitium frequens, carniisque gracilitatem. Amplius autem plurimi Scythæ Eunuchi sunt, & muliebria officia obcunt, iustarque foeminarum omnia faciunt, & loquuntur, vocanturque hi effeminati. Et regionis quidem incolæ causam ad deum referunt, coluntque hos ipsos homines, & adorant, sibi ipsis timentes, ne quid tale accideret. Mihi vero hi affectus divini quidem esse videntur, sicut & reliqui omnes, neque ullum a liquem alio esse divinorem, aut humaniorem, sed divinos omnes, verum unusquisque eorum suam propriam habet naturam, neque aliquis citra naturam accedit. Quare quomodo hic affectus contingat, ut mihi videre videor, narrabo. * Ab equitatione ipsa diuturni eos corripunt articulorum dolores. Nimirum propendentibus semper ex equis eorum cruribus, deinde claudi fiunt, contrahunturque coxendices, quum invaluerit morbus. Medicantur autem sibi ipsis hoc modo. A principio morbi utramque venam retro aures incidunt, quo facto sanguine quoto promanante, somnus eos corripit præ imbecillitate, sique obdormiscunt: quorum quidem aliqui, depulso somno, sani exurgunt: aliqui veromissime. * Atque mihi sane videntur ea medicatione se ipsos perdere. Venæ enim retro aures sunt, quas si quis fecerit, sterilitatem inferat his, quibus secantur, quare id etiam ipsis ex earum incisione accidere certum est. Quando igitur postea uxores adeunt, impotentisque se factos vident cum illis coire: primum quidem nihil molestius cogitantæ quiescunt, quum autem his, aut ter, aut amplius frustra opusentur, neque quicquam proficiunt, mox putant se deum offendisse, in quem culpam rejiciunt, induuntque se veste muliebri, palari se evitatos esse confitentes, ad mulierumque convubernia transeunt earum opera tractantes. Hoc itaque malo ditissimi Scytharum afficiuntur, minime vero infirmi. Imo qui maxime & genere, & potentia prævalent ex nulla alia, quam continue æquitationis causa hoc perpetiuntur. Pauperes vero minus, quam non multum equitent. Unde si hæc affectio alius diviniore censenda esset, non nobilissimis, non ditissimis Scytharum fere solis accideret, sed esset omnibus equaliter peculiaris. Imo magis invaderet pauperes circa cultum deorum negligentiores, si saltem gaudent dii in hominum admiratione constitui, & pro hoc beneficia hominibus retribuunt. Divites enim sæpius diis sacra faciunt, victimas offerunt, statuas erigunt, coluntque, quum pecuniis abundant: pauperes autem minus id faciunt, quum non habeant. Quin etiam aliquando deos detestantur, qui eis opes non suppeditent, ut verissimilis esset, pauperes, ac parum abundantes hoc malo propter crimina sua puniri, quæ divites, & qui opibus abundant. Verum sicut & prius dixi, divinus quidem hic affectus est, secundumque naturam accidit similiter utalij omnes, neque alia eius causa, quam ea, quam dixi, Scythas excidit. Simili autem modo & reliquis hominibus evenit. * Ubi enim frequenter, & continue homines equitant, ibi plurimi a diuturnis doloribus articulorum, coxendicumque maxime, & pedum corripuntur, ad coitumque sunt impotentes, quæ omnia mala Scytharum genti adfunt. Atque propterea Scythæ omnium hominum minime sunt ad coitum valentes. Et quod Anaxyridas (braccarum, sive fœminaliū id genus est) semper habent, & plurimum temporis in equis desides degunt, ut neque manu tractare pudenda liceat, atque præ frigore, & lassitudine voluptatis, ac jucunditatis coeundi obliviscantur, neque prius aliud sibi faciendum putent, quam ut evitari fiant, Hætenus ergo de Scytharum gente recensui. * Reliquum autem in Europa hominum genus valde inter se dissimile est, & diversum, tum quod ad magnitudinem attinet, tum quod ad formam, atque id propter temporum mutationes contingit apud eos magnas, & frequentes. Sunt enim eis calores vehementes, & hyemes fortes, pluvie multæ, rursumque

sumque siccitas diutina, & venti plurimi, ex quibus multæ, & omnimodæ sunt transmutationes. Neque a vero discrepat circa generationem, has ipsas mutationes sentiri, neque seminis genitalis coactione aliam, neque ex eodem etiam eandem, ætatis pariter ut hyemis, pluvioso ut siccio tempore progigni. Eaque causa est, cur patem Europæos magis, quam Asianos secundum corporum formas inter se discrepare, & magnitudines diversissimas in singulis adeo urbibus provenire. Plures enim corruptiones contingunt in seminis coactione, quam tempora frequenter variant, quam si eadeo sunt, & similia. Eadem autem morum ratio in utrisque existit. Feritas, integritas, & audacia a natura Europæis innascitur. Frequentes enim mentis perculsiones feritatem inducunt, mansuetudinem contra, & benignitatem exerpant. * Quare etiam magnanimos magis eos, qui Europam incolunt, Asianis iudico. Siquidem similitudo, & æqualitas segnitiei parit. Mutatio autem & animus, & corpus ad exercitationem excitat. Augerut itaque a desideria, & otio timiditas, ab exercitio vero, & laboribus crescit virilitas. Unde bellicosiores quoque Europæi exant, non ob hanc solum causam, sed & propter leges. Non enim regibus obediunt, quemadmodum Asiani. Ubi enim sub regibus vivitur, ibi necesse est homines timidissimos esse, quemadmodum & supra ostendi. Servitutis namque animi eorum pressi non libenter, neque volentes temere pro aliis se periculis exponunt. Europæi autem suo jure viventes, quam pro se ipsis pericula belli subeant, magna cupiditate feruntur, volentesque, ac alacres difficultates omnes aggrediuntur, ipsisque sibi ex re bene gesta præmia reportant, ut certum sit leges plurimum ad magnanimitatem conferre. Tota itaque, & universa res de Europæ, & Asia sic, ut retuli, habet. * Cæterum Europa ipsa adhuc habet gentes invicem differentes, non magnitudine, & forma solum, sed & magnanimitate, ac fortitudine. Quæ vero in eis hanc diversitatem faciunt, in præcedentibus dixi, dicamque amplius magis manifeste. Quicumque regionem montanam, asperam, nudam, & non aquosam incolunt, his mutationes temporum contingunt magnæ, & diversæ, unde & hominum formas magnas progigni convenit, qui & ad laborem, & ad viriliter agendum a natura præstent, quibusque feritas, & immanitas non modico critera a natura sint congenita. Qui vero loca concava, præterita, & æstiosa habitant, ventosque calidos plus sentiunt, quam frigidos, & aquis utuntur calidis, hi magni quidem esse non possunt, neque bene compositi, & longi, ac erecti, sed in amplitudinem a natura producti carnosius sunt, & capillis nigris. Imo & ipsi tori nigri magis, quam albi, & qui minus de piliis habeant, quam de bile. Virilitas autem, & tolerantia laboris non æque ipsis a natura inest, nisi consuetudo accedat, & hæc in eis efficit. Quod si flumina extent in ea regione, quæ stagnantes, & pluvias aquas evectant, homines ipsi incolumes, ac splendidi vivant. Si vero flumina desint, aquasque puteorum stagnantes, & olentes bibant, necesse est ab ipsis illis aquis & ventrem lædi, & splenem. * Quicumque autem altam habitant regionem, planam, ventis expositam, & aquosam, eorum forma magnæ, ac invicem similes, & erectæ. Animi quoque eorum exultant mutationibus non sine permixta, horum formas necesse est esse asperas, & vegetas, sivas magnas, quam nigras, mores etiam eorum rigidi sunt, pertinaces, & contumaces. Ubi enim mutationes temporum contingunt frequentes, & plurimum inter se diversæ, ibi & formas, & mores, & naturas reperias plurimum differentes. * Temporum itaque varietates potissime sunt, quæ naturam ipsam permittant. Deinde etiam regio, in qua multæ variationes sunt, postremum autem aquæ. Invenias enim sette semper & formas hominum, & mores regionis naturæ comparas. Nam ubi terra pinguis est, & mollis, & aquosa, aquæ autem valde sublimes, ita ut æstate calida sint, & hyeme frigide, & temporum ratio alias probe conveniat, ibi & homines carnosius, articulis non apparentibus, humidi, labores intolerantes, & ut plurimum maligni nascuntur. Segnitæque, & somnolentia eis inest multa. Suntque ad artes tractandas crassi, non aeres, & subiles. * Ubi autem regio est puda, natura munita, & aspera, quæque articulis probe distinctis, vegetosque, & hirsutos reperias homines, & in quibus a natura laboris tolerantia, & vigilantia inest. Quique mores habeant pertinaces, ad iram proclives, & contumaces, magisque feritate participant quam mansuetudine. Insuper ad artes etiam acutiores, & plus solertes, & ad res bellicas gerendas aptiores. Quoniam & omnia, quæ e terra proveniunt, terræ ipsius naturam respiciunt, & sequuntur. Argue hæc etenim quidem maxime contrarias corporum naturas, & formas diximus, e quibus conjectura facta, si quoque reliqua consideraveris, nunquam a vero aberrabis.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE FLATIBUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Medicina ex quo artium numero. Quae in Medicina vilia vulgo putantur, cogniti sunt difficillima. Vnus egregius manuum exercitator, & magister.
- 2 De quibus morbis opinio, & de quibus ars iudicet. Aetiorum causa. Medicina maxime securum naturam est.
- 3 Contraria contrariorum medicamina. Medicina quid.
- 4 Morborum omnium unus modus, species, & causa eadem. Corpora omnia triplici nutrimento sustentari. Quid Spiritus in corporibus, & quid extra vocetur, & quantum aliis commodet.
- 5 Ventus aeris fluctus. Sine spiritus, aut aeris vi nihil esse, aut fieri. Aer igni nutrimentum praebet. Animantia aquatica quomodo spiritus, ac aere in aquis participent.
- 6 Aer mortalibus solus vitis, & morborum est autor.
- 7 Febris omnium morborum comes. Febrim duo genera.
- 8 Febris communis quae, quare, quomodo, quibus, & unde signatur. Febris communis cur non omni animantium generi accidet.
- 9 Quomodo propter malam dietam febris accedat, & quid mala dicta. Cibi varii, & dissimiles cur noxii. Spiritus cum alimentis intra corpus assimilatur.
- 10 Eructationes post cibos, & potus a spiritibus.
- 11 Horrores unde, & cur ante febres corpus conturbant. Horrores maiores, vel minores pro flatuum in corpore qualitate, & quantitate. Tremores cur cum horroribus simul ingruant. Partes quodam sanguine plenas, quodam exangues. Tremor quas partes occupat.
- 12 Hiatus cur febres praecedat. Articularum

ante febres exolutio unde.

- 13 Sudoris ante febres in corpore generatio. Similitudo capitis dolores ante febres unde. Pulsus circa tempora ratio.
- 14 Agitationes intestinorum, tormina, oppilationes quomodo a flatibus causentur. Fomenta calida foris admoda quia ratione dolorem mitigent.
- 15 Quomodo fluxus per ipsos flatus generentur, & sanguinis rupturarum circa pectus & autor, & causa existant.
- 16 Ocularum, aurium dolores. Grauedinis, Rancedinis, Tulsis generatio. Quomodo ex pituita exulceratio. Fauicium exulceratio, & inflammatio unde.
- 17 Fluxus ruptura sine spiritu circa pectus. Haemorrhoei non est facilis via ad ardua prodire. Fluxus ruptura spontanea.
- 18 Quomodo ruptura, & ex rupturis aqua intercus fiat. Intercursum morbum a flatibus generari. Spiritus corpus brevi implet.
- 19 Quod super attonitus, seu syderatio, a flatibus, & quomodo fiat. Quod morbus facer etiam a flatibus generetur.
- 20 Quomodo sanguis inter omnia, quae in corpore sunt, maxime ad prudentiam conferat. Somno sanguis frigescit. Gravia omnia natura deorsum feruntur. Inferiorum ratio. Ex sanguinis per ebrietatem repetitam auctione animi percussio.
- 21 Affectus, & cognitiones a consuetudine. Aetiorum facer. Ex sanguinis perversione totius corporis subversio.
- 22 Sacro morbo laborantes cur sensibus priventur. Spuma in sacro morbo unde. Spuma omnes cur alba.
- 23 Quo tempore nonnulli, & quomodo a morbo sacro liberentur. Epilogus.

1 **S**UNT quaedam artes, quae illis, quibus earum cognitio conti-
 5 **S**unt quaedam artes, quae illis, quibus earum cognitio conti-
 10 **S**unt quaedam artes, quae illis, quibus earum cognitio conti-
 15 **S**unt quaedam artes, quae illis, quibus earum cognitio conti-
 20 **S**unt quaedam artes, quae illis, quibus earum cognitio conti-

natura perfecta. Est enim maxime secundum naturam ipsa medicina. Quare statim ubi fames molestat, morbus fit. Quicquid enim homini molestiam, ac tristitiam inferat, hoc morbus vocatur. Quod ergo est famis remedium? hoc scilicet, quod famem sedat: id autem facit cibus: eo ergo malum illud medicandum. Amplius autem ubi sitis urget, bibere compescit: & rursus, repletioni evacuatorio, evacuationi repletio- 25
 3 labori quies succurrit, & quietis medelam ex labore reperias: atque ut breviter dicam, contraria contrariorum sunt medicamina. * Medicina enim nihil aliud est, nisi adpositio: & ablatio. Ablatio quidem eorum, quæ excedunt; adpositio vero eorum, quæ deficiunt: qui autem istud optime facere potest, is optimus medicus censetur, quantumque quis ab hoc præstando deficit, tantum deficit quoque 30
 4 ab ipsa arte. Atque hæc quidem præter institutum futuri sermonis a me dicta sunt. * Morborum autem omnium unus, & idem modus est; locus vero ipse eorum differentiam facit. Quare videntur quidem morbi inter se nihil simile habere, propter diversitatem scilicet locorum: quum sit tamen una morborum omnium & species, & causa quoque eadem. Quæ autem hæc ipsa sit, in sermone huius progressu manifestum 35
 5 facere conabor. Corpora enim omnia tum hominum, tum reliquorum quoque animalium a triplici nutrimento sustentantur. Horum autem nutrimentorum nomina hæc sunt, cibus, potus, spiritus. Ac spiritus quidem, qui in corporibus sunt, status vocatur: qui vero extra corpora existunt, aer, qui sane maximus est in omnibus, quæ corpori accidunt & autor, & dominus. Quare operæ pretium 40
 6 est eius potentiam diligentius perspicere. * Ventus enim ipsius aeris fluctus, & unda existit. Quando igitur nullus aer sortes fluctus facit, tum & arbores radices evelluntur, & mare undis exæluat, spirituum potentia ita cogente, & naves onerarias etiam, & ingentes in altum disjiciente. Talem itaque vim in ista exercet, etiam si oculis minime sit conspicuus, & tantum consideratione cognoscatur, & effectu suo 45
 7 fiat manifestus. Quid autem sine hoc sit tandem? aut cui rei non adest? Omne enim, quod inter cælum, & terram est, spiritu repletum est. Hic & hyemis, & æstatis causa est. In hyeme quidem frigidus, & condensatus, in æstate autem mitis, & tranquilliss. Quin & solis, & lunæ, & astrorum omnium cursus per spiritum procedunt. Erenim igni spiritus nutrimentum præbet, quo si ignis privetur, vivere non possit. Et so- 50
 8 lis perpetuum cursum aer perpetuus, & tenuis conservat. Verum neque mare ipsum spiritus exors esse omnibus manifestum esse, puta. Non enim vivere narrata animantia possent, si non spiritum participarent: quomodo autem participarent, si non per aquam, & ex aqua spiritum adstraherent? Et lunæ hic fundamentum est, & terræ vehiculum, neque quicquam usquam est spiritu vacuum. Atque hæcenus quidem quan- 55
 9 tum aer alius commodet, diximus. * Mortalibus autem vitæ, & morborum ægrotis solus is est autor. Tantaque omnibus corporibus spiritus necessitas extat, ut si quidem omnibus alius abstineat homo, neque cibum sumat, neque potum: possit tamen dies dios, vel tres, & plures ducere. Si cui vero spiritus in corpus vitæ intercipientur, in brevi parte unius diei intereat, ut vel hinc quanto usui spiritus corpori sit, liceat æstimare. Amplius autem ab omnibus operibus aliquando immunes quiescunt homines: multæ enim sunt mutationes in vita, verum ab hoc opere nulla omnibus mortalibus animantibus requies contingit, ut cessent spiritum adducere, ac rursus exhalaré. Vides ergo ex his, quæ dixi, quanta communio omnibus animantium in fruendo aere existat. Subiciam igitur mox & illud, quod non aliunde unquam verisimile sit 60
 10 morbos evenire, quam inde, si is aut plus, aut minus, aut cumularior, aut morbidis fordibus inquinatior in corpus se ingerat. Sed hæc de universa hæc re dicta sufficiant. Ad ipsa nunc opera sermonem convertens demonstrabo, omnes morbos ex hoc oriundos corporibus innasci, ac generari. * Primum autem a communissimo morbo febrili exordium sumam, & qui omnium morborum comes est: præcipue tamen ex inflammatione, & tensione abscessum. Quod satis indicant sequentia offendicula, statim enim cum inflammatione inguinum abscessus, & febris consequitur. Sunt autem febrim genera duo, ut hoc quoque nunc attingam, quorum alterum commune omni- 65
 11 bus pestis appellatur, alterum propter malam dietam privatim se contingit, qui ea utuntur: utriusque autem generis aer autor, & causa existit. * Communis ergo febris propterea omnibus accidit, quod eundem spiritum omnes adstrahant, sique, ut simili corpori similes spiritus similiter permixti similes gignant febres. Sed est fortasse qui dicat, ut quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi morbi? Cui ego sic responderim. Differt corpus a corpore, natura a natura, & nutrimentum a nutrimento. Non enim omni animantium generi eadem aut non conferunt, aut 70
 12 commoda sunt, sed sunt alia aliis magis convenientia. Quando igitur aer ejusmodi inquinamenti plenus est, quibus humana natura offenditur, homines ægrotant. Quando vero alteri cuiuspiam animantium generi aer inconveniens est, tum morbus illud genus corripit. Qui ergo populares sint morbi, hæcenus dictum sit, & quare, & quomodo, & quibus, & unde gignantur. * Quomodo autem propter malam dietam febris accidit, deinceps exponam. Est autem mala dieta hæc. Primum quidem quum quis plures cibos liquidos, aut siccos ingerit in corpus, quem ipsum corpus ferre queat, neque laborem aliquem ciborum saltem multitudini parem adiungit. Deinde quum varios, & dissimiles inter se cibos adsumit: leditionem enim movent, quæ sunt 75
 13 inæqua-

transmigrant in pectus. Aeris autem quum sit pituita, carnem penetrans, enulcerat, ac
 perfringit venas. Ex quibus sanguis effusus in alienos sibi locos, ubi moram tra- 160
 xerit, putrefcit, ac in pus convertitur, & neque sursum potest conscendere, neque in-
 fra exire. Sursum non, nam non facilis est via humori ad ardua prodire, sicut neque
 alius rebus, quæ aliquam admixtam secum habent gravitatem. Infra autem procedere
 prohibet septum transversum. Quare sane contingit fluxum aliquem contra spiritum
 rumpi, & aliquando quidem sua sponte, quandoque etiam propter dolores. Ac sponte 165
 quidem, quum aer in venas ultro receptus, sanguinis meatui coarctat. Multitudi-
 ne namque sua compressus sanguis, meatui perfringit, quæ ejus copia maxime pro-
 tumpt. Effusione autem ejus facta, venæ rursum spiritui complentur, & ex eo dolor
 sequitur. Necessæ est enim affectum locum spiritui occupari, aliaque dictis similia
 fieri. * Rupturæ autem omnes sunt hoc modo. Quum violentia quadam invicem 170
 discedunt, & finduntur carnes, fissuram subtervenit spiritus, ac dolore affligit: quum
 autem ipsi flatus carnes pergressi, meatui corporis rarefecerint, sequitur post flatu
 humiditas, cui viam jam antea aer præstravit. Irriguo itaque corpore ad hu-
 miditate lacto, liquefiunt carnes, tumoresque in furas descendunt, atque morbus fit,
 qui aqua intercus appellatur. Maximum autem signum est, morbum hunc a flatibus 175
 generatum esse, quod jam sæpe aliqui hoc inalo affectu exoluti sunt, & ab aqua eva-
 cuati. Atque his quidem subro aqua ex ventre prorumpens, multa apparet, post mo-
 ram autem paucior fit. Cui vero hoc fiat, satis manifestum est. Nam primum subito pro-
 rumptens aqua aere plena est, remanens, ac æternum præ se fert ingentem; quum
 autem aeris spiritus evanuerit, remanent plane eadem aqua, & apparet quidem paucior: 180
 verum penitus eadem existit. Adjiciam autem aliud adhuc signum. Si quis univertum ven-
 trem penitus evacuet, non tres procedunt dies, rursum plenus fit. Quid ergo aliud,
 quod impleat, putandum est, quam spiritus? Quid enim aliud tam repente impleset?
 Nam neque tantum potum in corpus ingestum est, neque carnes in causa esse possunt,
 utpote antea liquefactæ. Superiunt autem ossa, nervi, chordæ, fibræ, aquorum nullo 185
 ulla aliquid aquæ augmentum potest provenire. Ergo quomodo aqua intercus
 fiat, jam fit dictum: quod vero stupor attonitis, vel syderatio a flatibus fiat, deinceps
 demonstrabo. * Quum ergo flatus frigidi multi penetrent, ac insint carnes, partes cor-
 poris stupidae sunt, & siquidem plurimi flatus per univertum corpus discurrant, totus 190
 homo syderatur. Si per partem, pars illa percucitur, atque ubi abierint flatus, cessat
 & morbus: quamdiu autem permanerint, consistit & morbus, idque sic habere indi-
 cat perpetuus syderatorum hiatus. Videtur autem mihi amplius, & sacrum ap-
 pellatum morbum ab ipsis flatibus gigni: quibus autem rationibus ego persuasus sum,
 illis ipsis & auscultatoribus persuadere conabor. * Opinor autem inter omnia, quæ in
 corpore sunt, nihil magis ad prudentiam conferre, quam sanguinem. Hic ergo, quum in 195
 constanti habitu persistit, consistit & prudentia: sanguine vero permutato, concidit
 simul & prudentia. Quod autem hæc ita habeant, multa sunt testimonia. Ac pri-
 mum quidem, qui omnibus animantibus communis est, hæc confirmat somnus.
 Quum enim corpus invaserit somnus, sanguis frigescit. A natura enim somno
 frigidificandi vis est. Infrigidato autem sanguine, languidiores sunt ejus meatus: quod 200
 hinc palam fit, quod corpora aggravata reclinantur. Omnia enim gravia natura ad
 fundum deferuntur: & oculi ardent, & prudentia permutatur, opinioque pere-
 grinæ mentem occupat, & exercent, quæ sane insomnia appellantur. Qui & in
 temulentia per ebrietatem aucto repente sanguine percellitur animus, & in animo
 prudentia, saneque presentium malorum oblivisi, ac futurorum bonorum secunda 205
 spe beantur. Possem autem plurima ejusmodi congerere, in quibus sanguinis permuta-
 tiones, animi quoque prudentiam permutant. Siquidem igitur penitus totus contur-
 batus est sanguis, penitus & prudentia proternitur. * Affectus enim, & cogniti-
 ones a consuetudine contingunt: quum autem a consuetudine solita recedimus,
 aufertur nobis prudentia. Dico itaque & sacrum morbum tum fieri, quum plurimus
 spiritus per omne corpus universo sanguini fuerit permixtus: tum enim multæ
 opilationes sunt multifariam per omnes venas, quumque in crassiores, & pleniores
 sanguine venas aer prodierit, progressusque diutius maneat, prohibet sanguis
 cursum, atque alio quidem loco consistit, alio lentius penetrat, alicubi adhuc tardius.
 Quia sane inæqualitate transitus sanguinis per corpus facta, omnigenæ inæqua- 215
 litates per omne corpus contingunt. Omne enim corpus undique contrahitur,
 ac turbatur, nimirum corpore partes suas ad tumultum, ac conturbationem san-
 guinis subministrante: continguntque ex sanguinis perversione, totius omnino
 corporis subversiones. * Eo enim, quo corripuntur a morbo, tempore, neque senti-
 unt quicquam, neque audiunt, quæ dicuntur, neque vident, quæ sunt, neque ullos ali- 220
 quos dolores percipiunt. Sic namque aer conturbatus sanguinem turbavit, ac confusa-
 vit. Spumaque etiam per os illis excurrit, neque id ab re est. Nam per jugulares ve-
 nas aer transiens, penetrat quidem ipse: adducit autem simul secum quod tenuissimum
 est in sanguine, idipsum quum humidum sit, multa permixtione albescit. Tenuis
 enim membranas purus perineans aer pellucet, quapropter & alba spuma om- 225
 nes apparent. * Porro liberantur aliquando huic morbo obnoxii, maxime acceden-
 te hyeme. Quomodo autem id fiat, dicam. Quando variis laboribus exercitatum cor-
 pus ca-

- pus calefactum est, calefit & sanguis, qui calefactus, rursus calefacit & flatus, hivo-
 ro calefacti, dissolvuntur & ipsi, & compactum sanguinem dissolvunt simul, proce-
 320 duntque e corpore partim cum spiritu, partim cum pituita eiectioni. Deservente itaque
 spuma, & consistente sanguine, tranquillitateque per omne corpus facta, quiescit eti-
 am morbus. Quare, ut dixi, flatus ipsi vere omnium istorum morborum omnimode
 existunt causae. Ceteraque omnia, quae causae videri queant, vel hos adjuvant, vel
 consequenter post hos in corporibus morbos generant. Haecenus ergo morbo-
 325 rum omnium causas flatus esse demonstravi. Id enim a principio receperam ut
 facturum. Recensui autem, spiritum ipsum, quum in aliis omnibus rebus poten-
 tem, tum maxime in animantium corporibus plurimum posse. Dediti autem
 sermonem usque ad morborum cognitionem, atque adeo agnitionem singularum,
 in quibus verum argumentum huius sermonis est a me manifestum. Quod
 340 si pergerem, singula agnitionum genera recensendo, amplius corroborare, lon-
 gius quidem sermo ipse extenderetur. Verus autem nihilominus futurus esset,
 & qui fidem suam omnibus probaret.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE MEDICAMENTIS PURGANTIBUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Medicamenta purgantia non temere exhibenda.
 Cibi seu alimenta, medicamenta potanda.
- 2 Quae quibus medicamenta danda.

3 Quae praemittende interrogationes.

- 4 Quibus morbis, quove tempore exhibenda me-
 dicina purgatoria.
- 5 Clysteres felicitantibus etiam quoquo tem-
 pore conveniunt.

- 1 **M**EDICAMENTORUM purgantium res non ita se habet, quem-
 admodum vulgo putatur. Eodem enim medicamento purgantur,
 & non purgantur. Quandoque vero alia purgat, quam quae purgare so-
 let. Aliquando nimium purgat. Aliquando ea, quae debet, facit.
 Quare fieri non potest, ut quis medicamentis confusus, ea temere
 exhibeat. Nam & cibos nos alentes medicamenta esse, putan-
 dum est; verum minus, quam illa. Homines enim, qui his recte in cibo
 utuntur, sani sunt: qui non recte, aegrotant: qui vero modum excedunt, purgan-
 tur quidem velut a sinceris medicamentis: verum minus & tardius, quam a sinceris me-
 10 dicamentis. Clarum igitur est, quod & hi medicamenta existunt. At vero hi ra-
 diiores, qui & familiares nobis sunt, & quotidie in corpus ingrediuntur, si te-
 mere, & negligenter exhibeantur, temere homines turbant, & quodammodo mor-
 bos inducunt. Quin & sinceros, & acidos cibos si quis citra delectum, ac inconsi-
 derate exhibeat, nihil commodi perficient. * Oportet igitur primum biliosis dare
 15 quod bilem purgat; pituitosis, quod pituitam; hydropicis, quod aquam; atrabilia-
 ris, quod bilem atram. Si vero extra hac purgaveris, quae quidem purgari de-
 bent, non purgabis: quae vero non debent, ea evacuabis. Quare in utramque par-
 tem peccabis. * Quum itaque phararmacum alicui dare voles, sive deorsum, sive sursum;
 20 purgans, interrogare ipsum oportet, an prius hiberet medicamentum, & an alvus
 ex deorsum purgantibus cita sit, & celeriter obediatur, aut diuturna. Et si citius, ac faci-
 lem solutus esse dixerit, mollioribus, & paucioribus medicamentis opus habet;
 si vero dura fuerit, fortioribus indiget. Idem modus in sursum purgantibus requiritur.
 At si nunquam neque sursum, neque deorsum se purgatum esse dixerit, neque
 medicamentum bibisse; cognoscere oportet, an ad ea, quae sanus in corpus inges-
 25 sit, alvus deorsum soluta facilis fuerit, aut sursum versus apposita ad vomitionem,
 & an ad repletionem aliquam alvi profluvium ipsi successerit. Haec omnia inter-
 rogare oportet, quo recte consulere possis. Turpis enim est calamitas, medicamen-
 to purgante dato hominem occidere. * Quicumque igitur a febris fortibus cor-
 30 rumpuntur, his medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris.
 Sin minus, saltem non intra quatuordecim dies. Carnes enim ipsorum, & venter,
 quum calidi sint, medicamentum assument, & nihil depurgantur, & febris maior
 fit, & color evertitur, & morbi regii speciem praeseferunt. Commota enim bile, &
 non purgata, non forbere vult aeger, neque bibere, sed omnia abominatur, & plerum-
 35 que perit. * Si vero detinet medicamentum, ante meridiem nihil purgatur: a meri-
 die vero nimium purgatur, & perit. At si hac die superstes maneat, & una cum pur-
 gatione remittat febris, sanus fit. Quapropter in febris vehementibus medi-
 camenta purgatoria exhibere non oportet. Verum si alicui opus fuerit, infusum
 per clysterem adhibere potes, quotiescumque volueris. Hoc enim minoris pericu-
 40 li est. Juxta eandem rationem etiam tempore aestatis, a canis ortu, per dies quin-
 quaginta vitare oportet, & non dare medicamentum, sed insulas per clysterem
 uti. Idem enim periculum imminet.

HIP-

HIPPOCRATIS COI

DE DIÆTA, SIVE VICTUS RATIONE

LIBER I.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Qua de viâu humano scripturum nosse, ac diiudicare oporteat, Ciborum, ac potuum facultas.
- 2 Cibi, & labores contrarias habent facultates. Laborum, seu exercitiorum tum naturalium, tum vero que per vim sunt cre. cogitatio. Astrorum ortus, & occasus observatio, ac cognitio.
- 3 Ciborum mensura inventa, & laborum ad unamquamque naturam numerus (quod tamen fieri nequit) sanitatis exalta inventio est. Morbi non derrepente sunt. Morborum causæ, seu excessus, priusquam sanitas a morbo superetur.
- 4 Animantium omnium, & hominis constitutio ex duobus, igne, & aqua. Ignis omnia movet; aqua omnia nutrit. Aquam neque ab igne, neque ignem ab aqua penitus separari.
- 5 Ignis, & aquæ quatuor qualitates primas inesse. Corpora nulla perire, neque fieri, que prius non erant, verum permixta, & discreta alteri. Generatio, corruptio, æstio, diminutio, ac secretio idem putantur. Naturæ opera vel volentibus, vel nolentibus nobis divina necessitate perficiuntur.
- 6 Corruptio omnibus inter se mutata est, Naturæ opera diversa.
- 7 Simile transire ad simile, Locus suæque proprius.
- 8 Animum in solo homine augeri.
- 9 Aëstio, & nutritio partium corporis ex diæta. Similitudo de febri lignariis ad æstia corporum.
- 10 Aëstio fit per harmoniam.
- 11 Formæ generatio ex igne, & aqua.
- 12 Humor in ventre plurimus. Ignis in reliquo corpore circuitus tres, & quod in illo humidissimum est, in penis cavis existit.
- 13 Natura, & lex quæ differunt.
- 14 Arias omnes licet diversas, ac discordes cum natura humane communicare. Venter non intellecta vocis.
- 15 Febri febrilis, Fullones, Sæores similes medicæ.
- 16 Aëstia officium, seu finis. Fabri lignarii, Aëstiares cum natura comparati.
- 17 Aëstia. Quæ plurimum diverse sunt, maxime concordant, ac delectant. Rebellium thiores, Plicatores, Aurifices. Pillores. Statuarii, Figuli.
- 18 Grammatica quid. Notitiam, & sensus per septem figuras homini contingere.
- 19 Palæstra, & paedotriba. Artes omnes cum humana natura communicare.
- 20 Anima hominis non similiter in omnibus au-

gescit. Corpora quæ nutrirî, ac augeri possint, Corpora fortiora, & imbecilliora quæ.

- 21 Partium humani corporis discriminatio, & auctio simul contingit.
- 22 Femella, & masculi a quibus maxime augescant. Masculum, aut femellam ut generet, quæ diæta utendum.
- 23 Masculus, & femella cur consistere possint. Anima semper in quolibet corpore similis. Qui viri animis splendidi, & qui non. Viriles quæ. Androgyni quomodo nascantur.
- 24 Faminosissime, ac ingeniosissime quæ mulieres. Viragines quomodo nascantur. Animam animæ ammisceri.
- 25 Gemini quomodo nascantur. Gemelli masculi, aut femelle quomodo nascantur, & cur sibi similes.
- 26 Superfætationes quomodo fiant. Quomodo de naturæ cognitione a prima constitutione cognoscere oportet. Aeris, & ignis rarissime partes in hominis corpore commixta sanctissimum habere constitutionem.
- 27 Naturarum robustarum constitutio ex quibus elementis, Frigida, & humida constitutiones.
- 28 Natura humida, & calida constitutio. Calidi, & siccæ temperamenti constitutio.
- 29 Natura secca, & frigida constitutio.
- 30 De Puerorum, Adolescentium, Virorum, Senum temperamento. Adulescenti femellæ, cur calidiores, & sicciores.
- 31 De temperamento animæ sapientis, aut desipientis. Anima sapientissima, & memoria valentissima in quo temperamento, & cur. Desipientissima quæ.
- 32 Sapientes secundo ordine, & constantes cum mansuetudine.
- 33 Vilius coram ratio. Exercitia. Aëstus corporis, corviores reddit, anima motum gravant. Deambulationes matutina, vespertina, ab exercitiis. Pomitio quibus conferas. Unctio. Coitu quando utendum.
- 34 Stolidi ex quo temperamento, & cur bi tardiores existant; Vilius coram ratione.
- 35 Desipientes, & stupidi quæ, & unde. Febrati purgatio a fomentis.
- 36 Sani, ac sapientes ex quæ elementorum permixtione. Diæta. Exercitia. Corpus sanum nec ab aliis perturbatum, animi sapientis causa est.
- 37 Inconstantes ex quæ elementorum mixtione, & cur. Diæta. Labores. Aliores quibus, & cur a cibis abunde.

Sub-

Utrumvis vero seorsum, neque sibi ipsi, neque ulli alteri sufficiens est. Vim igitur, ac facultatem utrumque ipsorum talem habet. Ignis enim omnia per omnia movere potest. Aqua vero omnia per omnia nutrire. Particularim vero utrumque superat, & superatur ad summum, ac minimum, quantum ejus fieri potest. Neutrum enim superare penitus potest ob hanc sane causam. Igni quidem, ubi ad extremitatem aque pervenerit, deficit alimentum: avertitur igitur eo, unde nutriti potest. Aquæ vero, ubi ad extremitatem ignis pervenit, deficit motus. Siftitur itaque in hac: quum vero steterit, non amplius potens est, sed ab illabente igne in alimentum consumitur: & propterea neutrum penitus superare potest. Si vero etiam alterutrum superetur, nihil sane ex his, quæ nunc sunt, fuerit, velut nunc habet. Quum autem sic semper se habeant, erunt & eadem, & neutra, & neque simul deficient, Ignis igitur, & aqua: velut a me dictum est, sufficientia sunt omnibus per omnia ad summum, ac minimum similiter. * Caterum utrique horum hæc adiungitur. Igni quidem caliditas, & siccitas: aquæ vero frigiditas, & humiditas. Habent autem inter se mutuo ignis ab aqua humiditatem. Inest enim ab aqua humiditas. Aqua vero ab igne siccitatem. Inest enim in aqua ab igne siccitas. Quum autem hæc sic habeant, mistas, & omnigenas formas, ac species tum seminum, tum animalium a se invicem secernunt, quæ nihil inter se simile habeat neque vîsu, neque facultate. Etenim quum nunquam simul in eodem consistant, sed semper alterentur, necessarium est etiam ea, quæ ab ipsis secerantur, ac producantur, dissimilia fieri. Equidem nulum omnino corpus perit, neque fit, quod prius non erat. Verum permixta, & dissecrata alterantur. Homines autem putant hoc quidem ex ore in lucem auctum generari: illud vero ex luce in ortum imminutum perire, ac corrumpi. Oculis autem magis credere oportet, quam opinionibus. Ego vero hæc ex sententia exponam. Animalia enim sunt, & illa, & hæc, & neque animal mori possibile est non cum omnibus. Unde cum moriatur, neque quod non est generari, quum non sit unde generetur. Sed augentur omnia, ac rumpuntur ad summum, & ad minimum, quantum ejus fieri potest. Quid vero dicam generari, & perire, vulgi gratia interprebor: hæc autem commisceri, & discerni significare declaro. Habet autem res hoc modum. Generari, & perire, sive corrumpi idem est. Idem est commisceri, & secerari. Generari idem est, quod commisceri. Perire, corrumpique, ac minui idem est, quod secerari: unumquodque ad omnia, & omnia ad unumquodque idem sunt. Consuetudo enim in his naturæ contraria est. Seorsim autem omnia & divina, & humana sursum, ac deorsum vicissitudinem habent, ac transeunt, dies, & nox ad summum, ac minimum. Sic & Luna ad summum, ac minimum. Ignis accessus est, & aquæ. Sol ad longissimum, ac brevissimum. Rursus hæc, & non hæc. Lux Jovi, tenebræ oreo. Lux oreo, tenebræ Jovi. Accedunt, & transmutantur illa huc, hæc illuc. Omni tempore transiunt illa res horum: hæc autem illorum, & quæ quidem faciunt, non sciuntur, quæ vero faciunt, scire sibi videntur: & quæ quidem vident, non cognoscunt, attrahunt omnia ipsi sunt per divinam necessitatem, & quæ volunt, & quæ non volunt. Accedentibus autem illis hæc, his vero illuc, & inter se permixtis, unumquodque destinatum satum explet. & ad majus, & ad minus. * Corruptio autem omnibus mutuo inter se est, majori a minore, & minori a majore. Et augetur majus a minore. Reliqua autem omnia, & hominis anima, & corpus velut anima ornantur, ac gubernantur. Irepunt autem in hominem partium, tota totorum temperaturam habentia, ignis videlicet, & aquæ, partim acceptura, partim dura, & quæ quidem accipiunt, plus faciunt: quæ vero dant, minus. Sciant homines ligum per ferrum, alter trahit, alter protrudit. Idem autem hoc faciunt, & minus facientes, plus laborant, ac faciunt. Sic & hominis natura, aliud protrudit, aliud trahit, aliud dat, aliud accipit, & alii dat, ab alio accipit, & alii quidem tanto plus dat: ab alio vero nihil minus accipit. * Locum autem unumquodque suum servat, & quæ quidem ad minus eunt, ad minorem locum secernuntur: quæ vero ad majus vadunt, permixta in majorem ordinem mutantur. Peregrina vero non eosdem mores habentia, ex aliena regione protruduntur. * Semper autem anima & majora, & minora habens, suas ipsius partes circumambulat non appositione, neque detractioe partium indigens, verum augmento, & decremento earum, quæ iam sunt, opus habens. Locum vero unicuique perficit, ad quem perveniant, & allabentia suscipiant. Non enim potest id, quod non similes mores habet, in discordibus locis permanere. Oberrant enim velut ignota: permixta vero inter se cognoscuntur. Concors enim concedi adhæret, ac assidet: discordia autem rebellat, & pugnant, atque inter se dissident. Quapropter anima hominis in homine augetur: in alio vero nullo, & aliorum magnorum animalium similiter. Quæcumque vero aliter ab aliis per vim secernantur, de aliis quidem animalibus prætermittam: de homine vero declarabo. Irepit in hominem anima, ignis, & aquæ temperamenti quæ habens partem corporis humani. * Foemelle autem, & masculi, & multi, & omnigeni nutriuntur. Nutriuntur autem, & auferunt per diem, qua homo nititur. Necessæ est autem, omnia, quæ ingreduntur, partes habere. Cuiuscumque enim pars non incipit a principio, augeri non poterit neque nullo, neque modico alimento ingrediente. Non enim habet, quod auferere faciat. Id vero, quod omnia habet, auferat, unumquodque in suo loco. Alimento autem ingrediente ab aqua, &

- igne, sicco, & humido; alia quidem intro coguntur, alia vero foras protruduntur. Quomodoque fabri lignarii lignum ferre dissecant, & alter quidem trahit, alter protrudit, idem sane facientes, & qui deorsum premittit, superiorem trahit, neque enim alias admittit deorsum ire. Si vero violenter cogant, toto opere aberrabunt. Similiter & circa hominis alimentum se res habet; aliud trahit, aliud protrudit; intro autem eadem foras repit. Si vero importune, & violenter cogatur, omni successu privabitur. Singula autem tanto tempore eundem ordinem habent, donec locus non amplius fufcipiat, neque alimentum aquarum, ac ignis sufficiens ad summum habeat. Postea ad externam regionem transeunt & soemellæ, & masculi, eodem modo præ violentia & necessitate impulsæ. Quæcumque autem destinatum satum expleverint, ea primum secernuntur, ac simul commiscuntur. Singula enim seceruntur: omnia autem hæc commiscuntur. * Postquam vero regionem permutaverint, & nacti fuerint harmoniam recte habentem symphonias tres comprehensim penetrantes per omnia, virunt, & augescunt iisdem, quibus etiam antea. Si vero harmoniam non assequuti fuerint, neque gratia acutis consona fiant, prima symphonia perit. Et si etiam secunda generetur, propterea quod unus per omnia corruptus est, omnino tonus vanus est. Non enim concentum habuerit, sed transitio fit ex maiore ad minus ante destinatum satum; quod qui faciunt, non sciunt, quid faciant. Cur autem utrique tum masculus, tum soemina fiant, in sermone progressu declarabo. Uter autem ipsorum harmoniam assequetur. * Humidus existeret movetur ab igne: motus autem vivificatur, & alimentum attrahit ab ingreditibus in quilibet cibis, ac spiritus: primum quidem undiqueque similiter, donec recenter rarus est: a motu autem & ignis siccatur, ac consolidatur: consolidatus autem, & firmatus citum circa densatur. Et ignis inclusus non amplius sufficiens alimentum attrahere potest, neque spiritum expellit propter ambientis corporis densitatem. Consumit enim humorem intus existentem. Quæ igitur solida natura sunt in compacto, ac sicco, ea non consumuntur ab igne in alimentum, sed valida, ac robusta sunt, et consistunt humore deficiente, atque hæc sine ossa, ac nervi nominantur. * Ignis autem ex commixto, ac motu humore corpus secundum naturam ordinat, ac disponit propter talem necessitatem. Nam per solidum, et sicum non potest diutius transire facere, quia alimentum non habent: per humidum vero, et molle potest: hæc enim ipsi sunt alimentum. Inest autem et in his siccitas, quæ ab igne non consumitur. Hæc autem inter se congregantur mutuo. * Ignis igitur penitissime ad intima obstruitur, et plurimus est, et maximum exitum facit. Plurimus enim humor in ea parte inest, quæ venter appellatur, et exedit inde, ubi alimentum non habet foras, et exitum facit. Plurimus autem humor in ventre inest tum propter alimenti ingestionem, tum propter concoctionem. Qui vero in reliquum corpus conclusus est ignis, triplices circuitus facit. Etenim quod humidissimum est in igne, in his locis, quæ venter caveæ appellantur, existit. In media autem horum id, quod reliquum est, aquæ congregatum stabilitur, atque ea vocantur carnes. In summa, ignis omnia, quæ in corpore sunt, secundum suum ipsius modum exornavit, ad universi imitationem, parva ad magna, et magna ad parva. Venter quidem maximum, sicco, et humido preomptuarius, ut det omnibus, et accipiat ab omnibus, juxta maris facultatem, quod est animalium in ipso nutritorum, ac nutritis: solutorum alimentum, discolorum vero perennes. Circum hunc autem aquæ frigide, et humide congregatio, transitus spiritus frigidi, et calidi ad terræ imitationem, omnia, quæ in ipsum incidunt, alterantur. Et alia quidem consumuntur, alia vero augentur, aquæ rehus, ac ignis dispersionem facit, insuperque non obcuri, et apparentis a compacto secretionem, in quo declarata omnia in apertum perveniunt, singula juxta destinatum satum. In hoc vero triplicem circuitum ignis facit, inter se mutuo intro, ac foras terminantes, alios quidem ad cavitates humorum lunæ facultate: alios vero ad externam circumferentiam, ad ambientem soliditatem altorum facultate. Medi vero et intro, et foras terminantes, calidissimum, ac fortissimum ignem habent, qui sane omnibus dominatur, omnia secundum naturam gubernans sive streptu tum ad visum, tum ad tactum. In hoc Anima, Mens, Prudentia, Augmentum, Motus, Immutatio, Permutatio, Somnus, Vigilia. Hic omnia per omnia gubernat, et hæc, et illa, nunquam quiescens. * At vero homines ex manifestis obscura considerare non novērunt. Quam enim artibus utantur similibus humane nature, id ipsum ignorant. Divina enim Mens edocuit ipsos sua ipsorum imitari, ut ut cognoscant, quæ faciunt, & non cognoscant, quæ intrentur. Omnia enim similia sunt, dissimilia existentia, & omnia concordia, discordia existentia, quæ comprobamus, non comprobamus, aequitatem habentia, iniqua sunt, contrarius est modus singulorum ei, quem consentitur. Lex enim, & natura, quibus omnia transigimus, non consentitur, quæ consentitur. Legem enim posuerunt, ac tulerunt homines ipsi sibi ipsis, non cognoscentes, de quibus tulerunt. Naturam vero omnes dei exornaverunt. Quæ igitur homines sanciverunt, nunquam eodem modo habent, neque recte, neque non recte. Quæ vero dii sanciverunt, semper recte habent. Et recta, ac non recta tantum differunt. * Ego vero Artes hominis manifestas, affectu nobis & manifestis, & obscuris similes esse declarabo. Variatio talis quid est. Ex manifestis quidem cognoscere obscura: ex obscuris vero manifesta, & ex præsentibus futura, & ex mortuis viventia. Et ea, quæ intelligi non possunt, va-

- tem intelligunt; qui quidem doctus est, semper recte; qui vero non doctus est, alias
 alter. Naturam hominis etiam hæc, quantum possibile est, imitantur. Vir mulie-
 71 rum concubens, puerum facit. Hoc manifeste, obcurum cognoscere datur, quod
 sic futurum est. Mens hominis obscura, cognoscens manifesta, ex puero in vi-
 rum transit, hoc præsentis futurum cognoscit. Non simile a morte ullum aliquid
 animal existit, neque mortuum animal vivum. Veniens, quod intelligi non potest,
 novit; per hunc enim intelligimus, quod sic, aut elucit. Hæ artis vaticinandi
 & humane nature affectiones, cognoscuntibus quidem semper recte habent;
 15 verum non cognoscentibus alias aliter. * Artis fabrilis febratiz instrumenta fer-
 rum circumstant, statim ignem fabri cogunt, & alimentum iam præsum auffle-
 runt; ubi vero rasefecerint, ferunt, ac tundunt. Aquæ autem alimentum ferrum ruri-
 110 sus robotatur. Eadem patitur homo a pedotribus, præsum enim alimentum
 igne detrahatur, quous præ spiritu homo cogatur; rasefactus autem tunditur, at-
 teritur, subvertitur. Aquæ autem aliunde accessione corroboratur, ac fortis eva-
 dit. Et huiusmodi idem transiunt, calestrant, ferunt, destruentes tundunt, trahunt
 215 destruentes, robustiora faciunt, decedentes supereminentia, & atroxentes pulchro-
 ra reddunt. Eadem etiam homo perperitur. Sutores coriarii tota in partes dis-
 secant, semicentes, & pungentes, marcida ac Jaceta, sana & integra faciunt. Et homo
 idem patitur. Ex totis partes secantur, & ex partibus compositis tota sunt. Punguntur,
 16 & secantur a medicis marcida, sananturque, ac vivit homo. * Medicina id, quod mo-
 lestiar, tollit, & id, a quo homo agrotat, auferens, sanum facit. Natura eadem sua sponte
 novit. Desidens conatur resurgere, currens conatur requiescere, & alia cunctis
 modi natura habet, quæ medicinz sunt. Fabri lignatiz terra secantes, alter tra-
 hit, alter protrudit. Idem autem uterque facit, & in utramque partem tendit. Idem te-
 225 rebrant, alter trahit, alter protrudit, & qui premit, superiorem deorsum trahit, &
 minus facientes plus faciunt, naturamque hominis imitantur. Spiritus alter tra-
 hit, alter protrudit. Idem autem uterque facit, & in utramque partem tendit. Cibi par-
 tem deorsum premuntur, partem sursum vergunt. Ab una anima divisa, plu-
 res, & majores, & minores, & pauciores sunt. Edificatores ex diversis rebus
 unam concordem facientes; sicca quidem, humectantes; humida vero secantes,
 230 & tota dividentes, divisa vero componentes; (si enim non sic contingeret, nihil præ-
 vatim, ac proprium constitui posset.) Naturam humanam in hoc imitantur. Nam &
 in hac sicca humectantes, & humida resicantes, tota quidem dividunt, divisa
 vero componunt. Hæc omnia diversa, ac discordia existantia, cum natura con-
 24 cordant. * Musices autem organum primum producere oportet, in quo harmonia
 quæ vult, declarabit. Constructiones ex istis non eadem sunt, ex acuto, ex
 245 gravi, nomine quidem similibus; sono autem non similibus. Quæ plurimum di-
 versa sunt, maxime concordant, & quæ minimum diversa sunt, minime concor-
 dant. Si vero quis similia omnia faciat, non inest delectatio. Plurimæ, ac multi-
 formes transmutationes maxime delectant. Coci obsonia hominibus parant;
 250 omnis generis diversa commiscentes; ex istis non eadem, ad hominum
 cibum, ac potum. Quod si omnia similia facerent, non haberent delectationem;
 & si in eodem etiam omnia constituerent, non utique recte haberent. Pulsantur to-
 ni in musica partim superne, partim inferne. Lingua musicam imitatur, cog-
 255 noscens quidem dulcedinem, & acorem eorum, quæ alabuntur, itemque dissonan-
 tia; pulsant autem sonos superne, ac inferne, & neque ea, quæ superne pulsantur, si
 inferne pulsantur, recte habent, neque quæ inferne, si superne. Quam autem lin-
 gua probe fuerit temperata, symphonice delectatio contingit. Si vero discors fue-
 rit, ac incongrua, molestia. Pelhum tinctores tendunt, terunt, pectinant, lavant. Ea-
 dem est puerorum curatio; Plicatores, ac textores ducentes in orbem fila plicant,
 260 a principio in principium desunt. Idem circuitus in corpore est; unde incipit, id
 hoc definit. Aurum operantes tundunt, lavant, molli igne liquant; forti autem non
 consistunt. Ubi vero elaborantur, ad omnia utuntur. Homo frumentum tundit,
 lavat, molli, & ubi igne coxit, utitur, & forti quidem igne in corpore non consis-
 tit, verum molli, ac lenio. Statuarii imitationem corporis faciunt, minus
 275 excepta; mentem autem habentem non faciunt; ex aqua, & terra humida siccan-
 tes, & sicca humectantes, ab his, quæ superabundant, detrahunt, & ad ea, quæ defi-
 ciunt, addunt, ex minimo ad maximum augentes. Eadem patitur homo, auget
 se a minimo ad maximum, ex superabundantibus detrahens, & deficientibus appo-
 nens, sicca humectans, & humida siccas. Figuli rotam versant, & neque re-
 280 trosum, neque antrosum procedit, sed simul in utramque partem. Universi hæc imita-
 tionem circularis existit. In eadem autem, quam iam circumfertur, omnis generis opera ef-
 ficuntur, ut alterum altero in nulla re simile existat. Ex istis homines eadem patiuntur,
 itemque reliqua animalia in eadem circumferentia omnia operantur, & ex istis ni-
 285 hil simile, istis instrumentis ex humidis sicca facientes, & ex siccis humida. * Gram-
 marica tale quid est, figurarum compositio, quæ signa, ac notæ sunt humane vocis,
 facultas revocandi in memoriam præterita, & quæ facienda sunt, declarandi. Per
 septem figuras notitia contingit. Eadem omnia homo transigit, sive sciens li-
 teras, sive literarum vidus. Per septem figurat etiam sensus hominibus commu-
 niter.

- 270 Auditus sonorum, Visus manifestorum, Nafus odoris, Lingua voluptatis, & pueri-
cunditatis, Os sermōnis, Corpus tactus calidi, aut frigidi, Spiritus tractatus
maro, ac foras. Per hæc cognitio hominibus contingit. * Paleftra, & pædoris
tale quiddam docent: prævaricari fecundum leges, iniuriam facere iuste, defrauda-
re, furari, sapere, violare honestiffima, ac turpiffima. Qui hæc non facit, malus;
375 qui hæc facit, bonus est. Ostentatio multorum, ac vulgi est, desipientia hæc esse
vident, & unum ex universis bonum iudicant; reliquos vero malos. Multi mi-
rantur, pauci cognoscunt, Homines in forum progressi eadem perpetrant,
defraudant vendentes, & ementes. Qui plurimum defraudavit, in admiratione
est. Bobentes, & infantes eadem perpetrant, currunt, luctantur, pugnant, furan-
380 tur, defraudant. Unus ex omnibus præfertur. Simulatores, & deceptores alia ad-
ferentes dicunt, & alia sentiunt, idem erant, & irrepunt non idem. Inest autem ho-
mini alia dicere, alia facere, & eundem non esse eundem, & nunc aliam habere men-
tem, nunc rursus aliam. Sic quidem artes omnes cum humana natura communicant.
* Cæterum anima hominis, quemadmodum etiam antea a me dictum est, ignis, &
385 aque temperamentum habens, partes autem hominis, irrept in omne animal,
quod sane spirat, itemque in omnem hominem & iuniorem, & seniore. Non autem
similiter in omnibus aufeſcit, sed in juvenibus corporibus, utpote celeri circum-
volutione existente, & corpore rutilis, expansa, & attenuata partes illæ animæ
in corporis augmentum consumuntur. In senariis autem, utpote tardo existen-
390 te motu, & corpore frigido, in decrementum hominis consumuntur. Quæcumque
autem corpora in vigore sunt, & in ætate secunda eas nutrire, & augere possunt,
Potentes autem homines, ut quisque plurimos homines alere potest, ita fortis iudi-
catur, ac potens; ubi vero defecerint, quos alat, imbecillior censetur. Sic etiam cir-
ca singula corpora res se habet. Quæcumque plurimas animas nutrire possunt, ea for-
395 tiora sunt; ubi vero hæc discescerint, imbecilliora. * Quæcumque igitur in aliud cor-
pus ingressum fuerit, non aufeſcit. Quicquid vero in feminam, aufeſcit, si ea,
quæ ipsi contraria sunt, contingant. Discriminantur autem partes, & aufeſcunt
simil omnes, & neque prius alteris, neque posterius. Verum majores natu-
ra priores apparent minoribus, quoniam non peliores existant. Non autem in æquali
400 temporis spatio omnes scæcis exoriantur, sed alii citius, alii tardius, prout singu-
li & ignem, & alimentum succum nacti, aliqui itaque in quadraginta ac tribus diebus
ſcaturunt, ac formantur, aliqui in quatuor mensibus. Similiter etiam vitales sunt,
ac gignuntur, aliqui citius septimo mense perfecte; aliqui tardius, perfecte nono
mense in lucem prodeunt, & ostendunt, se temperamentum habere, quod semper hæ-
405 bebunt. Masculi igitur, & femellæ hoc modo gignuntur, quantum ejus ſi-
ni potest. * Cæterum femellæ ab aqua magis, & a frigida, ac humida, & molli-
bus aufeſcunt tum cibis, tum potibus, nemque studiis, ac exercitiis. Masculi ve-
ro magis ab igne, a sicco videlicet, ac calidis cibis, & reliqua dicta. Si igitur fe-
mellam parere velit, diæta ad aquam vergente utendum est. Si vero masculum, exer-
410 citius, ac victu ad ignem tendente utetur. Et non solum vitium hoc facere oportet,
sed etiam malitiam. Non enim solum quod a viro ſecernitur, austile est, sed etiam
quod a muliere, ob hanc sane causam. Utraque quidem pars sufficientem motum non
habet ad humoris multitudinem, ut quod induit, consumat, & propter ignis debilita-
tem coagulentur. Quum vero amba in idem considerunt, mutuo inter se incur-
415 runt, & obvolvuntur, ignis ad ignem, & aqua similiter. Siquidem igitur in ſecco loco
circumvolvitur ignis, coſſapſum aquam ſuperat, & ab hoc ignis aufeſcit, ne ab illa
beat unda extinguitur, aliumque accedentem ſuſcipiat, ac ſibi coſoſcet. Si vero in
humorem incidit, ſtatim ab igne extinguitur ab illabente unda, & in minore or-
420 dine diſſolvitur. In una autem die uniſcuſque meſis coſociare, ac ſuperare ea, quæ
ageeſcunt, poteſt, & hoc ſi comedierit ab utriſque in unum locum. * Conſiſtere autem
poſſunt inter ſe & femella, & maſculus, propterea quod anima quidem idem eſt in o-
mnibus animarum. Corpus autem uniſcuſque diſſert. Anima quidem igitur ſemper
425 ſimilis & in maiore, & in minore. Non enim alteratur neque per naturam, neque per
neceſſitatem. Corpus autem nunquam idem in ullo aliquo eſt neque ſecundum naturam,
neque ex neceſſitate, propterea quod partim ſecernatur in omnia, partim permisceatur ad
omnia. Si quidem igitur maſcula corpora ab utriſque ſecreta fuerint, aufeſcunt pro
re præſenti, & ſunt in viti animis ſplendi, & corpore fortes; ſi non a dicta poſtea
detrimentum ſentiant. Si vero a viro quidem maſculum ſecernatur, a muliere vero ſo-
430 mineum, & ſupera verit, ſi ita contingat, maſculum: (Genitum enim miſceſcit ad for-
torem, aut debiliorem. Non enim habet ex præſentibus aliquid, ad quod familiariter
ſecedere poſſit. Suſcipit enim parva maiorem, & maior maiorem. In commune autem
ſuper hæc, quæ adſunt, dominum exerceat) corpus ſane maſculum aufeſcit, ſo-
mineum vero minuitur, & in aliam ſortem ſecernitur. Et hi quidem minus prioribus ſplen-
435 dit ſunt, tamen quia maſculum a viro ſupera vit, viriles evadunt, & hoc nomen
merito habent. Si vero a muliere quidem maſculum ſecerni fuerit, a viro autem mu-
liebre, ſupera verit autem maſculum, aufeſcit eodem modo, ſicut prius, ſo-
mineum vero minuitur. Et ſunt hi Androgyni, id eſt viriſſimum, & quæ ſic recte appel-
latur. Tres quidem igitur hæc ſunt generationes hominum diſſerentes in eo, quod ma-

- gis, aut minus tales sint propter partium aquæ temperamentum, & alimenta, & institutiones, ac consuetudines: declarabo autem in progressu serinosis etiam de his. 340
- 24 * Cæterum foemella eodem modo gignitur. Si enim ab utrisque foemineum secretum fuerit, foeminossimæ, ac ingeniosissimæ fient. Si vero a muliere quidem foemineum, a viro autem masculum, superaverit autem foemineum, audaciores quidem prioribus fient, verumtamen ornatae, ac moderate etiam ipsæ. Si vero a viro quidem foemineum, a muliere vero masculum secretum fuerit, & foemineum superaverit, augetur eodem modo, & sunt hæc audaciores adhuc prioribus, & viriles, ac viragines nominantur. Si autem quis non credat animam animæ amplexeri, demens est. Si quis enim carbonem ardentem ad ardentem adjiciat, fortes ad debiles, & alimentum ipsis præbuerit, simile corpus omnes exhibebunt, & alter præ altero non cognoscitur, sed in qualicumque corpore ignem susceperint, tale in omnibus erit. 345
- 25 Ubi vero præfens alimentum consumpserint, secernuntur, ac obscurantur. Idem hoc anima hominis patitur. * At vero quomodo gemini nascantur, hoc sermone declarabo. Equidem natura uterorum in foeminis ut plurimum in causa est. Si enim similiter in utranque partem iuxta osculum disposita natura fuerint, & similiter hiaverint, & a purgatione secantur, alere possunt, si semen viri conceperint, ita ut statim descendatur. Sic enim necesse est dispergi in utrumque uterum similiter. Siquidem igitur multum semen ab utrisque, & forte secretum fuerit, in utrisque locis augeri potest: dominum enim habet in alimentum, quod accedit. Si vero aliter contingat, gemini non sunt. Quum itaque masculum ab utrisque secretum fuerit, necessarium est in utrisque masculos gigni: quum vero foemineum ab utrisque, foemellæ 360
- fiant: quum autem alterum foemineum, alterum masculum fuerit, utrum altero prævalerit, id ipsum augetur pro ea ratione. Similes porro inter se sunt gemelli ob hanc causam. Primum quidem, quod æquales sint loci, in quibus auferunt. Deinde quod simul secreti sunt. Postea quod iisdem alimentis auferunt, vitalesque in hunc produunt. * Cæterum superfecundationes hoc modo sunt. Quum utriusque calidi, & sicci natura fuerint, ipsaque mulier ejusmodi, & semen calidum, ac siccum illapsum fuerit, non fit amplius ulla aliqua humiditas in utero, quæ semen superillabens contineat. Quapropter consistit ab initio, ac vivit: perseverare autem non potest, sed etiam id, quod jam adest, insuper corrumpit, quia non eadem utrisque conferunt. Etenim quod tenuissimum est in aqua, & quod rarissimum in igne, si in hominis corpore temperamentum acceperint, sanissimum habitum constituunt. Propterea quod neque in temporum anni maximis mutationibus, neque in regionum permutationibus, neque in ciborum, ac potuum alterationibus aqua densissima evadit in aquæ impetuosius incursum, neque ignis in ignis impetu. Possunt enim ambo & generationem, & societatem plurimam suscipere. Aëres mollissimum, ac rarissimum plurimum temperamentum suscipit, ac optimum evadit. Eodem modo etiam quod tenuissimum est in aqua, ac rarissimum in igne, ubi temperamentum acceperint. Qui igitur hanc naturam habent, sani perleverant omni tempore usque ad quadragimum annum: aliqui vero etiam usque ad extremam senectutem. Qui vero a quadragesimo anno a morbo aliquo correpti fuerint, nunquam 380
- 27 ferme evadunt. * Quæcumque autem corpora ignis fortissimi, & aquæ densissima temperamentum acceperint, fortia, & robusta sunt, verum multa custodia opus habent. Magnas enim transmutationes in utranque partem habent, & in aquæ incursum in morbos incidunt, & in ignis consimiliter. Qui igitur ejusmodi naturam habet, eum victum uti conducibile est temporibus anni contrario. Et aquæ quidem incursum contingente, uti oportebit eum ab his, quæ ab aqua sunt, paulatim pro temporum ratione discedendo. Porro ubi aquæ crassissima, & ignis tenuissimus in corpore mixtura facta est, talia contingunt, ex quibus frigidam, & humidam naturam cognoscere oportet. Talia enim corpora in hyeme morbosiora sunt, quam in æstate, & in vere, quam in autumno. Cæterum quod ad ætates attinet, sanissimi ex talibus pueri sunt, deinde adulescentes, morbosissimi autem senes, & his vicini, & hæc naturæ cito senescunt. Talibus in victu conferunt, quæ calidant, ac siccant tum in cibis, tum in exercitiis, & externas corporis partes magis, quam internas exercere conducit. Si vero humidissimum in igne, & densissimum in aqua, in corpore mixturam acceperint, ex his humidam, ac calidam naturam cognoscere oportet. Laborant quidem ex morbis huiusmodi maxime in vere, minime in autumno, quia in vere excessus est humiditatis, in autumno vero symmetria, & moderatio siccitatis. Ex ætatibus vero morbosissimæ sunt juniores. Corpora autem cito auferunt, & tales distillationibus obnoxii sunt. His conducit exhibere, quæcumque siccant, ac frigefaciunt, & in cibo, & in potu, ac laboribus. Verum labores 400
- 28 intra corpus his facere maxime confert. * Si vero mixturam acceperint fortissimum in igne, & tenuissimum in aqua, sicca, & calida est natura, & talibus morbus in ignis accessionibus contingit, sanitas vero in aquæ. Et in ætatibus vigentibus ad carnis bonam habitudinem morbosissimi sunt, sanissimi autem senes. Ita etiam utrisque proximi. Diætæ, quæ frigefaciunt, ac humectant, & ex laboribus, quum nime exaltant, ac colliquant, plurimam frigiditatem exhibebunt. Huiusmodi 405
- 29 naturæ vivacissimæ, ac sanissimæ existunt. * Si autem mixturam acceperint coge-

- pota ignis rarissimi, & aquæ siccissimæ, sicca, & frigida talis natura est, morbo-
 410 la quidem in autumno, sana vero in vere, & vicinis temporibus. Similiter ætates ad
 annos quadraginta morbozæ, pueri sanissimi. Ita & utrique proximi. Diætz his con-
 terunt, quæ calidæ exsistentes humectant, & labores sensim adhibiti leniter calfacien-
 tes, & non multum ab his, quæ adiunt, auferentes. De nature igitur cogni-
 tione sic a prima constitutione cognoscere oportet. * Cæterum ætates ipsæ ad se
 415 ipsas hoc modo habent. Puer itaque ex calidis, & humidis temperatus est, quia
 ex his constitutus est, & in his augmentum accipit. Humidissima igitur, & calidissi-
 ma sunt corpora proxima generationi, & augescunt quam plurimum, & quæ his
 proxima sunt eodem modo. Adolescens autem calidus quidem est, quia ignis
 impetus aquæ dominatur. Siccus autem, quia humidum ex puero consumptum est
 420 partim in augmentum corporis, partim in motum ignis, partim præ laboribus, ac
 exercitiis. Vir, quum stererit iam corpus, siccus est, & frigidus, quia caliditatis im-
 petus non amplius dominatur, sed stat corpus ab augmento quiescens, ac perfrige-
 ratum. Verum ex adulescenti ætate siccitas inest. Ab infrequenti autem ætate,
 & aquæ accessu humiditatem non habet, quapropter ex siccis, & frigidis exupe-
 ratius est. Senes autem frigidi sunt, & humidi. Quia ignis quidem recessus
 425 contigit, aquæ autem accessus, & sicciorum quidem sublatio; humidorum autem sta-
 tus. Ex omnibus autem masculi calidiores sunt, & sicciores; femine vero
 humidiores, ac frigidiores. Propterea quod ab initio utrique in talibus geniti
 sunt, & a talibus augescunt. Ubi vero in lucem editi sunt masculi, victu, ac diæta
 laboriosiore utuntur, ut excalecant, ac resiccantur. Femine vero humidioribus,
 430 ac pigrioribus diætis utuntur, & caliditatis purgationem ex corpore singulis
 mensibus faciunt. * Porro de animæ sapientia, ac desipientia hoc modo se res ha-
 bet. Quod humidissimum est in igne, & siccissimum in aqua, si in corpore tem-
 peramentum acceperint, sapientissima sunt. Quia ignis quidem habet humidita-
 tem ab aqua; aqua autem siccitatem ab igne; uterque autem sic sufficientissimus est.
 435 Neque ignis alimentum indigentior multum procedit, neque aqua motus indiga multum
 levis redditur. Sic itaque utraq; & per se sufficientissima sunt, & inter se per-
 mixta. Quod enim minime vicinis indiget, hoc maxime præsentibus obtemperat,
 velut ignis, qui minime movetur, non præ necessitate, & aqua, quæ maxime,
 non præ violentia. Ex his autem anima temperata sapientissima est, & memoria
 440 valentissima prædita. Si vero aliquo ascitamento utens, alterutrum horum auge-
 scat, aut contabescat, desipientissima redditur, propterea quod quum sic ha-
 beant, sufficientissima existunt. * Si autem ignis sincerissimus, itemque aquæ tem-
 peramentum anima fortiat: sit autem ignis paulo inferior, ac defectuosior, quam
 445 aqua: sapientes quidem sunt etiam hi, verum defectuosiores, quam in priore tempe-
 ramento; propterea quod ignis ab aqua superatus, & tardiorum motum fac-
 iens, segnius sensibus allabatur: constantes autem cum mansuetudine sunt eius-
 modi animæ, ad quamcumque tandem rem animum applicuerint. * Si vero recto vi-
 ctu utantur, & sapientiores, & acutiores præter naturam fieri queant; talibus con-
 fert victu uti ad ignem magis tendente, & non repletionibus neque ciborum, neque po-
 450 tibus. Curfus itaque utendum est velocibus, quo & corpus humore evacuetur, &
 humor amplius citius sistatur. Luctis autem, & fricationibus, & eiusmodi exer-
 citiis uti non conducit, ut ne meatus caviore redditi repleantur. A talibus enim
 animæ motum gravari necesse est. Confert & deambulationibus uti tunc a cœna,
 455 tum mane, itemque a curfibus. A cœna quidem, quo alimentum siccius anima susci-
 piat ab ingredientibus, ac ingests. Mane vero, quo transitus humoris evacuentur,
 & meatus animæ non obtineant. Ab exercitiis vero, ut ne in corpore relinqua-
 tur, quod secretum est a cursu, neque animæ commisceatur, neque transitus obturetur,
 neque alimentum conturbetur. Confert & vomitibus uti, quo corpus depurgetur,
 si quid defectuosius labores transegerunt; a vomitu autem paulatim adiaciendis, ci-
 460 bus offerendus est minimum ad quatuor dies. At vero ungi conducibilis est, quam
 lavari. Coiti utendum est, aquæ accessibus contingebit, frequentiore: in ignis
 autem impressionibus, pauciore. * Porro si in aliqua anima defectuosior vim
 465 ignis accipiat, quam aqua, eam tardiorum esse necesse est, & appellantur tales stolidi.
 Nam ut tardiore existente circuitu, sensus paulatim allabuntur, & qui acuti existunt,
 parum commiscantur propter circuitus tarditatem. Sensus enim animæ, qui per vi-
 sum, ac auditum contingunt, acuti sunt: qui vero per tactum, tardiores, & facilius
 percipiuntur: hos quidem igitur percipiunt etiam tales nihilominus, velut sunt frigi-
 da, & calida, ac consimilia. Quæ vero per visum, aut auditum percipere oportet,
 quæ non prius sciunt, percipere non possunt. Si enim non commota fuerit anima
 470 ab igne allabente, non percipere poterit, quale quid tandem sit. Tales igitur animæ
 non percipiuntur hoc ob celeritatem, quale quid tandem sit. Tales igitur animæ
 melior fieri possit. Conferunt itaque huic eadem, quæ priori. Verum siccioribus, ac pau-
 cioribus cibis utentur, laboribus autem pluribus, & acutioribus, ac velocioribus.
 Confert & fomentis uti, & vomitibus a fomentis, & exhibitionibus ciborum a vo-
 475 mitibus ex longiori tempore, si defectuosius contigerint vomitus. Et sane hæc
 faciens, sanior, ac sapientior fuerit. * Si vero amplius adhuc superetur ignis a sa-
 pientia-

præfenti aqua hos iam alii desipientes, alii attonitos, sive stupidos appellant. Et hæc infan-
 tiæ quædam species tardior existit: hi plorant, uerimine molestante, aut
 verberante, formidantque non formidanda, & tristantur in rebus nihil ad se perti-
 nentibus, & sentiunt ea, quæ non conveniunt sapientibus. Confert itaque his fomen- 480
 36 talis homo attenuatone pulmonis, ac siccitate. * Si autem aqua defectuosiorẽ
 vim accipiat, quam ignis, quàm alias sincerum temperamentum habeant, sani sunt ho-
 mines corporibus, & sapientes. Talis autem animã cito percipit allabentia, & non
 sæpe ab una re ad aliam transit. Natura quidem igitur talis animæ bonæ est. Me- 485
 lior autem reddetur rectæ dietæ usui, & pejor pravæ. Confert hunc, dietæ usus ad a-
 quam magis vergentis, ita ut excessus vitæ & ciborum, & potum, & laborum.
 Utetur & cursibus curvis, & rectis revertentibus, luctisque, ac reliquis exercitiis,
 ita ut in nullo excessum faciat. Si enim sanum fuerit corpus, & non ab aliquo alio
 37 perturbetur, animi temperamentum sapiens existit. * Si vero amplius aquæ vis
 ab igne superetur, tali homini necesse est, tanto acutiores animam esse, quanto ci- 490
 tius movetur, & ad sensus citius allabi, verum minus constantem priore, pro-
 pterea quod iudicat ea, quæ obveniunt, & in pulmonem ipso procedit ob celeritatem.
 Confert tali homini dietâ uti magis ad aquam vergente, quam priori, & maza mag-
 is, quam pane, & piscibus magis, quam carnibus, & potu aquosiore, & Venere rarius 495
 utetur, & laboribus, qui sunt maxime secundum naturam, quam plurimis: violentis au-
 tem uti non est necesse. Utetur & vomitibus paucioribus ex repletionibus, quo
 corpus quidem evacuetur, quam minime vero caleat. Conducit etiam talibus ad sa-
 pientiam, ut minime carnosissimi sint. Nam ad carnis bonam habitudinem, ardoris inflam-
 mationem fieri necesse est. Quum autem tale quid huiusmodi anima perpetitur, 500
 ad insaniam adigitur, ex superata aqua adactâ. Talibus confert actiones obire, ac
 transigere a cibo accepto magis, quam jejuniis. Stabilius enim redditur anima alimento
 38 ab igne, talis anima valde acuta est, & tales necesse est somnia videre, vocant autem
 ipsos subfuriosos. Nam res valde propinqua infantiæ est. Etenim a brevi, & incom-
 moda inflammatione infaniunt, & in ebrietatibus, & carnis bona habitudine, 505
 & præ carniæ esu. Verum talem oportet ab his omnibus, abstinere, utemque a reliqua
 repletionem, ac exercitiis violentis. In victu utendum est maza vino dulci non
 subacta, & oleribus coctis, sed non purgantibus, & pisciculis ex muria, & aquam bi-
 bere præstantissimum est, si fieri possit, sin minus, vinum molle, & album, quod aquæ 510
 sit proximum. Deambulationibus quoque multis mane utendum, a cœna vero
 satis est exurgere, quo cibi quidem non resiccentur a deambulationibus post
 coenam; corpus autem evacuetur a manutinis. Lavare autem magis condu-
 cit aqua tepida circumaffusa, quam ungi. Confert & in æstate interdum somno
 uti brevi, non multo, ut ne corpus ab anni tempore resiccentur. Conveniens est 515
 etiam vere veratris purgare, fomentis antea præparatos, deinde sensim ad
 dietam inducere, & neque hunc jejunium actiones obire oportet. Ex hac sa-
 ne cura, huiusmodi anima sapientissima fuerit. Sapientis quidem igitur, ac
 desipientis animæ hoc temperamentum causa est, quemadmodum a me scriptum
 39 est, potestque ex dietâ & melior, & deterior fieri. * Caterum curius impetu 520
 igne prævalente, impossibile forte fuerit aquæ aliquid apponere, similiterque
 aqua prævalente in temperamento, ignem augere. Ex his vero & sapientiores, &
 desipientiores animæ sunt. At vero talium non amplius temperamentum est, qualis
 est Iracundus, Segnis, Dolosus, Simplex, Infestus, Benevolus. Talium om-
 nium natura meatuum, per quos anima meat, causa est: per qualia enim vasa sece- 525
 dit, & ad qualia allabitur, & quibus ammiscetur, talia sapiunt. Ob id itaque im-
 possibile est, talia ex dietâ transmutare. Naturam enim obscuram transformare non
 40 est possibile. * Similiter autem & vocis qualiscumque tandem fuerit, meatus spi-
 ritus causa sunt, per qualescunque enim aer movetur, & ad qualescunque allabitur,
 talem necesse est esse vocem: & hanc quidem tum deteriores, tum 530
 meliores facere possibile est; quia leviores, ac breviores
 res meatus spiritus facere possibile est. Verum
 illa ex dietâ alterare, impossibile existit.

HIPPOCRATIS COI

DE DIÆTA, SIVE VICTUS RATIONE

LIBER II.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Quomodo regionum singularum natura, & situs cognoscendi. Regio ad meridiam. Locorum iuxta seipsa differentia. Alta, & squalida ad nitridum. Lucultra, & palustris. Cava, & non aquosa. Montes ab Austro, & Aquilone. Cava ab Aquilone. Insula ad continentem, & mare.
- 2 De ventorum aatura, & facultate.
- 3 Boreas. Austro. Austro car natura humidus, plantarum, ac hominum corpora in Libya resiccat.
- 4 De ventorum natura iuxta singulas regiones. Ventus a mari, aëre, glacie, flammis, terra, montibus.
- 5 Quomodo de ciborum, ac potuum singularum vi, tum ea, quæ feruorem naturam est, tum ea, quæ per artem accessit; cognoscere oporteat. Qualitates secundas, licet in eodem genere, non tamen semper similes esse.
- 6 De Ordeo. Polentarium facultas. De Maxa. Maxa quæ ratione per alvum secedat, & quando refrigeratoria. Maxa sicca, dulcis viuo emollita, ac trita facultas. Cereæ quid. Lat.
- 7 De Tritico. Panis triticeæ farina, & ex pura tantum collata facultas. Panis fermentatus. Panis facto subaltus. Maximus panis eo maxime alant. Panes fornaceti, focarii, vernarii, elubano colli, subconiceæ, similaginei. Panes ex alica. Furfurum sacculus coctus.
- 8 Similago. Tragus, sive olura. Avena. Polenta, & farine quæ secciores. Panes calidi. Faba. Pista. Oculi, sive Ervilia. Dolichi. Silique. Cicer album. Atilium. Lentis. Ervum. Lini fenum. Horumini semen. Lupini. Frio. Cacumeris semen. Cnicus. Papaver. In medicamentorum preparatione quæ observanda.
- 9 De animalibus, quæ in ciborum usum veniunt: & primo de alimento, quod a quadrupedibus sumitur. Carnes bubule, caprine, felle. Animalium hoc tunc, carnis tenuioris indicium. Carnes agnæ, vitulinæ, porcine, asinæ, equine, canine, caniline, suis silvestris, cervine, leporine, vulpine, erinaceorum.
- 10 De alimento, quod a volucribus animalibus sumitur: & cur aves neque miscant, neque speciem fundant. Carnes palumborum, columbarum, perdicum, gallorum, turronum, asserum, anatium.
- 11 De nutrimento, quod ab aquatilibus animalibus sumitur. Ex piscibus succissimi scor-

pius, draco, callionymus, euculus, glaucus, perca, thurra. Leues sunt petrosi, ferre omnes, ut tadus, phoca, elephetus, gobio. Errantes autem, & laboribus fracti solidiorem carnem habent. Leuius autem sunt terpedines, squatina, rhombi. Graviores, capitones, mugiles, anguille, & quicumque in lutois, & aqualis locis alimenta habent. Fluviales, & palustres graviores. Polypti, scip, conchyria, pina, purpura, patella, buccina, ostrea, Salsamenta.

- 12 De agrestium, ac domesticorum animalium differentia. Animalia silvestria, & domestica. De animalium carnis differentia, & primum de partibus exanguibus. Carnes fortiores, & leuius. Exanguum partium alie robustissima, alie leuissima. Pisces. Orva volucrium, Cateus.
- 13 De Aqua. De Puro: nigra, & austera vina. Adulsa nigra. Dulcia nigra. Alba austera. Nova. Tenuia dulcia. Mustum. Pura acida. Accrum. Sapa. Mel. Vinum dulce pituitosis alvus magis secedit.
- 14 De alimento, quod a plantis ipsis agrestibus sumitur. Allium, Lepa, Porrum, Raphanus, Nasturtium, Sinapi, Eruca, Coriandrum, Lactuca, Anethum, Apium, Ocimum, Ruta, Asparagus, Salvia, Solanum, Portulaca, Calaminta, Mintha, Rumez, Atriplex, Alitum, Brassica, Beta, Cucurbita, Rapum, Fulegium, Origani, Thymra, Thymum, Hippocrepis. Olera ex calfacientia, & odorata. Olera acida, & austera. Olera acida, & odorata. Olera acida, & sicca in ore. Olera acida. Succus vinum eientes. Alvum moventia.
- 15 De Fructibus, qui ab arboribus colliguntur. Poma. Mora. Pira maturo, silvestria, cruda. Mala. Cydonia, Sorba, Mispila, Corna. Malum puniceum, Nuclei, Cucumeres, Horti urorum, Ficus, & Uva passe. Cericea, Amygdale. Nuclei rotunde. Acti.
- 16 Carnium differentia secundum varias preparationis modos, & quomodo carum coctura vires augenda, & minuenda.
- 17 Ex igne, & aqua omnia consistunt, & ex his ceteri, & in hac secerui, ac reserui. Talla, & effata.
- 18 Alimenta sicci, & assuosis locis nascuntia. Alimento forte, & leve quod.
- 19 Alimenta calfacientia, seccantia, & humefactia, excalfacientia, seccantia. Dulcia, pingua. Acida, acra, austera, acerba. Rectius, antiqua, cruda. Obscure.

folia

- sonia ex variis interitis. Edulia ex moria preparata.
- 20 De balneo. Aquapstabilis, falsa. Balnea calida, frigida.
- 21 Allevius. Uctio. Sol, Lapis. Umbra, frigus.
- 22 Sudores. Coitus. Vomitus. Vomitus ventrem solvit, & sistit.
- 23 24 Somnus. Vigilia. Otium. Labor.
- 25 Semel in die cibum sumere attenuat, siccant, & alvum sistit. Aquæ potus, Calfaciencia corpus, & alimentum non præstantia, frigiditatem exhibent.
- 26 De laboribus. Labores naturales, & violenti scilicet. Pises. Auditus. Curarum, & vocis exercitii, & deambulationum vis.
- 27 Deambulationis a cæca facultas. Mutati-

- ne deambulationes, item post exercitia.
- 28 Cæsus longi, ac curvi, in veste, vestis revertentes, circulares, quam vinhabent, quibus, & quo potissimum tempore conveniunt.
- 29 Cancriones. Commotiones. Læssa, & frictio, volutatio in pulvere, micatio, sellis, & manus ad rythmum motu.
- 30 Spiritus detento. Exercitia in pulvere, & oleo. Oleo cur corpus hinc magis aperi, assate contra. Pulvis inter exercendum. In pulvere morari post exercitia. Frictio ex oleo, & aqua.
- 31 De Lassitudinis tribus speciebus. Lassitudinis generatio, & vis. Inexcitatorum lassitudo, & curatio. Excitatorum ab infertis laboribus lassitudo, & curatio. Lassitudo a consuetis exercitiis, & eorum curatio.

I



REGIONUM singularum situm, & naturam hoc modo cognoscere oportet. Et in summa res hoc modo se habet. Regio ad meridiem sita calidior est, & siccior, quam ea, quæ ad septentriones jacet, propterea quod soli propinquior est. Et in his regionibus necesse est, & hominum genera, & nascencia ex terra siciora, ac calidiora, & fortiora esse, quam in contrariis, velut Lybica gens ad ponticam, & utriusque vicinæ. Ipsa autem loca iuxta septem hoc modo habent. Alta, & squallida, & ad meridiem sita, siciora sunt, quam campestria, & equaliter sita, propterea quod pauciores humores habent. Illa enim stationem pro aqua pluvia non habent, hæc habent. At vero lacustria, ac palustria humectant, & calfaciunt. Et calfaciunt quidem, quia cava sunt, & circumdara, & non persanantur; humectant autem: quia nascencia ex terra, quibus homines aluntur, humidiora sunt, & spiritus, quem attrahimus, crassior est propter aquæ stationem, ac immobilitatem. Verum cava loca, & non aquosa siccant, & calfaciunt. Et calfaciunt quidem, quia cava sunt, & circumdantur. Siccant autem tum propter alimenti siccitatem, tum quod spiritus, quem inspiramus, siccus existens, humorem ex corporibus trahit in alimentum sibi ipsi, quam non habeat aliium humorem, ad quem allapsus nutriatur. Ubi autem regionibus montes adjacent ad austrum, in his squallidi austri, & morbosi assant. Ubi autem ab Aquilone montes adjacent, in his aquilones perturbant, ac morbos faciunt. Ubi vero ab Aquilone cava loca urbibus adjacent, ab æstivis ventis calida, & morbosa hæc regio existit, propterea quod neque aquilo persanum puram spiritus inductionem exhibet, neque ab æstivis ventis perfrigeratur. Ceterum insulae propinque continenti tempestuosiores sunt, & ægre in ipsis hybernamus. Marinae vero hyeme tepidiores sunt, propterea quod nives, & glacies in continenti stationes habent, & ventos frigidus in vicinis insulas mittunt. Verum insulae intra pelagium positæ non habent in hyeme nivum stationem.

2

* Porro de ventis, quam naturam, ac facultatem singuli habent, hoc modo cognoscere oportet. Naturam quidem habent omnes venti humectandi, ac refrigerandi tum animalium corpora, tum nascencia ex terra, ob hanc causam. Necessesse est omnes ventos spirare a nive, & glacie, & gelu vehementi, & fluminibus, & stagnis, terraque humecta, ac perfrigerata. Et fortiores quidem ventos a majoribus, & fortioribus: debiliores vero a minoribus, & debilibus. Quemadmodum enim animalibus spiritus inest; sic etiam aliis omnibus, aliis quidem minor, aliis vero iuxta magnitudinem. Naturam quidem igitur habent humectandam, ac refrigerandam omnes venti. Verum propter situm regionum, ac locorum, per quæ venti ad singulas regiones accedunt, diversi inter se sunt frigidiores, calidiores, humidiores, sicciores, morbosiores, salubriores. * Singularum autem causam sic cognoscere oportet. Boreas, sive aquilo frigidus spirat, ac humidus, quia progreditur a talibus regionibus, nearque per tales locos, ad quos non accedit sol ipse, neque aerem reficcans, humorem ebirit, ac exhaurit. Quare ad terram habitabilem accedit suam ipsius vim habens, ubi non per regionis situm corrumpitur: & his quidem, qui proxime habitant, frigidissimus est: qui vero remotissime, minime. Aufter autem a similibus aquiloni natura regionibus spirat. Ab Australi enim polo spirans, & a nive mixta, glacieque, ac gelu fortibus procedens, necessarius his, qui prope ipsum illic habitant, talis spirat, qualis nobis est Aquilo. Verum omnem non item similis accedit regionem. Nam quum per solis iter, & in meridiem spirat, humiditas ipsius a sole ebiritur, & reficcatus rarefit: quapropter necesse est ipsum calidum, ac siccum huc accedere. In proximis igitur regionibus necesse est, ipsum talem vim calidam, ac siccantem exercere: &

re : & hoc sane in Lybia facit . Nam & terræ nascentia exarescunt , & homines la-
 center resiccat . Quin enim non habeat , nec mare , nec fluvium , unde humidita-
 tem accipiat , ex aërianis , ac plantis humorem exhaurit . Ubi vero pelagus
 55 illabatur , implet , & necesse est , ipsum calidum , ac humidum esse , ubi non regio-
 nis situs alterius qualitatibus causa existat . Eodem modo etiam aliorum ven-
 torum facultates se habent . * Ceterum iuxta singulas regiones venti hoc mo-
 do se habent . Venti ex mari in regiones illabentes , sicciores quodammo-
 60 do sunt . Qui vero a nive , aut glacie , aut stagnis , aut fluminibus procedunt , om-
 nes humectant , ac frigescent , tum plantas , tum aëm , & sanitatem corpori-
 bus exhibent , qui non frigiditate superexcellunt . Hi enim laedunt , propterea
 quod magnas mutationes calidi , ac frigidi in corporibus inducunt . Hæc autem
 perpetiuntur hi , qui in regionibus habitant palustribus , ac calidis prope flumi-
 65 na magna . Reliqui vero venti , qui a prædictis spirant , utiles sunt , tum aërem purum ,
 ac sincerum exhibentes , tum aëni calori humiditatem præbentes . Quicumque
 vero venti ex terra accedunt , eos necesse est sicciores esse tum a sole , tum a ter-
 ra resiccatis . Quum autem non habeant venti , unde alimentum trahant , a
 viventibus humorem trahentes , & plantas , & animalia omnia laedunt . Et
 quicumque venti , relictis montibus , ad urbes accedunt , non solum siccant , sed eti-
 70 am turbant spiritum , quem inspiramus , & corporum hominum morbosa fa-
 ciunt . Naturam quidem igitur , & vium singulorum sic cognoscere oportet .
 Quomodo autem ad singulos se præparare oporteat , in sermone progressu de-
 clarabo . * At vero ciborum , ac potuum singulorum vium tum eam , quæ secun-
 dum naturam est , tum eam , quæ per artem accessit , hoc modo cognoscere opor-
 75 tet . Quicumque igitur in summa dicere aggressi sunt , aut de dulcium , aut pin-
 guium , aut salsozum , aut alterius cuiusdam consimilis facultate , non recte iudi-
 cant . Non enim eandem vim habent , nec dulcia inter se , neque amara , neque ulla
 aliqua eusmodi . Multa enim ex talibus sunt , quæ & alvum emolliunt , & sistunt ,
 siccantque , & humectant . Similiter autem etiam in reliquis omnibus . Sunt , & quæ
 80 adstringunt , itemque alvum movent , & urinam cient . Sunt , quæ neutrum horum
 faciunt . Similiter & ex calfacientibus , ac reliquis omnibus , alia aliam facultatem
 habent . De omnibus quidem igitur impossibile est , qualia nam sint , declarare .
 Verum , quam vini singulatiim habeant , docebo . * Ordeum natura quidem
 85 frigidum est , & siccum . Inest & purgatorium quiddam a succo palcarum . Eius si-
 gnum habebis , si voles ordeum non purgatum coquere ; purgat enim is succus
 fortiter . Si vero decoratum coxeris , perfrigerabit magis , ac alvum sistet . Quum
 autem tostum fuerit , humor quidem purgatorius præ igne perit . Frigiditas autem ,
 & siccitas relinquitur . Quæcumque vero perfrigerare , ac siccare oportet , id ipsum
 90 polentæ transigunt . Maza omnis generis sic utitur ; facultatem autem ha-
 bet maza hæc talem : farinæ ex toto collata alimentum quidem minus habent ; ve-
 rum magis per alvum secedunt ; putæ autem magis nutriunt : minus vero per al-
 vum secedunt . Maza prius subacta , respersa , vino dulci non emollita , levem fa-
 cit , & per alvum secedit , ac frigescent . Et frigescent quidem , quia frigida aqua
 madefacta est , per alvum autem secedit , quia cito concoquitur : levem vero facit ,
 95 quia multum alimenti cum statu foras excernitur . Quum enim transitus alimen-
 ti angustiores sint , aliud insuper accedens non suscipiunt , & quod quidem cum
 statu attenuatum est , foras excernitur ; quod vero intus manet , statim inducit ,
 & partim superne eructatur , partim inferne secedit . Multum itaque alimenti a
 corpore dissatur . Si vero velis , mazam , statim ut subacta est , exhibere , talis re-
 100 siccativa est . Quum enim polenta sicca existat , & aqua sit madefacta , atque sic præ-
 parata in ventrem illabatur , humorem ex ipso trahit calidum existentem . Solet
 enim calidum attrahere frigidum , & rursus frigidum calidum . Consumptio autem
 humore ex ventre necesse est siccare . Aqua vero , quæ una cum maza ingres-
 sa est , frigescent . Quæcumque igitur siccare oportet , aut frigescent , aut ventris
 105 profusio dissatur , aut alia quapiam eiusmodi caliditate , maza efficax existit .
 At vero sicca , vino dulci emollita , ac trita maza , siccant quidem non similiter ,
 propterea quod vehementer est adstricta , alimentum vero plurimum corpo-
 ri præbet ; nam ut leniter liquefactis alimentum transitus suscipiunt . Per al-
 vum quidem igitur tarde secedit ; statim autem non inducit , neque eructatur . Quæ
 110 vero & aqua , & viço dulci emollita , ac prius subacta est ; nutrit quidem minus ;
 per alvum autem secedit , & statim magis inducit . Cyceon autem solum
 in aqua quidem frigescent , ac nutrit ; in vino vero calfacit , ac nutrit , & alvum si-
 sistit . In melle autem calfacit quidem minus , ac nutrit ; per alvum vero magis sece-
 dit , si non nectacum mel fuerit : sin minus , non secedit , sed alvum sistit . In la-
 115 æe vero bene alunt omnes cyceones , hoc est farinæ . Verumtamen ovillum
 alvum sistit , capinum vero magis per alvum secedit . Bubulini vero minus .
 Equinum autem , & asinum magis secedunt . * Triticum fortius est or-
 deo , & magis nutrit ; minus autem per alvum secedit , tum ipsum . tum succum .
 Panis autem ex tota farinæ collata siccatur , & per alvum secedit . Prius au-
 tem

tem magis nutrit, minus vero secedit. Ex ipsis porro panibus fermentatus 110
quidem levis est, & secedit. Er levis quidem est, quia a fermenti acore humi-
ditas consumpta est, quæ sane alimentum existit, secedit autem, quia cito con-
coquitur. Non fermentatus secedit quidem minus; nutrit autem magis.
Qui succo subactus est, levior est, & multum nutrit, ac per alvum secedit.
Nutrit, quia purus est; levis est, quia levissimo subactus est, & fermentatus, ac 125
rollus ab eodem est; per alvum secedit, quia passio, & alvum movente tritici par-
te, permixtus est. Ex ipsis autem panibus maximi maxime alunt, propterea
quod minime exuritur humiditas ab igne. Et furnacei panes magis alunt, quam
focatii, & vervarii, propterea quod minus exuruntur ab igne. Clibano autem 130
cocti, & subacetici siccissimi sunt; hi quidem propter cinerem, illi vero per tes-
tam humore privati. Similaginei omnium horum fortissimi sunt. Et ad-
huc magis, qui ex alica fiunt, valdeque nutriunt: verum non similiter secedunt.
Fatina pura in aqua pota frigescit, & lotura pollinis tritici. Fursurum
succens coctus, levis per alvum secedit. Verum farinæ in lacte datæ magis per
alvum secedunt, quam in aqua propter serum, & maxime inter alvum moven- 135
tia numerantur. Quæcumque vero farinæ cum melle, & oleo coquantur, aut
assantur, omnes æstiosæ sunt, & ructum cient. Et ructum quidem cient, quia
probe alantur non secedunt. Æstiosæ autem sunt, quia pinguis, & dulcia, & inter
se concordia, non eadem coctura indigentia, in eodem sunt. * Similago, &
alica cocta sortia sunt, & alunt: non tamen per alvum secedunt. Trygis, 140
id est Tragus, sive olyra levior est tritico, & quæ ex ipsa sunt similiter ut ea, quæ
ex tritico parantur, & magis per alvum secedunt. Avena comesta humec-
tat, ac perfrigerat, itemque in sorbitione accepta. Polentæ, ac farinæ recentes
sicciores sunt vetustis, quia igni, & præparationi propinquiores existunt. Ubi
vero vetustæ sunt, calor exhalat, & frigiditas inducitur. Panes calidi sic- 145
cant, frigidi minus: fragilitatem autem quandam inducunt. Fabæ alunt, al-
vum sistunt, & instant. Instant, quia meatus aliud insuper accedens alimentum
non suscipiunt. Alvum sistunt, quia totam alimenti secem habent. Pisi
instant quidem minus: per alvum autem magis secedunt. Ochri, sive ervi-
liæ, & dolichi, sive phasoli, ac siliquæ his magis per alvum secedunt, minus in- 150
stant, & probe alunt. Cicur alvum per alvum secedit, & per urinam ejec-
tur, & alit. Et alit quidem carnosum in ipso. Per urinam vero ejicitur dulce
per alvum autem secedit falinginosum. Milii grana, ac paleæ siccant, & ven-
trem sistunt, & cum sicibus, fortibus doloribus conferunt. Ipsum autem Mi-
lium coctum alit: non ramen alvo secedit. Lentæ æstiosæ sunt, & turbativæ, 155
& neque per alvum secedunt, neque ipsam sistunt. Ervum alvum sistit, & robu-
stum est, & crassificat, & explet, & boni coloris hominem facit. Lini semen
comestum alvum sistit: habet & quiddam frigescentium. Hormini semen consi-
milia lini semini facit. Lupini natura robusti sunt, & calidi: vetum per præpara-
tionem leviores, ac frigidiores sunt, & alvo secedunt. Lirio humectat, & alvo 160
secedit. Cucumeris semen per lotium magis abit, quam secessum. Explet autem,
& crassificat. Et secedit quidem per alvum propter paleam externam: explet autem,
& crassificat propter carnem. Lotum vero secedit quidem, verum minus:
crassificat autem, & explet magis: humectat autem, & urit propter pingue, & o-
leosum. Cnicus alvum movet. Papaver alvum sistit: magis autem nigrum 165
hoc facit, sed & album idem agit: alit autem, & robustum est. Horum porro om-
nium succi carnis alvum movent: oportet itaque in præparatione id observare,
ut quæ siccate velis, ab his succis detrahas, & carne utaris: quæ vero alvum move-
re velis, ut succo copiosiore, carne vero pauciore, & succulentiore utaris.

* Cæterum de animalibus, quæ in ciborum usum veniunt, sic cognoscere oportet. 170
Carnes Bubulæ robustæ sunt, & alvum sistunt, & ægre in ventre concoqui-
untur, propterea quod crassæ, ac multæ sanguinis, est hoc animal, & carnes
graves, itemque sanguis, ac lac. Quotum autem animalium lac tenue est, & san-
guis similiter, eorum etiam carnes consimiles sunt. Caprinæ carnes hi levio-
res sunt, & magis alvo secedunt. Suillæ robur quidem magis, quam hæ corpori 175
inducunt: multum autem secedunt, propterea quod tenues, & modici sanguinis
venas suæ habent, carnem veto multam. Agninæ leviores sunt ovillis, et
hedinæ caprinis, quia exanguiore sunt, et humidiores. Quum enim sicca, et
robusta natura sint animalia, dum quidem teneræ sunt, alvo secedunt: ubi vero aug-
mentum sumperint, non similiter. Et vitulinæ carnes eodem modo se ad bubu- 180
las habent. Verum porcine suillis graviore sunt. Quum enim animal sit
natura carnosum, et exangue, humiditatis excessum in renella ætate habet. Quum
igitur meatus superaccedens alimentum non suscipiant, intus manens calfacit, ac
perturbat ventrem. Asininæ carnes alvo secedunt, et pullorum adhuc magis.
Equinæ leviores sunt. Caninæ calfaciunt, ac siccant, et robur inducunt: non 185
ramen alvo secedunt: catulinæ vero humectant, et secedunt. Sus sylve-
stris cito siccatur, et robur exhibet, ac secedit. Cervi siccatur: minus autem sece-
dit, magisque urinam prolicit. Leporinæ sicæ sunt, et alvum sistunt: urinæ
autem

- autem citamentum quoddam faciunt. Vulpinae humidiores sunt, & utinam
 190 cient. Et erinaceorum terrestrium carnes humidiores sunt, ac urinam cient. * Porro
 de volucrium generibus sic res se habet. Omnia fetine volucrium genera sic-
 ciora sunt, quam quadrupeda. Quaecumque enim vesicam non habent, neque mingunt,
 neque sputum, aut salivam fundunt, omnino siccata sunt. Propter caliditatem enim
 195 ventris humiditas ex corpore consumitur in alimentum caliditatis, quare neque
 mingunt, neque sputum, aut salivam fundunt. Cui autem tales humiditates non
 infunt, id ipsum necessario siccatur. Siccissima igitur caro est palumbis, deinde
 columbae, tertio loco perdix, ac galli, & turritus; humidissima vero anseris. Se-
 minileges autem volucres praedictis sicciores sunt. Verum anetis carnes, & reli-
 quantum auricularum, quae in paludibus degunt, aut in aquis, omnes humidae
 200 sunt. * At vero ex piscibus siccissimi sunt hi, scorpius, draco, callionymus, 11
 cuniculus, glaucus, petca, thrissa. Leves autem sunt petrosi setinae omnes, velut
 turdus, phoca, elephetis, gohio. Tales autem, & praedicti item leviores sunt
 205 ertonibus. Nam hi, ut quiescentes, ratam, ac levem carnem habent. Errones autem,
 & undas vebetantes laboribus fracti, solidiorem carnem habent. Torpedines
 autem, & squatinae, ac Rhombi, & ejusmodi sunt leviores. Quicumque vero
 pisces in lutosiis, & agrosis locis alimenta habent, velut capiones, mugiles, anguil-
 lae, & reliqui ejusmodi graviiores sunt, propterea quod ab aqua, & luto, &
 in his nascentibus, alimenta habent, a quibus etiam spiritus in hominem ingre-
 diens, ipsum laedit, ac gravat. Fluviales autem, & palustres hi adhuc gra-
 210 viiores sunt. Polypti vero, & sepiae, & ejusmodi pisces, neque leves, velut videntur,
 sunt, neque per alvum secedunt; quapropter etiam oculis comesti gravant. Ju-
 scula tamen horum alvum movent. Caeterum conchyliia, velut sunt pinnae,
 purpurae, patellae, buccinae, ostrea; ipsa quidem siccata sunt: succi autem ipsorum al-
 vum movent. Mituli vero, & peccines, ac tellinae magis alvo secedunt. Urtice
 215 autem, & charitilaginosi generis pisces maxime humectant, ac alvum movent. Ce-
 teterum Erinaceorum ova, & locustarum humor, & musculi, & ursae, ac canis, magis
 quidem fluviales, sed & marini alvum movent, & utinam cient. Salsamen-
 ta siccant, & attenuant: plectaque etiam alvum leniter movent. Ex salsamentis siccis-
 220 sima sunt marina, deinde fluvialia. Humidissima autem sunt palustria. Ex
 ipsis autem salsamentis pisces, petcae appellati, valde siccata sunt. * Animalium 12
 potro cicurum ea, quae in sylvis, & agtis nascuntur, sicciora sunt hiis, quae intra
 aedes nutriuntur, quia labore resiccantur, itemque praesole, ac frigore, & spiritu
 sicciora nutriuntur. Verum sylvestria sicciora sunt mansueti, & crudiora, ac
 sylvatum materia pasta, itemque parum edacia, sicciora sunt edacibus. Et frugivo-
 225 ra herbivoris sicciora sunt. Et frugivora non frugivoris, & paucibilibus multibi-
 bis, & sanguine sefecta exanguibus, ac paucum sanguinem habentibus, & quae
 in vigore sunt vetustis valde, & juvenilibus, & mascula foemineis, & castrata
 non castratis, & nigra albis, & hirta nudis. Contraria vero hiis humidiora sunt.
 Ex ipsis autem animalibus carnes haec fortiores sunt, quae optime exerce-
 230 unt, ac sanguinolentissimae sunt, & in quibus recumbunt. Levissimae autem
 carnes sunt, quae nimis exercentur, & in umbra degunt, & in iutinis animas-
 lis partibus fixae sunt. Exanguium autem parvium robustissimae sunt cete-
 rum, & medulla. Levissimae vero carniū partes sunt capitales, & sub ventre
 musculi, peccines, pedes. Ex piscibus siccissimae sunt supernae partes, levissi-
 235 mae sub ventre. Et capita ipsorum humidiora sunt propter pinguedinem, ac cete-
 rum. Ova volucrium robustum quid habent, & alunt, & inflant. Robustum
 quid habent, quia generatio est animalis. Alunt, quia hoc est pulli lac. Inflant,
 quia ex parva mole in multam diffunduntur. Caseus robustus est, & aestuo-
 240 sus, & alit. Robustus quidem, quia proximus est generationi. Alit autem, quia
 carnosae reliquiae sunt lactis. Aestuosus est, quia pinguis. Alvum autem silit,
 quia succo, & coagulo compactus est. * Aqua frigefacit, Vinum calidum 13
 est, & siccum. Habet & purgatorium quiddam a materia. Vina nigra, & austera
 sicciora sunt, & alvum non movent, neque utinam cient, neque salivam faciunt. Sic-
 cant autem, & calfaciunt, humiditatem ex corpore consumentes. Mollia ve-
 245 ro nigra humidiora sunt, & inflant, atque alvum magis movent. Dulcia nigra hu-
 midiora sunt, calfaciunt autem, & inflant humiditatem indurientia. At vero al-
 ba, & austera calefaciunt, magisque urinam cient, quam alvum movent. Nova vi-
 na alvum magis movent, quia propiora musto sunt, itemque alunt, & odorata ma-
 250 gis quam inodorata ejusdem aetatis, quia magis concocta sunt: & crassa magis,
 quam tenuia. Verum tenuia dulcia magis urinam cient, & alvum movent, &
 humectant corpus, & sanguinem debilem faciunt, & adversarius corporis san-
 guinem in corpore augent. Mustum inflat, & subducit, ac conturbat fervens in
 ventre, & alvo secedit. Inflat quidem, quia calfacit; subducit autem ex cor-
 pore, quia purgat: conturbat autem, quia fervet in ventre, atque ita alvo secedit. Vi-
 255 na acida frigefaciunt, attenuant, & humectant. Frigefaciunt quidem, & attenuant,
 humiditatis evacuationem a corpore facientes; humectant autem per aquam,
 una cum vino ingredientem. Acetum frigefacit, quia colliquans humidita-
 tem

tem in corpore consumit. Siftit autem magis, quam moves alvum, quia non alit, & acre est. Sapa calfacit, & humectat, ac subducit. Calfacit, quia viscosa est, humectat, quia alit, & subducit, quia dulcis est. Vinum recens sub torculari expressum, & nigrum excolatum, humectat, subducit, & inflat, quia etiam multum idem facit. Mel calidum est, & siccum, si meracum sit, cum aqua autem humectat, & alvum movet hiliosis, pituitosis vero sistit. Dulce vero vinum pituitosis magis alvo sedecit. De oleis porro hoc modo res se habet. Alvum calidum est, & alvum movet, & urinam ciet corpora oculis vero non est commodum. Multam enim corporis purgationem faciens, visum hebetat. Alvum autem & urinam movet propter vim purgatorium, coctam debilis est, quam crudum: statum autem inducit propter spiritus intentionem. Cera visui commoda est: corpori vero mala, quia calida, & astuosa est, & alvo sedecit, & alimentum quidem nullum corpori praebeat, neque utilitatem: calfaciens autem fecat propter succum. Porrum calfacit quidem minus: urinam vero ciet, & alvum movet. Habet & quid purgatorium, humectat autem, & ructum acidum sedat. Praestat a reliquis cibis postremum ipsum edere. Raphanus, sive radícula humectat paulatim diffundens sua acrimonia: folia minus prostant, praeterquam ad articulare morbum. Radix vitiosa est, innatans, ac acre conceditur. Nasturtium calidum est, & carnem liquat, sistit autem pituitam albam, quae urinae stillicidium inducit. Sinapi calidum est, & alvum movet, sed & hoc urinae difficultatem facit. Quia & Eruca idem facit. Coriandrum calidum est, & alvum sistit, & ructum acidum sedat, & somnum conciliat, si postremum edatur. Lactuca frigidissima est, prius quam succum habeat: debilitarem autem quendam corpori inducit. Anethum calidum est, & alvum sistit, & stercuramenta sedat olfactum. Apium magis urinam ciet, quam alvum movet, & radices magis, quam ipsum, alvum movent. Ocimum siccum est, & calidum, & alvum sistit. Rura urinae magis, quam alvum movet. Habet & vim quendam condensandi, & ad medicamentis noxia commoda est praeparata. Asparagus siccus est, & alvum sistit. Salvia sicca est, & alvum sistit. Solanum frigefacit, & semen in somnis effundit, non permittit. Portulaca fluviatilis frigefacit: sale vero condita, ac servata calfacit, & purgat. Calamagrostis calfacit, & purgat. Mintha calfacit, & urinam ciet, & vomitus sistit. Et si quis semen eius sepe comedat, colligescit, ut quis diffusat, & arrigere prohibet, & corpus debile facit. Rumex calfacit, ac alvum movet. Attriplex humida est, non tamen alvum movet. Bitum calidum est, non movens alvum. Brassica calfacit, ac alvum movet, & biliosa ducit. Betae succus quidem alvum movet: ipsum autem olus comestum sistit. Radices vero magis alvum movent. Cucurbita frigefacit, & humectat, & alvum movet. Rapum astuosum est: humectat autem, & contrahit corpus, non tamen alvo sedecit, & urinae difficultatem rigidit. Pulegium calfacit, & alvum movet. Origani calfacit, & biliosa subducit. Thymum brassa similia origano efficit. Thymum calidum est, per alvum sedecit, & potitur, ducit & proutosa. Hyssopum calidum est, & pituitam ducit. Porro sylvestris olea, quae quae calfaciunt, & odorata sunt, ea calfaciunt, & magnitudo magis, quam per alvum sedecit. Quae vero humidam habent naturam, frigidamque, ac fatuam, & odores graves, magis per alvum sedecunt, quam per urinam. Quae autem acerba, & austera sunt, alvum sistunt. Quae acria, & odorata sunt, urinam cient. Quae acria, & sicca in ore sunt, ea omnia siccant: Quae acida sunt, frigefaciunt. Ceterum succi urinam cientem sunt crethmi, apii, allii, eremori, cythi, foniculi, porri, adiani, solani, qui & frigefacit. Item scolopendrium, mentha, fufeli, clausalides, hypericum, urtica. Alvum autem movent, & purgant cicer, lenticula, ordeum, beta, brassica, mercurialis, sambucus, enicus. Haec omnia alvum magis movent, quam urinam. At vero de pomis hoc modo se res habet. Quae quidem feminibus repleta sunt, ea magis alvum movent. Item vitidia magis, quam sicca. Verum vis, & facultas ipsorum referant. Mora calfaciunt, & humectant, ac alvo sedecunt. Pira matura calfaciunt, & humectant, ac alvum movent. Cruda vero sistunt. Mala dulcia agro concoquantur. Acida vero, & matura minus. Cydonia adstringunt, & non movent alvum. Succus autem malorum vomitus sistunt, & urinam cient, & ante vomitus odores ipsorum idem praestant. Mala sylvestris alvum sistunt. Cocta comesta magis alvum movent. Verum ad respirationem, quae erecta cervice fit, & succi ipsorum, & ipsa quibus hausta prosunt. Sorba, Mespila, & Corna, & quaecumque alia huius generis popa alvum sistunt, & acerba sunt. Mali punici dulcis succus alvum movet, vero magis frigefactoria. Nuclei autem omnium alvum sistunt. Cucumeres crudi frigidi sunt, & acre concoctiles. Maturi autem, & pepones stringunt, & per alvum sedecunt: verum astuosi sunt. Boeri uvary calidi sunt, & humidi ac alvum movent, maxime albi. Dulces quidem igitur calfaciunt fortiter, propterea quod multum jam caliditatis habent. Impatura vero minus calfaciunt, magis

- magis autem purgant potati. Ficus, & uvæ passæ astuosa sunt, sed alvum movent. Ficus viridis humectat, & alvum movet, ac cassat; humectat, quia succo plena est; cassat propter succum, idem alvum movet propter succi dulcorem. Præter ficus pessumæ sunt, quia succulentissimæ: optimæ autem sunt pistenæ. Ficus aridæ astuosa sunt, sed alvo succedunt. Amygdalæ astuosa sunt, verum probe nutriunt. Astuosa quidem sunt propter pinguitudinem: nutriunt autem propter carnositatem. Nuclei rotundæ similes his sunt. Latæ vero maturæ probe alunt, & alvum movent. Depuratæ vero etiam flatum inducunt. Tunice vero ipsarum alvum fistunt. Acyli siliis glandes, & quercinæ, ac saginæ glandes alvum fistunt crude, & assatæ: coctæ vero minus. Pingues carnes astuosa sunt, sed alvum movent. Carnes conditæ, ac asservatæ in vino quidem siccant, & alunt, & siccant quidem propter vinum: alunt autem propter carnem. In aëro autem asservatæ cassant quidem: verum minus propter accitum: multum autem nutriunt. At vero sale servatæ minus quidem alunt humiditatem per saleem privare: attenuant autem, & siccant, ac sufficient alvum movent. Carerem vites lingulorum detrahare, & addere, ac augere hoc modo oportet. Ex igne, & aqua omnia constituuntur & animalia, & terra nascentia: & ex his augeantur, & in hæc feceruntur, ac resolvuntur. Fortem quidem igitur eduliorum vinum sape coquendo, ac frigefaciendo detrahare oportet, & vice versa angere. Humidorum autem torrendo, ac assando humiditatem eximere. Siccorum vero rigando, ac iradesaciendo. Salorum rigando, & coquendo. Amarorum, & acrum dulcium mixtura. Acerborum pinguium temperamento, & de reliquis omnibus ex prædictis iudicium facere oportet. Quæcumque tosta, aut assata sunt, alvum magis fistunt, quam cruda, propterea quod humiditas, itemque pinguitudo per ignem ablata sunt. Quum itaque in ventrem inciderint, humiditatem ex ventre trahunt, & oscula venarum concludunt, siccantque, ac cassant, quare transitus humiditatis fistunt. Quæ vero ex inaquosis, ac siccis, & astuosis locis veniunt, ea omnia sicciora, ac calidiora sunt, & robur amplius corpore exhibent, propterea quod pari mole, ac copia graviora sunt, & densiora, & maiorem redditum tribuunt, quam quæ ex humidis, & riguis, ac frigidis. Hæc enim humidiora sunt, & leviora, ac frigidiora. Non igitur solum ipsius cibi, & potus, & animalium ipsorum vinum nosse oportet, sed etiam patriæ unde sunt. Quum igitur forte alimentum corpori offerre voles, & ex istis cibis, his, quæ ex inaquosis locis veniunt, utendum est, & cibis, & potibus, & animalibus. Ubi vero levior, & humidior, his, quæ ex riguis veniunt, utendum. Dulcia, & acra, & salsa, & amara, & austera, & carnosa cassare solent. Item quæ siccæ sunt, et quæ humida. Quæcumque igitur de siccæ parte plus in se habent, ea siccant, et cassant. Quæ vero humidæ partis plus habent, ea omnia cassantia humectant, et alvum magis movent, quam siccæ. Nam ubi alimentum amplius corpori præbuerunt, revulsionem in ventre faciunt, & humiditatem alvo succedunt. Quæ autem ex cassantia siccant tum edulia, tum pocula, neque salum, neque urinam, neque feculum facientia corpus siccant, idque ob hanc causam. Corpus cassatum humore vacuatur, & pars ejus ab ipsis cibis, pars in alimentum caloris ipsius animæ consumitur. Pars etiam cassata, & attenuata per ipsum corpus expellitur. Dulcia, & pinguis, ac oleosa replent, quia ex modica mole multum diffunduntur. Cassata autem, & diffusa caliditatem in corpore replent, ac tranquillam esse faciunt. At vero acida, & acra, & austera, & acerba, & ex toto collata, & siccæ non replent: propterea quod oscula venarum apertunt, et expurgant, et partim siccantia, partim mordentia, ac adstringentia, humiditatem carnis horrent, ac confidere, et in modicam molem contrahi faciunt, atque ita vacuum multum in corpore fit. Quum igitur voles a modica implere, aut a pluribus evacuare, talibus utaris. Recentia omnia maiorem, quam alia foretudentem habent, propterea quod propinquiora vino sunt. Verum antiqua, et marcescens magis, quam recentia alvum movent, quoniam propiora putredini sunt. At vero cruda alunt, et iustus cient, propterea quod quæ ignem coquere oportebat, ea ventris transigit, debilius, quam ingesta sunt, existens. Carerem obsonia ex variis intritis preparata, astuosa, et humida sunt: propterea quod pinguis, et tosta, et calida, et inæquales inter se vires habentia, in eodem coherant. Verum quæ in muris præparantur, meliora sunt, & non astuosa. Porro de balneis hoc modo habet. Aqua potabilis humectat, & frigefacit: exhibet enim corpori humiditatem. Salum autem balneum cassat, ac siccant. Quum enim natura calidum sit, trahit a corpore humiditatem. Calida autem balnea spiritum attenuant, ac frigefaciunt: per caliditatem enim humiditatem de corpore auferunt, evaporata autem de carne humiditate corpus perfrigeratur: a cibo accepto eadem cassant, ac humectant ea, quæ supercuminent in corpore diffundentia in maiorem molem. Balnea autem frigida vice versa: vacuo quidem corpore præbent quandam caliditatem. Ubi autem eibus ingestus est, ab humido existente detrahunt, & frigidum existens siccant replent. Illuvies siccant, quum humiditas consumatur. Similiter etiam unctionis neglectus. Unctio vero cassat, humectat, ac mollior. Sol, & ignis siccant, propterea quod quum calida sint, & siccæ, humiditatem ex corpore

- corpore trahunt: Unbra, & frigus moderate humectant: dant enim magis, quam accipiunt. * Sudores omnes abeuntes siccant, & attenuant, humore ex corpore deficiente. Corrus attenuat, humectat, & calfacit. Calfacit quidem propter laborem, & excretionem frigiditatis. Attenuat autem propter evacuationem, humectat propter colligationis reliquias in corpore præ labore. Vomitus attenuat propter cibi evacuationem: non tamen siccant, si quis postmodum recte egeret, sed humectant propter repletionem, & colligationem carnis præ labore. Si vero quis sinat hæc postmodum consumi in alimentum calidat, & diætam sensum adhibeat, siccant. Ventrem autem compactum vomitus solvit, & egerentem magis, quam oportet, silit; illum quidem humectans, hunc vero siccans. Quum igitur alvum quis sistere velit, avide devoratum cibum evomere oportet, priusquam humefcat, & infra detrahatur, & magis acerbis, & austeris edulis uti. Ubi vero solvere alvum quis velit, plurimo tempore cibis immorari confert, & acerbis, ac salis, & pinguis, ac dulcibus tum cibis, tum porionibus uti. * Somni jejuni attenuant, & frigescent, si non longi fuerint, præsentem humiditatem evacuantes. Qui vero magis calfaciunt, colligunt carnem, & corpus diffundentes exolvunt, ac debiles faciunt: a cibo vero sumpto calfacientes humectant, alimentum in corpus diffundentes: a matutinis autem deambulationibus somnus maxime siccatur. Vigilia in exsariatis cibo noxia est, non permittens cibum liquari, ac concoqui. Ictuosus autem attemperat quidem, verum minus lædit. * Segnitie, ac otium humectat, & corpus debile facit. Anima enim quiescens humiditatem ex corpore non consumit, Labor siccatur, & corpus robustum facit.
- * Semel in die cibum capere attenuat, & siccatur, & alvum silit, propterea quod per animæ caliditatem humiditas ex ventre, & carne consumitur. Prandium contraria facit. Aquæ potus calidus attenuat, similiter & frigidus. At vero & spiritus, & cibus, & potus humiditatem in corpore congelant, si excellenter frigidat fuerint, & per congelationem, ac frigiditatem alvos sistunt. Nam animæ humiditatem superant. Rursus autem etiam caliditatis excessus eandem congelant, in tantum ut dissindi nequeat. Quæcumque vero calfacientia corpus, et alimentum non præbentia, carnem humiditate evacuant, etiam excessum non facientia, ea frigiditatem homini exhibent. Nam præsentem humiditatem mota, statim ab ipsa repletur, ac perfringitur. * Cæterum quam vim labores habeant, nunc exponam. Sunt enim alii naturales, alii violenti. Naturales igitur sunt visus labor, auditus, vocis, curarum. Visus quidem igitur talis vis est. Anima in id, quod videtur intensa, movetur, et calefit. Calfacta vero, evacuata humiditate siccatur. Per auditum vero allabente sono, anima concutitur, et laborat: laborans autem calefit, et siccatur. Quæcumque sunt hominibus in cura, anima etiam ab his calefit, ac siccatur, et humiditatem consumens laborat, et carnes attenuat, et hominem evacuat. Quicumque labores vocis sunt, velut sermo, aut lectio, aut cantus, omnes hi animam movent. Mora autem siccatur, et calefit, et humiditatem in corpore consumit. At vero deambulationes etiam ipsæ maxime præ reliquis naturales sunt. Habent autem quid violentum. Vis ipsam talis est. * Deambulatio a cœna et alvum, et corpus, et ventrem siccatur, ipsumque amarum fieri non sinit ob hanc causam. Quum movetur homo, calefit corpus, itemque cibi. Attrahit igitur humiditatem caro, et alvum amarum fieri non sinit. Corpus quidem igitur repletur, alvus vero attenuatur. Siccatur autem eadem ob hanc causam. Quum corpus movetur, et calefit, quod tenuissimum est alimentum, consumitur partim per insitum calorem; partim vero una cum statu foras excrentur, partim etiam per locum epicrit. Quod vero sicissimum est, de cibis relinquatur. Quare una cum alvo etiam caro resiccatur. Matutine deambulationes attenuant, et partes circa caput leves, et agiles, ac promptas reddunt, et alvum solvunt. Attenuant quidem, quia motum corpus calefit, et humiditas attenuatur, ac purgatur partim per spiritum, ac statum, partim vero emungitur, et excreatur: sed et aliqua pars in alimentum caliditatis animæ consumitur. Alvum autem solvunt, quia quum calida sit, frigidus spiritus superne allabente, caliditas frigiditati cedit. Leves autem partes circa caput faciunt ob hanc causam. Quum evacuata est alvus, ex reliquo corpore, & capite, humiditatem in seipsam attrahit, nimis calida existens. Evacuata autem capite & visus, & auditus depurgantur, & homines agiles sunt. Deambulationes autem post exercitia, corpora para reddunt, & attenuant, non permittentes carnis colligationem fieri præ labore, sed ipsam depurgant. * Cæterum cursus longi, ac curvi sensum facti, calfacientes carnem, concoquere, ac diffundere possunt, & vim ciborum in carne concoquunt, verum corpora tardiora, ac crassiora reddunt, quam cursus circulares. Ex multa comedentibus commodiores sunt, & hyeme magis, quam æstate. Qui vero in veste sunt, eandem vim habent; magis autem exalfaciunt, & corpora humidiora faciunt, & decoloriora: quia sincerus spiritus allabens ipsa non depurgat, sed in eodem spiritu exercentur. Conferunt itaque & siccis, & carnosiss, qui carnem demoliri, & abolere volunt, itemque seniores propter corporis frigiditatem. Cursus autem recti revertentes, & equiores indefiniti, carnem

- 465 nem minus diffundunt; attenuant autem magis, propterea quod externis ani-
mae partibus hi labores sunt, & humiditatem ex carne revellunt, & corpus at-
tenuant, ac siccant. Circulares vero curius carnem minime diffundunt, at-
tenuant autem, & diffundunt carnem, & ventrem maxime, propterea quod acu-
tissimo spiritu utentes, humiditatem in seipos celerissime trahunt. * At vero con- 29
470 cussiones siccant quidem derepente; non sunt autem idoneae, neque commodae:
nam convulsiones inducunt, quia excalfactum corpus cutem quidem fortiter at-
tenuat, carnem vero minus coagmentat, quam curius circulares: eamque autem
humore evacuant. Commotiones, & allevationes carnem quidem minime excal-
faciunt: corpus autem, & animam irritant, & spiritu evacuant. Lucta, & fri-
475 catio exteius corporis partibus magis laborem exhibent: calfaciunt autem carnem,
& corroborant, ac augeri faciunt ob hanc causam. Quae ex natura solida sunt,
conficta confidunt, ac coagmentantur: quae vero cava sunt, auferunt. Quod
itaque densum est in carne, id confictum coagmentatur: cava vero auferunt, itemque
venae. Nam carnes calfactae, ac siccatae alimentum in seipsas per venas trahunt, de-
480 inde auferunt. Volutatio in pulvere consimilia luctae efficit. Magis autem
siccatur propter pulverem, & minus incarnatur. Micatio per summam manus at-
tenuat, & carnes sursum trahit. Follis, & manuum ad rythmum motus, con-
similia faciunt. * Spiritus detentio incatus dissipare, & cutem attenuare, & 30
humiditatem sub cutem extrudere potest. Exercitia in pulvere, & oleo in tan-
tum differunt, quod pulvis quidem est frigidus, oleum autem calidum. In hyeme
485 igitur oleum corpus magis auget, propterea quod frigus prohibet a corpore quid
auferre. In aestate vero caliditatis excessum faciens, carnem liquat, quum & a tem-
pore, & oleo, ac labore corpus calefiat. At vero pulvis, qui inter exercendum acce-
dit, in aestate quidem magis auget. Nam frigefaciens corpus, in excessum caliditatis
490 non permittit. In hyeme vero frigus, & algorem inducit. Morari in pulvere post
exercitia in aestate modico tempore confert refrigerando. Verum longior mora su-
persiccatur, & corpora dura, ac lignosa efficit. Frictio ex oleo, & aqua mol-
495 lit, & non vehementer excalfieri sunt. * Porro de lassitudinibus, quae in corpo-
re fiunt, hoc modo res se habet. Homines inexercitati ab omni labore lassan-
tur. Nulla enim corporis pars exercitata est ad ullum aliquem laborem. Corpo-
ra autem exercitata ab insuetis laboribus delassantur. Aliqua vero etiam a con-
suetis exercitiis lassantur, si modum excesserint. Species quidem igitur lassitudi-
nis ejusmodi sunt. Vis autem ipsarum sic habet. Etenim inexercitati, humi-
dam carnem habentes, quum laboraverint, corpore calefacto, multam colliqua-
500 tionem remittunt. Quicquid igitur exsudaverit, aut cum corpore depurgatum fue-
rit, non exhibet magis laborem in corporis parte praeter consuetudinem evacuatam.
Quicquid vero ab excretionibus intus remanserit, non solum hunc laborem exhibet,
sed etiam ei parti, quae humiditatem suscepit. Non enim commoda est corpori, sed
505 infesta. Et si carnes quidem corporum non similiter congregantur, verum in carnosas
partes, quare his laborem exhibet, donec exiverit. Tamquam enim circumum non ha-
bens, calefens calefit tum ipsa, tum quae allabuntur. Si igitur multum fuerit, quod
exercitum est, etiam sanum corpus exsuperat, ut totum concalefcat, et febrem fortem
inducit. Calefacto enim sanguine, et attracto, celerem circuitum faciunt ea, quae
in corpore sunt, et tum reliquum corpus praeter spiritum purgat, tum quod compa-
510 ctum est, calefens attenuatur, et simul ex carne foras sub cutem extruditur, atque
hoc sudor calidus vocatur. Hoc autem excreto, et sanguis in naturalem stratam re-
stituitur, et febris remittit, et lassitudo sedatur maxime tertia die. Ceterum
ejusmodi lassitudinem sic curare oportet, ut fomentis, et balneis calidis id, quod
compactum est, dissolvamus, et deambulationibus vehementibus depurgemus, et
515 modico cibo, ac attenuarionibus carnis evacuationem cogamus, ac coagmentemus,
et oleo sensim multo tempore fricemus, ut ne violenter excalfescat. Unguentis etiam
tum exudatoris, tum mollientibus ungere, ac mollire conducit. At vero exercita-
tis ab insuetis laboribus propterea lassitudo contingit. Quum corpus non fue-
rit laboribus exercitatum, necesse est, carnem humidam esse ad eum locum, ad quem
520 non est adhaerens se laboribus exercere, quemadmodum etiam ad singula exercitationum
genera. Carnem igitur necesse est colliquari, et externi, considerareque, ac contrahi,
velut priori. Conferat autem hoc modo curari. Exercitationibus iuendum est consuetis,
quo id, quod compactum est, calefens extenuetur, ac depurgetur, et reliquum cor-
pus non humectetur, neque inexercitatum maneat. Utile est et hunc balneis calidis
525 uti, itemque frictione similiter ut priore. Verum fomentis nihil habet opus. Labo-
res enim calfacientes sufficientes sunt attenuare, et depurgare id, quod compactum
est. Lassitudo autem a consuetis exercitiis hoc modo fit. A moderato quidem la-
bore lassitudo non movetur. Quum vero major, quam oportet, labor fuerit, carnem
supersiccatur, evacuatam autem humore caro calefit, et dolet, et horret, et ad febrem
530 perducitur longiore, si non quis recte euret. Oportet autem primum quidem ipsum
balneo non valde multo, neque nimis calido lavari, deinde exhibito a balneo mol-
li vino, in cena offerre plurima, et omnigena edulia, et potu aquoso, vino vero
molli, ac multo uti. Postea longo tempore his immoretur, donec venae resipere ap-
collantur.

tollantur: Deinde vero vomat, et post modicam stationem mollior dormiat. Postea per dies sex sensim ad cibos, et labores consuetos adhibeatur, atque ita ad consuetum cibum, ac potum perducatur. Vini autem habet hac curatio talem. Refecturum excellenter corpus, humectare potest citra excessum. Si quidem igitur possibile esset, laboris excessum nosse, quantus is esset, commodum foret ipsi per moderatum cibum mederi. Nunc vero illud impossibile est, hoc vero facile. Corpus enim refectum ab ingestis omnigenis edulis id, quod conducibile sibi ipsi est, sumit, unaqueque pars de singulis cibis; repletum autem, et humectatum, alvo per vomitum evacuata, rursus excessum remittit. Alvus autem vacua existens, revellit. Excedentem itaque humiditatem caro eructat, moderatam vero non remittit, nisi per vinum, aut labores, aut medicamenta, aut aliam quamdam revulsionem. Qui autem addidit, ne cibi sensim crescente utitur, is corpori dietam placide constituit.

HIPPOCRATIS COI

DE DIÆTA, SIVE VICTUS RATIONE.

LIBER III.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Cur dieta, laborum compensationi per omnia respondens, præscribi nequeat. Mediceamentis quædam sanari non posse.
- 2 De multitudinis, ac vulgi dieta, qui ex necessitate vitam transigunt.
- 3 Vitis hyeme. Potus. Labores. Deambulationes ab exercitiis, matutina. Stratum durius. Que exercitia extenuent. Navigationes. Levandi ratio. Vomitus quando, & quibus hyeme conducatur. Excessus in exercitiis vitandas. Corpori hyemem ferre melius est, quam exerceri hoc tempore. Corpora cur hyeme tarde, & modice calfieri debeant. Dieta circa solstitia diligenter observanda.
- 4 Quomodo dieta verno tempore instituenda, & corpora ad æstatem sint preparanda. Cibi sub æstatem molliores, & potus aquosiores. Deambulationes. Maxa. Olera. Obsonia. Venas.
- 5 De dieta æstatis tempore instituenda. Maxa. Potus. Somni a prandio. Olera. Vomitus. Venus. Balnea. Puma fortiora sunt, quam pro natura humani. Labores. Voluntationes in pulvere.
- 6 De dieta per autumnum instituenda. Amentis. Cibi. Epilogus.
- 7 De divitiorem dieta, & quibus sanitatis studium præcipue curæ esse solet. Præconiatio quid.
- 8 Nares citra cassam apertam impletas habentis curatio. Amentis e naribus exercitata corpore cur educitur. Amentis, & saliva repletionis indices, & signa. Curatio. A vomitu os, & fauces vino austero colluantur. Vomitus in repletionibus etiam tertio repetendus.
- 9 Repletionis futura signa. Somni longi, ac dulces. Somni in repletionibus quando jucundi esse desinant. Anima corporis perfimibus obnoxia.
- 10 De aliis repletionis signis. Corporis doloris, lassitudinis curatio. Febris ex corporis totius, vel alienius partis lassitu-

dine dieta, & curatio.

- 11 De iis, quibus a repletionis caput dolet, ac gravatur, palpebra a cana coeidunt, & in somnis turbantur, & coram curatio.
- 12 De iis, quorum venter cibum quidem contemnit; carnes autem non suscipiunt, & alimentum intus manens statum inducit. Alvi profluvium quid proprie dillum. Dysenteria quando dicatur. Curatio.
- 13 Cibum crudum posttridie transientes citra rursus acidum. Curatio.
- 14 De faciem decolorem post cibum habentibus, & acida eructantibus, cum acore in nari præcedente. Facies cur decolor post cibum fuit. Curatio.
- 15 De iis, quibus rufus acridi posttridie finit curatio.
- 16 Corpora densa carne prædita. Inexercitatis derelictis laborantes. Adcario per summas manus. Potus exercitatio a cana quibus commoda.
- 17 De iis, quibus cibis liquidus, & incoctus per alvum secedit, & quibus hoc frequenter accidat. Curatio. Piscium partes que humidiores, & que solidiores. Carnes sale, & aceto inveterate. Caro eamini æstata.
- 18 De iis, quibus secessus non patrefactus, per alvum secedit, tabescente corpore, curatio.
- 19 De iis, quibus secessus liquidi, & patrefacti per alvum abeunt. Item quorum venter carnes attrahit, cibos excludit, ac exulceratur. Curatio. Maxa vino danci emolita. Leporina carnes in aqua cocta.
- 20 De iis, quibus secessus siccus, & persicus fit, ac siccum, & progressu temporis etiam amarum, & alvus sistitur, itemque urina, strepens vomitus. Curatio Locusta, mytili, herinacti, cancri, cancellorum succus.
- 21 De iis, quibus harrores a deambulationibus matutinis accidunt, & caput gravatur. Curatio.
- 22 De horrentibus ex gymnasiis curatio. Mollior embari. Inebriari. Venere uti. Sernem esse ad labores.



- D**E diæta humana exacte quid conscribere, ut ad ciborum copiam, laborum comensurationem, ac symmetriam fiat, non est possibile, quemadmodum etiam antea a me relatum est. Multa enim sunt impedimenta. Primum quidem hominum naturæ, diversæ existent. Nam & sicca ipsæ ad se ipsas, & ad alia collata magis, ac minus sicca sunt, & humide. Similiter etiam alia omnes. Deinde ætates non isdem indigentes. Insuper & regionum situs, & ventorum mutationes, & temporum alterationes, & anni constitutiones. Est & inter ipsos cibos multa differentia. Triticum enim a tritico differt, & vinum a vino, & reliqua omnia, ex quibus victum facimus, diversæ existentia, impediunt, quo minus possibile sit exacte de diæta conscribere. At enim prænotiones invenire sane a me sunt eorum, quæ in corpore dominantur, sive labores cibos, sive cibi labores superent, & quomodo singulis mederi oporteat, prædiscereque sanas naturas, & ut non accedant morbi, nisi quis valde multum delinquat, ac sæpe; hæc autem medicamentis iam opus habent. Sunt autem, quæ neque per medicamenta sanari possunt. Quantum quidem igitur inveniri possibile est, quæ maxime adrem faciunt, a me inventum est. Verum exacte a nullo. * Primum igitur multus, ac vulgo hominibus conscribam, ex quibus maxime utilitatem capere possint, qui sane cibis vulgaribus utuntur, ac laboribus necessariis, protectionibusque necessariis, ac operis marinis ad vitam degendam repertis; quique calefcunt plus, quam expedit, perfrigeranturque præter commoditatem, & reliqua diæta inconstanti utuntur. His itaque ex præsentibus sic victum facere conducit. Annum equidem in quatuor partes dividunt, quas plerique omnes poverunt, hyemem, ver, æstatem, autumnum. Et hyemem quidem a plejadum occasu usque ad æquinoctium vernum. Ver autem ab æquinoctio usque ad plejadum exortum. Æstatem vero a plejadum ortu usque ad Arcturi exortum. Autumnum ab arcturi ortu usque ad plejadum occasum. * In hyeme quidem igitur tempore frigido, & compacto se opponendo, hoc victu uti conducit. Primum quidem semel tantum in die cibum capere convenit, nisi quis valde sicum ventrem habeat. Id vero si fieri non possit, modicum prandere. Victu autem utendum est siccio, & austero, & calfactorio, & ex toto collato, ac meraco. Pane autem magis uti expedit, & obsonis assatis potius, quam coctis. Et potonibus nigris meracioribus, ac paucioribus. Oleribus minimum, præterquam calefacientibus, & siccis. Succis namque, ac forbutionibus minime utendum est. Laboribus autem multis omnibus, curfibusque curvis sensim, crescente accessione, & lucta in oleo longa, a levibus ordiendo, ac sensim addendo. Et deambulationibus ab exercitiis, acutis, ac celeribus, a cœna vero, tardis in tepore. Matutinis autem militis, leni initio factis, ac sensim crescente accessione, ita ut placide rursus desinas. Utendum est & strato duriore, & nocturnis itineribus, & sinambulationibus, ac curfibus per finem uti consert. Omnia enim hæc attenuant, ac callaciunt. Utendum etiam navigatione. Ubi autem quod lavari velis, si quidem in palæstra se exercueris, frigida lavetur. Si vero alio quopiam exercitio usus fueris, calida commodior existit. Utendum & vomitibus, si humidiores sint, ter in mense, sin sicciores, bis a cibis omnis generis, & vomitibus sensim perveniendum est ad consuetum cibum per dies tres, eoque tempore laboribus levioribus, ac paucioribus utendum; a bubulis autem, & porcinis carnibus, aut aliis, quicquid tandem modum excesserit, repletus vomat: & a caseosis, & dulcibus, ac pinguibus eum, qui non est assuetus repleti, vomere conducit, & ab ebrietate, ac ciborum mutatione, & regionum alteratione vomendum est. Oportet etiam in alio tempore, excessum vitare oportet. Melius est enim corpori hyemem ferre, quam exerceri hoc tempore. Nam neque arbores, quæ hyemem non pertulerunt hoc tempore, fructum ferre possunt, neque ipsæ sanæ esse. Utendum est & laboribus hoc tempore multis usque ad excessum, nisi lassitudines succedant. Signum autem docet idoras, offendamque quapropter hæc ita se habent. Tempore existente frigido, ac compacto, consimilia patimur etiam animalia ipsa. Necessè igitur est corpora tarde calefieri a labore, & modicam quandam humiditatis præsentis partem exercere. Deinde modicum tempus concessum est, quo laboret, & nihil autem quo quiescat. Dies enim brevis est; nox vero longa, propterea igitur neque tempus, neque labor excessum habet. Ob hanc itaque causam hoc tempore sic diætā instituire oportet, a plejadum occasu usque ad solstitium hybernū diebus quadraginta quatuor. Circa solstitium autem maxime in custodia, ac tutela esse, & a solstitio alios totidem dies eadem diætā uti. Postquam autem tempus adduxerit favonium, & mollius factum fuerit, oportet etiam cum tempore diætā sequi, diebus quindecim, quæm æstivus oritur, & hirundo volat. Sequens vero tempus magis varie transigere oportet usque ad æquinoctium diebus triginta duobus. Oportet igitur etiam diætā uti hoc tempore variegatiorē, mollioreque, ac leviori, & cibo, & potu, & labore, atque ita sensim ad ver perducere. * Quam autem æquinoctium iam factum fuerit mollius, & dies longiores, ac noctes breviores, & tempus calidum, ac siccum consiterit, etiam præteris victus probe nutritius, ac meracius

fit. Quemadmodum igitur arbores, rationem non habentes, hoc tempore præpara-
 rant sibi ad æstatis commoditatem tum incrementum, tum umbram; sic oportet ho-
 minem, quum sane mente, ac ratione præditus sit, carnis incrementum salubre sibi
 præparare. Oportet igitur, ut ne derepente diæta transmutetur, tempus in sex par-
 tes dividere per octo dies. In prima itaque parte & labores detrudere oportet, &
 reliquis quoque velocioribus uti. Cibus autem mollioribus, & potibus aquosioribus, 75
 ac alioribus, & lacta cum oleo in sole utendum est. In singulis autem temporibus sin-
 gulas diætas paulatim transmutare oportet, & deambulationes detrudere a cœna
 plures, maritimas pauciores, & niæzam pro pane offere, & olera cocta exhibere,
 & obsonia cocta assatis adæquare, & balneis uti, & parum praudere, & re vene-
 rea pauca uti, & vomitibus, primum quidem quarto quoque die, deinde per longius 80
 tempus, quo & corpus pura carne incarnatum constituas, & diætam in hoc tempo-
 re mollem usque ad plejadum exortum. Et in hoc iam æstas adest, & ad hanc
 5 nunc diætam instituire oportet. * Quum itaque pleias exorta fuerit, cibus molli-
 oribus, ac paucioribus uti oportet. Deinde maza magis, quam pane, atque ea prius
 subacta, & vino dulci non emollita, potibus autem mollibus, albis, aquosis, prandi- 85
 o modico, & somnis a prandio brevibus, & repletioibus ex cibus, ac potibus quam
 minimis. Poti inter edendum utendum est sufficiente, per diem vero minime bibend-
 um, nisi necessaria aliqua siccitate corpus utatur. Utendum est & oleribus co-
 ctis, exceptis æstivis, ac siccis. Utendum etiam crudis, exceptis calfacientibus, ac
 siccis. Vomitibus, nisi si qua repletio contingat, utendum non est. Re autem venerea mini- 90
 me. Balneis autem tepidis uti licet. At vero poma forriora sunt, quam pro humana na-
 tura. Melius est igitur a pomis abstinere. Si vero quis cum cibus uratur, minime
 delinquerit. Laboribus quoque, ac curibus circularibus exerceri oportet, & cur-
 sibus rectis revertentibus modicis multo tempore, & deambulationibus in umbra; lu-
 cta autem in pulvere, quo quam minime excalescat. Verum volutationes in pulvere 95
 meliores sunt, quam curius circulares. Frigefaciunt enim corpus, humore evacuan-
 tes. A cœna deambulandum non est, sed saltem surgendum. Mane vero deambula-
 tionibus utendum. Soles vitandi sunt, itemque frigora tum mane, tum vespere, quæ flu-
 mina, aut stagna, aut nives exhalant. Hanc autem diætam tolerare oportet usque
 ad solstitium æstivum, quo in hoc tempore adimas omnia, quæ sicca sunt, & calida, & ni- 100
 gra, ac meraca, itemque panes, præterquam si parum quod voluptionis gratia concedere ve-
 lis. Sequenti vero tempore utetur mollibus, & humidis, & perfrigerantibus, ac albis
 6 usque ad archuri exortum, ac æquinoctium per dies nonaginta tres. * Cæterum ab æqui-
 noctio sic diætam instituire oportet, per autumnum ad hyemem adducendo, ita ut mu-
 tationes frigorum, ac teporis vires vestitu crasso. Utendum autem hoc tempore motu in
 veste, frictioneque, ac lacta in oleo, ita ut sensim accessio crescat. Deambulationes 105
 quoque in tempore faciendæ sunt, & calidis lavacris utendum, & somni diurni detra-
 hendi. Cibus autem utendum est calidioribus, ac minus humidis, & puris, & potibus
 nigrioribus, verum mollibus, & non aquosis: oleribus vero minus. Reliquam item
 diætam omnem sic consonam adhibere oportet, ut ab æstivis detrahas, hybernus au-
 tem utaris non ad summum, quo hybernum victum quam proxime constituas, in diebus
 110 duodequingaginta, usque ad plejadum occasum, ab æquinoctio. Hæc porro multitu-
 dinis commotione gratia, ac vulgi hominum causa prodo, qui ex necessitate
 vitam temere transigunt, neque licet ipsis aliorum negligentibus esse, ac suam ipsorum
 7 sanitatem curare. * Quibus vero jam hoc certum, ac percognitum est, quod neque di-
 vitiarum, neque corporis, neque ullius alterius rei ulla utilitas est citra sanitatem, ad
 hos inventa est a me diætæ, quantum possibile est, ad veritatem, ac certitudinem possi-
 bilium rerum adducta. Hanc itaque in sermonis progressu declarabo. Inventum autem hoc
 honestum quidem mihi repertori, utile vero discipulis, nullus adhuc priorum ne
 attentavit quidem componere, quod ad omnia alia magni æstimandum duco. Est 120
 autem præcognitio, antequam ægrotent, cognitio quid corpora perpetiantur, utrum
 cibus superat labores, aut labores cibus, aut moderate inter se habeant. Utrum e-
 nim tandem superetur, morbi sunt; ab æqualitate autem inter ipsa mutua, sani-
 tas adest. Ad hæc sane commemoranda accingor, & demonstrabo, qualia sunt ho-
 minibus, qui sani sibi esse videntur, & jucunde comedunt, laborareque possunt, & 125
 8 corporis, ac caloris satis habent. * Nares citra causam apertam a cœna impleuntur,
 & repletio esse videtur; & emungunt autem nihil. Ubi autem deambulare mane inci-
 piunt, ac exerceri, tunc emungunt, ac spunt, & progressu temporis etiam palpe-
 bras graves habent, & pruritus frontem occupat, & a cibus abstinent, & bibere mi-
 nus possunt, & color fit decolor, & aut destillationes moventur, aut febres horri- 130
 de, juxta quodcumque tempus repletio fuerit mota. Quicquid autem eo tempore fe-
 cerit, in id ipsum culpam, ac causam rejicit, quum id ipsum causa non sit. Huic enim
 cibi superant labores, & repletio paulatim collecta in morbum ipsum adduxit.
 Sed non huc usque differe oportet; verum ubi prima signa cognoverit, scire quod
 cibi labores superant, & paulatim collecta repletio existit. Mucus enim, & saliva 135
 repletionis indices sunt, ac signa, & quiescente quidem corpore, meatus spiritus ob-
 turant, multa repletionem existente; ubi vero calefactum est præ labore, attenua-
 ta excernuntur. Talem autem sic curare oportet. Exercitatum in consuetis exer-

- citiis citra lassitudinem, calidique lotum, cibis omnigenis expleto, ac vomere fa-
 cito; a vomitu vero os, & fauces colluat vino austero, quo oscula venarum constri-
 gantur, & nihil attrahant, velut a vomitu fieri solet: deinde iurgens, modice de-
 ambulet in tepore. Postridie vero deambulationibus quidem utendum est; exercitiis
 autem paucioribus, & levioribus, quam prius: & si aestas fuerit, unpransus degat, sin mi-
 nus, parum comedat, & de coena, quam sumere solebat, dimidium detrahat. Ter-
 tia autem die labores quidem obeat omnes consuetos, ac deambulationes; ve-
 rum cibos sensim ingerat, quo quinta die a vomitu consuetum cibum assumat. Et si
 quidem ab hoc satis bene habuerit, de caetero cibis quidem paucioribus, labori-
 bus autem pluribus curetur. Si vero signa repletionis non quieverint, interpositis
 duobus diebus ab ea, qua consuetos cibos assumpsit, rursus vomat, & eodem mo-
 do sensim ad consuetos cibos redeat. Quod si non successerit, etiam tertium eadem
 repetere, donec a repletionem liberetur. * Sunt autem homines, qui ubi labores supe-
 rantur a cibis, talia patiuntur. Incipiente quidem repletionem, somni longi, & dulces
 ipsis contingunt, & interdum etiam dormiunt. Somnus autem contingit carni, & san-
 guis funditur, & spiritus diffusiliter tranquillius est. Quum vero non suscipiat am-
 plius corpus repletionem, secretionem jam remittit intero, praeter circuitus violentia,
 quae sane secretio contraria alimento a cibis, animam perturbat. Quo tempore non
 amplius iucundi ipsis sunt somni, sed necesse est hominem perturbari, & videtur
 sibi cum aliquo pugnam committere. Quali acunque enim patitur corpus, talia videt
 anima, visu jam concluso. Quum igitur ad hoc pervenerit homo, prope jam est, ut
 aegrotet. Quod autem venit morbus, valde manifestum est. Qualis enim secretio vene-
 nerit, & quamcumque partem superaverit, eam ipsam morbo asfigit. Verum non o-
 portet ita desipientem esse, & hucusque differre, sed statim, ubi prima signa cognovit,
 curam contingere, & huius, velut priorem curare; longiori autem tempore, ac fame o-
 pus habet. * Sunt praeterea etiam talia repletionis signa. Dolet crispis aliquibus totum,
 aliquibus pars quaedam, quaecumque tandem. Dolor autem est, veluti lassitudo, & dela-
 tari esse sibi videtur, segnitique, ac repletionem curantur, donec ad febrem perveniant:
 & adhuc nondum hoc cognoscunt, sed balneis, ac cibis utentes, ad pulmonis inflam-
 mationem, peripneumoniam graecis dictam, motum deducunt, & ad extremum peri-
 culum deveniunt. Verum oportet providere, antequam ad morbos perveniant, & hoc
 modo curare, ut maxime molibus fomentis hominem foveamus, aut si id fieri ne-
 queat, multa calida lavemus, ac corpus dissolvamus, & a multis ingestis cibis,
 primum quidem acerbis, ac plurimis, deinde salis, probe vomere faciamus, quo
 facto exurgat, ac modico tempore deambulet in tepore, deinde dormiat. Mane
 vero deambulationibus sensim crescentibus utendum est, & exercitiis levibus, & cibo-
 rum exhibitionibus sensim crescentibus, velut prius. Attenuatione autem plurima o-
 pus habet, itaque deambulationibus. Si vero providentia non adhibita ad febrem per-
 venerit, nihil aliud offerre oportet, praeter aquam dies tres. Si quidem igitur ex hac
 sedetur, bene est: si minus, petasae succo curandus est, & aut quarta, aut septi-
 ma die decedet febris, si exstiterit. Bonum autem est & unguentis excludatoris uti,
 sub indicatione, excludare enim cogunt. * Quidam vero etiam talia a repletionem per-
 peruntur. Caput ipsis dolet, ac gravatur, & palpebrae ipsis a coena coincidunt, &
 in somnis turbantur, & calor inesse ipsis videtur, & alvus aliquando sistitur. Ec-
 talis, ubi venire utitur, levior statim esse sibi videtur, postea vero magis grava-
 tur. His caput repletionem revellens, & alvum sistit, & ipsum gravatur. Periculum
 autem subest, ut quo erumpat ipsa repletio, id ipsum coarumpat. Verum providere hoc
 inodo oportet. Si curam celere facere velit, petastro purgandus est: deinde exhiben-
 di cibi leves, ac molles ad dies decem, acque hi alvum moventes, quo venter inferior su-
 peret, & de capite revellere valeat. Utendum & curibus tardis, ac maturis, & de-
 ambulationibus multis. Item lucta in oleo, & prandio, & somnoa prandio non longo
 a coena vero exurgere satis est, & partim balneis, partim unctione utendum; balneis
 vero tepidis: a venere autem abstinendum. Haec quidem velocior cura est. Si vero me-
 dicamentum bibere nolit, multa calida lotus, a cibis dulcibus, ac salis vomat; a vomitu
 vero satis est, ut exurgat; mane autem deambulationibus adhibendus est, & exer-
 citiis praescriptis ad dies sex: die septima repletionem corporis facta, a similibus ci-
 bis vomatum faciat, & eodem modo cibi rursus sensim adiaciendo exhibeantur, atque
 his hoc modo ad quatuor hebdomadas uratur. In tanto enim tempore maxime se-
 datur. Deinde cibi exhibendi quo corpus reficiatur, & diata paulatim ad consu-
 etum morem redigenda est. * Funt etiam talia a repletionem. Quibusdam venter qui-
 dem concoquit cibum; carnes autem non suscipiunt. Alimento autem intus inaniens,
 statum indicit. Ubi vero pransi fuerint, sedatur. Nam a fortiori id, quod levius
 est, expellitur, & videtur sibi liberati esse. Verum malum multo maius postmodum ac-
 cedit. Quum autem quotidie augefcens sortis invaluerit, id, quod prius inest, su-
 peringesta superat, & calfacit, ac perurhat corpus, & profusum ventris facit. Sic
 enim nominatur, quandiu ipsum solum alimentum putrefactum secedit. Ubi autem co-
 pore calfacto purgatio acris fiat, tunc & intestinum raditur, ac emulceratur, & san-
 guinolenta egeruntur; hoc autem dysenteria a mala intestinorum affectione appellatur,
 morbus gravis, & periculosus. Sed providere oportet, & prandium detrahete, &

- cœnæ tertiam partem. Curfibus autem pluribus, et Inctis, et deambulationibus uti tum ab exercitiis, tum mane. Quum vero dies decem præterierint, dimidium cibi detracti apponere, ac vomitu uti, atque fic ad dies quatuor cibum exhibere; ubi autem alii decem dies præterierint, etiam reliquum cibum apponere, ac vomitum facere, atque fic ad confuetum cibum reducere, et talem laboribus confuenter premens ac iurgens, in hoc tempore sanum facies. * Fit etiam talis repletio. Posttride cibum eructant crudum citra ructum acidum. Alvus autem egerit, pauciora quidem, quam pro ratione ciborum, attamen multum. Dolor vero nullus intus est. His ventriculus frigidus existens, cibos in nocte concoquere non potest. Quum igitur motus fuerit, cibum crudum eructat. Oportet itaque huic præparare ventriculi caliditatem tum ex victu, tum ex laboribus. Primum quidem igitur utendum est pane ex tota farina collata, fermentato, diffracto in vinum nigrum, aut in iusculum fuisse carnis; piscibus vero coctis in muria acri. Utendum etiam carnis, velut extrematibus percoctis, et suillis carnis coctis pluribus, et porcinis non multis, et catulorum, ac hædorum. Ex oleribus vero porro, et alio cocto, ac erudo, blitroque cocto, et cucurbita. Porcionibus vero meracioribus, somnisque longis citra prandium prima die, itemque somnis ab exercitiis, curfibus autem curvis sensim accessione augefcere, luctasque molli in oleo, balneisque modicis. Est et ficus cum cibus bona, et meracum vinum ab ipsa. Ex hac autem curatione alii citius, alii tardius repletio sedatur.
- 14 * Alii porro quidam talia patiuntur. Faciem decolorem habent, et ubi comederint, paulo post eructant acida, et acor in nares proferpit. His corpora pura non sunt, et plus est, quod de carne colliquatur præ labore, quam quod depurgatur præ circuitu. Ex hoc sane intus manens alimento contrarium est, ipsumque violat, ac acidum facit. Alimento quidem igitur eructatur; illud ipsum vero sub eum expellitur, et hominem decolorem facit, et morbos similes aque inter cutem parit. Eorum providere oportet hoc modo. Velocior quidem curatio est, poro veratro, exhibere cibos, quemadmodum a me scriptum est. Verum tutior a dieta, hoc modo. Primum quidem calida lotus vomitum faciat, deinde septem a vomitu diebus cibum confuetum capiat; decima autem a vomitu die rursus vomat, & similiter cibum assumat, & tertium similiter faciat. Et curfibus quidem circularibus paucis, ac velocibus utatur, & motibus, ac frictione, & mora longa in gymnasio, ac exercitio. Utatur & volutatione in pulvere, & deambulationibus multis ab exercitiis, sed & a cœna. Plurimis autem matutinis in pulvere utatur. Quum autem lavari vult, calida lavetur, & eo tempore impransum degat. Et si quidem uno mense restituitur, de cætero convenientibus curetur. Si vero quid reliquum fuerit, medela utatur. * Sunt autem quidam, quibus posttride ructus acidi sunt. His in nocte secretio præ repletionem fit. Quum igitur motus fuerit corpus ex somno deorsum spiritu usum, calidum, ac acidum una cum spiritu foras expellit, & ex hoc morbi sunt, nisi quis providentia utatur. Conducit autem etiam his facere velut priori. Verum laboribus pluribus hos uti oportet. * Quibusdam etiam talia sunt. In corporibus densa carne præditis, quum cibi concalescunt, ac dissoluntur, & a primo somno, & præ cibus carne calefcere, secretio per somnum fit a carne multæ humiditatis. Deinde caro densa existens alimentum non suscipit. Id vero, quod a carne secretum est alimento contrarium, ac foras protrusum, hominem suffocat, ac calfacit, donec evomuerit. Postquam autem levior factus est, dolor nullus in corpore manifestus inest, sed decoloratur. Progressu vero temporis & dolores, & morbi sunt. His consimilia patiuntur etiam, qui in exercitiis derepente laboraverunt, & colliquationem carnis violentam, ac multam fecerunt. Hos autem sic curare oportet. De cibo detrachenda est tertia pars. Utendum autem cibus acris, & siccis, & caustis, ac odoratis, & urinam cientibus. Curfibus vero plurimis curvis in vestitu; rectis autem revertentibus, & circularibus, exutis vestibus, frictione, & iucta modica. Micatio per summas manus commodior est, quam solis. Utendum & deambulationibus ab exercitiis multis, itemque matutinis. A cœna vero etiam vocis exercitatio valde commoda est; humiditatis enim evacuationem faciens, rarefacit carnem. Conducit & impransum degere. His autem cibus utendum est per dies decem, deinde dimidium ablati apponendum est ad dies sex, & vomitus faciendus; ab unoquoque vero vomitu, ad dies quatuor sensim adiciendo, exhibendus est cibus. Quum autem dies decem a vomitu transierint, omnem detractum cibum assumat, laboribusque, ac deambulationibus deditus sit, & sanus evadet. Talis autem natura copiosior labore, quam cibo opus habet. * Quidam etiam talia perpetiuntur. Secedit ipsis cibus per alvum liquidus incoctus, velut ex intestinorum levitate, & dolorem nullum exhibet; patiuntur autem hoc ventres maxime, qui humidi, ac frigidi sunt: & propter frigiditatem quidem non concoquunt; propter humiditatem vero fecellus fit. Corpus igitur contabescit, alimentum conveniens, ac debitum non accipiens. Ventresque corrumpuntur, & in morbos incidunt; verum providere oportet. Consert huic de cibus tertiam partem auferre. Sint autem cibi, panes non fermentati ex tota farina collata, elibano cocti, aut subincricii calidi, in vinum austerum tincti, & piscium partes ex dorso, accauda, Verum capitales & sub ventre sinendæ sunt, velut humidiores, & coctos quidem pisces in

- muta edere oportet; affatos autem in aceto. Utendum etiam carnibus, sale, & aceto inveteratis, & caninis affatis, & de palimbe, ac reliquis ejusmodi volucribus, affatis, ac coctis. Oleribus vero minime. Vino utendum est nigro, & deambulationibus a coena, ac matutinis; a deambulatione autem dormiar. Curlibus vero curvis sensim accessione augefcente utatur. Sit & frictio multa, & lucta tarda, & in oleo, & in pulvere, quo caro concalescens resiccet, & humiditate ex ventre revellat. Ungui autem magis conducit, quam lavari; impanfus vero degat. Quum autem dies septem transierint, dimidium cibi apponatur, & ad quatuor dies exhibetur, & vomat.
- 185 Post alios vero septem dies omnem cibum assumat, & vomitu rursus facto, cibis eodem modo exhibetur. * Quibusdam vero aliis talia sunt. Secessus non putrefactus per alvum abit, & corpus contabescit cibis non fructus; hi vero progressu temporis in morbos incidunt. His ventres frigidi, ac siccus sunt. Quum itaque neque convenientibus cibis, neque exercitiis uruntur, ralia perpetiuntur. Conducit autem sic affecto, panibus puris forniceis uti, & piscibus coctis cum intreis, & carnibus coctis suillis, & extremitatibus percoctis, & plurimis affatis, & ex acerbis, ac salis his, quae humectant, & sanguinolus. Vinis autem nigris mollibus, & inter cibos avis, ac fribus impleri conser. Oportet & modicum prandere, & exercitationibus plurimis uti, curvisque curvis sensim crescentibus; postremum autem curvis circularibus, & post cursum lucta rum oleo; deambulationibus vero non multis ab exercitiis, a coena vero satis est exurgere. * Matutinis autem pluribus deambulationibus utatur. Lavetur calida, & utatur laboribus, ac unctionibus, somnoque longiori indulgeat, & molliter cubet. Oportet & venire aliquo modo siti. Verum de cibis quarta pars detrahenda est, & post dies decem rursus ad consuetos cibos reducendus est. * Sunt etiam, quibus secessus liquidus, ac putrefactus per alvum abit, & qualesiani sunt, ac exercentur, nullum dolorem res exhibet. Quibusdam vero excluduntur ea, quae conveniebant, progressusque temporis venter per caliditatem carnes attrahit, & dolorem exhibet, & cibi excluduntur, & venter exulceratur, & ipsum sistere jam operosum, ac difficile est. Verum ptius providere oportet, ac nosse venter calidum, ac humidum magis, quam debet esse, laborumque incommoedorum excessum factum esse. Per diartem igitur frigidificare, ac siccare oportet, & primum quidem exercitia ex dimidia parte detrahare, & de cibis tertiam partem. Utatur autem maza antea subacta, ac vino dulci, emollita, & piscibus siccissimis coctis, & neque pinguibus, neque salis. Utatur & carnibus affatis volucrium, coctis quidem, palumbis, ac columbae; affatis autem perdicum, & galiorum circa condimenta. Leporinis vero coctis in aqua, itemque ferinis omnibus. Ex oleribus autem, quae frigidatoria sunt, velut beta cocta acida. Vino vero nigro austero. * Gymnastis autem, curvis circularibus velocibus; venter frictio non multa adhibetur, sed modica, neque lucta. Micatio per summas manus, & manuum ad rythmum motus, & solis, & Volutatio in pulvere commoda sunt, sed non multa. Deambulationibus ab exercitiis utatur sufficientibus juxta laborem, & a coena pluribus juxta cibum, & mane moderate juxta habitum. Laver autem tepida, ac quiescat. Sic ubi in hac diarta transigit dies decem, apponatur cibi dimidium, & laborum tertia pars, & vomitus faciat a cibis siccis, & acerbis, & incipione moretur, sed quam celerrime vomat; a vomitu ad dies quatuor & cibis, & labor partium exhibetur. Ubi autem dies decem praeterierint, reliquum cibi apponatur, & vinum potabile: verum labores pauciores, & ubi vomitum securus, velut scriptum est, exhibetur. Hoc vero tempore semel tantum in die cibum capere conducit, donec malum sedetur. * Aliis porro quibusdam siccis, & petusius secus sit, & os siccum, & progressu temporis etiam amatum sit, & alvus sistit, itemque urina. Quum enim non habeat intestinum humiditatem circa excrementum, intumescentis transitus obturat, & dolorem exhibet, & calor occupat, & quicquid bibetur, aut edat homo, id ipsum revomit. Postremum vero etiam sterco vomit, atque hic non supervivet, quum ad hoc pervenerit. Verum providere oportet, ac nosse, quod caliditas, & siccitas in homine praedominantur. Victum igitur ipsi consistere oportet ex maza prius subacta respersa, & pane ex tritico trimessii, succo lufurum fermentato. Oleribusque utendum, exceptis acerbis, & siccis, atque illis coctis, & piscibus levissimis coctis, et partibus capitalibus tum piscium, tum locustarum, et mitilis, et herinae, et cancris, et conchyliorum succis, ipsique liquidissimis. Carnibus autem suillis, et extremitatibus anterioribus coctis, et hedorum, et agnorum, ac catulorum coctis. Piscium vero fluviatilium, ac in stagnis degentium coctis. Vino molli aquoso. Laboribus autem utendum est non multis, neque velocibus, sed omnibus quietis. Deambulationibus vero mane utatur juxta habitum sufficientibus, et ab exercitiis laboribus moderatis; a coena vero ne deambulet. Balneis utatur, et somnis mollibus, et prandio; et somno a prandio non longum. Pomis etiam humectantibus una eum cibis utatur, et cicere viridis, ac siccis in aqua macerato. De laboribus vero prioribus dimidium detrahat etiam hic a principio, et vomitum faciat a duleibis, et pinguibus, ac salis, hisque plurimis; moretur autem plurimum tempus in cibis usque ad vomitum. Deinde cibum exhibeat ad trium, et non maneat impanfus. Quum vero dies decem praeterierint, labores sensim addi-
- 345 ciendo augeat, et si quidem repletio inerit a cibo, aut ventris vitio, vomat; sin

minis;

31 minus; sic reliquo tempore curetur. * Funt insuper etiam talia. Horrores a
deambulationibus matutinis accedunt, & caput gravatur. Huc plures sunt
deambulationes, quam modus requirit. Corpus enim, & caput humore evacua-
tum horret, ac gravatur. Progressu vero temporis ad febrem perveniunt horrores.
Sed non hucusque differre oportet, verum prae curare hoc modo. Quamprimum 350
aliqua signa apparuerint, unctus, ac frictus modice prandium amplius solito fa-
ciat, & vinum multum bibat molle, deinde somno utatur a prandio sufficienter:
ad vespem vero, ubi exercitiis levibus usus est, calidaeque lotus, consueto more coe-
net: deambulationibus autem a cena ne utatur, verum ad tempus differat. Postri-
die in aqua laverit, & somni mollibus tempus transigat. Et per dies quinque panla- 355
tim ad consuevos cibos, ac labores procedat. * Sunt autem quidam, qui hor-
rent ex gymnasiis, & quum se exuunt, donec decerent: ubi vero perfrigerati sunt,
rursus horrent, & stridor dentium tremulus corpus occupat, somnoque talis grava-
tur. Ubi autem expersciscit, saepe oscitat, & a cena palpebrae ipsi graves sunt:
progressu vero temporis etiam febres malignae accedunt. Verum cavere oportet 360
& non hucusque differre, sed prius curare hoc modo. Primum quidem ab
omnibus exercitiis dimidium auferatur. Cibis vero omnibus humidioribus, ac fri-
gidioribus utatur, & potibus mollioribus, ac dilutioribus. Ubi vero praeterierint dies
quinque, rertia pars laborum ablatorum apponatur. Cibis vero isdem utatur. Post
alios autem quinque dies dimidium reliquorum laborum apponatur. Er rursus post 365
alios quinque omnes labores & leviores, & pauciores reddito, ut ne rursus exces-
sus fiat. Nam his, qui hac signa perperiuntur, labores majores sunt, quam cibi. Ad-
equare igitur hac oportet. Quidam vero non hac patiuntur, sed aliqua ex his; ali-
qua vero non. In omnibus autem his signis, labores superant cibos, & curatio ean-
dem est. Et confert his calida lavare, ac molliter cubare, & semel, ac iterum post
370 inebriari, verum non usque ad excessum; & venere uti, ubi excessus contigerit, & se-
gnem esse ad labores. Deambulationes autem in totum non sunt faciendae.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE INSOMNIIS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Senioiorum iudicia, seu praesagia quanti momenti.
- 2 Anima corporis omnia per somnum obit.
- 3 De astionibus diurnis per somnum occurren-
tibus, & cur haec bona. De somnia diurnis
astionibus adversaria quid significent. Cu-
ratio.
- 4 Quomodo de Astrorum significationibus iudi-
candum. Solem, Lunam, Astra in somnis
pure, atque agilia videre quid homini si-
gnificent. Astrorum, Solis, Luna cum
partibus humani corpori cognatio. Aqua,
aut grandinis per somnum imaginatio quid
in corpore denotet, & quomodo curentur.
- 5 Quomodo qui Lunam aliquid pati per somnum
vident, curandi. Revulsivis intro cu-
rendum. Solem aliquid pati videre,
quid, & quos morbos significet. Astra,
serenitate existente, premi, & debilia
videre quid.
- 6 Aquam, ac calidum aliquid astris oppositam
videre. Astrorum fuga quid. Curatio.
- 7 Astra errantia videre quid. Curatio.
- 8 Astra ex circumferentia excedere videre. A-
stra nigra, & obscura ad occasum ferri vi-
dere quid. Curatio.
- 9 Astra pura, & candida in celo videre.
- 10 Astra nigra, & non pura videre.
- 11 A Deo aliquid parum accipere videre.
Compluisse videre clementi celo, & aqua
molli, & contra quid. Quibus diis in

utroque, & quibus in secundis rebis sup-
plicandum. Sensuum alio per somnum si-
bere, bona.

- 12 De aliis somni sanitatem significantibus,
Visum, ac auditum per somnum lesum
habere quid. Crisum affectio, Terra
aspera.
- 13 Arborum sterilitas. Folia ex arboribus de-
cidencia.
Arbores florida, verum infructuosa. Flui-
minum variis cursus per somnum videre.
Fontes, & puteos commotos videre. Ma-
re turbatum.
- 14 Terram, aut domum moveri videre. Terra
inmutatio.
- 15 Terram nigram, & combustam videre. Na-
tare per somnum sibi videri, quibus
malum, aut bonum.
- 16 De insomniis, quae quis elire se ipsum solito
more fieri videt. Vestitus albus, & niger.
Calcamentum pulcherrimum. Adspicere a-
liquid motus, vel minus videre. Nigra.
Nuda. Mortui videre in vestibus albis,
& parum aliquid ab eis accipere, vel contra.
- 17 Corpora formae peregrina.
- 18 Edere, aut bibere per somnum consuetos ci-
bos. Aquam purem bibere videri.
- 19 Familiaria, ac consueti videre quid signi-
ficet. Falsere perterrefactum.
- 20 Pugnare, & pungi per somnum videri. Ob-
errationes, & ascensus.
- 21 Fluminum transitus, hostium, & monstru-
rum formae peregrina. Curatio.

- 1 **Q**UISQVE de his, quæ in somnis obveniunt, recte coniectat, ut
 2 magnam habere vim ad omnia ipsa reperiet. Anima enim
 3 vigilat, & quum quidem corpori intersit, in multas partes dis-
 4 tributa, non sui juris est, sed partem aliquam singulis corpo-
 5 ris partibus, sive sensibus distribuit, audiens, visus, tactus, gres-
 6 sus, actioni, ac omni corporis facultati. Ipsa autem animæ co-
 7 gatio sui juris non est. Quum autem corpus quiescit, anima
 8 in motu est, & corporis partes perreptans, domum suam gubernat, & omnes corpo-
 9 ris actiones ipsa pericit. Nam corpus dormiens non sentit: ipsa vero vigilans cognos-
 10 cit, ac visibilia videt, & audibilia audit, vadit, tangit, tristatur, animadvertit.
 11 In summa quæcumque corporis, aut animæ munia, ea omnia anima ipsa in somno
 12 obit. Quicumque igitur hæc recte iudicare novit, magnam sapientie partem novit.
 13 * Quæcumque quidem igitur somnia divina sunt, & quedam eventura significant,
 14 aut urbibus, aut populo privato, sive bona, sive mala, non ob ipsorum delictum,
 15 de huiusmodi sunt, qui iudicant, certam artem habentes. Quæcumque autem corporis af-
 16 fectioes sunt, & anima per ipsas repletionis, aut evacuationis rerum a natura insi-
 17 rarum excessum, aut confusorum mutationem præmonstrat, de his quidem itidem iudicant,
 18 & partim assequuntur, partim aberrant, & de neutris recte sentiunt, cur nam
 19 fiant, neque sciunt, quando assequuntur, neque quando aberrant, cavere admonentes,
 20 ne quid mali accidat. Atque hi non docent, quomodo cavere oporteat: verum diis
 21 supplicare iubent. Et supplicare quidem decorum, ac valde bonum est. Oportet au-
 22 tem etiam ipsi optulari, & deos invocare. De his igitur res hoc modo se habet.
 23 ? Quæcumque Infomnia mens hominis in noctem per somnum offert de diurnis actio-
 24 nibus, & reddit, quomodo facta sunt ea, quæ seria, ac iusta in reperdis facta sunt,
 25 aut de quibus consilium inritum est; hæc homini bona sunt: sanitatem enim significant,
 26 propterea quod anima in diurnis consiliis perseverat, neque repletionem, neque eva-
 27 cuationem, neque aliqua alia forissecas allapsa re, victa. Quum autem Infomnia diur-
 28 nis actionibus adversantur, & de ipsis pugna obortitur, quum sane hoc contigerit,
 29 turbationem in corpore significat. Et si quidem fortis fuerit, forte est malum: si vero
 30 levis, debilis. De actione quidem igitur, an avertenda sit, sive non, nihil decerno.
 31 Verum cæpiti hominis curari consilio. Repletione enim aliqua inus facta, se-
 32 cretio quadam conrigit, quæ animam perturbavit. Si igitur fortis fuerit conra-
 33 rietas, vomitum facere conducit, & cibos leves exhibere, sensim adijciendo aliquid ad dies
 34 quinque, & deambulationibus pulsis, ac velocibus sensim augescentibus uri, & exer-
 35 citiis exerceri moderatis, pro ciborum assumptorum ratione. Si vero debilius fuerit
 36 conrarietas, detractio vomitum, tertiam cibi partem adime, atque hanc sensim rursus
 37 ad dies quinque adice, & deambulationibus preme. Sed & vocis exercitiis utatur,
 38 & dissupplicet, & turbatio ipsi sedabitur. * A vero solem, & lunam, & cætelum, ac stel-
 39 la, pura, atque agilia solito more videre, singula bona sunt. Sanitatem enim corpori
 40 significant ab omnibus presentibus. Verum talem habitum, præsentia diæta, conservare
 41 oportet. Si vero quid contrarium his fiat, morbum quemdam corpori significat, a for-
 42 tibus quidem fortiorem, a debilibus vero leviozem, Et astrorum quidem exterior est
 43 in corpore circuitus, solis vero medius, lunæ autem ad cavitates. Quodcumque igitur
 44 astrorum extinguitur, aut lædi, aut disparere, aut sisti a circuitu suo videtur, ju-
 45 xta illam ipsam partem morbum redundare significat: & si quidem ab aere, aut nebu-
 46 la, aliquid ex ipsis astris pati quid horum videt, debiliorem, si vero ab aqua, aut
 47 grandine, fortiorem. Significat autem secretionem in corpore humidam, ac pituiro-
 48 sam factam esse, & in extremam circumferentiam illapsam esse. Conducit itaque huic, &
 49 cæcibus in omni vestitu uti multis, sensim augescentibus, ut quam maxime exudet. Item
 50 deambulationibus ab exercitio multis citra prandium uri, & detracta ciborum tertia
 51 parte, ad dies quinque sensim adijciendo rursus exhibere. Si vero fortius videatur
 52 malum esse, etiam fomentis uti: nam per corporis tumentiam purgationem facere ex-
 53 pedit, propterea quod in externa circumferentia offensa, ac laeso existit. Cibus vero
 54 utendum est siccis, acerbis, austuris, inercis, & laboribus maxime siccantibus. * Si
 55 vero quid horum luna patiat, revulsionem intro facere conducit, utique vomitu ab
 56 acerbis, & falluginosis, ac mollibus cibis; cursibus autem circularibus celeribus, &
 57 deambulationibus velocibus. Utendum & vocis exercitiis, & prandium aufere-
 58 dum, cibique detractio, ac rursus appositione eodem modo utendum est. Ob id au-
 59 tem intro revellendum est, quia ad cavitates corporis offensa apparet. Si autem sol tale
 60 quid pati videatur, fortius iam malum est, & difficilior exiti potest. Oportet autem
 61 in iteramque partem revulsionem facere, & rectis cursibus, & curvis, & circularibus uti,
 62 & deambulationibus, & aliis laboribus omnibus. Ciborum autem detractio, ac
 63 rursus appositione eodem modo; deinde vomere, & rursus sensim cibos augere
 64 ad dies quinque. Si vero, fetenitate existente, prematur hæc, & debilia esse videan-
 65 tur, & præ siccitate a circuitu suo impediri, periculum significat delabendi
 66 in morbum. Verum oportet labores detrachere, & diæta humectiore, ac molli uti, & bal-
 67 neis, ac otio ampliori, & somno longo, ac multo, donec malum sedetur. * Si autem
 68 igneum, ac calidum esse videatur, quod se illis opponat, bilis secretionem significat.
 69 Si vero superata hæc disparcant, ac evanescant, periculum est ad mortem pervenien-
 70 di ex

- di ex morbo. Si veto versa, ac mutata esse videantur, presentem statum in su- 70
gam verti significant. Fugere autem ipsa celeriter, esseque qui ea persequantur, peri-
culum desuancie futuræ ipsius hominis, si non curatus fuerit. Omnibus autem
his conducit, ut verato purgati, optimam victus rationem inficiant: sin minus, ut
victu ad aquam tendente intantur, vinum vero non bibant, aut omnino albam, tenue,
molle, & agnosum. Abstinant autem ab acerbis, rescicantibus, calfacientibus, ac sal- 75
fuginosis. Laboribus secundum naturam plurimis intantur, & cursibus in vestitu plu-
mis. Frictio vero ne fiat, neque lucta, neque volutatio in pulvere. Somnis intatur
mollioribus, & in otio degat, exceptis laboribus naturalibus, a cœna deambulet.
Bonum est & sumentis uti, a sumentis vero vomere, per trīginta vero dies non re-
pleatur. Quum autem repletus fuerit, bis in mense vomat a dulcibus, & aquosis, ac levi- 80
bus. * Quæcumque autem ex his alias alio præ nulla necessitate errant, animæ turbatio-
nem quamdam præ cunctis significant. Confert autem huic otium, & animum converti ad spe-
ctacula, inaxime risum moventia: quod si fieri non possit, ad id, ex quo ad bideum, aut
triduum maxime voluptatem capiat, & sedabitur. Sin minus, periculum est delabendi 85
in morbum. * Quæcumque alia ex circumferentia exidere videntur, suntque pura, & splen-
dida, & ultra, ac prorsum ferri videntur, sanitatem significant. Quicquid enim in cor-
pore parum ex circuitu exceditur secundum naturam, a vespera in auroram, id ipsum
recte habet. Nam & quæ in venere secernuntur, & quæ in carnem eructantur, omnia
ex circuitu, ac circumferentia exidunt. Quæcumque vero nigra, & obscura sunt, &
ad vesperam, ac occasum ferri videntur aut in mare, aut in terram, aut sursum, ea 90
magis morbos significant: hæ quæ quidem sursum feruntur, fluxum capitis significant.
Quæ vero in mare, ventris morbos. Quæ in terram, tubercula maxime significant
ex carne enascentia. His conducit tertiam cibi partem detrachere, & a vomitu, ad dies
quinque eandem rursus sensum adiciendo exhibere, in aliis autem quinque diebus cibos
omnes assumere, & vomitu facto, rursus eodem modo cibos sensum auctus exhi- 95
beatur. * Quæcumque vero ex his pura, & candida in celo hæere videbuntur, san-
num esse significant, quia quod in hominem descendit, ex æthere est. Tale autem videt a-
nima, quale sane descendit. Quæ autem nigra fuerint, & non pura, neque conspicua,
morbum significant non propter repletionem, neque evacuationem, sed sordissecus indo-
ctum. Huic confert curibus circularibus velocibus uti, quo quam minima corporis col- 100
liquatio fiat, & spiritum quam densissimo irent, id, quod inductum est, exeat, a em-
bus autem deambulationibus celeribus utendum est. Victus autem molli, & levis ad dies
quatuor offeratur. * Quicquid porro a Deo accipere quis sibi videtur purum,
bonum est ad sanitatem. Significat enim ea, quæ in corpus ingesta sunt, pura esse.
Quicquid vero huic contrarium videre quis putat, non est bonum. Morbum enim in 105
corpus venisse significat. Oportet igitur, velut priorem, etiam hunc curari. * Si quis
se complui putet elementis celo, aqua molli, & non valde mædifici, neque vehemen-
tem tempestatem ingruere, bonum est, significat enim moderatum, ac purum spiritum
ex æte ingressum esse. Si vero vice versa, valde complui quis sibi videatur, & tempe-
stare, ac turbidum esse, idque aqua non pura, morbum designat a spiritum, qui in ipso 110
est. Verum oportet etiam hunc simili dieta uti, & omnes hos paucos cibo ali. De
significationibus quidem igitur astrorum sic iudicare oportet, providereque, ac diatam sta-
tuere, & diis supplicare, in secundis quidem rebus Soli, Jovi cœlesti, Jovi possessori,
Minervæ opulenti, Mercurio, Apollini. In contrariis vero diis malorum aver-
sionibus, & terræ, & herouibus, quo mala, ac gravia omnia avertant. * Cætrum & hæc 115
sanitatem præsignant. Nimirum ea, quæ in terra fiunt, acute videre, & audire, & se-
curo iter facere, & securo, ac citra timorem currere, & videre terram levem, ac probe cul-
tam, & arbores florcentes, fructuosasque, ac sativas, & flumina solito more fluentia, & a-
qua pura, neque copiosiore, neque pauciore, quam conveniens est. Item fontes, & puteos eo-
dem modo. Hæc omnia hæc vilia, sanitatem homini designant, & corpus recte habere 120
omnesque circuitus, & exhibitiones ciborum, ac secretiones integras esse. Si ve-
ro quid his contrarium videatur, detrimentum aliquod in corpore significat. Et
visus quidem, ac auditus lesus morbum circa caput significat. Itaque matutinis deam-
bulationibus, itemque a cœna pluribus utendum est ad superiorem diatam. Crui-
bus vero læsis, vomitibus revellendum est, & lucta amphore utendum, ultra superio- 125
rem diatam. Terra autem aspera carnem non puram significat: quare deambula-
tionibus ab exercitiis pluribus utendum est. Arborum vero sterilitas (geninis huma-
ni corruptionem indicat. * Si igitur solia arboribus decident, ab humidis, ac frigidis
corpus læditur. Si vero floridæ sint arbores, verum instructiose, a calidis, & siccis
hæc igitur per diatam frigidare, ac humectare oportet, illa vero siccare, ac calfa- 130
cere. Flumina autem, non solito more fluentia, sanguinis circuitum significant, & au-
ctiora quidem fluentia, excessum; imminuta veto, defectum. Oportet itaque per dia-
tam hunc quidem augere, illum vero imminuere. Non pura autem fluentia turbationem
significant, quæ a curibus circularibus, & deambulationibus, corpore per densum
spiritum moro, purgatur. Fontes vero, & putei commoci conspecti status circa ves- 135
tam significant, quos medicamentis, urinam cunctibus, expurgare oportet. Mare
perturbatum ventris motum significat, sed oportet alvum moventibus, levisque, ac
14 mollibus expurgare. * Terram, aut domum morci videre, sano quidem viro debili-
tatem

- tatem significat: agrotanti vero sanitatem, & ex presenti statu transmutationem. Sano itaque transmutatae dietam conducit. Itaque primum vomat, & rursus, ubi paulatim cibum assumpsit: a presenti enim dieta totum corpus movetur: debili vero eadem dieta uti conducit. Nam corpus ex presenti statu transiit. Terram ab aqua aliqua, aut mari inundatam videre morbum significat, humiditate multa in corpore existente. Verum oportet vomitibus, & prandii detractioe, & laboribus, & sicco victu uti, deinde sensim adijciendo, ac modico cibo renutrire. * Sed neque nigram, neque combustam terram videre bonum est, sed periculum est delabendi in fortem, ac lethalem morbum. Siccitatis enim excessum in carne esse significat. Verum oportet & labores detrahere, & cibos, qui siccis, & calidis, & acres, ac urinam cientibus sunt, nurri-
 145 reque praeferre sicco decocto, & omnibus mollibus, ac levibus modicis, & poru uti aquoso, albo, copiosiore, & balneis multis calidis, sed jejunos ne lavet, molliter cubet, ac dormiat, & in otio degat; frigus, & solem vitet. Supplicet autem Terrae, & Mercurio, & Heroibus. Si vero in stagno, aut in mari, aut in fluminibus natae quis sibi videatur, non est bonum; humiditatis enim excessum significat. Confert autem huic, & dieta siccis, & laboribus uti: febrienti vero id bonum est; exstinguitur enim ca-
 155 liditas ab humoribus. Quicquid porro quis circa se ipsum videt solito more fieri ad naturam sui ipsius neque majus, neque minus, bonum est ad sanitatem. Et vestitum album indutum esse, & calcamentum pulcherrimum, bonum est. * Quicquid vero membris majus fuerit, bonum non est, sed neque quodcumque tandem fuerit minus: & oportet hoc quidem per dietam augere, illud vero minuire. Nigra autem morbosiora sunt, & periculosa. Mollire itaque oportet, & humectare. Nova quoque transmutationem significant. Mortuos videre puros in vestibus albis bonum est, & accipere aliquid ab ipsis purum bonum est. Sanitatem enim significat corporum, & salubritatem ingestorum, a mortuis enim nutrimenta, & incrementa, ac semina sunt. Haec autem pura in corpus irrepere, sanitatem significat. Si vero contra quis videat ipsos nudos, aut
 165 nigris vestibus inditos, aut non puros, aut aliquid accipientes, aut ex domo portantes, non est commodum. Morbum enim significat; quae enim in corpus ingeruntur, nociva sunt. Verum oportet cursum circularibus, & deambulationibus depurgari, & alimento molli, ac levi a vomitu sensim nutrire. * Quaecumque vero forma peregrinae corpora in somnis apparent, & hominem perierint, ciborum inconfuetorum repletio-
 170 nem, & secretionem, & bilis superne, ac inferne eruptionem, & morbum periculosum significant. Verum oportet vomitum facere, & ad dies quinque cibos quam levissimos non multos, neque acres, neque siccis, neque calidos sensim adijciendo accipere, & laboribus naturalibus maxime uti, exceptis deambulationibus a cena. Utendum etiam balneis, ac calidis lavacris, & otio. Solem vero, & frigus vitet. * Si vero quis per somnum edere, aut bibere confuetos cibos, ac potus sibi videatur, inopiam alimenti significat, & animae tristitiam. Et si carnes robustissimas quis edere se putet; maximum alimenti excessum designat. Si vero debilissimas, minorem. Quemadmodum enim id, quod editur, bonum est; sic etiam id, quod videtur. Cibus igitur detrahere
 175 conducit. Nam alimenti excessum hoc significat. Sed & panes ex caseo, ac melle facti; per somnum comesti, similiter significant. Aquam autem puram bibere bonum est, reliqua omnia nociva sunt. * Quaecumque homo ex confuetis, ac familiaribus se videre putat, ea animae concupiscentiam significant. Quaecumque vero fugit perterrificas, sanguinem sisti, ac prae siccitate coerceri significant. Confert itaque frigefacere, ac humectare. * Quum vero quis pugnat, aut pugnatur, aut ab alio ligatur, secretionem
 180 circuitui contrariam corpori contraxisse significat. Conducit igitur vomere, & attenuare, ac deambulare, & cibis levibus uti, & a vomitu ad dies quinque sensim renutrire. Quin & oberrationes, & ascensus in somnis visi, gravia significant. * Fluminum transiiones, & hostes armati, monstra formae peregrinae, morbum, aut insaniam significant. Confert itaque his, qui talibus insomniis vexantur, cibis modicis uti, levibusque, ac mollibus, itemque vomitibus, atque sic sensim rursus ad dies quinque cibum exhibere. Utendum & laboribus naturalibus multis, praeterquam a cena. Ca-
 190 lida lavacra, & otium, frigusque, ac soleni vitent. Qui igitur his, quemadmodum conscripta sunt, utatur, vitam sanus deget, & inventa est sane a me haec ipsa dieta, quantum possibile est humano ingenio excogitare, diis auxiliantibus.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE ALIMENTO.

Hunc librum Galenus Hippocratis esse negat. Sed tamen non alicujus plebei ac vulgaris hominis esse dicit, & fortassis ipsius Theſſali. Quidam Herophilum autorem putant.

Argumentum in Librum ſequentem.

- 1 *Alimentum, & alimenti ſpecies quatenus unum, & multa, & quæ ejus facultas. Aſſimilatio quando contingat. Alimentum exile fit, Alimentum quando deſtruat.*
- 2 *Alimenti diſtributio in omnes corporis partes, Alimentorum omnium principium unum, & ſinis omnium unus.*
- 3 *Alimentorum ſuccus coloribus, & viribus, item pro temperamentorum differentiis diſcrepare. Cauſa manifeſta, obſcura, poſſibiles, & impoſſibiles.*
- 4 *Natura omnibus ſubvenit forniſecus, & intrinſecus.*
- 5 *Morborum differentia. Morborum magnitudo, & ſigna.*
- 6 *Raritas, & denſitas corporis. Probe, & male perſpirantes. Pulmo contrarium corpori alimentum trahit. Alimenti principia.*
- 7 *Venarum, & arteriarum radicatione, hepar,*

cor. Lat, & vinum quibus nutrimentum, & quibus non.

- 8 *Diſpoſitio athletica. Lac, & ſanguis, alimenti redundantia. Natura ſine doctore. Sanguis. Humores. Lac.*
- 9 *Cibus. Fatus quæ diebus fermentur, & quot abſolvantur.*
- 10 *De oſſium ratione. Sanguis qui bonus, & qui malus. Via ſuſſum, & deoſum una. Alimenti potentia melior, quam moles. Sanitatis, & morborum ſigna.*
- 11 *Alimentum etiam ſpiritus eſt. Alimentum humidum, & alimentum ſiccum. Alimenta agere alterata, agere conſumuntur. Nutriendum cito, & tarde quomodo. Aduſculi agere magis, quam alia colliqueſcunt.*
- 12 *Denudata partes agere tranſmutantur. Pus, & purulentum unde. Medalla alimentum oſſis. Facultas, & potentia, Humiditas,*

- 1  **ALIMENTUM**, & alimenti ſpecies, unum, & multa; unum quidem, quatenus unum genus eſt. Species vero humiditate, ac ſiccitate finitur, & in his formæ, ac quantitas eſt, & ad quædam, & ad tot. Anget autem, & corroborat, & incarnat, & aſſimilat, & diſſimilia facit, quæ in ſingulis ſunt, juxta uniuſcuſque nature naturam, ac facultatem, quæ ab initio adest. Aſſimilat autem pro viribus, quum id, quod ſuperingeritur, ſuperatur; id vero, quod prius ineſt, ſuperat. Exile autem fit aliquando quidem prius, in tempore diſſolutum, aut inſuper appoſitum; aliquando vero poſterius, in tempore diſſolutum, aut appoſitum. Deſtruit autem utrumque in tempore, & poſt tempus id, quod extrinſecus aſſiduo ſuperingeltum eſt, & per multum tempus omnibus membris ſolide implicatum eſt, & propriam quidem formam producit, priorem vero, aliquando autem & priores deſtruit. Facultas porro alimenti pervenit & ad oſſa, & ad omnes partes, & in nervum, & in venam, & in arteriam, & in muſculum, & in pelliculam, & carnem, & pinguedinem, & ſanguinem, & pituitam, & medullam, & cerebrum, & medullam ſpinalem, et interanea, omneſque ipſorum partes, et ſane etiam in caliditatem, et ſpiritum, et humiditatem. Alimenti vero et id, quod hoc nutrit, alimentum eſt, et quod velut nutrimentum eſt, et quod nutrimentum futurum eſt. Principium autem omnium unum eſt, et ſinis omnium unus, et idem ſinis eſt, atque principium; et quæ particulatim in alimento probe, et male diſtribuntur. Probe quidem, quæ prædicta ſunt. Male vero, quæ contrarium his ordinem 2 habent. * Succus variè coloribus, et viribus, et in detrimentum, et in utilitatem, et neque lædentes, neque commodantes, et multitudine, et exceſſu, et defectu, et implicatione, aliquorum quidem; aliquorum vero non. Et omnium caliditatem lædunt, ac juvant, et frigiditatem lædunt, ac juvant, et facultatem lædunt, ac juvant. Facultatis autem variz nature ſunt. Succus corrumpentes et totum, et partem, et forniſecus, ac intrinſecus, ſpontanei, et non ſpontanei. Nobis quidem ſpontanei; cauſæ vero non ſpontanei. Rurſus autem cauſæ, aliæ manifeſtæ, aliæ obſcuræ, et aliæ poſſibiles, aliæ impoſſibiles. * Natura omnibus ſubvenit. Ad hanc vero forniſecus quidem cataplaſma, Illitio, Unguentum, nuditas, et totius, et partis. Caliditas, et frigiditas juxta eandem rationem, et adſtriſtio, et ulceratio, et morſus, et corroſio. Intrinſecus vero, et quædam ex prædictis, et ſupra hæc cauſa obſcura, et parti, et toti, et alicui, et non alicui excretiones vegetis ſecundum naturam,

- turam, item urinarum, sudoris, saliva, muci, uteri, juxta hæmorrhoidas, verrucam, lepram, tuberculum, carcinoma, ex naribus, ex pulmone, ex ventre, ex sede, ex colle secundum naturam, & præter naturam; discrimina horum aliis juxta aliam rationem, aliquando etiam aliter. Una natura sunt hæc omnia, & non una. Multæ naturæ sunt hæc omnia, & non una. Medicina sursum, & deorsum, & neque sursum, neque deorsum. In alimento medicina, opimum. In alimento medicina, malum. Malum, & opimum ad aliquid. Ulcus, crusta, sanguis, pus, fæces, lepra, furfur, ulcera capitis manantia, impetigo, vitiligo, lentigo aliquando ledit, aliquando prodest; aliquando neque ledit, neque prodest. Alimentum, non alimentum. Si nutrire non potest, nomen non est alimentum, non opus. Opus, & res est alimentum, non nomen. In pilos alimentum, & in ungues, & in extremam superficiem intrinsecus pervenit.
- 45 Forinsecus alimentum ex extrema superficie ad utrumque pervenit. Confluxio una, conspiratio una, consentientia omnia. Juxta totius quidem corporis naturam omnia; juxta partem vero partes in unaquaque parte ad opus. Principium magnum ad extremam partem pervenit. Ex extrema parte ad magnum principium pervenit. Una natura esse, & non esse. * Morborum differentia, in alimento, in spiritu, in calore, in sanguine, in pituita, in bile, in humoribus, in carne, in pinguedine, in vena, in arteria, in nervo, musculo, pellicula, osse, cerebro, medulla spinali, ore, lingua, stomacho, sive gula, ventre, intestinis, septo transversio, peritonæo, membrana alvum, ac intestina amplectente, hepate, splene, renibus, vesica, utero, cute. Hæc omnia & singularim, & particulatim. Magnitudo ipsorum magna, & non magna. Signa, titillatio, dolor, mens, furor, urinarum subsidencia, quies, iactatio, visus, imaginationes, morbus arctatus, singultus, morbus committalis, sanguis integer, somnus; & ex his, & ex aliis naturalibus, & quæcumque alia hujusmodi ad detrimendum, & utilitatem procedunt. Labores totius & partis. Et inagnitudo signa, alterius ad majus, alterius ad minus, & ab utroque ad majus, & ab utroque ad minus. Dulce non dulce; dulce ad potentiam, velut aqua; dulce ad gustum, velut mel. Signa utriusque, ulcera, oculi, & gustus: & in his magis, & minus. Dulce ad visum & in coloribus, & in aliis mixturis. Dulce magis, & minus. * Raritas corporis ad perspirationem: quibus amplius auferatur, saniores sunt. Densitas corporis ad perspirationem: quibus minus auferatur, morbidiores. Qui probe perspirant, debiliores, & saniores sunt, & a morbis facile convalescunt. Qui male perspirant, priusquam ægrotent, fortiores sunt. Ubi autem ægrotant, difficilis a morbis convalescunt. Hæc autem & toti, & parti. Pulmo contrarium corpori alimentum trahit, reliqua vero omnia idem. Principium alimenti spiritus, nares, os, guttur, pulmo, & reliqua respiratio. Principium alimenti & humidi, & seci, os, gula, venter. Verum antiquius, & primordiale alimentum, per abdomen umbilicus. * Radicatio venarum hepar. Radicatio arteriarum cor: ex his aberrant in omnia sanguis, & spiritus, & calor per hæc meat. Vis una, & non una, quæ omnia hæc, et alia gubernantur, alia quidem ad vitam totius, et partis, alia ad sensum totius, et partis. Lac nutrimentum, quibus videlicet secundum naturam alimentum est; alii vero non. Alii autem vinum alimentum est, et quibusdam non alimentum. Et carnes, et alia multa alimenti species, et juxta regionem, et juxta consuetudinem alime partem ad augmentum, et ad esse, partem ad esse solum, velut in senibus. Quædam vero supra hæc, etiam ad robur. * Dispositio Athletica non est a natura. Habitus sanus melior in omnibus. Magna res est quantitas ad vires solerti rationatione adoptata. Lac, et sanguis alimenti sunt redundantia. Circuitus ad multa consoni sunt, ad scutum, etique alimentum. Rursus autem sursum repti in lac, et in alimentum, et ad infanem. Vivificatur non animalia, vivificantur animalia, vivificantur partes animalium. Naturæ omnium nullo doctore usæ sunt. Sanguis alienus utilis. Sanguis proprius utilis. Sanguis alienus nocivus. Sanguis proprius nocivus. Humores proprii nocivi. Humores alieni nocivi. Humores alieni conducibiles. Humores proprii conducibiles. Consonans consonans est. Dissonans consonans est. Lac alienum bonum. Lac proprium nocivum. Lac alienum nocivum. Lac proprium commodum. * Cibus juvenibus facile, ac leviter putrescitur. Senibus vero ad summum transmutatur. His, qui in vigore ætatis consistunt impermutabiles. Ad signationem, foles triginta quinque. Ad Motum, septuaginta. Ad perfectionem, ducenti et decem. Alii tradunt. Ad formam, quadraginta quinque; ad motum, septuaginta sex; ad exitum, ducenti et decem. Alii sic. Ad formam, quinquaginta; ad primum salutem, centum; ad perfectionem, trecenti. Alii sic. Ad discriminationem, quadraginta; ad transitum, octoginta; ad elapsum, ducenti quadraginta. Non est, et est. Gignitur autem in his et plures, et pauciores secundum totum, et secundum partes. Non multo autem plures, aut pauciores; pauciores vero tot, et quæcumque alia his similia. * Officium alimentum ex contractione. Naso bis quinque. Maxilla, et clavicula, et 10 costis duplicia, cubito triplicia. Tibiæ, et brachio quadruplicia, femori quintuplicia. Et si quod in his plus, aut minus potest. Sanguis humidus, et sanguis solidus. Sanguis humidus bonus, Sanguis solidus malus. Ad aliquid

omnia mala, & bona sunt. Via sursum deorsum una. Potentia alimenti melior, quam moles. Moles alimenti melior, quam potentia. Et in humidis, & in siccis detrahit, & apponit idem, & alteri quidem aufert, alteri vero apponit idem. Venarum pulsationes, & respiratio spiritus, juxta ætatem, & consonantia, & dissonantia sunt, & morbi, & sanitatis signa, & sanitatis magis, quam morbi, & morbi magis, quam sanitatis. Alimentum enim etiam spiritus est. Humidum alimentum magis facile transmutatur, quam siccum. Siccum alimentum facilius transmutatur, quam humidum. Alimentum, quod ægre alteratur, ægre consumitur. Quod facile apponitur, facile consumitur. Et quicumque veloci appositione opus habent, his humidum ad rebeccendas vires medicamen optimum, Quicumque vero adhuc velociori indigent, per olfactum. Qui autem tardior appositione opus habent, solido alimento utantur. Musculi solidiores ægre magis, quam alia colliquecunt, excepto osse, & nervo. Quæ denudata sunt, ægre transmutantur, & siccum genus ipsa se ipsis fortiora sunt, quam pro re ipsa ipsa, propterea ipsa seipsis agrius colliquecunt. Pus ex carne, purulentum ex sanguine, & ex alia humiditate. Pus ulceris alimentum, Pus alimentum venæ, arteriæ. Modilla alimentum ossis, propterea callo obducitur. Facultas, & potentia omnia auget, & nutrit, & germinare facit. Humiditas alimenti vehiculum est.

120

HIPPOCRATIS COI LIBER DE HUMIDORUM, SIVE LIQUIDORUM USU.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Aqua potabilis cur in officina medica optima, & eius facultas. Aqua potabilis oculis utilissima. Aqua calida potabilis faciliat.
- 2 Madefactionem, & humectationem debile quiddam esse; frigesactionem vero, & calfactionem, forte. Qui agrosi de aqua qualitate iudicare nequeant. Pedes perfrigerati ex calida per osque deciderunt. Aqua tam calida, quam frigida paucitas debile quid est, multitudo vero forte.
- 3 Aqua utraque ladit, calida autem magis, quam frigida. Quæ partes calida, & quæ frigida magis gaudent. Partes verenda.
- 4 Cerebrum, & quæ ab hoc oriuntur. Frigus dentibus, ossibus, &c. minorem. Alcebre, & volutates a calidis. In animi deliquis cur frigida assidenda.
- 5 Cur posteriores corporis partes prioribus calidum magis perferant. Partes extrema. Vene alia prius, alia posterius frigidam moleste ferunt. Ulcera cur calida gaudeant. Thorax, & ventriculus cur frigoris impetientes. Desquamata, & ambigua in

superficie cur frigidam moleste ferunt, sive venter calida delectatur.

- 6 Pefica partes genitales, & virilis membri glans cur natura frigida. Corpus post frigidam moleste, ac indurescit magis: post calidam contra. Oculi post frigida usum indurescunt.
- 7 Mare quibus proficit, & quibus non. Ulcerum ambulatorum, desquamatorum, piscatorum, canculosorum, depauperatum curatio.
- 8 Aeti frigidi, & calidi usus. Aeti sex.
- 9 Vinum dulci, & austeri usus. Lana frigiditatis, aut strictionis gratia adhibere, quibus humoribus imbuenda.
- 10 Aqua frigida papulis rubicundis prodest. Furunculorum generatio. Tumoribus in articularibus, doloribus sine ulcere, polatrietis, ac convulsionibus plurimis frigida prodest.
- 11 Aqua calida in aliis affectionibus usus. Articuli indurati quomodo sanandi. Calida acatis doloribus, suppurationibus, lachrymis mordacibus, siccis omnibus conveniunt. Frigida quibus partibus, aut affectionibus præterea amica, aut inimica. Calida quibus præterea affectionibus amica.

AQUA potabilis, fæluginosa, mare, potabilis quidem in officina medica optima. Nam & ferramentis, & ærumentis optima, & medicamentis plurimis inveteratis communissima. Verum ad corpus nosse oportet, quod hæc aut madefacit, aut frigesacit, aut calfacit. Aliiter vero nulli commodat, aut detrimento est potata. Ubi modica potabili in spongia uteris, optimum oculis est. Cuius ipsa superne exulceratur calidæ asperione. Fomentum corporis totius, aut partitis. Cutis duræ mollitio, distentæ laxatio, nervorum, carnum, humorum sub æstem effusio, sudoris secretio. Humectare prolutione, velut nates, vesicam, flatus. Incarnare, attenuare, liquefacere, minuire, colorem revocare, colorem dispergere. Somniferum & in caput, & in alia, convulsionum, tensionum, mitigarivum dolores stupefacit auris, oclorum, & quæcumque talia, frigida calfacere, velut pix ulceribus, præterquam a quibus sanguis erumpit, aut erupitur est, fractis, luxatis reliquis, quibus lintea sunt medicus. Capitis gravitatis. Moderatio in uno quoque, ne ultra torqueamus, velut calida corpori, ex excessu in utramque partem, ut ab utraque non aberret, coniectione ex detrimento, aut inutili facta, velut in tepida.

- repida. Oportet enim detrimentis, aut utilitatibus, etiam si sint, uti, usquequo juvent, aut donec laedant. * Madefactio itaque, & humectatio debile quid est. Frigefactio vero, & calfactio, forte, velut ex sole. Verum frigida calida existens, velut
- 10 porabilis aqua, debile quid est. Calida autem ne ulterius pergat, ut urat, iudicat autem de his ipse agrotus, exceptis miris, aut leviter syderatis, aut suspensatis, aut velut in vulneribus perfrigeratis, aut nimio dolore vexatis; his enim haec sensu non percipiuntur. Nam non sentiunt hi perussi. Itemque profundae, ac inagnae luxationes. Jam vero etiam pedes deciderunt perfrigerati ex calidae perfusione.
- 15 Sed his corpus perussi iudex est, similiter etiam frigidae. Harum autem utrarumque paucitas, debile quid est. Multitudo vero, forte: venimutamen sinere oportet, donec fiat id, cuius gratia sunt; antea vero quam postremum fiat, cessandum est. * Harum porro utraque laedit, & calida quidem amplius ea utentibus, has lesiones iudicat, carnis efforminationem, nervorum debilitatem, mentis stuporem,
- 30 sanguinis eruptiones, animi deliquia haec ad mortem. Frigida vero convulsiones, tensiones, nigrores, rigores febiles. Mediocritas quidem extra noxam est. Reliqua vero laedunt, ac proliant, velut relatum est. Voluptatibus, & iucunditatibus, & doloribus, ac molestiis, prout singula est ipsis conveniunt, ita sani apparent. Corpus tegi, ac velari aduersum, quicquid insuetum est, quicquid longissime a familiari calore abest, & peregrino frigori propinquissimum, id ipsum aver-
- 35 facit; & propterea sane calida gaudet, & ferre potest. * Cerebrum, & quae ab hoc oriuntur, frigida quidem resistant; calida vero gaudent, si sane frigidus, & solidus a natura fuerit. Propterea ossibus, dentibus, nervis frigida inimica; calida vero amica, quia ab illa convulsiones, tensiones, rigores febiles, quae sane frigida
- 40 facit; calida vero sedat. Ob id etiam a calida voluptates, & illibetiae; a frigida vero dolores, & aversiones. Ideoque spina, pectus, dorsum, praecordia, magis frigida aggravantur; calida vero gaudent, & ferre ipsam possunt, propterea sane spina, pectus, dorsum, praecordia, contraria perpessa sunt, quia suae contraria. Propterea sane in hoc loco anxietatem ex calida obortam frigida sedat, propterea sane frigide potu
- 45 gaudet, propterea sane cibis calidis delectatur, propterea sane & in animi deliquis frigidam extremis partibus affundere prodest. * Quod autem posteriores partes calidam magis fufferunt, quam anteriores, quae relatae sunt, in causa sunt. Quod vero etiam frigidae recte habet. Nam & extremas partes anteriores sunt, & regi non aduersae: velut etiam interna pars se habet ad externam. Cogitandum autem, quod utraque in uno
- 50 quoque corpore potior est externa cute, quae & sibi ipsi, & nervo sanguineo continua, ac cohaerens, eoque extra proprium calorem in externo frigore est, abuterisque frequenter superatur, & utrique frequenter opus habet; frequentius autem calida ad voluptatem. Perpetiunt autem & extremas partes tale quid, quare cito multa percipiunt, tarde autem primum atolluntur. Et venae quoque aliae prius, aliae posterius. Aequae sic omnia ap-
- 55 parent, & ubi frigescent extremas partes, & ubi calefiunt, in vasorum evacuationibus, in animi deliquis. Et iuxta rationem merito etiam venas sequuntur ea, quae ab his eveniunt. Et calefacti primum calida, velut in manibus, internas partes. Ar ulcera calida gaudent ex confesso, quia regi aduersa sunt. Merito itaque aliter gravatur. Merito igitur & ipsae venae, quia sunt in calido. Merito etiam ipse thorax, & ventriculus
- 60 ipse a frigida superatus, moleste fert, & mortem minatur, quia maxime defuetus est. Verum plurimum abest ab eo, ut paratur; propinquissima autem inter se sunt, egerere, & pati. Merito igitur frigida potu delectatur. Et sic consentiunt inter se omnia haec. Quod vero omnia desquamata, & amissa in superficie, non valde regi aduersa, maxime frigidam moleste ferunt, par est. Cerrissime enim superantur. Et profundissima, si superentur, maxime utique graventur; deinde etiam natura nervosa partici-
- 65 pant. * Quoniam imus venter calida delectari videtur, considerandus locus est, & postea extremas partes, & vesicae, & genitales partes, & virilis membri glans natura frigidior est, quam quis putat. Sursum enim, non deorsum exiit caliditas, & propterea calida delectatur. Considerandum etiam, quod post calidam frigescit corpus magis perfrigeratum; post frigidam vero recalciscit magis contrarium, velut etiam aquae frigescentiae, & caleficientiae sunt propter tenuitatem. Et quod post calidam dure-
- 70 scit corpus magis resiccatur, velut oculi post frigidam. Altera enim similis est aeri ambiente, altera non. * Mare pruriginosum, & qui ab acerbis humoribus vellicantur, prodest, ut & lavent, & foveant ex calido. Qui vero non aduersi sunt, aliquantum laeduntur. Verum ad ulcera, & amissa, ac desquamata, & quaecumque talia contrarium est. Aptum est autem puris. Bonum est & ad attenuandum, & ad piscatorum ulcera. Haec enim neque suppurantur, si non velles; & ad ulcera cuniculosa, & depascentia prosperando sedat, ac sistit, velut sal, salugo, nitrum. Omnia autem haec, si quis parum nitatur, irritant; & si excellenter, bona sunt. Melius autem est calidum ad plurima. * A-
- 75 cetum ad corpus, & articulos simile est mari, & potentius ad perfundendum, & ad fomentum, & ad ulcera recens vulneratis, & ad sanguinis grumos, ubi nigredines sunt in pudendis: collutio est ad aures, & ad dentes. Calido autem haec fiunt, & alia, sed & ex tempore conjecturam facere oportet. Elicat, velut sal, & ut alia, quae imperigini, lepro, ac vitiliginibus conducunt, assulum ad calidum solem:
- 80 maxime vero conducit unguibus leprosis. Superat enim post tempus: vetu-

eas fornicatias attenuat, & sordes in auribus sanat. Mollit autem corpus, &
 multos alios locos, si non odor offenderet, & maxime mulieres. Valuerit &
 9 ad podagram, si non corpus vulneratur. Eadem etiam fex aceti facit. * Vinum
 dulce ad diuturna vulnera commodum est assidue utenti. Sed & ad medicamen-
 totum potionem. Asperum autem, & album, & nigrum vinum, frigidum ad ulcera 90
 commodum est, frigidum propter caliditatem. Lana, quæ frigiditatis gratia aut
 perfunditur, aut induitur, aut intingitur, aquam frigidissimam postulant. Quæ
 vero adstrictiois gratia, vinum nigrum etiam lanas aspergere potest, velut etiam
 betarum folia, aut linteola intinguntur in plurima, quibus adstrictio inest, velut
 sunt hederæ albæ folia, & quæ acerbiora sunt, aut friabiliora, velut hedera, & ru- 95
 bus, rhus coriarius, salvia: & in ea, quæ mollite oportet, velut farina cocta.
 10 * Aqua frigida prodest papulis rubicundis, quales alia, atque alia parte sublatæ erumpunt,
 quales per splenia attractoria emergunt. In catnosis vero, & tenera carne prædictis subrubicundæ sunt; in nigris autem rotundæ, dothienes, hoc est, furunculi
 appellatæ, & quales in ipsis calidis lavacris obtinuit, & mulieribus ex mensi- 100
 sum sub eadem recursu sunt, & ab irritamentis cutis, aut insulata vestimentorum
 asperorum gestatione, & ex sudoris exitu, aut ibi quis ex frigore, derepente ad ignem,
 aut calida lavacta accessit. Nam si hæc posterius fecerit, nequaquam amplius
 erumpunt. Alioqui quæ ex frigore sunt, aut quæ exasperantur inflar milii, deinde
 exulcerantur, eas frigida lædat. Calida vero prodest. Tumores in articulis, 105
 & dolores sine ulcere, ac podagricos, & convulsæ plurima ex his frigida multa affusa
 levat, ac extenuat, & dolorem torpescit. Torpor autem moderatus dolorem
 11 solvit. * Sed & calida aqua attenuat, ac mollit. Podagricis resolutis ante, ac retro
 distentis, convulsis, talia accedunt, distentiones, tremores, leves siderationes;
 Talibus laxaris, claudicationes, torpores, vocis interceptiones ad talia, excre- 110
 tionis per infernas partes suppressæ, Cavendum autem est in frigide usu, ne modum
 excedamus. Articulos induratos, aut ab inflammatione aliquando oborta, aut a
 distortionem, operæ pretium est sanare, aqua calida in utriculum infusa. Manum
 deligare, & oculos, lachrymas lenit, ita ut ad acres stillamentum lene infundat quis,
 ut ne sanguinolenta contactu lædat. Et fossiliis, ulceribus, oculorum glorio prodest, & 115
 repleto ad naturam reducens. Calida oculis convenit, doloribus, suppurationibus,
 lachrymis mordacibus, siccis omnibus. Frigida doloris exortibus, valde rubicundis,
 & qui collectiones tuberculorum juxta venas habere solent, qualia sunt ulcuscula
 capitis manantia circa thoracem, & alia dura. Verum podiei, & utero non valde
 commoda est, neque sanguinem in frigore mingentibus. Ulceribus quidem frigida mor- 120
 dax cutem obdurat, dolorosa non suppurari facit, livescit, nigrescit, rigores febriles
 facit, convulsiones ante, ac retro distentiones. Quandoque vero in hac distentione
 sine ulcere, juveni carnoso, media ætate, multæ frigide aquæ effusio caloris revo-
 cationem facit. Calor autem hæc solvit. Calida suppuratoria est, non in omni
 ulcere, maximum signum ad securitatem, eutem mollit, attenuat, dolorem 125
 eximit, rigores, convulsiones ante, ac retro distentiones lenit, capitis gravitatem
 solvit, plurimum autem conducit ossium fracturis, magis autem denudatis;
 & ex his maxime his, qui in capite ulcera habent, & quæcumque præ frigore
 aut moriuntur, aut ulcerantur: itemque in ulcerationibus voluntariis, ac involuntariis,
 qualia sunt desquamata: herpetibus serpendo adedentibus, denigratis, 130
 aut in gingivis, aut in aure, aut in sede, aut utero. His omnibus calida amica
 est, ac judicatoria. Frigida vero inimica, & occidens, præterquam in quibus sanguinem
 fluxurum esse timor est. Atque hoc modo utendum est liquidorum perfusionibus,
 inunctilium illitionibus, soliorum impositionibus, aut linctorum cataplas-
 matis, quæcumque aut frigiditate, aut caliditate profunt, aut nocent. 135

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE HUMORIBUS.

Genuinum Hippocratis librum hunc esse Galenus dicit. Verum quadam insunt ad extremam diffusionis brevitatem contraria: quadam rursus ultra modum exsensa.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Medico que considerata. 2. Celeritas in medicina. Flumorum inconstantium consideratio. Formae infra umbilicum.
- 3 Egestionum alvi consideratio. Animae, & corporis molestis unde. Serpens repente conspectus pallarem cum virore inducit.
- 4 Terra similis ventriculo. Ventriculus alimentum transmittit, fecem retinet.

- 5 Morborum modi qui. Morbi temporibus amari possunt. Tempora qua morbos indicant faciles periant.
- 6 Temporum inaequalitas morborum indicationem difficiliorem reddit. Tempora etiam recidivas faciunt.
- 7 Morbos ex temporibus, & ex morbis aquas, & ventos dissimilari.
- 8 Aquae interuentum praenotio. 9. Colores pro temporum ratione variant.

- 1 **I**MPETUS, & ferocitas humorum, ubi non reciprocatio humorum est, velut florum, ducendus est qua repit pet convenientes, ac commodas regiones, exceptis his, quorum maturitas tempore contingit. Maturaciones extra, aut intro repunt, aut alio, quo oportet. Cautio, infinita magnitudo, experiendi difficultas, pilorum nuditas, viscerum vacuitas, infernis repletio, supernis alimentum, mutatio sursum, mutatio deorsum. Spontanea sursum, & deorsum; quae profunt, & laedunt. Cognata species, regio, mos, aetas, tempus constitutio morbi, excessus, defectus. Quibus quantum deficit, aut non, mede, declinatio, derivatio, in caput, in obliqua, qua maxime repit, aut reuulsio, in supernis deorsum, in infernis sursum, aut siccare, aut aliquibus inferna, aut aliquibus superna, aut eluunt, aut quibusdam mitigabitur: humores effusi ne intro reuellantur, sed secretiones siccantur. Turbario, insusio per sedem, pellivium, quibus abscedit ad sedem, unde exolvitur, aut medicamentum, aut ulcus, aut humor aliquis compactus, aut erupio pustulosa, aut stans, aut cibus, aut animalculum, aut aestus, aut alia quaedam affectio. * Consideranda haec, 2 spontanea definitia, aut velut ab exsitione excitatae bullae, in quibus qualia laedunt, aut profunt. Figurae, motus, elevatio, & rursus subsidencia, somnus, vigilia. Quae faciendi, aut impediendi, cito assequi. Calsigatio per vomitum, inferne per exitum, aut sputum, mucus, tussim, ructum, singultum, flatum, urinam, sterutationem, lachrymas, pruritus, evulsionem, contactus, sitim, famem, repletionem, somnos, labores, otium, corpus, mentem, disciplinam, memoriam, vocem, silentium, uteri purgationem. Quae superne erumpunt, ac torquent, pinguis, intemperata, ac metata, spumosa, calida, mordica, eruginosa, varia, ramentosa, seculenta, cruenta, status expertia, cruda, cocta, siccata. Quaecumque circumstant, ferendi facilitatem contemplari oportet, itaque difficultatem, priusquam periculum veniat. Item quae sedare non oportet: maturatio, descensus eorum, quae infra sunt, retardantia, & fluctuatio eorum, quae supra, & quae ex utero, & in auribus sordes, concitatio, ac permixtio, apertio, evacuatio, calfactio, perfrigeratio, intrinsicus, forinsecus, horum quidem, horum vero non. Quum infra umbilicum fuerit id, quod torquet, tardum, & molle est tormen. Vice versa, contra. * Quae per alvum egerunt, quae repunt, non spumosa, matura, cruda, frigida, foetida, siccata, humida. Quae olfactum male afficiunt. Sitis, quae prius non adfuit, neque aestus, neque alia causa. Urina, nasi humectatio. Jactationem. Siccitatem, & non esse contractum, ac arefactum, & spiritum turbulentum, praecordia, extremitates, oculos male affectos, coloris transmutatio. Pulsus, frigiditas, palpitaciones, cutis durities, nervorum, articulatorum, vocis, mentis, figura voluntaria, vili, ungues, facile ferre, aut non, qualia oportet. Signa haec. Odores corporis, oris, secessus, auris, status, urinae, ulceris, sudoris, sputi, nasi. Corpus sanguinosum, aut sputum, aut nasus, aut lachryma, aut alii humores. Penitus similia, iuvantia, laedentia. 40 Insomnia qualia videat, & in somnis qualia faciat, an acute audiat, & obedire paratus sit animo, an magis fortia sint, ac plura, quae commoda sunt, ac servant, quam alia, an sentiant omnia omnibus sensibus, & serant, veluti odores, sermones, vestitus, figuras, & huiusmodi patienter, quae sine, & sua sponte comparentia profunt, & quando etiam talia indicationem inducunt. Item tot, & talia, veluti sunt stans, urinam, qualis, & quanta, & quando. Quae vero contraria sunt, avertere, ipsique advertere.

adversari. Quæ propinqua, & communia sunt affectionibus, prima, & maxime assignantur. Constitutionem autem ex primis incipientibus, quicquid tandem excernatur ex urinis, qualeſcunq; fuerint, & qualis sit corporis collapsio, coloris immutatio, spiritus imminutio, & reliquæ cum his victus rationes. Scire etiam oportet, an similia sint, quæ decedunt, transitus, urinae, per uteros, sputa, per nares, oculi, sudor, ex tiberculis, ex vulneribus, ex pustulis, quæ sua sponte, quæ arte. Quod similia sunt inter se omnia, quæ indicant, & quæ proſunt, & quæ nocent, & quæ perimunt, quo hæc quidem fugiens, avertat, illa vero accerſat, & dicat, ut incipiat. Sed & alia eodem modo, cutis, extremitatum partium, præcordiorum, articulorum, oculorum, oris, figurarum, somniorum, qualia judicant, & quandotalia machinari. Insuperque qui tales abſceſſus fiunt. Qualia proſunt cibus, potibus, odoribus, visu, auditu, cogitati, secretionibus, humoribus, calefactione, frigefactione, siccitatibus, humectando, siccando, unguentis, iltitionibus, cataplasmatibus, emplastris, insperſionibus, denique & epithematis, quæ imponuntur. Figuræ, defricatio, curatio, labor, otium, somnus, vigilia: spiritibus superne, inferne, communibus, propriis, arte paratis. In exacerbationibus neque præsentibus, neque futuris, neque pedum frigiditate, sed in declinante deorsum morbo. In exacerbationibus per circuitus sentibus, ciborum oblationes dandæ non sunt, neque cogere oportet, sed auferre de appositionibus ante judicationes. Quæ indicantur, & judicata sunt integre, neque movete oportet, neque novare, neque medicamentis, neque aliis irritamentis, sed linere. Concocta medicamentis aggredi oportet, & movere non cruda, neque in principis, si non turgeant. Multa vero non turgent. Quæ ducere oportet, quo maxime repunt per convenientes locos, eo ducere oportet. Quæ prodeunt, non multitudine æſtimare oportet, sed quandiu prodeant, quæ sita oportet, & facile ager ſerit. Ubi vero opus est, debilitare etiam, aut animi deliquium inducere oportet, donec hoc feceris, cuius gratia hoc fit, interim alio vertere, aut ſiccare, aut humectare, aut revellere, si ſufficiat ager, id quod ex his conſectabis. Sicca quidem calidi erunt, humida vero frigida. Quæ vero alvum movent, plerumque contraria. Hæc imparibus diebus, ſurſum, si & circuitus, & conſtitutio talis sit ex exacerbationibus. Finit autem plurima paribus diebus, deorsum: sic enim & ſua ſponte proſunt: si non circuitus faciant ex exacerbationes in paribus. In talibus autem, in paribus ſurſum, in imparibus deorsum. Tales autem pauci ſunt. Et tales conſtitutiones etiam difficilius judicantur. Quæ & ulterius tempore progreſſa, ſic fieri neceſſe est, velut ad decimamtertiam, ac decimamquartam diem. Decimatertia quidem deorsum, decimaquarta vero ſurſum. Ita enim ad judicationem conducit. Et quæ ad vigefimam. Cæterum quæ infra prodeunt, multum purgare oportet, & hæc non prope judicationem, sed longius ab ea. Ratio autem in acutis multa ducere oportet, in deſaſſatis, totum. In febris ad articulos, & circa maxillas maxime abſceſſus fiunt, prope ſane dolores uniuſcuſque ad ſuperiorem partem magis, & in totum. Si vero lentus fuerit morbus, & deorsum tendens, inferne etiam abſceſſus fiunt. Maxime autem pedes calidi, inferne ſignificant; frigidi, ſuperne. Quibus vero ex morbis ſe erigentibus, ſtarim in manibus, aut pedibus dolores fiunt, in his abſceſſus contingunt. Sed & si quid doluerit, quis antea quam ægrotet, ad eas partes firmat. Quemadmodum etiam inſipientibus, & anginoſis in Perintho. Faciunt enim tuſſes abſceſſus, velut etiam febres. Juxta eandem rationem contingit ab humorum, aut corporis colligatione, & frigiditate. Proinde noſſe expedit, in quibus temporibus humores florent, & quales in ſingulis morbos faciunt, & quales in unoquoque morbo affectiones: & reliquum corpus, ad quem morbum maxime natura repit: & quale quid ſplen intumefcens, facit. Horum ſane & natura, & ſerme colores deteriores ſunt, & corpora timent. Et si quid aliud eſt, in his exercere ſe prodeſt, velut eſt animi intemperantia circa cibos, ac potus, ſomnum, vigilias, aut ob amores quoddam, velut telſeratum, aut propter artes, aut propter neceſſitates: tolerantia laborum, & quorum ordinata eſt, aut inordinata. Mutationes ex qualibus ad qualia: ex morbis animæ indultia, aut quærens, aut meditans, aut videns, aut dicens, aut aliud quid, velut triſtitia, iracundia, cupiditates, quæ ex caſu contingunt. Moleſtia animi aut per oculos, aut per auditum, velut etiam corporum. Molis quidem ad ſe ipſas attritis, dentes ſuſcepunt. Ambulanti vero circa cavum locum cerra tremunt: quum autem quis manibus ea, quibus opus habet, levat; hæc erunt. Serpens derepente conſpectus pallorem cum virore inducit. Timores, pudor, meoror, voluptas, ira, aliaque huiusmodi quomodo obediunt. Unicuique autem pars corporis ad actionem pertinens, in his obedit. Sudores, cordis palpitatio, & cuiusmodi potentia. Quæ extrinſecus proſunt, aut nocent, unctio, perſuſio, iltio, cataplaſmatum uſus, deligatio lanarum, & talium rerum: et intetna partes talibus obediunt, non ſolum externæ his, quæ intro aſſumuntur, ſed et quæ in lanis ab ovili ſuccidis adhibentur, et quod a rege nomen habet cuminum, videtibus, & olſcientibus. Quæ de capite dicunt, turbant ſermones, vox, et huiusmodi, mammae, genitura, uterus, et quæ ſigna in ætariis, et in ſuffocationibus, et tuſſi, et quæ ad teſticulos. * Quemadmodum arboribus terra, ita animalibus

- bus ventriculus, & nutrit, & calefacit, & frigefacit. Frigefacit, dum evacuat; calefacit, dum impletur. Quemadmodum terra stercoreata hyeme calida est, ita etiam ventriculus. Arbores corticem tenuem siccum habent, intrinsecus autem carneifica, sanæ, non putridæ, duræ. Ita & ex animalibus testudines, & quæcunque ejusmodi est. Et arboribus, temporibus, annis, similia animalia non deteruntur, si moderate melioribus utantur. Quemadmodum hydra, quod recens est, transmittit, quod inveteratum, retinet; sic & ventriculus transmittit alimentum, & secem retinet, velut vasculum. * Modi morborum hi sunt, partim quidem cognati sunt, de quibus interrogando discere oportet, partim a regione, familiares enim sunt per multas, & multi ipsos noscunt; partim ex corpore, & victus ratione, ac temperiei constitutione, aut a temporibus. At regiones ad tempora male dispositæ tales morbos pariunt, quali tempori similes fuerint, verbi gratia inæqualis calor, aut frigus eadem die, quin talia fuerint, morbos autumnales faciunt. Et in aliis temporibus secundum rationem, alii ab odoribus cœnosis, aut palustribus; alii ab aquis calculosis, splenici; alii a ventis bonis, & malis incipiunt. Qualia vero sunt tempora, tales erunt etiam morbi, & constitutiones ex ipsis. Si tempora tempestive, & ordinate se habuerint, morbos judicati faciles faciunt. Veteraculi autem temporum morbi indicant mutationes, & prout evariaverit tempus, similes, aut dissimiles erunt morbi, qui in hoc tempore oriuntur. Si vero similiter procedat, ejusmodi quoque fuerint morbi, & ad talem modum tracti, veluti est morbus tegius autumnalis. Frigora enim ex caloribus, & calor ex frigore. Et si æstas biliosa fiat, & bilis aucta ignis relinquatur, etiam aliquantum splenici fient. Quum igitur & ver sic processerit, etiam vere fit morbus tegius. Proximus est enim hic motus temporis, juxta hanc speciem. Quum vero æstas fiat veri similis, sudores in febribus, & febres faciles, & non præcutæ, neque linguis obaridæ fient. Si vero hyberum fiat ver, & postitemum hyemis tempus, hyberni etiam morbi, & tussis, & peripneumonix, & anginx. Et autumnus, si non in tempore, ac derepente hybernatur, non assidue tales morbos facit, eo quod non in tempore incipit, sed inæqualiter fit. Quapropter etiam tempora a iudicatione aliena, ac inconsistentia sunt; quemadmodum etiam morbi, si præcumpant, aut præexacerbantur, aut intus relinquuntur. Recidivas enim etiam tempora faciunt, quemadmodum & morbos ita inducunt. Itaque insuper considerandum est, quomodo habentia se corpora, tempora suscipiant. * Austri auditum gravant, caliginem inducunt, caput gravant, torpidi sunt, dissolvunt. Quum hic prævaluerit, talia in morbis pariuntur, ulcera glabra, maxime os, puerendum, & alix partes. Si vero aquilo, tussis, faucium affectiones, ventres duriores, utinx difficultates, horrores, dolores laterum, ac pectoris. Quum hic dominatur, tales morbos magis expectare oportet. Si magis redundaverit, ad squalores sequuntur febres, nemque ad pluvias, ex quolibet tandem redundantia transmutatur fuerit, & quomodocumque habentia se corpora, ex alio tempore susceperint, & quæcumque tandem humore in corpore dominante. Cæterum siccitates, & austri sunt, & aquilonates. Differunt enim & alia hoc modo. Magnum enim & hoc est. Nam alius in alio tempore, ac regione magnus est. Veluti æstas bilem patit, ver sanguinem, reliqua prout singula. Mutationes maxime pariunt morbos, & præsertim maximæ: & in temporibus maxime mutationes, & in aliis. Quædam sensim contingente progressu sunt. Tempora huiusmodi sunt securissima, velut etiam diætæ, & frigus, & calor maxime sensim facto progressu. Et ætates sic transmutantur. Naturæ, quantum ad tempora attinet, alix ad æstatem, alix ad hyemem bene, aut male dispositæ sunt. Quantum vero ad regiones, & ætates, & victus rationem, & alias morborum constitutiones, alix ad alias bene, aut male se habent. Et ætates ad tempora, & regiones, & victus rationem, & morborum constitutiones. Et in temporibus victus, & cibi, & potus qualiter suam requirunt. Nam hyems ab operibus otium habet, & quæ in corpus ingeruntur, matura, ac simplicia postulat. Magnum enim & hoc est. Autumnus autem laboribus deditus, sub insolationibus potus frequentes sunt, cibi inconstantes, vina, arborum fructus. * Quemadmodum autem ex temporibus morbos conjectare datur, ita quandoque etiam ex morbis aquas, & ventos, & siccitates prænosce-re licet, & aquilonares, & austrias. Licet autem ei, qui probe, ac recte dicit, unde sint hæc considerare, velut & lepræ quædam, & circa articulos dolores. Aquæ ubi suntæ sunt, pruriginosi sunt, & alia huiusmodi. Et quæ pluvix æternis, aut singulis diebus, aut per alios circuntus, aut assidue fient. Et venti aliqui per multos dies stant, & contratio inter se modo stant, alii per pauciores. Et idem per circuitum. Hæc habent cum temporum constitutionibus similitudines. Verum brevius talia. Si vero annus durius talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, tales etiam morbi durius erunt. Et si magis fortes fuerint, maximi quoque morbi sic fient, & communissimi, & ad pluvium tempus. * Exprimis aquis, ubi post multa siccatatem aqua futura est, de aqua inter cutem prædicere licet: & ubi talia parva signa apparuerint in ventorum quiete, in transmutatione. Colligenda igitur sunt, quæ in quolibet aquis, aut ventis morbi significant, & audiendus est, si quis novit, quod tali hyeme prægressa, tale ver, aut æstas erit. Colores non sunt simi-

similes in temporibus, neque in aquilonaribus, neque in austrinis, neque in ætatis, 185
neque in unoquoque ad se ipsum, neque in alio ad alium. Considerandum autem est
ex his, quæ præsentia, ac quiescentia novimus de coloribus, & quod ætates tempo-
ribus similes sunt & colore, & mutatione. * Qui hæmorrhoides habent, neque
pleuritide, neque peripneumonia, neque phagedæna, neque furunculis, neque tuber-
culis terebinthi figuram habentibus, corripuntur. Fortassis autem neque lepris, 190
fortassis neque vitiligibus. Multi tamen intempestive curati, non tarde correpti
sunt, & sic perniciose fuerunt. Et quicumque alii abscessus, velut fistulæ, aliorum
medela sunt. Quæ ubi insuper comparent, sedare solent, ea prius sentia impedi-
menta ab his liberant. Alterius loci morbos loca expientia aut dolore, aut gravi-
tate, aut ob aliud quiddam liberant, aut quod aliis sunt communicationes. Pro- 195
pter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed juxta humoris cognationem
taliam spūnt: convenit quibusdam sanguinem detrahre tempestive in talibus;
in aliis autem, velut in his, non hoc convenit. Impedimentum in spūntibus cruen-
ta, tempus anni, pleuritis, bilis. Tubercula circa autem, quibus circa judicatio-
nem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus, recidiva fit, & pro ratione 200
recidivarum, recidiva sentie, rursus intumescunt, & permanent, quemadmodum
febrim recidivæ, in simili circuitu: in his ipos est ad articulos abscedere. Urina
crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febribus quarta die
aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si vero ultra hoc, etiam sanguis e naribus
large eruperit, etiam valde. Cui intestinum in dextra parte dolebat, 205
& articulari morbo correptus est, quietior erat. Post-
quam autem hic curatus fuit, magis dolebat.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE MORBO SACRO.

Non genuinum Hippocratis, sed memorabilis tamen viri, bene librum
Galenus esse dicit, tum quod ad dictionem, tum quod ad sen-
sentiam attinet. Hippocratis autem neque dicendi modum,
neque sententiarum acumen in ipso esse.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Morbum sacrum aliis morbis neque diviniorem, neque sacratiorem esse: sed omnes divinos, & humanos.
- 2 Aegros, ac homines quosdam arrogantes hanc affectionem sacram appellasse.
- 3 Carnes aliorum turbantes, Morbum sacrum expiationibus curantes, cur medicamenta non propinquant, Cur morbus sacer illis ipsis, quibus sic vocatur, neque sacer, neque divinus existat. Deus quis sit.
- 4 Quod morbus sacer naturam habeat, quam etiam alii morbi, & causam unde singuli cognantur.
- 5 Morbus sacer hereditarius. Morbus sacer biliosus naturis non accidit. Cerebrum hujus affectionis auctor, & causa.
- 6 Morbus sacer quomodo, & ex qua causa fiat. Cerebrum hominis, ut aliorum animalium, duplex. Pena capitis. Pena respirations. Spiritum nunquam consistere.
- 7 Quomodo morbus sacer, facti in utero existente, incipiat. Caput sanctissimum, & morbosissimum, qui setus babeat. Capitis ulcerum in pueris commoda. Qui pueri huic morbo obnoxii. De affectionibus a pituita defluxu in cor, pulmonem, ventrem, & venas.
- 8 Aduti, ac desipientes homines sunt, ubi aer pituita a venis excluditur. Manus qua de causa in comitialibus impotentiæ reddantur, Hipp. Opera.

oculi distorquentur: spuma, stercus, cal-
estratio.

- 9 Qui pueri ex comitiali morbo supervivunt, & qui non. Partes corporis, nota a comitiali morbo impressa, debiliores redduntur, sed non amplius apprehenduntur.
- 10 Qui pueri ex comitiali morbo citra nota impressionem supervivunt. Cur comitialis morbus, si senilibus accidat, eos neque distorquet, neque occidat, antiquissimos vero occidat, & semisideratos faciat.
- 11 Dextra partes cur in comitialibus facilius succumbant.
- 12 Quomodo, & qua de causa sentis hyeme, & vere morbo sacro corripiantur, non autem æstate.
- 13 Cur viginti annos nati a morbo comitiali sint tuti. Caput plerumque comitiales.
- 14 Morbus sacer cur diuturnus. Morbo comitiali affuerit, tempus quo corripiendi sunt, præcognoscant.
- 15 Cur ventorum mutationes, maxime autem Anstrina, comitiales morbi sint causa. Aquilo eor ventorum omnium saluberrimus. Ventis ex omnibus rebis, atque adeo ex ipsis hominibus humiditatem, ac tenebrositatem exerunt. Aster aërem compellunt liquat, ac dissipat.
- 16 Cerebrum plurimum in homine vin habere. Voluptates, latitudo, risus, &c. ex cerebro contingunt. Quæ a cerebro non satis patiantur. Quomodo humiditas infama causa

est. Cerebri corruptio inde, & quomodo cognoscatur. Qui cum clamore insanunt, & qui minime. Terrores, ac timores in insanientibus inde. Anger, & inquietudo in insanis inde. Obliviosi inde sunt. Clamores mediani in insanientibus tantum a bile.

17 Partes corporis cerebro subiecta, ejus metu ac imperio reguntur. Cerebrum intelligen-

tia, ac prudentia interueniunt. Spiritus primum in cerebrum astrahitur, per reliquum corpus distribuitur, non vice versa.

18 Quod neque praecordia, neque cor sapientia participant. Cerebrum cur primo sentiat. Epilogus. A medico in morborum curatione qua observanda. Quomodo morbum comitalem circa expiamenta, & incantationes curare possit.

- 1 **D**E morbo sacro appellato sic se res habet. Nulla re videtur mihi alius diviniore morbis, neque sacrior. Verum naturam habere, quam etiam reliqui morbi. Unde fit. Homines vero naturam, & causam ejus divinam esse putaverunt praeter inexpectantiam, & admirationem, propterea quod reliquis morbis nulla re similis est, & per inopiam quidem quod non cognoscunt, divinitas ipsi conservatur. Per abundantiam vero, & parabilem modum fantionis medentur. Exolvuntur enim aut expiationibus, aut incantamentis. Si vero propter admirationem divinus censetur, multi morbi sacri erunt, & non unus.
- 10 Quomodo enim ego demonstrabo etiam alios nihil minus admirabiles, neque minus monstruosos, quos nemo sacros esse censet. Primum etenim febres quotidianae, & tertianae, & quartanae nihil minus mihi sacri esse videntur, nec minus a Deo fieri, quam hic morbus, etiam si nihil admirabile habeant. Deinde vero insanos homines, & delirantes a nulla manifesta causa, & multa, & simul importuna facere, vidique multos in somno plorare, ac vociferari; alios vero suffocari, alios exilire, & foras fugere, atque ita delirare, donec expersciscuntur, postea autem etiam sanasse, ac sapientes, velut prius, esseque ipsos pallidos, ac debiles, atque haec non semel, sed saepe, alique multi sunt, ac omnigeni morbi, in quibus singulis recensendis in longum sermo extenderetur. * Ceterum qui prius hunc morbum sacrum esse pronuntia-
- 20 caverunt, tales homines mihi fuisse videntur, quales etiam nunc sunt magi, & expiatores, & circulariores, & quidam arrogantes, qui se vehementer pios esse simulant, & amplius quod scire. Ni itaque consilii, ac mentis inopie obvelantes, ac praetextentes divinitatem, quum nihil haberent, quod exhibiturum prodesset, ut ne manifesta fieret ipsorum ignorantia, sacram hanc affectionem esse pronuntiaverunt.
- 25 & rationibus idoneis collectis. * Curationem constituerunt sibi ipsis securam, expiamenta offerentes, & incantamenta, et a balneis abstinere jubentes, et a cibis multis, ac ineptis ad hominum agrotorum esum, velut ex marinis quidem a mullo, et melanuro, mugilique, ac anguilla, hi enim pisces opportune haberi possunt. Ex carnibus vero a caprina, cervina, suilla, ac ovina. Haec enim carnes maxime alvum turbant. Ex volucribus autem, a gallo, et turtura, ac coride, insuperque ab his, quae robustissime esse censentur. Ex oleribus a mentha, allio, ac cepa. Nihil enim acre infirmo conducit. Pallium praeterea nigrum habendum non esse praecipere. Niger enim color mortalis est. Neque in caprina pelle decumbendum esse, neque eandem gestare oportere, neque pedem supra pedem habendum esse, neque manum supra manum. Haec enim omnia curationis impedimenta esse. Omnia autem haec divinitatis gratia opponuntur, velut amplius quid scientes, et alios praetextus proferentes, quo si sanus aeger evadat, ipsis gloria, et dexteritas adscribitur, si moriatur, in tuum posita sint ipsorum execrationes, habeantque praetextum, quod non ipsi sint in causa, sed Dei. Neque enim medicamentum aliquod edendum, aut bibendum exhiberunt, neque balneis incoerunt, ut ipsi in causa esse videri possint. Mihi autem videtur nullum ex his, qui mediterranea Africae inhabitant, sanum esse posse, propterea quod caprinis pellibus, ac carnibus utuntur, quum neque stratum, neque pallium, neque caleamentum habeant, quod non sit caprinum. Non enim alia ulla ipsis sunt pecora praeter capras, & boves. Si autem haec admora, & comesta morbum augent, & non comesta sanant, non est sane Deus alienus auctor, aut causa, neque profertur expiamenta, sed edulia sunt, quae & sanant, & laedunt. Numinis vero vis dissipatur. Sic igitur mihi videntur hi, qui hoc modo hos morbos curare aggrediuntur, neque sacros ipsos putare, neque divinos. Ubi enim praeter talibus expiamentis, ac tali curatione transmutantur, quid verum etiam praeter alios artibus similibus illis, & discedere ab hominibus, & accedere? Quare non Deus auctor est, sed aliquid humanum. Quisquis enim iustificationibus, & magicis incantamentis talem affectionem abducere potens est, is etiam aliis artibus abduxerit, & ex hac ratione divinitatis opinio penitus pessumrit. Talia itaque dicentes, ac excoerantes, amplius quid se scire simulant, & homines decipiunt, proponentes his iustificationes, ac purificationes, quum verba ipsorum magna ex parte se ad Deum, ac demonium extendant. Atqui mihi sane non de pietate verba facere videntur, velut ipsi putant, sed potius de impietate, & quod dei non sunt, pietasque, ac divinitas ipsorum impia est ac feelesta, velut ego docebo. Si enim & lunam abolere, & solem obscurare, tempestatesque, ac serenitatem facere, pluvias item,

Item ac siccitates, & mare sterile, itemque terram, & alia huiusmodi omnia se sci-
re proficiuntur sive ex sacrorum mysteriis, sive ex alia quadam professione, aut
meditatione hanc potentiam habent, qui talia studio habent, impii sane mihi
esse videntur, & deos non esse putare, neque si sint, aliquid posse, neque ullum ali-
quod etiam extremum malum prohibere. Quod quum faciant, quomodo non
ipsis infestis sint? Si enim homo incantamentis, ac sacrificiis utens, & lunam abole-
bit, & solem obscurabit, & tempestatem, ac serenitatem faciet, non utique ego ho-
rum aliquid divinum esse putaverim, sed humanum, si sane divinitatis poten-
tia ab humana voluntate superatur, & in servitutem redacta est; fortassis autem
hæc non hoc se modo habent, sed homines victus indigi multa, & omnigena moliri-
tur, & evariant tum in alia omnia, tum in hunc morbum, in singulis affec-
tionis speciebus causant Deo adscribentes. Non enim semel, sed sæpius eorum-
dem mentionem faciunt. Siquidem enim capras imitentur, & si balatum edant,
& frendant, & si dextris partibus convellantur, matrem deorum causam esse
arunt. Si vero acutiores, & concitiores sonum emittant, equo assimulant, &
Neptunum autorem esse dicunt. Si vero etiam aliquid stercoreis emittant, quod
sæpe quibusdam contingit præ morbo coactis, Hecates enodia appellatio addi-
tur. Si autem tenuiores, & densiorem vocem edant, velut aviculæ, Apollo
Nomius, id est pastor; si vero spumam ex ore remittant, ac pedibus calcitent,
Mars causam habet. Quicumque porro pavores noctu ingruunt, timoresque,
ac deliria, & exaltationes e lecto, terroresque, ac fugæ foras, Hecates insidias esse
dicunt, & heroum insulsi, expientisique utuntur, ac incantamentis, & scelestissi-
mum, ac impiissimum, meo sane iudicio, faciunt nomen. Expiant enim mor-
bo correptos sanguine, itemque aliis sceleribus inquinatos, aut iniustos, aut ab
hominibus intoxicatos, aut qui scelestum aliquid facinus perpetrarunt, quos
contraria his facere oportebat, sacrificare nimirum, ac precari, & ad templa progres-
sus diis supplicare. Nunc vero horum quidem nihil faciunt, verum expiant, &
alia expiamenta terra occultant, alia in mare proiciunt, alia ad montes dese-
runt, ubi nemini attingat, neque conculcet. Oportebat autem ea ad templa dese-
re, ac Deo contribuere, si quidem Deus est autor. Non tamen ego puto, hominis
corpus a Deo inquinari, sordidissimum scilicet a purissimo. Verum etiam si con-
tingat ab alio inquinari, aut quid perpeti, cupierit utique a Deo purgari, ac purifi-
cari magis, quam inquinari. Deus itaque est, qui maxima, ac sceleratissima pecca-
ta purgat, ac purificat, & liberatio nostra existit, ipseque terminus templorum, ac de-
lubrorum his designamus, ut nullus, qui non purus sit, eos transgrediat, & in-
gressi respergimur, non velut qui inquinemur, sed si quod etiam prius scelus ha-
beremus, purificemur. Et de expiationibus quidem sic se res habere mihi videtur.

4 * Hic vero morbus nulla re diviniore reliquis mihi esse videtur. Sed naturam ha-
bet, quam etiam alii morbi, & causam inde singuli gignuntur. Naturam autem,
& causam, ab eodem Deo fieri, a quo etiam alia omnia. Et sanabilis esse mihi vi-
detur nihilo minus, quam alii, nisi iam præ temporis longitudine invaluerit, ut fortior
sit medicamentis, quæ adhibentur. * Incipit autem, velut etiam alii morbi se-
cundum genus. Si enim ex pituitoso pituitosus, ex bilioso biliosus gignitur, & ex
tabido tabidus, & ex splenico, sive lienoso lienosus, quid prohibet, ut cuius
pater, & mater hoc morbo correpti fuerint, etiam posterorum, ac nepotum aliquis
eo corripiatur? Semen enim genitale ab omnibus corporis partibus procedit,
a sanis sanum, a morbidis morbosum. Aliud porro signum magnum est, quod nihilo
divinior reliquis sit morbus; pituitosis enim natura oboritur, biliosus vero non acci-
dit. Atqui si diviniore est reliquis, similiter omnibus morbum hunc fieri oportebat,
& non discrimen facere inter biliosos, ac pituitosos. Sed enim ipsi cerebrum
amor est, & causa huius affectionis, velut etiam aliorum maximorum morborum.

6 * Quo vero modo, & ex qua causa fiat, ego manifeste docebo. Cerebrum homi-
nis duplex est, quemadmodum etiam aliis omnibus animalibus. Medium autem
ipsius dividit membrana tenuis. Quapropter non semper eandem capitis partem do-
let, sed particulatim utramvis, aliquando vero totum. Sed & venæ in ipsum ten-
dunt ex universo corpore multæ, & tenues, dux vero crassæ, altera ab hepate,
altera de liene. Et quæ quidem ab hepate venit, hoc modo se habet. Altera
quidem venæ pars deorsum tendit per partes ad dextram, iuxta ipsum rhenem, ac lum-
bum, ad internam femoris partem, & descendit in pedem, & vocatur vena cava.
Altera vero sursum tendit per venas dextras, ac pulmonem. Finditur autem &
in cor, & in brachium dextrum. Reliqui vero sursum feruntur per claviculam in
dextram cervicis partem, ad ipsam cutem, ut conspicua fiat. Juxta autem vero oc-
cultatur. Atque hic finditur, & crassissima quidem, ac maxima, & cavissima ipsi-
us pars in cerebrum definit, alia vero pars in aurem dextram, quæ sane vena
tenuis est, alia autem in oculum dextrum, alia in ipsum nasum. Atque sic qui-
dem venæ ab hepate habent. Tendit autem & a liene vena in sinistra sursum, ac
deorsum, velut ab hepate, verum tenuior, & imbecillior. Cæterum in has venas
etiam spiritus copiam inducimus. Hæ enim corporis nostri respiraciones sunt,
aerem in se ipsas trahentes, & in reliquum corpus, ac venulas derivantes, refrige-

- ranque, ac rursus dimittunt. Non enim possibile est spiritum stare, sed procedit
 130 sursum, ac deorsum. Si enim alicubi constiterit, ac interceptus fuerit, impotens
 redditur illa pars, ubi constiterit. Cuius rei signum hoc est. Quum enim desi-
 deranti, aut decumbenti venaule compressæ fuerint, ut spiritus a vena non discur-
 rat, statim torpor occupat. Et de venis quidem reliquis sic habet. * At vero mor-
 bus ipse fit in pituitosis; in biliosis vero non. Incipit autem fieri in fortu adhuc
 135 in utero existente. Purgatur enim, & florescit cerebrum, velut etiam aliæ par-
 tes prius, quam gignantur. In hac autem purgatione, si quidem probe, ac mode-
 rate purgatum fuerit, & neque plus, neque minus, quam oportet, defluerit, hic foetus
 sanissimum caput habebit. Si autem amplior colligatio a toto cerebro facta
 fuerit, morbosum caput augetur, foetus habebit, & sonitu plenum, & neque
 140 solem, neque frigus tolerabit. Si vero ab una aliqua parte colligatio contigerit,
 aut ab oculo, aut ab aure, aut vena aliqua simul gracilis facta fuerit, ille sic afficitur,
 qualiter sane colligatio contigerit. Si vero purgatio non contingat, sed in ce-
 rebro spissetur, ac cogatur, sic necesse est fortis pituitosus esse. Et quibuscum-
 que quidem, pueris existentibus, erumpunt ulcera in caput, & in aures, ac in
 145 reliquum corpus, & qui salivosi sunt, ac mucosi, hi ipsi progressu ætatis facillime
 degunt; hic enim abicit, ac purgatur pituita, quam in utero purgari oportebat,
 & qui sic purgati fuerint, comitiales, sive sacro morbo fere non apprehen-
 duntur. Qui vero mundi sunt, & neque ulcus ullum, neque muco, neque saliva ul-
 la prodit, neque in uteris purgationem fecerunt, talibus periculum imminet, ut ab
 150 hoc morbo corripiantur. Si porro ad cor progressum fecerit defluxus, tre-
 mor apprehendit, & anhelationes, & pectora corrumpuntur; aliqui vero etiam in-
 curvi fiunt. Quum enim descenderit pituita frigida ad pulmonem, aut ad cor,
 perfrigeratur sanguis. Venæ autem violenter perfrigeratæ, ad pulmonem, & cor
 assiliunt, & cor tremore concutitur, ut præ hac necessitate anhelationes incidant,
 155 & spiratio percipere erecta. Non enim spiritum suscipere potest, donec id, quod
 influxit, a sanguine superatum, & calefactum in venas fuerit diffusum. Deinde
 & tremor, & anhelatio sedatur; sedatur autem, prout copia eius fuerit. Si enim
 amplius influxerit, tardius; si minus, citius. Et si quidem densiores, ac crebri-
 ores fuerint defluxus, crebrius comitiali morbo corripitur, si minus, rarius.
 160 Hæc itaque perpetitur homo, si ad pulmonem, ac cor fluxus processerit. Si ve-
 ro in ventrem, profluvia alvi apprehendunt. Si vero ab his viis exclusus fuerit,
 & in venas, quas dixi, defluxum fecerit, mutus fit, & suffocatur, & spuma ex ore
 effluit, & dentes constringuntur, & manus convelluntur, & oculi distorquentur,
 & nihil sapiunt, aliquibus etiam sterces inferne secedit. Atque hæc sunt aliquan-
 165 do in sinistra, aliquando in dextra, aliquando utrinque. * Quomodo vero singula
 hæc perpetiatur, ego nartabo. Mutus quidem est, quum pituita dereptre in ve-
 nas delapsa, aerem excludit, & non admiserit neque in cerebrum, neque in venas ca-
 vas, neque in ventriculos, sed occupat inspirationem. Quum enim accipit homo
 per os, & nares spiritum, primum quidem ad cerebrum venit, deinde vero in ventri-
 170 culum magna ex parte, pars etiam ad pulmonem, & pars ad venas. Ex his ve-
 ro ad reliquas partes in venas dispergitur, & quantum quidem eius ad ventri-
 culum venit, perfrigerat, & nihil aliud confert. Idem præstat, & quod ad pul-
 monem venit. Qui vero ad venas pervenit aer, confert ad ventriculos ingressus,
 & ad cerebrum. Atque sic sapientiam, & motum membri exhibet. Quare ubi fue-
 175 rit exclusus a venis aer præ pituita, eumque non susceperint, mutum, ac desipien-
 tem hominem reddunt. At vero manus impotentes fiunt, ac convelluntur, san-
 guine quiescente, & dum non diffunditur, velut solebat. Oculi quoque distor-
 quentur, aut a venis excluso, & commoventur. Spuma vero ex ore prodit, ex pul-
 mone. Quum enim spiritus non ingrediatur in ipsum, spumescit, & ebullit, velut
 180 moriens. Stercus vero subit, dum violenter suffocatur. Suffocatur autem
 hepate, & ventre sursum ad septum transversum irrudentibus, & stomacho ventris
 concluso. Irruunt autem, quum tantum spiritus in os non ingreditur, quantum so-
 lebat. Calcitrat autem pedibus, quum aer in membris conclusus fuerit, & foras
 penetrare non poterit præ pituita; venim exiliens per sanguinem sursum, ac deor-
 185 sum, convulsionem, ac dolorem inducit, & propterea sane calcitrat. Porro om-
 nia hæc perpetitur, quum pituita frigida defluerit in sanguinem calidum existen-
 tem. Perfrigerat enim, & sistit sanguinem. Et si quidem fluxus multus fuerit, ac
 crassus, statim occidit. Dominatur enim sanguini per frigus, ipsumque congelat.
 Si vero paucior fuerit, in præsens quidem dominatur, obturans respirationem.
 190 Deinde temporis progressu, quum dispersus fuerit per venas, & ammixtus san-
 guini multo existenti, ac calido, si sic superatus fuerit, venæ aerem suscipiunt, at-
 que ita ægri resipiscunt. * Et quicumque quidem pueri parvi hoc morbo corri-
 piuntur, ut plurimum moriuntur, si multus fluxus contingat, isque humidus exi-
 stat. Venæ enim tenues existentes pituitam præ crassitudine, ac multitudine susci-
 195 pere non possunt, sed perfrigeratur, ac congelatur sanguis, & sic moriuntur.
 Si vero modica existens pituita in utraque venas defluxum fecerit, aut in alteri-
 us partis, supervivunt, nota ex morbo impressa relicta; aut enim os convellitur,
 aut ocu-

- ant oculus, aut cervix, aut manus, ubicumque sane vena pituita repleta superata fuerit, & gracilis reddita. Hanc itaque venam necesse est debiliorem esse, & hanc corporis partem laesam defectuosiore. Verum ad longius tempus plerumque prodest. 100
- Non enim amplius morbo apprehenditur, si semel notam impressionem suscepit. Quapropter necessario etiam reliquæ venæ assignantur, ac partim simul gralescunt, ut aerem quidem suscipiant; pituitæ autem defluxus non amplius similiter illabatur. Debiliora tamen similiter membra esse verisimile est venis afflicta. 101
- * Quibuscumque autem imperfectis, & valde modica pituita defluerit, & ea in dexteris partes, hi citra notæ impressionem supervivunt, verum periculum est, ne morbus connutritur, ac simul augeat, si non his, quæ commoda sunt, curentur. Pueris quidem igitur sic fit hic morbus, aut quam proxime huic modo. Seniores vero non occidit, si accedat, neque distorquet. Nam & venæ sunt cavæ, & sanguine calido refertæ, quapropter neque superare potest pituita, neque perfrigerare sanguinem, ut congelet ipsum, sed ipsa superatur, ac sanguini cito ammiscetur, atque sic venæ aerem suscipiunt, & sapientia contingit, signaque prædicta minus invadunt propter fortitudinem. At vero antiquissimis, si hic morbus accedat, propterea ipsos occidit, aut leviter sideratos facit, quia venæ ipsi sunt evacuatæ, & sanguis modicus est, ac tenuis, & aquosus. Si igitur multum defluerit, & hyemis tempus fuerit, occidit. Suffocat enim respirationes, & sanguinem congelat, si in utramque partem defluxus fiat. Si veto in alteram tantum, leviter sideratum facit. Non enim potest sanguis pituitam superare, quin tenuis sit, frigidusque, ac modicus, sed ipse superatus congelatur, ut impotentes fiant illæ partes, juxta quas sanguis fuerit corruptus. Ad dexteram autem magis defluit, quam ad sinistras, quia venæ sunt caviores, & plures, quam in sinistris. Ab hepate enim tendunt, & liene. 102
- * Defluit autem, & eliquatur pueris maxime, quibus sane caput fuerit percalefactum, sive a sole, sive ab igne, sive etiam deterente inhoruerit cerebrum, etiam tunc pituita seceretur. Eliquatur etenim per calorem, ac cerebri diffusionem: segregatur autem a frigore, ac concretionem, & sic defluit. Et quibusdam quidem defluxionis causa hæc est. Aliis vero etiam, ubi repente post aquiliones ventos auster flare coeperit, compactum, ac debile cerebrum deterente solvit, ac laxat, ut pituita redundet, & sic defluxum facit. Defluit insuper & ex ignoto timore, si quidem timuerint aut aliquo vociferante, aut inter plorandum spiritum cito revocare non potuerint, id quod pueris frequenter contingere solet. 103
- Quicquid sane horum ipsorum acciderit, statim horret corpus, & æget mutus factus, spiritum non trahit, sed spiritus quiescit, & cerebrum compingitur, & sanguis consistit, & sic seceretur, ac defluit pituita. Et pueris quidem hæc ipse causa sunt, ut ab initio a sacro morbo corripiantur. 104
- * At vero senibus hyems insectissima est. Quum enim ad multum ignem senex caput & cerebrum percallescit, deinde in frigore versatus fuerit, ac inhorruerit, & ex frigore ad teporem accesserit, & ad ignem descenderit, idem hoc patitur, ac sic a morbo sacro apprehenditur juxta prædictum modum. Periculum vero multum est, ut & vere partiantur idem hoc, si caput fuerit insolatum. Minime autem æstate, non enim fiunt repente mutationes. 105
- * Postquam vero viginæ anni præterierint, non amplius hic morbus corripit, præterquam paucos, aut nullum, nisi ex puero connutritus fuerit. Venæ enim plenæ sunt, & cerebrum compactum est, & acerbum, ac rigidum, quare non defluit in venas; si vero defluerit, sanguinem non superat multum, ac calidum existentem. In quo vero a puero augmentum cepit, ac connutritus est, in eo per consuetudinem facit, ut in mutationibus ventorum patiatur, & ut plurimum morbo sacro corripitur, præcipue australi, ac humida aeris constitutione. Et liberatio difficulter contingit. Cerebrum enim humidius, quam ex natura fit, & præ pituita inundat, ut defluxiones quidem frequentiores fiant, non autem amplius possibile sit pituitam excerni, neque cerebrum resicari, sed perrigatur, & humidum existit. Cognoverit autem hoc ipsum quæ maxime ex ovibus hoc morbo correptis, & præsertim capris. Hæ enim frequentissime corripuntur. Si enim caput ipsarum dissecueris, reperies cerebrum humidum esse, & sudore refertum, ac male olens. Et in hoc nimium cognosces, quod non Deus corpus affligit, sed morbus. Sic vero se res habet etiam in homine. Quum enim ætatem ad eprus fuerit morbus, non amplius curabilis est; cerebrum enim eroditur a pituita, ac colliquatur. Id vero, quod colliquatur, aqua fit, & foris cerebrum ambat, ac circumalluit, & propterea frequentius, ac facilius a morbo hoc corripuntur. Propterea vero diuturnus est morbus, quia id, quod insitit venis, tenue est præ multitudine, & statim superatur a sanguine, ac calefit. 106
- * Quicumque vero jam afflicti sunt morbo, præcognoscunt se corripiendos, & ex hominum frequentia fiunt, si domus ipsorum in propinquo fuerit ad domum: sin minus, in locum desolatissimum, ubi quam paucissimi ipsos lapsos visuri, statimque se obvelant, idque faciunt præ pudore affectionis, non præ timore, velut multi putant, demonii. At vero pueri primum quidem cadunt, ubicumque tandem congerit præ inassuetudine. Quum autem sæpius a morbo corripiantur, postquam præsenferint, confluunt ad matres, aut ad alium maxime notum, præ timore, ac formidine affectionis, verecundari enim pueri nondum sciunt. 107
- * Cæterum in rationibus ventorum propterea morbo sacro corripit censeo, maxime quidem austrinis;

- postea vero etiam aquilonaribus, deinde etiam reliquis ventis; hi autem sunt, qui fortissimi ex ipsis existunt, & inter se tum statione, tum viribus contrarissimi. Etenim aquilo compingit aerem, & turbatum, ac nubilosum excernit, & illustriorem, ac pellucidum facit. Eodem modo etiam alii omnes venti ex mari, ac aliis aquis proficiscentes. Ex omnibus enim rebus, atque adeo ex ipsis hominibus humiditatem, ac tenebrositatem excernunt. Quapropter saluberrimus omnium ventorum aquilo existit. Auster autem contraria huius operatur; primum enim incipit aerem compactum liquare, ac diffundere, quapropter etiam non statim magnus spirat, sed primum lenius, ac lenis est, quoniam aerem statim superare non potest, qui prius densus est, & compactus, sed temporis progressu ipsum dissolvit. Idem porro hoc etiam in terram operatur, & in mare, fluvioque, ac fontes, & puteos, & quae ex terra nascuntur, & in quibus humor inest. Est autem in omni, in aliopius, in alio minus. Omnia autem haec ventum hunc sentiunt, & ex splendidis tenebrosa fiunt, & ex frigidis calida, & ex siccis humida. Et quaecumque in domibus vasa juxta terram sunt cum vino, aut alio quopiam liquore, ea omnia autem sentiunt, & formam in aliam speciem transmutant. Solem vero, & lanam, ac sidera multo hebetiora, quam ex natura sunt, reddit. Quum igitur etiam his, quae adeo magna sunt, ac fortia, intrantum dominetur, & corpus sentire faciat, ut ex horum ventorum alterationibus transmutetur, necesse est ab austeris quidem solvi, ac humectari cerebrum, & venas laxiores reddi; ab aquilonis vero statibus, quod lassissimum est in cerebro compingi, quod vero morbosissimum, ac humidissimum est excerni, & fortissecus circumalueri, atque sic defusus in horum ventorum mutationibus succedere. Hoc modo hic morbus fit, & floret tum ab accedentibus, tum a decedentibus, & nullatenus difficilior aut cogniti, aut curati est, quam alii, neque etiam divior aliis.
- Porro expedit homines nosse, quod ex nulla alia nobis parte volupitates contingunt, & letitiae, & risus, & lusus, quam ex cerebro. Itemque moerores, & anxietates, tristitiaeque, ac ejularis, & querelae. Et hoc sapimus maxime, ac intelligimus, & videmus, & audimus, & cognoscimus turpia, & honesta, mala, & bona, iocunda, & iniucunda, partim consuetudine discerentes, partim utilitate percipientes. Eodem volupitates, & iniucunditates pro opportunitate dinoscimus, & non eadem nobis placent. Eodem & infanimus, & deliramus, & terrores, & timores nobis accedunt partim noctu, partim inretdis, & insomniis, & errores intempestivi, & curae inanes, & ut non noscimus adstantes, & defunctio, & inesperienza. Atque haec omnia perpetimur a cerebro, quum sanum non fuerit, sed aut calidius, quam ex natura fiat, aut frigidius, aut humidius, aut siccus, aut aliud quid perpetiatur praeter naturam, & consuetudinem. Et infanimus quidem praeter humiditatem. Quum enim humidius fuerit, quod pro natura, necesse est moveri; ubi vero movetur affectio, necesse est neque visum quiescere, neque auditum, sed alias aliud videre, & audire, & linguam talia dicere, qualia semper, ac singulis vicibus viderit, ac audierit. Quanto vero tempore cerebrum quieverit, tanto etiam homo sapit. Fit autem corruptio cerebri a pituita, & bile. Utriusque cognitio sic contingit. Qui enim a pituita infanunt, quieti sunt, & non vociferantur, neque tumultuantur. Qui vero a bile, vociferatores sunt, & malefici, & non quieti, semper aliquid intempestivum facientes. Si quidem igitur assidue infanunt, haec ipsis sunt causae. Si vero terrores, & timores accedant, a cerebri transmutatione id contingit; transmutatur autem, dum calefcit; calefcit autem praeter bile, ubi ad cerebrum impetum fecerit, ex corpore per venas haemorrhoidales, hoc est sanguinarias appellatas, & timor restat, donec rursus redierit in venas, ac corpus, deinde quiescit. Angitur autem homo, & inquietudine multa jactatur intempestive, dum cerebrum perfrigeratur, & praeter consuetudinem compingitur. Hoc veto a pituita perpetitur; ab hac autem affectione etiam obliviosus evadit. Non autem vero clamat, & vociferatur, quum de repente cerebrum percalefcit, hoc autem perpetiuntur biliosi; pituitosi enim non percalefcunt, quum sanguis multus ad cerebrum pervenerit, & effluerit; venit autem per venas praedictas. Quum contigerit, ut homo videat insomnium horrendum, & intimore fuerit, velut etiam si vigilet, tunc magis facies ignescit, & oculi rubescunt, quum timuerit, & mens meditatutur aliquid mali operari, sic etiam in somno patitur. Ubi vero expergetus fuerit, & resipuerit, atque sanguis rursus in venas praedictas dispersus fuerit, quiescit.
- Propterea iudico cerebrum vim plurimam in homine habere. Hoc enim est nobis eorum, quae ab aere sunt, interpretes, si sanum fuerit. Sapientiam autem ipsi exhibet aer, Oculi vero, & aures, & lingua, & manus, & pedes, qualia cerebrum statuit, ac cognoscit, talia subministrant. Sapientia enim toti corpori contingit, prout aere participat. Ad intelligentiam vero intermincuius est cerebrum. Quum enim homo spiritum in se ipsum attraxerit, primum quidem ad cerebrum pervenit, & sic ad reliquum corpus aer dispergitur, relinquens in cerebro suum ipsius vigorem, & quicquid prudens, ac sapientia praedictum fuerit. Si enim in corpus primum perveniret, & posterius in cerebrum, relicta in carnibus, ac venis dinorione, ac iudicio, ad cerebrum calidius iam existens perveniret, & non sincerus, ac purus, sed amixto humore a carnibus, & sanguine, ut non amplius exacte sincerus esset. Quapropter dico cerebrum intelligentiae, ac prudentiae intermincuius, ac interpretem esse. Ceterum praecordia alias fortium nomen apud graecos per consuetudinem habent, quum phrenes a sapientia dicta videantur; reuera autem

non, neque ex natura. Neque ego sane novi, quam vim habeant præcordia, ut sapiant, & intelligant, præterquam si homo ex improvviso nimio gaudio perfundatur, aut tristitia afficiatur, tunc sane exiliunt, & anxietatem exhibent præ tenuitate, & quod distenta sunt maxime in corpore, & ventriculum non habent, ad quem suscipiant, aut bonum, aut malum allabens, sed ab utrisque his turbantur propter naturæ debilitatem. Nam nullo sane prius sentiunt ex his, quæ in corpore insunt, sed frustra hoc nomen, & causam habent. Quemadmodum quæ ad cor litæ sunt, aures appellantur, quum nihil conferant ad auditum. Porro dicunt quidam, quod corde sapimus, & quod hoc est, quod angitur, & quod curam gerit. Verum hoc non ita se habet, sed convellitur quidem velut præcordia, & magis etiam propter easdem causas. Ex omni enim corpore venæ ad ipsum tendunt, & conclusiones habet, ut sentiat, si quis dolor, aut collectio homini contingat. Necessæ est enim, & dum angitur, inhorrere corpus, ac distendi, & si quis nimio gaudio perfundatur, idem pati. Quapropter cor quidem, & præcordia maxime sentiunt, sapientia tamen minime participant, sed omnium horum cerebrum causa est. Quemadmodum igitur etiam prudentiam, ac aerem omnium primum ex his, quæ in corpore insunt, percipit cerebrum, sic etiam si qua mutatio fortior in aere contingat præ temporibus anni, etiam ipsum a se ipso diversum redditur in aere. Etenim cerebrum propterea primum sentit, quia etiam morbi in ipsum irruunt acutissimi, & maximi, ac præcipue lethales, & qui difficillem iudicationem habent apud inexpertos. Hic vero morbus sacer appellatus ex iisdem causis oritur, a quibus etiam reliqui, ab accedentibus nimirum, ac decedentibus, velut frigore, sole, ventis, quæ & transmutantur, & nunquam quiescunt. Hæc autem sunt divina. Quare nequaquam hunc morbum ab aliis discrimina-re oportet, neque reliquis morbis diviniorem putare, sed omnes divinos, & omnesque humanos. Naturam autem unusquisque habet, & vim in se ipso, & nullus nec auxilii, nec remedii expertus est, & perique his ipsis curantur, a quibus etiam nascuntur. Alterum enim alterius nutrimentum est; alterius vero perniciem, ac afflictio. Hoc itaque Medicum nosse oportet, & temporis occasionem in singulis pernosce-re, quod alterum quidem per alimentum absolvet, & angebit, alterum vero detra-het, & minuet. Oportet autem tum in hoc morbo, tum in reliquis omnibus non au-gere morbos, sed festinare, ut ipsos exteramus, id, quod adversissimum est morbo, exhibendo, non quod amicum, & familiare. A familiari enim, & consuetu floret, ac augetur; ab adverso vero, & hostili perit, & dissipatur. Quisquis autem talem mutationem in hominibus novit, & humidum, ac siccum facere potest hominem, calidum item, ac frigidum per diætam, hic utique, & hunc morbum sanaverit, si oc-casionem eorum, quæ conferunt, pernoscat citra expiamenta, ac incantationes, citra-que omnem aliam huiusmodi machinationum absurditatem.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS LIBER I.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 De his, quæ Medicum in sanatione animad-vertere deet.
- 2 Unde morbi omnes hominibus fiant, & qui longi sint, aut breves.
- 3 Qui ex vulneribus claudi fiant. Quæ vulne-ri mortalia. Morbi qui lethales, qui du-bii, qui non lethales. Teneamus quid. Siderati ab atra bile. Claudii a contradi-cum morbo. Oculi, & auditus unde mu-tantur. Morbi longi, & morbi breves. A quibus morbis ad quales transitus fiat. Quando, & in quibus morbis mala fiant, & quid temporum occasio. Rigori ardor igneus supervenit. Nervus diffectio convul-sionem facit. Cerebrum convulsus qua symptomata consequantur. Cerebrum san-ctatum qua symptomata comitentur. O-mentum clapsus puris. Sanguis e ven-a, aut vulneribus in superum ventricu-lum fluxio.
- 4 Trimmerum occasiones multa. Occasiones qua repentine. Occasio Occasionem ferre in omni-

- bus aliis esse morbis. Quibus morbis, aut vul-neribus auxilia a medico adhibita non pro-sint. Intemperitias in curandis morbis quid.
- 5 De his, quæ recte a medico circa sententiam, & chirurgiam sunt. Circa chirurgiam quæ recte fiant. Quæ circa ea, quæ egrotis offerantur, sint observanda.
- 6 Casu, ac sponte in morbis contingentia.
- 7 Quæ medici per fortuitum successum in cura-tione boni, aut mala faciant. Mala supra mala in morbis, aut vulneribus contingen-tia, medico, non necessitati imputantur. Quæ parvi diffilia non coalescant.
- 8 Artis universa sanandi morbos principium nullum esse.
- 9 Artis facilitas, & promptitudo, in quibus consistant.
- 10 De Suppuratorum signis. Pulmonis suppara-tio ex peripneumonia. Pulmonis supparatio ex pueria de capite destillante. Pulmonis supparatio a vena rupta. Qui ex hoc morbo superstiti maneat, & qui non. Pulmonis supparatio ex acuto vena pulmonis tractu.

cito, aut recte, aut non recte. Et quod malum supra malum fieri necesse est. Hac animo versantem, observare oportet in sermonibus, quantum quis ab his delinquat aut in dicendo, aut percunctando, aut respondendo. Et an quæ multa sunt, pauca dicat, & an quæ impossibilia sunt, possibilia esse affectat. Et quicquid sane etiam aliud dixerit, ac aberrarit, hac ratione observare oportet, & in contradic-
 2 ne aggredi, & impetere. * Morbi quidem igitur universi sunt ex his quidem, quæ in corpore insunt tum a bile, tum a pituita. Ab externis vero, a laboribus, & vulneribus. Sed & a calido, & supercalefaciente, & a frigido, ac superrefrigesciente, & sicco, ac superrefrigescante, & ab humido, ac superhumectante. Et bilis quidem, ac pituita una cum nascentibus gignuntur, & sunt in corpore aut plus, aut minus.
 3 Morbos autem exhibent partim a cibis, & potibus, partim a calido supercalefaciente, & a frigido superrefrigesciente. * Necessitatem autem alia habent, ut fiant hæc, quum ipsa sunt, velut verbi causa. In vulneribus eos, qui crassos nervos fauciatos habent, necesse est claudos fieri. Itemque si musculorum capita fauciat sint, præsertim eorum, qui sunt in femoribus. Moritur autem, si quis cerebro fauciat
 35 sinerit, aut spinali medulla, aut hepate, aut præcordiis, sive septo transverso, aut vesica, aut vena sanguinea, aut corde. Non moritur autem vulneratus in his partibus, in quibus hæc membra non insunt, sed ab his longissime absumt. Ex morbis vero tales necessitatem habent, ut ab ipsis perimantur, quum fiant. Tabes, Aqua inter cutem, ac subest cutem nascens, & si mulierem sætum in utero
 40 habentem, peripneumonia, id est pulmonis inflammatio corripiat, aut febris ardens, aut pleuritis, sive lateris inflammatio, aut phrenitis, id est membranarum cerebri inflammatio, aut Erysipelas, ignis facer appellatur, in utero fiat. Dubii autem morbi, ut & perdant, & non, tales sunt, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, pleuritis, angina, iuva, hepatitis, splenitis, nephritis, dysenteria, in mu-
 45 liere fluxus sanguinolentus. Tales vero non lethales sunt, nisi quid ipsis accedat. affectiones fluidæ circa articulos, atra bilis, podagra, coxendicum morbus, tenebris, qui est voluntas egerendi inevitabilis, quartana, tertiana, strangulatus urinae, lippitudo, lepra, impetigo, morbus articularis. Multi autem frequentes ab his mutati sunt, sidenturque manibus, ac pedibus, & lingux impotentes red-
 50 duntur. Et ab atra bile quidam leviter sidentur. Claudii vero a coxendicum morbo sunt. Oculi autem, & auditus mutilantur a pituita obfirmata. Longos autem necesse est esse tabem, dysenteriam, podagram, affectiones fluidas circa articulos, pituitam albam, coxendicum morbum, urinae strangulatum, in senio-
 55 ribus vero nephriticum. Mulieribus vero fluxum sanguinolentum, hæmorrhoidas ani, fistulas. At vero febris ardens, phrenitis, peripneumonia, angina, iuva, pleuritis cito decedunt. Transitus autem fit in his, ex pleuritide in febrem ardentem, ex phrenitide in peripneumoniam. Verum ex peripneumonia febris ardens non fit, ad dysenteriam tamen accedit, & a dysenteria, henteria, sive le-
 60 vitas intestinorum sequitur: ex henteria in aquam inter cutem transit fit, & ex pituita alba in aquam inter cutem, & ex peripneumonia, ac pleuritide, in pectoris suppurationem. Mala porro supra mala fieri necesse est, velut si rigor corripuerit, ardor igneus supervenit. Et si nervus dissecus fuerit, convulsionem facit, & ut dissecus neque coalescat, & fortiter inflammetur. Et si cerebrum concussum fuerit, ac doluerit eius, qui percussus sit, necesse est & vestigium mutum fieri, & neque videre, neque audire. Si vero fauciatum fuerit, febrem necesse est supervenire, & bilis vomitum, & aliquam corporis partem sidentam fieri, ac perire. Si
 65 vero omentum exciderit, necesse est putrefieri. Et si sanguis ex vulnere, aut vena effluerit in supinum ventriculum, necesse est, ipsum in pus converti. * Tempo-
 70 rum autem occasiones, ut in summa dicam, multæ sunt, & variz in arte, quoniam admodum etiam morbi, & affectiones, & horum curationes. Maxime vero repentinae sunt in his, quibus animo defectus opitulari oportet, & qui neque urinam, neque sterces egerere possint, & qui suffocantur, & si mulierem parientem, aut fauciatam liberare oportet, & quicumque eiusmodi. Et hæc quidem occasiones repentinæ sunt, & paulo posterius non sufficiunt. Plerique enim paulo posterius pereunt. Occasio vero est, si horum aliquid perpetiatur homo, & quis, antequam animam esset, opituletur, hoc totum ex occasione opitulatur. Est quidem igitur
 80 animæ hæc occasio etiam in omnibus aliis morbis. Semper enim in quocumque sane quis opinitur tempore, ex occasione opitulatur. Quicumque vero morbi, aut vulnera non ad mortem tendunt, sed temporarii sunt, ac periculosi, doloresque in ipsis sunt, verum possibile est, ut cessent, si quis recte medeatur, his sane non prosunt auxilia a medico adhibita, quum adhibeantur. Nam & non præsentem medico utique cessassent. Alii vero morbi sunt, quibus occasio est, ut curentur matutina diei hora, nihil autem refert, an valde mane, aut paulo posterius. Alii morbi sunt, quibus occasio est, ut semel in die curentur, nec refert, quo tem-
 85 pore id fiat. Alii per tertium, aut quartum diem curantur, & alii semel per mensem, & alii per tertium mensem, nec refert, an id ipsum tertio augmento, vel fine fiat. Tales itaque occasiones sunt, in quibus non aliam, quam hanc certitudinem habent, Intempestivitas autem hæc est, si quæ mane curari oportebat, in meri-
 die cu-

- 90 die curentur. Propterea vero intempestive curantur, quia inclinationem ad pejus habent propter curationem non in tempore factam. Quicumque etiam citius sive in meridie, sive vespere, sive noctu curentur, intempestive curantur: & si vere curari oporteat, curentur autem hyeme; aut si hyeme oporteat, curentur autem aestate; aut si quod jam curari oportet, id ipsum differatur; aut quod differre oportet, id ipsum jam curetur; talia omnia intempestive curantur. * Recte porro, & non recte in ipsa hæc sunt. Non recte quidem sit, si morbum alium existentem, alium esse pronuncies, & magnum existentem, parvum dicas, & vicissim parvum, magnum, & si supervicturum, non supervicturum pronuncies, & perituum non perituum. Et si suppuratum existentem non cognoscas, nec morbum magnum in corpore nutriris cognoscas, & si medicamento; aut porione quis opus habeat, quo ipsi opus sit, non cognoscas; & si quæ sanari possunt, non sanes, & quæ sanatu impossibilia sunt, te sanaturum recipias. Atque hæc quidem circa sententiam non recte sunt. Circa chirurgiam vero hæc. Pus in ulcere, aut tuberculo existens non cognoscere; & fracturas, ac luxationes non cognoscere; & specillo admoto ad caput non cognoscere, an os fractum sit, & fistulam in vesicam immisissam demittere non posse; & lapidem in vesica existentem non cognoscere; & suppuratum existentem ex concussione non dinoscere; & secando, aut urendo, aut a profunditate, aut a longitudine aberrare; aut urere, & secare, quæ non oportet. Et hæc quidem non recte. Recte autem sunt hæc. Morbos cognoscere qui sint, & a quibus, & qui ipsorum longi, & breves, & lethales, & non lethales, & qui transmutantur, & qui augescunt, & qui minuantur, & qui magni, quique parvi, & dum curas possibiles quidem, curare; impossibiles vero, scire curatui sunt impossibiles, & dum curas eos, qui tales habent, per curationem quantum possibile est, opitulari. Quæ vero offeruntur ægrotis, ea sic observare oportet recte ne, an fecus fiant, veluti si quis, quæ siccare oportet, humectet; aut si crassescere oporteat, non exhibeat, a quibus crassitudo inducitur; aut si quæ attenuare oportet, non attenuet, quæ frigefacere, non frigefaciat; quæ calfacere, non calfaciat; quæ putrefacere, non putrefaciat; & reliqua juxta eandem rationem. * Talia autem sua sponte, ac casu hominibus in morbis sunt tum bona, tum mala. Febrienti, ac bilioso, in tempore foras dispersa bilis, bonum; diffusa vero, ac dispersa sub cutem, toleratui levior est habenti, & curatui facilior sananti; diffusa autem, ac dispersa, & ad unam aliquam corporis partem allapsa, malum. Alvus turbata in pleuritico, aut peripneumonico, aut suppurato, malum. Febrienti, aut vulnerato alvus resiccata, malum. Subaqueoso, ac lienoso ab alba pituita detento, alvus fortiter turbata, bonum. Erysipelas, si extra diffusum intro vertatur, malum. Si vero intra diffusum foras vertatur, bonum. A profluvio alvi forti correpto, vomitus superveniens, bonum. Mulieri sanguinem vomenti menses erumpere, bonum. A fluxione vero infestata ad nares, aut os fluxionem transire, bonum. Mulieri a convulsione pressæ ex partu, febrem supervenire, bonum. Et tetano, ac convulsione occupante, igneum ardorem supervenire, bonum. Talia enim per nullam medicorum ignorantiam, aut scientiam sunt, & non sunt, sed sua sponte, ac fortuito casu fiunt, & profunt, & nocent juxta eandem rationem. * Ceterum medici talia per fortuitum successum bona in curatione faciunt. Nimirum si medicamento sursum purgante dato, & sursum, & deorsum probe purgant. Et si mulieri medicamento dato, quod bilem, aut pituitam deorsum purgat, menses alias non fluentes erumpant. Et si lienem suppuratum habenti medicamentum dederint, quod bilem, ac pituitam deorsum purget, & sic pus deorsum a liene expurgent, & a morbo liberent. Et si medicamento exhibitio calenoso, calculum in urinarium meatum præ pharmaci violentia proegrediant, ut per urinam ejiciatur. Et si medicamentum dederint, quod pituitam sursum purgat ei, qui pus in superiore ventriculo, in tuberculo habent, non scientes, quod habet, isque pus vomat, ac sanus fiat. Et si eum, qui ex medicamento sursum purgante superpurgetur, sua sponte alvo subter erumpente, a vomitu sanum faciant. At vero mala operantur medici præ infortunio hæc. Si pharmaco bilis, aut pituitæ sursum ductivo dato, venam in pectore præ vomitu rumpunt ei, qui prius nullum manifestum dolorem in pectore habuit, atque sic fiat morbus. Et si mulieri in utero habenti medicamentum superne purgans exhibeant, alvus autem inferne erumpens, sætem expellat. Et qui suppuratum curat, si alvus proflua fiat, ipsum perdit, & qui oculos curat, ac sublinat, si dolores incidant acutiores; & si ira contingat, rumpantur oculi, & destruantur, accusant medicum, quod oculos sublevit. Et si puerperæ in ventris dolore medicus aliquid det, & male habeat, aut pereat, medicus in culpa est. Ferme autem quæcumque necessitatem habent, ut fiant in morbis, ac vulneribus, mala supra mala, ea ubi sunt, in medicum culpam rejiciunt, & necessitatem talia fieri cogentem, non agnoscunt. Et si ad febricitantem, aut vulnus habentem ingressus, admotis quamprimum remediis non opituletur, sed postea die æger pejor habeat, medicum accusant. Si vero opituletur, non aequaliter laudant. Oportere enim ipsum perpeti putant, ulceraque inflammari, & in morbis quibusdam dolores fieri oportere, neque tales esse, ut ne fiant. Ner-

- Nervus præcisus, ac dissectus non coalescit, neque vesica, neque aliquod ex tenuibus intestinis, neque vena sanguinea, neque totius genæ pars, neque pendens pelliscula. * Porro principium sanationis demonstratum quidem non est, quod sane recte principium sit universæ artis, neque secundum aliquod, neque medium, neque finis. Sed incipimus ab ea aliquando dicentes, aliquando operantes, & definitius eodem modo. Et neque dicentes ex iisdem sermonibus incipimus, neque si de iisdem dicamus, neque in iisdem definimus, & operantes juxta eandem rationem, neque ex iisdem operibus incipimus, neque in iisdem definimus. * At vero facillimas, ac promptitudinem in his est. Quum quis secans, aut urens, neque nervum secet, neque venam. Et si suppuratum urat, pus consequatur. Et si secet, eodem modo, Et fracturas recte componere. Et si qua pars corporis ex natura excidat, ut ipsam recte ad naturam retrudat. Item apprehendere fortiter ea, quæ oportet, & apprehendere premere. Et apprehendere leniter ea, quæ oportet, & apprehendendo non premere. Et in obligando tortuosa non facere ex rectis, neque premere, quæ non oportet. Et in contactu ubicumque tandem congerit, dolorem ex superfluo non exhibere. Hæc quidem igitur facilitatis, ac promptitudinis existunt. At vero digitis decenter attingere, aut probe, aut non probe, aut longis, aut brevibus, aut probe deligare omnes deligaturas, non ad artem pertinere iudicatur de facilitate, ac promptitudine, sed scorsim. * Quicumque suppurati sunt pulmone, aut superiore, vel inferiore ventre, aut tubercula habent live in superiore ventre, live inferiore, aut in pulmone, aut ulcera intrinsecus, aut sanguinem vomunt, aut spuunt, aut dolorem aliquem habent vel in pectore, vel in dorso, hæc omnia habent ex his quidem, quæ in corpore insunt a bile, & pituita, & ab externis vero ab aere infuso calori ammixto. Sed & a laboribus, ac vulneribus. Et quicumque quidem pulmone suppurati sunt, ab his sunt. Si peripneumonia corruptis in judicatoris diebus non purgetur, sed relinquitur in pulmone spiritum, ac pituita, suppuratus sit. Et si quidem statim curatus fuerit, ut plurimum effugit; si vero neglecta fuerint illa in pulmone, corrumpitur, illis & inhaerentibus, & putrescentibus, ulceraturque pulmo, & suppuratus sit, & non amplius intro ad se ipsum nutrimentum memorabile trahit, neque quicquam depurgatur ab eo sursum, sed suffocatur, & semper amplius difficulter spirat, & respirando sterit, & respirat illinc sursum ex pectore, tandem vero obcuratur a spuito, & moritur. Fit autem & suppuratus, si pituita ex capite ad pulmonem destillet, & primum quidem ut plurimum latenter defluit, tuncque tenuem exhibet, & spiritum paulo amarum solito, & aliquando tenuis adest calor. Temporis autem progressu exasperatur pulmo, & intus exulceratur a pituita inhaerente, ac putrescente, & gravitate exhibet pectori, & dolorem acutum ante, & retro, caloremque acutiores in corpus incident, & pulmo a calore trahit ad se pituitam ex toto corpore; & maxime ex capite. Caput vero calefactum ex corpore, & hanc putrescentem subcrassam spuit. Quanto vero magis tempus progreditur, tanto magis pus sincerum spuit, & febres acutiores sunt, & siccis frequens, ac fortis, & media vesar, & tandem alvus infestè turbatur. Turbatur autem a pituita, & pituita vero de capite descendit. Hic quum ad hoc pervenerit, perit, quemadmodum dictum est in superioribus, purulento, ac putrido pulmone facta, aut ventre infra erumpente. Fit præterea & ab his pulmo suppuratus, quum venula videlicet aliqua in ipso fuerit rupta; rumpitur autem a laboribus; & ubi rupta fuerit, sanguinem fundit, si quidem crassior fuerit, amplius; si tenuior, minus, & sanguinem quidem ipsum partim confestim spuit, partim vero, nisi vena adstringatur, in pulmone funditur, & in ipso putrescit, & ubi putrefactus fuerit, pus facit; progressu vero temporis aliquando pus sincerum, aliquando pus subcruentum, aliquando sanguinem, & si magis repleta fuerit vena, ipsam sanguinis copiam acervatim a se ipsa revomit, spuriusque pus crassum ab accossoria, & intus putrescente pituita. Hic si anticipetur, incipiente morbo, primum vena sanguinem fundat, ac fortiter laxetur, & priusquam attenuetur, & in lecto decumbat, & caput corrumpi incipiat, & reliquum corpus colliquari, superstes ab hoc morbo evadit. Si vero neglectus fuerit, & hæc occupaverit, ut ea perpetiatur aut omnia, aut plarima, perit; perit autem hic, aut ex iisdem, quæ superius dixi, aut a vomitu, sanguine multo multoties per vomitum rejecto. Si vero vena omnino quidem rupta non fuerit, verum acutus tractus in ipsa fiat; sit autem maxime, velut varix, qui etiam statim, ubi factus fuerit, dolorem quemdam tenuem inducit, ac tussim aridam. Si vero diu duraverit, & neglectus fuerit, primum quidem sanguinem medicum, ac subnigrum dimittit, ac rejicit, deinde vero adhuc copiosorem, & sincerissimum, deinde pus, paritque quacumque in superioribus dicta sunt. Conducit autem talibus, si ab initio curandos suscipias, ut & venæ de manibus sanguinem emittant, & dextra, a qua quamviscissimus, & exangustissimus fiat. Eodem porro modo etiam venæ in dextere afficiuntur, quæ intus in superficie sitæ sunt. Quum igitur affectæ fuerint, varicosæque factæ, & intus elevatae, & neglectæ fuerint, hæc perpetiuntur. Erumpunt & spuunt a se sanguinem, & aliquando etiam vomunt, & suppurati fiunt, & ut plurimum

- plurimum pereunt. Si vero curentur, incipiente morbo, rursus in loco venæ condunt ad latus, humileque sunt. Et pulmo ab his suppuratus redditur, & ab ipso etiam talia perpetuantur, & sic moriuntur. * Cæterum superiore ventre suppurati multipliciter sunt. Nam quum pituita de capite copiosa, & acervatim in superiorem ventrem fluxerit, putrescit, & in pus vertitur. Putrescit autem maxime in diebus viginti una. Hoc igitur pus concutitur, & intus succinat ad latera allabens. Hic si uratur, aut seceetur, primum duntaxat fiat pus, sanus plerumque evadit. Funt autem & superiore ventre suppurati ex pleuritide, quum sortis fuerit, & in iudicatoriis diebus neque putruit, neque sputo rejecta est, sed latus emicceratum fuerit a pituita affixa, & bile, & quum nlcus factum fuerit, reddit de se pus, & ex vicinis locis præ caliditate in se ipsum pituitam adducit, & hæc, ubi computruit, pus spuitur. Aliquando vero etiam ex venis sanguis in nlcus ingerit, & putrefactus pus fit. Hic, si e vestigio assumatur, sanus plerumque fit; si vero negligatur, perit. Funt præterea suppurati etiam, si pituita de capite delapsa, ad latus agglutinata fuerit, & putruerit. Tunc enim latus ut plurimum inflammatur, & patitur eadem, quæ ex pleuritide suppuratus. Funt & quum præ labore, aut exercitiis, aut alio quopiam modo vena ante, aut retro fuerit rupta, & sic rupta, ut non statim spuat sanguis, sed in carne acutus tractus, five varix fiat, & caro tracta, ac convulsa humiditatem modicam traxerit, & sublimata facta fuerit, & statim quidem sic affectus non percipit præ robore, ac bona habitudine; aut si etiam sentit, nihil molesti esse putat. Hic ubi deprehenderit, quum iam præ febris, aut poru, aut venere, aut aliqua alia re correptus, fuerit attentatus, caro sauciata subreficatur, & subcalescit, & humiditatem in se ipsam a vicinis tum venis, tum caribus trahit. Ubi autem attraxerit, intumescit, & inflammatur, & dolorem exhibet tenuem, & tussim raram, & siccam primum. Deinde adhuc magis trahit in se ipsam, & dolorem inducit vehementiorem, & tussim frequentiorem. Et primum quidem subpurulentum spuit. Aliquando vero lividum, & suberuentum. Et quanto magis tempus progreditur, amplius in se ipsam trahit, ac putrefacit, & de ipsa carne quantum ab initio lividum erat, hoc pus fit, & dolorem acutum exhibet, & febrem, & tussim multam, ac frequentem, & per sputum sincerum pus exiit. Si vero pus in ventre moram traxerit, totum corpus ab ipso calefit. Maxime vero vicinissimæ partes. Calefcente autem corpore, humiditas maxime eliquatur. Et quæ quidem a supernis partibus eliquatur, in supernum ventriculum maxime confluit, & pus fit, ad hoc quod iam in ipso est. Pars vero eius etiam in infernum ventriculum fluit, & quandoque alius ab ipsa turbatur, & hominem perimit. Nam cibi ingesti sedecunt incocti, & alimentum ab ipsis corpori non accedit. Et sputi sursum purgatio non æqualis contingit, alvo nimirum calefacta, & omnia deorsum trahente in se ipsam. Et a sputo quidem suffocatur, & sterit, cum non purgatur, a ventre vero fluente, debilitatur, & plerumque perimitur. In huiusmodi autem morbis hunc fluxum maxime exhibet caput, utpote quod cavum est, & superne situm. Quum enim ab alvo fuerit calefactum, tenuissimam pituitam de corpore in se ipsum trahit. Ubi vero hæc in ipso fuerit collecta, reddit rursus acervatam, & crassam, velut dictum est: & pars quidem ipsius in supernum ventriculum defluit; pars vero in infernum. Quum igitur caput fluxu incepterit, & reliquum corpus colligari non acrius equaliter, ne ulsi quidem superfluitates evadunt. Suprant enim supra pus influentia mala, ea quæ defluunt: & carnes liquefunt magis a malis, quam nutrantur ab ingestis. Qui vero huiusmodi morbos habent, partim ab his brevi pereunt, partim diutius tempus extrahunt. Differt enim corpus a corpore, & ætas ab ætate, & affectio ab affectione, & tempus a tempore, in quo ægrotatur: & aliqui maiorem tolerantiam in morbis habent, alii omnino ad tolerandum impotentes sunt. Proinde certitudo exacta temporis, in quo pereunt, non est, an longum, aut breve futurum sit. Neque enim hoc tempus certum est, quod quidam defluunt: & plerumque neque hoc ipsum suppurat. Differt enim & annus ab anno, & tempus a tempore. At si quis de ipsis recte cognoscere, ac dicere velit, is cognoscat, omni tempore & perire, & superfluitates evadere, & pati, quæcumque tandem patiantur. * Cæterum inferno ventriculo suppurati sunt, maxime quidem quum pituita, aut bilis acervata inter carnem, & cutem collecta fuerit. Funt autem & a convulsionibus, quum vena convulsa rupta fuerit, sanguis effusus putrescit, & suppuratur. Si vero caro convulsa fuerit, aut contusa, sanguinem ex venis sibi ipsis propinquis trahit, atque hic putrescit, ac suppuratur. His si quidem foras de se significationem præbuerit, & eruperit pus, sani sunt. Si vero sua sponte intro proruperit, pereunt. At vero diffusum pus in ventriculo inferno, veluti in superno dictum est, generari haudquaquam poterit, sed velut a me dictum est, in tunics, & in tuberculis innascitur. Et si quidem intro noras habuerit, cognitu difficile est. Neque enim ex conculsione cognoscere licet. Cognoscitur autem maxime ex dolore, ubi fuerit, & si terram sigulinam, aut aliud quid huiusmodi imposueris, brevi id resiccat.

S E C T I O I I.

- 13 * **E**rysipelas autem in pulmone fit, ubi pulmo fuerit nimium reficcatus, id quod
 1 couringit ab ardore, & a febris, & a labore, ac interperie. Et quum su-
 perreficcatus fuerit, plurimum sanguinis in se ipsum trahit, maxime quidem &
 plurimum ex magnis venis. Hæ enim ipsi vicinissimæ sunt, ac ipsi incumbunt.
 Trahit etiam ex aliis vicinis. Et tenuissimum, ac debilissimum trahit. Postquam
 autem traxit, febris ex ipso fit acuta, & tussis sicca, & repletio in pectoribus, &
 dolor acutus in anterioribus, ac posterioribus partibus, maxime circa spinam,
 nimirum magnis venis percalefactis. Et vomit aliquando suberuentum, aliquan-
 do lividum. Vomunt item pituitam, & bilem, & frequenter animo linguun-
 tur propter sanguinis transmutationem derepente contingentem, atque hoc maxi-
 mum signum est Erysipelæ in pulmone generati, & si assidua febris invasio con-
 tingerit. Huic si quidem duobus, aut tribus, aut quatuor ad summum diebus id,
 quod intus est, diffusum fuerit, ac transierit foras, plerumque sanus evadit. Si vero
 non diffundatur, ac foras transeat, intus putrescit, & suppuratur fit, ac perit. Pe-
 rit autem brevi, utpote pulmone toto suppurato, ac putrido. Si vero foras diffu-
 sum intro vertatur, & pulmonem corripiat, huic nulla vitæ spes reliqua est.
 Quum enim antea reficcatus pulmo traxerit in se ipsum, non amplius dimit-
 titur, sed statim ab ardore, & siccitate nihil amplius suscipit, neque quicquam sur-
 sum distribuit, sed corrumpit. * Tuberculum in pulmone fit hoc modo, quum
 pituita, aut bilis coacta putrescit. Et quandoque quidem adhuc crudius fuerit, dolo-
 rem exilem, ac tussim siccam inducit. Postquam autem maturum factum fue-
 rit, dolor & ante, & retro acutus fit, & calores corripunt, ac tussis vehemens.
 Et si quidem quamcitissime maturuerit, & eruperit, & pus sursum verta-
 tur, ac totum expulatur, & ventriculus, in quo fuerat pus, contrahitur, ac re-
 ficcetur, penitus sanus evadit. Si vero ruptum quidem fuerit quamcellerrime, &
 maturatum, ac repurgatum, verum penitus reficcari non poterit, sed ipsum tu-
 berculum a se ipso pus produxerit, & a capite sane tunc, itemque reliquo corpo-
 re pituita ad tuberculum defluens, putrescit, & pus fit, ac expulitur, per quod
 homo perimitur. Perimitur autem a ventre fluente, ab his, quæ antea relata
 sunt, & loquente ipso, ac intelligente omnes res, aque ut in priori tempore, refic-
 catur, ac perfrigeratur, conveniuntque venæ in corpore omnes, utpote sangui-
 ne ex ipsis a febre exusto: quandoque vero etiam præ temporis longitudine, ac
 morbi magnitudine tum malorum iam præsentium, tum eorum, quæ insuper ac-
 cedunt. Quod si multo tempore rumpi non possit neque sua sponte, neque a me-
 dicamentis, consumitur debilitatus a doloribus vehementibus, & inedia, & tussi,
 & febris, & usquehinc perimitur. Si vero jam attentato, & in lectum re-
 clinato, pus eruperit, neque sic valde revalescunt, sed tali modo perimuntur. At si
 eruperit quidem quamcellerrime, & maturuerit, maturatum autem multa sui
 parte ad septum transversum effundatur, statim quidem melius habere sibi videri-
 tur. Verum progressu temporis, si quidem totum per spatium rejecerit, & ven-
 triculus, in quo pus inerat, confidat, ac reficcetur, sanus evadit. Si vero & tem-
 pus longius protrahatur, & ipse debilior fiat, & per spatium rejecere nequeat, sed u-
 llus fuerit, aut sectus, & pus exeat, statim quidem, & sic melius habere sibi videtur,
 15 verum tempore procedente, perimitur ab eisdem, quæ prius relata sunt. * Por-
 16 ro in latere sunt tubercula & a pituita, & bile, eadem ratione, qua in pulmone.
 Fiant etiam a laboribus, quum vena aliqua tracta rupta fuerit, non tamen pe-
 nitus rupta, sed ita ut acutus tractus in ipsa factus sit. Si quidem igitur rupta
 fuerit, statim sanguis e vena effusus putrescit, & suppuratur. Si vero acutus tra-
 ctus in vena fiat, principio quidem dolorem exhibet, ac pulsas; progressu vero
 temporis distribuit vena sanguinem in carnem, atque hic in carne putrescens, pus
 fit. Eodem modo & caro, si quidem magis doluerit, & sanguis plus in
 se ipsam trahat ex vicinissimis venis, & statim suppuratur. Si vero minus dolo-
 erit, tardius & trahit, & suppuratur. * Quibusdam autem, quum debiles
 facti fuerint tractus in carnibus, aut venis, non suppuratur, sed sunt dolores dau-
 rurni, & vocantur Ruptiones. Et quæ quidem in carne sunt, hoc modo sunt.
 Quum caro afflicta fuerit, aut convulsa, aut percussa, aut aliud quid perpeffa,
 livida, velut antea dixi, fit, non sincero sanguine, sed tenui, & aquoso, eoque mo-
 dico. Quum autem plus solito fuerit reficcata, percalefcit, & dolorem exhibet,
 & a venis, ac caribus vicinis humiditatem in se ipsam trahit: & ibi nimium fue-
 rit humectata, atque ea ipsa humiditas, ubi a carne fuerit supercalefacta, per totum
 corpus dispergitur, qualis est attracta, magis tamen in venas dispergitur, quam
 in carnes. Venæ enim magis trahunt, quam carnes. Trahunt tamen etiam car-
 nes. Quando vero ad multam in corpore humiditatem, modica de carne attracta
 fuerit, obscura jam fit, & doloris exors, & pro morbida cum tempore sua eva-
 dit. Si vero caro magis fuerit percalefacta, & ampliorem humiditatem traxerit,
 65 dolorem

- dolorem exhibet: & ad quaecumque corporis partem ab ipsa processerit, ac firmata fuerit, dolorem indicit acutum, & aliqui putant ipsis ruptione transfusam esse, verum hoc fieri non potest. Proximissima vero ulceri sunt quaecumque talia, & alia. At humiditas de carne exiit per venas, quum autem percalescit, & crassa, & copiosa facta fuerit, dolorem exhibet, donec similis fiat relique humiditati in tenuitate, ac frigiditate. * Quaecumque vero in venis fiunt, sic habent. Ipsa quidem vena, inquantum tracta est, in loco manet. Quum autem tracta fuerit (trahitur autem, ac convellitur a labore, & violentia) fit veluti varix. Percalescit autem, & trahit in se ipsam, liquidam quamdam humiditatem, quæ est a bile, ac pituita. Et ubi mixta fuerint sanguis, & humiditas de carne, crassescit sanguis, & multipliciter ipse se ipso, ea parte, qua vena convulsa est, & morbosior fit, & amplius stabilior. Et quum copiosior factus fuerit, plenitudo ipsa transfugatur, quocumque tandem contigerit, & dolorem inducit acutum, ut aliquibus videatur rupcio locum permutasse. Et si contigerit, ut ad humerum transferatur, & gravitatem in manu inducit, & torporem, ac legnitiem. Et si quidem ad venam properit, aut ad humerum, & dorsum tendat, dolor plerumque statim quiescit. Fiunt porro convulsiones & a laboribus, & lapsibus, & a plaga, & si quis onus majus levet, & a curibus, & luctu, & ejusmodi omnibus. * Quicumque vero a vulneribus suppurati fiunt, aut ex hasta, aut pugione, aut jaculo, intro fauciat fuerint, quandoque quidem habuerit ulcus respirationem foras, per antiquum vulnus, & hæc parte frigidum in se ipsum adducit, & calidum a se ipso hac parte emittit, & sane facile tum pus, tum si quid est, aliud expurgatur. Et si quidem & interna, & externa pars simul fuerint sanata, sanus penitus homo evadit. Si vero externa quidem sanata fuerit, interna vero non, suppuratus fit. Et si etiam sanata simul sint interna, ac externa pars, cicatrix autem intus debilis fiat, & aspera ac livida, reulceratur quandoque, atque sic suppuratus fit. Rursus exulceratur, etiam si quid amplius laborarit, & si attenuatus fuerit, & si pituita, aut bilis ad cicatricem affixa fuerit. & si alio morbo correptis attenuatus fuerit. Ubi vero ulcus factum fuerit sive hoc modo, sive ubi externa pars, priusquam interna coaluit, dolorem acutum inducit, & tussim, & febrem, & frigiditatem ipsum sibi ipsi inducit, eo quod amplius calidum existat: & ipsum a se ipso caliditatem efflat, & pus expurgatur, & per longius tempus curatur, & tardius sanescit, quandoque vero neque sanescit. Nam caro, & ulcus ab ardore, qui est in corpore, coquitur, & nimium humectatur, ut non possit neque siccare, neque carnem producere, neque sanari. Sed cum temporis progressu moritur, patiens talia, quæ etiam prius dicta sunt. * At si contingat, ut crassarum venarum aliqua laueatur, & sanguis intro fluat, ac putrescat, suppuratus fit. Et si quidem hoc pus totum per spiritum rejectum fuerit, et vena sanciatæ coaluerit, et ulcus intus, ac foris sanatum fuerit, penitus sanus evadit. Si vero neque ulcus intus coalescere poterit, neque vena constringatur, sed alias, atque alias sanguinem remittat. Et si statim vomatur, et spatatur, aut etiam putrescat, et pus expuat, plerumque perimitur, aut statim sanguinem vomens, aut posteriori tempore, dum perit ab ipsis, quæ antea dicta sunt. Sape vero hi, quibus venarum aliqua intus sanciatæ a vulneribus, aut quibusdam laboribus, aut exercitiis, aut alia quadam causa, quum coaluerit, et sana esse videtur vena; alio tempore iterum rumpitur, idque ab ipsis contingit causis, a quibus etiam prius patiebatur. Ubi vero iterum rupta est, sanguinem fundit, et statim pereunt sanguinem multum, ac saepe vomentes (aut alias, atque alias sanguinem recentem vomunt) pus autem spuentes per omnem diem multum, ac crassum, tali, aut consimili modo pereunt, velut etiam in aliis morbis dictum est. * At vero in his, ac similibus morbis multum refert, quantum ad facilem, ac difficilem curationem, vir sit, an mulier, qui morbum habet, juvenis, an senex, et mulier juvenula, an ancilla. Et præterea tempus a tempore differt, in quo agrotant. Interest item, an ex alio morbo agrotent, aut non ex alio. Differt etiam affectus ab affectu, major a minore, et corpus a corpore, et curatio a curatione. His autem sic inter se differentibus, necesse est etiam tempus diuturnitatis differe, et aliis longius fieri, aliis brevius, et alios perire, alios non; et morbos aliis durabiles esse, et majores; aliis minores, et brevis temporis; aliis permanere usque ad senectutem, et commori, alias perire ab ipsis brevi. Et qui quidem juniores patiuntur eas affectiones, quæ a laboribus fieri dictæ sunt, hi et ampliores, et vehementiores ipsas patiuntur, et magis quam alii dolent, et statim in ipsis manifestæ fiunt, ut sanguinem aut spuant, aut vomant. Sed et quadam sententia fallunt ipsos, præ bona corporis habitudine. Seniores autem raro quidem patiuntur, et si patiantur, debiles ipsas perpetiuntur, utpote ipsi debiliores existentes, et remittunt magis ipsis, et affectionum majorem curam gerunt. Fiunt igitur ab initio omnino minus seniores, quam juniores, et ubi factæ fuerint, seniores debiliores fiunt, juniores vehementiores. Et juniores quidem, utpote qui habet corporis vigorem, et siccitatem, et carnem densam, ac robustam, et ad ipsa ossa adhaerentem, cure circum ipsam circumtenta, quum aliquando amplius laborarit, subito magis, et derepente convulsiones vehementes fiunt,

- fiunt, & ruptiones multae, ac omnigenae venarum, ac carniū. Et horum aliqua
statim manifesta fiunt, aliqua posteriori tempore comparent. At senioribus
vigor fortis non inest, & carnes citum ossa dissolunt, & cutis circum carnes: &
ipsa caro tata est, ac debilis, & neque tale quid pati possit similiter senior, veluti ju-
nior. Et si quid patitur, leviter patitur, & statim manifestum redditur. Atque in-
tantum quidem in affectionum principio juniores senioribus difficilius liberan-
tur. * Quum vero morbus conspicius factus fuerit, & aut pus, aut sangui-
nem, aut utrumque expuerint, qui quidem juniores sunt, quum corpus ipsorum
sit robustum, ac densum, non aequaliter depurgari possunt ab ulceribus, quocum-
pus in superno ventriculo existit. Nam & pulmo non valde trahit ad arterias,
ut qui densior sit; & arteriae, quum tenues, & arctae sint, pus non inscipiunt, nisi
modicum, & raro. Quare necesse est pus in thorace, & in ulceribus coaceruati,
& crassum fieri. At seniori & pulmo rarior, ac caviore est, & arteriae ampliores, ut
pus non diutius in ventriculo, & ulceribus moretur, & quicquid ejus insuper
generatum fuerit, hoc totum necessario sursum attrahitur a pulmone ad arte-
rias, & statim expuitur. In juniore igitur, neque quum sint affectiones vehe-
mentiores, & purgatio pro sputi ratione non fiat, & febres acutiores, & frequen-
tiores fiunt, & dolores acuti incidunt tum in ipso affectionis loco, tum in reli-
quo corpore, nimirum quum venae sint robustae, ac sanguine plenae. Ubi vero
hae percalescunt, dolores ab ipsis transiliunt alias ad aliam corporis partem. Ac
hi quidem plerumque brevi perimuntur. Senioribus vero, quum affectiones sint
debiliores, & sputum ab ipsis purgetur, & febres mitiores, ac paucae fiunt, & dolo-
res adsumt quidem, verum exiles. Et ab hujusmodi affectionibus ne senes quidem
penitus liberantur, sed longo tempore afflicti pereunt. Et aliquando pus
spuunt, quandoque sanguinem, quandoque neutrum, tandemque cum his moriuntur. Mo-
riuntur autem hoc modo, quum ipsos morbus aliquis huc, quem antea habent con-
similis apprehendit, ita ut & hunc habeant, & is, quem prius habent, vehementior
fiat, & plurimum pereunt. At vero morbi, qui hos morbos efficiunt, maxi-
me sunt pleuritis, & peripneumonia. * Febris porro ab his fit. Quum bilis, aut
pituita calefacta fuerit, totum reliquum corpus ab his calefcit, & vocatur hoc
febris. Calefcit autem bilis, & pituita, intrinsicus quidem a cibis, & poti-
bus, a quibus etiam nutritur, ac augetur, extrinsecus autem a laboribus, ac vul-
neribus, & a calido nimium calefaciente, & a frigido nimium frigefaciente. Cale-
fcit item a visu, & auditu. Verum minimum ab his. Rigor autem in mor-
bis fit quidem & ab externis, ventris, adra, siccitate, & aliis hujusmodi. Fit au-
tem & ab ingestis cibis, ac potibus. Maxime vero & vehementior fit, quum bilis,
& pituita sanguini fuerint permixtae, aut altera ex his, aut utraque. Magis ta-
men si pituita sola permixta fuerit. Est enim pituita frigidissima ex natura. Calidissi-
mus autem sanguis. Frigidior est etiam aliquanto bilis sanguine. Quum igitur
hi humores ambo, aut alter solum, permixti fuerint ad sanguinem, ipsum con-
gelant, non tamen omnino. Neque enim vivere posset homo, si sanguis densior,
& frigidior se ipso multis modis fieret. Frigefcente igitur sanguine, necesse est
& reliquum totum corpus perfrigerari, & ubi hujusmodi quid factum fuerit, ri-
gor appellatur. Et si quidem vehemens fiat rigor, vehementior est etiam tremor.
Nam dum contrahuntur venae, sanguine & coacto, & congelato, corpus & contra-
hunt, & tremere faciunt. Si vero minus aliquanto sanguinis coactio fiat, hoc
rigor appellatur. Horror autem dicitur debilissimus rigor. Quod autem post
rigorem necessario corripiat febris aut major, aut minor, sic habet. Quum san-
guis percaluerit, & vim depulerit, ac rursus ad suam naturam redierit, concies-
cit tumi & pituita, & bilis sanguini permixta. Et sanguis ipse se ipso multipli-
citer calidior evadit. His igitur percalescitis, necesse est febrem succedere post
rigorem praesanguinis caliditate. Sudor vero fit hac de causa. Quicumque mor-
bi in judicatoriis diebus judicantur, & febrilis ignis dimittit, in his de pituita, &
bile, quod tenuissimum est, eliquatur, & seceratur, & secedunt partim extra cor-
pus, partim intus, & isthic in corpore relinquunt, partim praes caliditate attenuan-
tur, & vapor fit, & cum spiritu permixtum foras procedit. Atque haec quidem
hujusmodi sunt, & ab his sudor generatur. Quando vero quandoque calidus, quan-
doque frigidus est, ita contingit. Calidus quidem de percalesceto malo, & ex-
usto, & attenuato, & debili, et non valde multo seceratur, et necesse est, ipsum
calidiorum ex corpore excerni. Frigidus autem de ampliore malo seceratur, et
de eo, quod reliquum est, et adhuc validum, et nondum putrefactum, neque atte-
nuatum, neque exustum, et frigidior, ac crassior, et graveolentior prodit. Mani-
festum autem hoc ex hac re fit. Qui frigidum sudorem exdant, e longis mor-
bis pleniusque agrotant, invalescente malo eo, quod in corpore relinquunt, post
Qui vero calidum sudorem excludunt, citius a morbis liberantur. * Pleuri-
& peripneumonia sunt hoc modo. Pleuritis quidem, quum portiones acervu-
tae, et fortis valde corripunt. Percalescit enim totum corpus, ac humectatur a
visu. Maxime autem et bilis, et pituita percalescit, ac humectatur. Et sane his
commotis, ac humectatis, continget, ut rigor invadat eburnum, sive lebrum. Et quum

- latus natura carne nudum sit præ omnibus corporis partibus, & non sit quicquam in ipso, quod renitatur præter ventriculi cavitatem; maxime rigorem percipit. Et quum riguerit, ac perfrigeratum fuerit, tum caro, quæ est in latere, tum vena contrahuntur, & convelluntur. Et quantum in ipsa carne inest bilis, ac pituita, aut in venis, quæ in ipsa carne sunt, id magna ex parte, aut totum fecerunt, introque compellitur ad caliditatem, carne extrinsecus condensata; atque id latius affligitur, & dolorem vehementem exhibet, & percalefcit, & per caliditatem trahit ad seipsum a vicinis venis, ac carnibus pituitam, ac bilem. Atque hoc sane modo fit. Ubi vero ad latus affixa putruerint, & per spiritum rejecta fuerint, sani sunt. Si vero & antiquum multum affixum fuerit ad latus, & aliud insuper accesserit, statim pereunt, præ salivæ copia expuere nequeunt; aut suppurati fiunt, & partim pereunt, partim evadunt. Indicium autem hæc de se præbent in septem diebus, aut novem, aut undecim, aut quatuordecim: dolorem quoque inducunt ad humerum, & ad claviculam, & ad alas, hæc de causa. Vena, quæ splenitis appellatur, tendit a splene ad latus; a latere vero ad humerum, & sinistram manum. Hepatitis autem ad dexterarum partes eodem modo: & quum hujus in latere pars a rigore contracta fuerit, & sanguis in ipsa horruerit, ad alas, & claviculam, ac humerum concedit, & convellit, ac dolorem inducit. Eodem modo & loci circa dorsum, ab affixo ad latus humore putruit, ac bilis percalefcit; & quandoque dolorem locis infra latus exhibent. Sæpe vero fit ad infernas partes convertatur, dolorem per venas ad vesicam distribuit, multumque, ac biliosum ager mingit. Ardeantur autem huius morbi causam, ac principium rigorem esse. * Peripneumonia fit, quum 24 commota, ac calefacta pituita, ac bile, pulmo præ caliditate traxerit in se ipsum de vicinis locis ad ea, quæ jam sunt in ipso. Et percalefcit quidem totum corpus, ac dolorem exhibet, maxime autem dorso, & costis, & humeris, ac spinæ, nimirum ab his in se ipsum attrahens plurimam humiditatem, & superreficcantur hæc partes, & nimium calefcunt. Postquam autem attraxit in se ipsum, & tum bilis, tum pituita sedem in pulmone occupavit, putrescit, ac suppuratur. Et si quidem in diebus indicatoris putrefacta per spiritum rejecta fuerint, æger superstes evadit. Si vero & ea, quæ ab initio advenierunt, susceperit, & alia insuper accesserint, & neque spuens, neque putrefaciens superaret, præ copia eorum, quæ insuper accedunt, ut plurimum moriuntur. Si vero ad dies perveniant duos, & viginti, & sebris remittat, & in his per spiritum purgati non fuerint, suppurati fiunt. Fiunt autem maxime ex his, quibus & pleuritis, & peripneumonia vehementissima existit. * Fit autem & peripneumonia, & pleuritis sine spuro, ambæ ex eadem 25 causa præ siccitate. Siccant autem & calida, ubi nimium callescunt; & frigida, ubi nimium frigescent. Congelatur autem latus, & quæ sunt in ipso venæ, & convelluntur, & quantum in ipso inest pituita, aut bilis, id a caliditate reficcatur, & dolorem inducit, & a dolore febrem. Huic venam lecare conducit in manu splenitidem appellatam, aut hepaticidem iuxta usum sane fuerit morbus. Atque sic dolor mollior fit & lateris, & aliarum partium. Nam vena, & quantum in ipsa inest bilis, ac pituita, & ipsius sanguinis ægroantis una cum his magnam partem foras dimittit. Pars vero ex carne per medicamentay & potiones diffunditur, & a calefactoris fornicibus adhibitis, ita ut morbus per totum corpus dispergatur. Vocatur autem hæc pleuritis sine spuro, * Peripneumonia vero, quum pulmo etiam ipse superreficcatur, fuerit, & quantum in ipso inest bilis, aut pituita, 26 neque putrescit æqualiter, neque per spiritum reddit, & quantum in ipso est humiditas, aut a potu, aut a sorbitione, aut a vicinis locis, hoc totum exurit præ nimia siccitate, ac caliditate. Huius potiones bibere conducit, a quibus pulmo humidatur, ac spiritum reficit. Si enim spiritum non rejecerit, & durior fit, & coarctetur, & hominem perimit. * Febris ardens corripit magis biliosos, corripit item pituitosos. Corripit autem hoc modo. Quum bilis commota fuerit per corpus, & contigerit ut vena, & sanguis attrahant bilem, earque plurimam ex carnibus, ac ventriculo ad eum, qui prius inest, utpote quum etiam natura calidissimus sanguis in corpore existat. Quum itaque percaluerit ex carnibus, & ventriculo supra eum, qui jam inest, adhuc magis a bile, percalefcit etiam reliquum corpus. Et quædam sane partes præ multa humiditate penitus reficari non possunt. Si vero refecata fuerint, homo moritur. Extremæ vero corporis partes, utpote natura siccæ, reficcantur, & plurima humiditas ex ipsis exurit, & si ipsas contingere velis, frigidæ comperies, ac siccæ. Quapropter his, qui a febre ardente corripiuntur, internis quidem partibus a febre exurantur, externas autem frigidifunt. Fit lingua, ac fauces ab interno spiritu, ac caliditate exasperantur, & arcescunt. 265 Quantum autem in ventriculo, & in vesica inest bilis, quod quidem in ventriculo est, aliquando deorsum exturbatur; plerumque vero in primis diebus vomitur, aut in quatuor, aut quinque. Vomitur autem hæc de causa. Quum supernus ventriculus supercalefcit fuerit, attrahit in se ipsum, & fit vomitus. Et ob hoc ipsum etiam ex febre ardente, & ex pleuritide ad peripneumoniam maxime morbi transmutantur. Ubi enim supernus ventriculus supercalefcit fuerit, trahit 270 in se ipsum, et suscipit pulmo, et fit peripneumonia, et plerumque pereunt, nimium de-

rum debiles jam existentes, & morbo alio novo insuper generato, dies transigere nequenter, donec sputum in pulmone concoquatur. Verum ut plurimum pereunt præ debilitate. Aliqui tamen evadunt. At quibus in vesicam consluit quid bilis, his crassa urina mingitur, crassa autem a pituita. Biliosa vero alvi egestas prodit, eo quod combusta sint ea, quæ sunt in ventre. * Phrenitis hoc modo se habet. Sanguis, qui est in homine, maximam partem ad prudentiam confert, quidam dicunt totum. Quum igitur bilis commota ad venas, & ad sanguinem ingreßa fuerit, sanguinem ex confecta compage, ac motione dimover, & fecosum facit, ac calfacit. Calefactus autem, etiam reliquum corpus totum percalefacit, & desipit homo, & non sibi constat præ febris copia, & sanguinis ad serositatem transmutatione, & motione non solita contingente. Assimiles autem sunt, maxime hi, qui phrenitide tenentur, his, qui ab atra bile delirant. Nam & hi, ubi sanguis ex bile, & pituita corruptus fuerit, morbum habent, & dementes fiunt. Aliqui vero etiam insanunt. Et qui phrenitide correpti sunt eodem modo. Tantum autem minor infans, ipsiusque delirium fit, quanto paucior, ac debior est bilis, quam pituita. * Porro subcruentum, & lividum est sputum in pleuritide, ac peripneumonia, idque ob hanc causam. Principio quidem plerumque neutrum spuit, neque lividum, neque subcruentum, unde nosse convenit, morbum vehementem esse. Quum autem sputum subcruentum spueri cœperint, tunc maxime purgantur. Sputum autem id a distensione venarum, in pleuritide quidem earum, quæ sunt in latere, in peripneumonia vero earum, quæ sunt in pulmone, & caliditatem ad se ipsam affectio trahit. Si vero ægro abscessus fuerit ruptus, ac purulentus fuerit, prima mox die sanguinem, & pus subcruentum, ac lividum cum saliva spuit. Lividum autem sit a sanguine, si modicus ad multam salivam ammixtus fuerit, & non statim spuat, sed semiputrefactum, & effeminatum in corpore manet. * Moriantur autem ex pleuritide, ubi & multum pituitæ, ac bilis ab initio lateri fuerit affixum, & multum insuper ex reliquo corpore affluerit, & neque spuens, neque putrefaciens superare, præ materię affluenti copiam. Implentur autem arteriæ ab his, quæ insunt, pituita, ac pure. Deinde sterit, & frequenter, & illinc statim respirat; tandem vero omnia obturantur, & moritur. Eodem modo ex peripneumonia percutit. Quicumque vero ex febre ardente moriuntur, omnes præ siccitate moriuntur. Et resicantur primum quidem extremæ ipsorum partes, manus, ac pedes. Deinde partes sicciores. Ubi autem humiditas ex corpore penitus fuerit exusta, ac resicata, sanguis quidem congelatur penitus, ac perfrigeratur. Reliquum vero corpus exsiccat, ac sic homo moritur. At ex phrenitide ita perit. Desipiunt in hoc morbo semper, nimirum sanguine corrupto, & ex confecta motione emoto, & quum desipiant, nihil eorum, quæ ipsis exhibentur, accipiunt, quod saltem memoratu dignum sit. Quum vero progressum fuerit tempus, marcescunt, ac imminuti consumuntur tum ex febre, tum quod nihil alantur. Et primum quidem extremæ partes consumuntur, ac perfrigerantur. Deinde ipsi proximæ. Sed & frigiditatis, & febris, & dolorum principium hoc habet: Quum sanguis, qui est in venis, perfrigeratus fuerit a pituita, transmutatur, & convellitur a cervatim alias alia parte, & tremat. Tandem vero omnia perfrigerantur, & moritur.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS LIBER II.

Argumentum in Librum sequentem.

- De capitis morbis. Quomodo, capite ralesso, urina multa emittatur. Cur oculi, pituita ad venas in oculis perveniant, cæcant, & ejus rursus. Cur quibus pituita ex capite ad carnes convertitur, bene colorati esse videantur.
- Ulcera qua ratione in capite, & reliquo corpore nascuntur.
- Capitis dolor, & bilis vomitus. Urina difficultas unde. Delirium unde.
- Pharinx circa caput supervenit quando contingat. Aurium sonitus unde, & cur ibi difficulter audiant. Sanguis quatenus sanguis vocetur. Capitis dolor. Vertigo. Gravitas.
- De cerebri corrupti signis, & unde ejus cor-
ruptio contingat. Spina dolor unde. Ani-
mi deliquium unde. Sanguinis vomitus in
cerebri corruptione.

- Capitis dolor repentitus cum vocis interrup-
tione, ac sui impotentia, & rassa.
- De Carie ossis capitis.
- Sideratorum signa. Capitis dolor in sideratis un-
de. Oculorum hebetudo. Corporis impoten-
tia. Qui ex his convalescant, & qui non.
- De Angina, sive Cynanche generatione.
- De urina morbi generatione, & quomodo pur-
gatio rubicundus fiat, & postea nigrescat.
- Tonsille, partium sub lingua, gingivæ, &
quæcumque hujusmodi hoc loco consistunt,
morbis.
- De morbis a capite sentibus. Capitis tor-
por, frequens mictus, & alia urina stulti-
tudinis symptomata, caput humore repletum
signifi-

- significent. Quibusdam septimo, aut quoddecimo anno revertitur. Curatio per utrum coriacum aqua calidissima impletam, Petasane succus cum mercenialis succo in aqua collu. Serri potus ad dies septem. Crustulam immiso in capitis partibus. Vena circa aures quatuor ardeat.
- 13 De ulceribus in capite, curibus tumidis, velut ab aqua potu, curatio. Sanguis ad caput exulceratum, ex vini sace, glandis cortice & nitro. Capitis unguentum.
- 14 De capitis dolore cum bilis vomitu, & urina difficultate &c. curatio. Spongiarum aqua calida imbutarum in capitis dolore, usus. Albedimentum ad aures resicandas.
- 15 De aqua in cerebro signis, & curatio. Lentacula decoctum cum melle, & aceto.
- 16 De rigore, dolore, & febri per caput, maxime ad tempora, & ad sinuiput. Causa, seu generatio huius morbi, & eius curatio.
- 17 De febri ex renarum circa cerebrum supervenitu, & eius curatio.
- 18 De capitis gravi dolore nunc ad collum, nunc ad alias partes transiensis ex renarum super vomitu, & eius curatio. Frontis in capitis dolore, secundi ratio. Salis in fissuram frontis inferio. Diata.
- 19 De Cerebri a bile infestati signis, & curatione. Apii succus per nares instillatus, Sambuci folia alvum movent.
- 20 De cerebri corrupti signis. Aceri albi aequo potus.
- 21 De capitis dolore repentino cum vocis interceptione, & eius curatio.
- 22 De vocis privatione ex ebrietate, & qui ex hoc morbo evadunt, & qui non. Cepa decorticata in nares indita.
- 23 De cerebri corrupti signis, & eius curatione.
- 24 De cariei, seu stredinis signis.
- 25 De siderati, anteriorum capitis partem dolentibus, nec videre potentibus, &c. Fomentum ex murrha, & aris flore ad nares. Sinepitis incisio.
- 26 De signis anginum concomitantibus, & eius curatione. Fomentum ex aceto, nitro, origano, & nasturtii semine. Gargarismus. Ad salivam suppressam. Asiri ramulus.
- 27 Alia angina. Inflammatio ad pectus conversa: ad pulmonem conversa. Suppurati ex angina.
- 28 Alia angina, & eius curatio. Cataplasma. Gargarismus ex ficum decocto. Farina calida in vino, & oleo casta. Pans calidi.
- 29 De Uva morbi in faucibus signis, & curatione. Farinam frigidam lingere.
- 30 De Tonsillarum morbi signis. Aëris flos in gargulione inflammato.
- 31 Tuberculum sub lingua, quod hypoglossi dicitur. Ordeacea farina in vino, & oleo casta.
- 32 Tuberculum confissum ad palatum. Uva passa alba usus.
- 33 De Polypi in naso generatione, & curatione. Limum Aegyptium.
- 34 Alius Polypus, cum nasus carnibus duris impletur. Alia. Alius Polypus. Alius. Curatio. Peratri in polypum istum inferio.
- 35 De morbi regii nigri signis, & curatione. Asphodeli radice. Pinum Aeginense. Sple-
- nicus ex morbo regio nigro. Alius morbus regius.
- 36 De febrium a bile signis. In febris biliosa pharmacum nona die. Aqua mulla in febriculis ante medicamentum potientem. Aqua frigida in febris biliosa potus.
- 37 Alia febris, seris ad contactum debilis, interius autem ardet, & lingua ipsius aspera est. & per os, & per nares calidum spirat, & eius curatio.
- 38 Tertia febris. Pharmacum in febris tertiana ante quartam invasionem.
- 39 Febris quartana, cum quis alio morbo purgatus non fuerit, curatio.
- 40 De signis Pleuritidem comitantibus, eiusque curatio.
- 41 42 Alia pleuritis. Item alia.
- 43 De peripneumonia signis. Eiusque curatio. Leguminum decoctum.
- 44 Suppuratum ex peripneumonia signa, eiusque curatio.
- 45 Alius morbus. Lateris sinistri in suppuratis sectio minus periculosa, quam dextri. Suppuratum ex peripneumonia secundi, & puris educendi. Qui ex his evadant.
- 46 De tabescentis ex pulmonis affectu signis. Qui huic morbo sint obnoxii. Pulvum in tabe prostratum uade. Tabidarum spem, supra carbonem coniectum, male olens. Curatio.
- 47 Alius morbus appellatur tabes.
- 48 Aphisa in pulmonis fistula. Caput rarissime lavandum.
- 49 De tabis a dorsali medulla generatione, & quibus frequenter fiat, signa. Pelintformicas de capite in spina deferri videri. Gemitus cum urina prodeunt. Seminis in somnis profusio. Capitis gravitas, & aurium sonitus post exercitum, & eius curatio.
- 50 De pulmonis morbi signis.
- 51 De arteria vulnerata signis. Pulmonis ruptio quid.
- 52 De pulmonis articularis convulsis. Circuli rubicundi in tibiis. Curatio.
- 53 De Erysipellate in pulmone. Causa, & curatio. Splenis quibus purgandi.
- 54 De morbi dorsalis signis. Urina cruenta in morbo dorsali.
- 55 De tuberculi in pulmone generatione, & signis, & eius curatio.
- 56 De pulmonis repleti signis. Curatio.
- 57 De pulmonis ad latus prolati signis. Græve quiddam in pectore incipiens. Sanguinalis svidor. Curatio. Dares, & centaury femina.
- 58 De tuberculi in latere signis, & curatio.
- 59 De hydropis pulmonis. Aqua in pulmone quomodo cognoscatur, & curatur.
- 60 De pectore, aut dorsi rupti signis, & curatio.
- 61 De febri ardensis signis. Ex febre ardensis in peripneumonia transitus.
- 62 De febri succulentis signis.
- 63 De leibargi morbi signis, & curatione.
- 64 De morbi siccitatis signis. Corpus, velut a ciculis, purpi videri. Curatio.
- 65 De febri intercurrentis signis, & curatione.
- 66 De morbi lividi signis, & curatione.
- 67 De morbi rutillosi signis. Curatio.
- 68 De morbo pituitoso, qui mulieres magis, quam viros

- 69 De pituita alba, & ejus curatione. Scrovi
aqua repleti fessio.
70 De cunctis morbis difficilis signis, & ejus curatione.

- 71 De morbo nigri signis. Pomus in morbo nigro,
varia species, & ejus curatione.
72 Alius morbus niger, & curatione.
73 De morbo corruptorio,

S E C T I O I.

- M**ULTUM urinae emittitur, ubi caput nimium incaluerit. Lique-
scit enim in ipso pituita; liquescens autem secedit partim ad nares,
partim ad os, partim per venas, quae ducunt ad pudendum,
Quum autem ad pudendum pervenerit, mingit homo, & patitur,
quemadmodum ab urinae stillicidio. Caecutunt autem, quum
ad venas in oculis pervenerit pituita. Aquosior enim
fit visus, & turbulentior, & splendor in oculis non similiter
splendens est, neque in ipso comparet, si videre voluerit, similiter sicut ante, quum
splendens, & purus esset. Hic in quadraginta diebus maxime fanatur. Si vero
longo tempore postea morbus reveratur, cutis capitis crassescit, & reliquum corpus
attollitur, & crassescit, ac bonum colorem habet. Haec pituita ad carnes con-
vertitur, & ab hac crassus esse videtur, Nam carnes, quum sita perfrigata, & elevata,
ac rariores, sanguinem ex venis trahunt, & propterea bene colorati esse videntur.
3 * Alius morbus. Caput ulceribus impletur, & corpus intumescit, & co-
lor morbi regii est, & alias alia corporis parte ulcera erumpunt & febris alias, at-
que alias corripit, & ex dorso aqua fluit. Huic, quum in capite pituita subbiliosa con-
nutrita fuerit, ulcera sunt, ubi sinciput pituita, & bile perfrigata fuerit, & ubi pi-
tuita rara, & acervata fuerit, itemque bilis. Haec enim consistit, putrescit, & ex-
ulceratur. Attenuata vero pituita ad aures penetrat. At in reliquo corpore ulcera ead-
em ratione, qua in capite fiunt, sanguine, & bile putrefactis, quacumque in parte
fuerint collecta. Haec enim parte caro putrescit, & exulceratur, & accedentem
pituitam, ac bilem insuper putrefacit, & fit pus. * Alius morbus. Dolor cir-
cum circa caput vexat, & vomit bilem, & difficulter mingit, & desipit. Hic ca-
put quidem dolet praeter nimiam ejus calefactionem. Desipit autem, quum sanguis in ca-
pite a bile, aut pituita fuerit calefactus, & plus solito commotus. Vomit autem
bilem, utpote commota ipsa in corpore. Et caput praeter caliditatem trahit in se ipsum,
& crassissimam quidem vomit; tenuissimum vero in se ipsum trahit. Mingit autem
& in hoc morbo ab iisdem, velut etiam in superiore dictum est, * Ali-
us morbus. Si circa cerebrum venulae superevoment, nomen quidem re-
ctum morbo non est. Neque enim fieri potest, ut aliqua vena sive parva, sive
magna superevomat. Nominant tamen, & dicunt superevomatum, Si vero etiam
quammaxime superevoment, morbum ab hoc ipso fieri non est verisimile. Nam a bo-
no malum fieri non potest, neque a malo utique bonum fiat. Neque rursus bonum
plus iusto fieri potest. Verum superevomere videntur, quum ad venas bilis, aut pi-
tuita ingressa fuerit. Elevantur enim venae, & pulsant, & dolor per totum caput
dispergitur, & aures sonitu percipiunt, ac nihil audiunt. Et sonitum quidem perci-
piunt, utpote venis pulsantibus, & palpitantibus. Tunc enim sonitus est in capi-
te. Graviter autem audiunt partim praeter interno strepitu, ac sonitu, partim quum ce-
brum, & venae circa ipsum elevantur. Praeter nimiam enim caliditatem, vacuum circa au-
rem partem cerebrum de se ipso implet, & quum aequalis aeris copia non infit, velut
priori tempore, neque aequalem sonum exhibeat, ea, quae dicuntur, non aequaliter
se imprimunt, atque ex hoc gravem auditum habent. Hic, si quidem erumpat ipsi
ad nares, aut ad os aqua, & pituita, sanus fit. Si vero non erumpat, septima die
maxime moritur. At si in capite venae superevoment, id quod ab iisdem fit, quae
prius relata sunt. Signum vero, quod tali modo superevoment, hoc est. Quum quis
aut manum, aut caput, aut aliam quamdam corporis partem, hoc patientem incidat, san-
guis niger profuit, & turbatus, ac morbosus, quamquam neque sanguis nominari
iuste mereatur, nisi tunc quum rubicundus, ac sincerus fluxit. Quum itaque supere-
voment ab iisdem causis, dolor, & vertigo, & gravitas caput occupant. Dolor qui-
dem praeter nimiam sanguinis caliditatem. Vertigo vero, quum acervatus ad faciem pro-
cesserit sanguis. Gravitas autem, quod copiosior sanguis fit in capite, & turbulen-
tior, ac morbosior, quam intrinsecus.

* Cerebri corruptio.

SI cerebrum corruptum fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad eor ani-
mi deliquium procedit, & insor adest, & somni expertus est, & ex naribus san-
guis fluit. Saepae etiam sanguinem vomit. Corruptum autem cerebrum tali modo,
quum aut nimium calefactus, aut perfrigeratus, biliosus, aut pinitosus plus soli-
ro factus est. Ubi vero horum aliquid perpessus fuerit, etiam spinalem modum
supercalefactum. Et quum etiam hic percalefactus, dolorem spinae inducit. Animo

Alipp. Opera.

K 3 vero

- vero linquitur homo, quum pituita, aut bilis ad cor consistit. Consistere autem necesse est commotis, ac humectatis. Sudor autem fit præ dolore. Sanguinem veto vomit, quum venæ, quæ sunt in capite, a cerebro fuerint calefactæ; quæ vero circa spinam sunt, a spina. Spina autem a spinali medulla. Medulla vero a cerebro, unde sane originem trahit. Quum igitur calefactæ fuerint venæ, & sanguis in ipsis effluerit, quæ quidem in capite sunt, venæ, distribuunt ipsum ad nares, & ad os;
- 65 quæ vero circa spinam sanguifluæ, in corpus. Hic tertia, aut quinta die plerumque perit. * Alius morbus. Derepente dolor occupat caput, & statim vox
- 70 lum inquam, ac pectus. Deinde postmodum sideratus fit, ac impotens, sanguine nimium perfrigerato. Et si superior evaserit, ita ut sanguis caleseat, sive ab his, quæ exhibentur, sive a se ipso attollitur, & diffunditur, ac movetur, & spirationem inducit, & spumescit, & a bile separatur, & sanus evadit. Si vero superior non evaserit, adhuc magis perfrigeratur; & ubi penitus perfrigeratus fuerit, & calor ex ipso defecerit, congelatur, & moveri non potest, sed moritur. At si ex ebrietas
- 75 tibus hæc patiat (nam & hoc contingit) itidem moritur.

* *Caries ossis capitis.*

7

- Quum caries facta fuerit in osse, dolor ex osse corripit. Temporis autem progressu cutis de capite alia atque alia parte discedit. Talia vero patitur is, cui in secunda ossis lamina, pituita superveniens ressecata fuerit. Hac enim parte
- 80 rum fit, & omnis humiditas ex ipso deficit, & quia aridum est, cutis ab ipso discedit. Hic morbus lethalis non est. * Alius morbus. Si sideratus fiat, antetorem capitis partem dolet, & oculis non aequaliter videt, & soporatur, & venæ pulsant, & febris debilis tenet, & corporis impotentia. Hic patitur hæc, quum venæ in capite fuerint calefactæ, & calefactæ pituitam in se ipsas traxerint.
- 85 Et principium quidem morbi ex hoc fit. Anteriorem vero capitis partem ideo dolet, quod venæ in hac sint crassissimæ, & cerebrum ad anteriorem capitis partem magis situm est, quam ad posteriorem. Et oculis ideo non videt, procumbente eo cerebro, ac inflammato. Impotentia vero ideo corpus occupant. Postquam venæ pituitam in se ipsas traxerint, necesse est præ pituitæ frigidityte sanguinem magis nunc sisti, ac perfrigeratum esse, quam priori tempore; dum autem sanguis non
- 90 movetur, fieri non potest, ut non etiam corpus quiescat, ac torpeat. Et si quidem sanguis, ac reliquum corpus superarint, ita ut calefant, homo evadit. Si vero pituita prævaluerit, sanguis magis perfrigeratur, ac congelatur. Et si frigiditas, ac congelatio auferant, penitus congelascit, ac perfrigeratur homo, & moritur.

* *Angina.*

9

- Angina, sive Cynanche fit, quum pituita in capite commota acervatim deorsum fluxerit, & in maxillis, ac circa collum consistit. Hic neque salivam deglutire potest, respirat autem violenter, ac sterit, et aliquando etiam febris ipsam corripit. Et morbus sane ex hac causa fit, et aliquando sub ipsam linguam, aliquando paululum supra pectus.

* *Uva, morbus.*

10

- Uva fit, quum pituita de capite ad gurgulionem descenderit, et gurgulio præceptis dependet, ac fit rubicundus. Temporis autem progressu nigrescit. Nigrescit autem hoc modo. Venosus est gurgulio, ac crassus, et postquam inflammatus est, calefit, & præ caliditate sanguinem ex vena attrahit, ac ab ipso nigrescit. Quapropter si nonurgentem feces, statim inflammantur,
- 105 Nam vena calefacit, et præ caliditate partes circa gurgulionem sanguine replet, et brevi suffocantur.

* *Tonsillæ, ac vicinæ partes.*

11

- Tonsillæ, et partes sub lingua, et gingivæ, et lingua, et quæcumque huiusmodi hoc loco consistunt: hæc omnes partes ex pituita agrotant. Pituita autem de capite descendit. Caput autem ex corpore trahit. Trahit autem, ubi fuerit calefactum, percalefcit autem a cibus, et sole, et frigore, et laboribus, ac febrili calore.
- 110 Quum vero calefactum fuerit, tenuissimum ex corpore ad se ipsum trahit. Ubi vero traxerit, rursus id ad corpus descendit.

- Quum repletum fuerit caput, & ab aliquo ex relatis percalescens, torpor caput tenet, & frequenter mingit, & alia patitur, quæ ex urina stillicidium contingere solent. Idem per novem dies hæc patitur. Et si quidem per nares, aut aures aqua, & mucus erumpat, a morbo liberatur, & urina stillicidium sedatur, mingitque citra dolorem urinam multam, & albam ad viginti dies. Et dolor capitis cessat, & intuitu splendor ex oculis subtrahitur, & dimidiatas rerum facies se videre putat. Hic quadragesima die penitus sanus evadit. Multis vero quandoque morbus redit septimo, aut decimoquarto anno, Et capitis cutis ipsi crasse-
scit, & ad tactum cedit; & de paucis cibis tener, ac bene coloratus apparet, & non acutum auditum habet. Quum ita habentem offenderis in principio morbi, priusquam erumpat aqua per nares, & aures, & tenuerit ipsum dolor; derafo capite, utrem coriaceum circum frontem deligare oportet, aqua plenum calidissima, quantum sustinere potest, atque hinc ipsum calefieri permittere, & ubi perfrigeratus fuerit, alium adhibere. Si vero hinc debiliatur, desistere; ac tempore interposito eadem repetere, donec remiserit dolor. Et si alvus non egerat, infusum per clysterem immittere, & urinam cientibus in poti datis, aquam mulsam aquosam insuper bibendam exhibere, & calore quammaxime foveatur. Sorbeat autem succum prisanæ tenuem. Si vero venter non subeat, mercurialem in aqua coctam terio, ac succum excolato, & de ipso, ac de prisanæ succo pariem mensuram permisceto, & modicum mellis adjicito. Hunc succum ter in die sorbeat, & vinum mellei coloris, aquosum, album modicum, a sorbitione insuper bibat. Postquam autem eruperint ipsi per nares mucosa, & urinam crassam eiecerit, & a dolore capitis liberatus fuerit, utre amplius ne utatur, sed multa calida lotus, urinam cientia, & aquam mulsam aquosam bibat. Et primis quidem diebus milium delingat, & incurbitam edat, aut betas per triduum. Deinde cibis utatur mollissimis, ac quammaxime per alvum subeuntibus, ita ut semper modicum ad cibos priores addat. At ubi quadraginta dies præterierint, (sedatur enim morbus maxime in tanto tempore,) capite ipsius purgato, prius medicamento exhibito, ipsum deorsum purgato, si tempus anni hoc permittat. Deinde serum ad dies septem bibendum dato, aut pauciores, si debilis existat. Si vero morbus revertatur, fomento per totum corpus adhibito, postmodum veratrum bibendum dato. Deinde quanto tempore tibi visum fuerit intermittere, & tunc capite purgato, medicamento deorsum purgante exhibito, crustas octo capiti inurito, duas circa aures, duas in occipito, hinc atque hinc ad cervicis nervum, duas in naso circa angulos oculorum. Venæ autem circa aures urpendæ sunt, donec pulsare desinant. Ferramentis vero cuneoli forma paratis obliquis venas percurito.
- Atque hæc, ubi feceris, sanitas continget. * Alius morbus. Ulceribus impletur caput, & crura intumescunt, velut ab aquæ poti, & in tibiis tumor infareitur, & si premas, color morbi regii apparet, & ulcera alias alia corporis parte erumpunt, maxime tamen circa tibiis, & malum aspectum præ se ferunt. Ubi vero inflammatione liberata sunt, cito sana fiunt, & febres alias atque alias corripit. Caput autem semper calidum est, & ex auribus aqua fluit. Quum ita habet, medicamentum ei dandum est, a quo pituita, & bilis sursum purgatur, si quidem frigus fuerit, præfotò, ac calida lotò. Deinde tribus diebus interpositis, caput purgato. Postea etiam deorsum purgans medicamentum bibendum dato. Si vero tempus anni ferat, etiam serum postea bibat. Sin minus, lac asinum. Post purgationes cibis quampaucissimis, & quammaxime per alvum subeuntibus utatur, & non lavet. Si vero caput exulceratur, secem vini ad smegma faciendum combureto, & glandis corticem tritum levigatum ammiscoeto, & pari nitro ammixto, his desectus multa calida lavetur. Inungat autem caput bacis lauri tritis, & gallis, & myrrha, & thure, & argenti flore, adipique fusillo, ac oleo laurino. His permixtis inungatur. Post hoc autem tempus vomitibus utatur bis in mense, & exerceat se, ac calida lavet. At si his adhibitis, ex reliquo quidem corpore morbus fuerit exclusus, verum in capite ipsi ulcera adhuc hænt, rursus capite purgato, medicamentum deorsum purgans postea bibendum dato. Deinde raso capite, fissuras raras incutito, & ubi sanguis effluxerit, conficicato. Postea lanas succidas vino imbutas superligato, & postquam exolveris, spongia detergito, & ne humectato. Deinde oleo sublito, cupressum inspergito. Laneis autem deligamentis, donec sanus fiat, utatur. * Alius morbus. Dolor caput corripit, & si paululum moveatur, bilem vomit. Quandoque etiam urinam difficulter emittit, ac desipit, & septima die quandoque moritur, & nona quoque, ac undecima, septimam transgressus, si non eruperit per nares, aut aures. Si vero eruperit, evadit. Fluit autem aqua subbiliosa. Deinde temporis progressu putrefacta pus fit. Quum igitur ita habuerit, quandiu quidem dolor tenuerit in principio, priusquam ex naribus, ac auribus erumpat, spongas aqua calida imbutas cito capiti admoveo. Si vero his non laxetur, utre utaris eodem modo, ve-

- lur in superiore morbo. Bibat autem aquam mulsam aquosam: Sin minus;
 180 aquam de farina crassa in ipsa macerata. Sorbeat prasanæ quoque succum, & vinum album aquosum insuper bibat. Postquam vero per aures eruperit, & febris, ac dolor remiserit, cibus utatur per alvum subeuntibus, a modicis initio facto, semper aliquid addendo. Et caput calida lavetur, & aures collum aqua pura, & spongiam melle tinctam indat. Si vero neque sic refecerit, sed diuturna fluxio
 185 fiat, collutione facta, argenti florem, sandaracham, cerusam, singula aëquis portionibus trita, levigataque in aurem indito, eamque expleto, & si quid præterlabatur, de medicamento amplius supetaddito. Ubi vero refecata fuerit auris, expurgato, ac medicamentum eluito. Postea (obscurescit enim primum refecata) lenibus fomentis aures foveto. Nam & sic vix, ac longo tempore sedabitur. Mo-
 190 riuntur autem etiam, si dolor in aure fuerit, & nihil in septem diebus eruperit. Hunc multa calida lavato, & spongias aqua calida imbutas exprime, & tepidas ad aurem appone. Si vero neque sic erumpat, auri fomentum adhibeto. Sorbitio-
 195 lius morbus, Si aqua in cerebro fuerit, dolor acutus per sinciput, ac tempora emergit, alias alio loco: & rigor, ac febris alias arque alias, & regiones o-
 culorum dolet, & cæcurit, & pupilla finditur, & ex uno duo se videre putat, & si surrexerit, vertigo ipsum corripit, & ventum non sustinet, neque solem; & aures tinnunt, ac inter audiendum strepitu offenditur; & vomit salivam, ac pituitam, quandoque etiam cibos; & capitis cutis attenuatur, & contractu gaudet. Quum sic
 200 habuerit, primum dandum est ipsi medicamentum, quod sursum pituitam educit, & postea caput purgato. Deinde interposito tempore, medicamentum deorsum purgans bibendum dato. Postea cibus quammaxime alvum subeunti-
 bus ipsum reficito, semper modica addendo. Postquam vero comederit iam cibos
 205 sufficientes, vomitibus jejuniis utatur, lenticulæ decocto mel, & acceum miscens, & olera antea comedens: & in illa die, qua vomuerit, primum cyceonem bi-
 bat tenuem; postea ad vespertam cibis modicis utatur, & non lavet, & a cibis deam-
 bulet, itemque mane, vitans ventum, ac solem, & ad ignem ne accedat. Et si qui-
 dem talia faciens, sanus fiat, bene est. Sin minus, vere, ubi ipsum prius purgatis
 210 primum veraturo, postea etiam in nares medicamentum infundito, & paucio tem-
 pore interposito, deorsum purgato. Deinde cibus reficito. Postea inciso capite ju-
 sta sinciput, ad cerebrum usque perforato, & veluti sectionem, ac perforatio-
 nem curato. * Alius morbus. Rigor, dolor, & febris per caput: maxi-
 me ad aurem, & ad tempora, & ad sinciput, & oculorum regiones dolet, & super-
 215 cilia ipsi incumbere videntur, & gravitas caput detinet, & si quis ipsum move-
 rit, minget, & multum, ac facile mingit, & dentes torpent, & stupor ipsos ten-
 et, & venæ attolluntur, ac pulsant in capite, & non potest quietus esse, sed an-
 xius est, ac desipit præ dolore. Hinc si quidem per nares, aut aures eruperit, a-
 qua profluit subpurulenta, & sanus evadit. Sin minus, plerumque in septem die-
 220 bus moritur. Hic morbus maxime fit ex febre lypiria, quum liberatus a se-
 labore, quum sic habuerit, primum sanguinem de capite mittito, indecumque
 tibi visum fuerit. Et post sanguinis missionem, raso capite perfrigoratoria ipsi
 adhibeto. Et si alvus non subeat, infusum per clysterem immitto. In potu ve-
 ro prasanæ succum frigidum dato, & aquam insuper bibendam. Si vero ad per-
 225 frigoratoria non remittat, transmutatione facta, ure utitor, ac calefacto; postquam
 autem quieverit dolor, cibus utatur alvum subeuntibus, & ne impleatur. Ubi
 vero vigesimum diem attigerit, sedato dolore, fomento capiti ipsius adhibito,
 ad nares medicamentum apponito, & interposito triduo medicamentum deorsum
 purgans exhibeto. * Alius morbus. Si venæ circa cerebrum sangui-
 230 nem supervomerint, ac cerebrum calefecerint, febris emergit fortis, & do-
 lor ad tempora, & sinciput, ac posteriorem capitis partem; & aures tinnunt, ac
 statui implentur, & nihil audit, & anxius est, & se ipsum præ dolore iactat. Hic
 quinta, aut sexta die moritur. Quum sic habuerit, caput ipsius calefacto. Si e-
 nim per aures, aut nares aqua eruperit, mortem effugit. Si vero sex dies evale-
 235 rit, victum ipsi velut in superiore morbo constituto. * Alius morbus. 18
 Si venæ supervomerint in caput, dolor gravis totum caput tenet, & ad col-
 lum, & alias ad alias capitis partes transit. Et ubi surrexerit, vertigo ipsum
 corripit, febris autem non invadit. Quum igitur sic habuerit, derafo capite, si
 non calefactoris cesserit, frontem ea parte, qua capillus desinit, a capite findi-
 240 to; ubi vero secueris, disparata, ac diducta cute, quum sanguis defluxerit, salem
 tenuissimum inspergito, & postquam effluxerit sanguis, fistulam componito, &
 duplici filo totam ipsam includito. Deinde splenium cera, ac pice illtum, ulce-
 ri imponito, & lana fordida superimposita deligato, & ad dies septem ne solvito, si
 non dolor vexet: si vero dolor adit, exolvito. Donec autem sanus fiat, aquam
 245 de macerata in ipsa crassa farina bibendam dato, & prasanæ succum forben-
 dum, & aquam insuper bibendam. * Alius morbus. Si cerebrum bile in-
 festatur, febris emergit debilis, & rigor, & dolor per totum caput, maxime
 ad tem-

ad tempora, ad finciput, & ad regiones oculorum, & supercilia ipsis impendere videntur, & ad aures dolor procedit, & quandoque per nares bilis defluit; & oculis hebetes habent, & plerisque dolor ad dimidiam capitis partem extenditur, quandoque etiam per totum caput. Quum sic habuerit, perfrigatoria ad caput apponito, & postquam dolor, ac fluor cessarit, apud succum in nares infiltrato, & ne laver, quandiu dolor obtinuerit. Et sorbeat milium tenue modico melle affuso, & bibat aquam. Si vero alvus non subeat, brassicas edat, & succum sorbeat. Sin minus, folia sambuci eodem modo. Et postquam tempestivum tibi esse visum fuerit, cibos quammaxime alvum subeuntes, ipsi exhibeto. Et si depulso fluore, ac dolore, gravitas ipsi supra supercilia incumbat, & in naso muens crassius, ac putridus fuerit, fomento ex aceto, & aqua, ac origano ipsi adhibito, deinde calida aqua loto, florem aris, & myrrham ad nares apponito. Atque his factis, plerumque sanum efficies. Morbus autem non est lethalis. * Alius morbus. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor ex cervicis nervo ad spinam tendit, & ad cor frigus descendit, & derepente novus sudor adest, & per nares sanguis fluit. Vomunt quoque multi. Hic triduo moritur. Si vero septem dies transgrediat: plerique autem non transgrediuntur: & si sanguinem vomat, aut e naribus fundat, neque calida ipsum lavato, neque calefactoria adhibeto. Verum acetum album aquosum bibendum dato, & si debilis sit, pisanam sorbendam. Si vero plus iusto sanguinem vomere tibi videatur, aut ex naribus ipsi fluat, a vomitu quidem bibat farinam trimestris tritici in aquam inspersam. Si vero ex naribus fluat, venas & in brachiis, & in temporibus, splenis suppositis deligato. At si neutrum horum ipsi assuerit, dolet autem cervicis nervum, & collum, & spinam, & frigus ad cor processerit, cumervo pectora, & dorsum, & cervicis nervum, & collum calefacito. Nam his factis, inaximam utilitatem capere poterit. Verum pauci huiusmodi morbum effugiant. * Alius morbus. Sanum derepente invadit dolor circa caput, & statim vox intercipitur, & sterit, & os hiat, & si quis ipsum vocet, aut moveat, solum suspirat, nihil autem intelligit, & multum mingit, & mingere se non sentit. Hic si non febris ipsum corripit, in septem diebus moritur. Si vero corripit, plerumque sanus fit. Huiusmodi vero morbus senionibus maxime fit, & magis quam junioribus. Hunc, ubi sic habuerit, lavare oportet multa calida, & quammaxime calefacere, & aquam mulsam tepidam in os instillare. At si rescipiat, & morbum effugiat, ubi ipsum cibus rescieris, ita ut viribus valere tibi visus fuerit, indito in nares ipsius medicamento, & paucis diebus interpositis, pharmacum deorsum purgans bibendum dato. Si enim ipsum non purgaveris, timor est, ne rursus morbus revertatur. Effugiant autem non ita valde ex primo. * Alius morbus. Si quis ex ebrietate voce privetur, & statim sane ipsum etiam febris corripit, sanus fit. Si vero non corripuerit, die tertia moritur. Si itaque in ira affectum incideris, multa calida lavato, & spongas in aqua calida tinctas ad caput apponito, & cepas decoratas in nares indito. Hic si quidem apertis oculis, & loquutus, ad se redierit, & non nugetur, hae die sopote pressus jacet, postredie vero sanus fit. Si vero exurgens bilem vomuerit, insanit, & moritur maxime in quinque diebus, si non dormierit. Huius vigili hae facere oportet. Multa calida lavato, donec ipse ad se ipsum redeat. Deinde multo oleo illitum, ad stragula molliter reclinato, & vestimentis contegito, & neque lucernam apud ipsum ardere, neque loqui permittito. Ut plurimum enim ex balneo obdormit, & si dormierit, sanus evadit. Postquam vero ad se redierit, primis tribus, aut quatuor diebus, milium tenue sorbeat, aut pisanam succum, & vinum mellis speciem referens bibat. Deinde cibus utatur mollioribus, ac paucis primum.

* Cerebri corruptio.

SI corruptio cerebrum invaserit, dolor tenet maxime anteriorem capitis partem, & paulatim etiam intumescit, & livida fit, & febris, & rigor apprehendit. Quum ita habuerit, fecare oportet, qua parte intumuit, et perpurgato osse, ipsum radere, donec ad secundam laminam perveniat, deinde velut fracturam curare.

S E C T I O II.

* Caries, seu tredo.

QUum caries facta fuerit in osse, dolor ex hoc corripit ipsum os, et progressu temporis attenuatur, ac inflatur, et fit in ipso fractura. Et si hanc rescueris, comperies ipsum os elevatum, et asperum, ac solum. Quibusdam vero etiam ad cerebrum usque corrosum. Ubi in hoc modum affectum incideris, si quidem ultra corrosum fuerit, sinere optimam est, et ulcus quamcelerrime curare. Si vero corrosum non fuerit, sed asperum, ad secundam usque laminam rasum, velut praecedens curare. * Alius morbus. Si sideratus quis fiat, et anteriorem capitis

pitris partem dolet, et oculis videre non potest, sed sopor ipsum tenet, et venæ in temporibus pulsant, et febris debilis tenet, et totius corporis impotentia, et emacelcit. Quum sic habuerit, multa calida ipsum lavato, et calefactoria ad caput adhibeto. A fomentis vero myrrham, et æris florem in nares infundito. Sorbeat autem peissanæ succum, et aquam bibat. Et si quidem, ubi hæc feceris, melius habuerit, bene est; sin minus, quæ una spes reliqua est, sinciput ipsius findito, et ubi sanguis defluerit, labiis compositis curato, ac deligato. Si vero non
 15 fecueris, decimo octavo, aut vigesimo die plerumque moritur.

* Angina.

26

Febris corripit, et rigor, et dolor capitis, et maxillæ intumescunt, et spiritum difficulter deglutit. Expuit autem et salivas duras, ac paucas; et infra in faucibus stertit: et si apprehensa lingua inspexeris, gurgulum non magnus est, sed mollis, fauces autem intrinsecus saliva viscosa plene sunt, et non potest exscreare, et decumbere non sustinet, verum si decumbat, suffocatur. Hunc si ita affectum deprehenderit, hæc facito. Primum quidem cucurbitas ad verticulum in collo primum affigito. Deinde in capite præfalo, et iuxta aurem ab utraque parte apponito. Et ubi cucurbitam affixeris, ad multum tempus adliærere sinito. Postea fomentum ipsi ex aceto, nitro, origano, et nasturtii semine adhibeto. Hæc terito, et cum
 25 aceto pari aqua permixta diluito, ac parum olei instillato. Deinde in olivum infusus, opetculo addito, arundinem cavam immittito, et prunis imposita terrefacito: et ubi per arundinis fistulam vapor ascenderit, hianti ore vaporem intro trahat, cavens, ne fauces adurat. Forinsecus autem spongiæ aqua calida imbutas, ad genas, ac maxillas apponat. Gargarismus porro ipsi parandus est, ex origano, fatureia, apio, mentha, et modico nitro, cum aqua multa aquosiore, et modico aceto instillato: prædictarum herbarum folia trita, et nitrum in aqua multa diluito, tepefacito, ac sic gargariset. At si saliva supprimatur, myrrhi ramulum complanatum sumito, et tenera ipsius summa parte incurvata, ac molli lana obvoluta, in fauces immissa, salivam expurgato. Et si venter non egerat, glandem subdito, aut
 35 clysterem adhibeto. Sorbeat autem peissanæ succum, et aquam bibat. Si vero tumor ipsi oboriatur, et ad pectus intumescat, ac rubicundus sit, et ardeat, amplior spes salutis est. Facienda vero hæc sunt, postquam inflammatio foras conversa fuerit. Betas in frigidam aquam tinctas apponat. Tepidas collusiones ore gargariset, et ne lavet. Hæc faciens maxime evaserit. Est autem morbus
 40 lethalis, et paucissimi evadunt. * Alia angina. Febris, et dolor capitis corripit, et fauces inflammantur, itemque maxillæ, et salivam deglutire non potest, spuit autem crassam, ac multam, et difficulter loquitur. Quum ita habuerit, primum cucurbitam affigito eodem modo, veluti supra diximus. Deinde spongiam aqua calida imbutam, ad collum, ac maxillas adhibeto. Aquam autem ipsam aquosam colluendam dato. Et succum peissanæ sorbere cogito. Si vero ipsa facienti saliva non extierit, eodem modo, velut in priore fomentum adhibeto. At si ad pectus converteratur inflammatio, aut ad collum, betas, aut cucurbitas concisas, in frigidam aquam tinctas superimponat, et frigidam aquam bibat, quo saliva facilius exscreetur. Quum autem ad pectus extumuerit, plerique
 50 evadunt. Si vero salivæ, ac tumoribus sedatis, morbus ad pulmonem conversus fuerit, febris statim corripit, et lateris dolor, et ut plurimum moritur, ubi hoc factum fuerit. Si vero quinque dies effugerit, suppuratus sit, si non ipsum statim tussis invaserit. Si vero invaserit, facta exscreatione depurgatus, sanus fit. Huic quamdiu dolor latus tenuerit, latus calefaciendum est, et adhibenda, quæ in peripneumonia adhiberi solent. At si quinque dies effugerit, et febris remiserit, tussis autem remanserit, primis quidem diebus sorbitionibus utatur. Postquam autem cibos sumere inceperit, quampinguissimos, ac maxime salso edat. Quod si
 55 tussis non affuerit, nimirum suppuratum fieri scito, et ubi coenavit, quum dormire volet, allium edat crudum quamplurimum, et vinum insuper bibat vinosum meracius. Et si quidem ita pus eruperit, bene habet; sin minus, posttriduo calida loto suffumum adhibeto, et si eruperit, velut suppuratum curato. * Alia angina. 28
 65 Linguae posterior pars inflammatur, itemque locus sub tonsillis ad guttur, et neque salivam, neque quicquam aliud deglutire potest. Si vero coactus fuerit, per nares ipsi effluit. Quum ita habuerit, mentam viridem tritam, apium, origanum, et niterum, et rhoem ribeum melle diluito, et ad crassam formam redacta, inrus lingue, qua parte tumet illinito. Postea ficus aqua coquito, et de rhoe parum tritum, hoc ficum decocto diluito, ac gargarisandum dato, si id potest; sin minus, collendum. Bibendam vero aquam de farina crassa in ipsa macerata exhibitio. Foris autem cervicem, et maxillas, farina calida in vino, et oleo cocta integito, et pannes calidos apponito. Suppuratur enim plerumque in loco sub tonsillis, et si quidem
 70 sua sponte eruperit, sanus fit. Si vero non rumpatur, ubi digito contigeris, an molle sit, ferramento acuto ad digitum alligato perforato. His adhibitis, multi sani fiunt. Est autem hic morbus minime lethalis.

* Quæ,

39

* Uva, morbus.

SI uva morbus in faucibus fiat, summa gurgulionis pars aqua impletur, & rotunda fit, ac pellucida, & expirationem intercipit. Et si maxillæ ab utraque parte inflammatae fuerint, suffocatur. Si vero ipse morbus per se consistat, maxillis non inflammatis, minus moritur. Quum sic habuerit, gurgulionem digito apprehensum sursum ad palatum apprimito, & summam ipsius partem præsecato. Postea foliorum hortensium condimentariorum decoctum gargarifandum dato, & farinam frigidam delingendam, aquamque insuper bibendam; & ne lavet. 80

30

* Tonsillæ, morbus.

SI tonsillæ fiant, intumescunt sub maxillis ab utraque parte, & ad contactum foris durum est tuberculum, & gurgulio totus inflammatus est. Quum sic habuerit, immisso digito tonsillas protrudito, ad gurgulionem autem forem æris siccum illinito: & foliorum condimentariorum horrentium decoctum, velut a sole calidum gargarifandum dato. Foris qua parte tumor est, ordeaceam farinam vino, ac oleo coctam, foris ubi tumor est, imponito. Gargariset siccum decoctum, & ne lavet. Postquam autem purulentum factum fuerit, secato. Aliquando vero sua sponte erumpit, & sedatur non sectum. Si vero foras suppuraverit, perurito. Quædam etiam sua sponte sedatur. 85

31

* Tuberculum sub lingua.

SI tuberculum sub lingua, hypoglossis appellatum, fiat, lingua intumescit, & pars sub ipsa, ac externa ad tactum dura est, & salivam deglutire non potest. Quum sic habuerit, spongiam aqua calida imbutam apponito, & ordeaceam farinam vino, ac oleo coctam, foris ubi tumor est, imponito. Gargariset siccum decoctum, & ne lavet. Postquam autem purulentum factum fuerit, secato. Aliquando vero sua sponte erumpit, & sedatur non sectum. Si vero foras suppuraverit, perurito. 95

32

* Inflammatio conficiens ad palatum.

SI inflammatio confiterit ad palatum, intumescit, & suppuratur. Quum sic habuerit, tuberculum urito. Ubi vero exierit pus, reliquum eluito primum nitro, & aqua calida, deinde vino. Postquam autem elueris, uvam passam albam exemptis vinaceis tritam, in usuræ locum indito, & ubi exciderit, vino meraco tepido colluat, & ubi edere quid, aut sorbere valer, spongiam indat, atque hæc faciat, donec sanus fiat. 100

33

* Polypus.

SI polypus fiat in naso, ex medio cartilaginum dependet, veluti gurgulio, & ubi expirationem facit, progreditur foras, & est inollis, ubi vero inspirationem facit, retrocedit; & loquitur obscure, & quum dormit, sterit. Quum sic habuerit, spongiam in rotundum concisam, & velut speram factam, luno Aegyptio obvolvito, ac duram efficito. Sit autem eius magnitudinis, ut ad nasum quadret. Spongiam vero quadruplex lineo filo deligato, ita ut inumquodque longitudinem habeat cubitalem. Deinde facto uno ipsorum principio, virgam stanneam tenuem sumito, quæ ad alteram sui partem foramen habeat, & transmissa per foramen filorum principio, virgam in acutam in os transmittito, & attrahito, donec filorum principium apprehendas. Postea specillo instar unguis bifurcato sub gurgulionem subposito, retinens trahito, donec polypum extraxeris. Postquam vero ipsum extraxeris, & sanguis fluere desierit, secum linamentum specillo obvolvito indito, & de cætero æris flore in melle cocto, linamentum illud, atque sic in nasum inde. Et ubi jam ulcus curatum fuerit, plumbum efformatum, ita ut ad ulcus perveniat, melle illine, & donec sanus fiat, appone. * Alius polypus. Impletur nasus carnis, & ad contactum caro dura apparet, & per nasum spirare non potest. Quum sic habuerit, fistula immissa, ferramentis tribus, aut quatuor urito, & post unctionem veratrum nigrum tritum injicito, & postquam computruerit, ac exciderit caro, linamenta melle illita cum æris flore indito, & ubi curatum fuerit ulcus, plumbeas massas, sive fistulas melle illas immitte, donec sanus fiat. Alius polypus. Intrinsecus ex cartilagine caro rotunda prominet, quæ ad contactum mollis est. Quum ita habuerit, chordam nerveam accipito, & facta in ipsa parva ansula, eam tenui filo obligato, deinde alterum principium per ansulam transmittito, alia maiore ansa facta. Postea principium illud per virgam stanneam transmittito. Deinde ansam illam maiorem in nasum indito, & specillo infecto ipsam circum polypum obducito, ac adaptato, & ubi circumscripta fuerit, virgam in os transmittito, & arreptam ipsam trahito, eodem 125

- eodem modo specillo instar ungulae bisurcato supposito sub gurgulionem, ac renitente. Postquam autem extraxeris, curato velut superiorem. Alius polypus. Intrinsecus circa cartilaginem alicunde durum quid nascitur, & videtur quidem caro esse; si vero ipsum attigeris, strepitum edat, velut lapis. Quum sic habuerit, fillo per scalpellum naso expurgato, deinde inurito. Atque hoc factum nasum rursus confuuto, & sulcus curato, linamentum melle illitum indens, & ubi computruerit, aeris florem cum melle illinito. Fiat autem curatio plumbeis massis ita demum immisissis. Alius polypus. Nascuntur ex obliquo cartilagini in summo, velut cancelli. Omnes autem hos urere oportet, & post unctionem veratrum inspergere; postquam autem computruerint, aeris flore cum melle expurgare. Curatio autem etiam plumbo immisso fiat.

* *Atarbus regius niger.*

35

- 140 **C**olor fit niger circa faciem, & maxime circa partes, velut in umbra occultatas; & oculi cum virore pallidi, itemque lingua inferne, & vena sub lingua crassa, ac nigra; & est homo sine febre, ac mingit urinam crassam, biliosam. Quum ita habuerit, primum venas sub lingua secato, deinde calida multa loto, asphodeli radices bibendas ieiuno dato, ita ut aequales quinque radices depurgatas in vino coquas, & apii foliorum, quantum manus plena capit, adas. Assindito autem vini dulcis tres heminas dimidiatas Aeginenses, ut a coctura semihemina supersit. Hoc permixtum bibendum dato. Postquam autem minxerit, cibis alvum subeuntibus utatur, & a cibo cicet album edat, & vinum album, multum, aquosum bibat, & apium, ac porrum in cibo edat, faciat autem haec per dies septem, & si quidem in his color probe depurgatus esse tibi visus fuerit, bene est; sin minus, etiam alios tres haec faciat. Postea interposita una atque altera die, medicamentum ad nares apponito. Deinde pharvacum deorsum purgans bibendum dato, a quo bilis purgatur. Et si splenicus fuerit, asinum huc, aut serum postea exhibeto. Haec faciens, sanum efficies. Alius morbus regius. Febris corripit debilis, & gravitas caput tenet, & quibusdam sane febres cessant. Ipse vero fit cum virore pallidus, & maxime oculi, & debilis est, & corporis impotentia adest, & urinam crassam cum virore pallidam emittit. Hunc calida lavato, & urinam cientia bibenda dato. Postquam autem purior esse tibi visus fuerit, & color melior apparuerit, medicamentum ad nares appone, & postea deorsum purgans bibendum praebe. Cibis autem utatur quamvis mollioribus. Vinum bibat album, dulce, aquosum. Haec faciens, sanus evadet.

* *Febris a bile.*

36

- S**i bile infestatur homo, febris ipsum corripit quotidie, ac dimittit. Detinet autem in meridie; & os amarum est, & quum sine cibo manet, offendit hoc ipsum. Ubi vero edierit, strangulatur, & a modicis quibusdam cibis impletur, & abominatur, & vomitiones ipsum invadunt; & ad humbos, ac crura gravitas incumbit, & multum dormit. Hic, si post febre exudarit frigidum, ac multum sudorem, & febre non liberetur, morbum dururnum sentiet. Si vero non sudarit, citius judicatur. Quum sic habuerit, & ad nonum diem devenerit, pharvacum dato. Nam si statim a febris initio dederis, postquam purgatus est, febris repetit, & rursus medicamento opus habet. At si os non afficiatur, verum ad imum ventrem totum irruat, pharvacum deorsum purgans bibendum dato, & postea lac asinum, aut serum, aut aliquem succum. Si vero debilis fuerit, per clysterem substitus eluito. Ante medicamentum vero potionem, si quis febricit, danda est ipsi aqua multa aquosa. Altera autem die, qua febris detinet, aquam frigidam, quantum bibere volet, dabis. Ubi vero remiserit febris, prisanæ succum, aut milium tenue sorbeat, & vinum album, odoratum, aquosum insuper bibat. Si vero febris neque noctu, neque interdum remittat, & ad contractum supernas partes habeat calidas, venter autem, & pedes frigidi sunt, & lingua aspera; huic medicamentum ne dederis, sed molli insulo per clysterem subluito, & prisanæ succum bis in die frigidum forbendum dato, & vinum aquosum insuper bibendum. Reliquo vero tempore aquam frigidissimam bibat. Hic, si quidem septima die exudarit, & febris ipsum dimiserit, bene est; sin minus, decimaquarta die pleurumque moritur.
- * *Alia febris.* Foris ad contractum febris debilis est, intrinsecus autem asperdet, & lingua ipsius aspera est, & per nares, & per os spirat calidum. Quinta die praecordia dura sunt, & dolor inest, & calor, qualis in morbo regio apparet, & crassam, ac biliosam urinam ejicit. Hunc, si septima die rigor, & febris vehementer apprehenderit, & exudarit, bene est; sin minus, moritur septima, aut nona. Corripit autem maxime hic morbus, si non inaequalis fuerit. Quum sic habuerit, quotidie calida lavato, aquamque multam aquosam multam bibendum danto, & prisanæ succum frigidum bis in die forbendum. A forbitione vero vinum bibat aquosum, album, modicum. Si vero alvus non egerat, clysterem adhibeto, aut

ro, aut glandulam subito. Cibus autem ne exhibeas, donec febris remittat. Ubi vero sedata fuerit, pharmacum deorsum purgans bibat, Revertitur enim quandoque morbus, si impurgatus permanserit. Et amplius morbus hic rursus corripit, si sanguis nimium biliosus factus fuerit. * Alia febris. Si tertiana febris tenuerit, si quidem non omnibus tribus invasionibus, quarta corripit, pharmacum deorsum purgans, bibendum dato. Si vero pharmacum non opus habere tibi videatur, radicem quinque folii tritatum acescibili mesuram ex aqua bibendam dato. Si vero neque sic cesset, multa calida lota, trifolium, & filipii succum, in vino pari aqua ammixta, bibenda præbeto, & reclinato vestimenta multa integro, donec exsudet. Postquam vero exsudarit, si sitiar, polentam cum aqua bibat. Vesperti autem milium coctum renue sorbeat, & vinum insuper bibat, donec febris cesserit, & cibus quammolliissimis utatur.

* Febris quartana,

Quum febris quartana ex alio morbo non purgatum apprehenderit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato. Deinde caput purgato. Postea rursus infra purgato. Si vero his factis non cesset, interpositis duobus invasionibus post purgationem infernam, multa calida ipsum lavato, & seminis hyoscyami milii magnitudinem, & mandragoræ tantundem, & succi filipii trium fabarum magnitudinem, & trifolii tantundem, in vino meraco bibat. At si firmus, & sanus se esse putans ex lassitudine, aut protectione febre correptus, ad quaranam deveniat, fomentis ipsi adhibitis allium dato, in melle tinctum. Deinde lenticulæ decoctum bibat, melle, & aceto ammixtis. Postquam autem repletus fuerit, vomat. Postea calida lotus, ubi frigidus fuerit, cyceonem ex aqua bibat. Vesperti cibus mollibus, & non multis utatur. Altera vero exacerbatione, ubi multa calida laveris, & stragula ipsi intexeris, donec exudet, statim veratri albi radices trium digitorum longitudine, & trifolii drachmam, & succi filipii duarum fabarum magnitudinem in vino meraco bibat. Et si vomitiones ipsum urserint, vomat. Sin minus, post caput purgatum. Cibus autem utatur quammolliissimis, & acerrimis. Quum vero exacerbatio ipsum invaserit, jejuniis medicamentum ne bibat.

* Pleuritis.

Pleuritis, ubi corripuerit, & febris, & rigor tenet, & dolor per spinam ad pectus, & erectæ cervicis spiratio, & tussis, & saliva alba, ac subbiliosa, & non facile per tussim rejicit, & per inguina dolor est, & cruentam urinam mingit. Quum ita habuerit, siquidem febris septima die remiserit, sanus evadit. Si vero non remittat, debeat morbus ad undecimum, aut decimumquartum diem. Et sane multi in his diebus moriuntur. At si decimumquartum transgrediatur, evadit. Quum ita habuerit dolor, calefactoria adhibeto. Bibat autem mel, aequali aceto affuso coctum, ita ut quanta fuerit mensura cocti mellis, & aceti, undevigesimam partem aquæ affundas. Hoc paulatim, & frequenter bibendum dato, & postea quoque aquam modico aceto affuso ammisceto. Sorbeat & milii succum, melle modico adtilato frigidum, quartæ heminae partis mensura, quoties urrumque cibum sumit, & bibat vinum album vinosum, aquosum modicum. Sit autem vinum quammolliissimum, odorem non habens. Ubi vero febris dimiserit, per biduum milium bis in die sorbeat, & betas jucundissime paratas edat. Deinde catulum, aut aviculam coquat, & jus sorbeat, & de carnibus parum edat. Reliquo vero tempore, maxime quando a morbo teneris, in prandio milium sumat, vesperti cibus paucissimis, & molliissimis utatur. * Alia pleuritis. Febris tener, & tussis, ac rigor, & dolor ad latus, & quandoque ad claviculam, & salivam spuit subbiliosam, ac subcrenentam. Quod si ægro abscessus rupius fuerit, qua parte dolor maxime urget, calefactoria adhibeto, & calida lavato, si non magna febris ipsum teneat. Sin minus, non. Bibendum autem dato solum in aqua maceratum, ita ut aquam jam subdulent facias, & postea quoque aquam ammiscens. Sorbeat prisanæ succum bis in die, & vinum inde bibat album, aquosum. Et si quatuordecim dies effugerit, sanus evadit. * Alia pleuritis. Febris derinet, & dentium stridor, & tussis sicca, & cum virore pallida rejicit, quandoque etiam livida, & dolor latus corripit, & dorsum subtribidum fit. Caput, & pectus calefcunt, aliquando etiam venter, & pedes, & crura. Et quum erectus sedet, magis tussit, & alvus turbatur, & alvi egestio cum virore valde pallida est, ac graveolens. Hic in viginis diebus moritur. Si vero has effugerit, sanus fit. Hinc, donec quatuordecim dies præterierint, aquam de farina crassa in ipsa macerata bibendam dato, & vinum album vinosum, aquosum postea bibendum. Sorbeat succum prisanæ frigidum bis in die. Verum præ melle mali punici succum ad prisanæ succum admisceto, postquam jam hic prisanæ succus coctus fuerit, & laver non multa. Ubi vero quatuordecim dies præterierint, in prandio milium sumat. Ad vespertam carnis avicularum cum juseulo, & paucis cibus utatur. At talem morbum pauci effugiunt.

- 255 **F**ebris detinet dies quatuordecim ut minimum, ad summum duas de viginti, & per hos dies fortiter tussit, & primum quidem excreat salivam crassam, ac puram, septima, & octava die. Si vero febris corripuerit nona, ac decima, subdulcem, & purulentam, donec quatuordecim dies praterierint. Et si quidem decimaquinta die pulmo resiccatus fuerit, & tussiendo rejecerit, sanus fit, sin minus, duas
260 de viginti observato, & si quidem in his diebus tussis sedata fuerit, evadit. Si non sedata, interrogato ipsum, an saliva ipsi dulcior appareat, & si hoc confessus fuerit, morbus annuum durabit. Nam pulmo suppuratus fit. Huic primis diebus vitum dare convenit dulce, album, aquosum, paulatim frequenter bibendum. Sorbeat etiam prisanæ succum melle ammixto bis in die, donec dies decem & octo
265 praterierint, & febris desiverit. Perichitatur autem maxime in septem, aut quatuordecim. Postquam autem decem & octo dies transgressus fuerit, non amplius moritur, sed pus spuit, & pectus dolet, & tussit. Quum sic habuerit, jejuni cum saliva vini illam potionem bibat, & leguminis fressi decoctum sorbeat, adipe multo ammixto, si non calor fuerit. Si vero fuerit, ne sorbeat, sed eibus utatur
270 salis, ac pinguibus, & marinis potius, quam carnis. Et si pro ratione purgari tibi visus fuerit, in os infundito, ac fomenta adhibeto: si quidem crassum fuerit pus, fomenta adhibeto; si vero tenue, infundito, & ex eibus hæret quammaxime, & ab acerbis abstineat, & a carnis bubulis, ovillis, ac porcinis.

- 275 **Q**uam ex peripneumonia suppuratus factus fuerit, febris detinet, & tussis sicca, & difficultas spirandi, & pedes intumescunt, & manuum, ac pedum ungues contrahuntur. Hunc ita affectum ad decimam diem a suppurationis initio progressum, multa calida lavato, & ari radicum tali magnitudine tritam, & salis granum, & modicum mellis, & aquam, & olei parum, extracta lingua tepida infundito, & postea humerum concutito. Et si quidem ab his pus erumpat, bene habet, sin minus, aliud facito. Cibus acres, & cyclaminum exsuccato, sitque succi utrorumque acetabulum parvum, deinde sulphur siccum saba magnitudine terito, ac diluto in vino alio, & lactis caprini, aut asinini acetabulum ammictero. Hoc tepidum infundito, Quod si ab hoc non erumpat, raphani corticem, & aris florem, trium fabarum magnitudine terito, Sit autem raphani duplum, & oleo diluto quarta hemi
280 ne parte. Hoc tepidum infundito. Et si eruperit pus, eibus quamvis salis, ac pinguisimis utatur. At si non prodierit pus, paulatim fomentum adhibeto in os ex sii iucco, vino Torno, lacte bubulo, aut caprino, singulis pari mensura permixtis, ita ut sint hemina tres, in quas per stria lani testas igni candefactas imposito, atque inde vaporem per fistulam trahat, cavendo, ut ne aduratur. Postquam autem pus
290 rursus jam spiritum prodierit, utricæ semen, thus, organum in vino albo, melle, que, ac oleo modico ipsi infundito, atque per tertium diem, postea vero butyrum, resinam in melle eliquatam. Et eibus non amphius utatur salis, neque pinguibus. At diebus interpolatis, infusionum oris usu cessante, salivam, rutam, saturejam, origanum, pari portione jejuni ex vino bibat acetabuli mensura, omnibus illis interperis. Quod si ab infusionibus his oris non eruperit, nihil miri est. Saepè enim
300 prorumpit ad alvum, & statim melius habere sibi videtur, ubi ex angustulo ad ampliore regionem venerit. Alius morbus. Quum tempus longius protrahitur, & febris vehemens, ac tussis corrupta, & latus dolet, & ad sanam partem decumbere non potest, sed ad doloctum. & pedes, & oculorum cavitates intumescunt, hunc, ubi decimus quintus ab eruptione dies adest, multa calida lotum in sella firma collocato, & alius quidem manus ipsius teneat, tu vero humerum concutito, ut audias in utrum latus affectio strepitum edat, optandum autem esset in sinistro. Hunc ipsum igitur locum feces; minus enim lethalis est. Si vero præ
305 crassitudine, ac copia strepitum non edat, quo ipsum cognoscere possis, (nam hoc aliquando contingit) utrum latus tumuerit, ac magis doluerit, hoc infine secato retro tumorem, magis quam ante ipsum, quo pus exitus facilem fluxionem habeat. Secato autem inter costas per novaculam primum cucur, deinde scapelluaculo, quod panniculo sit obligatum, ita ut summa ipsius pars ad unguis magni digiti mensuram expedita resset, quam intromittas. Postea emissio pure, quantum visum fuerit, vulnus linamento ex lino crudo; alligato foras propendens filo, concludito, & quotidie semel pus educito; postquam autem decimus assuerit dies, omni pure emissio, linamentum ex lino indito. Deinde vinum, & oleum tepidum per fistulam infundito, ne pulmo a pure humectari solius derepente resicceat. Emitterendum autem est id, quod mane infusum est, ad vesperam; quod vespera, mane. Ubi vero pus tenue, velut aqua fuerit, & ad digiti contactum viscosum, ac modicum, penicillum stanneum cavum indito. Postquam autem omnino venter resiccatus fuerit, paulatim linamentum præfectum imposito, donec ulcus coalescat, & ipsum
315 peni-

penitus eximas. Signum autem an evasurus sit, habes, si pus album, ac purum fuerit, et si fibræ sanguinis insint, plerumque sanus sit. Si vero prima die profluat lutei ovi speciem habens, aut secunda die desinat crassum, cum virore subpallidum, siccum, 320 rursus, ubi pus, effluxit. * Alius morbus. Quum quis ex pulmonis affectu tabescit, is salivam crassam, cum virore subpallidam, dulcem, tussiendo rejicit, et stridor, ac dolor ad pectus, et ad dorsum fit, et in faucibus tenuis sibilus auditur, et fauces sicæ sunt, et oculorum cavitates rubicundæ, et vox gravis, et pedes intumescent, et ungues contrahuntur, et supernæ partes attenuantur, ac imminuuntur, 325 et salivam abominatur, ubi exsistaturus ipsam in ore habet, et tussis mane maxime, et circa mediam noctem, immo etiam aliis temporibus. Et corripit magis hic morbus mulierculam juveniculatam, quam vetulam. Huic, si jam pili de capite desuane, et nudum sit caput, velut ex morbo; et si primis insipienti saliva graveolens sit, intra breve tempus ipsum moriturum esse pronuncia; id vero, quod occider, alii profluviu fore. Ubi enim jam pus circa cor pueruerit, nidorosum odorem primis injectum de se præbet, et cerebrum concalescens fassuginosum humorem effundit, qui alvum movet. Huius autem signum est, quod capilli ex capite desuane. Hunc, ubi ita habuerit, ne curato. Si vero a principio morbus obtigerit, lenticulæ decoctum bibendum dato. Deinde interposita una die, veratrum dato temperatum, ut ne alvum infernam moveat. Et quum noctu ad os fassuginosus humor ipsi insint, medicamenta ipsi frequentiora ad nates appone. Si vero non fuerit, appone quidem, sed rarius, et mente semel, ita ut insuper veratrum bibendum des, quantum duobus digitis comprehendendi potest, in vino dulci temperato. Statim vero lenticulæ decoctum inde bibendum dato. At medicamenta quampaucissima bibat, si non febres acutiores ipsum corripiant. Radicem draconthi albam, et veratri delingat, sed non ex melle. Sic enim minime alvum movebit. Si vero tormen in alvo inferna oboriatur, primum per clysterem illud insulum immitte, in quod coctus enidius ammiscetur. Quod si neque sic sedetur, lacte asinino cocto purgato, pharinaeum autem nullum dorsum purgans dato. Si vero ante medicamentum, præpotato veratro, bilem vomat, ab ipso lenticulæ decocto accepto, vomat. Cibus autem utatur, si febres acutæ tenuerint, carnibus ovilliseoctis, et voluerum, et cucurbita, et betæ. Jusculum autem ne sorbeat, neque ad inenctus utatur. Piscibus utatur scorpiis, et cartilaginei generis cocti. Calidum vero nihil edat, neque lavet, si febris multa teneat. Neque oleribus acerbis utatur, præterquam fatureja, aut origano. Vinum bibat album. Si vero sine febre sit, calores autem alias atque alias corripiant, pisces edat optimos, ac pinguisimos, et pinguis, et dulcia, et quammaxime fassa. Et deambulationibus utatur neque in ventos, neque insule. Et a cibus vomat, ubi tempestivum visum fuerit. Et calida lavet, capite exerceo. Ex cibis fermentaceis præstat panis his, qui non maxam edere soliti sunt. Maxam vero edere solitis, utraque dato. 335

SECTIO III.

* Alius morbus appellatus Tabes.

TUffis vexat, et sputum multum, ac liquidum, et quandoque facile tussiendo rejicitur etiam pus, veluti grando, quod dum digitis concutitur, durum, et male olens est. At vox pura est, et doloris exors, et febres non corripunt, verum calor quandoque alias atque alias, atque hic debilis. Huic veratrum bibendum est, et lenticulæ decoctum, et large cibus sumendus, ita ut abstineat ab acerbis, et carnibus bubulis, ac porcinis, et ovillis. Exerceatur modice, et deambulet, et a cibus vomitu utatur. A venere abstineat. Hic morbus per annos septem, aut novem durat, quod si ab initio ager curatus fuerit, sanus evadit. Alius morbus. Si ex servitio ulcere, apheia appellato, pulmonis fistula laboraret, febris debilis tenet, et dolor medium pectus, pruritus corporis adest, et vox rauca, et salivam liquidam, ac tenuem sput, quandoque etiam crassam, velut prisaæ succum. Et in ore odor oboritur ipsi gravis, velut a piscibus crudis, et alias atque alias in saliva apparent durs, velut fungus ab ulcere, et supernæ partes attenuantur, atque adeo homo totius, et circuli faciei rubescunt, et progressu temporis ungues contrahuntur, et aridi, ac cum virore pallidi fiunt. Moritur autem statim, si non curatus fuerit, sanguinem ac pus spuens, postea etiam febres vehementes accedentes ipsam perimunt. Si vero curetur, effugit ex hac tabe. Curare porro oportet, ut lenticulæ decocto potu vomat. Quod si tempestivum esse visum fuerit, veratrum bibat, si quidem potens fuerit homo, per se, si minus, dimidium portiois ad lenticulæ decoctum ammisceto, ita ut in quinta, aut sexta portione desinat. At ventrem infernum medicamento ne moves, si non febres fortes corripuerint. Si non autem corripuerint, lacte asinino subius purgato. Quod si debilis sit, ut bibere non possit, per clysterem insundito. Migus autem caput moveas, & si quidem saliva ad os prodierit multa, ac fassuginosa, ad nates apponito quid, quod bilem non ducat. Si vero fluxio, ad os non fiat, nihil

- 35 nihil capiti adhibeat. Ubi autem saliva graveolens fuerit, interpositis inter lenticula decocti usum diebus, medicamentum in pulmonem infundito, & interposita una die suffito. Cibis utatur carnibus ovillis, & volucrium, & piscibus cartilaginei generis, & scopis coctis. Quarto vero quoque die salamentum edat optimum, ac pinguisimum, & in prandio mazam sumat, in cena vero etiam panem ad hanc addat, & nihil sorbeat, neque cyceonem bibat, si edere poterit: Porro obsonia condant, ac edat sesamo pro tritico, & coriandro, ac anetho. Silphio autem ne utatur, neque alio quopiam odore acri, præterquam origano, aut thymo, aut ruta. Deambulationibus autem utatur ante, & post cibum, vitans ventum, & solem. Ab ebrietatibus, & re venerea abstineat. Lavet tepida, excepto capite, quod quamrariissime lavari debet.

* *Tabes dorsalis.*

49

- 35 **D**orsalis tabes a medulla fit. Corripit autem maxime recentes sponfos, & veneri deditos. Sunt autem sine febre, & bene cibum capiunt, ac consumuntur. Et si interroges ita affectum, diceret sibi superne de capite in spinam velut formicas descendere videri, & ubi mingit, aut ventrem exonerat, prodit ipsi genitalis semen multum, ac liquidum, & genitura in utero non manet, & in somnis semen profundit, sive dormiat enim uxore, sive non. Et quum iter fecerit, aut cucurrerit tum alias, tum ad acclivem locum, anhelatio, ac debilitas ipsum corripit, & capitis gravitas, & aures sonant. Hunc temporis progressi, ubi febres fortes ipsum corripuerint, perdunt febres lypyriae. Quum ita habuerit, si ab initio curandum susceperis, somento per totum corpus adhibito, medicamentum sursum 45 purgans bibendum ipsi dato, & postea caput purgato. Deinde deorsum purgans exhibito. Optandum autem fuerit, ut vere hanc curationem aggrediamur. Postea vero forum, aut lac asinum bibendum dato. Cæterum bibendum lac per quadraginta dies bibendum præbero. Ad vespertam vero quandiu lac potat, aliam sorbendam dato. A cibis autem abstineat. Postquam vero lac bibere cessarit, cibis mollioribus reficito, ex modico initium sumens, & quammaxime crassum, ac pinguem facere studeo. Per annum ab ebrietatibus, & venere, & laboribus abstineat, exceptis deambulationibus, in quibus vitet frigus, & solem. Tepida autem lavet.

* *Pulmonis morbus.*

50

- 35 **S**aliva crassa, ac saliginosa, tussi rejicitur, & color niger, ac suburgidus est, & dolores tenues sub pectus, & sub scapulas sunt, & ulcera ipsis agre sanescunt. Minus tamen periculosus est hic morbus supetiore, & plures evadunt. Hunc veterum bibere oportet & per se, & lenticula decocto ammixtum. Insundere etiam in pulmonem oportet, ac suffumum facere. Cibis quoque large utatur, abstinendo a carnibus bubulis, ovillis, & porcinis, & ab acribus oleribus, præterquam origano, aut satureja. Utatur deambulationibus. Mane vero jejunus ad acclivem locum iter faciat. Deinde folia condimentaria hortensia bibat in vinum temperatum inspersa. Deinde vero cibis relatis utatur.

* *Arteria vulnerata.*

51

- 35 **S**i vulnerata fuerit arteria, tussis habet, & sanguinem tussiendo rejicit, & fauces sanguine latenter implentur, & grumos elicit, & dolor fit acutus ex pectore ad dorsum, & saliva viscosa, ac multa, & fauces siccae, & febris, ac rigor corripit, & strident fauces, velut a pinguedine, atque hæc ad quindecim dies patitur. Postea vero pus spuit, & velut ulceris ricinos, bronchia in pulmone cartilaginea, & rursus tussit, & sane sanguis erumpit, & postea pus crassius spuit, & febris fortior fit, & in pulmonem definit, & vocatur ruptio pulmonis. At si post primum 70 sanguinem pus non spuat, a laboribus, ac exercitiis quiescere oportet, & vehiculum inscindere, abstinereque a cibis salis, ac pinguis, & ab oleribus acribus, & postquam ipse se ipsum optime corpore affectum esse putat, pectus, ac dorsum inuito, ex parte utrumque, & postquam ulcera sana fuerint, per annum abstineat ab ebrietate, & ac nimium impleatur, neque manibus laboret, neque vehiculum inscindat, sed studeat, ut corpus quammaxime crassum efficiat.

* *Articuli pulmonis convulsi.*

52

- 80 **Q**uam articuli pulmonis fuerint convulsi, spatium spuit album, quandoque vero cruentum, & desipit, & febris tenet, & dolor pectus, dorsum, ac latus, & si se vertat, tussit, & sternutat. Huic, qua parte dolor fuerit, calefactoria apponito, & centaurium, & daucum, & salviae folia trita, melle, & aceto affusa, præforbenda dato, & aquam insuper sorbendam. Et persanæ succum præforbeat, & vinum aquosum insuper bibat. Postquam vero dolor sedatus fuerit, salivam tussam, ac cribatam, &

tam, & hypericam, & irionem trita, & polenta, singula paribus portionibus, in vinum temperatum coniecta, jejuno bibenda præbeto. At si jejunos non sit, leguminis fressi decoctum sine sale forbendum dato. Si vero calor fuerit, cibis utatur mollissimis, non salis, & minime nidorosis, ubi jam probe se habuerit corpus, & in 85 pectore, & in dorso. At si ambo convulsa fuerint, tussis emergit, & saliva crassa, ac alba apparet, & dolor acutus adest ad pectus, & sub scapulas, ac latus, & ardor derinet, & rubicundis in tibiis circulis impletur, & pruritum habet, & non sustinet neque sedere, neque jacere, neque stare, sed agere afficitur, ac viribus deficit. Hic quarta die maxime moritur. Si vero hanc effugerit, spes neque sic multa superest, 90 verum periclitatur & in septima. Quod si & hanc effugiat, sanus evadit. Hunc ubi sic habuerit, multa calida bis in die lavato. Er quum dolor habuerit, calefactoria adhibeto, & mel, & acetur bibendum dato, & prasanæ succum sorbendum, & vinum album vinosum insuper bibendum. Si vero ad balneum, & calefactoria affligatur, ipsaque non sustineat, crassi liniei panniculos ipsi adhibeto, quos aqua tinctos 95 in pectus, ac dorsum imponas. Et favum mellis aqua frigidissima macerato, aquamque bibendam dato, & frigidum prasanæ succum, & aquam insuper bibat, & ad frigus decumbat. Hæc facienda sunt, Verum morbus lethalis est.

53

* Erysipelas in pulmone.

Si erysipelas in pulmone fiat, tussis habet, & salivam expuit multam, ac liquidam, 100 velut de guttute, non est autem cruenta, & dolor tenet dorsum, & vacuas partes ventris, ac laterum molliitudinem, & viscera sugunt, & vomit pituitam, ac velut acetum, & dentes rupefciunt, & febris, ac rigor, & sitis corripit, & ubi quid derit, in visceribus fugit, & acidum eructat, & venter stridet, & corpus torpescit, & ubi vomuerit, melius se habere putat. Quum autem non vomuerit, digressa die tormen, & dolor in ventre oboritur, & excrementum alvi liquidum procedit. 105 Hic morbus maxime fit ex ebriariis, & carniis elii, & ex aquæ murarione. Sed & ex aliis causis emergit. Huic pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & lac asinum insuper bibendum, si non natura fuerit splenicus. Si vero splenicus fuerit, ne purges neque succis, neque lacte, neque sero, sed eo, quod modicum ingestum multum educet. Per clysteres quoque infusio in alvum fiat, & glandulæ subdantur in omnibus morbis, si alvus non egerat. Adhibendum est & frigidæ lavacrum in hoc morbo, & exercitium, ubi febres remiserint, & corpus leviter se habere visum fuerit. Et vere, & autumno vomitus inducatur. At vero alii capita, & origani pugillum, quantum tribus digitis apprehendi potest, duabus heminis vini dulcis affusis, & aceti acerrimi hemina una, & mellis quarta heminae parte, coquito, donec tertia pars reliqua fiat. Deinde ubi hominem exercueris, & aqua tepida laveris, calidum hoc bibendum præbeto. Dato etiam lenicula decoctum, melle, & aceto ammixtis, donec impleatur. Deinde vomat, & ea die pota polenta, & aqua, ita jejunos permaneat. Ad vesperam vero betam edat, & parum de maza, & vinum aquosum bibat. Reliquo vero tempore a lenicula decocto, & a cibis vomat. Et si discesserit dolor sub scapulas, cucurbitam affigito, & venas in manibus pertundito. Cibis porro uratur non salis, neque pinguius. 110 Acrida autem, & acida edat, & frigida omnia. Utatur & deambulationibus. Hæc si fecerit, optima victus ratione usus fuerit, & per plurimum tempus morbus prorogari poterit. Est autem non lethalis, sed consenscentes relinquit. Si vero junorem aliquem citius a morbo liberare voles, ubi ipsum purgaris, pectus, & dorsum inurito. 115

54

* Morbus dorsalis.

Rigor, & febris, & tussis, & spirandi difficultas corripit, & salivam spuit cum virore pallidam, quandoque etiam suberientam, & dolet maxime dorsum, & inguina, & terria, aut quarta die cruentam urinam mingit, & moritur septima die. 120 Si vero quatuordecim dies effugerit, sanus evadit, effugit autem non ita valde. Huic aquam musam bibendam dato, in olla nova fervescentem, & perfrigeratam, & apii, aut feniculi radice corice in ipsa macerato. Dato & prasanæ succum bis in die, & vinum album aquosum insuper bibendum. Qua vero parte dolor constitit, calefactoria adhibeto, & calida lavato, si non febris multa vexet. Postquam autem quatuordecim dies præterierint, in prandio quidem sumat milium, ad vesperam vero carnes catulinas, aut volucrium coctas edat, & de jasculo sorbeat. Cibis autem quam- 125 paucissimis primis diebus utatur.

55

* Tuberculum in pulmone.

Quum tuberculum in pulmone natum fuerit, rufus tenet, & erectæ cervicis spirario, & dolor ad pectus acutus, & ad latera, & usque ad quatuordecim 130 dies ita afficitur. Nam plerisque per tot dies tuberculi affectio inflammatur. Sed & Hipp. Opera.

L caput

- caput dolet, & palpebras, & videre non potest; & corpus subflatum fit, ac venis impletur. Hunc multa calida lavato, & aquam multam aquosam bibendam dato, & prisanæ succum sorbendum, & vinum aquosum insuper bibendum. Si vero dolor
 145 urgeat, calefactoria adhibeto. Ubi autem sedatus fuerit, cibis mollissimis utatur. Quod si liberatum a morbo, spirandi difficultas corripiat, dum ad acclivem locum recta pergit, aut alias festinat, pharmacum dato, a quo inferna alvus non moveatur. Et si una cum vomitu pus sequatur, si quidem pus fuerit album, & fibræ in ipso subcruenta fuerint, effugit. Si vero lividum, & cum virore pallidum, ac graveolens, moritur. Purgantur autem in quadraginta diebus ab ea, qua erupit. Multis etiam annus fit morbus. Hunc velut suppuratum curare oportet. Quod si non erumpat (multis enim progressu temporis abscedit ad latus, & extumescit) hunc, si hoc fiat, secato, aut urito.

* Pulmo repletus.

36

- 155 **S**i pulmo repletus fuerit, tussis tenet, & erectæ cervicis spiratio, ac anhelatio, & linguam exerit, rubicundis circulis in tibis repletur, & pruritus venat, & dolor acutus emergit ad pectus, & scapulas, & non potest sedere, neque jacere, neque stare, sed ægris viribus est. Hic quarta die maxime moritur. Si vero hanc evaserit, spes plerumque est, periclitatur tamen etiam in septima. Si vero hanc effugerit, sanus evadit. Hunc, ubi ita habuerit, multa calida bis in die lavato, & ubi dolor habuerit, calefactoria adhibeto. Et mel, & acetum cocta bibenda dato, & prisanæ succum sorbendum, ac vinum insuper bibendum. Si vero ad balneum, & calefactoria affigatur, & ipsa non sustineat, perfrigeratorium ipsi adhibeto, & favum mellis aqua frigidissima macerato, aquamque bibendam dato. Et decumbat ad frigus. Hæc faciat. Morbus autem gravis est, & lethalis.

* Pulmo ad pectus prolapsus.

37

- 165 **S**i pulmo ad latus prolapsus fuerit, tussis tenet, & erectæ cervicis spiratio, & salivam tussiendo rejicit albam, & dolor ad pectus, & dorsum emergit, et incumbens pulmo impellit, et grave quiddam in pectore incumbere videtur, et dolores acuti pungunt, et sanguis stridet velut pellis, et spirationem cobibet, et ad affectum quiddam latus decubitus sustinet, non autem ad sanum; verum velut
 170 grave quiddam ipsi de latere pendere videtur, et per pectus transpirare se putat. Hunc calida multa bis in die lavato, et aquam multam ipsi bibendam dato. Post balneum vinum album cum modico melle misceto, et dauci, ac centauri semina trita bis diluito, et tepida hæc sorbenda præbeto. Et insulam aquam calidam in utriculum, aut vesicam hybulam ad latus apponito, et fasciâ pectori alligato. Decumbat in latus sanum. Prisanæ succum tepidum præbeto, et vinum aquosum insuper bibendum. At si ex vulnere hoc fiat, aut suppurato secto (fieri enim in his solet) huic vesicam ad fistulam alligatam statu impleto, ac intro mittito, et penicillum solidum stanneum indito, ac ulterius propellito. Sic curationem instituens, maxime profeceris.

* Lateris tuberculum.

38

- 180 **Q**uam in latere tuberculum fit, tussis emergit dura, et dolor, et febris, et gravitas in latere incumbit, et dolor acutus in eodem semper loco urget, et sitis vehemens, et calidum potum aversatur, et in dolens latus decumbere non potest, sed in sanum. At ubi decumbit, velut lapis impendere ipsi videtur, et intumescit, et rubescit, et pedes intumescunt, hunc secato, aut urito. Postea pus emitto usque ad decimum diem, linamento ex lino crudo indito. Decima autem die
 185 pure omni emisso, vinum, et oleum tepida immittito, ut ne deterpene resiccescat, et linamento ex linteola utitor; ubi vero id, quod insulum est, emisseris, aliud insundito, atque hæc per dies quinque facito, postquam autem pus tenue effluxerit, velut prisanæ succus, ac modicum, ad manus contactum, stanneum penicillum indito, et ubi penitus resiccatum fuerit, linamento semper modice præfecto, ulcus ad linamentum coalescere sinito.

* Hydrops pulmonis.

39

- 195 **S**i hydrops in pulmone fiat, febris, et tussis tenet, et acervatim respirat, et pedes tumunt, et ungues contrahuntur omnes, et patitur talia, qualia is, qui suppuratus fit, sed debilius, ac diuturnius. Et si quid insundas, aut fomentum, aut suffum adhibeas, pus non sequitur, atque ex hoc sane cognoveris, non pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentaveris, ebullit intrinsicus velut acetum, et hæc quidem aliquandiu patitur, postea erumpit ad alvum, et statim quidem sanus esse sibi videtur, ac a morbo liberatus.

ratus: Verum progressu temporis alvus intenditur, eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt ventre, ictoro, ac facie. Et quidam ab inferna alvo id esse putant, quum videant ventrem magnum, & pedes tumentes. Intumescunt enim hæc, si sectionis tempus transgrediatis. Hunc si quidem extra intumuerit, inter costas sectum curare oportet. Si vero non intumuerit, multa calida lotum, velut suppuratos collocato, & qua parte strepitum perceperis, ea secaro, quam potes infimo loco, quo effluxio facilis contingat. Postquam secueris, linamentum ex lino crudo indito, ita ut crassum, & acutum linamentum facias, & sanguinem paucissimum parce emittas. Et si quidem in linamento pus adhaeserit quinta die, plerumque evadit. Sin minus, ubi aquam exhauseris, sitis corripit, & tussis, & moritur.

60

* Pectus, aut dorsum ruptum.

Si pectus, aut dorsum fuerit ruptum, dolores tenent pectus, ac dorsum perpetuo, & calor alias atque alias corripit, & salivam suberuentem tussiendo rejicit, & velut pilus cruentus per salivam transeurrit. Atque hæc maxime patitur, si manibus quid laboraverit, aut in currum, aut equum inscenderit. Hunc ante, & retro urino ex partibus utroque loco, & sic sanus evadit. Cæterum per annum a labore se contineat, & ab ulyra pinguescendi corpori studeat.

61

* Febris ardens.

Febris tenet, & sitis vehemens, & lingua aspera, & nigra, & cum virore pallida, & sicca, & vehementer rubicunda, & oculi cum virore pallidi sunt, & crementum egerit rubicundum, & cum virore pallidum, talem quoque urinam mingit, & multum spuit. Sæpe etiam transmutatur velut ad peripneumoniam, et deliratur. Ex qua re cognoveris, quod peripneumonia sit. Hic si quidem peripneumonicus fiat, et quatuordecim dies transgrediatur, sanus fit. Si vero in decem, et octo diebus peripneumonicus fiat, si non impurgatus permanens suppuratus fiat, aquam de crassa farina in ipsa macerata bibat, et acetum album quamodoratissimum postea bibat, et prisanæ succum sorbeat bis in die, si vero debilis fuerit, ter et vinum vinosum, album, aquosum insuper bibat, et quamminimam lavet. At si suppuratus fuerit, velut suppuratum curato.

62

* Febris singultiva.

Febris detinet vehemens, et rigor, et rufus, et singultus, et una cum saliva grumos sanguinis rufiundo rejicit, et septima die moritur. Si vero decem dies effugerit, melius habet. Verum vigesima suppuratur, et primis diebus pus modicum tussiendo rejicit, deinde amplius. Purgatur autem in quadraginta diebus. Huic primis diebus acrum, et mel cocta bibenda dato, et postea acetum, et aquam ammiscero, quo aquosior potio fiat. Et prisanæ succum modico melle amixto sorbeat, et vinum album vinosum insuper bibat. Postquam autem decem dies præterierint, si febris sedetur, et spueum purum sit, prisanam integram sorbeat, aut milium. At si vigesima die pus spuat, salivam, et rutam, et saturejam, et origanum, ac hypericum, singula aquis portionibus confusa, ac cribrata permisceat, ita ut omnium cyathi parvi, live conchæ marinæ sit mensura, et polentæ tantundem: Hæc jejunus in vino dulci temperato bibat. Et si hyems sit, aut autumnus, aut ver, sorbitionibus utatur. Si vero æstas, minime. Verum amygdalas, et cucumeris semen torrefactum, et sesamum, singula aquis partibus, ut in totum sit conchæ marinæ mensura, terat, et aquæ heminam Aegiweam affundat, et farinam, ac favum inspergat. Hæc post potum sorbeat. Cibis utatur pinguibus, et salis, et marinis magis quam carnisbus. Calida lavet, minime vero caput. Hæc faciens a morbo liberatur.

63

* Atorbus, lethargus diffus.

Tussis oboritur, et salivam spuit multam, ac liquidam, et ougas garrit, et ubi nugari desierit, dormit, et crementum male olens egerit. Huic aquam de macerata in ipsa farina crassa bibendam dato, et vinum album vinosum postea bibendum, et prisanæ succum sorbendum. Verum huic mali punicum succum ammiscero, et vinum vinosum album insuper bibat, et ne lavet. Hic in septem diebus moritur. Si vero has effugerit, sanus evadit.

350

* *Morbus succatorius appellatur.*

64

Nequē sine cibo esse, neque cibum acceptum tolerare potest. Verum ubi quidem sine cibo manet, viscera sugunt, & os ventriculi dolet, & alias alia vomit, & bilem, & salivam, & pituitam, & aëria, & postquam vomuit, aliquantisper melius habere sibi videtur. At ubi cibum accipit, ructus adfunt, & cum rubore exardescit, & semper multum se eacaturum esse putat. Ubi vero ea gratia defecerit, status prodit, & dolor caput habet, & totum corpus velut aciculis pungi videtur, alias alia parte, & erura gravia sunt, ac debilia, & consumitur, ac debilis fit. Huic medicamentum bibendum dato, primum deorsum purgans, postea superne, & caput purgato, & a cibis abstinere duleibus, & oleosis, ac pinguibus, & ab ebrietatibus. Vomare autem a succeis, & a cibis, & pro anni tempore, lac, aut serum asininum bibendum præbens, pharmacum insuper bibendum dato, utro tandem magis opus esse tibi visum fuerit. Æstate, & vere frigida lavet. Autumno autem & hyeme unguento utatur, et deambulet, et modice se exerceat. Si vero debilior sit, quam ut exereeri possit, iter faciat. Et cibis frigidis, ac alvum subeuntibus utatur.

255 Et si venter non egerat, molle insusum per elysterem injecto. Morbus hic duntaxat est, et consensescens, si ita futurum est, relinquit. Sin minus, commotitur.

* *Febris interficiens appellata.*

65

Febris tenet, et rigor, et supereilia impendere videntur, et caput dolet, et vomit salivam calidam, et bilem multam, quandoque etiam infra egerit, et loci oculos non capiunt, et dolor ad cervicem, et ad inguina emergit, et affectis viribus est, et nugas garrit. Hic septima die, aut etiam prius moritur. Si vero hanc effugerit, plerumque sanus fit. Morbus est lethalis. Huic perfrigeratoria adhibere oportet ad viscera, et ad caput, et hordeum torrefactum una cum paleis fractum aqua macerare, et de excolata aqua mullam facere, arque hanc aquosam bibendam dare. Cibum autem non offerre, neque sorbitionem usque ad septimum diem, si non debilis esse visus fuerit. Si vero sit, præsanæ succum frigidum, ac tenuem, modicum bis in die exhibere, et aquam insuper bibendam. Postquam vero septem dies præterierint, et febris dimiserit, milium lingat. Ad vespæram cucurbitam, aut betas paucas sumat, et vinum album aquosum inde bibat, donec ad nonum perveniat diem. Postea cibo quam paucissimo utatur, milium in prandio sumens. Balneo, donec dolor, et febris assuerint, ne utatur. Ubi vero cessaverint, multa lavet. Quod si venter non egerat, molle insusum per clysterem immittito, aut glandulas subito. Quum vero validus factus fuerit, molli pharmaco ad nates appolito, alvum infra purgato, postea lac asininum bibendum dato.

* *Morbus lividus.*

66

Febris detinet sicca, et horror alias aque alias, et caput dolet, et dolor viscera tenet, et bilem vomit, et quum dolor tenet, suspicere non potest, sed gravatur, et venter durus fit, et color lividus, et labia, ac albæ oculorum partes livescunt, et aspectum præ se fert, velut qui strangulatur. Quandoque etiam colorem transmutat, et ex livido eum virore subpallidus fit. Huic medicamentum et deorsum, et sursum purgans bibendum dato, et clysterem adhibeto, et a capite purgato. Et calida quam minime lavet, sed et ubi laverit, ad solem apricetur. Serum etiam, et lac asininum pro anni tempore bibat, et cibis quam molliissimis utatur, et frigidis, abstinens ab aeribus, et salis, et verum dulcoribus, ac pinguioribus utatur. Cæterum hic morbus ut plurimum cum agro commotitur.

* *Morbus rutilans.*

67

Dolor corripit acutus, & dolat vehementer, & se ipsum jacat, & vociferatur, & frequenter eructat, & ubi eructavit, melius habere sibi videtur. Saepe etiam bilem revomit modicam, poculi parvi mensura, & dolor corripit a visceribus ad imum ventrem, & lateribus mollitudinem, & ubi hoc factum fuerit, melius habere sibi videtur, & venter inflatur, ac durus fit, & strepit, & status non egreditur, neque stertens. Hunc si dolor habuerit, multa calida lavato, & calidiora ipsi adhibeto. Ubi vero in ventre dolor, ac status fuerit, clysterem adhibeto, & mercurialis coctæ succum ad præsanæ succum ammisceito, ac sorbendum dato, & vinum dulce, aquosum insuper sorbendum. Cibum autem ne exhibeas, donec dolor remiserit, & utarum expressarum recrementa duleia per noctem in aqua maceret, & hanc aquam per sex dies bibat. Si vero utarum expressarum recrementa non habeat, mel, & acetum cocta bibat. Postquam autem dolorem emoverit, medicamento deorsum alvum purgato. Cibis utatur inde mollibus, & alvum subeuntibus, & marinis magis quam carnibus, caribus autem volucrium, & ovillis.

ovillis coctis, edat etiam betas, & cucurbitam; ab aliis vero abstineat. Morbus hic, si juvenem corripit, tempore decedit; si seniores, commoritur.

68

* Morbus pituitosus.

Corripit quidem morbus pituitosus etiam virum, sed magis mulierem, & est haec quidem crassa, & bene colorata, verum iter faciens debilitatur, & maxime si ad acclivem locum iter faciat. Corripit etiam febris tenuis, quandoque etiam suffocatio, & evomit, ubi jejuna est, bilem, & salivas multas, saepe etiam ubi cibum accepit, de cibo tamen nihil, & quum laboraret, dolet pectus, & dorsum, alias alia parte, & rubicundis cutis eminentiis impletur, velut ab urtica iniustis. Huic medicamentum bibendum dato, & serum, ac lac asinum bibat. Si vero serum potes, medicamentum deorsum purgans ad plurimos dies praebendum dato. Et si serum bibere desierit, lac asinum postea bibat, & dum hoc poterit, a cibis quidem abstineat; vinum veto quamjucundissimum bibat, donec purgari desinat. At ubi a potione cessaverit, milium in prandio sumat. Vespere cibo molliissimo utatur, ac paucissimo. Abstineat a pinguibus, & dulcibus, ac oleosis. Et alias atque alias, maxime tamen hyeme, a leniule decocto vomat, oleribus praesumptis. Et calidum quamminimum lavet, sed & ad solem apricetur. Morbus autem commoritur.

69

* Pituita alba.

Innumescit totum corpus albo tumore, & venter ad contactum crassius est, & pedes, ac femora tument. Tibiae item, ac scrotum: & acervatim respirant, & facies rubicunda est, & os siccum, & sitis tenet, & ubi cibum accepit, spiritus frequens incumbit. Hic eadem die quandoque melius habet, quandoque pejus. Huic si quidem venter sua sponte turbatus fuerit in principio morbi, proximus sanitati est. Si vero non turbetur, medicamentum deorsum purgans dato, a quo aqua purgetur. Et calida non lavet, & sub dio exponatur, & scrotum, ubi impletum fuerit, secato. Cibis utatur, pane puro frigido, & betas, & piscibus scorpiis coctis, juleulo autem quampaucissimo. Et frigida omnia edat, & non dulcia, neque pingua, sed trita, & acida, & acria, excepto allio, cepa, & porro. Origanum vero, & saturajam multam edat, & vinum inde vinosum bibat, & ante cibum iter faciat. At si medicamentum timeat, clysterem adhibeto, & cibo, deambulationibus, & illuvie premio. Medieamenta vero quampaucissima exhibeto. Verum sursum purgans non prius dederis, quam tumores ad infernas partes descenderint. Quod si extenuato jam ipso suffocatio in pectore oboritur, veratrum bibendum dato, & caput purgato, & postea deorsum purgans bibat. Morbus hic maxime a nullo decedit.

70

* Cura morbus difficilis.

In visceribus veluti spina esse videtur, & pungere, & anxietas ipsum corripit, & lucem, ac homines fugit, & tenebras amat, & timor invadit, & septum transversum foris tumet, & ad contactum dolet, & expavescit, & tericulamenta, ac somnia horrenda videt, & quandoque etiam mortuos. Et morbus hic fere plurimos vere corripit. Huic veratrum bibendum dato, & caput purgato, & post capitis purificationem pharmacum deorsum purgans bibat, postea vero lac asinum bibat. Cibis utatur quampaucissimis, si non debilis fuerit, & frigidis, & alvum subeuntibus, & non acribus, neque falsis, neque pinguibus, neque dulcibus. Et calida non lavet, neque vinum bibat, sed aquam maxime, aut saltem vinum aquosum. Neque exercitiis utatur, neque deambulet. Hac si fecerit, a morbo liberabitur temporis progressu. Si vero neglexerit, commoretur.

71

* Morbus niger.

Nigrum vomit veluti fecem, quandoque cruentum, quandoque velut vinum secundarium, quandoque velut polypti atramentum, quandoque acre velut acetum, quandoque salivam, & pituitam, quandoque bilem cum virore pallidam. Et ubi quidem nigrum cruentum vomuerit, cadaveris foetorem refert, & fauces, & os a vomitu aduruntur, & dentes susceperunt, & id, quod vomitu rejectum est, tetram elevat. Et postquam vomuit, paululum melius se habere putat. Et neque sine cibo esse, neque ampliore cibum ferre potest. Verum ubi sine cibo manet, viscera surgunt, & salivae acidae sunt. Quum vero cibum accepit, gravitas in visceribus est, & pectus, ac dorsum, velut stilis pungi videntur, & dolor tenet latera, & febris debilis est, & caput dolet, & oculis non videt, & crura gravantur, & color niger est, & consumitur. Huic pharmacum bibendum dato frequenter, & pro anni tempore, & serum, & lac. Et a cibis abstineat dulcibus, & oleosis, ac pinguibus, & frigidissimis, ac maxime per alvum subeuntibus utatur. Et caput purgato, &

Hipp. Opera.

L 3 post me-

- 365 post medicamentorum potiones sursum purgantes, de manibus sanguinem detrahi-
to, si non fuerit defecit. At si alvus non egerat, molle infusum per clysterem
immitte. Et abstineat ab ebrietatibus, & venere. Si vero coierit, jejuniis fo-
mentis utatur. Et a sole abstinere, neque multum se exerceat, neque deambulet, ne-
que calida lavet, neque acra edat, neque salsa. Hæc facienda sunt. Et una cum ætate au-
370 fugit etiam morbus, & cum corpore senescit. Si vero denigratus fuerit, com-
moritur. * Alius morbus niger, subfulvus, & gracilis, & oculis cum virore pal-
lidus sit, & tenuem cutem habet, ac debilis est. Quanto autem tempus amplius
progreditur, tanto morbus amplius affligit. Et vomit omni tempore, velut stilla-
mentum modicum, ad duorum poculorum parvorum mensuram, & frequen-
375 ter etiam cibum, ac una cum cibo bilem, & pituitam; & post vomitum dolet to-
tum corpus, aliquando etiam antea quam vomat. Et horrores rejuet, ac febris tenet.
& ad dulcia, ac oleosa maxime vomit. Hunc medicamentis sursum, ac deorsum
purgare oportet, & lac assuquum postea bibendum præbere. Cibus autem utatur
molliissimis, ac frigidis, picibus lictoralibus, & cartilaginei generis, & betis, &
380 cucurbitis, & caribus tritis. Vinum bibat album, vinosum, aquosum. Labore, &
deambulationibus utatur, & calida ne lavet, & a sole abstinere. Atque hæc sane fa-
cienda sunt. Verum morbus lethalis quidem est, non autem confensibilis.

* Adorbus corruptorius.

73

385 **A**lia quidem omnia eodem modo paritur. Verum grumos bilis concretos
vomit, & deorsum similiter egerit, postquam cibos excrevit. Cæterum ea-
dem facere oportet, quæ in priore morbo relata sunt, & clysterem adhibere.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS LIBER III.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 De cerebri humore, & quæ signa cerebri in-
flammationem comitantur, & ejus curatio.
- 2 De doloris ex cerebri repletionem causis, Cu-
ratio. Animum collatio. Lac muliere.
- 3 De siderationum signis, & curatione.
- 4 De cerebri corrupti signis, & curatione.
- 5 De lethargi morbi signis, & curatione. Ex
lethargo suppuratio.
- 6 De morbi, sive febris ardentis signis, & ejus
curatio. Aqua vomitum pleniusque cict.
- 7 De pulmonis tumentis præ calore signis, &
curatio. Sanguinis de naso, & lingua
missio.
- 8 De capitis doloris acuti cum vocis interce-
ptione ab ebrietate, tum alias signis, &
curatio.
- 9 De phrenitis signis, & curatione.
- 10 De Angina signis, & curatione.
- 11 De Angina leni, Peratynache appellata, &
ejus curatio. Vene sub mammae sectio.
Suffusio.
- 12 De morbi regii signis. Urina ictericorum, &
ejus curatio. Nuxes thesia.
- 13 De dysenteriam (setam appellatur) signis,
& curatione. Potum, sorbitiones, & pi-
tuitam per nares retere.
- 14 De dysenteria in posteriores partes, seu op-
sthotomi signis, & ejus curatione. Aqua
frigida superinfusio.
- 15 De volvulorum generatione, & signis, &
curatio. Flatus in ventrem per sollem
inmissio. Febris amoto volvulo. Alvus
inferna soluta, amoto volvulo.
- 16 De peripneumonia signis. Lingua in peri-
pneumonia citius, & tardius nigrescit.

Saliva infusio.

- 17 Peripneumonia, pleuritidis, & phrenitidis ea-
dem curatio. Sorbitiones dulces ad sputum
sursum exserendum conducunt. Adulcus
humor infra sedens.
- 18 Saliva non probe purgata quid denotet. Dau-
cus.
- 19 De pleuriticorum signis. Pleuritis prima,
sanguinea, & biliosa. Singultus cum san-
guine.
- 20 De pleuritidis sicca signis.
- 21 De pleuritidis ex dorso signis. Saniel sub-
creta mittio. Spica varia.
- 22 Suppuratio fieri ex pleuritide, minus letha-
le. Lingua in omni pleuritide considera-
da. Bulla sublivida in lingua. Quo tem-
pore dolores in pleuritide fiunt.
- 23 Pleuritides quomodo curande. Clyster ex ari-
stolochia.
- 24 Quando a curatione pleuriticorum abstin-
endum.
- 25 Sanguinea pleuritidis curatio.
- 26 Tussis arida generatio. Puris eruptio ex pul-
mone.
- 27 Sectio, aut aliquis dexterae partium in pleu-
ritide periculosior, & dextrarum partium
morbis insidiosior. Terra Eretria adrefri-
gerandum in pleuritide.
- 28 Corporibus, prorsusque secernantur, aut wan-
tur, cui nota imprimenda. Suppuratorum
ex vulnere, & peripneumonia eadem, quæ
pleuritidis consideratio, & curatio.
- 29 De frigida febris potationibus in febre ardenti.
Ad omnem febrem ardentem potio. Potio vi-
nam moveat, frigefaciens, & sitim sedans. Vi-
nam thesia potio. Adorbus regius cum febre. U-
rinam scientia, & bilem per alvum trahentia.

De

E febribus universis a me dictum est, de reliquis jam dicam.



QUUM cerebrum ab inflammatione tumuerit, dolor totum caput occupat, maxime qua parte constitit inflammatio. Constitit autem in temporibus, et aures sonitu implentur, et auditus hebetescit, et venae extensae sunt, ac pulsant, et febris, ac rigor aliquando cortipiunt, et dolor nunquam deficit, sed quandoque remittit, quandoque magis premit, et vociferatur, ac exiit prae dolore. Et ubi surrexit, rursus ad lectum decumbere festinat, et iactat se ipsum. Hic lethaltiter quidem affectus est, in quot vero diebus morietur, non habet iudicationem. Nam alialiter pereunt. Plerumque tamen in septem diebus moriuntur. Si vero vigintiunum effugerint, sani sunt. Quum itaque dolor vexarit, frigidificare caput oportet, maxime quidem per rasuram, aut frigidatorio aliquo, velut esset solani succus, et terra figularis, in vesicam, aut folliculum immisso, ita ut vicissim modo apponas, modo auferas, priusquam respecant. Sed et sanguinem detrahere oportet, et caput purgare, ad apri succos odoratis admixtis. A vino autem in totum abstine, praeferant succum sorbere, et infernam alvum solvere.

* Cerebri repletio doloresa.

QUUM doluerit caput prae cerebri repletionem, vitiosorum humorum purgationem non factam ille significat, et dolores totum caput tenent, et delirat, et moritur septima die, et evadere non poterit, si non eruperit humor septima die per aures. Sic enim et dolor sedatur, et resipiscit, effluit autem multus, et odor. Huius aures, priusquam pus erupisse videris, potius ne curato. Si vero infernam, ac infernam alvum purgare voles, seorsum utramque solvito. Postea capiti maxime quidem universo, sed et per aures, et per nares fomentum adhibeto. Sorbeat autem praeferant succum, et a vino abstineat in totum. Postquam vero eruperit pus, contineto te, donec multa fluxio sedetur, postea aures colluito vino dulci, aut lacte muliebri, aut oleo veteri, atque hac tepida infunduntur. Caput vero frequenter mollibus, ac odoratis fomentis fovero, quo citius cerebrum purgetur. Hic primum quidem non audit, progressu vero temporis et fluxio minor fit, et auditus una cum fluxione penitus quiescente contingit, et maxime sibi ipsi similis redit. Cavere autem oportet solem, ventos, ignem, sumum, acrium odores, et alia huiusmodi: et quiescere, ac molli victus ratione uti. Sit autem alvus inferna prae vasorum vacatione soluta facilis.

* Syderati.

QUI idi, ac syderati esse dicuntur, quum cerebrum multa immunditia vitiosorum humorum repletum fuerit, anterior capitis pars primum dolorem ipsis exhibet, et suscipere non possunt, aliqui ambobus oculis, aliqui altero, et sopor ipsos tenet, et desipiunt, et tempora saliant, et febris tenuis habet, et corporis impotentia. Hic tertia, aut quinta die moritur, et ad septem non devenit. Si vero devenerit, a morbo liber evadit. Hunc si curare voles, capiti samenta adhibeto, et sectione facta transpirationem efficit, Si veto dolor tenuerit, etiam sternutationes inducere oportet, et caput purgare levibus, ac odoratis, infernam item alvum purgare. A vino autem penitus abstineat, et praeferant succo utatur.

* Cerebri corruptio.

SI cerebrum corruptum fuerit, dolor caput tenet, & per collum procedit ad spinam, & aeger non audit, & frigus ad caput devenit, & totus intumescit, & repente privatur voce, & ex naribus sanguis fluit, & lividus fit. Quod si morbus leviter corripiat, ubi sanguis discessit, melius habet. Si vero vehementer correptus fuerit, cito perit. Huic sternutationes per odorata inducero, & alvum utramque, aut alteram saltem purgato, & odorata, quae leves odores habent, naribus admoveto, & sorbitionem tenuem, ac tepidam exhibeto. Abstineat autem penitus a vino.

* Lethargus.

MORBI lethargi appellati status idem est, qui & peripneumoniae. Verum diffici-
cilior, & non omnino liber, ac remotus est ab humida peripneumonia. Sed multo rardior est morbus. Patitur autem aeger hac. Tussis, & sopor ipsum tener, & salivam liquidam, ac multam educit, & vehementer impotens est, & quum moriturus est, multum, atque id liquidum infra egerit. Huic valde exigua

55 vitæ spes est. Attamen hoc curandum est, ut plurimum spuat, & calefiat, & a vino abstineat. Si vero effugerit, supputatus sit.

* *Morbus, sive febris ardens.*

6

IN morbo, febris ardente appellato, sitis tenet multa, & lingua horret. At color
 60 levis primo quidem tempore est, veluti solet, verum sicca est. Progressu vero
 temporis induratur, exasperatur, crassecit, ac nigrescit. Si vero in principio hæc
 65 patiantur, citiores iudicationes sunt. Si posternus, tardiores. Cæterum remissio-
 nis eadem omnia signa lingua exhibet, quæ in peripneumonia: & urinae bilio-
 sæ, aut cruentæ, dolorem ampliorem, flavæ vero minorem significant, & spu-
 70 rum præ caliditate, ac siccitate combustum, ac crassum est. Sæpe vero etiam in
 peripneumoniam transit, quod si conegerit, brevi moritur. Hunc autem hoc
 65 modo curare oportet, calida bis, aut ter singulis diebus lavato, capite excepto.
 Ac in iudicationibus lavare non oportet. Et primis quidem diebus deorsum pur-
 gato, & aquam bibendam dato. Nam plerumque vomitum aqua ciere solet. Poste-
 70 rioribus vero post purgationem humectato, & sorbitionibus utamur, ac vinis dul-
 cibus. Quod si non ab initio agrum curandum susceperis, sed signis jam in lin-
 gna mitiora facta fuerint, & neque medicamentum dederis, neque ad purgationem
 faciendam clysterem adhibueris, priusquam iudicationes prætereant.

* *Pulmo tumens præ calore.*

7

Q Uum pulmo tumet præ nimio calore repletus, tussis tenet fortis, & du-
 75 ra, & erecta cervicis spiratio, & acervatim respirat, & frequenter anhelat,
 & inumescit, & nares expandit, velut equus ex cursu, & linguam frequenter ex-
 erit, & pectus ipsi canere videtur, & gravitas in ipso inesse. Quapropter hanc ca-
 pere pectus non potest, sed dirumpitur, & impotens fit, & dolor acutus emer-
 80 git, & dorsum, & pectus, & latera velut acubus punguntur: & ardent hæc par-
 tes, velut ejus, qui sedeat ad ignem, & rubores exoriuntur ad pectus, & dorsum
 80 velut a flamma, & morius fortis incidit, & angustia, ut neque stare, neque sedere,
 neque decumbere possit. Venam ita velut desperatis rebus anxius jactat se ipsum,
 & jam mori videtur. Moritur autem maxime quarta, aut septima die, quas si ef-
 85 fugerit, non valde perit. Hunc si cures, infernam alvum quamcunque clysteri adhi-
 bito, probe purgare oportet, & de cubitis, & naso, & lingua, ac de omni corpo-
 85 ris parte sanguinem mittere. Potiones item frigefaciennes exhibere, & sorbi-
 tiones idem præstantes. Danda sunt & urinam cientia sæpe, sed quæ non calefa-
 ciant. Et ad ipsos quidem dolores, quum irruunt, calefactoria levia, ac humida
 adhibendo, locum calefacere, ac humectare oportet, ubicunque dolor fuerit; ad re-
 90 liquas vero partes frigefactoria adhibere, vicissim ea apponendo, ac tollendo, &
 90 ubicunque arserit, frigus facere. A vino autem penitus abstinere.

* *Capitis dolor.*

8

Q Uum a capite initio sumpto, dolor acutus statim vocem interceperit tum
 alias, tum si ex ebrietate hoc contingat, ita affectus septima die moritur. Mi-
 95 nus tamen moriuntur, qui ex ebrietate tale quid perpessi sunt, & voce privati
 permanserunt. Nam si eadem die, aut postea, aut tertia vocem edant, sani eva-
 95 dunt: faciunt autem hoc aliqui ex ebrietate, & nentri moriuntur. His sternutatio-
 nes fortes inducere oportet, & infusum per clysterem injicere, quod bilem ve-
 hementer ducat. Quod si sensum ager receperit, thapsiæ succum in multa cali-
 da aqua dato, quo quamcitissime revomat. Postea attenuato, & a vino prohibere
 per septem dies. Detrahendus est & a lingua sanguis, si venam comprehendere possit.

* *Phrenitides.*

9

100 PHrenitides sunt etiam ex aliis morbis. Patiuntur autem ægri hæc: septum
 transversum dolent, ut ne contingere quidem permittant, & febris accedit,
 & mentis moventur, & inentis oculis vident, & alia similia faciunt his, qui peri-
 105 pneumonia affecti sunt, ubi sane in peripneumonia mente moventur. Hoc
 modo affectum calefacere oportet, calefactorius humidis, & portionibus, exce-
 105 pro vino. Et si quidem fieri poterit, sursum purgare, & per tussim, ac spui-
 tionem educere oportet, quemadmodum in peripneumonia. Sin minus, inferna
 alvus præparanda est, ut egerat. Humectato autem portionibus, hoc enim condu-
 cit. Morbus autem letalis est. Moriuntur enim tertia, aut quinta, aut septi-
 ma die. Si vero leniter corripit, judicat, velut peripneumonia.

Angina.

* Angina.

AB Angina appellata suffocatur homo, & in faucibus magis ipsi inherere videtur, & neque salivam, neque quicquam aliud detrahit, & oculi affecti sunt, ac prominent, velut strangulatis, & intente per ipsos videt, & ipsos convertere non potest, & anxius est, & exilit frequenter, & facies, & fauces ardent, immo etiam collum. At videntibus nihil mali habere videtur, & videt, ac audit obfusius, & præ suffocatione non intelligit neque quid dicat, neque quid audiat, aut faciat. Verum hians decumbit salivam fundens, ac talia faciens. Hic quinta, aut septima, aut nona die moritur.

* Levis angina paracynanche appellata.

AT ubi horum signorum quid abfuerit, laxiorem morbum significat, quem paracynanchen vocant. Huic venam secare oportet, maxime sub mamma. Concomitatur enim hac parte ex pulmone spiritus calidus. Oportet quoque deorsum purgare medicamento, aut per clysterem. Fistulas item detrahende conveniunt in fauces iuxta maxillas, quo spiritus ad pulmonem trahatur. Eæ faciendum, ut quamcivissime spuat, & pulmo gracilis fiat. Et fistulas fiat per hyssopum, cilicium, sulphur, & bitumen; & astrahat & per fistulas, & per nares, ut creat pressa. Fauces, & lingua confricentur his, quæ pituitam ducunt. Et venæ sub lingua secentur. Sed & a cubitis sanguis dimittatur, si vires valide fuerint. A vino abstinere, & pisanæ succum tenuem forbeat. Postquam vero remiserit morbus, & jam cibos gustarit, elaterio recenti purgato, ut ne in aliud malum incidat.

* Morbus regius.

MOrbus regius huiusmodi acutus est, & cito occidit. Color totius mali corium valde refert, & cum virore pallidus est, quales sunt lacerti cum virore pallidantes. Confimile est etiam corpus, & in urina subditer, velut cervum fulvum, & febris, ac horror debilis habet. Quandoque etiam vestimenta ferre non potest, sed mordetur, ac raditur. Et mane, quum cibum non accepit, viscera plerumque lancinantur. Et quum quis excitat, aut alloquitur, non parit. Hic plerumque in quatuordecim diebus moritur. Has si effugerit, sanus evadit. Oportet autem ipsum calidam lavare, & aquam mulsam bibendam dare, ita ut de nucibus thassii decorticatis, & absinthii coma, æquis portionibus acceptis, & de aniso cribrato dimidia parte ammixta, obolos tres jejunis ex illa bibat, & rursus dum cubitum sit, hanc aquam mulsam sumat. Bibat etiam vinum vetus tenue, & sorbitionibus utatur. Nec a cibis abstinere.

* Tetanus.

QUum distensiones Tetani appellatæ, corripuerint, maxillæ rigent, velut ligna, & os aperire non possunt, & oculi lachrymantur, ac distorquentur, & dorsum riget, & crura contrahere non possunt, similiter neque manus, & facies rubicunda est, & valde dolet, & ubi moriturus est, & potum, & forbitionem, & pituitam per nares revomit. Hic tertia die, aut quinta, aut septima, aut decima-quarta perit. Ubi vero has effugerit, sanus evadit. Huic carapocia ex pipere, & veratro nigro devoranda dato, & jusculum volucrum pingue calidum. Inducendæ sunt etiam sortes, ac multa sternutationes, & fumenra adhibenda. Quum autem fomentis non utitur, calefactoria humida, ac pingua undequaque in vesticis, ac utriculis apponantur, maxime tamen ad partes dolentes, & calido oleo multo, ac saepe illinatur.

* Opisthotonos.

QUum autem distensio in posteriores partes, opisthotonos appellata, temerit, reliqua quidem plerumque eadem sunt. Verum in posteriores partes convellitur, & vociferatur aliquando, & dolores emergunt vehementes, & crura interdum contrahere non permittit, neque manus extendere. Sunt enim cubiti incurvati, & digiti in pugnum contracti, & pollicem plerumque aliis digitis continet, et clamat, et nugæ garrit quandoque, et non potest se ipsum continere, sed aliquando exilit, ubi dolor premit, quum vero dolor remittit, quietem habet. Aliquando etiam vix intercipitur, simul ut morbo corripiantur, aut infans, et atra bile perciti sunt. Hi tertia die moriuntur voce soluta, et revomunt per nares. Si vero effugerint decimum quartum diem, sani sunt. Curandus hic est velut superior. Quod si viles, etiam sic facies. Aquam frigidam plurimam superfundito,

dito, et postea vestimenta tenuia, pura, ac calida superintegito. Ignem autem tunc non adhibeto. Hoc auxilium et ad tetanos, et ad opisthoronos adhibere oportet.

* Polendi.

15

- 165 **V**olvuli sunt, quin supernus ventriculus calefit, infernus vero frigescit. Reficatur enim simul intestinum, et prae inflammationis caliditate obcuratur, ut neque status, neque cibi pertransiant, sed venter durus sit, et quandoque vomat primum pituitosa, deinde biliola, postremum stercus. Et aeger sitim habet, ac dolorem, maxime circa praecordia. Verum et totum ventrem dolet, et inflatus est; et anxius est, et febres corripunt, et sunt maxime septima die. Hos sic curare oportet. Supernum ventriculum quamcivissime purgato, et sanguinem de capite, ac cubitis detrahit, ut superna alvus calescere desinat, et partes supra septem transversum frigefacito, excepto corde. Infernas autem calefacito, hominem in solio, aqua calida colloquato, ac semper oleo illito. Calefactoria quoque 175 humida apponito. Et glandulam de melle solum decem digitorum longitudinis facito, et ex summa anteriori parte sel tantum oblinito, atque sic bis, ac ter subdito, quo omnia combusta stercora circa rectum, ac princeps intestinum contenda educas. Et si quidem sic obediunt, postea clysterem adhibeto; sin minus, tollem fabrillem indito, et in ventrem statim immittito, a quo et ventrem, et intestina contractionem dissendas. Deinde extracto folle, clysterem adhibeto. Sic autem infusum per clysterem miscendum paratum non ex valde calefactorius, sed ex his, quae stercora dissolvunt, ac colligant. Postea obturata per spongiam sede, in aqua calida desident, continens clysteris infusum. Et si hoc infusum susceperit, et rursus digesserit, sanus evadit. Ceterum priore tempore mel 185 optimum delingat, et vinum splendidum vernaculum bibat. Quod si volvulus amoto, febris ipsum corripiat, desperatus est. Fortassis enim et inferna alvus soluta ipsum occiderit.

* Peripneumonia.

16

- P**eripneumonia talia facit, Febris acuta tenet, et spiritum frequentem, ac calidum respirat, et anxietas adest, et impotentia, et iactatio, et dolor sub scapulis, et ad clavicularum, et ad manuum, et gravitas in pectore, quandoque etiam delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint. Verum hic morbus diuturnior, ac difficilior illo est. Salivam tennem, ac spumofam primum 190 spuit. Lingua flava est, verum progressu temporis nigrescit. Si igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur; sin posterus, tardius. Tandem vero etiam 195 rumpitur lingua, et si digitum apponas, inhaeret. At liberationem a morbo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Haec autem pariter homo, minimum diebus quatuordecim, ad summum una et viginti, et per hoc tempus tussit vehementer, et una cum tussi purgatur primum saliva multa, et spumofa; septima vero, et octava die, ubi febres in vigore fuerit, si humida sit peripneumonia, crassior proderit; sin minus, non. Nona vero, et decima, cum virore 200 pallida, ac subcruenta. Duodecima autem usque decimanquartam, multa, et purulenta. Atque hoc in his contingit, quorum natura, et corporis affectiones humidae sunt, et morbus fortis est. Quorum vero et natura, et morbi constitutio sicca est, in his minus. Si quidem igitur decima quarta die reficatus fuerit, et non 205 amplius purulentum tussiendo reiecerit, sanus est; sin minus, ad duo de viginti, et vigintiannam primum annum adverte: et si quidem tunc spiritum illud quieverit, evadit; sin minus, interroga ipsum, an dulcior sit saliva, et si affirmaverit hoc, scito pulmonem ipsi suppuratum esse, et morbus annuum durabit; si non, in quadraginta diebus pus eduxerit. Si vero insuavem salivam esse dixerit, status morbi lethalis est. Verum in primis diebus hi maxime manifesti fiunt. Si enim putrefactum, ac purulentum expuerit in diebus duobus ac viginti, et non emulceratum fuerit, evadit; sin minus, non. Haec peripneumonia nihil 210 abest ab affectionibus, quae in pulmone sunt. Si igitur aliquid harum affectionum abfuerit, cognoscere oportet, et quae agrosus mala habeat, et quae medicum 215 curae aggredi debeat. Si vero pauca horum signorum habuerit, ne decipiat. Nam perniciofa non est peripneumonia, sed mollis. Ceterum peripneumoniam hoc modo curare oportet. Non tamen peccabit, si quis etiam pleuritidem, et phrenitidem ita curare aggrediatur. Primum caput levius facere incipe, quo nihil insuat ad pectus. Primis autem diebus forbesiones sint dulciores. Sic enim id, quod confedit, ac consipatum est, potissimum eluere, ac commoveris. Quarta die, et quinta, ac sexta, non amplius dulces, sed pingues. Nam ad spiritum sursum exereandum conducimur. Si vero pro ratione spucare non possit, ex pharmacis sursum educentibus dato. Alvum autem in primis 220 quatuor, aut quinque diebus subducere oportet, et hoc paulo amplius, quo et 225 febres obtusiores sint, et dolores leviores. Quum autem evacuatus fuerit, et corpore

17

corpore debilis, infernam alvum tertio quoque die deorsum commovere, quo & corpus potens sit, & supernae regiones humoris exortes. Nam si multus humor infra secedat, a quinta die mortem inducit. Infra enim humore secedente, supernae partes resciscantur, & spiritus purgatio sursum non prodit. Oportet igitur, & infernam alvum neque valde suppressam esse, ut ne febres sint acutae; neque valde egerere, quo saliva sursum educi possit, & arget viribus valeat. At medicamenta sursum educuntia, sexta, & septima, ac nona die, & morbo adhuc ulterius progresso, magis exhibeto. Sit autem medicamentum, veratrum album, thapsia, elaterium recens, singula aequis portionibus. * Quod si saliva non probe purgetur, & spiritus fuerit frequens, & purgatio non pravealeat, praedicendum est nullam spem vitae reliquam esse, si purgatione nihil efficere possit. Sed & alia facienda sunt, quae in peripneumonia fieri solent, si inferna alvus ministerium suum probe obierit. Quin & aliter facere curationem oportet: A prima die initio sumpto, ari magni conchulam majorem dato, dauci & turticae utriusque item unam, sinapis & rutae quantum tribus digitis comprehendere potes, & succum silphii magnitudine fabae. Haec in aceto dulci, & aqua permixta, & diluta, ac excolata, jejuno tepida bibenda dato. Postquam veto purum exspuere coeperit, ari conchulam majorem, & sesamum, & amygdalas purgatas, in aceto dulci aqua diluto bibenda praebeto. Si vero magis ducere voles, radicis capparidis corticem his ammisceto.

19

* Pleuritis.

Quum pleuritis apprehenderit, haec patitur. Dolor latus, & febris, & horror tenet, & frequentem spiritum habet, & erectae cervicis spiratio urget, & tussiendo rejicit subbiliosa, velut a mali punici corio, si non ruptiones habuerit. Si vero habuerit, etiam sanguinem a ruptionibus. Iste autem & sanguinea pleuritis, in qua subruentia rejicit. Et est quidem biliosa mitior, si non ruptiones aeger habeat; si minus, dolorosior quidem est, sed non lethalior. At sanguinea fortis, & dolorosa, & lethalis est. Quum igitur affuerit simul singultus, simulque cum saliva sanguinis grumos nigros tussiendo rejecerit, septima die moritur. Si vero dies decem transgressus fuerit, a pleuritide quidem sanus fit, verum vigesima suppuratur, & pus tussiendo rejicit; demum vero revomit, & non adeo facili curam est.

20

* Pleuritides secae.

Sunt & siccae pleuritides sine spuro. Verum haec difficiles sunt. Judicationes autem similes aliis sunt, sed ampliore in potu humectatione opus habent, quam aliae. Biliosae vero, & sanguineae, nona, & undecima die judicant, atque hi magis sani sunt. At si a principio quidem molles quidam tenuerint dolores, a quinta vero, ac sexta die acuti, hi usque ad duodecimum perveniunt, & non valde effluunt. Periculum autem maxime est usque ad septimum. Immo etiam usque ad duodecimum. Post haec vero sanantur. Quae vero ab initio molles sunt, a septima autem, & octava acutae, ad decimumquartum judicant, & sani sunt.

21

* Pleuritis ex dorso.

Pleuritis ad dorsum intantum ab aliis differt: dorsum dolet velut ex plaga, & suspirat, & acervatim respirat, statim autem spiritus patet, & corpus delassatur. Tertia, aut quarta die saniem mingit subruentam. Moritur autem maxime quinta die; si minus, septima. Haec si effugerit, vixerit. Et motus lenis est, ac minus lethalis. Custodire tamen oportet usque ad decimumquartum. Postea vero sanus evadit. Ceterum quibusdam pleuritidis saliva quidem pura est, medio autem eruenta, velut serosa a carnibus affatis sanies; dolores vero acuti per spumam ad pedus, & ad inguen tendunt. Hic si septimum diem effugerit, sanus fit. At si alicui in his pleuritidibus contingat dorsum rubescere, & humeros calefescere, & inter decidendum gravari, & venter exturbetur egestionem cum virore pollida, ac valde graveolenti, hic propter ventris egestionem vigesima prima die moritur. Haec si effugerit, sanus fit. Quibus autem statim spura varia sunt, & dolores valde acuti, hi tercia die moriuntur. Hanc autem transgressi, sanescunt. Qui vero sanus non fit septima, aut nona, aut decima, hic suppurati incipit. Melius est autem suppuratum fieri, etiamsi dolorosum sit. Minus enim lethale est: Porro supra omnia relata signa, in unaquaque pleuritide considerare oportet linguam. Si enim bulla sublivida fiat in lingua, velut ferro in oleum tincto, si quidem in principio fiat aspera, difficilior est morbi emotio, & necesse est sanguinem tussiendo rejicere in diebus, quibus id fieri oportet. Si vero facto morbi progressu fiat, judicationes quidem contingant ad decimumquartum diem. Verum necesse est sanguinem spueri. Habet autem se res de liberatione ab hoc morbo.

- hoc morbo, hoc modo. Si quidem tertia die inceperit maturari, ac expui, citius liberabitur. Si vero posterius matureſcat, poſteriori iudicationes ſunt, quemadmodum in capitis ſignis. * Dolores porro in omni plenitudine plenumque magis interdiu, quam noctu leuiores ſunt. Curare vero pleuritidas hoc modo oportet, ut plurimum velut phrenitidem, & peripneumoniam, præterquam quod hic balneis calidis, & vino dulci utendum eſt. Si igitur prima, aut ſecunda die, poſtquam inſaſit, ægrum acceſſeris, ſi ſtercus prodiit purum, aut leuiter biliolum & modicum, inſuſum ex thapſia per clyſterem iniſcito. Si vero alvus commota, noctu quidem egerat, poſtridie vero dolor, & tormen vexet, ruſſus clyſterem adhibeto. At ſi æger biliſus ſit natura, & non purgatus correptus fuerit a morbo, priuſquam ſalivam biliſam expuat, etiam medicamento bilem probe purgato. Si vero iam expuat biliſa, medicamentum ne dederis. Si enim dederis, ſputum ſuſum prodire non poterit, ſed ſeptima, aut nona die ſuffocabitur, maxime ſi præcordia dolent. * Quod ſi ad dolores in lateribus etiam præcordia dolent, clyſterem adhibere oportet, & in potu jejuno bibendum dare ariſtoloſchiam, hyſſopum, cuminum, ſilphium, peplum, mætona appellatum album, ſorem æris, mel, acetum, & aquam. Et per medicamenta quidem ita primas curationes facere oportet. Reliqua vero ſic ſe habent. Multa calida pro viribus ægri lavato, capite excepto, & quum iudicationes ſunt, dolentes locos humidis fomentis tepeſcito, & oleo illinito. * Quum vero impetu fertur morbus, & ægrum, & medicum a curationibus quieſcere convenit, ne quid mali indicatur. Dandus aurem eſt priſana ſucco coctus, aliquanto craſſior ſpiſſitudine mellis. Poſt balnea etiam vinum dulce, & aquoſum bibendum eſt, non frigidum, modicum, ex anguſti oris pocillo, & ubi ruſſes inſaſerint, amplius bibendum, & quammaxime exſcreandum, & potu humectandum, quo pulmo humidior factus, facilius ac citius ſputum reddat, & tuſſis minus aſſigat. Sed & mali punici dulcis vinoſi ſuccum, lacte caprino modico, & melle ammixto, paulatim ſæpe dato, & noctu, & interdiu, & ſomnum quammaxime prohibeto, quo purgatio & citius, & copioſior fiat. * At vero ſanguineam pleuritidem ſic curare oportet. 25
- 290 Poſt iudicationes cibis leuibus reſcito, & quietem agat, & nimium caveat ſolem, ventos, repletiones, acida, ſalfa, pingua, ſumum, ſtatus in alvo, laborem, venenem. Si enim morbus recidivarit, mors ſequetur. In expuitionibus autem ſi dolor habeat, & expuere non poſſit, jejuno æris ſtorem dato magnitudine olive, & ſucci ſilphii dimidium eius, & trifolii feminis modicum. Hæc ex melle delingat. Aut piperis grana quinque, & ſucci ſilphii magnitudinem ſabæ, mel, acetum, & aquam jejuno tepida bibenda præbeto. Hoc etiam dolores fedat. Quod ſi pro ratione ſpuere non poſſit, ſed moretur ſputum hærens in ipſo, & ſtettat in pectore, ari magni radicis conchulam maiorem, & oleum, ac acetum mixta dato, & acetum aqua diſtillum inſuper bibat. Aliud forte. Florem æris magnitudine ſabæ, & nitrum aſſatum dupla portione, & hyſſopi quantum tribus digitis comprehendere poſſit, melli miſceto, & aquam, ac oleum modicum adſuſſato, & tepeſcta in conchula maiore inſundito, ut ne ſuffocetur. Hoc etiam in peripneumonia facere oportet, ſi non purgetur. Si vero neque ſtettat, neque velut oportet, ſpuat, capparis fructus, quantum tribus digitis comprehendere poſſit, & piper, & nitrum modicum, & mel, & acetum, & aquam miſceto, atque hæc tepida ſorbenda præbeto. Altera die eadem in aceto, melle, & aqua ſerveſcta ſorbeat. Hoc etiam ſtettentibus dato, & his, qui purgari non poſſunt. At ſi fortius facere voles, hyſſopi, & ſinapis, & naſturtii concham maiorem, melle, & aqua terito, & ſerveſcta, ac excolata, tepida ſorbenda dato. 30
- 335 * Atque hoc modo hi morbi curati ſanantur, ſi non quid ſputi in pulmone relictum pus fiat, a quo arida tuſſis ſequitur, & febris, ac horror emergant, & erecta cervicæ ſpiratio tenet, & frequentem, & acervatam reſpirationem æger habeat, & vox paulo gravior ſit, & color cum calore faciem occupat. Progreſſu vero temporis morbus magis manifeſtus redditur. Hunc ſi intra decem dies ſuſceperis, ubi victu, & balneo calido caleſceeris, medicamentum, quod pus ducat, in pulmone inſundito, aliſque pus dicentibus uttor, atque ſic velut ſuppurato victus rationem præſcribas. Caput quoque reſiccato, ut ne quid inſuât. Si vero ex eo, quod in pulmone inſuſum eſt, pus non educatur, rumpitur hoc ipſum ex pulmone in thoracem, & poſt ruptionem ſanus eſſe videtur, quoniam ex anguſtia ad 35
- 340 amplam capacitatem pus pervenit, & ſpiritus, quem reſpirando attrahimus in pulmone locum, ac ſedem habet. Verum progrediente tempore pectus pure impletur, & tuſſes, & febres, & alii dolores omnes magis ipſum premunt, & morbus inclareſcit. Hunc poſt ruptionem per quindecim dies ſinere oportet, quo pus ruſſus matureſcat. Nam ex eo, quod pus ad ampliorem locum devenit, perfrigeratum eſt, & id, quod in thorace humidum erat, ad ſeipſum attraxit, ita ut ipſum ſit ſemiputrefactum. Si quidem igitur ſua ſponte expui incipiat in hoc tempore, bene eſt, ſi minus, medicamentis, aut porcionibus opem ferre oportet, in ultimis ex quindecim illis diebus, ſeſtinando ad corporis excitationem, antea quam magis aſſigatur, ita ut caput purum cuſtodias, inſinuum gratia. Si vero non ſpuatur,

spuatur, sed sui significationem ad latera præbeat, secato, aut urito. At si neque
 27 ipuatur, neque ad latera de se significationem præbeat, ubi multa calida jejunum
 lavasti, & neque poru ulum in firma sella locasti, alter ex humeris ipsam apprehen-
 dat, tu vero concute ipsam, aure ad latera admota, quo percipias ex utra parte
 significationem sui præbeat. Oportundum autem esset ex sinistra. Nam dextras
 urere, aut secare lethalis est. Quanto enim robustiores sunt dextra partes, tan-
 30 to etiam fortiores morbi in ipsis sunt. * Quod si præ crassitudine humor non flu-
 et, neque strepitus sit in pectore, verum spiritum frequentem trahat, & pedes
 intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiat hæc, sed thoracem pure ple-
 num esse probe noris. Proinde in terra cretriade liquida, & valde trita, ac tepi-
 da lineum tenue tingito, eoque thoracem circumcirca integito, & qua parte pri-
 35 mum resiccatum fuerit, ea secato, aut urito quamproxime ad septum transversum,
 cavendo tamen, ne hoc ipsum lædas. Si vero voles, ipsam terram cretriadem illini-
 to, & similiter velut in linteo considerato. Multi simul illinunt, ne quæ primum illi-
 38 nuntur, resiccantur. Post sectionem, aut unctionem, linamento ex lino crudo utere, & pau-
 latim pus emitte. * Cæterum ubi secare, vel urere voles, corpori in eadem figura, in
 qua inter secandum, aut urendum futurum est, notam imprimito, ut ne cutis te decipiat,
 si in figuræ transmutatione sursum, aut deorsum magis cedat. Sed & tussis vi-
 tare oportet ex victu, ut ne rursus pus reveillant ad pulmonem. Malum enim hoc
 est, quare permitendum est, ut ad sectionem quamcivissime resiccetur. Postquam ve-
 370 ro duodecima affuerit dies, reliquum pus totum emittito, & ex lino linamentum in-
 dito, & bis in die pus emittito, & ventrem supernum ex victu quammaxime resicca-
 to. Atque hoc modo oportet etiam suppurationes ex vulneribus, & ex peripneumonia,
 & ex magnis destillationibus, & pulmone ad lateres prolapsio, considerare,
 ac curare,

29

* Frigefactoria potiones in febre ardenti.

Frigefactoria potiones in febribus ardentibus, quando voles, bibendas da-
 380 to. Sunt autem multarum operationum, alie enim mictionem inducunt, alie
 alvi egestionem, alie utrumque præstant, alie neutrum, alie solum frigefaciunt, ve-
 lut si quis in vas aquæ ferventis frigidam aquam infundat, aut ipsam vas ad frigi-
 dum ventum exponat, Dabit itaque alias aliis. Neque enim dulces omnibus conducunt,
 neque acerbæ, neque eadem omnes bibere possunt. i. Favorum siccorum hemi-
 385 ninarum duarum mensuram aqua macerato, & conterens gustato, donec subdul-
 cis aqua fiat, deinde excolato, & injectis apii bibendam dato. ii. Semi-
 nis lini acetabulum, aquæ heminis decem affusus, in nova olla prunis imposita co-
 quitur, ac fervere finito, ut transparent, donec succus ad tactum pinguis fiat.
 iii. Aquam mullam aquosam ad dimidias coquito, deinde apio injecto frigi-
 390 dam paulatim exhibeto. iv. Hordeum Achilleum magnum, ac plenum hemi-
 nis mensura siccato, & acutis spicis ablatis, ubi probe laveris, aquæ congio affu-
 so coquito ad dimidias, frigefacito, ac bibendum dato. v. Cumini Æthiopici
 hemina decunæ parti, tres aquæ semicongios affunde, & olla luto pilosa oblita,
 donec tertia pars restet fervere sine, & frigidam hanc ad omnem ardentem, aliamque
 395 febrem exhibe. vi. Aquam celestem ipsam per se ipsam præbe. vii. Psis-
 næ hemina congio aquæ affuso, ad dimidias coquito, deinde excolato, & apii
 injectis frigidam dato. viii. Profunt & vina alba aquosa ex uvis passis.
 ix. Profunt & uvarum passarum expressarum recrementa aquosa. x. Uvarum
 passarum albarum, exemplis vinaceis heminam, radicum quinque folii ma-
 400 nipulum tundito, & affusus aquæ heminis viginti ad dimidias coquito, & frigi-
 dam hanc paulatim bibendam dato. xi. Ad farinæ hordei pleni crassæ choeni-
 cem dimidiam, aquæ congium affundas, & quin jam intumescant crassæ sari-
 næ partes, manibus teras, donec aqua alba fiat, & adianti pugilo injecto, sub dio
 per noctem exponito, ac exhibeto. xii. Ovorum trium, aut quatuor candi-
 405 dum in aquæ congio concussum bibat. Hoc valde frigefacit, & ægrum ad alvum
 exonerandum conturbat. xiii. Hordei torrefacti probe loci choenicem dimi-
 diam in aquæ congio bis, aut ter fervere finito, & frigidam hanc exhibeto.
 xiv. Psisanæ succum cochum tenuem, & vinum dulce dato. Hoc urinam
 ducit. xv. Cucumeris pepónis corio nudati pollinem ex aqua præbe. Hæc po-
 410 tio urinam ciat, frigefacit, & sitim sedat. xvi. Ervum in aqua præcoqui-
 to, deinde ollam novam in maiorem ollam aqua plenam ponito, & alia aqua ervo
 affusa, ad modicum tempus coquito, postea ubi coctum fuerit ervum, tertiam aquæ
 partem reliquam excolatam bibendam dato, ita ut ad singulos cyathos, & cucu-
 meris, & ervi pollinem inspergas. Hoc constanter sitim sedat. xvii. Vium
 415 thasium vetus parte una, cum viginquique aquæ partibus dato. xviii. Trifolium,
 cucumeris pollinem, & crassam hordei farinam in aqua macerato, & hanc biben-
 dam dato. xix. Apii manipulos tres, pulegii pugillos duos in aceti hemi-
 nis decem ad tertias coquito. Hoc melle, & aqua dilutum aquosum bibat, adianti
 pugilo injecto. Hoc urinam ducit, & alvum solvit. xx. Mala odorata dulcia
 420 contin-

contundito, & aqua macerato, & aquam bibendam dato. **xxi.** Mala cydonea eodem modo, si alvus soluta fuerit in febre ardente. **xxii.** Quod si morbus tegius infuper corripitur, uvæ passæ albæ exemptis vinaceis, & cicerum alborum, utroqueque dimidiam heminam, & hordei Achillei magni, ac pleni tantumdem, & cnicus tantundem, aquæ heminas decem, & apium, & mentam, & coriandrum, & singulis parum, terito, donec placide aqua dulcescat, & adianti pugillo postea injecto, ubi sub dio per noctem exposuisti, exhibeto. Potes etiam alias his similia imitari. Omnia vero per noctem sub dio exposita dabis febricenti, exceptis his, quibus alvi, plus quam convenit, fluunt. **xxiii.** Pulegii pugillos tres api duplum, in vino diluto coquito, ac exhibeto; hoc urinam ciet, & bilem per alvum trahit.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS LIBER IV.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Semen utriusque parentis, ab omnibus corporis partibus progressum, ad formam in utero recipiendam condensari. Hæmorum in corpore species quatuor, morborum omnium causa. Propositio huius libri.
- 2 Quomodo bilis, sanguis, & hydrops, & pituita, copiosiora, & pauciora sunt a cibis, & potibus. Sanguinis fons est cor. Pituita autem caput. Aqua vero fons splenis, & bilis folliculus in hepate. Caput, & splen, partes maxime caræ.
- 3 Cibus, ac potibus omnibus quatuor illos humores inesse. Corpus in se ipsum humorem ex ventriculo trahere.
- 4 Planta cur agrotent, aut non nascantur quibusdam in locis. Plantas ab initio humores iuxta cognationem non habentes, ne germinare quidem possent.
- 5 Locus alteri loco etiam valde vicinus, ad vini iucundi productionem plurimum præstat. Terra innumeris inesse facultates. Plantas omnes sylvæstres fuisse.
- 6 Unde pituita in corpore gignatur. Caput velut cucurbita corpori incumbit.
- 7 Cur pituita ad ventriculum, & vesicam perveniens non laedatur.
- 8 Bilis quomodo, & cur copiosior in corpore fiat. Hepar pueris cor dicitur. Hepatis dolores unde, & quomodo sedentur. Cibus, ac potus aut aliis mediamenta esse solent.
- 9 De aqua quomodo, & cur copiosior in corpore fiat. Aqua de splene purgatio non fit per supernas regiones. Pena ex splene deorsum tendentes multa.
- 10 De sanguine quomodo, & cur amplior in corpore generetur. Cordi dolor non oboritur. Pena jugularis post cibum, ac potum sanguinem statim attolluntur, ac facies rubet. Quomodo sanguis morbus in corpore generet. Morbus ex ciborum, ac potuum copia fieri.
- 11 Quomodo fontes isti quatuor, sanguis, bilis, pituita, & aqua (ut & ventriculus) si splenes fuerint, semper corpori distribuunt. Pena multa, ac frequentes per corpus disfluenta sunt.
- 12 Cibi, potusque succitas, ac insuavitas unde. Quando homo ebrius, ac potum appe-

tat, & quando cesset appetentia.

- 13 Solam bilem ad fellis folliculum in hepate, a cibus, & potibus fecerunt. Solus cardiorum, hoc est cordis morbus in fellis folliculo inascitur. Morbi cur in corde non oboriuntur.
- 14 Caput, & splen cur morbis maxime obnoxia.
- 15 Quomodo, & cur pauciores fiant humores hominem affligentes, & quot locis expurgentur.
- 16 Quomodo, & cur homines sani degent. Quamdiu humores in corpore morantur, & quomodo expellantur. Excrementorum graveolentia unde. Excrementa alimentorum quantitati respondent. Quid fieri solet, si humor in corpore maneat. Urina sanguinolenta propter humores ammixtos. Cibus etiam id, quod morbosum est, de corpore deferre. Quare, ubi quis ventrem exoneravit, aut minxit, non statim potum, ac cibo, pro egrediens salta copia, agitat. Quomodo humor ultra triduum in corpore manens, mox, aut minus homini malum de se præbeat. Quomodo, & cur cibi non possint eadem die exire.
- 17 Cur corpora repletiones assate nimis, hyeme magis ferant. Quomodo febres ab ambiente aere calido oriuntur.
- 18 Quomodo si plus humoris foras prodeat, quam de cibus, ac potibus accessit, homo attingitur, & qua ratione plus prodeat. Cur hominibus otiosis cibi injucundi, & quomodo febres illis accendantur.
- 19 Quomodo bona habitus ex usu accedat. Febres ex repletionem. Febres tertia, aut quinta die revertentes. Morbi per dies indicantur.
- 20 Cur febres, & qua ratione tertia, quinta, septima, aut nona die remittantur. Cur febres imparibus diebus solvantur.
- 21 Cur homines imparibus diebus moriantur. Spiritus graveolentia unde. Quod humores imparibus diebus turbantur. Medicamentis purgantia imparibus diebus non exhibenda.
- 22 Cur ulcera, si curentur, imparibus diebus magis inflammantur. Glandularum tumores quomodo ab ulceribus generantur. Caliditas quomodo ad ulcera perveniat. Propter in sano corpore tertio die, ster-

cus mi-

ea autem secundo prodit.

- 23 Quomodo morbi fiant, si homo a copiosiore humore fient non exparetur. Quia febris minus periculosa. Aquosus humor febris infusissimus, biliosus contra alimentum illi supeditat. Aquosus humor quomodo in febritionibus exhalet. Oleum eum non similiter ut aqua, extenuari, & exhalare possit.
- 24 Morborum principia tria. Violenti quid vocetur, & quod hoc maximum morborum principium.
- 25 De violentia, & qualia in corpore faciat. Pulvis. Contusio. Labor. Calum quomodo morborum principium, & causa. Aforbi a calore externo. Erysipelas, Hippasie, Serum lactis. Humores quomodo gravitate, aut levitate inter se differant. Febris a quibus humoribus magis oriantur. Febris ab aqua, seu atra bile minus fortes, & breviores. Qualia humor ante turbationem, & in ipsa turbatione in corpore efficiat. Quando humor affligens, priorem (qui salubris erat) consummat. Alimentum est hominis humor levis. Putrefactionis principium. Similitudo.
- 26 Quomodo ea, quae a calo nobis obveniunt, morbos perant, humores liquati, & ad altum delati, sterius conturbant. Aquosus humor postquam circa ossa, & nervos consistit. Quomodo, & quando rigor morbosus fiat, & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruat.
- 27 De lumbicis latiss, & rotundis, Lumbicis

rotundis parere; latus vero minime, sed abrupti. Cur lumbici partem perperam a quibusdam dicantur. Lumbicorum latorum species, & signa. Spota quaedamque oriuntur, lumbicis latis ad hepatis assistentibus. Lumbici quibusdam vocem interceptant.

- 28 De calculi morbi generatione a lacte, a corporis, & ventriculi consentientibus. Pituita ad fecem ammixta, glutinum sit. Simile. Lapides ex terra esu.
- 29 Calculi signa quinque. Urina subnigra a vesica lapide exulcerata, & inflammata. Arenosorum per urinam ejectio unde.
- 30 Pusum in ventrem deferri, & ex hoc in reliquum corpus. Vocem de pulmone edij a lobis vero, & lingua articulari.
- 31 Adedimentorum purpurationem facultates. Pituita de capite descendens pulmonem brevi exulcerat. Penter cur a medicamentis non exulceretur. Libra incola, peccorum pellibus pro vestibus utuntur.
- 32 Urina edulcorum olidorum (ut alliorum) odorem refert. Cyrenae, aut farina colla, in pulmonem, aut eius fistulam perveniens, hominem cecitat. Epiglottidis, qua hedera folio assimilatur, officium.
- 33 De hydropis generatione, & signis. Cur rassa angustioris oris, subito inversa, aquam a se non emittant.
- 34 De hydropis generatione in mulierum utero. Quando hi morbi diffusiores fiant. Qui ex hydropis moriuntur.

SECTIO I



De hominis generationem de omnibus et viri, et mulieris partibus semen progressum, et in uterum muliebrem illapsum condensatur, temporeque veniente natura hominis formam referens ex ipso producit. Habet autem et mulier, et vir quatuor species humoris in corpore, a quibus morbi sunt, qui non a violentia aliqua fiunt. Sunt autem species hae, Pituita, Sanguis, Bilis, et Hydrops, sive aqua, et de his non minima, Et quia animal secundum parentes nascitur, tot humorum species, et sanorum, et morbosorum in se ipso habet. Ostendam autem, quae in unaquaque harum specierum, et plura, et pauciora in corpore sunt, et a quo agrotant. Et quod morbi in imparibus diebus judicantur. Et quae sint morborum principia. Et qualia singula ex ipsis in corpore efficiant, ut morbum inducant, et a quo rigor febrilis fiat, et cur post ipsum febris irruat. * Primum autem demonstrare volo, quomodo bilis, et sanguis, et hydrops, et pituita, copiosiora, et pauciora fiant a cibis, et potibus, hoc modo. Ventriculus, dum plenus est, omnium horum corpori fons est. Verum ubi vacuus est, corpore frivus colliquecente. Sunt autem et alii fontes quatuor, a quibus unusquisque horum humorum in corpus procedit, postquam sane ipsi a ventriculo acceperint; et hi quoque fontes, ubi evacuantur, de corpore fruiuntur. Sed et ipsum corpus attrahit, ubi ventriculus in se ipso quid habuerit. Et sane sanguini fons est cor, pituitae caput, Aquae splen, Bili locus folliculi in hepate; hi sunt quatuor humoribus hi fontes, ventriculo excepto. Ex his autem maxime cavi sunt, Caput, et Splen. Nam in hoc ipso maxima amplitudo est. Verum de hoc paulo postea clarius dicam. Quin et haec se habent. * In omnibus cibis, ac potibus, et biliosi quid est, et aquosi, et sanguinei, et pituitosi: in alio plus, in alio minus. Quapropter, et quae eduntur, ac bibuntur, alia aliis praestant ad sanitatem. Arque haec mihi de hoc dicta sunt. Postquam vero comedit, aut bibit homo, corpus in se ipsum humorem relatum ex ventriculo, et fontes trahunt per venas de ventriculo, similis humor similem, et corpori distribuunt. Quemadmodum etiam in plantis similis humor similem trahit de terra. Habet enim eodem modo terra omnigenas in se ipsa, ac innumeras facultates. Quaecumque enim in ipsa nascuntur, his omnibus exhibet humorem similem univique, qualem et hoc ipsum, quod nascitur sibi similem juxta cognationem habet, et trahit unumquodque de terra alimentum, quale etiam ipsum existit. Nam et rosa de terra trahit talem humorem, qualis ipsa in potentia est, et allium de terra humorem ejusmodi trahit, quale ipsum in potentia est. Et

est. Et alia omnia terræ nascencia, ex terra trahunt, singula juxta se ipsa. Si enim hæc res non ita se haberet, non nascerentur plantæ similes seminibus. * Cui porro plantæ in terra cognatus humor multo uberior est, quam convenit, ea planta ægrotat. Cui vero paucior, quam opportunum est, ea rehicatur. At si ab initio non inist terræ humor, quem planta juxta cognationem trahat, ne germinare quidem poterit. Intelligeniam autem huius rei, quod si non habeat planta humorem secundum naturam, ne ab initio quidem germinet, inde nobis suppediatur. Ionia enim regio, et Peloponnesus pro temporibus anni a sole non minime calet, ac illustratur, ut sol nascentibus e terra sufficere possit, attramen fieri non potest, multis frustra iam id tentantibus, ut in Ionia, aut Peloponneso Silphium nascatur. At in Lybia sua sponte nascitur. Non enim est neque in Ionia, neque in Peloponneso, ejusmodi humor, qui ipsum alere possit. * Quam autem sint et alia multa medicinarum, quas sole sufficientes, regiones alere non possunt, alia vero sua sponte produciunt, hoc ipsum ejus, quod nunc dicturus sum, considerandi occasionem exhibet, quantum videlicet locus alerri loco etiam valde vicinus præstet ad jucundi vini productionem, sole aequaliter sufficiente. Hic etenim in terra humor est, qui vinum suave exhibere potest, illic non est. Sunt etiam sylvestria non pauca in loco nascencia, quæ ad orgyæ, seu cubitorum quatuor spatium translata, nasci minime compertas. Non enim habet terra talem humorem translato, qualem illa sylvestribus plantis exhibebat. Sunt enim ex ipsis quadam venenosiores, alia humidiores, alia dulciores, alia sicciores, alia asperiores, et innumera alia aliter se habent. Innumera enim sunt in ipsa terra facultates. Et propter hæc genera primum nihil alteri simile ex terra productum est, quod non esset cognatum. Et mihi sane videntur hæc omnes plantæ sylvestres fuisse. Verum homines ipsas manifestecerunt, fructum terre efficientes, usamque juxta suum semen. Trahit enim similis humor similem ex terra, et ex hoc angelicit, ac nutritur, et nullum ex terræ nascentibus alteri simile est, quod non æquale, neque similem humorem ex terra trahat. Et omnia, quæ nascuntur, in eis, ac potus istum venientia, multas facultates de terra ad se trahunt, et in omnibus est aliquid pituitosi, ac sanguinei. Et ex hoc adeo ad hanc demonstrationis necessitatem deveni, quod a cibis, ac potibus in ventriculo procedentibus trahit corpus secundum fontes, quos nominavi, similis humor similem per venas. * Referam quoque aliud argumentum, quod singula, prout relatum est, trahant, et simul dicam, unde pituita in corpore gignatur. Ubi quis casum contemnit, aut aliquid acre, aut aliud quid edit, aut bibit, quod pituitosum est, statim ipsi ad os, ac nares accurrunt, atque hoc ita fieri pariter omnes videmus, partim ita esse credere oportet ex his, quæ ego referam. Affero itaque, quod quantum in cibo, aut potu pituita inest, illud ubi ad ventriculum pervenit, partim corpus ad se ipsum trahit, partem caput, ut quod cavum sit, et velut cucurbita corpori incumbat, ad se trahit, utpote viscosa existente pituita, ita ut hanc alia per aliam sequatur ad caput; et quæ quidem recens ex cibo generatur pituita, in capite manet. Vetus autem, prout copiosior est recens, ab ipsa violente extruditur. Quapropter ubi quis edit, aut bibit aliquid pituitosi, excrescat pituita. Habet autem et hæc res se hoc modo. * Si ubi edit, aut bibit quid pituitosus homo, non rursus exeat, quod redandat, neque per os, neque per nares, necesse est ipsum manere in capite, aut ad corpus descendere de capite, et ad ventriculum pervenire. Ac optimum quidem fuerit, si ad ventriculum perveniat. Exire enim poterit una cum stercore, et si quidem multum fuerit, ac humidum, stercore humectare poterit. Si vero modicum, non hoc effecerit. At si in capite maneat, multum dolorem capiti exhibuerit, quum in venis est. Si vero modicum, non hoc fecerit. Significationem autem de se præbet, copiosum ne sit, an modicum. Quod si ad corpus deveniat, atque illic alio humorum mixtum fuerit, si quidem multa fuerit pituita, statim corpus leserit; si vero pauca, non adeo ledere poterit, quum magnum sit corpus, si non et aliud quoddam principium ipsi reliquum sit. Verum temporis progressu, si alia pituita superaccidat, lædi utique possit. At si corpus vestire, ac ventriculo deleget, atque hæc foras perferant, nihil mali ex ipsa habuerit. In hoc igitur sermone demonstratum est, quomodo caput pituitam ex ventriculo trahat, et simile ad simile perveniat, et simul a me dictum est, quomodo, et quare copiosior pituita homini a cibis, ac potibus fiat. * Nunc vero dicam de bile, quomodo, et cur copiosior in corpore fiat, et quomodo locus folliculi in hepate ipsam trahat. Habet se res hoc modo. Postquam comedit, et bibit homo aliquid amari, quodque alias biliosum, ac leve est, copiosior etiam bilis fit in hepate, et statim dolet hepar, quod plerique cor vocant, atque hoc ita fieri videmus, et clarum nobis est, quod a cibo, aut potu factum est. Trahit etenim corpus in se ipsum de cibis omnem prædictum humorem. Trahit etiam folliculus in hepate, quicquid isthic biliosus inest. Et si derepente multa bilis fiat, homo hepar dolet, et de ventre copiosior fit. Hoc enim contingente, procedit de veteri bile propter multitudinem ad ventriculum fit. Et ex hoc tormento ventriculo obortitur, et pars ipsius per vesicam, pars per alvum egreditur, atque sic minima pars in homine manet, et dolores cessant. Si vero neutrum horum contingat, procedit primum de veteri bile ad corpus.

pus, distribuitur enim ad ipsum, & si multa fuerit, statim significationem sui præbet, alii humori ammixta. Si vero modica, non adeo læserit, quum magnum sit corpus, si non & aliud quoddam principium suboritur. Verum temporis progressu, si alia bilis superaccedat copiosior, hominem utrique læserit. Si vero non superaccedat, excolare illam poterit corpus, ut & bilis, & quæcumque biliosa sunt, prodeant. Nam quæ in cibo, ac potu sumuntur, alia aliorum medicamenta sunt. Sic sane etiam alia quæcumque lædencia sunt medicamenta, ubi aliud ab alio in ventriculum incidit, sua ipsius potestate causam habens, id, quod superatum est, expellit, ac ipsum lædit. At si superaccedat alia bilis in corpore, ab his, quæ in ventriculum incidunt, morbus hinc oboritur. Atque in hoc sermone iam ego declaravi, quomodo bilis, & cur copiosior fiat in corpore a cibis, & potibus, & quod trahit in se ipsum folliculus in hepar iuxta similitudinem id, quod biliosum est, a cibis, ac potibus. * Nunc vero dicam de aqua, quomodo, & cur copiosior fiat in corpore, & quomodo splen trahit in se ipsum. Affero autem, ubi homo bibit amplius, & corpus, & splenem aquam in se ipsa trahere ex ventriculo. Et si plus traxerint, quam oportet, statim hominem affligi, atque hoc ita fieri intelligunt, quicumque homines splenici existunt. Postquam autem traxit splen, opimum est, si verus aqua, quæ in splene merat, ad vesicam, aut ventriculum excoletur, & per hæc expellatur. Nam per supernas regiones non purgatur aqua de splene, nisi quantum ejus in vas inest, quæ de liene procedunt; verum ad ventriculum, & vesicam depurgatio fieri potest. Si vero hæc ad fluxionem apta non fuerint, neque aqua per ea foras excoletur, de splene ad infernas partes aqua procedit, atque isthic alii humori miscetur. Et si quidem pauca fuerit, non sane læserit, sed de corpore ad vesicam, & ad ventriculum per venas excolari poterit. Sunt enim multe ex hoc reudentes deorsum, quæ ex infernis partibus ad se ipsas trahunt, ubi sicciore fuerint, quam prius erant. At si alia aqua generetur, & ventriculus, ac vesica foras non expellant, splen elevatur, & infernæ corporis partes dolore afficiuntur. Atque hæc a me dicta sunt, quomodo, & cur aqua copiosior generetur in corpore a potu, & quomodo splen trahit. * Nunc autem de sanguine dicam, quomodo, & cur amplius in corpore generetur. Postquam bibit, aut comedit homo aliquid, quod sanguineum est, trahit quidem & totum corpus in seipsum, trahit autem & cor sanguineum ad se ipsum. Et ubi plus attraxit, non oboritur cordi dolor. Est enim cor res solida, ac densa, & propterea dolore non affligitur. Et ex ipso procedunt venæ crassæ, jugulares appellatæ, ad quas statim, si copiosius accedat, sanguineum illud distribuitur, & illæ impletæ brevi ad caput, & corpus delegant. Et quum ederit, aut biberit homo quid sanguinei, statim venæ jugulares attolluntur, & facies rubet. Accedente vero ad cor, & corpus sanguine, quam satis est, uberiore, a cibis, ac potibus, & ad alium humorem ammixto; si non ab ipso egressus fuerit per alvum, aut vesicam, reliquo humori ammixtus, dolorem corpori inducit. Si vero modicus accedat, non sane læserit corpus. Verum temporis progressu distribuitur ab ipso ad ventriculum, aut ad nares, quæ ipsum foras excolant, & nulla læsio contingit. Si vero paulatim copiosior fiat, morbosus efficitur. Atque ita quomodo copiosior sanguis generetur, a me declaratum est. Quum autem sint quatuor, Sanguis, Bilis, Pituita, & Aqua, omnia hæc a me demonstrata sunt, & quomodo, & cur copiosiora fiant a cibis, ac potibus. Quod autem ex his fiant, ac generentur, hoc argumento constat. Si homo parum edat, & parum bibat, nullum morbum hoc ipsi inducit. Et hæc quidem de hoc mihi dicta sunt. Attigi etiam obiter ostendere intelligenti, quomodo hæc pauciora fiant. Verum de hoc paulo post melius tractabo. * Cæterum fontes hi quatuor, quos nominavi, quum pleni fuerint, semper corpori distribuunt; quum vero vacui, vice versa trahunt ab ipso. Sic etiam ventriculus facit. Et habet se res hoc modo, veluti si quis tria, aut plura anea vasa in planissimo loco componat, & coaptata quamoptime disponat, fistulis ad foramina insertis, atque ita placide in unum vas aquam infundat, donec omnia ab aqua fuerint expleta. Ab uno enim disfluat in reliqua vasa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquam autem plena facta fuerint vasa, si quis de uno aquam effundat, retribuet se retro fluens aqua ad unum vas, & vacua fient reliqua vasa rursus, quemadmodum etiam susceperunt. Sic sane & in corpore res se habet. Postquam enim cibi, ac potus in ventriculum inciderint, fruitur corpus de ventris, & una cum fontibus impletur. Ubi vero alvus vacuatur, rursus retro humor ab ipso redditur, quemadmodum susceperat, veluti ex aliis ad unum vasculum. Venæ enim sunt per totum corpus tendentes alie tenuiores, alie crassiores, multe, ac frequentes. Hæ autem, donec vivit homo, apertæ sunt, & discurrunt, & dimittunt novum humorem. Ubi vero mortuus fuerit, clauduntur, & extenuantur. Quamdiu igitur vivit homo, fruitur corpus de ventriculo, ubi quid in se ipso habuerit; fruuntur etiam fontes, & impleri corpori distribuunt. Si enim corpus non traheret de ventriculo humorem, sed soli fontes, & hi ad corpus distribuere, non sane haberet corpus sufficiens alimentum, sed paucius. Non enim amplius haberent alimentum fontes, quod corpori subministrarent. * At

- vero si fontes isti non essent, dum edimus, ac bibimus, vere non cognosceremus
 175 neque quid iuandum, neque quid iniucundum esset propter hanc, quam referam, necessitatem. Hi loci quum minores sint, & intra reliquum corpus, semper etiam, antea quam attrahat unusquisque iuxta suam facilitatem, reliquo corpori denuntiat de cibis, ac potibus, qui biliosus sit, & qui pituitosus, & qui sanguineus, & qui aquosus. Quicquid enim horum humorum, plus quam opportunum est, in
 180 cibis, ac potibus nobis obvenit, neque cibos illos iucundos facit. Quæ vero maxime appetimus, pro eorum ratione etiam illi iucundi sunt. Si vero cibis, ac potibus opus habuerit fons quidam, pro hac ratione etiam corpus trahet ab ipsis fontibus, donec humor paucior, quam oportet, fiat, & tunc sane appetit homo aut edere, aut bibere tale quid, quod portionem illam expleat, ac reliquis adequet.
 185 Et propterea, ubi multum cibi sumpsimus, aut bibimus, quandoque adhuc cibum, aut potum appetimus, & nihil aliud libenter edimus, quam quod appetimus. Postquam autem comedimus, & adequatus fuerit humor, his perfectis & in fontibus, & in corpore, tunc cessat appetentia. Atque hæc de hoc a me dicta sunt.
 * Quin & hoc se ita habet, quod ad folliculum in hepate sola bilis a cibis, ac potibus fecerint. Venulæ enim, quum debiles, & tenues sunt, alium humorem trahere non possunt, qui gravior, & crassior existit, & simul non est ea loci capacitas, ut alius humor in hoc folliculo consistat, & est hic locus maxime familiaris
 190 bili secundum naturam, & ob id in ipso nullus alius fit morbus, quam is, quem homines cardiognum, hoc est cordis morbum vocant. At caput, & cor, & splen, de omnibus humoribus participant. Unumquodque tamen, si non ægrotet, plurimum de relatis participat iuxta suam ipsius naturam, caput pituita, cor sanguine, splen aqua. Trahunt autem & de alio humore venæ in se ipsas, amplæ, & crassæ, & inflat pampini retortæ existentes, ita ut ubi trahant, alius humor alium sequatur. Et cordi quidem propinquant venæ iugulares crassæ,
 195 ad quas cito distribuitur, ubi illi amplior, quam commodus est, humor accedat. Hæc vero ad reliquum corpus delegant, & simul ipsum cor solidum est, ac densum, ut ab humore non ægrotet, & propterea nullus morbus in corde oboritur.
 * Caput autem, & splen maxime sunt morbis obnoxia. Ægrotant enim & ab his, quæ a natura insunt, quum plura, quam opportunum est, accesserint. Ægrotant
 200 item ab aliis humoribus. Venæ enim in ipsis crassæ, ac mustæ sunt, & ipsæ quoque venosæ sunt, ac cava, ut & alius humoribus recipiendis capacitas in ipsis sit, paucum nimirum accedentibus, & ad eum humorem, qui a natura inest, se ammisceribus. Quenadmodum in vase magno amplior capacitas est, quam in parvo. Sic sane, & in capite, aut in splene res se habet. Magna enim capacitas maxime in ipsis est. Si vero repleta fuerint isthic humore venæ, ab ipso sane in illis morbus oboritur. Atque hæc mihi de hoc nunc dicta sunt. * Volo autem melius declarare,
 210 quomodo unusquisque horum humorum in corpore paucior fiat. Quatuor eundem humores esse demonstravi hominem lædentes. Quatuor item ipsorum fontes. Quatuor quoque esse dico locos, per quos homo de singulis his expurgatur. Sunt autem his, os, nares, podex, utinæ meatus. Et ubi humor aliquis affligens copiosior factus fuerit, si his locis homo depurgetur, nullus ipsum morbus ab illo premit. Et si ventriculus plenus fuerit, liquecente corpore ab humore, desinit ad ipsum, & extra prodit per aliquem horum locorum, & propterea humor paucior fit in corpore. Corpus enim, velut & antea dixi, ventriculo retribuit, ubi vacuus fuerit, & trahitur de ipso, ubi plenus existit. Atque hæc a me dicta sunt, quomodo, & cur pauciores fiant humores hominem affligentes. * Quomodo vero, & cur homo sanus degat, referam. Postquam comedit, ac bibit, & humor ad corpus pervenit eo, quo dictum est, modo, ammixtus alii tum ei, qui in corpore, tum ei, qui in fonte est, ea quidem die, qua accesserint, in corpore manet, postmodum vero alius humor ad ipsum accedit. Atque hi quidem duo sunt dies; duo
 215 vero in corpore humores. Et alteri quidem humori duo dies sunt, alteri unus. Et qui quidem posttridie accessit, manet in corpore, ut qui sit crassus. Alter autem coctus a caliditate dissinditur, & tenuis fiens, postera die ad ventriculum accedit, & per omne tempus a recenti expellitur. Ubi vero ad ventriculum pervenit, cibos in hoc loco coquit, & de se sanguinem in corpore facit. Si vero permanserit, tempore graveolens fit. Tertia vero die una cum stercore & urina exit, copia ipse sibi ipsi æqualis, & consimilis, & æquilibris, etiam si sui ipsius pars quædam sit, quo humor maneat in corpore iuxta relictam rationem. Insistit autem & terttia die humor de corpore ad ventriculum amplior, & graveolentior, qui videlicet reliquus fuit a secundo, & desert cibos concoctos, & quicquid est in corpore morbosum, et rursus simul exit. Indicium est autem urina, quæ sanguinolenta est, quod cibi deserunt de corpore etiam id, quod morbosum est. Et cibi quidem semper posttridie per alium secedunt, humor autem ad tertiam diem. Hoc modo sanitas contingere solet. Atque hæc dicta sunt, quomodo, & cur homines sani degunt.
 220 At vero humor hic, si particulatim foras prodiret posttridie, cibi non similiter ex ventriculo graveolentes facti foras prodirent, sed veluti cocti, et urina potius similis, et corpus semper evacuaretur, et per omne tempus homo, ubi ventrem

S E C T I O I I.

- 23 **N**unc vero exactius referre volo, cur homines aegrotent, simulque cum hoc 1
sermone dicam, quæ sint principia morborum, & qualia unumquodque
ipforum efficiat. Sic autem assero. Si cibi plures, quam opportunum est,
qui jam concocti sunt, iutus maneant, & homo non purgetur, & alii
cibi superingerantur, corpus ab humore priore, ac recenti repletum cale- 5
scit, & febris ex hoc homini oboritur. Verum febris hoc modo fiens,
non periculosa, neque fortis est, in qua humor aqualis est, copia pau-
lulum uberiore nos affligens. Si enim hoc ita se habuerit, & quis admo-
dum validus sit, & quæ comoda sunt, adhibuerit, sanus evadit. Unus autem
morbus solus est ex omni humore, & septem signa habet. Nam & tussis ip- 10
sum habet, quæ & debilis, & sicca est, & venter durus fit, utpote & stercore intus
contento, caput gravatur, & vomia, & febrit, & urina non probe prodit. Hæc se-
ptem signa huius morbi sunt ex omni humore fiensis. Si vero alvi egestione non
prodeunte, unus ex aliis humoribus superet, melius deget homo. Et si quis febre
fiente ab omni humore, non adhibeat idonea, invalescet morbus, quantum ipse 15
humores superaverit, hoc modo. Calefcente sanguine exhalat maxime per hunc
humor aquosus, qui febrili est infestissimus. Relinquitur autem pinguis, ac le-
vis, qui est biliosus, & febrili maxime nutrimentum est. Exhalat autem hoc mo-
do, velut si quis aquam, & oleum in vas æneum infundat, &igna multa subje- 20
cta ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior erit, ex vase enim ex-
halabit, oleum autem paululum imminuetur. Nam aqua præ raritate ab igne at-
tenuari potest, & levis reddita exhalare. Oleum vero utpote quod est conjun-
ctum, ac densum attenuari non potest, neque similiter ut aqua exhalare. Sic sane
& in homine se res habet. Aqua enim calefcente corpore foras exhalat, biliosus
autem humor, ut qui conjunctus est, ac densus, non similiter attenuatus exala- 25
re potest. Verum attenuatus hic biliosus humor, corpus magis calere facit. Co-
piosus enim, & melius alimentum febrili bilis suppodat, & prorumpens, aut firma-
ta in corpore, morbum supra priora corroborat. Atque hæc quidem dicta sunt
de eo, quod afficitur homo, si non purgetur, & curetur. Si vero non ipsa copia
prævaluerit, sive semel multa fiens, sive paulatim colligatur, reliquum corpus, dum 30
hoc fit, præ robore sustinere potest, donec principium aliquod superaceadat. Atque
hoc sane modo morbus fit, si homo a copiosiore fiente humore non expurgetur.
- 24 * Principia, ex quibus fiunt morbi, tria sunt. Et unum quidem hæc a me relatum
est, qualia, & quot efficiat in corpore; demonstravi enim, quomodo, & cur ægro-
tet homo, si non purgetur. Alterum est, si contingat, ut ea, quæ ex cælo obve- 35
niant, inepta, & præter victus rationem sint. Tertium est, si violentum quid accedat, vio-
lentum autem esse dico & casum, & vulnus, & plagam, & laborem, & si quid aliud
est huiusmodi. Horum vero principiorum maximum est violentia, si magna fuerit,
si vero parva, non ita maximum. Secundum est, si non purgetur homo. Tertium,
quæ ex cælo obveniunt, inepta fuerint ad sanitatem. Proinde diligenter ab his se cu- 40
stodire oportet. Singula vero ita in corpore faciunt, qualia ego dicturus
sum. * Equidem si vulnus fiat, manifestum est, quod caro dissecta est, & ulcus fa-
ctum est, hoc autem morbum esse dico. Si vero contusio fiat, homine percusso,
aut lapso, aut aliud quid tale perpesso, & tumor oboritur, sanguis statim præ
violentia calefactus, & venis hiantibus illapsus, non habens exitum præ copia, 45
quo abire possit, conglobatur, & propterea tumor fit, & tandem adest, donec
depurgatus fuerit eo modo, quo de locis depurgari dictum est, aut etiam per ip-
sum tumorem, & sive per chirurgiam, sive sine ea sanguini transitus fiat, aut per
tempus suppurato, aut non. Sed & labor tale quid efficit. Quum enim homi-
nes laborarint, quibus sane maxime sanguinis afflictio contigerit, illic firmatur, 50
ac calefit, & ex hoc dolor oboritur. Si vero hæc quidem superarit homo, ve-
rum multa copia labor accedat, & alvus, ac vesica non brevi copiam expulerint,
febris sane ex hoc irruerit. Et si quidem prior humor aqualis fuerit, nequa-
quam. Si vero in labore ipforum plurimus in corpore permaneat, superat ille.
Atque hæc a me dicta sunt de violentia, qualia in corpore efficit. Et hæc quide- 55
m duo sunt principia, violentia, & pleniudo, quæ si non purgantur homi-
nes, corpora calefaciunt. At vero quod ex cælo obvenit principium, si
ineptum fiat in homine, superat aliquid humoris, & velut ad morbum calefa-
cit, & frigefacit prius, si fieri contingat. Dicam autem prius de eo, quod
calefacit. Sic igitur sentio. Si in eodem homine fuerit aliquid morbofi, quale in 60
priori dixi, & ea, quæ ex cælo obveniunt, incommoda fuerint, & calefacit ho-
mo, turbatur humor omnis in corpore calefescens. Hoc autem violentia facit. Et
si quidem depurgetur homo, humore illo turbato, secernitur, quantum eius plus,
quam commodum est, redundarit. Et habet hæc res similitudinem ad id, quod
Scythiæ faciunt ex equino lacte. Lac enim in cava vasa lignea infusum coocuit, 65

- unt. Illud autem dum turbatur, spumescit, ac secernitur, & pingue quidem, quod Butyrum vocant, quum leve sit, in superficie consistit; grave vero, & crassum deorsum sidit, quod etiam secretum siccant. Ubi vero concretum, ac siccatum fuerit, Hippocren ipsum vocant. At serum lactis medium locum tenet. Sic etiam in homine, dum turbatur humor, quicquid eius est in corpore a principis, quæ dixi, disparatur. Et in superficie quidem bilis consistit. Levissima enim existit. Secundo loco sanguis. Tertio pituita. Gravissimus autem horum humorum est aqua. His vero ita se habentibus, quisquis ex his in morbo plurimus fuerit, in principio fiente turbatione, devenit ad locum, ubi plurimus esse possit. Verum in turbatione, spatiosa capacitate fiente, secretus distrahiunt, & calefaciunt corpus. Aut aliqua corporis parte firmatus, una cum alio humore, cum quo est in alio loco, dolorem, ac calorem exhibet. Qui vero calefactus est locus, insuper etiam reliquum corpus concalefacit, & ex hoc febris oboritur. Et oboritur magis a bile, & pituita, & sanguine; calidissimi enim hi humores existunt. Et si quis humor in aliqua corporis parte firmatus fuerit, ut plurimum morbus illi nominatur, & cognomen habet. Cæterum ab aqua non valde fortis febris oboritur, neque diuturna. Nam igni non bonum alimentum aqua præbet. Atque hæc quidem de hoc dicta sunt. At vero ante turbationem non habet multus humor, qui procedat, sed sursum, ac deorsum volvitur, & distrahiunt alii humori permixtus.
- 85 Omnia enim plena existunt. In turbatione vero evacuantur. Verum aliud aliis magis evacuantur. Et multus humor suum locum occupat, & alienus alii non amittitur, si firmatus fuerit, proutquam ille viribus adequetur. Potest autem ipsi adequari is, qui ab ipso postea ad morbum superaccessit, donec purgatus fuerit locus qualicumque purgatione. Si vero multus fuerit assidens humor, fruitur, & consumitur ad morbum etiam alius, qui prius salubris erat. Et tali modo homo moritur; fruitur autem, si morbus non amplius sufficiens alimentum haberet, & consumitur ab humore, qui in loco dolente existit; prout enim propinquum assumit, deinde longius depascitur, donec consumptum fuerit, & non amplius inest in corpore alimentum. Alimentum autem est hominis humor levis. Quem admodum igitur ut certum est, putrefactio primum paulatim fit, si maxime calefiat. Postea ubi isthic alimentum putrefactionis non amplius sufficit, depascitur de sano, initio sumpto a proximo, ad totum corpus, donec totum quicquid carnosum est, putrefecerit; postquam vero in totum depasta est, alimentum putredini consumitur. Sic sane etiam in morbo. Sumpto enim a loco illo initio, ubi isthic alimentum sufficiens non amplius inest, depascitur ulterius, a proximo initio facto. Postquam enim per totum grassatus fuerit, alimentum morbo consumitur, & alius salubris humor non superat. Et si hoc fiat, homo moritur. Quæ in turbatione, ubi hic salubris humor ampliotem locum occupavit, & non firmatus fuerit, sed volvitur, ac distrahitur, non amplius alii miscetur, sed ad morbum consumitur, si non depurgetur. Deinde venæ superimplentur. Valde autem impletæ, nihil ex se ipsis remittunt, proutquam spatiosa capacitas ipsis contingat. Quemadmodum ubi quis vehementer percussus est, sanguis sub plagam inbecutur, nimirum venis a plaga evacuatis. Postquam autem caries veluti spongia fuerint impletæ, non amplius remittunt, sed continent in se ipsis, donec in loco aliquid ab ipsis evacuatum fuerit. Quum enim collectus fuerit sanguis, præ copia viam intercepit. Quemadmodum si quis vas olearium coriaceum angustis oris oleo impletum, in osculum vertat e directo, & si hoc fecerit oleum, ex ipso prode non poterit; viam enim ipsum oleum intercepit, utpote multum, & acervatum incumbens. Si vero quis ipsum vas inclinet, libera erit via osculi intercepta, quia effluet oleum ex ipso. Idem fecerit etiam aqua in mensa. Ita sane etiam ubi multus humor in corpore præ turbatione locum occupavit, & venas impleverit, non amplius ab ipsis discedit, proutquam ubi locus vacuus est, alimento a morbo consumpto. Atque hæc a me dicta sunt de hoc, si in corpore quid fuerit, unde morbi signantur, redundantibus etiam aliis, & quomodo principia efficiant colorem, & turbationem humorum deducenda ad morbum. ¶ Nunc vero dicam, 26 quæ efficiant ea, quæ ex cælo nobis obveniunt, si ad ea, quæ in corpore generata sunt, incepta fiant, & quum humorem in corpore superarint. Aspero autem partem humoris in homine, ubi liquatus fuerit, congelari, ac spissari, donec morbum pepererit; partem vero dilatarsi, ac secerni. Habet autem & hæc affectio similitudinem ad lac. Si quis enim succum in lac immittat, frigiditas in ipso oborta, lac inspissat, & congelat. At circum inspissatum, serum est. Sic etiam in homine humor, frigiditate in morbo oborta, congelatur, & inspissatur. Circum ipsum vero aquosum humorem, adhuc etiam alius humor, quanto copiosior fuerit in alio corpore, amixtus est. At si quidem ad alvum devenerit, stercore conturbat, & tormen in alvo inducit, & foras pertransit, nullo magno damno illato. Si vero non ad alvum devenerit, firmabit se aliqua corporis parte, ubi ipsi plurima capacitas erit. Voluitur itaque exquirens sibi ipsi loci capacitatem. Et quod quidem aquosi humoris de conglotatione secretum est, utpote frigidissimum, ac gravissimum in corpore existens, ad infernas partes descendit, & circum ossa, ac nervos volu-

- exonerasset, ac minxisset, opus haberet statim potu, ac cibo pro egestionis factæ copia, si modo validus esse deberet, quum humor sufficiens in corpore non relinquitur, sed una cum stercore foras prodeat postridie, aut eadem die. Et si 245 quidem comedisset, bene esset; sin minus, & evacuans debilis esset, neque humor crassus fieri posset, ut postridie foras prodiret. Non enim sufficiens in corpore relinquitur. Nunc vero alvum exonerantes probe valemus, & si per biduum nihil cibi acceperimus, & vivere, & facere quid possimus, & non penitus debilitamur ex evacuatione in hoc tempore. Huius enim in corpore manens, 250 robur exhibet. Atque hæc a me dicta sunt, quomodo, & cur fieri non possit, ut humor, qui corpori accessit, foras egrediatur eadem die, immo neque postridie. Id porro assero, si humor pluribus quam tribus diebus in corpore permaneat, aut alius multus implens accedat, venis calecentibus, ac stantibus, majus malum, aut minus homini significationem de se præbere; hyeme quidem minus, 255 & posterius; æstate vero majus, ac prius. Atque hæc a me dicta sunt de eo, quod fieri solet, si humor in corpore maneat. At vero si corpus cibos eadem die egeret, non sufficeret humore uti posset, sed essent homines tenues, ac debiles. Nunc vero quum maneat cibi, ac potus, quandiu permanent, corpus fruitur sensim de ventriculo trahens, & impletur. Hæc dixi, & quomodo, & cur ci- 260 bi non possint eadem die exire. * Si vero cibi maneat in ventriculo, ampliore tempore quam opportunum est, & alii ad ipsos ineidant, corpus utique repletur, & dum premiuntur a plenitudine venæ, calor, ac dolor corpori accesserint, æstate quidem citius, hyeme vero posterius. Æstate enim calidus est aer am- 265 biens, & calidiorem corpus in se ipsum trahit. Et si calido adhuc existente ventriculo, calidior, quam opportunus est, spiritus homini accedat, nihil miri est hominem ex tali febre, hyeme vero, quum frigidum spiritum trahat in se ipsum, multo magis poterit corpus repletionem ferre, homine modice ventrem exonerante. Et hæc a me dicta sunt de eo, quod fieri solet, si cibi ampliore tempore in ventriculo maneat. Et attigi quoque obiter, ut declararem omnem humoris, 270 ac cibi & longioris, & brevioris temporis differentiam, cur homines agerent. Verum de hoc melius tractabo temporis progressu. * Reverror rursus retro de sanitate dicturus, quod sane corpus hominis humore de cibis, ac potibus fruitur, & prodeunt foras in sano tum cibi, tum humor juxta relatum rationem. Et si quidem foras prodeat plus humoris, quam de cibis, ac potibus accessit, homo 275 attenuatur. Prodit autem foris plus, quam accessit, ob hanc causam. Si in quiete degat homo, & non laboret, mali aliquid ipsi in corpore inest. Verum præ alia sanitate, quæ multa est, non lædit valde. Malum vero illud hujusmodi est. Postquam aliquid ex his quatuor corpori accedentibus advenit copiosius, non ita multo corpus calefit sensim, ut non valde lædatur, & liquefit in ven- 280 triculo, & cibum homini injucundum facit. Si vero humor alius alio copiosior fueris, febris ex hoc homini oboritur. Verum de hoc exactius paulo post tradam. Quandoque etiam ubi cibis jucundus est, homo attenuatur. Causa vero eadem est. His autem signibus, plus humoris extra prodit, quam succenturiatur. Et propterea in quiete degeneri contingit, ut attenuetur. At vero labo- 285 rantibus hominibus itidem corpus coalescit. Et hoc a labore calefcente tum humor in ipso diffunditur, tum attenuationis morbus oboritur. Quum autem inutilis fiat humor, & ad ventriculum, & ad vesicam defluit, hæc autem foras expellunt. Pars vero ipsius extra exhalat per internam corporis raritatem. Pars autem, quæ adhuc intus manet, sudor fit, & per corpus foras procedit. Eodem 290 modo & exercitationes juvenum idem efficiunt, quod labor. Si vero etiam non paucior fuerit humor eo, qui prius exivit, accedatque insuper alius a cibis, ac potibus, attenuatur propterea homo. Paucior autem accedit, si non aliud quid edere poterit, & si neque labores pro prioris laboris, aut exercitationis ratione, alii aliis pauciores sunt. Cæterum bonus corporis habitus accedit ex eis hæc 295 de causa. * Postquam refectus est tempore humor, & in priore labore prius egressus est alius alio copiosior, & unus alius alios valde superavit, homo repletus fit. Et si quidem a multis valde superetur, febris ex hoc modo oboritur. Si vero a paucis, parum superatur. Sed & corpus hoc modo sufficere, ac revalescere potest; humiditate enim uberiore in ipso existente, calorem exolvit. Calefit enim corpus a febre, & si quidem modicum fuerit id, quod affligit, tertia die eodem modo dimittit, per duas autem continue tenet; si vero copiosius, quinta die, per quatuor vero tenet pro ratione. Atque hoc modo morbi per dies judican- 300 tur. At si dimiserit febris in impurius diebus, & sanus homo fit, & moritur. Quæ de causa paulo post dicam. * Nunc autem referam, cur febris dimittat. Sic autem sentio. Quæcumque febris de corpore hominem corripuerit, necesse est, tertia die humorem affligentem exire de corpore, aut in alio quopiam impari die juxta rationem antea relatum. Non enim exit prius, quam alius bonus de ventriculo ipsi accedat. Nam intermedia, & postera die corpus trahit de ventriculo quicquid ipsi in se ipso dimiserit priori die, nisi ventriculus id expulerit, & alium humo- 310 rem habuerit, quod sane malum homini esset. Si vero dimiserit febris tertia

vos volutarium, adhuc magis corpus ad inflammationem perducit, & clarum est, quod circa nervos, & præsertim circa ossa aquosus humor, qui humorem facit, existit. Circa ossas enim corporis partes homo maxime riget, & capilli erecti stant, contorta cuticula, ac ficciore fiente, quam priori tempore, numquam aquosus humor isthic deficiente, & circa ossa obvoluto. Atque hinc sane solus ille locus, ubi primo tempore erat, humorem facere non potest, unde etiam rigor oboritur. At vero reliquus humor, qui æqualissime crassus est, partim quidem in toto corpore est, partim vero quantum abundaverit, si quidem alvus plena non fuerit, & quod affligit, modicum sit, quandoque ad alvum devenit, & nullum magnum damnum inducit, & aliquando quidem febrem non inducit, aliquando vero debilem, & innoxiam, & quod affligit, una cum stercore exit. Si vero alvus plena multum, quod affligit, habeat, periculum est ex ipso morbum aliquem fieri, si alicubi se firmiter id, quod affligit aut ad latus, aut ad viscus, aut alicubi aliam partem concalescat, quo primum illum humorem simul turbet. Qui vero non valde ex calore ab aquoso humore victi sunt, utpote qui circa ossa, & prope medullam consistit, hos progressu temporis magis lædit, primum quidem in illum ipsum locum, deinde ipsi propinquum, & semper ulterius depascitur, & alvus ipsum affluit, ut quæ calida sit, & postea tum alvus, tum lædens humor adhuc magis calefacit. At humor crassus calefcens, primum diffunditur is, qui propinquus affligenti existit, diffusus autem aquoso humori affligenti miscetur, deinde in concussione corporis inerior redditur, & tandem rigor tenet, quamdiu aquosus humor alii humori ammixtus est. Quin & febris hoc modo generata oboritur. Affligentia ad locum firmata, calefcens corpus febrem in se suscipere cogunt, & ab affligente, & ab alvo calefactum, reliquum aquosum humorem superat. Atque sic febris fit post frigus, si qua corporis parte copiosior humor formatus fuerit. Si vero volutatur, ac distrahitur, tali modo febris oboritur. Post frigus febris volutatur, maxime affligens circa alvum & supernam, & infernam. Isthic enim plurima loci capacitas existit. Dum autem volutatur, primum propinquæ calefcunt & viscera, & quæ in alvo sunt. Postea etiam alius humor diffusus calore fruitur, & aquoso humori miscetur. Atque febris post rigorem hic fit, ubi affligens volutatur, imo etiam ubi firmatus fuerit reliqua corporis parte. Et hæc a me dicta sunt, quomodo, & quando rigor morbosus fiat, & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruit. Et quæ sint principia morborum, & qualem unumquodque ipsorum morbum in corpore inducat, & quomodo, & cur in diebus imparibus morbi judicantur. Et unde homines sani sint, & unde ægrotent, & quomodo bilis, & pituita copiosior, & paucior fiat. Itemque alia multa, quæ in ipsa natura humana sunt, demonstravi, quæ sane hic sermo exigebat. Atque hæc ita relata finem habent. * Nunc autem de lumbricis latis dicam. Assero enim ipsos in puero, dum adhuc in utero est, nasci. Postquam enim semel ex utero egressus est, non tanto tempore sterco in alvo manet, ut ex ejus diuturnitate, ac putrefactione tantæ magnitudinis animal generari possit. Excernit enim semper hesternum sterco per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale vero animal nasci non possit, etiam si multis diebus homo sterco non egeret. Multa enim nascuntur, dum puer in utero est, hoc modo. Ubi ex lacte, & sanguine computrescente, ac redundante, utpote quod dulce est, pus factum fuerit fervidum, animal isthic generatur. Nascuntur autem & rotundi lumbrici isthic eo modo. Signum vero, quod hæc res ita se habet, hoc est. Postquam in lucem editi sunt pueri, mulieres ipsis in cibo offerunt medicamenta, quo sterco ex intestino exeat, & non comburatur, & simul ut intestinum dilatetur, Ubi vero cibum obtulerint, multi sane pueri & rotundos, & lutos lumbricos una cum primo stercore excernunt. Si vero non excreverint, sunt etiam, insuperque nascuntur in ventribus. Et rotundi quidem parvius, lati vero non amplius, etiam si quidam ipsos parere dicant. Nam homo, qui latum lumbricum habet, velut cucumeris semen excernit alias atque alias una cum stercore ipso, & sunt homines, qui hoc lumbrici partus esse dicunt. Mibi vero non recte dicere videntur, qui talia dicunt. Neque enim ab uno animali tot pulli generari possunt, neque ea est loci in intestino capacitas, ut partus educare queant. Angescunt autem puero, angescit etiam lumbricus in intestino ab his, quæ in ventriculum ingesta sunt, & æqualis sit intestino quibusdam in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam paulo prius. Et postquam intestino adæquatus est, similiter angescit, & quanto major factus fuerit, una cum stercore excernitur de intestino recto, & excidit velut cucumeris semen; sæpe vero etiam major. Quibusdam vero iter facientibus, aut laborantibus, & ventriculo calefcente, deorsum descendit, ipsique prominet ex podice instans, hocque facit, & de podice refecatur, aut retrocedit. Signa vero, quod non pariat, sed ita habeat, velut ego dico, hæc sunt. Si quis curet hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit, aut potio-

- longe amplior, & ubi abruptus fuerit, per multum tempus signa cum stercore
 205 non prodeunt. Postea vero angescunt. Atque hæc argumenta sunt, quod lumbricus
 latus non parit, sed abrumptur. Est autem species ipsius, qualis alba in-
 testini rasura. Signa habet hæc. Cacat alias atque alias velut cucumeris semen, &
 ubi jejuniis est homo, exilit ad hepar alias atque alias, & dolorem inducit, & quan-
 210 doque sputa ori insunt, ubi ad hepar assilit, quandoque non. Quibusdam etiam
 vocem intercepti, si fortiter ad hepar irruat, & valde multa sputa ex ore sunt,
 paulo autem post sedantur, & tormen multum in ventriculo alias atque alias ob-
 oritur. Quandoque etiam ad dorsum dolor incidit. Nam & hic aliquando firma-
 tus innititur. Hæc lumbrici lati signa sunt. Contingit & hoc. Qui hoc animal-
 culum habet, in toto quidem tempore valde debilis fieri non poterit. Ubi vero
 215 debilis factus fuerit, vix revalescit. Latus enim lumbricus partis alicujus parti-
 ceptis fit ex his, quæ in ventriculum ingesta sunt. Si quidem igitur curatus fue-
 rit iusto modo, sanus fieri poterit. Si vero non curetur, ita sponte non exit. Mor-
 tem tamen non inducit, sed consenscit. Atque hæc a me dicta sunt de lumbrico la-
 to, unde nascitur, & quæ morbi ipsius signa sunt. * Caterum calculi mor-
 220 bo principium oboritur a lacte, ubi puer lac impurum fugit. Lac autem in nu-
 trice impurum fit, si pituitosis cibis, ac poribus, & alimentis in puris nutritur
 utatur. Conferunt enim omnia in ventriculum illabentia in ipsa ad lac. Habet au-
 tem & hæc res se hoc modo. Si nutrit non sana fuerit, sed biliosa, aut aquosa, aut
 225 sanguinea, aut pituitosa; lac etiam malum puero generatur. Consentiant e-
 nim corpus, & ventriculus. Plurimum vero ipsi ad lac cedit de eo, quod ipsa
 plurimum in se ipsa habuerit. Et puer si de nutritæ lac non purum suserit, sed
 biliosum, velut dixi, morbosus fit, ac debilis, & in præsens maxime affligitur,
 quandiu lac prævum, ac morbosum suserit. At ubi suserit lac non purum, sed
 terreum, & pituitosum, & habuerit puer venas de ventriculo ad vesicam tenden-
 230 tes amplas, ac attrahentes, procedit autem & quod bibit nutritæ, & lac in ven-
 triculum pueri, tale quale trahit a ventriculo de lacte, in totum similiter, prout ve-
 næ ad ventriculum detrudere possunt, si quid sane in lacte non pituitum fuerit, id
 quo vesica fruatur, lapis fit tali modo, velut in aqua non pura, in calice, aut vase
 æneo turbata, & rursus sedata, sex acervata fit in medio. Sic sane & in vesica de
 235 utina non pura existente. Et non per urinam ejicitur, ut quæ in cavo sit loco,
 maxime acervata fiens præ dolore per mictionem non pertransit, & a pituita cru-
 da concrevit. Glutinum enim fit pituita ad fecem ammixta. Et primum parva
 lanugo superstat, deinde quod accedit, arenosum fit, glutinoso fiente pituita, quæ est
 in vesica de lacte, & augetur, & quicquid humoris in glutinatione accesserit,
 240 emingitur. Rursus autem sex solida fit, & lapidis speciem accipit. Quemadmodum
 ferrum ex lapidebus, ac terra, dum comburuntur, fit. Et in prima quidem in
 ignem immisione conglutinati sunt lapides cum terra ad ferri recrementum.
 At ubi iterum atque iterum in ignem unmissa fuerint, recrementum quidem foras
 decedit, liquefcens ex ferro id, quod ita fieri oculis videmus. Ferrum autem in igne
 245 relinquatur, & recremento decedente, subsidet, sitque solidum, ac densum. Sic pro-
 fecto etiam sex in vesica, dum pituita glutinum fit, emingitur id, quod ab urina
 liquefcit. Sex autem subsidet, & densatur, ac solida fit, velut ferrum. Ubi vero sub-
 sedit, ac solida facta est, sursum, ac deorsum in vesica volutatur, & feriens vesicam,
 dolorem inducit, & si vehementer feriat, ac ulceret, aliquid de ipsa aufert. Verum
 250 id, quod insuper affertur, adhuc magis quam id, quod arenolum decessit, concre-
 tionem efficit. Atque tali modo fit lapis de lacte in vesica, & si puero anxietas ali-
 qua ab hoc oboritur, alias atque alias, ubi meire vult, urine meatum apprehen-
 dit. At si puero jam adulto lapis gignatur ex terræ vult, dolor non adest ipsi
 prius, quam ipse sibi ipsi cibum deligat. Et hæc a me de hoc relata sunt. * Cate-
 255 rum morbus signa quinque habet. Nam, ubi meire vult, dolore affligitur, & uri-
 na paulatim fluit, velut in urinae stillicidio, & est subetuenta, nimirum vesica
 a lapide exulcerata, & vesica inflammata est. Verum hoc signum inconspicuum
 est, indicat tamen summa pars præputii. Quandoque mingit arenosa, verum a
 talibus, qualia ego dicam. Ejicit autem aliquando lapides duos, aut etiam plu-
 260 res parvos generatos eodem modo, velut de uno dixi. Fiunt etiam tali modo.
 Quum lapis fuerit concretus, & profunde subfederit in vesicam in arena separa-
 ta, ita ut ipsam advententem lapis non assumat in se ipsum, sed gravior, ac co-
 piosior fiat, ut tamen ipsa ad se ipsam non concreascit, etiam sic duo lapides fiunt.
 Fiunt etiam plures eodem modo. Sed & collisis inter se in agitatione, aliquid
 265 disparatur, & arenosum per urinam ejicitur. Quod etiam aliquando contingit,
 ubi arena ad vesicam descendit, & non coalluit. * Quidam dicunt, quod po-
 tus in pulmonem devenit, ex hoc veto in reliquum corpus. Hi autem, qui hæc di-
 cunt, redarguuntur ex hoc, quod dicturus sum, quod valeat pulmo cavus est, &
 in ipso fistula est. Quod si pulmo cavus non esset, & fistula non ipsi adhare-
 270 ret, animalia vocem non ederent. Vocem enim edimus de pulmone, quia cavus
 est, & fistula ipsi adest. Vocem autem articulant labia, & lingua. Verum de hoc
 exactius in peripneumonia tractatione egi. Caterum hominibus, quibus
 portis

porus in pulmonem ferri videtur, adversabor, habetque res se hoc modo. Proce-
dit potus in ventrem, a ventre autem in reliquum corpus expenditur. Oportet
autem his, quæ dicturus sum, mentem adhibere. Sermonis argumenta, quod po-
tus non procedit in pulmonem, sed in ventrem, hæc sunt. Si enim potus pro-
cederet in pulmonem, quum pulmo expletus esset, homo non facile respiraret,
neque loqui posset. Non enim esset, pulmone pleno existente, quod resonaret.
Et hoc quidem unum argumentum est. Deinde si potus in pulmonem procede-
ret, cibi in nobis sicci existentes non similiter concoquerentur. Atque hæc duo
argumenta existunt. Sed & medicamenta alium subducunt, si in poru suman-
tur, extra ventrem procederent. Habet autem hæc res hoc modo. * Quæcumque
medicamenta purgatoria sunt aut superne, aut inferne, aut etiam utrumque præ-
stant, ea hæc faciunt. Omnia valde urunt, & fortia quidem ex ipsâ, si partem
aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora veto tutius
lentum corporis motum faciunt, quæcumque tandem partem occupant. Si ve-
ro aliquod ex his medicamentis in pulmonem pervenit, videtur mihi ma-
gnam aliquod malum inducturum esse. Pituita enim de capite descendens, eum
in valde brevi tempore exulcerat. Teneta enim, & rara res est pulmo, & si ex-
ulceratus fuerit, non bene habebit homo ille ob multas sane causas. At veto
venet a medicamento non exulceratur. Nam tes est valida, ac robusta, nimi-
rum velut pellis, & corium. Et plerique sane ex Lybiæ incolis pecorum pellibus
pro vestibus utuntur, ventribus autem pro utriculis. Robusta enim res ven-
ter existit. Deinde ubi a vino nigro homines repleti fuerint, nigra recrementa
exerunt. Atque hæc omnia argumenta existunt. * Et ubi allia comederimus,
aut aliud quoddam edulium olidum, utinam reddimus, comesta odore referen-
tem. Et hæc quidem omnia argumenta sunt. Sed & hoc considerandum venit,
quod dicturus sum. Si quis cyceonem biberit, aut farinam coctam sorbe-
rit, aut aliud quid ejusmodi, & hoc ipsum in pulmonem pervenerit, certe ar-
bitramur, ipsum ne minimum quidem tempus vivere posse. Ubi enim modicum
quiddam pituitæ in pulmonem pervenerit, aut iu fistulam ipsius, multa, ac for-
tis tussis oboritur, ac convulsio. Si vero utrique & vixerit homo, qui cyceonem
biberit, aut farinam coctam sorbuerit, ubi sane concocta fuerit sorbitio, vide-
tur mihi multa, & fortis caliditas corpori oboritura esse, multusque dolor, ut
omnino moriatur homo hoc modo, si illa in pulmonem perveniant. Atque hæc
jam argumenta septem sunt. Præterea quomodo lac infantes pueros nutre-
re possit, si ad pulmonem descenderet? Atque hoc mihi aliud adhuc argumen-
tum est. Et hæc ne produxissem quidem ad sermonis mei confirmationem,
nisi multi adeo homines essent, quibus potus in pulmonem procedere vider-
etur, & necesse est ad opiniones fortiter in hærentes multa argumenta adduce-
re, si quis velit auditorem a priore sententia abducere, ac convertere, ut suis ver-
bis fidem habeat. Et propter hoc etiam potus in pulmonem non procedit, sed
in ventrem; quia cœcigua, & annexa est ipsi gula hominis semper hians, & in
hanc procedit. Et simili pulmonis fistulæ, velut hederæ solum incumbit, quare
neque descendere permitteret in transglutendo, si in ipsum procederet. At-
que hæc mihi de hoc relata sunt. Procedit namque potus in ventriculum, &
ubi expletus est, splen de ipso suscipit, & distribuit ad venas, & ad omentum,
& in declive deorsum, & in scrotum, & ad crura, & ad pedes. * Et postquam mor-
bus ex aqua multa obortus fuerit, procedit de ventriculo, & semper ad sple-
nem venit de potu, ubi biberit homo. Contingit autem in hoc morbo, ut neque
febricitent alias ex ventre, quam ubi homo sinit, vesica autem, & ventriculus
non iusto modo excolent, neque conveniente diætâ homo utatur. At splen sub-
agrotans a ventre de potu trahit. Morbus autem obortus, & scrotem pelluci-
dum fit, & claviculæ, & collum, & pectora attenuantur. Colliquantur enim
ab hoc morbo, & humor ad ventriculum defluit, & infernæ partes aqua plenæ
sunt, & venter cibum averfatur, & quandoque valde adstringitur, quandoque de-
fluit. Nec vesica iusto modo excolat, & plerumque horror alias argue alias per
corpus discurrat, & quandoque febris corripit. Et quibuldam facies tumida
fit, quibuldam non. Aliquibus etiam tibie rumpantur, ubi morbus diutur-
nus factus fuerit, & aqua illinc effluit. Incidunt & vigilie, & impotentia cor-
poris, ac maxime lumborum. Et postquam edit, aut bibit, etiam paulo ampli-
us splen affligitur, & spiritum frequentem semper emitit. Atque hæc signa
hydropsis sunt. Est autem & circa ventriculum solum, sive febris contigerit,
sive non. Et venet magnus fit, & crura implentur aqua. Verum supernæ cor-
poris partes attenuantur his, qui ita affecti putantur. At signa omnia debilio-
ra sunt, & simul in erubibus aqua non discedit, & dolor tanto minor existit.
Cæterum circa ventriculum solum hydrops, & aqua hac de causa fit. Etenim
ubi acervatim aqua accessit, & via in principis non pateat ad infernas par-
tes, sed acervatim in venis concludatur, nimirum ut quæ respirationem non
habeat, neque sursum, neque deorsum inniti possit, haud aliter, quam si quis
magnum vas angusti osculi occludat, ac subito invertat, deinde sensim oper-
culum

culum de osculo detrahat, Et si enim hoc fecerit, aqua non effluet foras, neque enim respirationem habet, sed a spiritu, qui intus est, conclusa est. Nam spiritus, qui intus est, replet vas, & externo spiritui resistit, & excursus aquae non datur, præ spiritu vas implente, & simul aere incumbente. Si vero quis sensum vas inclinat, aut fundum perforat, spiritus de vase exiit. Egresso autem spiritu, procedit etiam aqua foras. Sic sane in hydrope, si quidem perspiratio sursum, aut deorsum contingat in principio morbi, transit ad crura hydrope, & ad pedes; sin minus, isthic solum volutatur circa ventriculum. Atque ita quidem de his a me dictum est. * Fit autem & mulieribus hydrope in utero ipso, & signa sane in ventriculo, & in cruribus, & reliqua signa eadem habet. Er de hoc ipso a me dictum est in morbis muliebribus. Atque hæc tres sunt species morborum ab hydrope. Funt autem hi morbi omnes cito difficiles, & omnes cito augentur. Adhuc autem difficiliore sunt, si ex alio morbo corpus liquefactum, ad hunc devenit. Si quidem igitur subito occupaverit morbus hominem, moritur, nempe alio morbo diutissime jam affligente. At ubi etiam alvus valde fluida fuerit, citissime moritur, & sentiens, & loquens. Atque hæc a me relata sunt de hydrope, & unde oriantur, & quod hæc sint ipsius signa.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE AFFECTIONIBUS.

Hunc Galenus Polybi esse dicit;

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Sanitas res maximi pretii. Morborum omnium fons, & origo, bilis, & pituita. Morbi quomodo a bile, aut pituita fiant.
- 2 Capitis doloris a pituita, seu causa frigida, aut aliis causis curatio. Morbi capitis qui dicantur, Vinum in capitis doloribus non est exhibendum. Agri, morborumque genera in morborum principiis diligenter consideranda.
- 3 Aurium doloris a pituita generatio, & curatio.
- 4 Fauces inflammatarum causa, & curatio. Gingivarum inflammatio, Cummella causa, & curatio.
- 5 Dentium dolores, & exstio partim a pituita, partim a bile.
- 6 Narium polypi generatio a pituita, eiusque curatio.
- 7 Morbi, qui circa ventrem fieri solent. Acuti morbi qui, & quo tempore maxime, & fortissimi fiant.
- 8 Pleuritidis causa, nota, & curatio. Indicatio in morbis quid dicatur.
- 9 De peripneumonia, seu pulmonis morbo, & eius nota, & curatio. Ex pleuritide in peripneumonia, & febrem ardentem transitus.
- 10 Pleuritidis, sive amentia generatio, & curatio. Vinum mente motis non convenit. Pleuritidis in peripneumonia transitus.
- 11 Febbris ardentis, sive causosæ generatio, nota, & curatio. Lingua nigra, & aspera a spiritus caliditate. Febbris ardentis in peripneumonia transitus.
- 12 Febrium hyemalium, seu non acutarum in acutas transitus, observatio, & tutela. Pleuritidis, Pleuritidis. Peripneumonia. Cu-

ratio. Morbi maxime acuti ferme occidunt.

- 13 De febribus, & symptomatis astivis. Bilis per superiora, vel inferiora in febre forti purgatio, & curatio. Crisis.
- 14 Febbris astiva, Cerebræ gravitas, ubi febrilis calor apprehenditur, ac dimissio. Quamquam, & corpus grave sine febre.
- 15 Morborum astivorum, præter prædictos, causa, & curatio per vomitum. Ventris doloris ad alium locum transiens circa febrem cura. Dolorum in ventre etiam bilis causa est.
- 16 Dolores infra umbilicum. Dolores repentini circa febrem a pituita, & bile compelluntur.
- 17 Morbi in aestate fieri soliti, quomodo fiant.
- 18 Tertianæ, & quartanæ, corpore a sole callescente, sape fiunt. Febri tertianæ cura. Tertianæ in quartanæ transitus.
- 19 Febri quartanæ caputio. Febri quartanæ quando potissimum levatur.
- 20 Morbus a pituita alius prognatur, & eius causa.
- 21 De leucis, Pituitosis. Biliosis. Splenicis quidam: quibus pharmacorum potiones nihil proficiunt, illi morbus in hydroper degenerat. Splenis suppurationis cura. Causa huius morbi.
- 22 Ventrulus, & eius nota, causa, & curatio.
- 23 Aqua inter extem generatio, causa, curatio. In hydroper aut a splene, aut hepate, aut pituita alba, aut dysenteria, transitus. Morbum morbo succedere inlethale. Aqua in corpore generatio. Aquæ e ventre per fellionem emissio.
- 24 Dysenteria, & eius causa.
- 25 Lienteria, sive intestinum levis, & ejus

- 9 * Peripneumonia. In peripneumonia febris detinet, & rufus, & excreat primum quidem pituitam crassam, ac puram; sexta vero, & septima subbiliosam, & 80
sublividam. Octava autem, & nona subpurulentam. Huic, si quidem dolor ad-
est aut dorsi, aut laterum, dandum est medicamentum, quod in pleuritide ad lateris
dolorem, in medicamentario libro scriptum est. Per potus autem, & sorbitiones, &
veneris subductionem, ac frigusactionem eadem curatio adhibeatur, quæ in pleuritide.
Quo vero spiritum, & pus ex pulmone repurgetur, danda sunt pharmaca in potu, 85
quibus pulmo humectatur, & pus sursum purgatur. Ex autem hic morbus, quum
pituita acervatim ex capite ad pulmonem fluxerit. Aliquando etiam ex pleuritide in
peripneumoniâ, & febrem ardentem transitus fit. Judicatur autem brevissimus qui-
dem in diebus quatuordecim; longissimus vero in duobus de viginti. Pauci vero
hunc morbum effugiunt. Funt etiam pectore suppurati ex hoc morbo, si non 90
in iudicatoriis diebus pulmo fuerit purgatus. * Phrenetis ubi apprehenderit, fe-
bris primum debilis detinet, & dolor circa præcordia, magis autem dextra ad he-
par. Quum autem quarta, aut quinta advenit, & febris fortior fit, & dolores au-
gescunt, & color subbiliosus efficitur, & mens percellitur. Huic ad dolorem quidem
danda sunt, quæ in pleuritide, & tepor faciendus, ubi dolor hæret. Sed & alvus cu- 95
randa, ac reliqua similiter facienda sunt, excepto potu. Potu vero utendum est
quocumque alio volueris, præter vinum, aut acetum, & mel, ac aquam dato. Vinum
autem non convenit mente motis, neque in hoc morbo, neque in quibusdam aliis. Com-
ducit autem in hoc morbo etiam caput multa calida lavate. Mollito enim corpo-
re, sudor quoque magis sequitur, & alvus, & urina secedit. Et æger ipse se ipso tem- 100
perantior evadit. Fit hic morbus a bile, quum mota visceribus, ac septo transverso in-
federit. Judicatur autem morbus, brevissimus septima die, longissimus undecima.
Effugiunt & hunc pauci, transique etiam ipse in peripneumoniâ, & si transierit, pau-
ci effugiunt. * Febris ardens, siue causos quum habuerit, febris detinet, & sitis for- 105
tis, & lingua aspera, ac nigra fit a spiritus sane caliditate. Et color subbiliosus fit,
& sputa biliosa. Et æger extrinsecus quidem frigidus fit, intrinsecus vero valde
calidus. Huic conducit irrefracientia adhibere & ad alvum, & fornicis ad cor-
pus, cavendo, ne inhorrescat, potiones quoque, ac sorbitiones danda sunt frequen-
tes, & paulatim quamfrigidissimæ. Venter autem curetur, & si quidem non subeat,
quæ insunt, insusa frigidissima per clysterem immittantur aut quotidie, aut ali- 115
ternis. Hic autem morbus fit a bile, quum mota intra corpus firmata fuerit. So-
let etiam in peripneumoniâ transire. Judicatur autem brevissimus quidem nona, aut
decima die. Longissimus autem decimaquarta. Et si quidem transierit in peripneumoni-
â, pauci effugiunt. Si vero non transierit, multi effugiunt. Atque hi quidem mor- 120
bi acuti vocantur, & oportet hoc sic curare. * Quæcumque vero alie febres hyeme fi-
unt siue ex vino, siue ex lassitudine, siue ex aliqua alia re, eas observare oportet.
Transiunt enim aliquando in morbos acutos. Transitus vero ipsarum talis est.
Quum commotis duobus humoribus, pituita, & bile, non condicentia corpo-
ri exhibentur, ipsi inter se ipsos coacti, pituita videlicet, ac bilis, corpori ubicum-
que tandem contigerit, allabuntur. Et fit pleuritis, aut phrenetis, aut peripneumo- 125
nia. Observare igitur, ac vitare oportet febres in hyeme. Sit autem observatio, & tu-
tela ab ipsis, quies, & fragilitas, & ventris evacuatio. In sorbitionibus autem, &
potionibus degendum est, donec febris imminuta fuerit. Ex morbis ferme maxi-
me acuti & occidunt, & laboriosissimi sunt, & opus est ad ipsos plurima tute-
la, & exactissima curatione. Et a curante nullum malum accedere oportet, suffi- 130
ciunt enim, quæ ab ipsis morbis adsunt. Verum ut boni quid præstet, pro viri-
bus conetur. Et si quidem recte curante medico, a magnitudine morbi super-
etur æger, non hæc culpa medici est. Si vero non recte curante, neque cognoscente, a
morbo superetur, medici culpa est. * Æstate porro hæc sunt: febris decinet fortis, 135
& sitis, & vomunt aliqui bilem, aliquibus vero etiam inferus secedit. His in
potu dandum est, & ad sorbendum, quodcumque tandem tibi idoneum esse visum
fuerit. Si vero bilis, aut pituita ad cor confederit, aqua frigida, ac aqua multa po-
ta, vomant. Si vero venter non secesserit, clysteri utendum est, aut subditiæ glan-
de. Morbus autem fit a bile. Liberantur autem maxime septima die, aut nona. Si
vero febre detinente, non purgetur neque deorsum, neque sursum, dolor autem 140
affuerit per totum corpus, tertia, aut quarta die pharmaco levi, aut potione deor-
sum purgato, facito autem sorbitionem ex milio, aut farina, & isdem potioni-
bus curato. Patiuntur autem & hæc a bile. * Si vero externæ partes non valde
servidæ fuerint, verum internæ, & lingua aspera, ac nigra fit, huic pharmacum ne
dederis, curato autem, irrefracientia adhibendo & ad alvum, & ad reliquum cor- 145
pus. Vocatur autem hæc febris æstiosa. Judicatur maxime undecima die, & deci-
ma quarta. Si vero febrilis calor apprehenderit, ac diuiserit, gravitas autem cor-
poris ipsum detinuerit, hunc donec quidem calor tenuerit, sorbitionibus, ac po-
tionibus curato. Quum autem non tenuerit, etiam cibos dato, purgato autem
quamcelerrime pharmaco, siue sursum, siue deorsum opus habere tibi visum fuerit.
Si vero febris quidem non tenuerit, os vero amarum habuerit, & corpus gra-
vetur, & cæcum aversetur, pharmacum dandum est. Patiuntur autem hæc a bile,
quum

- hoc morbo, hoc modo. Si quidem tertia die inceptis maturari, ac expui, citius liberabitur. Si vero postertius maturefcat, postertius iudicationes fiunt, quemadmodum in capitis illis. * Dolores porro in omni pleuritide plerumque magis interdum, quam noctu leviores fiunt. Curare vero pleuritidas hoc modo oportet, ut plurimum velut phrenitidem, & peripneumoniam, praterquam quod hic balneis calidis, & vino dulci utendum est. Si igitur prima, aut secunda die, postquam invaluit, aegrum accesseris, si stercus prodit purum, aut leviter biliosum & modicum, infusum ex thapsia per clysterem injicito. Si vero alvus commota, noctu quidem egerat, postridie vero dolor, & tormen vexet, rursus clysterem adhibeto. At si aeger biliosus sit natura, & non purgatus corpeus fuerit a morbo, priusquam salivam biliosam expuat, etiam medicamento bilem probe purgato. Si vero jam expuat biliosa, medicamentum ne dederis. Si enim dederis, sputum furtim prodire non poterit, sed septima, aut nona die suffocabitur, maxime si praecordia doleant. * Quod si ad dolores in lateribus etiam praecordia doleant, clysterem adhibere oportet, & in potu jejuno bibendam dare aristolochiam, hyssopum, cuminum, silphium, pepulum, metoea appellatum album, florem aris, mel, acetum, & aquam. Et per medicamenta quidem ita primas curationes facere oportet. Reliqua vero sic se habent. Multa calida pro viribus aegri lavato, capite excepto, & quum iudicationes sunt, dolentes locos humidis fomentis tepefacito, & oleo illinito. * Quum vero impetu fertur morbus, & aegrum, & medicum a curationibus quiescere convenit, ne quid mali inducatur. Dandus autem est praesanae succus coctus, aliquanto crassior spissitudine mellis. Post balnea etiam vinum dulce, & aquosum bibendum est, non frigidum, modicum, ex angustii oris pocillo, & ubi tussis invaserint, amplius bibendum, & quammaxime exsiccandum, & potu humectandum, quo pulmo humidior factus, facilius ac citius sputum reddat, & rursus minus affligat. Sed & mali punci dulcis vinosis succum, lacte caprino modico, & melle ammixto, paulatim saepe dato, & noctu, & interdum, & somnum quammaxime prohibeto, quo purgatio & citius, & copiosior fiat. * At vero sanguineam pleuritidem sic curare oportet. 25
- Post iudicationes cibis levibus reficito, & quietem agat, & nimium caveat solem, ventos, repletiones, acida, falsa, pinguis, fumum, flatum in alvo, laborem, venerem. Si enim morbus recidivarit, mors sequetur. In expuitionibus autem si dolor habeat, & expuere non possit, jejuno aris florem dato magnitudine olivae, & succi silphii dimidium ejus, & trifolii seminis modicum. Haec ex melle delingat. Aut piperis grana quinque, & succi silphii magnitudinem fabae, mel, acetum, & aquam jejuno tepida bibenda praebeto. Hoc etiam dolores so-
- dat. Quod si pro ratione spueri non possit, sed moretur sputum haerens in ipso, & stertat in pectore, ati magni radices conchulam majorem, & oleum, ac acetum mixta dato, & acetum aqua dilutum insuper bibat. Aliud forte. Florem aris magnitudine fabae, & nitrum assatum dupla portione, & hyssopi quantum tribus digitis comprehendi potest, melli misceto, & aquam, ac oleum modicum adstillato, & tepesfacta in conchula majore insundito, ut ne suffocetur. Hoc etiam in peripneumonia facere oportet, si non purgetur. Si vero neque stertat, neque velut oportet, sputat, capparum fructus, quantum tribus digitis comprehendi potest, & piper, & nitrum modicum, & mel, & acetum, & aquam misceto, atque haec tepida sorbenda praebeto. Altera die eadem in aceto, melle, & aqua servescata sorseat. Hoc etiam stertentibus dato, & his, qui purgari non possunt. At si fortius facere voles, hyssopi, & sinapis, & nasturtii concham majorem, melle, & aqua tetro, & servescata, ac excolata, tepida sorbenda dato.
- * Atque hoc modo hi morbi curati sanantur, si non quid sputi in pulmone relictum 26
- pus fiat, a quo arida tussis sequitur, & febris, ac horror emergunt, & erecta cervice spiratio tenet, & frequentem, & acervatam respirationem aeger habeat, & vox paulo gravior sit, & color cum calore faciem occupat. Progressu vero temporis morbus magis manifestus redditur. Hunc si intra decem dies susceperis, ubi victu, & balneo calido calefeceris, medicamentum, quod pus ducat, in pulmonem insundito, aliisque pus ducentibus utitor, atque sic velut suppurato victus rationem praescribas. Caput quoque reficito, ut ne quid insuat. Si vero ex eo, quod in pulmonem insutum est, pus non educatur, rumpeur hoc ipsum esse pulmonem in thoracem, & post ruptionem sanus esse videtur, quoniam ex angustia ad amplam capacitatem pus pervenit, & spiritus, quem respirando attrahimus in pulmone locum, ac sedem habet. Verum progrediente tempore pectus pure impletur, & tussis, & febris, & alii dolores omnes magis ipsum premunt, & morbus inclarescit. Hunc post eruptionem per quindecim dies finire oportet, quo pus rursus maturefcat. Nam ex eo, quod pus ad amphorem locum devenit, perfrigeratum est, & id, quod in thorace humidi erat, ad se ipsum attraxit, ita ut ipsum sit semiputresfactum. Si quidem igitur sua sponte expui incipiat in hoc tempore, bene est; sin minus, medicamentis, aut potionibus opem ferre oportet, in ultimis ex quindecim illis diebus, festinando ad corporis excitationem, antea quam magis affligatur, ita ut caput putum custodias, influxionum gratia. Si vero non spuat,

spuat, sed sui significationem ad latera præbeat, secato, aut urito. At si neque
 spuat, neque ad latera de se significationem præbeat, ubi multa calida jejunum
 lavasti, & neque potu usum in firma sella locasti, alter ex humeris ipsum apprehen-
 dat, tu vero concute ipsum, aure ad latera adnota, quo percipias ex utra parte
 significationem sui præbeat. Opandum autem esset ex sinistra. Nam dextras
 urere, aut secare lethalius est. Quanto enim robustiores sunt dextra partes, tan-
 to etiam fortiores morbi in ipsis sunt. * Quod si præ crassitudine humor non flu-
 at, neque strepitus sit in pectore, verum spiritum frequentem trahat, & pedes
 intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiat hæc, sed thoracem pure plen-
 um esse probe noris. Proinde in terra etetriadem liquida, & valde trita, ac tepi-
 da linteum tenue tingito, eoque thoracem circumcirca integito, & qua parte pri-
 mum resiccatum fuerit, ea secato, aut urito quamproxime ad septum transversum,
 cavendo tamen, ne hoc ipsum lædas. Si vero voles, ipsam terram etetriadem illin-
 ito, & similiter velut in linteo considerato. Multi simul illinunt, ne quæ primum illi-
 nuntur, resiccetur. Post sectionem, aut unctionem, linamento ex lino crudo utere, & pau-
 latim pus emitte. * Cæterum ubi secare, vel urere voles, corpori in eadem figura, in
 qua inter secandum, aut utendum futurum est, notam imprimito, ut ne cutis te decipiat,
 si in figuræ transmutatione sursum, aut deorsum magis cedat. Sed & tussis vici-
 tare oportet ex victu, ut ne rursus pus revellant ad pulmonem. Malum enim hoc
 est, quare permitendum est, ut ad sectionem quamcivissimè resiccetur. Postquam vero
 duodecima affuerit dies, reliquum pus totum emittito, & ex linteo linamentum in-
 dito, & bis in die pus emittito, & ventrem superum ex victu quammaximè resicca-
 to. Arque hoc modo oportet etiam suppurationes ex vulnibus, & ex peripneumonia,
 & ex magnis destillationibus, & pulmone ad lateres prolapsio, considerare,
 ac curare,

29

* Frigefactoria potiones in febre ardenti.

Frigefactoria potiones in febribus ardentibus, quando voles, bibendas da-
 ro. Sunt autem mulrarum operationum, aliæ enim mictionem inducunt, aliæ
 alvi egestionem, aliæ utrumque præstant, aliæ neutrum, aliæ solum frigefaciunt, ve-
 lut si quis in vas aquæ ferventis frigidam aquam infundat, aut ipsum vas ad frigi-
 dum ventum exponat. Dabit itaque alias aliis. Neque enim dulces omnibus condu-
 cunt, neque acerbæ, neque eadem omnes bibere possunt. I. Favorum siccorum hemi-
 ninarum diarum mensuram aqua macerato, & conterens gustato, donec subduli-
 tas aqua fiat, deinde excolato, & injectis apii bibendam dato. II. Semi-
 nis lini acetabulum, aquæ heminis decem assulis, in nova olla prunis imposita co-
 quito, ac fervere sinito, ut transpirent, donec succus ad tactum pinguis fiat.
 III. Aquam mulsam aquosam ad dimidias coquito, deinde apio injecto frigi-
 dam paulatim exhibito. IV. Hordeum Achilleum magnum, ac plenum hemi-
 nis mensura siccato, & acutis spicis ablatis, ab probe laveris, aquæ congio affu-
 so, coquito ad dimidias, frigefacito, ac bibendum dato. V. Cumini Æthiopici
 hemina decem parti, tres aquæ semicongios affunde, & olla luto pilosa obluta,
 donec terra pars resset fervere sine, & frigidam hanc ad omnem ardentem, aliamque
 febrem, exhibe. VI. Aquam celestem ipsam per se ipsam præbe. VII. Prila-
 næ heminae congio aquæ affuso, ad dimidias coquito, deinde excolato, & apii
 injectis frigidam dato. VIII. Profunt & vina alba aquosa ex uvis passis.
 IX. Profunt & uvarum passarum expressarum recrementa aquosa. X. Uvarum
 passarum albarum, exemptis vinaceis heminam, radicum quinque folii ma-
 nipulum tondito, & affusis aquæ heminis viginti ad dimidias coquito, & frigi-
 dam hanc paulatim bibendam dato. XI. Ad farinæ hordei pleni crassæ cheni-
 cem dimidiam, aquæ congium affundas, & quum jam intumescant crassæ fari-
 cæ partes, manibus teras, donec aqua alba fiat, & adianti pugillo injecto, sub dio
 per noctem exponito, ac exhibeto. XII. Ovorum trium, aut quatuor candi-
 dum in aquæ congio concussim bibat. Hoc valde frigefacit, & ægrum ad alvum
 exonerandum conturbat. XIII. Hordei torrefacti probe loci chenicem dimi-
 diam in aquæ congio bis, aut ter fervere sinito, & frigidam hanc exhibeto.
 XIV. Prisanæ succum coctum tenue, & vinum dulce dato. Hoc urinam
 ducit. XV. Cucumeris peponis corio nudati pollinem ex aqua præbeto. Hæc po-
 tio urinam ciet, frigefacit, & sitim sedat. XVI. Ervum in aqua præcoqui-
 to, deinde ollam novam in maiorem ollam aqua plenam ponito, & alia aqua ervo
 affusa, ad modicum tempus coquito, postea ubi coctum fuerit ervum, tertiam aquæ
 partem reliquam excolato bibendam dato, ita ut ad singulos cyathos, & cucu-
 meris, & ervi pollinem inpergas. Hoc constanter sitim sedat. XVII. Visum
 thasium vetus parte una, cum vigintiquinque aquæ partibus dato. XVIII. Trifolium,
 cucumeris pollinem, & crassam hordei farinam in aqua macerato, & hanc bibe-
 dam dato. XIX. Apii manipulos tres, pulegii pugillos duos in aceti hemi-
 nis decem ad tertias coquito. Hoc melle, & aqua diluam aquosum bibat, adianti
 pugillo injecto. Hoc urinam ducit, & alvum solvit. XX. Mala odorata dulcia
 contun-

contundito, & aqua macerato, & aquam bibendam dato. **xxi.** Mala cydonea eodem modo, si alvus soluta fuerit in febre ardente. **xxii.** Quod si morbus regius insuper corripit, uvæ passæ albæ exemptis vinaceis, & cicentim alborum, utroqueque dimidiam heminam, & hordei Achillei magni, ac pleni tantumdem, & enei tantundem, aquæ heminas decem, & apium, & mentam, & coriandrum, de singulis parum, terito, donec placide aqua dulcescat, & adianti pugillo postea injecto, ubi sub dio per noctem exposuisti, exhibeto. Potes etiam alias his similia imitari. Omnia vero per noctem sub dio exposita dabis febricitantibus, exceptis his, quibus alvi, plus quam convenit, fluunt. **xxiii.** Pulegii pugillos tres apud plum, in vino diluto coquito, ac exhibeto; hoc urinam ciet, & bilem per alvum trahit.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS LIBER IV.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Semen utriusque parentis, ab omnibus corporis partibus progressum, ad formam in utero recipiendam condensari. Humorum in corpore species quatuor, morborum omnium causæ. Propositio huius libri.
- 2 Quomodo bilis, sanguis, hædrys, & pituita, copiosiora, & pauciora fiant a cibis, & potibus. Sanguinis fons est cor. Pituitæ autem caput. Aqua vero fons splenis, & bilis folliculus in hepate. Caput, & splen, partes maxime cavæ.
- 3 Cibis, ac potibus omnibus quatuor illos humores inesse. Corpus in se ipsum humorem ex ventriculo trahere.
- 4 Planta cur ægratent, aut non nascantur quibusdam in locis. Plantas ab initio humores iuxta cognationem non habentes, ne germinare quidem possent.
- 5 Locus alteri loco etiam valde vicinus, ad vini iacundi productionem plurimum præstat. Terra innumeros inesse facultatis. Plantas omnes sive terrestres fuisse.
- 6 Unde pituita in corpore signatur. Caput velut cucurbita corpori incumbit.
- 7 Cur pituita ad ventriculum, & vesicam perveniens non lædatur.
- 8 Bilis quomodo, & cur copiosior in corpore fiat. Hepar pueris cor dicitur. Hæpatis dolores unde, & quomodo sedentur. Cibis, ac potus alii aliis medicamenta esse solent.
- 9 De aqua quomodo, & cur copiosior in corpore fiat. Aqua de splene purgatio non fit per superius regiones. Vena ex splene dorsum tendens multa.
- 10 De sanguine quomodo, & cur amplior in corpore generetur. Cordi dolor non oboritur. Vena jugularis post cibum, ac potum sanguinem statim attolluntur, ac facies rubet. Quomodo sanguis morbos in corpore generet. Morbus ex ciborum, ac potuum copia fieri.
- 11 Quomodo fontes isti quatuor, sanguis, bilis, pituita, & aqua (ut & ventriculus) si splenes fuerint, semper corpori distribuunt. Vena multa, ac frequentes per corpus diffusa sunt.
- 12 Cibi, potusque suavitates, ac insuavitates unde. Quando homo cibum, ac potum appe-

tat, & quando cesset appetentia.

- 13 Solam bilem ad fellis folliculum in hepate, a cibis, & potibus fecerunt. Solus cardiogmus, hoc est cordis morbus in fellis folliculo innascitur. Morbi cur in corde non oboriuntur.
- 14 Caput, & splen cur morbis maxime obnoxia.
- 15 Quomodo, & cur pauciores fiant humores hominem affligentes, & quæ locis expungantur.
- 16 Quomodo, & cur homines sani degent. Quamdiu humores in corpore morantur, & quomodo expellantur. Excrementorum gravolentia unde. Excrementa alimentorum quantitati respondent. Quid fieri solent, si humor in corpore maneat. Urina sanguinolenta propter humores ammixta. Cibis etiam id, quod morbosum est, de corpore deferre. Quare, ubi quis ventrem exoneravit, aut mixtus, non statim potu, ac cibo, pro egessimis satia copia, æquat. Quomodo humor ultra triduum in corpore manens, majus, aut minus homini malum de se præbeat. Quomodo, & cur cibi non possint eadem die exire.
- 17 Cur corpora replentibus assate nimis, hyeme magis ferant. Quomodo febres ab ambiente aere calido oriuntur.
- 18 Quomodo si plus humoris furas prodeat, quam de cibis, ac potibus accessit, homo atroxatur, & qua ratione plus prodeat. Cur hominibus otiosis cibi injucundi, & quomodo febres illis accendantur.
- 19 Quomodo bonus habitus ex esu accedat. Febres ex repletionem. Febres tertias, aut quintas die revertentes. Morbi per dies judicantur.
- 20 Cur febres, & qua ratione tertias, quintas, septimas, aut nona die remittant. Cur febres imparibus diebus solvantur.
- 21 Cur homines imparibus diebus moriantur. Spiritus gravolentia unde. Quod humores imparibus diebus turbantur. Medicamentata purgantia imparibus diebus non exhibenda.
- 22 Cur ulcera, si curentur, imparibus diebus magis inflammantur. Glandularum tumores quomodo ab ulceribus generentur. Caliditas quomodo ad ulcera perveniat. Stomachus in sano corpore tertio die, si-

tas autem secundo prodit.

- 23 Quomodo morbi fiant, si homo a copiosiore humore fieri non expurgetur. Que febres minus periculosa. Aquosus humor febris infestissimus, biliosus contra alimentum illi supeditat. Aquosus humor quomodo in febrientibus exhalet. Oleum eae non similiter ut aqua, extenuari, & exhalare possit.
- 24 Morborum principia tria. Potentia quid vocetur, & quod hoc maximum morborum principium.
- 25 De violentia, & qualia in corpore faciat. Pituita, Contusio, Labor, Calum quomodo morborum principium, & causa. Adorbi a calore externo, Butyrum, Hippocri, Serum lactis. Humores quomodo gravitate, aut levitate inter se differant. Febres a quibus humoribus magis oriuntur. Febres ab aqua, seu atra bile minus fortes, & breviores. Qualia humor ante turbationem, & in ipsa turbatione in corpore efficiat. Quando humor affligens, priorem (qui salubris erat) consummat. Alimentum est homini humor levis. Putrefactionis principium. Similitudo.
- 26 Quomodo ea, quae a caelo nobis obveniunt, morbus pariant. Humores liquati, & ad altum delati, streus conturbant. Aquosus humor potissimum circa ossa, & nervos consistit. Quomodo, & quando ripar morbosus fiat, & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruat.
- 27 De lumbicis latius, & reconditis, Lumbicos

rotundat parere; latus vero minime, sed abrupti. Cur lumbici partus perperam a quibusdam dicantur. Lumbicorum latorum species, & signa. Sputa quoadque oriuntur, lumbicis latius ad hepar affluuntibus. Lumbici quibusdam vocem intercipiunt.

- 28 De calculi morbi generatione a lacte, Corpore, & ventriculis consentaneis. Pituita ad fœcem ammixta, glutinum fit. Simile, Lapide ex terra est.
- 29 Calculi signa quinque. Urina subvibra a vesica lapide exulcerata, & inflammata. Arenosorum per urinam ejellio unde.
- 30 Potum in ventrem deferri, & ex hoc in reliquum corpus. Vocem de pulmone edis a lumbis vero, & lingua articulari.
- 31 Medicamentorum purgantium facultates. Pituita de capite descendens pulmonem breviter exulcerat. Penter cur a medicamentis non exulceretur. Libra incola, pecorum pellibus pro vestibus utantur.
- 32 Urina edulcorum olidorum (ut alliorum) odorem refert. Cyceon, aut farina colla, in pulmonem, aut ejus fistulam perveniens, hominem enterat. Eniglotidis, quae hedera folio assimilatur, efficiunt.
- 33 De hydrops generatione, & signis. Cur rassa angustioris oris, subito inversa, aquam a se non emittant.
- 34 De hydropis generatione in mulierum utero. Quando bi morbi difficiliores fiant. Qui ex hydropis moriantur.

SECTIO I.



- D hominis generationem de omnibus et viri, et mulieris partibus semen progressum, et in uterum muliebrem illapsum condensatur, temporeque veniente natura hominis formam referens ex ipso producit. Habet autem et mulier, et vir quatuor species humoris in corpore, a quibus morbi sunt, qui non a violentia aliqua fiunt. Sunt autem species hæc, Pituita, Sanguis, Bilis, et Hydrops, sive aqua, et de his non minima, neque debilissima in semen præcedit portio. Et quia animal secundum parentes nascitur, tot humorum species, et sanorum, et morbosorum in se ipso habet. Ostendam autem, quæ in unaquaque harum specierum, et plura, et pauciora in corpore fiunt, et a quo ægrotant. Et quod morbi in imparibus diebus judicantur. Et quæ sine morborum principia. Et qualia singula ex ipsis in corpore efficiant, ut morbum inducant, et a quo rigor febrilis fiat, et cur post ipsam febris irruat. Primum autem demonstrare volo, quomodo bilis, et sanguis, et hydrops, et pituita, copiosiora, et pauciora fiant a cibis, et potibus, hoc modo. Ventriculus, dum plenus est, omnium horum corpori fons est. Verum ubi vacuus est, corpore frui-
tus colligescence. Sunt autem et alii fontes quatuor, a quibus unusquisque horum humorum in corpus procedit, postquam sane ipsi a ventriculo acceperunt; et hi quoque fontes, ubi evacuantur, de corpore frumunt. Sed et ipsum corpus attrahit, ubi ventriculus in se ipso quid habuerit. Et sane sanguinis fons est cor, pituitæ caput, Aquæ splen, Bili locus folliculi in hepate; hi sunt quatuor humoribus hi fontes, ventriculo excepto. Ex his autem maxime cavi sunt, Caput, et Splen. Nam in hoc ipso maxima amplitudo est. Verum de hoc paulo postea clarius dicam. Quin et hæc sic se habent. In omnibus cibis, ac potibus, et biliosi quid est, et æquali, et sanguinei, et pituitosi: in alio plus, in alio minus. Quapropter, et quæ eduntur, ac bibuntur, alia aliis præstant ad sanitatem. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Postquam vero comedit, aut bibit homo, corpus in se ipsum humorem reflat ex ventriculo, et fontes trahunt per venas de ventriculo, similis humor similem, et corpori distribuunt. Quemadmodum etiam in plantis similis humor similem trahit de terra. Habet enim eodem modo terra omnigenas in se ipsa, ac innumeras facultates. Quæcumque enim in ipsa nascuntur, his omnibus exhibet humorem similem unicuique, qualem et hoc ipsum, quod nascitur sibi similem juxta cognitionem habet, et trahit unumquodque de terra alimentum, quale etiam ipsum existit. Nam et rosa de terra trahit talem humorem, qualis ipsa in potentia est, et allium de terra humorem ejusmodi trahit, quale ipsum in potentia est. Et

est. Et alia omnia terræ nascuntur, ex terra trahunt, singula juxta se ipsa. Si enim hæc res non ita se haberet, non nascerentur plantæ similes feminibus. * Cui porro plantæ in terra cognatus humor multo uberior est, quam convenit, ea planta exgrotat. Cui vero paucior, quam opportunum est, ea relinquitur. At si ab initio non inest terra humor, quem planta juxta cognationem trahat, ne germinare quidem poterit. Intelligentiam autem hujus rei, quod si non habeat planta humorem secundam naturam, ne ab initio quidem germinet, inde nobis suppeditatur. Ionia enim regio, et Peloponnesus pro temporibus anni a sole non minime calet, ac illustratur, ut sol nascentibus e terra sufficere possit, attramen fieri non potest, nullis frustra jam id tentantibus, ut in Ionia, aut Peloponneso Sulphur nascatur. At in Lybia sua sponte nascitur. Non enim est neque in Ionia, neque in Peloponneso, ejusmodi humor, qui ipsum alere possit. * Quam autem sint et alie multæ medicinarum, quas sole sufficiente, regiones alere non possunt, alie vero sua sponte producant, hoc ipsum ejus, quod nunc dicturus sum, considerandi occasionem exhibet, quantum videlicet locus alteri loco etiam valde vicinus præstet ad jucundi vini productionem, sole aequaliter sufficiente. Hic etenim in terra humor est, qui vinum suave exhibere potest, illic non est. Sunt etiam sylvestria non pauca in loco nascentia, quæ ad orgyæ, seu cubitorum quatuor spatium translata, nasci minime comperias. Non enim habet terra talem humorem translatum, qualem illa sylvestribus plantis exhibebat. Sunt enim ex ipsis quædam venenosiores, alie humidiore, alie dulciores, alie sicciores, alie asperiores, et innumere alie aliter se habent. Innumere enim sunt in ipsa terra facultates. Et propter hæc genera primum nihil alteri simile ex terra productum est, quod non esset cognatum. Et mihi sane videntur hæc omnes plantæ sylvestres fuisse. Verum homines ipsas mansuefecerunt, fructum ferre efficientes, utamquamque juxta suum seminem. Trahit enim similis humor similem ex terra, et ex hoc augetur, ac nutritur, et nihil ex terræ nascentibus alteri simile est, quod non aequalem, neque similem humorem ex terra trahat. Et omnia, quæ nascuntur, in cibo, ac potus usum venientia, multas facultates de terra ad se trahunt, et in omnibus est aliquid pituitosi, ac sanguinei. Et ex hoc adeo ad hanc demonstrationis necessitatem deveni, quod a cibis, ac potibus in ventriculum procedentibus trahit corpus secundum fontes, quos nominavi, similis humor similem per venas. * Referam quoque aliud argumentum, quod singula, prout relatum est, trahant, et simul dicam, unde pituita in corpore gignatur. Ubi quis caseum comedit, aut aliquid acre, aut aliud quid edit, aut bibit, quod pituitosum est, statim ipsi ad os, ac nares accurrit, atque hoc ita fieri partim omnes videmus, partim ita esse credere oportet ex his, quæ ego referam. Assero itaque, quod quantum in cibo, aut potu pituitæ inest, illud ubi ad ventriculum pervenit, partim corpus ad se ipsum trahit, partim caput, ut quod cavum sit, et velut cucurbita corpori incumbat, ad se trahit, utpote viscosa existente pituita, ita ut hanc alia per aliam sequantur ad caput; et quæ quidem recens ex cibo generatur pituita, in capite manet. Vetus autem, prout copiosior est recens, ab ipsa violente extriditur. Quapropter ubi quis edit, aut bibit aliquid pituitosi, exerceat pituitam. Habet autem et hæc res se hoc modo. * Si ubi edit, aut bibit quid pituitosi homo, non rursus exeat, quod redundat, neque per os, neque per nates, necesse est ipsum manere in capite, aut ad corpus descendere de capite, et ad ventriculum pervenire. Ac optimum quidem fuerit, si ad ventriculum perveniat. Exire enim poterit una cum stercore, et si quidem multum fuerit, ac humidum, stercus humectare poterit. Si vero modicum, non hoc effecerit. At si in capite maneat, multum dolorem capiti exhibuerit, quum in venis est. Si vero modicum, non hoc fecerit. Significationem autem de se præbet, copiosum ne sit, an modicum. Quod si ad corpus deveniat, atque illic alio humoriammixtum fuerit, si quidem multa fuerit pituita, statim corpus læsetur, si vero pauca, non adeo lædere poterit, quum magnum sit corpus, si non et aliud quoddam principium ipsi reliquum sit. Verum temporis progressu, si alia pituita superaccadat, lædi utique possit. At si corpus vesicæ, ac ventriculo delegat, atque hæc foras perferant, nihil mali ex ipsa habuerit. In hoc igitur sermone demonstratum est, quomodo caput pituitam ex ventriculo trahat, et simile ad simile perveniat, et simul a me dictum est, quomodo, et quare copiosior pituita homini a cibis, ac potibus fiat. * Nunc vero dicam de bile, quomodo, et cut copiosior in corpore fiat, et quomodo locus folliculi in hepate ipsam trahat. Habet se res hoc modo. Postquam comedit, et bibit homo aliquid amari, quodque alias biliosum, ac leve est, copiosior etiam bilis fit in hepate, et statim dolet hepar, quod pueri cor vocant, atque hoc ita fieri videmus, et clarum nobis est, quod a cibo, aut potu factum est. Trahit etenim corpus in se ipsum de cibis omnem prædictum humorem. Trahit etiam folliculus in hepate, quicquid isthuc biliosi inest. Et si derepente multa bilis fiat, homo hepar dolet, et de ventre copiosior fit. Hoc enim contingente, procedit de veteri bile propter multitudinem ad ventriculum, et ex hoc rorem ventriculo oboritur, et pars ipsius per vesicam, pars per alvum egreditur, atque sic minima pars in homine manet, et dolores cessant. Si vero neutrum horum contingat, procedit primum de veteri bile ad corpus,

pus, distribuitur enim ad ipsum, & si multa fuerit, statim significationem sui præbet, alii humori ammixta. Si vero modica, non adeo læset, quum magnum sit corpus, si non & aliud quoddam principium suboritur. Verum temporis progressu, si alia bilis superaccedat copiosior, hominem utrique læset. Si vero non superaccedat, excolare illam poterit corpus, ut & bilis, & quæcumque biliosa sunt, prædeant. Nam quæ in cibo, ac potu sumuntur, alia aliorum medicamenta sunt. Sic sane etiam alia quæcumque lædentia sunt medicamenta, ubi aliud ab alio in ventriculum incidit, sua ipsius potestate causam habens, id, quod superatum est, expellit, ac ipsum lædit. At si superaccedat alia bilis in corpore; ab his, quæ in ventriculum incidunt, morbus huic oboritur. Atque in hoc sermone iam ego declaravi, quomodo bilis, & cur copiosior fiat in corpore a cibis, & potibus, & quod trahit in se ipsum folliculus in hepate iuxta similitudinem id, quod biliosum est, a cibis, ac potibus. * Nunc vero dicam de aqua, quomodo, & cur copiosior fiat in corpore, & quomodo splen trahit in se ipsum. Assero autem, ubi homo bibat amplius, & corpus, & splenem aquam in se ipsa trahere ex ventriculo. Et si plus traxerint, quam oportet, statim hominem affligi, atque hoc ita fieri intelligunt, quicumque homines splenici existunt. Postquam autem traxit splen, optimum est, si vetus aqua, quæ in splene merat, aut vesicam, aut ventriculum excoletur, & per hæc expellatur. Nam per supernas regiones non purgatur aqua de splene, nisi quantum ejus in vasis inest, quæ de liene procedunt; verum ad ventriculum, & vesicam depurgatio fieri potest. Si vero hæc ad fluxionem apta non fuerint, neque aqua per ea foras excoletur, de splene ad infernas partes aqua procedit, atque isthuc alii humori inmiscetur. Et si quidem pauca fuerint, non sane læserit, sed de corpore ad vesicam, & ad ventriculum per venas excolari poterit. Sunt enim multæ ex hoc tendentes deorsum, quæ ex infernis partibus ad se ipsas trahunt, ubi sicciores fuerint, quam prius erant. At si alia aqua generetur, & ventriculus, ac vesica foras non expellant, splen elevatur, & infernæ corporis partes dolore afficiuntur. Atque hæc a me dicta sunt, quomodo, & cur aqua copiosior generetur in corpore a potu, & quomodo splen trahit. * Nunc autem de sanguine dicam, quomodo, & cur amplius in corpore generetur. Postquam bibit, aut comedit homo aliquid, quod sanguineum est, trahit quidem & totum corpus in seipsum, trahit autem & cor sanguineum ad se ipsum. Et ubi plus attraxit, non oboritur cordi dolor. Est enim cor res solida, ac densa, & propterea dolore non affigitur. Et ex ipso procedunt venæ crassæ, jugulares appellatæ, ad quas statim, si copiosius accedat, sanguineum illud distribuitur, & illæ impletæ brevi ad caput, & corpus delegant. Et quum edierit, aut biberit homo quid sanguinei, statim venæ jugulares attolluntur, & facies rubet. Accedente vero ad cor, & corpus sanguine, quam satis est, uberiore, a cibis, ac potibus, & ad alium humorem ammixto; si non ab ipso egressus fuerit per alvum, aut vesicam, reliquo humori ammixtus, dolorem corpori inducit. Si vero modicus accedat, non sane læsetur corpus. Venim temporis progressu distribuitur ab ipso ad ventriculum, aut ad nares, quæ ipsum foras excolant, & nulla læsio contingit. Si vero paulatim copiosior fiat, morbus efficitur. Atque ita quomodo copiosior sanguis generetur, a me declaratum est. Quum autem sint quatuor, Sanguis, Bilis, Pituita, & Aqua, omnia hæc a me demonstrata sunt, & quomodo, & cur copiosiora fiant a cibis, ac potibus. Quod autem ex his fiant, ac generentur, hoc argumento constat. Si homo parum edat, & parum bibat, nullum morbum hoc ipsi inducit. Et hæc quidem de hoc mihi dicta sunt. Attingi etiam obiter ostendere intelligenti, quomodo hæc pauciora fiant. Verum de hoc paulo post melius tractabo. * Ceterum fontes hi quatuor, quos nominavi, quum pleni fuerint, semper corpori distribuunt, quum vero vacui, vice versa trahunt ab ipso. Sic etiam ventriculus facit. Et habet res hoc modo, veluti si quis tria, aut plura aenea vasa in planissimo loco componat, & coaptata quamoptime disponat, fistulis ad foramina insertis, atque ita placide in unum vas aquam insindat, donec omnia ab aqua fuerint expleta. Ab uno enim disfluat in reliqua vasa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquam autem plena facta fuerint vasa, si quis de uno aquam effundat, retribuet res retro fluens aqua ad unum vas, & vacua fient reliqua vasa rursus, quemadmodum etiam susceperunt. Sic sane & in corpore res se habet. Postquam enim cibi, ac potus in ventriculum inciderint, fruitur corpus de ventre, & una cum fontibus impletur. Ubi vero alvus vacuatur, rursus retro humor ab ipso redditur, quemadmodum susceperat, veluti ex aliis ad unum vasculum. Venæ enim sunt per totum corpus tendentes alie tenuiores, alie crassiores, multæ, ac frequentes. Hæ autem, donec vivit homo, apertæ sunt, & suscipiunt, & dimittunt novum humorem. Ubi vero mortuus fuerit, clauduntur, & extenuantur. Quamdiu igitur vivit homo, fruitur corpus de ventriculo, ubi quidem in se ipso habuerit; fruuntur etiam fontes, & impleti corpori distribuunt. Si enim corpus non traheret de ventriculi humore, sed soli fontes, & hi ad corpus distribuere, non sane haberet corpus sufficiens alimentum, sed paucius. Non enim amplius haberent alimentum fontes, quod corpori subministrarent. * At

S E C T I O I I.

- 23 **N**unc vero exactius referte volo, cur homines agrotent, simulque cum hoc 1
sermone dicam, quæ sint principia morborum, & qualia unumquodque
ipforum efficiat. Sic autem assero. Si cibi plures, quam opportunum est,
qui jam concocti sunt, intus maneat, & homo non purgetur, & alii
cibi superingerantur, corpus ab humore priore, ac recenti repletum cale- 5
scit, & febris ex hoc homini oboritur. Verum febris hoc modo fiens,
non periculosa, neque fortis est, in qua humor æqualis est, copia paulu-
lum uberiore nos affligens. Si enim hoc ita se habuerit, & quis admo-
dum validus sit, & quæ commoda sunt, adhibuerit, sanus evadit. Unus autem
morbus solus est ex omni humore, & septem signa habet. Nam & tussis ip- 10
sum habet, quæ & debilis, & sicca est, & venter durus sit, utpote & stercore intus
contento, caput gravatur, & vomit, & febrit, & urina non probe prodit. Hæc se-
ptem signa huius morbi sunt ex omni humore fiens. Si vero alvi egestione non
prodeunte, unus ex alnis humoribus superet, melius deget homo. Et si quis febre
fiens ab omni humore, non adhibeat idonea, invalescet morbus, quantum ipse 15
humores superaverit, hoc modo. Calefcente sanguine exhalat maxime per hunc
humor aquosus, qui febrī est infestissimus. Relinquitur autem pinguis, ac le-
vis, qui est biliosus, & febrī maxime nutrimentum est. Exhalat autem hoc mo-
do, velut si quis aquam, & oleum in vas æneum infundat, & ligna multa subie- 20
cta ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior erit, ex vase enim ex-
halabit, oleum autem paululum immineatur. Nam aqua præ raritate ab igne at-
tenuari potest, & levis reddita exhalare. Oleum vero utpote quod est conjun-
ctum, ac densum attenuari non potest, neque similiter ut aqua exhalare. Sic sane
& in homine se res habet. Aqua enim calefcente corpore foras exhalat, biliosus
autem humor, ut qui conjunctus est, ac densus, non similiter attenuatus exha- 25
re potest. Verum attenuatus hic biliosus humor, corpus magis calere facit. Co-
piosus enim, & melius alimentum febrī bilis suppoditat, & prorumpens, aut firma-
ta in corpore, morbum supra priora corroborat. Atque hæc quidem dicta sunt
de eo, quod afficitur homo, si non purgetur, & curetur. Si vero non ipsa copia
prævaluerit, sive semel multa fiens, sive paulatim colligatur, reliquum corpus, dum 30
hoc sit, præ robore sustinere potest, donec principium aliquod superaccedat. Atque
hoc sane modo morbus fit, si homo a copioso fiens humore non expurgetur.
- 24 * Principia, ex quibus fiunt morbi, tria sunt. Et unum quidem jam a me relaxa-
tum est, qualia, & quot efficiat in corpore; demonstravi enim, quomodo, & cur agro-
ret homo, si non purgetur. Alterum est, si contingat, ut ea, quæ ex cælo obve- 35
niant, ineptæ, & præter victus rationem sint. Tertium est, si violentum quid accidat, vio-
lentum autem esse dico & casum, & vulnus, & plagam, & laborem, & si quid aliud
est huiusmodi. Horum vero principiorum maximum est violentia, si magna fuerit,
si vero parva, non ita maximum. Secundum est, si non purgetur homo. Tertium, si
quæ ex cælo obveniunt, ineptæ fuerint ad sanitatem. Proinde diligenter ab his se cu- 40
stodire oportet. Singula vero talia in corpore faciunt, qualia ego dicturus
sum. * Equidem si vulnus fiat, manifestum est, quod caro dissecta est, & ulcus fa-
ctum est, hoc autem morbum esse dico. Si vero contusio fiat, homine petcussio,
aut lapso, aut aliud quid tale perpeso, & tumor oboritur, sanguis statim præ
violencia calefactus, & venis hiantibus illapsus, non habens exitum præ copia, 45
quo abire possit, conglobatur, & propterea tumor fit, & tamdiu adest, donec
depurgatus fuerit eo modo, quo de locis depurgari dictum est, aut etiam per ip-
sum tumorem, & sive per chirurgiam, sive sine ea sanguini transitus fiat, aut per
tempus suppurato, aut non. Sed & labor tale quid efficit. Quum enim homi-
nes laborarint, quibus sane maxime sanguinis affectio contigerit, illic firmatur, 50
ac calefit, & ex hoc dolor oboritur. Si vero hæc quidem superarit homo, ve-
rum multa copia labor accedat, & alvus, ac vesica copiam expulerint,
febris sane ex hoc ituerit. Et si quidem prior humor æqualis fuerit, nequa-
quam. Si vero in labore ipsorum plurimus in corpore permaneat, superat ille.
Atque hæc a me dicta sunt de violentia, qualia in corpore efficit. Et hæc qui- 55
dem duo sunt principia, violentia, & plenitudo, quæ si non purgentur homi-
nes, corpora calefaciunt. At vero quod ex cælo obvenit principium, si
ineptum fiat in homine, superat aliquid humoris, & velut ad morbum calefa-
cit, & stifiescit prius, si fieri contingat. Dicam autem prius de eo, quod
calefacit. Sic igitur sentio. Si in eodem homine fuerit aliquid morbofi, quale in 60
priori dixi, & ea, quæ ex cælo obveniunt, incommoda fuerint, & calefacit ho-
mo, turbatur humor omnis in corpore calefescens. Hoc autem violentia facit. Et
si quidem depurgetur homo, humore illo turbato, fecernitur, quantum eius plus,
quam commodum est, redundarit. Et habet hæc res similitudinem ad id, quod
Scythæ faciunt ex equino lacte. Lac enim in cava vasa lignea insulum concuti- 65

- unt. Illud autem dum turbatur, spumescit, ac fecernitur, & pingue quidem, quod Butyrum vocant, quum leve sit, in superficie consistit; grave vero, & crassum deorsum fidit, quod etiam secretum siccant. Ubi vero concretum, ac siccatum fuerit, Hippaen ipsum vocant. At serum lactis medium locum tenet. Sic etiam in homine, dum turbatur humor, quicquid eius est in corpore a principis, quæ dixi, disparatur. Et in superficie quidem bilis consistit. Levissima enim existit. Secundo loco sanguis. Tertio pituita. Gravissimus autem horum humorum est aqua. Has vero ita se habentibus, quisquis ex his in morbo plurimus fuerit, in principio fiente turbatione, devenit ad locum, ubi plurimus esse possit. Verum
- 75 in turbatione, spatiosa capacitate fiente, secretis distrahitur, & calefacit corpus. Aut aliqua corporis parte firmatus, una cum alio humore, cum quo est in alio loco, dolorem, ac calorem exhibet. Qui vero calefactus est locus, insuper etiam reliquum corpus concalascit, & ex hoc febris oboritur. Et oboritur magis a bile, & pituita, & sanguine; calidissimi enim hi humores existunt. Et si quis ho-
- 80 rum in aliqua corporis parte firmatus fuerit, ut plurimum morbus illius nominatur, & cognomen habet. Caterum ab aqua non valde fortis febris oboritur, neque duratura. Nam igni non bonum alimentum aqua præbet. Atque hæc quidem de hoc dicta sunt. At vero ante turbationem non habet multus humor, quo procedat, sed sursum, ac deorsum volvitur, & distrahitur alii humori permixtus.
- 85 Omnia enim plena existunt. In turbatione vero evacuantur. Verum aliud alio magis evacuat. Et multus humor hum locum occupat, & alienus alii non ammisceatur, si firmatus fuerit, priusquam ille viribus adequetur. Potest autem ipsi adæquari is, qui ab ipso postea ad morbum superaccessit, donec purgatus fuerit locus qualicumque purgatione. Si vero multus fuerit affligens humor, fruitur, & consumitur ad morbum etiam alius, qui prius salubris erat. Et tali modo
- 90 homo moritur; fruitur autem, si morbus non amplius sufficiens alimentum habuerit, & consumitur ab humore, qui in loco dolente existit; penum enim propinquum assumit, deinde longius depascitur, donec consumptum fuerit, & non amplius inest in corpore alimentum. Alimetur autem est hominis humor levis. Quemadmodum igitur ut certum est, putrefactio primum paululum fit, si maxime calefaciat.
- 95 Postea ubi isthic alimentum putrefactionis non amplius sufficit, depascitur de sano, initio sumpto a proximo, ad totum corpus, donec totum quicquid carnosum est, putrefecerit; postquam vero in totum depasta est, alimentum putredini consumitur. Sic sane etiam in morbo. Sumpto enim a loco illo initio, ubi isthic alimentum sufficiens non amplius inest, depascitur ulterius, a proximo initio
- 100 factio. Postquam enim per totum grassatus fuerit, alimentum morbo consumitur, & alius salubris humor non superat. Et si hoc fiat, homo moritur. Quin & in turbatione, ubi hic salubris humor amplio rem locum occupavit, & non firmatus fuerit, sed volvatur, ac distrahatur, non amplius alii misceatur, sed ad morbum
- 105 consumitur, si non depurgetur. Deinde venæ superimplentur. Valde autem impletæ, nihil ex se ipsis remittunt, priusquam spatiosa capacitas ipsis contingat. Quemadmodum ubi quis vehementer pettusculi est, sanguis sub plagam intercurrit, nimirum venit a plaga evacuatus. Postquam autem carnes veluti spongia fuerint impletæ, non amplius remittunt, sed continent in se ipsis, donec in loco
- 110 aliquid ab ipsis evacuationi fuerit. Quum enim collectus fuerit sanguis, præcipia viam intercepit. Quemadmodum si quis vas olearium coriaceum angustis oris oleo impletum, in osculum vertat e directo, & si hoc fecerit oleum, ex ipso prodire non poterit; viam enim ipsum oleum intercepit, utpote inutilem, & acervatum incumbens. Si vero quis ipsum vas inclinet, libera erit via osculi inter-
- 115 cepta, qua effluerit oleum ex ipso. Idem fecerit etiam aqua in mensa. Ita sane etiam ubi multus humor in corpore præ turbatione locum occupavit, & venas impleverit, non amplius ab ipsis discedit, priusquam ubi locus vacuus est, alimento a morbo consumpto. Atque hæc a me dicta sunt de hoc, si in corpore quid fuerit, unde morbi gignantur, redundantibus etiam aliis, & quomodo principia efficiant color-
- 120 rem, & turbationem humorum deducencia ad morbum. * Nunc vero dicam, 26 quæ efficiant ea, quæ ex coelo nobis obveniunt, si ad ea, quæ in corpore generata sunt, inepta fiant, & quum humorem in corpore superarint. Affero autem partem humoris in homine, ubi liquarus fuerit, congelari, ac ipsari, donec morbum pepererit, partem vero dilatarsi, ac fecerni. Habet autem & hæc affectio similitudinem ad lac. Si quis enim succum in lac immittat, frigiditas in ipso obor-
- 125 ta, lac inspissat, & congelat. At circum inspissatum, serum est. Sic etiam in homine humor, frigiditate in morbo oborta, congelatur, & inspissatur. Circum ipsum vero aquosum humorem, adhuc etiam alius humor, quanto copiosior fuerit in alio corpore, amixtus est. At si quidem ad alvum devenerit, steruus conturbat, & tormen in alvo inducit, & foras pertransit, nullo magno damno illato. Si
- 130 vero non ad alvum devenerit, firmabit se aliqua corporis parte, ubi ipsi plurima capacitas erit. Volutatur itaque exquirens sibi ipsi loci capacitatem. Et quod quidem aquosi humoris de congelatione secretum est, utpote frigidissimum, ac gravissimum in corpore existens, ad infernas partes descendit, & circum ossa, ac ner-

exonerasset; ac minxisset, opus haberet statim potus, ac cibo pro egestionis facili copia, si modo valdus esse deberet, quum humor sufficiens in corpore non relinqueretur, sed una cum stercore foras prodeat postridie, aut eadem die. Et si quidem comedisset, bene esset; sin minus, & evacuatus debilis esset, neque humor crassius fieri posset, ut postridie foras prodiret. Non enim sufficiens in corpore relinquitur. Nunc vero alvum exonerantes probe valeamus, & si per biduum nihil cibi acceperimus, & vivere, & facere quid possumus, & non penitus debilitamur ex evacuatione in hoc tempore. Humor enim in corpore manens, robur exhibet. Atque hæc a me dicta sunt, quomodo, & cur fieri non possit, ut humor, qui corpori accessit, foras egrediatur eadem die, immo neque postridie. Id porro assero, si humor pluribus quam tribus diebus in corpore permaneat, aut alius multus implens accedat, venis calefcentibus, ac flantibus, majus malum, aut minus homini significationem de se præbere; hyeme quidem minus, & posterior; æstate vero majus, ac prius. Atque hæc a me dicta sunt de eo, quod fieri solet; si humor in corpore maneat. At vero si corpus cibos eadem die egereret, non sufficienter humore uti posset, sed essent homines tenues, ac debiles. Nunc vero quum maneat cibi, ac potus, quamdiu permanent, corpus fruitur sensim de ventriculo trahens, & impletur. Hæc dixi, & quomodo, & cur cibi non possint eadem die exire. * Si vero cibi maneat in ventriculo, ampliore tempore quam opportunum est, & alii ad ipsos ineidant, corpus neque repletur, & dum premuntur a plenitudine venarum, calor, ac dolor corpori accesserint, æstate quidem citius, hyeme vero posterius. Æstate enim calidus est aer ambiens, & calidiorem corpus in se ipsum trahit. Et si calido adhuc existente ventriculo, calidior, quam opportunus est, spiritus homini accedat, nihil miri est hominem ex tali febre, hyeme vero, quum frigidum spiritum trahit in se ipsum, multo magis poterit corpus repletionem ferre, homine modice ventrem exonerante. Et hæc a me dicta sunt de eo, quod fieri solet, si cibi ampliore tempore in ventriculo maneat. Et attrigi quoque obiter, ut declararem omnem humoris, ac cibi & longioris, & brevioris temporis differentiam, cur homines aegrotent.

18 Verum de hoc melius tractabo temporis progressu. * Revertor rursus retro de sanitate dicturus, quod sane corpus hominis humore de cibis, ac potibus fruitur, & prodeunt foras in sano tum cibi, tum humor juxta relata rationem. Et si quidem foras prodeat plus humoris, quam de cibis, ac potibus accessit, homo attenuatur. Prodit autem foris plus, quam accessit, ob hanc causam. Si in quiete degat homo, & non laboret, mali aliquid ipsi in corpore inest. Verum præ alia sanitate, quæ multa est, non lædit valde. Malum vero illud hujusmodi est. Postquam aliquid ex his quatuor corpori accedentibus advenerit copiosius, non ita multo corpus calefcit sensim, ut non valde lædatur, & liquefcit in ventriculo, & cibum homini injuncundum facit. Si vero humor alius alio copiosior fuerit, febris ex hoc homini oboritur. Verum de hoc exactius paulo post tradam. Quandoque etiam ubi cibis jucundus est, homo attenuatur. Causa vero eadem est. His autem signibus, plus humoris extra prodit, quam succenturiatur. Et propterea in quiete degenti contingit, ut attenuetur. At vero laborantibus hominibus itidem corpus calefcit. Et hoc a labore calefcite tum humor in ipso diffunditur, tum attenuationis morbus oboritur. Quum autem inutilis fiat humor, & ad ventriculum, & ad vesicam defluit, hæc autem foras expellunt. Pars vero ipsius extra exhalat per internam corporis raritatem. Pars autem, quæ adhuc intus manet, sudor fit, & per corpus foras procedit. Eodem modo, & exercitationes juvenum idem efficiunt, quod labor. Si vero etiam non paucior fuerit humor eo, qui prius exivit, accedatque insuper alius a cibis, ac potibus, attenuatur propterea homo. Paucior autem accedit, si non aliud quid edere poterit, & si neque laboret pro prioris laboris, aut exercitationis ratione, alii alius pauciores sunt. Caterum bonus corporis habitus accedit ex usu hæc de causa. * Postquam refecatus est tempore humor, & in priore labore prius egressus est alius alio copiosior, & unus alius alios valde superavit, homo repletus fit. Et si quidem a multis valde superetur, febris ex hoc modo oboritur. Si vero a paucis, parum superatur. Sed & corpus hoc modo sufferre, ac revalescere potest; humiditate enim uberiore in ipso existente, calorem exolvit. Calefcit enim corpus a febre, & si quidem modicum fuerit id, quod affligit, tertia die eodem modo dimittit, per duas autem continue tenet; si vero copiosius, quinta die, per quatuor vero tenet pro ratione. Atque hoc modo morbi per dies judicantur. At si dimiserit febris in imparibus diebus, & sanus homo fit, & moritur. Quæ de causa paulo post dicam. * Nunc autem referam, cur febris dimittat. Sic autem sentio. Quæcumque febris de corpore hominem corripuerit, necesse est, tertia die humorem affligentem exire de corpore, aut in alio quopiam impari die juxta rationem antea relata. Non enim exit prius, quam alius bonus de ventriculo ipsi accedat. Nam intermedia, & postera die corpus trahit de ventriculo quicquid ipsi in se ipso dimiserit priori die, nisi ventriculus id expulerit, & alium humorem habuerit, quod sane malum homini esset. Si vero dimiserit febris tertia

vos volutatium, adhuc magis corpus ad inflammationem perducit, & clarum est, quod circa nervos, & præsertim circa ossa aquosus humor, qui humorem facit, existit. Circa ossas enim corporis partes homo maxime riget, & capilli erecti sunt, contorta cuticula, ac liceiore fiente, quam priori tempore, nimirum aquoso humore isthuc deficiente, & circa ossa obvolvito. Atque hinc sane solus ille locus, ubi primo tempore erat, humorem facere non potest, unde etiam rigor oboritur. At vero reliquus humor, qui æqualissime crassius est, partim quidem in toto corpore est, partim vero quantum abundaverit, si quidem alvus plena non fuerit, & quod assilgit, modicum sit, quandoque ad alvum devenit, & nullum magnum damnum inducit, & aliquando quidem febrem non inducit, aliquando vero debilem, & innoxiam, & quod assilgit, una cum stercore exit. Si vero alvus plena multum, quod assilgit, habeat, periculum est ex ipso morbum aliquem fieri, si alicubi se firmet id, quod assilgit aut ad latum, aut ad visum, aut alicubi aliam partem conalescat, quo primum illum humorem simul turbet. Qui vero non valde ex calore ab aquoso humore victi sunt, utpote qui circa ossa, & prope medullam consistit, hos progressu temporis magis lædit, primum quidem in illum ipsum locum, deinde ipsi propinquum, & semper ulterius depascitur, & alvus ipsum assumit, ut quæ calida sit, & postea tum alvus, tum lædens humor adhuc magis calefacit. At humor crassius calefcens, primum diffunditur is, qui propinquus assilgenti existit, diffusus autem aquoso humori assilgenti miscetur, deinde in consensione corporis inanius redditur, & tandiu rigor tenet, quamdiu aquosus humor alii humori ammixtus est. Quin & febris hoc modo generata oboritur. Assilgentia ad locum firmata, calefcens corpus febrem in se suscipere cogunt, & ab assilgente, & ab alvo calefactum, reliquum aquosum humorem superat. Atque sic febris fit post frigus, si qua corporis parte copiosior humor formatus fuerit. Si vero volvatur, ac distrabatur, tali modo febris oboritur. Post frigus febris volvatur, maxime assilgens circa alvum & supernam, & infernam. Istihæ enim plurima loci capacitas existit. Dum autem volvatur, primum propinqua calefcunt & viscera, & quæ in alvo sunt. Postea etiam alius humor diffusus calore fruitur, & aquoso humori miscetur. Atque febris post rigorem hæc fit, ubi assilgens volvatur, imo etiam ubi firmatum fuerit reliqua corporis parte. Et hæc a me dicta sunt, quomodo, & quando rigor morbosus fiat, & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruit. Et quæ sint principia morborum, & qualem unumquodque ipsorum morbum in corpore inducat, & quomodo, & cur in diebus imparibus morbi judicantur. Et unde homines sani sint, & unde ægrotent, & quomodo bilis, & pituita copiosior, & paucior fiat. Itemque alia multa, quæ in ipsa natura humana sunt, demonstravi, quæ sane hæc sermo exigebat. Atque hæc ita relictæ finem habent. * Nunc autem de lumbri-
 27
 eis latius dicam. Assero enim ipsos in puero, dum adhuc in utero est, nasci. Postquam enim semel ex utero egressus est, non tanto tempore steruus in alvo manet, ut ex ejus diuturnitate, ac putrefactione tantæ magnitudinis animal generari possit. Exernit enim semper besternum steruus per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale vero animal nasci non possit, etiam si multis diebus homo steruus non egeret. Multa enim nascuntur, dum puer in utero est, hoc modo. Ubi ex lacte, & sanguine computrescente, ac redundante, utpote quod dulce est, pus factum fuerit fervidum, animal isthuc generatur. Nascuntur autem & rotundi lumbri isthuc eo modo. Signum vero, quod hæc res ita se habet, hoc est. Postquam in lucem editi sunt pueri, mulieres ipsi in cibo offerunt medicamenta, quo steruus ex intestino exeat, & non comburatur, & simul ut intestinum dilatetur. Ubi vero cibum obtulerunt, multi sane pueri & rotundos, & latos lumbricos una cum primo stercore excernunt. Si vero non excreverint, sunt etiam, insuperque nascuntur in ventribus. Et rotundi quidem parvum, lati vero non amplius, etiam si quidam ipsos parere dicant. Nam homo, qui latum lumbriculum habet, velut cucumeris semen excernit alias atque alias una cum stercore ipso, & sunt homines, qui hoc lumbriæ partus esse dicunt. Mihi vero non recte dicere videntur, qui talia dicunt. Neque enim ab uno animali tot pulli generari possunt, neque ea est loci in intestino capacitas, ut partus educare queant. Augescere autem puero, augescit etiam lumbricus in intestino ab his, quæ in ventriculum ingesta sunt, & æqualis sit intestino quibusdam in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam paulo prius. Et postquam intestino adequatus est, similiter augetur, & quanto major factus fuerit, una cum stercore excernitur de intestino recto, & excidit velut cucumeris semen, sæpe vero etiam major. Quibusdam vero iter facientibus, aut laborantibus, & ventriculo calefcente, deorsum descendit, ipsique prominent ex podice inflatus, hocque facit, & de podice refecatur, aut retrocedit. Signa vero, quod non pariat, sed ita habeat, velut ego dico, hæc sunt. Si quis curret hominem latum lumbriculum habentem, & medicamentum dederit, aut portionem, si quidem fuerit homo bene præparatus, totius rotundus factus ad pilæ figuram exit, & homo sanus evadit. Si vero ad medicinam hæreat, recta pars de lumbrico abrumpiatur, longitudine diorum, aut trium cubitorum, aut etiam

- longe amplior, & ubi abruptus fuerit, per multum tempus signa cum stercore
 205 non prodeunt. Postea vero auferunt. Atque hæc argumenta sunt, quod lumbricus
 latus non parit, sed abruptum. Est autem species ipsius, qualis alba intestini
 ratura. Signa habet hæc. Cacat alias atque alias velut cucumeris semen, &
 ubi jejunis est homo, exilit ad hepar alias atque alias, & dolorem inducit, & quandoque
 210 vocem intercepti, si fortiter ad hepar irrumpit, & valde multa sputa ex ore fluunt,
 paulo autem post sedantur, & tormen multum in ventriculo alias atque alias oboritur.
 Quandoque etiam ad dorsum dolor incidit. Nam & hic aliquando firmatus
 immititur. Hæc lumbrici lati signa sunt. Contingat & hoc. Qui hoc animalculum
 habet, in toto quidem tempore valde debilis fieri non poterit. Ubi vero
 215 debilis factus fuerit, vix reualefcit. Latus enim lumbricus parvis alicuius particeps
 fit ex his, quæ in ventriculum ingesta sunt. Si quidem igitur curatus fuerit
 iusto modo, sanus fieri poterit. Si vero non curetur, sua sponte non exit. Mortem
 tamen non inducit, sed consenscit. Atque hæc a me dicta sunt de lumbrico lato,
 unde nascitur, & quæ morbi ipsius signa sunt. * Caterum calculi morbo
 220 principium oboritur a lacte, ubi puer lac impurum fugit. Lac autem in nutritrice
 impurum fit, si pituitosis cibis, ac potibus, & alimentis in puris matris utatur.
 Conferunt enim omnia in ventriculum illabentia in ipsa ad lac. Habet autem
 & hæc res se hoc modo. Si nutritrix non sana fuerit, sed biliosa, aut aquosa, aut
 225 sanguinea, aut pituitosa, lac etiam malum puero generatur. Consentient enim
 nim corpus, & ventriculus. Plurimum vero ipsi ad lac cedit de eo, quod ipsa
 plurimum in se ipsa habuerit. Et puer si de nutritrice lac purum fuxerit, sed
 biliosum, velut dixi, morbosus fit, ac debilis, & in præsens maxime affligitur,
 quandiu lac pravam, ac morbosum fuxerit. At ubi fuxerit lac non purum, sed
 230 terretum, & pituitosum, & habuerit puer venas de ventriculo ad vesicam tendentes
 amplas, ac attrahentes, procedit autem & quod bibit nutritrix, & lac in ventriculum
 pueri, tale quale trahit a ventriculo de lacte, in totum similiter, prout venæ
 ad ventriculum detrudere possunt, si quid sane in lacte non purum fuerit, id
 quo vesica fruatur, lapis fit tali modo, velut in aqua non pura, in calice, aut vase
 235 anco turbata, & rursus sedata, sex acervata fit in medio. Sic sane & in vesica
 urina non pura existente. Et non per urinam ejicitur, ut quæ in cavo fit loco,
 maxime acervata fiens præ dolore per mictionem non pertransit, & a pituita cruda
 concretescit. Glutini enim fit pituita ad fecem ammixta. Et primum parva
 lanugo superstat, deinde quod accedit, arenosum fit, glutino sicut pituita, quæ est
 240 in vesica de lacte, & augetur, & quicquid humoris in glutinatione accesserit,
 emingitur. Rursus autem sex solida fit, & lapidis speciem accipit. Quemadmodum
 ferrum ex lapidibus, ac terra, dum comburantur, fit. Et in prima quidem in
 ignem immisione conglutinati sunt lapides cum terra ad ferri crementum.
 At ubi iterum atque iterum in ignem immissa fuerint, crementum quidem foras
 decedit, liquefcens ex ferro id, quod ita fieri oculis videmus. Ferrum autem in igne
 245 relinquitur, & cremento decedente, subsidet, fitque solidum, ac densum. Sic profecto
 etiam sex in vesica, dum pituita glutinum fit, emingitur id, quod ab urina
 liquefcit. Sex autem subsidet, & densatur, ac solida fit, velut ferrum. Ubi vero subsedit,
 ac solida facta est, sursum, ac deorsum in vesica volutatur, & feriens vesicam,
 250 dolorem inducit, & si vehementer feriat, ac ulceret, aliquid de ipsa auferit. Verum
 id, quod insuper affertur, adhuc magis quam id, quod arenosum decessit, concre-
 tionem efficit. Atque tali modo fit lapis de lacte in vesica, & si puero anxietas ali-
 qua ab hoc oboritur, alias atque alias, ubi meire vult, urinae meatum apprehendit.
 At si puero jam adulto lapis gignatur ex terræ ammu, dolor non adest ipsi
 prius, quam ipse sibi ipsi cibum delingat. Et hæc a me de hoc relata sunt. * Caterum
 255 morbus signa quinque habet. Nam, ubi meire vult, dolore affligitur, & urina
 paulatim fluit, velut in urina stillicidio, & est subetuenta, nimirum vesica
 a lapide exulcerata, & vesica inflammata est. Verum hoc signum inconspicuum
 est, indicat tamen summa pars præputii. Quandoque mingit arenosa, verum a
 talibus, qualia ego dicam. Ejicit autem aliquando lapides duos, aut etiam plu-
 260 rios parvos generatos eodem modo, velut de uno dixi. Fiunt etiam tali modo.
 Quum lapis fuerit concretus, & profunde subsederit in vesicam in arena separata,
 ita ut ipsam advenientem lapis non assumat in se ipsum, sed gravior, ac copiosior
 fiat, ut tamen ipsa ad se ipsam non concreseat, etiam sic duo lapides fiunt.
 Fiunt etiam plures eodem modo. Sed & collisis inter se in agitatione, aliquid
 265 disparatur, & arenosum per urinam ejicitur. Quod etiam aliquando contingit,
 ubi arena ad vesicam descendit, & non coaruit. * Quidam dicunt, quod potus
 in pulmonem devenit, ex hoc vero in reliquum corpus. Hi autem, qui hæc dicunt,
 redarguuntur ex hoc, quod dicturus sum, quod videlicet pulvis cavus est, & in
 270 ipso fistula est. Quod si pulvis cavus non esset, & fistula non ipsi adhereret,
 animalia vocem non ederent. Vocem enim edimus de pulmone, quia cavus est,
 & fistula ipsi adest. Vocem autem articulant labia, & lingua. Verum de hoc
 exactius in peripneumonia tractatione egi. Caterum hominibus, quibus
 porus

potus in pulmonem ferri videtur, adversabor, habetque res se hoc modo. Proce-
 dit potus in ventrem, a ventre autem in reliquum corpus expenditur. Oportet
 autem his, quæ dicturus sum, mentem adhibere. Sermonis argumenta, quod potus
 non procedit in pulmonem, sed in ventrem, hæc sunt. Si enim potus pro- 275
 cederet in pulmonem, quum pulmo expletus esset, homo non facile respiraret,
 neque loqui posset. Non enim esset, pulmone pleno existente, quod resonaret.
 Et hoc quidem unum argumentum est. Deinde si potus in pulmonem procede-
 ret, cibi in nobis fieri existentes non similiter concoquerentur. Atque hæc duo 280
 argumenta existunt. Sed & medicamenta alium subducunt, si in potu suman-
 tur, extra ventrem procedent. Habet autem hæc res hoc modo. * Quæcumque
 medicamenta purgatoria sunt aut superne, aut inferne, aut etiam utrumque præ-
 stant, ea hæc faciunt. Omnia valde urunt, & fortia quidem ex ipsis, si partem
 aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora vero turbu- 285
 lentum corporis motum faciunt, quamcumque tandem partem occuparint. Si ve-
 ro aliquid ex his medicamentis in pulmonem perveniret, videretur mihi ma-
 gnum aliquid malum inducturum esse. Pituita enim de capite descendens, cum
 in valde brevi tempore exulcerat. Tenera enim, & rara res est pulmo, & si ex-
 ulceratus fuerit, non bene habebit homo ille ob multas sane causas. At vero 290
 venter a medicamento non exulceratur. Nam res est valida, ac robusta, nimi-
 rum velut pellis, & corium. Et plerique sane ex Lybiæ incolis pecorum pellibus
 pro vestibus utuntur, ventribus autem pro utticulis. Robusta enim res ven-
 ter existit. Deinde ubi a vino nigro homines repleti fuerint, nigra crementa
 excernunt. Atque hæc omnia argumenta existunt. * Et ubi alia comederimus, 295
 aut aliud quoddam edulium olidum, utinam reddimus, comesta odore referen-
 tem. Et hæc quidem omnia argumenta sunt. Sed & hoc considerandum venit,
 quod dicturus sum. Si quis cyceonem biberit, aut farinam coctam forbu-
 rit, aut aliquid ejusmodi, & hoc ipsum in pulmonem perveniret, certe ar-
 bitramur, ipsum ne minimum quidem tempus vivere posse. Ubi enim modicum 300
 quiddam pituitæ in pulmonem perveniret, aut in fistulam ipsius, multa, ac for-
 tis tussis oboritur, ac convulsio. Si vero utique & vixerit homo, qui cyceonem
 biberit, aut farinam coctam forbuerit, ubi sane concocta fuerit sorbitio, vide-
 tur mihi multa, & fortis caliditas corpori oboritura esse, multusque dolor, ut
 omnino moriatur homo hoc modo, si illa in pulmonem perveniant. Atque hæc 305
 jam argumenta septem sunt. Præterea quomodo lac infantes pueros nutri-
 re possit, si ad pulmonem descendere? Atque hoc mihi aliud adhuc argumen-
 tum est. Et hæc ne produxissem quidem ad sermonis mei confirmationem,
 nisi multi adeo homines essent, quibus potus in pulmonem procedere vide-
 tur, & necesse est ad opinionem fortiter inhaerentes multa argumenta adduce- 310
 re, si quis velit audire a prioris sententia abducere, ac convertere, ut suis ver-
 bis fidem habeat. Et propter hoc etiam potus in pulmonem non procedit, sed
 in ventrem; quia contigua, & annexa est ipsi gula hominis semper hians, & in
 hanc procedit. Et simul pulmonis fistulæ, velut hederæ solum incumbit, quare
 neque descendere permittitur in transglutendo, si in ipsum procederet. At- 315
 que hæc mihi de hoc relata sunt. Procedit namque potus in ventriculum, &
 ubi expletus est, splen de ipso suscipit, & distribuit ad venas, & ad omentum,
 & in declive deorsum, & in scrotum, & ad crura, & ad pedes. * Et postquam mor- 320
 bus ex aqua multa obortus fuerit, procedit de ventriculo, & semper ad sple-
 nem venit de potu, ubi biberit homo. Contingit autem in hoc morbo, ut neque
 febricitent alias ex ventre, quam ubi homo sitiat, vesica autem, & ventriculus
 non iusto modo excolent, neque conveniente diata homo utatur. At splen sub-
 ægrotans a ventre de potu trahit. Morbus autem oboritur, & scrotum pellici- 325
 dum fit, & claviculæ, & collum, & pectora attenuantur. Colliquantur enim
 ab hoc morbo, & humor ad ventriculum defluit, & infernæ partes aqua plene
 sunt, & venter cibum averatur, & quandoque valde adstringitur, quandoque de-
 fluit. Nec vesica iusto modo excolat, & plerumque horror alias atque alias per
 corpus discurrit, & quandoque febris corripit. Et quibusdam facies tumida
 fit, quibusdam non. Aliquibus etiam tibie rumpuntur, ubi motus diurnus
 factus fuerit, & aqua illinc effluit. Incidunt & vigilie, & impotentia cor- 330
 poris, ac maxime lumborum. Et postquam edit, aut bibit, etiam paulo ampli-
 us splen affligitur, & spiritum frequentem semper emittit. Atque hæc signa
 hydropsis sunt. Est autem & circa ventriculum solum, sive febris corripitur,
 sive non. Et venter magnus fit, & crura implentur aqua. Verum supernæ cor-
 poris partes attenuantur his, qui ita affecti putantur. At signa omnia debilio- 335
 ra sunt, & simul in cruribus aqua non discedit, & dolor tanto minor existit.
 Cæterum circa ventriculum solum hydrops, & aqua hæc de causa fit. Enim
 ubi acervatim aqua accessit, & via in principiis non pateat ad infernas par-
 tes, sed acervatim in venis concludatur, nimirum ut quæ respirationem non
 habeat, neque sursum, neque deorsum inniti potest, haud aliter, quam si quis 340
 magnum vas angusti osculi occludat, ac subito invertat, deinde sensum ope-
 culum

- * Peripneumonia. In peripneumonia febris detinet, & tussis, & excreta primum quidem pituitam crassam, ac puram, sexta vero, & septima subbiliosam, & sublividam. Octava autem, & nona subpurulentam. Huic, si quidem dolor adest aut dorsi, aut laterum, dandum est medicamentum, quod in pleuritide ad lateris dolorem, in medicamentario libro scriptum est. Per potus autem, & sorbitiones, & venter subductionem, ac frigationem eadem curatio adhibeatur, quæ in pleuritide. Quo vero spiritum, & pus ex pulmone repurgetur, danda sunt pharmaca in potu, quibus pulmo humectatur, & pus sursum purgatur. Fit autem hic morbus, quum pituita acervatim ex capite ad pulmonem fluxerit. Aliquando etiam ex pleuritide in peripneumoniâ, & febrem ardentem transitus fit. Judicatur autem brevissimus quidem in diebus quatuordecim, longissimus vero in duobus de viginti. Pauci vero hunc morbum effugiunt. Fiunt etiam pectore suppurati ex hoc morbo, si non in judicatoriis diebus pulmo fuerit purgatus. * Phrenitis ubi apprehenderit, febris primum debilis detinet, & dolor circa præcordia, magis autem dextra ad hepatis. Quam autem quarta, aut quinta advenerit, & febris fortior fit, & dolores augescunt, & color subbiliosus efficitur, & mens percellitur. Huic ad dolorem quidem danda sunt, quæ in pleuritide, & repor faciendus, ubi dolor hæret. Sed & alvus curanda, ac reliqua similiter facienda sunt, excepto potu. Potu vero utendum est quocumque alio volueris, præter vinum, aut acetum, & mel, ac aquam dato. Vinum autem non convenit mente moris, neque in hoc morbo, neque in quibuscumque aliis. Conducit autem in hoc morbo etiam caput multa calida lavare. Mollior enim corpore, sudor quoque magis sequitur, & alvus, & urina secedit. Et æger ipse se ipso temperantior evadit. Fit hic morbus a bile, quum mora visceribus, ac sepe transverso infederit. Judicatur autem morbus, brevissimus septima die, longissimus undecima. Effugiunt & hunc pauci, transitque etiam ipse in peripneumoniâ, & si transierit, pauci effugiunt. * Febris ardens, sive causos quum habuerit, febris detinet, & sitis fortis, & lingua aspera, ac nigra fit a spiritibus sane caliditate. Et color subbiliosus fit, & spuma biliosa. Et æger extrinsecus quidem frigidus fit, intrinsecus vero valde calidus. Huic conducit frigefaciencia adhibere & ad alvum, & forinsecus ad corpus, cavendo, ne inhorrescat, potiones quoque, ac sorbitiones danda sunt frequentes, & paulatim quamfrigidissima. Venter autem curctur, & si quidem non subeat, quæ insunt, insula frigidissima per clysterem immittantur aut quotidie, aut alternis. Hic autem morbus fit a bile, quum mota intra corpus firmata fuerit. Soler etiam in peripneumoniâ transire. Judicatur autem brevissimus quidem nona, aut decima die. Longissimus autem decimaquarta. Et si quidem transierit in peripneumoniâ, pauci effugiunt. Si vero non transierit, multi effugiunt. Atque hi quidem morbi acuti vocantur, & oportet hoc sic curare. * Quæcumque vero aliæ febres hyeme fiunt sive ex vino, sive ex lassitudine, sive ex aliqua alia re, eas observare oportet. Transeunt enim aliquando in morbos acutos. Transito vero ipsarum talis est. Quam commotis duobus humoribus, pituita, & bile, non conducticia corpori exhibentur, ipsi inter se ipsos coacti, pituita videlicet, ac bilis, corpori ubicumque tandem contigerit, allabuntur. Et sit pleuritis, aut phrenitis, aut peripneumonia. Observare igitur, ac virare oportet febres in hyeme. Sit autem observatio, & tutela ab ipsis, quies, & gratilias, & ventris evacuatio. In sorbitionibus autem, & potionibus degendum est, donec febris imminuta fuerit. Ex morbis ferme maxime acuti & occidunt, & laboriosissimi sunt, & opus est ad ipsos plurima tutela, & exactissima curatione. Et a curante nullum malum accedere oportet, sufficiunt enim, quæ ab ipsis morbis adsunt. Verum ut boni quid præstet, pro viribus conetur. Et si quidem recte curante medico, a magnitudine morbi superetur æger, non hæc culpa medici est. Si vero non recte curante, neque cognoscente, a morbo superetur, medici culpa est. * Æstate porro hæc sunt: febris detinet fortis, & sitis, & vomunt aliqui bilem, aliquibus vero etiam inferno secedit. His in potu dandum est, & ad sorbendum, quodcumque tandem tibi idoneum esse visum fuerit. Si vero bilis, aut pituita ad cor confederit, aqua frigida, aut aqua multa pota, vomant. Si vero venter non fecerit, clysteri utendum est, aut subditiis glandum. Morbus autem fit a bile. Liberantur autem maxime septima die, aut nona. Si vero febre detinente, non purgetur neque deorsum, neque sursum, dolor autem affuerit per totum corpus, tertia, aut quarta die pharmaco levi, aut potione deorsum purgato, facito autem sorbitionem ex milio, aut farina, & iidem potiones curato. Patiuntur autem & hæc a bile. * Si vero externæ partes non valde fervidæ fuerint, verum internæ, & lingua aspera, ac nigra sit, huic pharmacum ne dederis, curato autem, frigefaciencia adhibendo & ad alvum, & ad reliquum corpus. Vocatur autem hæc febris æstuosa. Judicatur maxime undecima die, & decima quarta. Si vero febrilis calor apprehenderit, ac dimiserit, gravitas autem corporis ipsam detinuerit, hunc donec quidem calor tenuerit, sorbitionibus, ac potionibus curato. Quam autem non tenuerit, etiam cibos dato, purgato autem quamcelerrime pharmaco, sive sursum, sive deorsum opus habere tibi visum fuerit. Si vero febris quidem non tenuerit, os vero amarum habuerit, & corpus gravetur, & cibum aversetur, pharmacum dandum est. Patiuntur autem hæc a bile, quum

- quum in venas, ac articulos incubuerit, & firmata fuerit. * Quicumque vero alii dolores in aestate circa ventrem sunt, si quidem ad praecordia, & cor tenderint, aquam multam aquosam facito, & aceti tribus heminis affis, tepidam bibendam dato, & ubi modico tempore ipsam retinuerit, & igne, ac vestibus concalescatis fuerit, vomat. Si vero a vomitu rursus accesserint, ac suffocaverint, rursus vomitum faciat. Aut ipsum multa calida lotum, per clysterem subleue, & tepidioria adhibe, si affuerit dolor. Patiuntur autem haec maxime a pituita, quum commota ad cor allapsa fuerit. Danda sunt etiam his, qui talibus doloribus vexantur, pharmaca, quae descripta sunt ad eiusmodi morbum in medicamentario libro. Si vero transierit dolor alias ad alium ventris locum, & febre eaturit, multa calida lavetur, & doloris gratia bibenda dentur, quae in pleuritide sunt descripta, aut alia, prout tibi visum fuerit. Si vero a dolore non liberetur, per pharmacum deorsum subpurgetur. A cibis autem abstineat, quousque dolor assuerit. Tales autem dolores, qui sic errant, a bile sunt. * Quicumque vero dolores infra umbilicum sunt, in his molli infuso per clysterem immolli subleuato. Si vero non sedentur, pharmacum deorsum purgans dato. Quicumque vero dolores derepente in corpore sunt citra febrem, in his lavare multa calida conducit, & tepidioria. Nam pituita, & bilis compacta quidem, fortia sunt, et praevalent in quacumque corporis parte constituerint, et laborem, ac dolorem sortem exhibent. Diffusa vero debiliora sunt, quacumque corporis parte manifesta fuerint. * At vero morbi, qui in aestate sunt, sic fieri solent. Quum corpus a sole fuerit calefactum, humectatur. Humectatum autem aegrotat, aut totum, aut ea parte, in quam pituita, & bilis incubuerint. Si quidem igitur quis ipsos incipientes curet, neque longi sunt, neque periculosi. Si vero non curet, aut male curet, et longiores sunt, et saepe quoque occidunt. * Sed et tertianae, et quartanae febres ex talibus fieri solent. Haec morborum constitutio maxime quidem aestate fit, aliquibus vero etiam hyeme. Tertiana febris quum apprehenderit, si quidem videbitur tibi non purgatus esse, quarta die pharmacum dato. Si vero pharmacum non videbitur opus habere, medicamenta in potu exhibeto, quibus febris aut transmutetur, aut deficiat. Exhibeto autem, velut scriptum est, in medicamentis. Et in apprehensione quidem sorbitiones, et potu nutritio. Interposito vero tempore, cibis per alvum secedentibus. Apprehendit autem plerumque non ita saepe. Si vero non curetur, in quartanam transire solet, et diuturna fieri. * Si vero quartana apprehenderit, si quidem impurgatus fuerit, primum caput purgato, et interpositis tribus, aut quatuor diebus, pharmacum sursum versus purgans dato in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus, rursus aliud deorsum purgans dato in ipsa apprehensione. Si vero ex his non sedetur, rursus interpositis diebus, multa calida lavato, et pharmaca, quae scripta sunt, dato, potibus autem, et sorbitionibus, et reliqua dicta utendum est, velut in tertiana. Apprehendit autem haec febris plurimos multo tempore, alios vero paucos. Et fit tum tertiana, tum quartana a bile, et pituita. Cur autem tertiana, et quartana, alibi a me scriptum est. Vim porro habent medicamenta in his febris, ut potis his, corpus in loco sit, in consueta caliditate, ac frigiditate, et neque praeter naturam calefiat, neque frigeat. Danda sunt autem, velut scriptum est, in medicamentario libro. * Pituita alba, quum tenuerit, corpus totum intrumescit albo tumore, et in eadem die alia parte melius sibi videtur habere, alia deterius. Et tumor alias in alia corporis parte major, et minor fit. Huic pharmaca danda sunt deorsum purgantia, a quibus aqua, aut pituita purgatur. Victus autem ratio constituenda est in cibis, et potibus, ac laboribus, a quibus siccissimus, ac gracilissimus evadat. Morbus autem hic fit a pituita, quum quis ex febris diuturnis pituitosus existens, impurgatus manserit, et pituita ad carnes ipsius conversi fuerit. Et nihil quidem albidior est haec pituita quam alia. Verum corporis color albidior appareat. Sanguis enim a pituita copia aquosior fit, et non inequit similiter in ipso bonus color. Quapropter albidiores apparent, et vocatur hic morbus pituita alba. Si quidem igitur curatus fuerit, inchoante morbo, sanus fiet; sin minus, in hydropem transit morbus, & hominem corrumpit. * Quicumque splenem habent magnum, qui quidem fuerint biliosi, hi mali coloris sunt, & malis ulceribus sciant, & ex ore grave olent, & tenues evadunt. Et splen durus est, & semper consimili magnitudine, & cibi non secedunt. Qui vero pituitosi sunt, haec & minus patiuntur, & splen alias major, alias minor efficitur. His conducit, si quidem impurgati fuerint, & caput, & reliquum corpus purgare. Si vero purgatione non ogeant, victus ratio constituenda est, ita ut pituitosis corpus reficemus, ac attenuemus cibis, & potibus, & vomitibus, & exercitiis plurimis, & deambulationibus. Et in vete sursum per veratrum purgantur. Biliosis autem conducit, ut per victum humectantem, alvum, & vesicam subducamus, & ut de vena splenitide frequenter sanguinem mittant, & medicamentis urinae cientibus urantur, quae splenem mollite scripta sunt, & ut pro anni tempore bilem purgent. Quidam vero splenici a pharmacorum potu nihil utilitatis sentiunt, neque a reliqua curatione quicquam gracilior splen ipsorum evadit, sed quae adhibentur, a magnitudine morbi superantur, progressu vero temporis, aliquibus in hydropem morbus degenerat, & corrumpitur. Aliquibus autem splen

supra-

- eius nota, curatio, & causa,
- 26 Venter profluvium, seu diarrhoea, & eius nota, & causa. Dysenteria, ac lienteria, & diarrhoea morbi sunt confusiles. Fluxus a capite, & superiore ventre intercepti, horum morborum curatio.
- 27 Tensio, nota, curatio. Torminum in ventre generatio.
- 28 Bilis fluxus, aut diarrhoea, & eius curatio.
- 29 Urina stillicidium, & causa eius qua.
- 30 De coxandice, seu ischiade, & eius causa, & curatio.
- 31 De morbo articulari, seu arthritide, & apertis, & curatio.
- 32 De podagra, seu pedum dolore. Podagra quid. Quando durabilior, & eius curatio. Podagra in digitis relicta usio per linum crudum.
- 33 Morbus regius, eius causa, & curatio. Morbi ex parvis occasionebus neglecti, magni, ac diuturni fieri solent. Cibi, potus, vel sorbitiones, item pharmaca, quando pericula capeant, Pharmaca bilem, & pituitam purgantia periculosa.
- 34 De tuberculis, & eorum causis, & curatio. Cataplasmata tum discutientia, tum maturantia.
- 35 De summa cutis asperitudinibus, & scabiei speciebus. Favus. Struma. Pani. Furunculi &c.
- 36 Medias qua in adeundo aegroto considerare debet.
- 37 Vulnerati quomodo curandi. Cataplasma frigidifacientia ad inflammata vulnera. Cataplasma ad vulnera que inflammationem experiantur. Pingua quibus conducant, & quibus non.
- 38 Aegrotorum diata ex sanctorum virorum ratione temperari debet, & potus. Sorbitiones in omnibus morbis danda.
- 39 Quae atrium lubricant, quae item astringant. Pistana, & nullam levis sunt. Alica omnium robustissima. Lentaculum quomodo preparat. Sorbitiones febrientium, & non febrientium.
- 40 Quomodo atrium lubricanda imbecillioribus, Quae fecant.
- 41 Quando a morbo convalescentes sunt reficiendi. Morbi fecitatem, item humiditatem postulant.
- 42 Cibi, potus, aut obsonia quaecumque acri concupiscunt, si non damnum consequatur, exhibenda. Sorbitiones, cibos sufficientes perficientibus non danda. Ex alica, & pistana triticea sorbitiones fortiores.

- 43 Pharmacorum facultas non ex intelligentia, sed fortuna.
- 44 Debilibus sorbitiones post cibum danda. Ciborum facultas unde consideranda. Ciborum alia levia, alia gravia. Cibi, & potus ad sanitatem optimi. De iis, quae corpus corroborant. Pingua, castosa, melita, & ex seismo parata, rictum acidum maxime faciunt. Tormina, flatas, & rictus acidi ex cibis interdum non finit. Vina ventrem subdacentia, & urinam cientia. Carnes percocta, & exsiccata ad robur debiles, ad fecesum vero pertolte commoda.
- 45 Quibus cibis neque magnopere iuvetur, neque laeserit. Panis, & carnes calida per se comestis fecant. Panis purus, Vinum qui debilitetur. Carnes percocta, & exsiccata, debiliores, & leviores. Polenta. Masa.
- 46 Debilibus item, ac levibus, fortiorumque ciborum in corpore humano facultas. Carnes levissima quae, quae item gravissima. Carnes caninae, Polacrium, Leporina, Bubula, Porcina, Ovillia, Sailla. Carnes fetida manifestis sunt leviores. Carnes iumentorum secundam diversam ipsorum usum rationem ipsis familiarum differant. Piscium natura, & differentia.
- 47 Balati moderati usus, non moderati incommoda. De alimentis, eorumque facultatibus in genere, & particulatim.
- 48 Alia colla, & assata urinam cient. Cepae, Apium, Coriandrum. Oenanthe, Purum, Malum ponicum.
- 49 Cibi calidi, & cibi humidi, Acrba, Acida, Salsa, Pingua, Cucurbita, Beta, Blitum, Rumex, Cistae, Sesamum, Uva passa. Vinum aliud dulce, aliud austerum. Oleum, & oleosa. Cucumis. Pepo. Mel.
- 50 Urinam cientia. Atrium silentia. Ciborum varietas. Frumentum, & vinum quibus inter se differant.
- 51 Panis, cum edere assuetis, etiam in morbis est exhibendus. Cibus, aut potus plus solito ingestum, optimum est, si non conficiat, revocare. Poma, & fructus arbori cur venriculo molesti post cibum.
- 52 Vini veteris in flatibus, assa, repletionem, aut torminibus vires. Ciharia, & potus exigui augmenti, & ad robur, & ad sanitatem. In febre intermittente quando cibi dandi. Vinum, & mel temperatissima ad hominis naturam.

S E C T I O I.



IRUM prudentem ratione apud se intra (quod maximi pretii res est hominibus sanitas) nosse convenit, quomodo ex sua ipsius intelligentia in morbis utilitatem capiat. Nosse autem convenit ea, quae a medicis & decuntur, & adhibentur corpori suo, eaque diiudicare posse. Atque haec singula haecenus nosse si satis est, quatenus idiotae contingere potest. Hac vero novetur quis maxime, si harum rerum cognitione, ac studio teneatur. Morbi omnes hominibus a bile, ac pituita fiunt. Bilis autem, & pituita morbos exhibent, quum in corpore nimium aut resiccantur, aut humectantur, aut

- suppuratur, & ulsi sani fiunt. Cum quibusdam vero consenscit, durus, & magnus existens. Morbus autem fit, quum ex febris, & mala curatione bilis, aut pituita, aut ambo in splenem incubuerit. Et diuturna quidem est affectio, non autem lethalis. Ex pharmacis, quæ splenem gratia exhibentur, alia per vesicam purgant, & ipsum molliorem faciunt; alia vero purgant quidem, verum neque per vesicam quicquam, quod manifestius fiat, neque usquam alia parte. Splenem tamen molliunt. * Volvulus, quum apprehenderit, venter durus fit, & nihil secernit, & dolor inferne omnem alvum tenet, & febris, & sitis. Aliquando vero præ dolore æger etiam bilem vomit. Hunc humectare oportet & intrinsecus, & extrinsecus. Et multa calida lavare. Et bibenda dare, quæ alvum movent, & urinam subducunt. Et elytherem adhibere, si admittat. Si vero non admisit elytherem, fistulam ad utriculi extremitatem alligato, & insufflando multum flatum immittere. Et ubi intestinum, & venter elevata fuerint a flatu, exempta fistula, statim insulum per clysterem immittito. Et si susceperit, secessum emittet, & sanus evadet. Si vero non sic susceperit insulum, moritur maxime septima die. Talis autem morbus fit, quum stercore acervatim eombulto in intestino, pituita circa hoc colligitur. Et intestinum inenmescit, utpote his acervatim induratis, & neque pharmaca, quæ superne bibuntur, suscipit, sed revomit. Neque insula inferne adhibita admittit. Est autem morbus acutus, & periculosus. * Aqua inter ceterum fit plerumque, quum quis ex longo morbo impurgatus multo tempore manet. Corripuntur enim carnes, & liquantur, & fit aqua. Fit etiam hydrops a splene, quum agrotaverit, & ab hepate, & a pituita alba, & a dysenteria, ac lienteria. Et si quidem ex purgatione non facta fiat hydrops, venter aqua impletur, pedes autem, & suræ attolluntur, humeri vero, & claviculæ, & pectora, & femora liquefiunt. Hinc si a principio acceperis, priusquam aqua superexcreset, pharmaca bibenda dato, a quibus aqua, aut pituita purgatur. Bilem vero ne moveris. Cibos autem, & potus, & labores, ac deambulationes constituito, a quibus gracilis, ac siccus evadat, & carnes quamrobustissimæ fiant. Morbus autem est lethalis cum alias, tum si venter aqua repletus fuerit. Quum vero a splene, aut hepate, aut pituita alba, aut dysenteria in hydropem transiens fit, conducit quidem per eadem curare, effugiunt autem non valde. Nam in morbis, quum alter alteri succedit, plerumque occidit. Quum enim corpori a præsentis morbo debilitato, alius morbus accesserit, præ imbecillitate perit, priusquam alter morbus, qui posterior accessit, desinat. Aqua porro sic fit. Quum carnes a pituita, & tempore, & inorbo, & non purgata immunditia, & mala curatione, ac febris corruptæ fuerint, liquefiunt, & fiunt aqua. Et venter quidem non distribuit aquam in se ipsum, verum in circuitu circa ipsum consistit. Si quidem igitur a pharmacis, & alia victus ratione æger utilitatem percipiat, & venter ipsius evacuetur, bene est; sin minus, sectione facta, aquam emittito. Secatur autem vel iuxta umbilicum, vel retro iuxta lumbos. Effugiunt autem & hinc parit. * Dysenteria quum habuerit, dolor adest per totum ventrem, & tormen, & egerit bilem, ac pituitam, & sanguinem combustum. Huius ubi purgaveris caput, pharmaco in potu exhibito, quod sursum pituitam purgat, & alvum lacte cocto eluetis, reliquum corpus curato, & si quidem febre caruerit, pinguibus, & dulcibus, ac lequidus semper, quæ insunt, ex alvo subducto. Et multa calida partes sub umbilico lavato, si dolor assuerit. Potus autem, & forbitiones, ac cibos exhibeto, velut scripsum est in medicamentario libro. Morbus hic fit, ubi bilis, & pituita in venas, ac alvum incubuerint, agrotat quidem sanguis, & corruptus secedit, agrotat autem & intestinum, & raditur, ac exulceratur. Fit autem hic morbus & longus, & laboriosus, ac lethalis. Et si quidem robusto adhuc corpore curetur, spes est fugæ. Si vero colliquato iam, & ventre omnino exulcerato, nulla vita spes superest. * Lienteria. In lienteria, hoc est intestinorum levitate, cibi secedunt non putrefacti, liquidi, dolor autem non adest, & corpus attenuatur. Hunc per eadem curato velut a dysenteria detentos. Morbus autem fit, quum ex capite, & superiore ventre pituita defluxus sit in ventrem inferiorem. Quod ubi contingit, cibi ab ipso frigesunt, ac humectantur. Et secessus ipsorum non putrefactorum velox contingit. Et corpus liquefit, dum simul cibi per multum tempus in ventre non concoquuntur, & simul a ventre calido præter naturam calefiunt. * Profluvium ventris longum quum detinuerit, secedunt primum quidam liquida, quæ sunt ingesta, postea pituita. Et probe quidem edit, verum a multo secessu debilis, ac tenuis fit. Hinc sursum versus resiccat, vegeto in potu dato, & capite a pituita purgato. Ventrem quoque lacte cocto eluro. Deinde reliqua cibis, ac potibus curato, a quibus venter, & totum corpus resiccet. Morbus autem ab eisdem fit, a quibus etiam intestinorum levitas. Hi morbi, dysenteria inquam, & lienteria, ac diarrhoea, sive profluvium ventris confimiles sunt. Et oportet ipsos sic sanare, ita ut defluxum a capite, & superiore ventre intercipias, aut avertas. Morbi enim natura hinc est. Et nemo sententiam tuam reprehendet. Ferme autem & reliquos morbos sic considerare oportet, unde unicuique natura sit. Et si sic consideraveris, ac deprehenderis principium morborum, nime

nunc aberraveris. * Tenesmos ubi apprehenderit, secedit sanguis, ac mu-
cus, & dolor fit in ventre inferiore, maxime ubi ad secessum devenit. Huic
conducit ventrem humectare, & pinguefacere, & tepescere. Et quæ insunt
subducere, & calida lavare, excepto capite. Soler autem hic morbus plures ci-
bos expetere. Tormenta enim, evacuato ventre a sanguine, ac mucus pertranseun-
tibus, & ad intestinum allabentibus, fiunt. Quin autem insunt cibi, minorem
mordacitatem intestino insunt. Et fit quidem ex iisdem, a quibus & dysente-
ria, verum debilius, & non lethalis,

S E C T I O II.

1 * Quum ex vino, aut a convivio bilis superne, ac inferne fluxus, aut
aut diarrhoea corripuerit, diarrhoea quidem conducit jejuniare. Et si
firmum habeat, vinum dulce dare, aut uvarum passarum dulcium recre-
menta. Ad vespertam vero danda sunt, quæ etiam his, qui a pharmaco
5 purgati sunt, dantur. Si vero non cesset, velis autem sedare, vomitum a cibo
aut lenticule decocto, facito, & confectum sursum reveilitur infernus secessus, &
si succo lentium, aut cicetum infuso elueris, etiam sic sane sedabitur. At vero bi-
lis fluxui conducit, si dolor adsit, dare quæ in pharmacis scripta sunt, sedantia do-
lorem. Venter autem ceteris tum superior, tum inferior per potiones humectan-
tes, & per balnea calida corpus mollietia, capite excepto, & sic tui vomitus pro-
clivior fit, & si liquor aliquis ingressus fuerit, ea, quæ adversantur, sursum revo-
muntur, tum infernus secessus magis prodit. Si vero evacuaveris, violentius vo-
muntur, & violentius secedunt. Ad vespertam vero dato & huic ea, quæ dari solent
ei, qui pharmacum bibit, fiunt autem & hi dolores, qui ex potationibus, aut ex
convivio oriuntur, quum cibi, & potus plus solito in ventrem ingressi fuerint, & quæ ex-
trinsecus corpus supercallescere solent, bilem, ac pituitam moverint. * Uri-
15 næ stillicidii modi quidem multi, & omnigeni sunt. Conducit autem forinsecus
quidem corpus balneo calido molliere. Intrinsecus vero humectare, alvum
quidem per cibos, a quibus fluida fiat, vesicam vero per potus, a quibus urina
20 quamplurimum diffunditur. Danda sunt & urinam cientia medicamenta, quæ
scripta sunt in medicamentario libro, sedantia dolorem. Morbus autem fit a pi-
tuita. Et quum quidem vesica siccata fuerit, aut perfrigerata, aut evaciata, do-
lorem exhibet. Quum vero humida est, & plena, aut etiam diffusa, minus: fit autem
senioribus diuturnus hic morbus, junioribus autem brevior, neutris ve-
25 ro lethalis. * Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxæ juncturam, &
summas nates, ac coxendicem. Tandem vero etiam per totum crus dolor vagatur.
Huic confert, quum dolor tenuerit, molliere in quacumque tandem cruris parte
dolor hæserit, per balnea, & tepesfactoria, ac fomenta. Et alvum subducere. Ubi
vero quieverit dolor, pharmacum dandum est infra purgans. Et postea bibat lac
asininum coctum. Doloris autem gratia dantur quæ scripta sunt in medicamen-
30 ris. Morbus hic fit, quum bilis, & pituita in sanguineam venam incubuerint
aut ex alio morbo, aut aliter quantumcumque sanguinis a pituita, & bile compactum
agglomerat. Hic enim per crus vagatur per sanguineam venam, & ubique consistit.
Ibi etiam dolor manifestus fit maxime, molestus quidem, sed non lethalis.
35 Si vero in unum aliquem locum incubuerit dolor, & consisterit, & medicamen-
tis non fuerit exactus, urito quocumque loco fuerit dolor. Urito autem lino crudo.
* Articularis morbus quum tenuerit, corripit calor, & dolor corporis articu-
los. Corripit autem acutus, & in alium atque alium articulum dolores incumbunt
tum acutiores, tum molliores. Huic conducit adhibere, qua parte dolor hæret,
frigefactoria. Et quæ insunt, ex alvo subducere per clysteres, aut glandem sub-
ditam. Ad forbendum vero, & bibendum dato quodcumque tibi conducibile vi-
sum fuerit. Quum vero dolor intus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum
daro, & post hoc serum coctum, & asinum lac. Hic morbus a bile fit, & pi-
45 tuita, quum commota in articulos incubuerint. Et brevis quidem fit, & acutus, non
autem lethalis. Solet autem junioribus magis, quam senioribus contingere.
* Podagra violentior est omnibus ejusmodi circa articulos morbis, & diuturnissi-
mus, ac ægre cedens morbus. Et est quidem hic morbus sanguinis in venu-
lis a bile, ac pituita corrupti. Quanto autem in tenuioribus fuerit venulis, &
50 in plurima corporis necessitate constitutis, & in nervis, & ossibus multis, ac den-
sis, tanto sane durabilior est morbus, & qui ægrissime depelli possit. Conducunt
autem & huic eadem, quæ morbo articulari. Et longus quidem est & hic mor-
bus, ac molestus, sed non lethalis. Si vero in digitis dolor relinquatur, venas paulu-
lum supra articuli in digito nodum inurito. Urito autem cum lino crudo.
55 * Morbum autem regium sic curare oportet. Extrinsecus quidem corpus mollien-
dum est balneis calidis. Alvus vero, & vesica humectanda, & urinam cientia
danda, quæ sunt prescripta. Si vero sortis fuerit, purgare capite, pharmacum
quoddam potandum dato, quod bilem deorsum purgat, Postea vero urinam cientibus

eibus utendum est. Morbus autem fit, quum bilis commota sub cutem vertitur: Quod si hæc noverit vir idiota, non similiter in incurabiles morbos incidere. Solent enim morbi ex parvis occasionibus magni, ac diuturni fieri. Et quicumque cibi, aut potus, aut forbitiones congrue, ac consequenter se habent, & quæcumque pharmaca doloris gratia, ea omnia sine periculo semper exhibentur, si iuxta præscriptum exhibueris. Quæcumque vero pharmaca purgant bilem, aut pituitam, in his pericula sunt, & culpe medentibus imputantur. Quammaxime igitur ea vitare oportet. Atque hi quidem sunt morbi, qui circa ventrem sunt, exceptis pectore suppuratis, & tabidis, & muliebribus morbis; hi enim seorsim describentur. * Tubercula, quæ enascuntur, omnia a pituita, aut sanguine nascuntur, quum sane a vulnere, aut casu fuerint collecta. Conducit autem horum aliqua cataplasmatibus integere, & per pharmaca in potu data diffundere. Aliqua vero impositis cataplasmatibus maturare, & diffundunt quidem cataplasmata, quæ quum calida sint, humectant, & non in se ipsa trahunt. Maturant autem, quæ calefactientia contrahunt. Quum vero aliquod lectum fuerit, aut sua sponte ruptum, pharmaco humorem repurgare convenit, ubi autem pus efflueret deliquerit, velut ulcus sanare. * Lepra, & pruritus, & scabies, & impetigines, & vitiligo, & alopecia a pituita sunt. Sunt autem talia turpitudine magis, quam morbi. Favus, & struma, & furunculi, & carbunculus a pituita sunt. Quo vero hæc depurges, pharmacis sic utendum est. Quicumque biliosi sunt, his dato ea, a quibus bilis purgatur. Pituitosis vero ea, a quibus pituita. Atrabiliariis autem ea, a quibus atra bilis. Hydropicis ea, per quæ aqua. Quæcumque vero pharmaca in potu dantur, & non purgant neque bilem, neque pituitam, ea quum in corpus ingressa fuerint, vim exhibere oportet aut frigefactientia, aut calefactientia, aut siccantia, aut humectantia, aut contrahentia, aut diffidentia.

36 Quæ vero somnum faciunt, ea quietem sanguini exhibere oportet. * Quum ad ægrotum deveneris, interrogare oportet, quæ patitur, & ex qua causa, & quot jam diebus, & an venter secedat, & quo victu utitur. Et primum considerare, an morbus a bile, aut pituita factus sit, aut utriusque. Et hoc probe nosse convenit, quod necesse est, ut ab altero horum, aut utrisque fiat. Deinde utrum siccitate, aut humiditate opus habeat. Aut aliquæ quidem partes corporis siccitate, aliquæ vero humiditate. Postea an morbum sursum purgare oportet, aut deorsum, sive per vesicam. Et an angelicis morbus, aut marcescit, & an solvitur, aut in alium transiit. * Vulneratos fame affligito, et ex alvo, quæ insunt, subducito aut per clysterem, aut pharmaco infra purgante exhibito, et in potu dato aquam, aut acetum. Aut forbitiones præbeto. Inflammata cataplasmatibus frigefacito. Talia vero cataplasmata sint aut betæ coctæ in aqua, aut apium, aut oleæ folia, aut scii folia, aut rubi, aut quercus, aut mali punice. Atque his coctis utendum est. Crudis vero rhamni foliis, aut viticis, aut salviz, aut richymali. Aut pulegium viride, aut porrum, aut apium, aut coriandrum, aut isatidis folia impone. Si vero nihil horum habueris, neque ullum aliud cataplasma, potentiam aqua, aut vino subactam imposito. Tanto autem tempore hæc cataplasmata profunt, quanto frigidiora fuerint, quam ulcus. Quum vero fuerint calidiora, aut similiter calida nocent. Pingua tota ad inflammata non conducunt, neque ad ea, quæ non sunt purgata, neque ad putrescentia. Sed ad inflammata conferunt frigida. Et ad impurgata ac putrescentia, acria faciunt, et quæ mordacitatem aliquam inducentia purgant. Ubi vero carnem producere voles, pingua, et calida magis conducunt. Ab his enim caro pulsat.

38 * Quibuscumque cibis, aut potibus homines sani in victu utuntur, ex his oportet præsentibus uti ad ægrotos, ita ut præpares calidos et frigidos, et humidos, et siccos. Et frigidis quidem calidos, et calidos ex non calidis, et siccos ex non siccis, et reliquos iuxta eundem modum. Neque vero de præsentibus desperare oportet, tanquam nihil possint, et absentes querere, qui nullam utilitatem ægro afferant. Comperies autem, si recte consideraveris, extra hos, paucos quibus ad ægrotum utaris. Sorbitiones autem in morbis omnibus dato, aut piscinam, aut milium, aut farinam, aut alicam. Et quæcumque ex his dederis ad secessum, tenuia dato, et magis percocta, et dulciora potius, quam saliosa aut calidiora. Quæ vero ad robur, aut resuscitationem, crassiora, pinguiora, et moderate cocta. Potibus autem utendum est, si quidem alvum, et vesicam subducere velis, vino dulci, aut aqua multa. Si vero adstringere, austero, albo, tenui. Si corroborare, austero, nigro. Qui vinum bibunt citra affectionem erga ipsum, his dandi sunt potus, qui præparantur, et in medicamentario libro scripti habentur. * His, qui medicamentum biberunt, post purgationem detur, febrientibus quidem, aut lenticula, aut milium tenue, aut piscinæ succus. Danda est autem piscina, et milium, velut quæ levia sint. Alia vero velut omnium robustissima. Et farina velut his robustior. Lenticula autem odorata præparetur, et modica secundo loco detur, ut quæ levis sit sorbitio, et stomacho grata sursum versus. Ammisceatur autem aut sal, aut mel, et cuminum, et oleum. Ad lenticulam vero ammisceatur pulegii herba, et parum aceti. Non febrientibus autem, panis puri medullam in jusculum interposito, aut mazam et frustum picis dato, aut oviculæ teperrimæ carnem, aut vo-

- Iucri, aut catuli coctam. Febricitibus autem etiam betam dato, aut cneurbizam, aut blitum. Et post cibum bibant vinum vinosum, vetus, album, quamaquosissimum. Quibus lavari non conducit, ungantur vino, & oleo calido, & alternis extergantur. * Quum alvum debilis, a cibis humectare volueris, mazam dato, & obsonia. Et minorum quidem piscium frusta cocta cum iunio, carnes autem ovicula tenerimam, aut hedi, aut catuli, aut volucris coctas. Et betam, aut blitum, aut rumicem, aut cucurbitam, si tempus tulerit. Ex oleribus vero apium, & anethum, ac oecumum, & vinum mellei coloris, vetus, album item, ac aquosum.
- 135 Quum vero siccare volueris corpus, panem, dato, & obsonia asla, & siccata, & hac omnia calidiora, & carnum partes carnosas, pisces, petrosos, olera, rutam, aut thymum, aut origanum. Vinum vero nigrum austrium. Præparentur autem obsonia cum sale, & cumino. Aliis vero conducuntis parcissime utendum est. * Quum autem ex morbo refocillare volueris, alia quidem eadem dato, quæ
- 140 exhibes, quum ventrem humectas. Verum pro lactentibus carnes fortiores, & pro catulis, volucrum, ac leporinas, & ex his aliquas assatas tum de carnis, tum de piscibus, & quamoptime præparatas. Quibuscumque morbis siccas conducit, his semel in die cibum exhibere expedit, & cibos, ac potus pauciores dare, quam ut replentur, & hos laboribus, ac deambulatione perficere, & quamminimè dormire. Quibuscumque vero humiditas conducit, his expedie inediam non ferre, & cibi, ac potus non indigos esse, neque laborare, & dormire, quantum voluerint. * Quoscumque cibos, aut obsonia, aut potus aegroti concupiscunt, exhibito, si non corpori damnum inde accessurum est. Quum aut cibos, aut potus augere inceperis, aut detrahere, paulatim & additiones, & subtractiones facere oportet. Quoscumque cibos sufficientes perficere possint, his forbitiones ne dederis. Excludunt enim cibum. Qui vero non possunt, his dato. Si vero quid dare volueris refectionis gratia, aliam dato, & pristinam triceam. Hæ enim forbitiones sunt fortiores. Dantur autem post cenam. * Pharmaca, quæ potantur, & quæ ad vulnera adhibentur, discere oportet, omnibus enim hoc expostum, ac proclive est.
- 155 Non enim ex intelligentia homines hæc reperiunt, sed potius ex fortuna. Neque artifices magis, quam idiotæ. Quoscumque vero in arte medica intelligentia discuntur, & reperiuntur aut de cibis, aut de medicamentis, ea ab his, qui discere possunt, quæ in arte sunt, discere oportet, si quid discere velis. * Post forbitiones cibum debilibus dato, & vinum vinosum insuper bibendum. Ante cibos vero, & potus, aut forbitiones, & postea & cibum, & potum, quoscumque tandem tibi videbitur, debilibus exhibeto, ita ut & corpus, & animam inspicias. Sic enim maxime profueris. Quam facultatem singuli sibi habeant, conjectare oportet ex his, qui vim manifestam faciunt. Quoscumque statum, aut morbum, aut repletionem, aut rictum faciunt, aut tormen, aut secedunt, aut non secedunt, hi manifesti sunt, quod hæc operantur, & ex his etiam alios considerate oportet. Habent enim singula edulia, & quo profiunt, & quo ledunt. Verum alia manifestissime operantur, quæ operantur, alia vero obsecutis. Cibi, & obsonia præparentur, ac exhibeantur debilibus, a quibus neque status fit, neque tictus acidus, neque tormen, & quæ neque valde per alvum secedunt, neque valde resiccantur. Hæc autem sic sunt. Quoscumque quidem venter superat, & corpus ipsa suscipit, ea neque statum exhibent, neque tormen. Si vero venter non superat, ab his & status, & tormen, & alia huiusmodi sunt. Levissima sunt cibaria, & potus, ac obsonia, quæ moderata in corpus ingesta, aut paulo amplius supra modum, neque repletionem exhibent, neque tormen, neque statum, neque aliud quiddam ejusmodi, & celerissime concoquuntur, & concocta secedunt, & per omnem diem in ventrem ingesta, minime molesta sunt, etiam si diu antea fuerint ingesta. Gravia autem sunt, quæ moderata exhibita, aut infra modum repletionem, & dolorem exhibent, & quæ neque dari, neque edi, neque bibi possunt, ut non dolorem exhibeant. Et si quis ipsa per tempus rursus bibat, aut edat, etiam sic dolorem exhibent, & non pro ratione secedunt. Ad sanitatem optima sunt, quæ modice ingesta, sufficiunt, ut & famis, & sitis sint medela. Et plurimo tempore corpus ipsa suscipit, & pro ratione secedunt. Ad robur autem optima sunt, quæ carnem plurimam, ac densissimam producant, & sanguinem crassificant, & pro ingrossum ratione secedunt, & corpus plurimo tempore ipsa suscipit. Pinguis, & caseosa, & mellita, & ex sesamo parata, rictum acidum maxime faciunt, & bibi fluxum superue, ac inferne, & tormen, & statum, & repletionem. Hoc ipsum etiam contingit, quum quis plura edeat, aut biberit, quam venter concoquere possit. Debilibus si quidem pro ratione, ac corporis ratione dederis, quoscumque tandem dederis, consumit hæc corpus, & neque indigum est, neque repletum. Si vero abetraris a temporis occasione, detrimentum in utraque sequitur. Quoscumque cibaria, aut potus, aut obsonia corpus suscipit, ab his maxime neque tormen fit, neque status, neque rictus acidus. Quum enim in ventrem ingesta fuerint, corpus ab ipsis trahit, quod ipsi commodum est. Et necesse est iam, quod restat, debilius esse, quam ut tormen, aut statum, aut aliud quid huiusmodi in ventre faciat. Vina dulcia, & austera, & mellei coloris vetusta, ventrem subducunt, maximoque
- 165 urinam cient, ac nutrant, & neque statum exhibent, neque tormen, neque repletionem.

nem. Carnes percoctæ, & exallatæ; utraq; debiles sunt ad robur augendum, ad secessum vero percoctæ commodæ sunt; allatæ vero magis sistunt. Quæ vero moderatam habent & cocturam, & assaturam, hæc & ad robur, & ad secessum moderate se habent. At vero crudiores ad robur quidem commodæ sunt, sed non ad secessum. * Ex cibis, ac potibus, qui commodissimi sunt corpori, ac maxime sufficientes & ad alimentum, & ad sanitatem, ex his ipsis etiam, ubi quis ipsis non in tempore utatur, aut pluribus quam tempestivum est, & morbi, & ex morbis mories sunt. Reliqui vero cibi, ac potus, qui talem vim non habent, parum utilitatis asserunt, etiam si quis semper ipsis in tempore utatur, parum autem etiam lædunt. In utramque enim partem debiles sunt, ut & boni aliquid faciant, & mali. Sunt autem cibi, & potus, qui hanc vim habent, hi: panis, maza, carnes, pisces, vinum, & ex his alii magis, alii minus. Quicumque ex sicco victu vivunt, his non cum cibo potus datur, sed post cibum, multo tempore interposito. Et sic quidem siccus humor a siccis cibis ortus, corpus siccatur. Si vero quis simul cum cibo bibat, cibus humidior factus, corpus humidius facit. Panis calidus, & carnes calidæ, ipsæ per se comedæ siccant. Si vero cum liquore dederis, aut statim a cibo potum præberis, non siccant. Panis putus ex fatinis ad robur, ac refectorem commodior est, quam qui non est ex tenuibus farinis paratus, & recens utilior est, quam vetus, & ex farinis recentibus melior, quam veteribus. Polenta ex hordeo non madefacta, sed circumcirca conspersa, ac decortico, fortior est, quam madefacta, & recens, quam vetusta. Et maza prius subacta fortior est, quam non subacta. Vinum diffusum, ac perfrigeratum, & excolatum, tenuius fit, ac debilius. Carnes coctæ, si quidem percoctas feceris, debiliores sunt, ac leviores. Allatæ vero, si exallatæ fuerint, & inveteratæ ac aceto, aut sale, debiliores sunt, & leviores recentibus. * Debiles, ac leves cibi ventrem quidem non lædunt, neque corpus, eo quod calefacti non intrinsecant, neque replent, sed cito mollescent, & concocti secedunt. Humiditas autem ab ipsis debilis corpori accedit, & neque augent, neque robur memorabile exhibent. At fortes cibi et intrinsecant, ubi in ventrem ingesti fuerint, et replent, et difficilius quidem, ac tardius concoquantur, et non secedunt. Verum humor ab ipsis fortior, ac incorruptus accedens, multum robur, ac augmentum corpori addit. Ex carnibus levissima sunt in corpus, canine, et voluerum, et leporinæ coctæ. Graves autem sunt bubulæ. Et porcinæ moderatores, statim autem faciunt et coctæ, et assatæ. Et sanis autem, et debilibus conveniunt ovillæ. Syllæ vero his, qui laborant, et exercitantur, et ad bonum habitum, et ad robur commodæ sunt. Debilibus autem, et privatam vitam degentibus, fortiores. Sed et ferinæ mansuetis leviores sunt, eo quod fructum non similem edunt. Differunt autem et pecorum carnes, et eorum, quæ fructum edunt, et quæ non edunt. Et fructus non idem in omnibus facit, sed partim densam, ac sortem victuæ carnem efficit, partim raram, et humidam, ac debilem. Ut in summa dicam, pisces leve sunt edulium et cocti, et assati, et ipsi per se, et cum aliis cibis. Ipsi vero inter se ipsos sic differunt: Stagnorum pisces, et epungues, et fluviatiles, graviiores sunt. Littorales autem marini, leviores. Et percocti assatis sunt leviores. Ex his itaque fortes dato, ubi reficere aliquem volas. Leves vero, ubi gracilem, et tennem facere oportuerit. * Balneum calidum moderatum quidem molit, et augeat corpus. Quod vero opportunum modum excedit, siccas quidem corporis partes humectat, humidam vero resecat. Et sicca quidem humectat debilitatem, et animi deliquium exhibent. Humide vero siccant liquiditatem, ac sitim. * Ex oleribus allia et cocta et assata utinam cient, et per alvum secedunt, et ad menses muliebres conducunt. Cephæ ad urinas commodæ sunt. Succus enim acrimoniam quamdam exhibet, ut secedat. Arque his quidem sic utendum est, sed debilibus non exhibenda. Apium et coctum, et crudum urinam cient, et palustre magis quam fativum, quod etiam majorem vim habet. Coriandrum stomacho gratum est, et per alvum secedit tum coctum, tum crudum. Ocimum et humidum est, et frigidum, ac stomacho gratum. Porro coctum quidem urinam cient, et secedit. Crudum vero æstuosum est, et pituitosum. Malum punicum reficit, et pituitosum est, et cum nucleo quidem alvum sistit. Citra nucleum vero secedit. * Calidi cibi, siccis quidem sistunt, humorem enim in ventre resicant. Si vero humidi sunt, humectantes per caliditatem, alvum subducunt. Acerba siccant, et contrahunt corpus. Habent et vim sistendi. Acida attenuant, morsum inducunt. Salia secedunt, et urinam cient. Pinguis, et dulcia humiditatem, et pituitam exhibent. Resiciunt cucutbira, et beta, et blitum, et rumex, et per humiditatem secedunt. Brassica vero acrimoniam quamdam habet ad secessum, et simul boni succi est. Cakes, et scellum, et uva passa resiciunt, et pituitosa sunt. Vinum dulce, et mellis speciem referens, ambo et resiciunt, et urinam cient, et pituitosa sunt. * Austera vero ad robur, et siccitatem commodæ sunt. Urina etiam cient etiam austera vetusta, quæ alba, et tenuia existunt. Oleum, et quæcumque oleosa resiciunt, et pituitosa sunt. Ex oleribus coctis secedunt, quæ ex natura humidissima, aut acerrima sunt, aut caliditatem habent. Danda autem sunt hæc tepidiora, ac flaccidiora. Sic enim ad secessum commodant. Cucumis pepo et urinam cit, et alvo secedit, ac levis est. Alter autem pepo frigiditatem quamdam exhibet, et sitim sedat. Alimentum vero

- 265 a neutro horum contingit, nisi tenue quoddam. Sed neque malum, neque memorabile. Mel cum aliis quidem comestum, & nutrit, & bonum colorem exhibet. Ipsum autem per se ipsum attenuat magis, quam reficit. Nam & per urinam, & per secessum plus iusto expurgitur. Urinam cientia in ventre & cito calefiunt, & calefacta marcescunt, ac liquefunt, & ob id citum secessum faciunt. Stabiles autem, ac alvum
- 270 sistentes cibi, & calefiunt, & calefacti cito reficcantur, ac compinguntur, & propter ea obduri facti, non secedunt. Quæ per alvum secedunt, suceola sunt, & natura calida. Quæ vero urinam cient, sicca, & frigida. Frumentum, & vinum differunt quidem & ipsa inter se ipsa ex natura, tum robore, & debilitate, tum levitate, ac gravitate. Differt etiam locus a loco, ex quo illa fuerint. Est enim alius aquosus,
- 275 alius aquarum inops, & apricus, & umbrosus, & bonus, & malus. * Quare omnia 51 hæc ad hoc conferunt, ut singuli cibi aut fortiores sint, aut debiliores. Quicumque sane panem comedere soliti fuerunt, his dandus est & in morbis. Quum quis cibos, aut potus plures solito acceperit, si non solito more perfecerit, optimum est, ut statim reymat. Poma, & fructus arborei tum molles, tum duri corticis propter
- 280 ea post cibum molestiora sunt & sano, & debili, quia corpus ejus, qui cibum sumpsit, solum ab ipsis humores trahit. Si vero jejunis quis edat, plures. * Quicumque 52 cibi aut statum, aut æstum, aut morsum, aut repletionem, aut tormen faciunt, a talibus liberat vinum meracum insuper potatum. Corpus enim a vino calefactum, per calorem amovet ea, quæ insunt a cibis, & potibus, ac similibus. Venter aliquando perturbatur, aliquando sistitur, aliquando etiam pro ratione secedit. Cur autem hæc sic se habent? primum quidem venter, quum humidior fuerit, & quum siccior, susceptum cibum corrumpit; deinde quum imputatio facta fuerit live ex frigore ad caliditatem, live ex caliditate ad frigiditatem, inde corrumpit. Quare necesse est ventrem ab iisdem cibis, ac potibus propter hæc ipsa, & molliorem facias, & duriorum. Cibariorum, et potus, et obsonia, excepto pane, et maza, et carnibus, et piscibus, et vino, et aqua, reliqua omnia tenues, ac debiles utilitates exhibent ad augmentum, et ad robur, et ad sanitatem. Tenuia item, ac debilia mala ab ipsis sunt. Quoscunque ægrotos febres non continenter detinent, sed intermittentes corripiunt, his cibi dandi sunt post apprehensionem, ita ut coniecturam facias, ne febris a recens accepto cibo irruat, sed cibis jam concoctis. Vinum, et mel optima judicata sunt in hominibus, si juxta naturam et sanis, et debilibus cum temporis opportunitate, ac medicocritate exhibeantur. Et bona quidem sunt ipsa per se ipsa. Bona vero etiam permixta, et tum alias, tum quæcumque memorabilem utilitatem habent. Quicumque sanis commoda sunt, ea etiam ægrotis exhibita fortiora sunt. Et oportet derratio ipso rum vigore ea dare, alioqui non feret ipsa corpus, sed magis lædunt, quam profunt.

H I P P O C R A T I S C O I

LIBER DE INTERNIS AFFECTIONIBUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 De pulmonis arteria fauciatæ, & ejus causa, nota, curatio. Quæ vitanda, ubi convalescit.
- 2 De arteria læscinata, & ejus notis, & curatione.
- 3 Pelloris suppuratio. Pulmone rupto, multi vitam degunt, donec moriantur.
- 4 De pulmonis affectu, pneumoniæ, & ejus notis, & curatione. Lac bubulum, caprinum, æsinum, equinum.
- 5 De pulmonis varice, nota, & curatio. Cyceon, poculum ex herbis, melle, vinoque temperatum.
- 6 De vendis per pulmonem tendentibus, sanguine, aut atra bile plenis, & ejus nota.
- 7 De pulmonis inflammatione, causa, notis, ac curatione. Caprinum, & anguillarum piscium pinguedo pessima. Putio vomitum cians.
- 8 De pulmonis erysipellate, nota, & curatio.
- 9 De pectoris, & scapularum scissuris, & earum causis, notis, curatione. Adorbi re-
verentes periculosiores.
- 10 De tuberculo, phymatere collarum, & ejus notis, & curatione.
- 11 De tabe, & ejus causa, ejus nota, & symptomata, curatio.
- 12 De tabe altera, & ejus causis, & notis, & curatione.
- 13 De tabe tertie, hoc est spina dorsi, & ejus causa, nota, & curatio. Pituita hydropiformis. Castoreus verus caprinus.
- 14 Quæ de causa spina medulla succescat, & quæ ejus nota. Crura tumida velut ab aqua inter cutem, & quæ ejus medela.
- 15 De quatuor renum affectionibus, atque primum de calculo. Adscicorum error in renum dolore, cum lapidem in vesica (qui in rene est) esse existimus, quæ ejus curatio.
- 16 De altera nephritide, & ejus causa. Sanguinis cum urina mistio. Tabes renalis ex nephritide.
- 17 De tertio renum morbo, seu nephritide, & ejus causa. Urina sacco carniū bubularum asatarum similis, & ejus nota.
- 18 De quarto renum morbo, & ejus causa, & nota. Pedes, & tibia semper frigida. Urina subsidentem crassam, aut subsistentem, vel

vel albam, ut farina habens. *Curatio.* Vilius ratio describitur. *Obscurae pinguis-*
ma, & dulcis.

- 19 De atroci morbo venarum, nephritideve super-
veniente, causae, notae, curatio. Quo-
modo quaeque videntur.
- 20 De rena levi laborante, causae, notis, cura-
tione, & remedio.
- 21 De pituita speciebus aliquot, & eorumdem
curatio, & primum de popularis cura-
tione. Ficus, cisti postrema mensa sumantur,
postremo tamen omnium evanescunt.
Panis cibarius quid.
- 22 Pituita in ventre molestantis, per clysterem
curatio.
- 23 De pituita antiquiore, seu alba, & eius no-
tis, & curatio.
- 24 De aqua inter catem, quomodo expituitagi-
gnatur, & eius notis, causis, curatio.
Tumor in seroto ex aqua inter catem.
- 25 De aqua inter cutem aetatis tempore ex aqua
pota nata. Aquam inter cutem etiam a tu-
berculis fieri, & de eius signis. Aqua e
ventre hydropicorum per fistulam emissio.
- 26 De aqua inter cutem ab hepate nata, & e-
jus causis, notis, & curationibus. Vi-
num mendacium. Hepatis ab aqua inter cu-
tem laborantis, per singulos usus.
- 27 Alia intercutis in ventre rupta. Aqua e ven-
tre per ferri usum emissio.
- 28 De aqua inter cutem a splene nata, notis,
causis, & curatio. Lienis ab aqua inter cu-
tem laborantis, per singulos usus. Salsamentum gaditanum,
aut saperda. Vinum Comum.
- 29 De aqua subter cutem, per aetatem desatiga-
tione itineris, & aqua caelestis potu nata,
& eius notis, & curatio. Fomenta hu-
mida ante pharmaca.
- 30 De morbo hepatico ab atra bile, & eius no-
tis, & curatio. Potio ex ovi gallinaei
liquore. Vomitus morientia in morbo hepa-
tico.
- 31 De secundo ictericis morbo a bubula carnis
essa, & vini potu nimio, & eius notis.
Bilis pallida in morbo hepatico vomitus,
eius nota, & curatio. Usus hepatico-
rum per fusos buxos descriptio.
- 32 De tertio ictericis morbo, & eius curatio.
- 33 De primo splenis morbo, bile a sole commota,
& in ipsam attrita, & eius curatio.
Vinum Comum. Proxima sunt, quae cruda
eduntur, Splenem attenuantia.
- 34 De alio lienis morbo, & eius causis, & no-
tis, & curatio. Ex aere male olentes,
gingivae olentes, & a dentibus disceden-
tes. Ulcera ex tibialis erumpentia.
- 35 De tertio lienis morbo, qui verno tempore a
sempine fit, eius nota, & curatio. San-
guinis ab interna cubiti sinistri vena de-
tractio.
- 36 De quarto lienis morbo. Splenis usus.
- 37 De quinto lienis morbo, autumno ab atra bi-
le nato.
- 38 De morbo regio primo, qui, bile commota,
aetatis tempore maxime corripit, & eius

signis, & curatio.

- 39 De alio morbo regio, sive arcuato, qui hye-
mis tempore, & ex rigore corripit, & e-
jus curatio.
- 40 De alio morbo regio, qui popularis dicitur:
fit autem a repletionem maxime, & chre-
tate.
- 41 De quarto morbo regio, qui a pituita, hye-
me autem maxime corripit.
- 42 De typho, seu stupore attonito, & eius cu-
ratione. Listerium frigida tinctorum usus.
- 43 De alio typho, & eius notis, & curatio.
- 44 De tertio typho, cum bilis patrefacta, am-
mixta fuerit sanguini per venas, & cir-
culari; eius notis, & curatio.
- 45 De quarto typho. Mel collum asinum est,
& ventri adheret.
- 46 De quinto typho, ab humore in corpore pa-
trefacto, & eius notis. Coloris in typho
nigri causa. Adustas a stragulis venari.
Lucerna extincta odore delectari. Geni-
turam per somnium, & inter eadem ef-
fundentes.
- 47 De volutulo, sive illo, & eius causis, &
notis. Cuius color plumbiformis, & eius
curatio. Tardicala.
- 48 De alio volutulo arcuato, qui maxime aetatis
tempore in regionibus palatris corripit.
Capit ex tetragono medicamento pur-
gatio.
- 49 De volutulo hamatite, seu sanguineo. Os
male olens a dentibus. Gingivae disceden-
tes.
- 50 De morbis crassis. Rabores in lateribus. Ca-
pillorum in morbis crassis desiccium. Capiti-
tis catir crassa, ac rubicunda, & eius cu-
ratio. Scorum in morbo crasso suberuentum,
ac sublivendum per sanum ciacelatatum.
- 51 De altero morbo crasso. Resimula buccenda
in morbo crasso. Alentis abalientatio unde, &
eius curatio.
- 52 De alio morbo crasso a pituita patrefacta,
& eius causis, & notis, & curatio.
Capitis per tetragonum purgatio.
- 53 De quarto morbo crasso, a pituita alba fa-
cies intumescent. Terra odorem ex imbr-
bus irruentibus non sentiens.
- 54 De coxendicis morbo a sole. Hamores in ar-
ticulis ressecati candescunt, ac coarctan-
tuntur. Claudi a coxendicis morbo a so-
le nato.
- 55 De coxendice a bile contracto.
- 56 De coxendice a pituita excitato.
- 57 De coxendice a sanguinis humore creato. Un-
de in poplitibus scissio.
- 58 Coxendicis cartilago intus concretas, & arti-
culi coagulati claudicationis causa.
- 59 De tribus coxendicibus, seu tetragoni speciebus,
& eius notis. Cibi, & potus interdum per
nares rejiciuntur, curatio. Aqua tepida
mussa per nares infusio.
- 60 De tensione in posteriora, quam opisthoracum
vocant, & causa, & notis.
- 61 De tertia convulsione, tensioneque, & causis,
& notis, & curatio.

S E C T I O I.



- I pulmonis arteria fuerit exulcerata, aut aliqua tenuis venula
ex his, quæ in pulmonem dependent, rupea fuerit, aut aliqua fi-
stula ex his, quæ per pulmonem distentæ sunt, & alia in aliam
distracta fuerit, & sanguine fuerit impleta; distrahuntur san-
ne, ac rumpuntur ob has maxime causas, propter laborem, pro-
pter cursum, ob casus, ob plagas, ob vomitus violenter fien-
tes, ob febres. Hæc igitur patitur. Primum quidem tussis sicca
obtinet. Deinde paulo post expuit salivam suberuentam, aliquando autem puram.
Et si quidem hic brevi a morbo liberetur, sanus est; si vero non, temporis progressu
sanguis amplior prodit, aliquando purus, & aliquando etiam subputridus. Sepe
vero etiam fauces non animadvertentibus sanguine implentur. Postea sanguinis
grumos paulatim, & frequenter emergentes reiciunt. Aliquando vero etiam graveo-
lencia ab ipsis contingit, & fauces aliquando spuma quadam replentur. Et rigor, ac fe-
bris apprehendit circa initia quidem morbi vehementer, in progressu autem, debilius,
& alias acque alias corripit, & dolor quandoque in pectoribus insitus est, & in dor-
so, & in lateribus. Et ubi sanguinem spuerit desierit, salivam multam liquidam expuit,
quandoque vero etiam viscosam. Acque hæc quidem sic patitur, donec quatuordecim
dies præterierint. Post hos vero, si non deliverit morbus, squamas ab arteria tuf-
sifendo avellit, quales a pustulis decedunt, & dolor incidit in pectus, & in dorsum,
& in latus, & præcordia contingens, velut ulcus dolet. Huic conducit, ut quamma-
ximè quietem intus habeat, si morbus sic se habuerit. Si enim quid laborarit, & dolor
acutior, & tussis magis, quam prius premit, & rigor, ac febris magis occupat. Et si ster-
nuerit, dolor acutus irruit. Dolet autem & in lecto, quum se circumvertit. Huic ci-
bos quidem eisdem, quos & pectore suppurato, exhibere oportet, verum hos non
multos. Ex obsoniis autem his utatur. De piscibus quidem, squarina, aut pagro, aut
galæo magno albo, aut aliis similibus, omnibus cum rhoe, & origano conditis. Car-
nem autem edat galli assatam, sine sale, aut capræ coctam, & vino austero vetustis-
simo, ac jucundissimo nigro utatur. Deambulationibus autem moderatis. Verumtamen
hæc fiant, febre non tenente. Si vero febris tenuerit, sorbitionem farinæ, aut milii
utatur. Si vero cibos assumat, paucos assumat, & obsonia per alvum secedentia.
Et si pharmaco tibi utendum esse videbitur, enidio cœoco, aut tithymalide ipsi-
um subpurgato. Et post purgationem, farinæ coctæ pinguis heminam absorbendam da-
to. Deinde quammaximè reficito, ut quamminimè tenuis sit. Ad huiusmodi enim
morbum non conducit tenuem esse. Deambulationes etiam primum paucas faciat, ut
ne lassitudo succedat. Fomentum vero alias atque alias adhibeatur. Et quæ die so-
mentum adhibetur, sine cibo sit, excepta farina cocta, cuius heminam absorbeat. A-
quam autem bibat. Postera die minus, quam solitus fuit, edat, & bibat vinum nigrum, ju-
cundum, austerrum, modicum. De cætero vero his, aut ter in die cibi dentur. Sic au-
tem huic paulatim dato, donec ventrem confirmaveris. Nam ex febris, & inedia si
us quidem appetiverit, venter autem suscipere voluerit, ubi acervatim suscepit, in-
flammat. Quare paulatim dare oportet. Si vero acervatim dederis, & parum la-
borarit, deambulationibus venter non perfrigeratur, nimirum cibus quiete compa-
ctis. Quare etiam febris succedere solet, & hyeme quidem minus, æstive vero peri-
culum est, ne delinquat. Hunc quammaximè tescere oportet, quo quamcrassissimus fiat, &
deambulationibus moderatis utatur, & minus solito luctetur, & parum laborei pri-
mum, deinde amplius, nunquam autem multum; hæc si lecerit, celerissime sanus erit.
Si vero tenuis fiat propter laborem, remittat, ac quietem agat. Hic ubi sanus fuerit,
neque ad ventum celeriter cutrat, neque equum, neque currum conscendat. Vitet etiam vo-
ciferationem, & iracundiam. Periculum est enim, ne morbus revertatur. Quare hæc
omnia vitare oportet. Si vero cibum averteretur, ervum torreto, & corticem depurga-
to, deinde per triduum in aqua inacerato, singulis autem diebus aquam diffundito, &
aliam affundito. Postea quarta die excolato, ac rescicato, deinde tenuissime moli-
tum cribrato. Et lini semen tostum undato, ac terito. Et sesamum rostum undato, ac
terito. Et plentiam non falsam, puram, tenuem accipito. Et ervi quidem, ac polentæ,
amborum æqualis sit mensura; sesami vero tertia pars; lini vero d media unius par-
tis. Hæc in lacte caprino cocta quamliquidissime absorbeat. Postea vero in pran-
dium ipsi dentur cibi puri, & obsonia fortiora. Vinum autem idem bibat. Dato au-
tem ipsi & centaureæ radices, ad has rupturas facientes, in vinum ipsas detradens, dato
item draconitii radices in vinum detrasas. Sed & tussis gratia, draconitium dera-
limum in melle delingendum dato. Et si decoctum in lacte asseverarit se forbere non posse,
lac bubulum quamplurimum bibat, tertia parte aque multæ ammixta. Acque sic celer-
issime sanus erit. Morbus autem curatione multa opus habet. Est enim difficilis. Si e-
nim curatus, & sanus factus non se ipsum custodierit, plerisque revertens morbus in-
terioris causa fit. Hic si quidem ab hac curatione sanatus fuerit, sanus est; si minus,
ipsam lacte crassifacium, & in pectore, et in dorso urito. Si enim succellere istius

- 2 fugae morbi spes est. * Si vero arteria convulsa fuerit, aut aliqua vena ex his, quæ ad pulmonem tendunt, hæc paritur. Ab initio quidem morbi tussis acuta obinet, & rigor, & febris, & salivam expuit multam, albam, & spumofam, aliquando vero subcruentam, & dolor caput, ac collum detinet. Hic morbus fortior est priore, & usque ad decem primos dies talia patitur. Postea plerique undecima die pus crassum violenter expu-
70
nunt. Decimaquarta vero die puriora expuit, si evaserit, & dolore minus vexatur, & brevi sanus fit. Si vero morbus diuturnus futurus est, tunc & pus multo amplius expuit, & reliquus dolor multo amplior in corpore inest. Calores autem debiliores habent, quam prius. Hunc si a principio acceperis, infra subpur-
gatq. scammoniae succo, si non febricitatur. Post purgationem autem accipiat ea, quæ prius, & alia eadem assumat, quieto quammaxime corpore, & moliter cubet, & hæc
3 quidem ab initio faciat usque ad decem dies. * Si vero pectore suppuratus fiat, eadem quæ etiam prius faciat. Si vero sanus fiat, ab his cibis, ac potibus abstinere oportet, ab acidis, & acris, & salis, & pinguis. A labore item, ac infemia, a quibus prior, abstineat. Hæc si fecerit, celerrime a morbo liberabitur. Si vero quid horum non fecerit, rursus reverbis morbo periclitabitur, & morbus pejor erit. Nam multi rupto pulmone vitam degunt, donec moriantur. Hunc si non statim quis curet, recidivante morbo, postea non habueris, quo prodesse possis, nisi hæc feceris. Lacte bubulo crassifacrum, in pectore, & dorso icto. Si enim nifi successerit, proderis. Morbus autem hic ex isdem delictis fit, ex quibus etiam prior. * Pneu-
4 monis, sive pulmonia ab his maxime fit. Quum pulmo sanguinem in se ipsum traxerit, aut pituitam fassam, & non rursus dimiserit, sed in ipso coacta, ac compacta fuerint, ab his tubercula fieri solent in pulmone, & suppurari. Hic autem hæc paritur. Ab initio, & per totum morbum tussis acuta obinet. Et rigor, & febris, & dolor in pectoribus, & in dorso incumbit. Aliquando etiam in latere, & erecta cer-
80
vice spiratio vehemens incidit: hic usque ad quatuordecim dies talia patitur, sæpe vero etiam plures. Deinde erumpit pus, & multum expuit. Sæpe vero etiam velut araneorum tunicas expuit. Sæpe etiam subcruentum. Et si quidem depurgatus fuerit, & brevi gracilis factus pulmo, interitum effugit. Si vero non adhæret, & per annum morbus tenet, et transmutatur, ut alias alia aeger patiatur, huc in principio, an-
95
tequam pus erumpat, hæc adhibere oportet. Quum sebris remiserit, multa calida lavetur, et forbitionibus multis utatur. Prisanæ succum coctum, melle ad coctum affuso, forbeat. Et vinum bibat dulce album, aut aquam muscam coctam. Quum vero pus expuere inceperit, eadem bibat, quæ prior suppuratus, et cibis, ac potibus, et obfoniis isdem utatur, abstinens ab acidis, et acris, & salis, ac pinguis. Et a vene-
100
nere, ac ebrietatibus, nisi morbo commodum fuerit. Ex coloris autem inspectione aestimandum est, qualibus opus habere videatur. Reliqua vero eadem faciat. Bibat etiam lactebubulum, ac caprinum pro tempore, prius autem subpurgetur lacte asinino cocto. Bibat etiam equinum lac excolatum quotidie mane, poculi tres heminas continens mensura, si læcere poterit. Si quidem igitur sic curatus melius habebit, satis est, & si
105
non eruperit pus in pectus, ipse se ipsum curet, quietem quammaxime corpori exhibens, & quæ commoda sunt, tibi ipsi exhibens. Si vero erumpat pus in pectus, quæ parte tibi significationem de se præbere videbitur, illic maxime sectione, aut unctione facta, pus emitto modicum primum. Reliqua vero eadem facito, quæ & in priore
5 suppurato facto descripta sunt. * Si in pulmone varix fiat, tussis sicca corrumpit, & rigor, & febris in principio quidem morbi valde vehementer, habet etiam erecta cer-
110
vice spiratio, & dolor in capite consistit. Et supercilia impendere videntur, & tumor in faciem descendit, & in pectus, & in pedes. Sæpe vero etiam in capite innotuit, & præ dolore, ubi i. vexat, respicere non potest, & corpus subpalidum est, & ve-
næ per ipsum tendunt flammæ, aut nigræ. Huic, quum sic habuerit, & dolor maxime premit, primum sanguis detrahatur. Deinde multa calida lavato. Et ubi sitis habuerit, cyceonem in vino nigro austero quamviscundissimo, aequali mensura a-
quæ mixtum, bibendum dabo. Frigidum autem maxime bibere oportet. Sorbitionibus autem utatur prisanæ succo cocto, melle bono affuso. Hæc exhibere oportet in primis quatuordecim diebus. Si vero diutius morbus teneat, & dolor
120
amplior fuerit in corpore, & impotentia aderit, huic sic habenti eadem exhibe-
re, quæ ei, qui pulmonem suppuratum habet, ubi quatuordecim dies præterierint. Hic morbus fit a labore, & atra bile. * Quum venæ cavæ per pulmonem tenden-
6 tes, sanguine, aut atra bile impleatæ fuerint, venulæ aliæ in alias rumpuntur, ut quæ in angustis sunt conclusæ, & exitum non habeant, & dolore exhibent, ac statim in pulmone. Hic morbus difficilis est, & multa curatione opus habet. Alioqui agrius non relinquit, & plerumque in multis simul commoritur. * Si inflam-
7 matio in pulmone fiat, sit autem maxime a violentia, & gulositate, piscium capi-
tonum, & anguillarum. Hi enim pinguedinem habent naturæ hominis infestissi-
mam. Jam vero etiam factus est morbus a pituita, ubi sanguini mixta in pulmo-
nem inluserit. Accidit etiam ex carnis esu, & ex aquæ mutatione. Hæc igitur aeger patitur. Tussit fortiter, & salivam expuit liquidam, ac multam. Sæpe etiam
130
& laterum mollitudinem, ac latera. Et acidum eructat, & ex pectoribus, ac pulmonibus,

- 135 bus, velut venter murmurat. Et vomit pituitam acidam, & si id, quod vomuit, in terram effundas, radit terram, velut aceto infuso, & dentes stupefunt, & rigor, ac febris, & sitis fortis detinet, & si quid pingue voluerit edere, exurgit ad viscera, & vomitum inducit. Et totum corpus torpor occupat. Quum vero reuoluerit, paulo leuior sibi esse videtur, postea ubi vespera diet accessit, venter so-
- 140 niuini edit, & tormine versatur, ac murmurat. Huic, quum sic habuerit, & tempestivum esse visum fuerit, curationem sic adhibeto. Melle, & lac, & acetum, & aquam mixta in ollam infusa tepescito, & organi capitati ramulis agitato, ubi vero tepida facta fuerint, bibenda dato, aut apprehensa lingua, sensim per fistulam infundito. Deinde conuulsum quietem habere iubeto. Postea si vomitus succedat,
- 145 prompte vomat. Si vero non succedat, irritatione per pennam facta vomat, & si quid pituitæ vomuerit, per dies quinque idem faciat; hinc enim leuior evadet. Bibat autem hæc exercitatus, si fieri poterit, & multa cathda lotus, sin minus, saltem lotus; postquam vero quinque dies præterierint, mane ieiunus bibat in aqua mulla, aut vino mulso silphii succum, ervi magnitudine, & allium comedat,
- 150 ac taphanidas ieiunus, & meracum vinum insuper absorbeat nigrum, aut album austetum. Bibat etiam inter cibum, & post cibum. Cibis vero secis, & carnibus caninis utatur coctis, si rigor, & febris non apprehenderit. Hic si a tali infusione per fistulam in os purgetur, satis est; sin minus, solum per veratrum ipsum purgato. Post purgationem vero farinæ coctæ duas heminas absorendas dato,
- 155 melle affuso. Vinum vero idem bibat aquosum. At si non in principio affuerit morbo, lacte ipsum crassefactum in pectore, ac dorso utro; ita enim maxime a morbo liberari poterit. Si vero non fuerit usus, permanet, & non valde deficit, sed ad senectam usque adhæret. Sepe etiam commotitur, si non in primis quadraginta diebus mortuus fuerit. Quare multa quammaxime opus est cura, Et serum,
- 160 ac lac pro tempore bibat, bubulum, & caprinum, & asinum, æquequantum. Sic enim facillime deget. Est autem morbus difficilis. * Si pulmo ab erysipolare inuoluerit; (Hic autem tumor maxime a sanguine fit, quum pulmo in se ipsum sanguinem attraxerit, & susceptum tenuerit. Morbus autem hic æstatis tempore maxime fit) hæc igitur ab ipso æger patitur. Tussis incidit sicca, & rigor, & febris,
- 165 & erecta cervicæ spiratio, & dolor fortis in pectoribus, & nares aperit, velut equus a cursu. Et linguam exerit, velut canis æstare ab ardoris statu usus. Et tumor detinet pectora, & parum loquitur, & rubor est in facie, & pruritus fert in corpore, & præ dolore decumbere non potest. Sed ipse se ipsum anxius iactat. Hic in septem diebus moritur. Verumtamen in principio, quum sic habuerit, per hæc curretur. Corpus quidem refrigeretur betis, in aqua frigida tinctis, ac corpori impositis, in tertenti maxime dolore. Aut lintea frigida aqua tincta, ac expressa apponito. Et si quidem sic melius habuerit, satis est; sin minus, terram regularem frigidam pro cataplasmate imponito, & sub dio decumbat. Sic enim tractatus sepe septem dies catapherit. Quum autem septem dies præterierint, & dolor adhæserit, dolentem partem intus cum oleo illinito, & tepescitorum eadem, quæ in pleuride adhibetur, & potionem ad subpurgationem ipsi dato ex peplo, & metonide, five peplo, & grano cudio. Et post purgationem, lenticule heminam absor-
- 170 bendam dato. Bibat autem aquam. Postera die multa cathda aqua ipsum lavato, capite excepto. Postea origanum in aqua mulla macerato, & bibendum dato. Porribusque
- 175 quamcalidissimis utatur. Cibos autem accipiat eosdem, quos & qui a pleuritide correptus est, si non febris adhæserit. Hic morbus gravis est, & pauci effugunt. * Si pectus, & dorsum dirupta fuerint, dirumpuntur autem maxime a labore; æger hæc patitur. Tussis obtinet acuta, et salivam expulit aliquando suberuentem, et rigor, et febris plenusque corripit, et in pectore, et in dorso, dolor inest acutus, et
- 185 in latere velut lapis incumbere videtur, et a dolore perpetuo pungi, velut si quis acu stimulet. Huic, quum sic habuerit, statim lacte in potu dato, pectus, et dorsum inuro. Et sic celerissime sanus erit. De cætero vero quietam maxime corpori vitam degat. Si quid enim laborarit, et aut cutrim, aut equum ascenderit, aut humeros oneri subdidit, periclitabitur, ne rursus morbus recidivam faciat. Et si hoc contingat, periculum est, ut corrumpatur. Morbus enim reversus magis premis,
- 190 quam ab initio. Si vero non fuerit usus, isdem ipsum curato, quibus et suppuratum sorbitionibus, et potibus, et cibis. In summa vero quietem agat, et commodis cibis alatur. Si enim sic tractatus fuerit, celerissime sanus erit. Morbus autem gravis est. * Si in latere tuberculum nascatur, et suppuratus fiat, hæc patitur. Rigor ven-
- 195 ner, et febris, et tussis sicca per multos dies. Et dolet latus, et ad mammam, et ad claviculam, et ad scapulas dolor impetum facit. Hic quum sic habuerit, in primis decem diebus sorbitionibus utatur, prorsus succo cocto melle affuso, quam sorbitione cocta fuerit. Vino autem utatur albo, dulci, aut austero, et aquoso. Et ut vinum sepe sorbeat, ac expuat iubeto. Et a somno impedito, donec undecim dies præterierint. Post hos dies cibis paucissimis utatur, catribus etuliniis, aut galli calidis. Opotet autem ipsas probe cum iusculo præparare, et iusculum absorbeat. Et sorbitionibus prius, quam cibo utatur, et ne sitiat, donec latus suppuratum fiat. Suppuratur autem maxime in quadraginta diebus, aut paulo prius. Hoc autem cognoscet,
- ubi sup-

ubi suppuratum fiat latus. Pus enim non expuit, neque re vomit. Hunc, quum sic habuerit, ubicumque tumor significationem de se praeberit, secato, aururito. Et postea pus paulatim emittito. Et postquam exhauseris, linamentum crudi lini immittito, & hoc postmodum rursus exempto, paulatim pus exhauro. Deinde rursus linamentum indito, & rursus tertia die, & aliis deinceps bis per diem exhauro, donec resiccatum fuerit. Dato autem & cibos, & obsonia, si admiserit. Et bibat modicum uini multum, sive uinum, sive aquam. Edat etiam origanum tenesillam plurimam mel-
le tinctam. Si vero tenesillam non habeat, siccam tritam, & melli ammixtam plu-
rimam exhibeto. Et neque frigeat, & balneis lavet, & molliter cubet. Et sic hunc mor-
bum curans, celerrime sanum feceris. Quum autem sanus euaserit, viuet frigus,
calorem, solem. Et deambulationibus modicis utatur post cibum, ut ne lassitu-
do corpus corripiat. Hac faciens, sanus erit. Ex his morbis, quoscumque uideris,
statim post uestitionem porrum multum tritum super uesturas imponito, & per di-
em unam finito. * Tres sunt tabis species. Prima quidem fit a pituita. Quum
enim caput pituita impletum agrotarit, & calor accesserit, pituita in capite com-
putrescit, ut quae moveri non potest, ut decedat. Postea quum crassifecta fuerint, &
putrescunt, ac superexpletae venulae, fluxio in pulmonem fit. Et pulmo ubi succe-
perit, statim agrotat, ut qui a pituita mordetur, quae falla est, ac putrida. Hac
igitur aeger patitur: sebris debilis invadere incipit, & rigor, & dolet pectora, ac
dorsum. Aliquando etiam tussis premit acuta, & expuit salivam multam, & li-
quidam, ac fallani. Et haec quidem in principio morbi patitur. In progressu vero
corpus attenuatur, cruribus exceptis, haec enim intumescunt, & pedes, & ungues
contrahuntur, ex humeris autem tenuis, & debilis est, & fauces velut lanugine im-
plentur, & velut per arundinem sibilat, & fortiter sitit per totum morbum, & mul-
ta impotentia corpus habet. Hic quum sic habuerit, in anno corruptus male pergit.
Verum studium quammaxime adhibere oportet, ac rescire. Et primum quidem ve-
ratrum bibendum dare, infra autem subpurgare epithymo, aut peplo, aut grauo cni-
dio, aut rithimalide. Hac quater in anno dare oportet, sursum bis, deorsum bis.
Dandum est & lac asinum coctum ad subpurgationem, aut bubulum, aut caprinum.
Bibet etiam crudum lac bubulum, tertiae aquae mulse parte ammixta, per quinque, &
quadraginta dies, ammixto etiam origano. Caput autem ipsius prius pargetur,
pharmaco ad nares appposito. Cibaria autem, & obsonia dentur neque pingua, neque
nidiorosa, neque valde acra. Hac autem morbum observando facere oportet, & deam-
bulationibus ad cibos uti, observando ne frigeat. Hyeme vero iuxta ignem habi-
tationem faciat. Vinum autem bibat austerum, nigrum, quamvetsillissimum, ac ju-
cundissimum, verum modicum. Et si tibi visum fuerit, ante pharmacum fomentum ad-
hibeto, & sic pharmacum dato. Si vero dare nolueris, lactis fomento, vomitum
ex cibis facere cogito, velut prius scriptum est. Hinc si commodae fuerint, deam-
bulationibus utatur. Si vero non conducant, corpore quammaxime quiescat. Hic
hoc modo tractatus, facillime in morbo deget. Est autem morbus lethalis, &
pauci hunc effugiunt. * Secunda tabes fit a labore. Eadem autem aeger pa-
titur, quae & prior. Morbus autem hic magis priore quiescat, & astate tem-
perat. Salivam vero expuit crassiotem priore, & tussis premit maxime senes, &
dolor fortior est in pectoribus. & velut lapis incumbere ipsi videtur. Dolet
etiam dorsum. Et color ipsius limpidus existit, & si quid laborarit, status, &
anhelatio oboritur. Hic ex hoc morbo in tribus annis maxime moritur. Cura-
re autem oportet iisdem, quibus etiam priorem. Hic morbus multis adharet
usque ad tres annos, sed moriatur. Estque morbus gravis. * Tertia tabes. Ab
hac haec patitur. Medulla ipsius spinalis sanguine plena fit. Tabescit autem simili-
ter, & a cavis venis. Haec vero pituita hydropiformis, & bile replentur. Pati-
tur autem eadem, ab utris tandem tabescat. Et homo statim niger fit, ac suber-
midus. Et partes sub oculis pallidae sunt. Et venae in corpore pallidae disten-
sae sunt, quaedam vero valde rubicundae. Maxime autem manifestae sunt, quae sunt
sub alis. Et spiritus pallida, quae ubi ipsum invaserint, suffocant, & tussire volens al-
quando non potest. Quandoque autem praeter suffocationem, & tussidem cupiditate,
bilem acervatim vomit, aliquando vero pituitam. Saepe vero etiam cibos,
quum comederit. Et ubi revomuit, levior sibi esse videtur. Deinde modico tem-
pore interposito, in iisdem doloribus jacet. Hic etiam acutius loquitur, quam quum
sanus esset. Et rigor, ac sebris interquiescens, rursus sudorosa corripit. Hunc, ubi
sic habuerit, cibis, & forbitionibus, & potibus, ac pharmacis, & reliquis omni-
bus curato, velut priores. Morbus autem durat maxime annos novem. Postea
durat, dum corrumpitur, pauci vero ex ipso effugiunt. Gravis enim est morbus.
Si vero volēs, sic ipsum curato. Primum fomentum adhibeto, & ubi fomen-
tum adhibueris, postmodum aquae mulse dimidium congiunt ipsi bibendum da-
to, modico aceto assuso, & haec citra respirationem bibere iubeto. Deinde strag-
ulis ipsum ad multum, ac quamlongissimum tempus contegito. Si vero non susti-
neat, & vomere velit, vomat. Si vero vomitus non sequatur, tempore iam a-
liquo interposito, aquae tepidae poculo magno superingesto vomat, irritatione
per pennam facta. Quum vero evoverit, ut bege habeat, quietem agat per hunc
diem.

- diem. Ubi autem cenae tempus fuerit, eoenet mazam modicam, & oblonum
habeat falfamentum, & portum. Hac autem quamplurima edat. Vinum vero bibat
275 dulce. Reliquo tempore per totam diem, exotidio mane facto, multa calida la-
vetur, & post balneum cavere oportet, ut ne frigescat, sed decumbas plurimo tem-
pore dormiat. Quum autem a somno surrexerit, viginti stadia minimum cir-
cumcat illa die. In aliis autem diebus alia quinque stadia prioribus addens v. dat,
singulis diebus additione facta, donec ad centum stadia perveniat. Ventrem
280 vero quotidie subpurgare oportet, succis betae, & a brassica, ita ut utramque seor-
sim coquas, & de utraque congiunt excoles. Deinde adipis a rhenibus detracti mi-
nae quadrantein ammifceas, & simul coquas, in utrisque succis divisim facta co-
citur. Quum autem bibere voluerit, ad brassicam quidem succum, saleem adjici-
ro. Ad betae vero succum, mel affundito. Licet autem seorsim utramque bibere,
285 Aut melle in alterum poculum affuso bibat; in alterum vero immisso sale. Ebi-
bere autem oportet totum succum, & hac facere per triginta dies. Secundo ve-
ro mense edat panem, & carnes pingues suillas coctas; aliud vero nihil. Vinum
autem bibat album, austerum, & iter faciat, non minus stadiorum triginta ante
cenam. Post cenam vero decem, & ne frigeat, sed contetur. Hac si fecerit,
290 levis morbum teret. Tertio autem mense cyceonem floridum bibat, apii radi-
ces, & anethum, & rutam, & mentam, & coriandrum; & papaver tenerum, &
ocimum, & lentem, & mali puniei dulcis, & vinosi succum. Oportet autem dilu-
ere duplam mensuram esse, ita ut utriusque succi simul sit heminae dimidium, &
vini nigri jucundi austeri heminae dimidium, & aquae heminae dimidium. Post-
295 ea flores eriti in hoc diluantur permixto, & in poculum infundantur. Et postea
farinae ervi acetabulum adiciatur, & polentae tantundem, & casei veteris capri-
ni rasi tantundem, & hac permixta ebibat. Deinde modico tempore interpo-
sito prandeat panem, & oblonum habeat frustum torpedinis, aut squatinam, aut ga-
lei, aut rajae. Et carnes suillas edat coctas, & crassefaciat se ipsum, quietem quam-
300 maxime agens. Et decimo quoque die fomentum sibi ipsi leviter adhibeat. Quarto au-
tem mense, quinto quoque die leviter fomento utatur. Et edat oblonum plurimum.
Sint autem obsonia, caseus, & carnes ovillae coctae paucae. Et iter faciat per sta-
dia, velut antea dictum est. Et prima quarti mensis die, initio a decem stadiis fa-
cto eat, & quotidie addat, donec octoginta stadia fiant. Et deambulet in die stadia
305 octoginta. Ante cenam, triginta. Post cenam, viginti. Mane triginta.
Reliquo vero tempore victu utatur, mazam, & panem utraque edens. Et ob-
sonium habeat, chartilaginea. Sed & carnes omnes edat, exceptis bubulis, ac
porcinis. A piscibus autem his abtineat, a mugile, anguilla, & melanuro. E-
dat autem torpedinem, squatinam, rajam, galeum, passinacum, & ranas. Ex a-
liis nihil. Si vero videatur innoxius esse, etiam cyceonem bibat. Postquam au-
310 tem dormire voluerit, bibat de vino nigro, jucundo, veteri, poculum duarum
heminarum. Et per diem eodem vino utatur inter cibum. Et in die iter faciat
per stadia centum quinquaginta. Ante cenam, nonaginta. Post cenam, vigin-
ti. Mane, quadraginta. Hic hoc modo curatus, in anno sanus evadit. * Reli-
315 catur medulla spinalis maxime, quum venulae ad medullam tendentes fuerint ob-
turratae, itemque ex cerebro accessus. Propter corporis autem afflictionem hac
patitur, & aggroratur. Relicatur etiam a venere. Hac igitur patitur. Dolor acu-
tus incidit ipsi in caput, & in collum, & in lumbos, & in lumborum musculos,
& in articulos crurum, ut aliquando flectere non possit. Et stercois non secedit,
320 sed sistitur. Et urinae difficultate vexatur. Hic in principio quidem morbi quie-
tius degit. Quanto autem magis tempus morbo prolongatur, tanto magis omnia
dolet. Et crura velut ab aqua inter cutem tument. Et ulcera a lumbis emergunt,
& alia quidem faneantur; alia vero nascuntur. Huic, quum sic habuerit, caput pur-
gato hippophais succo, aut enidio grapo, corpore prius valde bene feto. Ve-
325 spero vero post purgationem, perisane dias heminas sorbeat, melle affuso. Vi-
num autem bibat album molle. Postera die asini lactis cocti, melle affuso, octo
heminas ebibendas ipsi dato. Si vero asinum non habeas, bubuli, aut caprini
cocti tres semicongios, melle affuso. Et dum temporis opportunitas adest, hac bi-
bat, sero, & lacte utens per quinque, ac quadraginta dies. Cibis autem, & obsoniis
330 utatur quammaxime per alvum secedentibus. Vinum bibat album, molle, mende-
sum. Quum autem crassissimus fuerit, in lumbos ipsius ab utraque verticulum
parte crustas quatuor inurito, & in dorsum utrinque quindecim, & in cervicem
duas, imper tendines. Si enim alio successerit, sanum facies. Est autem morbus
335 hic gravis. * Quatuor morbi a rhenibus sunt. A primo hac patitur. Dolor acu-
tus incidit in rhenem, & in lumbos, & in restem secundum rhenem situm. Et
frequenter mingit, & adstringit paulatim, ac supprimitur urina, & cum urina pro-
cedit arena. Et ubi per urinam meatum exit aetia, dolorem fortem in meatu ex-
hibet. Quum autem ipsam per urinam eiecerit, dolor remittit. Postea vero tursus in
340 iisdem doloribus jacet. Quum autem mingit, etiam colem pra dolore fricat. Vultus
autem medicorum, quod non intelligit morbum, ubi videt arenam, putat vesicae
eam e calculo laborare. At non vesica, sed rhen lapide laborat. Hic morbus sit
a pitui-

a pituita, quum rhen susceptam in se ipsum pituitam non rursus dimiserit, sed in ipso in totum concalescit, & sunt ex ea tenues lapilli, velut arena. Huic, quum sic habuerit, cum scamonia succo, aut ipsa radice, fomento prius adhibito, totum corpus purgato, postera vero die duobus congiis succi cicieris albi subpurgato, quem sale injecto bibendum dabis. Post hæc poribus, & cibis, & balneis curato, & eadem, quæ in urina stillicidio exhibentur, pharmaca dato. Quum autem dolor presserit, multa calida lavato, & tepesactiora, quia parte maxime dolet, adhibito. Quum autem intumuerit, & elevatus fuerit, sub id tempus iuxta rhenem secato, & extracto pure, arenam per urinam cientia sanato. Si enim sectus fuerit, su-
 16 gæ spes est. Sin minus, morbus homini commoritur. * Secundus rhenum mor-
 bus. Dolores fortiter premunt, velut in priore, sit autem morbus a labore, quum
 ruptæ fuerint venulæ ad rhenem tendentes, & postea rhen sanguine repletus
 fuerit. Hic ubi hæc patitur, cum urina sanguinem mingit in principio morbi,
 deinde progressu temporis pus. Hic si quietem corpore habuerit, celerrime san-
 nis erit. Si enim quid laborarit dolores, multo magis obtinebunt. Quum itaque
 suppuratus fuerit rhen, circa spinam intumescit. Hunc, ubi sic habuerit, circa tu-
 mentem partem secato, profunda maxime sectione iuxta rhenem. Et si quidem
 suc efferit sectio, & vestigio sanum facies. Si vero abettraveris, periculum est, ne ul-
 cus linamentis curandum fiat. Si autem concreverit ulcus, venter intrinsecus a rhe-
 ne suppuratur, & si quidem pus intus rumpatur, & ad intestinum rectum procedat,
 17 fuge spes est. Si vero contigerit alterum rhenem, periculum est, ne pereat. Cu-
 retur autem pharmacis, & isdem omnibus, quibus & prior, & diatam eandem
 habeat. Hic morbus gravis est, & multi ex ipso ad tabem rhenalem deveniunt.
 17 * Tertius rhenum morbus. Urina prodit, velut a carnibus bibulis afflatis
 succus, sit autem morbus ab atra bile, quum bilis in venas confluerit, quæ ad rhe-
 nem tendunt, & quum constiterit, exulcerat venulas, & rhenem. Ab ulceratio-
 ne igitur tale quiddam cum urina procedit. Dolores autem hærent in lumbis,
 & in vesica, & inter anum, ac pudendum, & in ipso rhenæ, ad modicum tempus.
 Deinde remittit dolor, & rursus acutus brevi corripit, & in tenuem ventris par-
 tem aliquando dolor iucidit. Huic, quum sic habuerit, ventrem subpurgato epi-
 thymo, aut scamoniae radice. Bibenda vero eadem dato, quæ & ex urina stillicidio
 laboranti, & quum dolor habuerit, multa calida lavato, & tepesactiora ad dolen-
 tem maxime locum adhibeto, & sorbitione utatur farina cocta, melle affuso, &
 reliquo victu utatur, quammaxime per alvum secedente, & vinum bibat album men-
 18 dragmæ mellei coloris. Aut aliud album jucundissimum probe temperatum. Hic mor-
 bus non valde deficit, & pro temporis opportunitate serum, & lac bibat. Senum
 quidem ad purgationem. Lactis autem potum faciat in tempore per quinque ac qua-
 18 draginta dies. Hæc si ita feceris, morbum in melius dispones. * Quartus rhe-
 num morbus. Morbus hic fit a bile, & pituita, maxime tempore æstatis, sit etia-
 m a venere morbus. Hic æger hæc patitur. Dolores premunt ipsum in late-
 ris mollitudinem, & in lumbos, & in lumborum musculos, & patitur, qualia solet
 mulier ex partu laborans, & non sustinet in sanam partem decumbere, sed valde
 dolet, & ex lateris mollitudine quædam pendere videntur, velut abrupta. Si
 vero pronus decumbat, non dolet, pedes, & tibie ipsius semper frigent. Urina vero
 vix prodit præ pituitositate, & crassitudine sua, & si siveris ipsam ad modicum
 tempus depositam, donec defecerit, videbis subsidentiam crassam, velut farinam,
 & si quidem bilis prævaluerit, subsulvam ipsam videbis. Si vero a pituita fuerit mor-
 bus, alba, & crassa erit, & primum quidem in annum, aut paulo amplius, aut bre-
 vius tempus æger talia patiens perseverat. Si vero prolongetur morbus, & magis dolet,
 & suppuratur, & quum suppuratus factus intumuerit, qua maxime partem in-
 tumuerit, in rhenem secato, & pus emittito, & si quidem successerit sectio, statim sanum
 facies. Hunc, quum sic habuerit, isdem omnibus curato, quibus etiam priores.
 Et a principio morbi oportet & purgare, & ante subpurgationem fomentum ad-
 hibere, & balneis frequenter lavare. Unguatur irem, & magis calefiat, neque fri-
 geat, & a sole abstineat, & neque venere utatur. Hæc si fecerit, & non celerrime sanus
 evaserit, nihil novi est. Morbus enim est gravissimus. Si vero citra pharmaca
 curari velit, crassum ex diætâ facere oportet, sive ex hoc morbo ægroet, sive ex
 aliquo de prioribus, divisus cibis, quos edere solet, in decem portiones, ita ut una
 parte detracta, reliquis comedat. Obsonium autem habeat, carnem suis tritam, & ea
 die decem stadia deambulet, postera vero die, & tertia usque ad decem dies, portio-
 nem minus edat, & deambulet decem stadia, aut plura singulis diebus addens. Quum
 autem ad ultimam cibi portionem devenierit, etiam ad centum stadia iter faciat, & edat
 quidem unam tantum portionem, & ea die centum stadia deambulet. Post coe-
 nam autem viginti, mane vero quadraginta. Vinum autem bibat mendacium album
 405 ansterum, atque hæc per tres menses faciat, postea reliquo tempore deambulationes
 imminuat, & cibos plures comedat, eodem modo additione facta, velut detrahe-
 bat. Deambulationem vero detrahat usque ad decimum diem, & postea quammaxi-
 me quietem habeat, & cibis puris alatur, & obsonia quamprimum habeat, & dulcia
 omnia ipsi commoda sunt. Aboleribus autem, & acidis omnibus abstineat, itemque
 ab aceti

- ab acris, & quæ statim faciunt. Multa etiam calida lavet, & ne frigeat. Hæc si fecerit, celeritque sanus erit. * A rheum morbo corripit morbus magnus venarum 19 cavarum, quæ a capite juxta jugulum per spinam tendunt ad malleolum pedis externum, & ad intermedium digiti locum. Morbus hic fit a pituita, & bile, quum in venas confluerint. Venæ autem hæ sanguine plene sunt. Si igitur quid alieni in 415 ipsis præterlapsum fuerit, ægrotant. Si dextram partem morbus corripiat, dolorem ex coxæ acetabulo in principio exhibere incipit. Quanto autem amplius tempus progressum, & prolongatum fuerit, tanto acutior dolor infra descendit, & quum ad malleolum pedis externum, & ad magni digiti inter medium locum devenierit, rursus ad caput venire incipit; & ubi in ipso ulcus confluerit, foetor premit, & homo 420 caput sibi diffingi putat, & oculi pituita replentur, reinque totum corpus. Huic, quum sic habuerit, elaterium bibendum dato, aut thapsiæ radicem, aut veratri, aut succum scammoniae, post purgationem vero eadem exhibeto, quæ superioribus. Si vero ab hac curatione non desinat, lacte ipsum crassefacito, & in scapulam dextram 425 quatuor crustas injuro, & in acetabulum coxæ dextræ, tres; & sub nates, duas; & in medio femore, duas; & supra genu, unam; & supra malleolum, unam. Hicubi sic nistus fuerit, neque sursum, neque deorsum morbum procedere permittit. Si vero alicubi dolor ruperis visus fuerit, si quidem in crus incubuerit, priusquam uratur, claudus erit. Si vero in caput, surdus, aut cæcus. Si vero in vesicam, prodit simul 430 cum urina sanguis maxime per quadraginta dies. Verum si in vesicam eruperit, eadem pharmaca, quæ & in urinae stillicidio, dato; & si alicubi dolor congregatus fuerit, urito. Urere autem oportet carnosa quidem ferro, ossia vero, & nervosa fungus. Cæterum ante hæc, si in principio morbi accesseris, ista facere oportet. In potu exhibendum est vinum album mendacum, aquosius, plutum per diem, & inebrietur, donec sanguis a naribus erumpat. Quum autem fluere inceperit, minimum 435 tres & decem dies fluat. Ubi vero hi dies præterierint, non amplius inebrietur, neque ubi semel fluere inceperit. Bibat tamen paulo amplius vinum inter cibum, quo sanguis fluere possit. Jam vero quibusdam sedato sanguine, erupit in vesicam, & prodit sanguis, ac pus. Si igitur eruperit, eadem pharmaca, quæ & ex urinae stillicidio laboranti, dato. Ex de eodem vino plus bibendum exhibeto. Hic si 440 ita curetur, & cibus per alvum sedecentes assumat; & obsonia ejusdem facultatis, citissime sanus erit. Morbus autem gravis est. * Alius morbus a sinistra vena. 20. Hic æger alia quidem eadem patitur, quæ etiam prior. Verum in splenem dolor acutus incumbit statim, & in principio morbi. Et si non intellexerit, priusquam incubuerit, proficit in pulmonem. Huic per fungos crustas octo marito, capita lienis quamcelerrime intercipient. Et ubiqueque alius dolor incubuerit, urito. Sic etiam statim sanus erit. Si vero non fuerit ulla, sanus autem sponte fiat, plerisque post duodecim annos morbus rursus revertitur, & si splenem occupavit, multas aquam inter cutem inducit. Verum oportet statim curare velut prorem, & si visum fuerit 450 urere velut priorem, si dolor in isdem articulis confluerit. Si vero non sic curatus fuerit, de cætero colliquescens moritur. Morbus enim gravis est.

S E C T I O I I

- 1 * D E pituita easdem sententias habeo, quas & de bile, & species ip- 21
sius multas esse puto; & alia quidem popularis est, quæ sane re-
centissima est; cuius etiam curatio facilissima est. Vomitus enim post ci-
bum facere oportet per duos, aut tres dies, ita ut & prandeat insuper,
5 ac quiescat, si prioribus diebus semel in die cibum capere, & labore
solitus fuit. Sin minus, hujusmodi diæta utatur. Primum iuxta calida lavetur,
quum vomitum facere voluerit, & edat mazam oleo, & melle subactam, & panem
exassarum veterem. Hæc enim magis pituitam trahunt. Obsonia autem utatur, & o-
leribus acris. Sed & pinguis, & dulcia, & acida omnia idonea sunt, ut permi-
10 xta assumantur. Et oleribus omnibus viridibus utatur. Et bibat inter cibum fre-
quenter modicum vinum dulce, & in fine placentam insuper edat, & mel, & ficus. Et
quum coenabit, pocula large exhauriat, & ubi jam repletus fuerit, parum dormiat.
Deinde expectectus vomat, magno vini poculo epoto, cum tepida aqua tempe-
rato. Trahit enim magis pituitam, & humorem ex carnibus, & corpus magis relin-
15 cat. Evomat autem, donec ficus evomuerit. Hæ enim postremum evomuntur. Atque
hæc quidem hæc die faciat, postera vero contineat se ipsum usque ad coenam, & in coe-
naumat panem, cui nihil sursum decessit. Obsonium autem sit ex fortioribus. Vi-
num vero bibat nigrum, austerrum. Atque hæc quidem popularis pituitæ medela est. * Si
vero edere, & bibere potest, & cibus delectatur, deinde vero cura gravetur, & co-
20 lor immutatus fuerit, huic ostendendum est, pituitam molestantem in ventre esse. Ve-
rum oportet, quum sic habuerit, mel, & vinum dulce, & oleum, & nigrum tali-
villi magnitudine pennixta per clysterem infundere; hæc enim mistissima sunt in cly-
sterem ad hominis naturam. Mensuram autem singulorum esse oportet; vini quidem
hemina, olei vero hemina dimidium, & mellis tantundem. Si vero clysterem non
voluerit,

voluerit, humectum hominem facere oportet, somento humido admoto. Fortassis
 enim etiam sic steruus subevacuari poterit. Nam a ciborum nimia reificatione
 hæc patitur. Si quidem igitur quis edat cibos valde succosos, fortassis hæc non ita
 vehementer patiatur. Si vero etiam aliquando patiatur, modica curatione opus
 23 habuerit. Hunc ita curans, ecletrime sanum feceris. * At si antiquior fuerit pi-
 tuita, appellatur autem hæc pituita alba, hæc patitur. Gravatur hominem magis,
 & speciem a populari alienam habere videtur pallidiores, & totum corpus laxo-
 rumore intumescit, & facies rubet, & os siccum est, & sitis tenet, & quum come-
 derit, spiritus densus ipsi incidit. Hic eadem est aliquando melius habet, aliquan-
 do derepente dolet, & sibi mori videtur. Huic si quidem venter sua sponte turba-
 tus fuerit, sanitati proximus erit. Si vero non sua sponte venter turbetur, pur-
 gare oportet, cneorum dato, aut hippophae, aut enidio grano, aut lapide magne-
 35 tæ. Et post purgationem lenticulæ hemina una, aut duæ dentur ad absorbendum.
 Coquatur autem allium in lenticula. Detur etiam betæ pinguis hemina non con-
 ditæ, polenta circuminspersa. Bibat vinum nigrum, austerrum, & forte. Postera vero
 die mane stadia viginti deambulet, A qua deambulatione reversus, panem edat
 40 parvum exassatum, & obsonium habeat allium coctum, & de eodem vino paulo me-
 racius bibat, deinde stadia vadat triginta, & ubi tempus aderit, coenet, quantum
 etiam prandere consuevit, obsonium autem habeat, maxime quidem pedes, & ca-
 pita suilla. Sin minus, galli carnibus, & suis tritis utatur. Ex piscibus autem scor-
 pio, aut dracone, aut cuculo, aut callionymo, aut gobio, aut aliis piscibus, qui
 45 qualem facultatem habent. Ex oleribus autem solo alio, & nullo alio utatur.
 Hoc vero quamplurimum edat, & crudum, & assatum, & coctum, semper plus
 singulis diebus, & haboret ex modico amplius, respectu ad cibos facto. Hic mor-
 bus maxime sic tempore æstatis ex aquæ potu. Insuper & a somno multo. Judi-
 catur autem in triginta diebus, an lethalis sit, aut non. Arque hæc quidem
 50 faciat, ubi triginta dies præterierint. In primis autem diebus foribitionibus utatur,
 lenticula cocta acidiores ab aceto, & prisana acida. Bibat aquam mulsam tepidam,
 polenta modica inspersa, quo corpus præparatum sit ad pharmacorum potum.
 Et his diebus sub dio dormiat, & si tibi vilum fuerit sanguinem a lumbis detra-
 here, cucurbitam affigito, & venas in scroto crassissimas secato. Hic ita curatus,
 55 citissime sanus fiet. * A pituita maxime in aquam inter cutem transitus sit hoc
 modo. Pinguedo colliguescit, & a calore, qui in pituita est, fit aqua. Cognosces
 autem hoc, an quis sanari possit, aut non. Donec enim quis in pectine pingu-
 edinem habet, fieri non potest, ut ipsum sanes. Cognosces autem ex his maxime,
 an pinguedo insit in pectine, aut non. Si quidem febres succedant, & non potest
 60 exurgere, & umbilicus inflatus extra prominet, indicium est non amplius in-
 fesse pinguedinem, & sanabilem esse. Huic conducit ventrem siccare, & panem da-
 re, cui nihil furfurum decessit, antiquum, calidum. Obsonium autem carnem le-
 porinam, & canis perfecti, & oviculæ, & suis assatam, & galli assatam, ac calidam, &
 polypos edat coctos in vino nigro austero. Vinum autem bibat nigrum, austerrum,
 65 quamcrassissimum, ac acerbissimum. Piscibus autem utatur, gobio, dracone, callio-
 nymo, cuculo, scorpio, & aliis huiusmodi, omnibus coctis, non recentibus, & fri-
 gidis, hi enim sicissimum sunt, & in iusculum ne intingat, & insilli sint pisces. Ex
 oleribus autem utatur raphanis, & apio. Torreat autem lenticulam ab aceto aci-
 diorem, & edat. Et deambulet quotidie & post coenam, & mane, & serotino tem-
 pore dormiat, & mane exurgat. Et si quidem ab his restituerit, satis est; sin mi-
 70 nus, cneorum, aut hippophae succum, aut granum enidium bibendum dato.
 Et post purgationem lenticulæ heminas duas sorbeat, & panem parvum com-
 edat. Vinum vero bibat nigrum, acerbum, modicum. Bibat autem pharmacum bis
 in die, donec vacuus fiat. Si vero tumor constitit in scroto, & femoribus, ac ti-
 75 biis, acuto scalpello multa, & frequenter vulnuscula incurito. Et si hæc feceris, ci-
 to sanum efficies. * Aqua inter cutem ex his fit. Quum æstatis tempore sit vexa-
 tus aquam multam biberis, nam ex hoc maxime fieri solet, & pulmo expletus
 fuerit, rursus ad pectora dimittit. Et quum in pectoribus fuerit, calorem vehe-
 mentem exhibet, ut pinguedo, quæ in arteriis est, colliguescat, & si semel liqua-
 80 ri pinguedo inceperit, multo amplius in brevi tempore aquam inter cutem fa-
 cit. Fit etiam, si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pec-
 tore rupta. Quod autem fiat etiam a tuberculis aqua inter cutem, testimonium ha-
 bet & in bove, & in cane, & in sue. In his enim quadrupedibus maxime sunt tuber-
 cula in pulmone, quæ aquam habent. Si enim dissecueris, citissime cognoveris.
 85 Fluit enim aqua. Videtur autem talia multo magis in homine fieri, quam in pec-
 toribus, quanto etiam morbosiore dieta utimur. Facti sunt autem & multi pec-
 tore suppurati tuberculis obortis. Hæc igitur in principio ad morbum consequun-
 tur. Tussis sicca, & fauces exasperari videntur, & rigor, ac febris succedit,
 & erecta cervice spiratio & corpus intumescit, & pedes tumunt, & ungues contra-
 90 huntur, & donec quidem in superno ventre fuerit aqua intercus, adeft dolor acutus,
 postquam autem ad infernum ventrem venerit, melius habere sibi videtur. Postea
 progressu temporis patitur, qualia prius, impleto ventre. Quandoque etiam ad latus
 intume-

- intumescit, & indicat, ubi secare oportet. Si vero non indicat, multa calida la-
 95 varo, & humeris apprehensum concurto, & deinde in utro latere magis fluctuet
 audito. Quo intellecto, collam tertiam ab ultima usque ad os secato. Deinde cum
 terebra cava ultra perforato. Et ubi perforata fuerit, aquæ parum emittito, & ubi
 emiseris, linamentum ex crudo lino indito, & spongiam mollem superimponi-
 100 to. Deinde ut ne excidat, linamentum deligato. Emittere autem per duodecim
 dies aquam oportet semel in die. Post duodecimum autem diem sequenti deci-
 ma tertia totam aquam emittere, & reliquo tempore, si subnascatur aqua, emite-
 re, & ventrem cibis reficere. Post sectionem autem hæc exhibere oportet.
 Succus filipii drachmæ pondus parato, & aristolochiam tali cervini magnitudi-
 ne decadito, & lentum, ac erui torrefactorum potentiam, dimidiæ chœnicis men-
 105 sura utramque purgato, arque hæc melle, & aceto subigito. Deinde pastillos sexa-
 giata efformato, & quotidie unum tritum in vini nigri austero, ac jucundissimi
 hemina dimidia diluito, & mane in potu dato. Reliquum vero victum, ac labo-
 rem eundem, velut priori tempore, habere iubero. Et si intumuerint pudenda,
 ac fenora, confidenter vulnificulis impactis pertundito. Hunc, si ita curaveris, cele-
 110 rime sanum facies. * Ab hepate sit aqua intercus, quum in hepar pituita accef-
 serit, & hepar ipsam susceperit, & humectum fuerit. Statim igitur calorem huic
 exhibet, & statum indicit. Deinde temporis progressu aqua impletur. Postea
 morsus in corpus incidit. Et tumor in tibiis, ac pedibus inest, & hepar durum est,
 ac intumescit, & claviculæ attenuantur. Huic, quum sic habuerit, in principio si
 115 hepar doluerit, organum tritum, & filipii succum eevi magnitudine, in vini albi
 dimidia hemina diluta, bibenda dato, & lactis caprini poculum quatuor hemina-
 rum, tertia aquæ mulæ parte ammixta. A cibis autem per primos decem dies
 abstineat. Hi enim iudicant morbum, an lethalis sit, aut non. Sorbeat autem
 persanæ succum coctum, melle affuso. Vinum autem bibat album mendum, aut a-
 120 liud jucundissimum aquosum. Quum autem decem dies præterierint, cibos acci-
 piat puros, & obsonium habeat galli carnem assatam calidam. Habeat & caru-
 linam coctam. Piscæ vero utatur galeo, & torpedine assatis. Vinum vero idem bi-
 bat, & si quidem ab his quiescat, satis est, sin minus, postquam sane crassissimus li-
 quus fuerit, & hepar maximum, iungis urito. Sic enim celerrime sanum feceris.
- 125 Inurere autem oportet crustas octo. * Si vero aqua intercus innascatur, & rum-
 patur in ventrem, iisdem medicamentis, & potibus, & cibis, ac laboribus, qui-
 bus priores, curato. Vinum vero bibat austerrimum nigrum. Si vero tibi videatur dis-
 cussibile ab hepate, per ferrum, ubicumque apparuerit, urito, & aquam paulatim emitti-
 130 to, & velut reliquos priores curato. Si vero ab his non sanus fiat, temporis pro-
 gressu corrumpitur, ac moritur. Morbus enim est gravis, & pauci huic effu-
 giunt. * Aqua vero intercus a splene hoc modo fit, & ab huiusmodi maxime causis,
 quum quis ficum viridum, & maiorum fructus multos ediderit. Multi vero iam
 etiam a cibo botrorum multorum, & a multo melle morbum inciderunt. Si qui-
 135 dem igitur in morbum collabatur, statim in doloribus est. Dolores enim acuti
 in splene consistunt, transeunt autem & in humerum, & in claviculam, & in mam-
 mam, & ad lumbos, & febres fortes tenent. Et si parum quid ediderit, ventris im-
 pletur, & splen attollitur, & dolorem exhibet. Hic morbus si duraverit, reliquus
 quidem tempore minus dolet. Quum vero fructuum malorum tempus fuerit, &
 hoc ediderit, magis quam prius dolet. Huic, ubi sic habuerit, a principio curato, & sur-
 140 sum quidem veratrum exhibeto. Dorsum vero cœnorum, aut hippophasi succum
 aut enidium granum. Lactis item asinini heminas octo, melle affuso, & si quidem
 ab his restituitur, satis est, sin minus, quum maximus fuerit lien, & maxime in-
 tumuerit, iungis urito, capita ejus intercipientis, aut ferramentis, cum multa cau-
 145 tione, ac observatione, ne ultra peruras, hæc a morbi principio facito, & hæc dicta nutri-
 triatur. Si quidem febris non affuerit, pane utatur tritico afflato, aut ex duro triti-
 cobis cocto, obsonium autem habeat fassimentum Gaditanum, aut laperdam. Et carnem
 ovillam tritam. Et acida, ac salsa omnia edat. Et bibat vinum alicrum Coum quam-
 150 nigerrimum. A dulcibus abstineat. Quum autem exurgit, et potens est, lactetur summis
 humeris et laboret per circuitus multos in die, et comedat ea, quæ dicta sunt. Si
 vero aqua intercus fiat, iisdem curato, quibus et priores. * Alia aqua intercus ab
 155 his fit. Astatim hora, si iter facies per viam longam, in aquam pluvialem, ac sta-
 bilem incident, et biberit de ipsa multum assatum. Si igitur carnes absorbuerint, et
 continuerint in se ipsam, secessus autem nusquam fiat, hæc prætur. Si quidem fue-
 rit in carne, calorem facit et in ventre, et in corpore, ut pinguedo ventrem ambiens col-
 liquecat. Hicquandiu quidem iter facit, nihil mali habere videtur. Postquam autem iter
 160 facere cessarit, et sol occiderit, statim dolorem multum habet. Progressu vero mor-
 bi valde attenuatur. Si vero etiam cibi fastidium accedat, multo plus attenuatur.
 Si vero cibos edere poterit, et ad laborem impotens fuerit, etiam amplius larditur, et
 plerisque horum tumor in totum corpus deducitur. Et tenui quidem color corporis hi-
 165 vidus sit, et venter magnus, et sitis fortis tenet, et viscera ipsius a calore reficantur,
 progrediente vero tempore, ad edendum quidem promptus fit, et edit, quodcumque
 quis dederit, et bibit, et dolet nihil. Si vero tumor obtinuerit, color huic fit pal-
 lidus.

lides. Et vomit nigra frequenter per corpus distenduntur. Indignatus autem, & tristatur ex quavis re, etiam si nihil novi acciderat. Venter vero aqua perhumescit, & magnus fit, & laterne speciem præ se fert. Et temporis progressu cibos non admittit, sed videntur ipsi cucumeris sylvestris odorem habere præ abominatio-
ne. Huic, ubi sic habuerit, cneori, aut hippophais succum dato, aut cniidum gra-
num; hæc vero pharmaca ita dare oportet. Cneorum quidem per sextam diem, hippophais autem succum per octavam. Cniidum vero granum per decimam.
Et dare ipsa oportet, donec expurgetur, & vacuus fiat. Interpositis autem diebus, alatur ex iisdem, quibus & prior. Maxime autem de eadem aqua bibendum dato, ex qua morbus corripuit, plurimum, quo ventrem ipsius turbet, & valde fecalem faciat. Sic enim potissimum sanum facies. Si vero tibi videbitur, etiam frequenter clysterem adhibere ex cneoti triti dimidia hemina, mellis tertia hemina parte arumixta, his cum quatuor succi betæ heminis dilutis, atque sic infusus; postera die etiam asinini lactis cocti octo heminae dentur, affuso melle, aut adiecto sale potanda. Et post purgationem iisdem utatur, quibus prior, & interiectis diebus, cibis, ac poribus iisdem utatur, & deambulationibus similiter, & sic curatus bre-
vi a morbo liberabitur tercio mense, aut sexto. Si vero negligentia aliqua con-
tingerit, & non statim curatus fuerit, brevi morietur. Sed & in attenuato iisdem utendum est ad sanationem. Præhumerare vero antea corpus ipsius oportet per somenta, quo magis pharmacis obediat. At vero statim curam adhibere oportet. Sin minus, cum multis consensescit morbus. Sed & iterum tandem morbus fit, clysterem ex his adhibere convenit. Vini albi heminas duas accipito, & mellis heminam dimidiam, & olei heminam dimidiam, nitrî Egyptii rubri torrefacti quadrantem, soliorum cucumeris sylvestris ruforum, ac expellendorum succi heminam, hæc omnia mixta, & in ollam infusa servefacio, & per clysterem infundito. Morbus hepaticus. Fit ab atra bile, quum influxerit ad hepar. Accidit autem maxime in autumno, in mutationibus anni. Hæc igitur æger patitur. Dolor acutus ipsi in hepar incidit & sub ultimis costas, & in humerum, & in claviculam, & sub mammam. Et suffocatio fortis tenet. Et aliquando lividam bilem revomit, & rigore, & febri primis diebus debilior habet, & dum attingitur, hepar dolet, & color ipsius sublividus est, & cibi, quos prius comedebat, suffocant ipsum, & ingesti urunt, ac torquent ventrem. Atque hæc quidem in principio patitur. Morbo vero progrediente, & febres remittunt, & a paucis cibis repletur. In solo autem hepate dolor testat, & ipse aliquando fortis, aliquando quietus. Quandoque veto acutus corripit, & sæpe derepente æger animam effla-
vit. Hinc conducunt, ubi dolor habuerit, tum alia, tum refectionem eadem appo-
sit, quæ etiam pleuritidi. Quum vero remiserit dolor, multa esula ipsum lava-
to, & aquam mulsam bibendam dato, & vinum album dulcem, aut austerrum, utrum tandem profuerit. Et sorbitiones easdem, quas etiam a pleuritide correpto. Cæterum ad dolorem hæc bibenda dato. Ovi gallinæ cocti liquorem tertio, & succi solani dimidiam heminam affundito, & aquæ mullæ dimidiam semiheminæ partem ammiscito, diluito, ac bibenda dato, & sedantur dolorem, dato autem quo-
tidie, donec dolor quiescat. Bibat etiam silphii succum crvi magnitudine, & cum eo origanum tritum in vino albo diluat, & sic jejuni bibat. Bibat insuper & phar-
maca, quæ in pleuritide dantur doloris gratia, bibat & caprinum lac, tertia parte mellis ammixta. Sunt autem lactis heminae quatuor. Hoc mane bibat, quum alia non biberit. A cibis autem abstineat, donec judicetur morbus. Judicatur autem maxime in septem diebus, in his enim manifestum fit, an lethalis sit, an non. Si vero etiam suffocatio accesserit, hæc dare oportet, quo vomat. Mel, aquam, acetum, salem, permixta in ollam novam infundito. Deinde tepefacito, & origani capitati ramulis una cum semine agitato. Ubi vero tepefacta fuerint, tepida ebibenda dato. Deinde stragulis injectis coniectum finito, donec quammaxime exardat. Et ubi vomitus ipsum apprehenderit, promptè vomat, irritatio-
ne per pennam facta. Si vero vomere non possit, aquæ mullæ repide poculum duarum heminarum insuper bibat, & sic vomat. Et si quid petierit, aut bilis evo-
merit, tursus idem facere oportet ad horas quatuor, proderit enim. Post mor-
bi vero judicationem curato modicis cibis, iisque patris datis, & si quidem panem edere cupierit, panem calidum maxime purum edat. Si vero mazam eam, quæ vino dulci subacta non est, edat, ubi tamen prius aqua subegit. Obsonium autem habeat carnes catuli coctas, aut columbæ, aut pulli gallinæ carnis, omnibus coctis utatur. Ex piscibus autem galeo, torpedine, passinaca, & rais parvis, omnibus co-
ctis. Lavetur autem quotidie, & stigus viat, & parum deambulet antea in securitate. Hæc si servaverit, non est timor, ut morbus revertatur. Nam huiusmodi morbus
gravis est, ac diuturnus. Alius hepaticus morbus: Dolores quidem eodem modo premunt in hepar, & color differt a priore. Mallicori enim formam habet. In tempore vero æstatis maxime incidit. Fit autem a bubulæ carnis esu, & vini poru nimio. Hæc enim omnia isto tempore hepati sunt infestissima, & bilem maxime ad hepar adducunt. Hæc igitur æger patitur. Dolores acuti incidunt, & non desiciunt ulla hora, sed semper magis premunt. Aliquando etiam vomit bilem pallidam, & ubi vo-

- ubi vomuit, paulo melius sibi habere videtur. Si vero non vomueris, bilis ad oculos pervenit, & sunt valde pallidi. Et pedes intumescunt. Atque hæc patitur quandoque valde, quandoque minus. Quum autem dies præterierint, in quibus morbus iudicatur, dolor minus urget, si nihil deliqueris, & ejusmodi dietam huic constituere oportet, qualem & priori. Si enim inebriatus fueris intempestive, aut venere usus fueris, aut aliud quid feceris, quod commodum non est, hepar statim ipsi durum fit, & intumescit, ac a dolore pullat. Et si quid facere festinaveris, derespente hepar, & totum corpus dolet. Huic, ubi sic habueris, & primi dies præterierint, fomentum adhibeto, deinde scammonio subpurgato. Si vero venter combustus fuerit, clysterem ex iisdem, quibus in prioribus usus es, adhibeto, quæ probe ducant, & post clysterem, lacte asinino cocto subpurgato, octo heminis ejus, melle affuso, in potu datis. Dato etiam caprinum lac mane poculi quatuor heminas complectentis mensura, tertia parte aquæ mulæ ammixta. Dato item cocti lactis caprini heminas duas, tertia aquæ mulæ parte ammixta, aut ipso solo melle affuso, dandum est etiam equinum lac, eodem modo velut asininum, & si quidem ab his morbis curatus cedat, satis est; sin minus, dexteri cubiti internam venam secato, & sanguinem detraheo. Si vero non visus fuerit tibi per asininum lac subpurgandus esse, bubuli lactis crudi duas heminas dato, tertia aquæ mulæ parte ammixta, quotidie, quod dies decem. Deinde ad alios duodecim dies, sexta parte aquæ mulæ affusa, ad bibendum dato. De cætero vero ipsum lac diuturnum heminarum mensura, donec pinguescat, exhibeto. Si vero neque sic desinat, urere oportet, quum maximum hepar factum fuerit, & maxime emiqueris. Urato autem per buxæos sulfos, in oleum fervens tinctos. Apponito autem, donec tibi bene habere, & unctionem factam esse visum fuerit. Aut per fungos octo crustas iurito. Si enim ustio successerit, sanum facies, & reliquo tempore melius deget. Si vero non successerit, de cætero ab aliis sanis non fens, corrumpitur, ac moritur. * Alius morbus hepaticus. Reliqua quidem eadem patitur hic ager, velut priores. Color autem niger est. At hepatis sel, pinguia, & sanguine repletum, velut ratiocinamur, dirumpitur, & ubi disruptum fuerit, celerrime insanit, & indignatur, & loquitur stulte, & latrat velut canis. Et naves pumiceæ fiunt, & oculis videre non potest, & pili in capite erecti stant, & febris acuta corripit. Huic eadem adhibere oportet, quæ etiam prioribus. Plerique vero moriuntur in undecim diebus, paucique effugiunt. * Splenis morbus primus. Fit huiusmodi morbus propter caliditatem solis, bile commota, quum in se ipsum bilem traxerit. Hæc igitur ager patitur: febris acuta in principio accedit, progrediente vero morbo remittit, excepto ipso splene, in quo semper calor hæret, & dolor alias atque alias incidit acutus, & in lateris inollendineam, & in ventrem. Et cibos in principio quidem adurit, non autem valde secedunt, progressu autem temporis, & color pallidus fit, & dolor fortis irruit, & claviculæ attenuantur, & cibos non similiter admittit, velut in principio, & a modico impletur. Lien vero alias magnus fit eadem die, & alias minor: Huic, quum sic habuerit, veratrum purgans deorsum bibendum dato, & enidio cocco subpurgato. Ad vespertum autem post purgationem, lenticiu acidioris heminam forbendam dato, & betarum pinguum heminam polenta iisperfa; postera vero, & tertia die panem parvum dato, pro obsonio autem lenticula utatur, & carne suilla in lenticula cocta trita Vinum bibat austerum, uigrum, paulo meracius. Et quietem his diebus habeat, nisi quod intus in umbra paululum deambulet. Reliquo vero tempore hæc exhibenda sunt. Cibus sit panis, cui nihil furfurum decessit. Obsonium habeat carnem canis majoris, vel capræ, vel oviculæ tritam, & salsamentum Gaditanum, aut sapersam, & acida, ac falsa omnia assumat, & acerba. Bibat vinum coum subastringens quamnigerrimum, a dulcibus autem, & pinguibus, ac nidiosis abstineat, & silphium non accipiat, neque allium, neque carnem porcina. Neque mugilem, nec recentem, nec salsum, neque anguillam. Neque olus ullum coctum sine aceto. Ex troximis autem, hoc est his, quæ cruda eduntur, raphanide utatur, & apio, in aceto tinctis, & polentam vino subactam edat, & vium meracum sorbeat. Si vero velit, etiam panem in vinum interat, ac calidum edat. Deneur etiam pisces, scorpius, draco, cuculus, gobio, callionymus. Hos coctos, & frigidos dato. Dato etiam, quæ splenem attenuare possunt singulis diebus, asphodeli semen, aut visci solia, aut fœnum græcum, aut viticis semen, aut rutam, aut mentæ radicem, ex his quodcumque volueris tritum in vino austero dato ieiuno. Si vero adeo validus fuerit, per triginta dies ad ligna secanda cogito, & summis humeris luctetur, & interdum deambulet, & vespere dormiat. Mane vero surgat, & quæ relata sunt, edat. Si vero ab his non melius habeat, splenem fungis urito, decem magnis crustis iustis, quum maximus fuerit splen, & maxime elevatus. Si enim successerit ustio facta, velut oportet, sanum facies, verum non brevi. Opus enim habet morbus curatione. Gravis est enim, & diuturnus, si non fuerit statim curatus. * Alius splenis morbus fit quidem ab iisdem, a quibus & prior, patitur ager ab hoc morbo hæc. Venter inflatur; postea vero etiam splen intumescit, & durus est, & dolores acuti in splenem incidunt. Color autem mutatur, & conficitur niger, pallidus, malicorij speciem referens, & ex auge mala olet, & gingivæ male olent,

olent, & a dentibus discedunt, & ex tibiis ulcera erumpunt, velut pustula nocturnae. Membra vero attenuantur, & stercus non secedit. Hunc, quum sic habuerit, isdem pharmacis, & edulis, & potibus, & laboribus, atque aliis omnibus curato, & ubi stercus secedere noluerit, clysterem adhibeto ex mellis hemina dimidia, & nitri Aegyptii magnitudine tali ovilli. Haec tria in quatuor hominis aquae de betis coctis diluito, & per clysterem infundito. Si vero morbus ab his non sedetur, splenem ipsius urito, velut prius, & si istio successerit, sanum efficies. * Alius splenis morbus fit, in anno, veris maxime tempore, vetum a sanguine. Quum enim repletus fuerit splen sanguine, erumpit in ventrem, & dolores acuti in splenem incidunt, & in mammam, & in claviculam, & in humerum, & sub scapulam. Color autem corporis est plumbeiformis, & parva ulcuscula velut lacinata in tibiis exurgunt, ex quibus ulcera magna fiunt, & quae primum infra secedunt, sanguinolenta sunt, & aeruginosa, & venter durus subit, & splen velut lapis est. Hic morbus magis lethalis est, quam priores, & ex ipso pauci effugiunt. Hunc, quum sic habuerit, isdem purgato, quibus & priorem, verumtamen pharmacum sursum purgans ne dederis; deorum vero granum cinidum exhibeto. Et postera die etiam lactis equini cocti octo heminas dato, melle affuso. Si vero hoc non adsit, bubuli, aut caprini cocti duos congios praebeto, ita ut alternatim mel in poculum ammiscetur, & vicissim bibantur. Ad vesperam autem post purgationem eadem, quae prior, dato. Et si visum fuerit, ab interna cubiti sinistri vena sanguinem detrahiro. Reliquis autem diebus quotidie jeiuo lactis bubuli quatuor heminas dato, tertiae murtae parte ammixta. Cibis vero, & potibus, & aliis omnibus isdem curato, quibus & priorem. Abstineat autem a venere, & ebrietate hac, velut prior. Et si videatur, etiam urito, quum crassissimus, & maximus splen factus fuerit, & si opportune ulseris, ac successerit, sanum facies. Si vero ab hac curatione sanus non fiat, tempore corruptus moritur. Est enim nim morbus valde gravis. * Alius splenis morbus. Accidit & hic morbus vere maxime, quum splen pituitam assumpserit in se ipsum, & statim magnis factus fuerit, ac durus, & deinde rursus sedatur. Et quum quidem elevarus fuerit, dolores incidunt acuti. Quum vero mollis fuerit, doloris exors est. Et ubi diuturnus factus fuerit morbus, obscurior esse videtur, & insurgit, & cito sedatur. Hic, quum sic habuerit, in principio morbi cibos admittere non potest, & cito attenuatur, & corpus impotentiam multam habet. Morbus autem, si non statim curatus fuerit, aut sua sponte quieverit, interpositis quinque, aut sex mensibus, rursus insurgit. Intermitit autem maxime per hyemem. Hunc, si in principio acceperis, decem crustas in splenem urito, & statim sanum facies. Si vero non ulseris, isdem pharmacis curato, quibus & priores. Et aliis item isdem, & potibus, ac laboribus. Sic enim celerrime sanum feeris; huius autem color sit exalbidus, subpallidus, & squalidus. * Alius splenis morbus. Fit autumno maxime ab atra bile. Fit autem ab olerum multorum, quae cruda eduntur, escu, & ab aquae potu. Paritur itaque ager haec. Quum morbus corripuerit, splenem vehementer dolet, & rigor, & febris apprehendit, & inedia ipsum habet, ac cibos aversatur, & corpus cito concidit, Splen autem magnus quidem non valde fit, verum durus, & ad viscera allabatur, & adherens fugit. Hunc, quum sic habuerit, isdem pharmacis, & edulis, ac laboribus, quibus priores, curato. Et si se tibi exhibuerit, urito ipsum eo modo, quo etiam alios. Hic morbus in plerisque, si statim curatus fuerit, brevi decedit. * Quatuor morbi regii. Primus quidem aestate maxime corripit, bile commota. Consistit igitur bilis sub cute, & in capite, quare statim corpus in alium colorem mutat, et fit pallidum, velut malicorium. Et oculi pallidi sunt, et in capite sub pilis velut cortex subest, et rigor, ac febris corripit, et pallidum urinam mingit, et crassum subpallidum in ipsa subidet, et manet, quandiu jeiuus fuerit, ad cor, et viscera exurgitur, et si quis ipsum alloquatur, aut interroget, aere fert, et anxius fit, et non sustinet audire. Stercus autem excrementum cum pallore albicat, et male olet. Hic, quum ita habuerit, maxime moritur in quatuordecim diebus. Si vero has effugiat, sanatur. Curare autem oportet ipsum sic. Quum febris remiserit, multa calida lavato, et aquam multam bibendam dato. Et sorbitionibus utatur pitanae succo, melle affuso. Mel autem non simul coquito, donec praeterierint quatuordecim dies. Hi enim iudicant, an lethalis fit morbus, aut non; postea vero bis in die lavato, et nutritio primum modicis quaecumque maxime admiserit, postea tamen plura dato. Vinum bibat album plurimum per diem, et si progressu temporis videatur tibi pallidus esse, et debilis, vomitum a cibis facere iubeto, velut in superioribus morbis habetur. Et si quidem ab his morbis quiescat, satis est; sin minus, veratrum bibendum dato. Post talem autem purgationem, ad vesperam edat mazam mollem, aut panis medullam. Obsonium vero edat, pullum gallinaeum percoctum, probe conditum cum cepa, coriandro, caeseo, sale, sesamo, et uva passa alba. Vinum autem bibat album, austerrum, vetustissimum. Alvum vero infra subpurgato, postera die succo ciccorum alborum, melle affuso, utatur, et duas heminas ejusmodi succi ebeat. Tertia vero die initio facto, singulis diebus hanc aquam bibat, ex his rebus coctam

- 370 feniculi radices tenues ea copia, quanta tribus digitis comprehendi potest, in duos aque congius mittito, ac coquito usque ad dimidias. Et cicerum alborum chœnicon, in duobus aque congiis ad dimidias item coquito, & quod superest excolatum sub dio per integram noctem exponito, & ambo hæc decocta misce-
 375 ro. Cum hac aqua & vinum temperatum bibat, & ipsam aquam solam, si velis, quam plurimam bibat, & aliam aquam non bibat. Si vero hanc portionem non admi-
 sent, aliam sic præparatam dato, Caricarum albarum chœnicon in duobus aque congiis coquito, excolato, & sub dio per integram noctem exponito, postea hanc
 380 aquam bibat, siue nucleam ipsam voluerit, siue cum vino mixtam. Bibat autem non acervatim multam, sed pro una vice dimidiam heminam, ut ne alvi profluvium ipsi succedat, & modico tempore interposito rursus bibat, Commoda autem sunt
 & hæc in potu data ieiuno singulis diebus, trita, & in vini veigris albi hemina diluta, apii semen, cucumeris semen, feniculi semen, cuminum Æthiopicum,
 385 adiantum, coriandrum herba, uve passæ albæ. His, & illis in potu acceptis uti-
 litatem percipiet, & celerrime sanus fiet. * Alius morbus regius, siue arcuatus, hic corrumpit tempore hyemis, & ex ebrietate, & rigore. Incipit autem primum ri-
 390 gor invadere, postea etiam febris perinet. Et humor, cui est in corpore, conge-
 larur in cute. Quod autem sic habeat, ex his ostenditur. Lividum est ipsius corpus, & subdum. Et venæ per corpus distentæ sunt pallidæ, majores autem, & cras-
 siiores sunt, quam prius. Et aliæ venæ subnigriores distentæ sunt. Et si quis aliquam
 395 ipsarum secet, sanguis effluet pallidus, si pallida sunt venæ. Si vero nigra fuerint, niger sanguis effluet. Et vessem interiore corpori adjacentem, præ pruritu non
 sustinet. Hic promptus est ad iter faciendum, & ambulandum, sed præ debilitate crura labasunt, ac ipsum non sufferunt, & sinit vehementer. Hic morbus non
 400 minus priore lethalis est. Procedit autem ad amplius tempus, si non in primis diebus sanus fiat. Si vero morbus prolongetur, & ad octavam, aut nonum diem
 durer, in morbum incidit, & morbus, & dolor magis premit, & exurgere non potest. Et plerique in hoc tempore statim pereunt. Huic, ubi sic habuerit, si quidem
 principio morbi accesserit, quum iam septem dies præterierint, veratrum bibendum dato. Ventrem vero infra subpurgato per succum, velut priori. Et alia ead-
 405 em pharmaca dato. Exhibeto & cantharidas sine alis, & capite quatuor tritas, & in vini albi hemina dimidia dilutas, modico etiam melle affuso. Atque has bis, aut ter in die bibat. Progrediente vero morbo, balneis, & fomentis curato. Edat
 autem, quæcumque admittit. Vinum bibat album, anisum, & alia eadem assu-
 410 mat, quæ prior. Hic morbus diurnus est, & gravis, si non ab initio probe fue-
 rit curatus. † Alius morbus regius, Popularis appellatur hic, eo quod omni tempore corrumpit. Fit autem a repletionem maxime, ac ebrietate, & postquam
 415 fuerit, statim sane corpus immutatur, & pallidum fit, & oculi pallidi valde sunt. Et sub pilos, ac sub ungues morbus procedit. Et rigor, ac febris debilis tener. Et de bile est corpus, & in capite dolor adest. Et pallidum, ac crassum mingit. Hic mor-
 420 bus minus lethalis est prioribus, & curatus brevi sanatur. Huic, quum sic habue-
 rit, cubiti venam secato, & sanguinem detrahito. Deinde fomento adhibito, elaterrimum bibendum dato. Tertia vero die rursus infra subpurgato cum lacte as-
 425 nino. Reliquas vero lorbitiones, & potus, ac edulia eadem dato, quæ priori. Et caput ipsius frequenter purgato, & de succo bibendum dato. Et multa calida ip-
 sum lavato, ac carnem desiccato, & desiccatas lordes in vino albo bibendas da-
 430 to, & ad alia omnia iisdem utatur, & brevi sanus evadet. † Alius morbus regius, Fit quidem a pituita, hyeme autem maxime corrumpit, & color ipsius ægri est
 435 albus, & pectora ipsius pituita plena sunt, & spuit salivam, & quom excreat, sin-
 gultus ipsi pboritur. Et album loquium, ac crassum ipungit, & in urina subsidet, velut farina. Hic morbus non est lethalis, & brevi sanatur. Huic, quum sic ha-
 440 buerit, cnidium granum bibendum dato. Et post purgationem, succi pitane qua-
 tuor heminas, melle affuso, exorbendas dato. Superiorem vero ventrem, vomitu inducto, velut in prioribus purgato. Sic enim facillime pituitam a pulmone, & arteriis abduxeris. Sed & gargarismum ipsi frequenter præparato. Hic aliquan-
 445 do etiam febricit debili febre, & horror tenuis succedit. De cætero vero iisdem, quibus priores, curato, & pharmacis, & fomentis, & balneis, & edulis, & potibus, & lorbitionibus. Sic enim maxime sanum facies.

SECTIO III.

42

* Morbus, Typhos vocatus.

TYphos quidem appellatur hic morbus, hoc est stupor attonitus, corrumpit autem tempore æstatis, quum canis sydis oritur, bile per corpus commota. Statim igitur ipsum febres fortes tenent, & calor acutus, & a gravitate debilitas, & crurum, ac manuum impotentia; maxime enim inutilia ipsi sunt hæc membra, & venter turbatur, & quæ secedunt grave olent. Et tormen forte succedit. Sed hæc patitur: si quis ipsum erigere velit, erigi non potest, neque oculis videre potest præ calore. Et si quis ipsum interrogat, præ dolore respondere non potest. Quum autem moriturus est, acutius videt, & loquitur confidenter, & bibere, ac edere cupit, & si quis det, quod edat, brevi etiam animam emittit, si non evomerit. Huic morbus hic judicatur in septem, aut quatuordecim diebus. Multi vero perveniunt etiam ad viginti quatuor. Si igitur hos transierit, sanus erit. Nam in his diebus judicatur, an lethalis sit morbus, aut non. Hunc, quum ita habuerit, sic curato. In primis quidem diebus a balneo abstineat. Unguatur autem vino, & oleo tepido in lecto, & a cibis abstineat. Sorbitiones autem tenues frigidæ dato. Vinum autem bibat nigrum, austerrum, si ipsi conducatur. Sin minus, album, aquosum, austerrum. Si vero sitis fortis premat propter calorem, potu acervatim dato, evomere iubeto, bis, aut ter hoc repetito. Et quum calor habuerit, lintea aqua frigida tincta apponito, qua parte se maxime ardere dixerit. Si vero horrorem habuerit corpus, frigidatoria remittito. Hic, quum doluerit, ab huiusmodi maxime dolore petulicatur, ne repente animam relinquat. Verum exhibere oportet ipsi doloris causa festinanter eadem pharmaca, quæ ei, qui a pleuritide tenetur. Quum autem exstiterit, cibo, & potu, & balneis quamcelerrime refocillato. Morbus enim est difficilis, & pauci effugiant. * Alius typhos. Corrumpit quidem hic morbus omni tempore, fit autem propter corporis humiditatem, quum cibos humidos, & potum multum carnes combibunt, & fluidæ fiunt, ab his maxime fit morbus. Incipit igitur febres tertiana, aut quartana, in principio fiens. Et dolor fortis in capite consistit. Aliquando etiam in corpore intermittens. Et vomit salivam, & frequenter eructat, & oculorum regiones dolet, & facies albescit, & tumor in pedes descendit. Quandoque vero etiam totum corpus intumescit. Et ad pedora, & ad dorsum aliquando dolor currit, & venter turbatus est, & oculis fortiter tuerit, & salivam multam, & spumofam expuit, & in faucibus detineri videtur, & exasperat ipsas. Sæpe vero etiam inflammantur fauces. Hic, ubi sic habuerit, & dolor ita presserit, & erectæ cervicis spiratio fortis inciderit, quandoque derepente præ dolore animam emittit in septem diebus, aut quatuordecim. Multi vero usque ad viginti quatuor dies durant. Sæpe vero etiam derepente morbus remittit, & æger sanus esse sibi videtur. Verum observare oportet, donec quatuor, & viginti dies præterierint. Si enim has effugerit, non ita valde moritur. Huic, quum ita habuerit, in primis diebus sorbitiones dare oportet, farinam coctam, tenui melle assulso. Vinum vero dandum est nigrum, paulatim, prout volueris, candidum granum dato. Et post purgationem, farinæ coctæ, & pinguis duas heminas exorbendas dato. Vinum autem bibat idem. Ex pharmacis, & sorbitionibus, ac potibus, quicquid dederis, profuerit, siue singulatum, siue plura simul exhibueris. Atque sic celerrime sanum feceris. Morbus autem est gravis, & pauci effugiant. * Alius typhos: hic quidem propter hoc fit. Quum bilis putrefacta ammixta fuerit sanguini, per venas, & articulos, quum sanguis steret, consistit quidem maxime in articulis. Incumbit autem quandoque etiam in reliquo totum corpus, & dolores acutos exhibet, et multi ex huiusmodi morbo claudi fiunt, quum bilis in articulis conclusa in totum calleat. Dolor autem intermittens corrumpit per tres, et quatuor dies. Hunc, ubi sic habuerit, hoc modo curato. Dolo in corpore prevalente, tepesfactoria facere, et adhibere oportet, oleo prius illito. Quum autem remiserit, veratrum ipsi dato, toti corpori antea fomento adhibito. Postera die serum caprinum coctum bibendum dato duorum congiurum mensurâ, ita ut in alterum congiurum mel affundas, et in alterum sal adicias, deinde poculis viciis permixtatis bibat, donec totum ebiberit. Ad vespertam vero post purgationem, lenticulæ heminam sorbeat, et betarum pinguium heminam, polenta misculata, ebibat. Et

Idip. Opera.

O 2

- 65 bat. Et pulli gallinacei carnem, aut columbar, aut turturis, aut oviculæ, aut suis pinguem edat. Veratrum autem per sextum diem dato, & si alibi in articulis tumor fiat, & discessus fieri nolit, cucurbita affixa sanguinem detrahito, punctura per acutum triangularem facta in genua, si in genibus tumor fuerit. Verum nullum ex aliis articulis perpunxeris. Interpositis autem diebus cibum accipiat, panem maxime allatum. Mazam vero maxime oleo, & melle subactam. Obsonia vero habeat, maxime quidem assatas carnes volucrum, non fassas, sin minus, etiam coctas, conditas, verum sine caseo, & sesamo, & sale. Piscibus autem utatur carnosissimis, assatis eodem modo, velut carnes, & coctis origano conspersis, ac oleo ipsi affuso. Vinum autem bibat album, si conducatur, aut si hoc non commodet, nigrum, & indeambulationibus se exerceat per diem & post cœnam, & mane. Serum autem, & lac pro tempore semper bibat. Si vero tibi visum fuerit, etiam asinum lac decoctum dato. Et si sanus fiat, in custodia ipsum esse oportet, ut ne a frigore, & astu laedatur, & cibus non valde expleatur. Periculum est enim, ne morbus revertatur. Hic itaque morbus, si sic curetur, in sex mensibus sanatur. In tor enim mensium spatio iudicatur, an mortalis sit, aut non, etiam si statim curetur. Nam morbus est gravis, & plerisque commoritur. * Alius typhos. Fit quidem hic morbus in tempore pomorum, quum quis se fructibus mollis corticis, & soris non lignosis, omnis generis tepleverit. Plerisque vero etiam ab his factus est talis morbus, ubi videlicet placentarum, & liborum sesaminorum, & aliorum dulciorum ex melle paratorum, elu se infatigabili.
- 85 Inter expleverunt. Mel enim coctum assuosum est, & ventri adheret, postea, quum concoctum fuerit in ventre, effervesceat, & venter derepente attollitur, & ardet, ac dirumpi videtur. Deinde repente ventris profluvium succedit, & quum semel secedere inceperit, per multos dies purgatur, & multi post hanc purgationem sani fiunt. Quum igitur sua sponte purgari cessaverit, lentum succi tres semicongios ipsum ebibere cogito, sale adiecto; post purgationem vero succi, ad vesperam lenticulæ frigidae non fassæ heminam forteat. Multum autem sibi in ipsam deradat, & betæ pinguis non condita heminam, polenta inspersa. Vinum autem bibat nigrum, austerum, paulatim. Reliquo vero tempore eadem faciat. Et cibos accipiat panem exassatum, & mazam oleo, & melle quammaxime subactam. Primis autem diebus farinam edat coctam frugesactam, melle affuso. Vinum autem bibat nigrum, acerbum, & donec quiesceat morbus, hæc assumat. At qui ex fructibus morbo arreptus est, statim sentit, & tormen, & dolorem, & cibi secedere non volunt, & venter ipsius magnus, ac durus est, & rigor, ac febris habet. Huic, si quidem sponte turbatus fuerit venter, in viginti diebus ut minimum purgatur. Et quum purgare cessaverit, sanus statim erit. Si vero non fuerit purgatus, purgato ipsum hippophaissacco, aut cnidio grano. Ad vesperam autem eadem exhibeto, quæ ei, qui sponte purgatur. Postera die, si febris habuerit, quietem habeat. Et de eodem vino in aqua frigidissima ipsi bibendum dato. Si vero febris non habuerit, victu utatur non humido, sed fortiore. Et deambulet, coniectura iuxta cibos facta. Ab hoc morbo multis jam aqua intermixta facta est. Et si tibi clysterem adhibere visum fuerit, eadem, quæ etiam hydropico, per clysterem infundito. Si vero volueris, hæc infundere potes. In aqua mæssa hemina herbarum thapliæ coquito, & sic infundito. Hic hoc modo curatus celerissime sanus erit. * Alius typhos. Fit hic morbus, quum humor, qui est in corpore, putrefactus fuerit, & magis, quam oportuit, est, resiccatus. Fit igitur æger hoc morbo correptus, specie limpida, ac humectus, subpalidus, pellucidus, & vesicæ urinæ similis, verum non intumescit, sed tenuis, & aridus est, ac debilis. Attenuantur autem in corpore maxime claviculæ, & facie fortiter gracilescit, & oculi valde sunt excavati, & hæc quidem a morbo patitur. Color autem corporis niger est, transa vero hæc est. Quum bilis atra in venas, & ad cutem subierit, & postea calor successerit, necesse est a calore venas comburi, ac resicari. Quare sanguis e venis excedit, hæc igitur patitur. Hic tenuis sit, & fortiter gracilis, & oculis raro nictat, & muscas a stragulis venatur. Et gravitas ciborum major est, quam quum sanus esset, & lucernæ eximie odore delectatur, & frequenter seminem per somnum effundit. Saepè vero etiam inter eundem genitura ipsi exit. Huic,
- 120 quum sic habuerit, ventrem nigro veratro purgato, supernum videlicet, infernum vero scammonie succo. Post purgationem vero eadem, quæ & aliis dato, & serum, ac lac bubulum, aut caprinum pro tempore exhibeto, dato & lac asinum decoctum ad purgationem. Hic ita curatus in duobus maxime annis sanus fit. Cibos autem, quos vult, assumat, & quammaxime nutriatur, & deambulet, coniectura ad cibos facta. Hic morbus corripit majorem viginti annis. Ubi vero corripit, si non a principio morbi quis curatus fuerit, non desinit, nisi viginti anni præterierint, sed adhæret. Postea ab aliquibus, dum curantur, decedit. Morbus autem gravis est. * Volvuli porro vocantur hi morbi, sunt autem maxime ab his. Si hyemis tempore quis calido, & humido victu utatur, & non deambulationibus se exerceat, respectu ad cibos facto.
- 130 Verum repletus semper dormit, & deinde longum iter perficere cogatur, frigore veniente. Deinde tiquerit sub ossa, hæc igitur patitur. Flatus in toto corpore oboritur, & color ipsius sit plumbeiformis, & riget semper, ut etiam calida ipsi affusa, calida esse non videatur. Corpus autem ipsius, dum lavatur, a calida desquamatur, maxime

maxime scrotum, et si digito corpus compresleris, impressionem faciens, et notæ tibi apparebunt, velut in farina aqua subacta. Maxime autem in portibus impellionem perfert. Crura vero ipsius gravia sunt, et si obambulet, tremat, et si ad acclivem locum iter faciat, vehementer anhelet, et ulnæ dependere videntur, et sitis urget noctu, cibi vero crudi secedunt, quousque ingessit. Huic, quum sic habuerit, fomento prius adhibito, cneorum bibendum dato, aut hippophais succum, aut enidium granum, post purgationem vero eadem dato, quæ prioribus. Postera die lactis asinini cocti congiunt dato bis ebibendum, sale adiecto. Ad vesperam cœnet panem. Obsonium autem habeat, oviculæ carnes coctas, et polypos coctos in vino nigro, et pisculum sorbeat, et lenticulam habeat sic præparatam, heminam lentis coctam probe terito, deinde farinam ammisceto, et silphium darsalum addito, et sale adjecto, et acetum affundito, et allium ad hæc simul coquito, et affusa aqua bis, aut et fervefacito, et cum tudicula undique expassa brachia habente, simul ipsa agitato, deinde ablata frige facito. Sit autem non valde crassa, et odoris gratia etiam pulegium, ut simul coquantur, adiciatur. Intermedius vero diebus, vomitus faciat per sextum diem. Verum alias atque alias ante vomitum, et pharmaci potum, fomentum adhibere oportet. Et per tertiam diem lavetur, si conducit, sin minus, ungatur. Et deambulet, si ita potens fuerit, conjectura ad cibos facta, et sambuci, ac conyzae semper teneræ folia cocta edenda dato. Sic enim curatus, facillime deget, et morbus annuum desinet. Multis vero jam sanis factis, post duos annos morbus reverſus est. Sed si hoc contingat, eodem modo curetur. Si vero tertium revertatur, tumor quidem non succedit. Tenuis autem fit et gracilis, incipitque a facie attenuari, et colore exalbescit magis quam prius. Huic quandoque aqua inretus fit in ventre. Si igitur facta fuerit, secate ipsum non oportet, moritur enim, sed usdem curare, quibus eum, qui a splene aqua inter cutem laboret. Hunc maxime in principio curare velis, et sic cito sanum facies. Opus autem habet morbus multa curatione. Est enim gravis.

48 * Alius volvulus arcuatus. Hic maxime ætatis tempore in palustribus regionibus corripit. Magis autem ab aquæ potu. Multi vero jam a tali morbo correpti sunt, ex volutatione ad solem capitis dolore affecti. Verum similia prioribus patiuntur, excepto colore. Nam pallidus fit æger, velut malicorum. Et oculi aliquando morbo arcuato implentur. Hunc, ubi sic habuerit, usdem curare oportet, quibus priorem. Danda etiam in potu aqua a cicere albo cocta, et cum vino eadem permixta danda est, & caput eius tetragono medicamento purgetur. Hic minus quam prior lethalis est, et vocatur volvulus arcuatus. * Volvulus hamatites. Reliqua quidem eadem pariter cum prioribus. Incipit autem morbus autumnò fieri. Hæc vero in morbo accedunt. Ex ore male olet a dentibus, et gingivæ discedunt, et a natibus sanguis fluit. Aliquando etiam ex cœturibus ulcera pullulant, et alia sanescunt, alia emergunt. Et color niger fit, et cutis tenuis. Est autem ad deambulandum, ac laborandum promptus. Hunc, ubi sic habuerit, usdem curato, quibus priores, et hæc per clystereum infundito. Cucumeris sylvestris folia quinque terito, et mellis dimidium hemina ammisceto, itemque olei heminam dimidiam, et salis, quantum una manu comprehendere poteris, et succi betarum heminas quatuor. Ad subpurgationem vero lactis asinini cocti heminas octo exhibeto, melle affuso. Bibat etiam bubulum lac pro tempore per quadraginta dies. Bibat item mane bubuli lactis duas heminas, tertia aquæ mulæ parte ammixta, per intermedios dies. Hic morbus multa medelâ opus habet, sin minus, non exit, sed cum homine moritur. Vocatur autem volvulus hamatites. * Morbi crassi appellati. Ex crassis appellatis morbis hi maxime fiunt. Quum pituita, & bilis mixta fuerint in corpore, fluunt in ventrem, & quum congregata fuerint in ventre, atolluntur, & sursum, ac deorsum discurrent, velut unda, et rigor, ac febris corripit. Et dolor in capite consistit, & quum dolor circa viscera constituerit, suffocationem inducit. Aliquando vero vomit pituitam acidam, quandoque etiam salivam, & postquam evomuit, os amarum ipsi esse videtur. In lateribus autem rubores desinentur. Nam quum pituita in ventre sit, sanguis a caliditate congregatus in latera allapsus est, & rubores in lateribus exierat. Et calor maxime latera occupat, ac costas. Et dorsum ipsius incurvum fit. Et quum maxime doleat, corporis contactum non sustinet. Nam velut ex ulcete dolet. Et carnes præ dolore vibrantur, & testes contrahuntur, & in sedem, & in vesicam calor quidam, ac dolor intra, et mingit crassum, velut in aqua inret cutem. Et ex capite defluunt capilli, & pedes semper frigidi sunt, & dolor premit maxime latera, & dorsum, & collum, & ad cutem aliquid ipsi proserpere videtur. Morbus vero quandoque urget, quandoque remittit. In progressu autem magis assidue premit, & cutis capitis crassa, ac tubicunda est. Hic usque ad sex annos talia pati perseverat, postea & sudor multus diffunditur, & male olet. Sæpe vero etiam per somnum semen effundit. Quod vero per coitum emittit, subcruentum, ac sublividum prodit. Hic morbus fit propter calorem solis, & aquæ potum, proinde hunc, quum sic habuerit, cneoro, aut hippophæ, aut enidio grano dato, subpurgato, dato etiam lactis asinini cocti heminas octo bibendas, melle affuso, postera die post purgationem eadem, quæ aliis, exhibeto. Primis autem diebus ex usdem nutriatur, ex quibus etiam is, qui ab aqua inter cutem correptus est, & deambulationibus se exerceat, si ita

- potens fuerit. Si vero præ febribus impotens fuerit, & cibos edere non poterit, leuiculae forbitione utatur, potu vero vino nigro quammaxime austero. Hic morbus maxime corripit autumnus, & tempore fructuum pomorum. Hic si quidem curatus fuerit in sex annis, satis est, si minus, adhæret ulque ad decem annos. Cum multis vero simul moritur, si non statim curatus fuerit. * Alius crassus morbus. Tales crassi morbi a bile sunt, quum bilis in hepar influxerit, & in capite confluere. Hæc igitur æger patitur: hepar intumescit, & præ tumore ad septum transversum expanditur, & dolor statim in caput irruit, maxime vero in tempora, & auribus non acute audit. Sæpe veto etiam oculis non videt, & horror, ac febris corripit. Atque hæc quidem in principio morbi ipsi sunt, intermittentia quandoque valde, quandoque minus. Quanto autem magis morbus progressus fuerit, tanto amplior dolor in corpore existit, & pupillæ oculorum disperguntur, ac hebetantur, & si digitorum oculis admoventis, non sentit, eo quod non videt. Quod autem non videt, ex hoc cognoveris, quod admodum digito non nictat, & floccos de stragulis tollit, si quos videt, pelliculos ipsos esse putans, & quum hepar magis ad seipsum transversum expansum fuerit, delirat, & ob oculos ipsi obversari videntur reptilia, & omnis generis peregrinæ feræ, & milites armati pugnantes, & ipse sibi inter ipsos pugnare videtur, & talia loquitur, velut qui videat pugnas, & bella gerit, & invadit, & minatur, si quis ipsum exire velit, & si surrexerit, curra e levare non potest, sed concidit, & pedes ipsius frigidi sunt. Et quum dormit, exilit a somno, & timet, quum insomnia viderit horrenda. Cognoscimus autem hoc, quod ab insomniis exilis, ac timet, postquam respiceret. Nam insomnia denarrat, & ea, quæ corpore fecit, & quæ lingua loquutus est. Atque hæc quidem sic patitur. Quandoque vero etiam per rotam diem, ac noctem voce privatus facit, respiciens spiritum multum accervatum. Quum autem delirare cessavit, statim e vestigio respicit, & si quis ipsum interrogat, recte respondet, & comoscit, ac intelligit omnia, quæ dicuntur, deinde rursus post modicum tempus in eisdem afflictionibus facit. Hic morbus accidit maxime in peregrinatione. Et si quis alicubi per desertum viam iter faciat, & timor ipsum exspectro corripiat. Fit etiam aliter. Hic, quum hic habuerit, vetatissimi obolorum quinque pondus in vino dulci bibendum dato. Aut hæc per clysterem infundito. Nitri Aegyptii magnitudinem tali ovilli terito, & mellis optimi cocti dimidiam heminam, & olei dimidiam heminam in mortario ammisceto, & aqua a betis coctis heminas quatuor per noctem sub dio expositas addito, aut si volueris, pro betis lac alinum coctum ammisceto, & hæc mixta per clysterem immitte, si febris habeat, si non. Sorbitionibus autem utatur, pessana cocta, melle assufo. Bibat etiam mel, & aquam, & acetum simul permixta, donec iudicatus fuerit morbus. Judicatur autem in quatuordecim diebus ad summum, si febris est, si non. Multis autem jam huiusmodi morbus sedatus, rursus rediit. Si igitur redierit, periculum est, ne æger pereat. Judicatur autem morbus in septem diebus, an lethalis sit, aut non. Si vero hæc effugerit, non valde moritur, sed morbus in plerisque curatus decedit. Quum autem deliravit morbus, diæta bona datur, quiete ingens, quæ ventri suscipit, & non comburantur, neque ventris profluvium succedat, ambobus enim hæc periculosa esse videntur. Lavetur autem quotidie, & deambulet post cibos modice. Veste vero induatur levis, ac molli, & pro tempore anni hæc, & ferum bibat per quinque ac quadraginta dies. Hæc si fecerit, celerrime sanus erit. Morbus autem gravis est, & multa cura opus habet. * Alius morbus crassus. Fit a pituita putrefacta. Quod autem putrida est, unde fit, ex hoc manifestum est. Eructat ab hac, quod odorem habet, velut si quis raphanides edisset. Incipit autem fieri talis morbus a cruribus, deinde ab his ascendit ad ventrem. Et quum in ventre constitit, rursus decurrit ad viscera. Et quum in his constitit, sinit, & vomitum facit, pituitam acidam subputridam eductens, & ubi evomunt, non habet se ipsum, neque sibi constare æger. Deinde angustus fit circa viscera. Quandoque etiam in caput dereperit, dolor incumbit acutus. Et auribus acute audit non potest, neque oculis videt, præ gravitate, & sudore multa diffunditur male olens, & maxime quum dolor habuerit, & morbum levat. Color autem ipsius arcuatus apparet. Hic morbum priore paulo minus lethalis est. Hic, quum ita habuerit, ventrem purgato, deorsum quidem per hippocratis, sursum autem per vesatrum, & caput tetrageono purgato, & quum a veratrum purgatus fuerit, postera diæ lacte alnino cocto subpurgato. Tertia deinde epismo cocto, & similiter quarta, ac quinta. Reliquis vero viginti diebus, lac bibulum crudum, aut etiam caprinum dato, tertia aquæ melleæ parte amittatur. Bibat autem lactis coagum. Post purgationem vero deorsum verus, eadem pharmaca exhibentur, quæ hydropicis. Reliquo tempore, quum lac bibit, tænet panem coctum. Obsonium autem habeat ex piscibus scorpion, aut callionymum, aut cuculum, aut squatinæ fensum cum condimentis coctum, ex carnibus ovillas, aut gallinæ pullos coctas. Vinum bibat album, si conducatur, si minus, nigrum austerum, deinde potu cibum deambulet, ne ne frigat. Si quidem igitur conducant, cibos huiusmodi, qui dicti sunt. Si vero non conducunt, forbitiones dato præsanæ, aut militi. In hoc morbo, si æger triginta dies transgressus fuerit, sanus fit, si enim iudicant, an lethalis sit, aut non. Est autem morbus gravis. * Alius morbus crassus.

crassus. Fit hic morbus a pituita alba. Congregatur autem in ventre, quam fe-
bres diuturnae corpus occupant. Initium hic morbus a facie sumit, & intume-
scit facies, deinde descendit in ventrem, & ubi in ipso consistit, ventrem ma-
gnum attollit, & corpus velut a labore lassatur, & in ventre gravitas inest, &
dolor torrens, & pedes tumunt, & si pluvia in terram effundatur, pulveris odo-
rem non sustinet. Si vero in pluvia steterit, & terram odoret, detrepente cadit.
Hic morbus interquiescens, longiore tempore quam prior, occupat, & tardius decedit.
Curare vero ipsum oportet isdem, quibus hydropicum, fomentis videlicet, & phar-
macis, & edulis, & laboribus. Hic morbus per sex annos maxime obtinet. Dein-
de decedit temporis progressu, si probe curetur, etiam si non in principio fuerit cura-
tus. Est autem morbus difficilis, & multa cura opus habet. * Coxendicum mor-
bus ex his maxime causis fit plerisque. Si quis diutius in sole versetur, & coxendi-
ces fuerint calefacti, & humor, qui est in articulis, a calore fuerit resiccatus.
Quod autem id, quod resiccatur, condensatur, ac constringitur, hoc mihi signum est.
Ager enim articulos vertere, aut movere non potest per dolor, qui est in ipsis,
& eo, quod verticilla sunt compacta. Dolet autem maxime lumbos, & verticilla ex
obliquo iuxta coxendices, & gentia, consistit autem dolor multo tempore in inguin-
ibus, simulque coxendicibus, acutis, & aestuosus, & si quis ipsum erigar, aut trans-
moveat, prae dolore ejulat, quammaxime potest. Aliquando etiam convulsio succedit,
& rigor, ac febris, fit autem & a bile, & pituita, fit item a sanguine dolor consimilis
velut ab omnibus morbis, & rigor, ac febris aliquando corripit debilis. Ceterum eum,
qui a sole hoc morbo correptus est, sic curare oportet. Corpus ipsius fomento
humectetur, & cibi, ac potus, & alia, quae exhibentur, tepida, ac humida pra-
beantur, atque haec omnia cocta. Cibaturatur, maza niolli, vino dulci non subacta. Vi-
num bibat album, aquosum, & corpore quietem habeat, & quamvis impotens fuerit,
ut exurgat, tamen modice singulis diebus deambulet, & ne frigeat, & non multa
aqua lavetur, & quum tibi bene habere visus fuerit, & corpore humidus esse, leni
fomento vehementer foveo. Magis enim remittit, & condensationem ex articulis
humectat, ac relaxat. Deinde postera die cnidium granum bibendum dato. Si vero
non profuerit, haec per clysterem infundito: cumini heminam dimidiam teritro, &
colocynthemidem integram, parvam, ac rotundam in mortario tundito, ac cribrato, &
nisi rubri Aegyptii minae quadrantem torreto, ac terito. Atque haec in ollam con-
siccato, & olei heminam, mellis heminam dimidiam, vini albi heminam, & succi betae,
quantum videbitur, affundito, & donec bonam crassitudinem habere visa fuerint, co-
quito. Deinde per lineum excolato, & si mel non simul coquere velis, mellis Atti-
ci heminam ipsi ammisceto. Si vero Atticum non habeas, optimi alias cocti hemi-
nam in mortario ammiscito. Si vero crassius fuerit hoc infusum, de eodem vi-
no affundito, iuxta crassitudinis respectu habito, & per clysterem infundito, dein-
de usque ad dies tres purgari sinere oportet. Si vero pluribus diebus purgetur,
bulbuli, aut caprini lactis heminas tres ebibendas dato, deinde betas pingues, non
salas, condimentis consperfas, edendas exhibeto. Ex hoc morbo multi claudi fa-
cti sunt. * Si vero a bile morbus fiat, veratrum deorsum purgans ipsi bibendum
dato, aut scammoniae sucum, post huiusmodi vero purgationem, succi persanae
melle affuso, heminas duas exorbendas dato; postera vero, aut tertia die abhibi-
to fomento, lacte asinino cocto subpurgato. Ad vespertim autem pinguis betae
heminas duas edat, polenta inspersa. Vinum bibat album, aquosum, dulce & nunc,
& post pharmaci purgationem. * Si vero a pituita agrotet, cnidium granum, aut
hippophaes, adhibito prius fomento, bibendum ipsi dato; post purgationem vero
easdem sorbitiones, & ac potus exhibeto. Itemque lactis potionem. Intermedias autem die-
bus, diata quamvisissima utatur. Et si quidem ab his utilitatem sentit, bene est; sin minus,
ipsum urito multis, ac profundis crustis inustis, in ossis quidem partibus
per fungos, in carnosus autem per serratamenta. * Si vero a sanguine agrotarit, fomen-
tum adhibeto, & cucurbitam affigito, & venas in poplitibus secato. Si autem tibi
visum fuerit, etiam cnidium granum ipsi bibendum dato. Diata vero quamvisicissi-
ma utatur. Vinum autem ne bibat. Si vero bibere velit, quamvisimum, & aquosissi-
mum dato, & modice deambulare jubeto, aut si potens fuerit, plurimum. Condu-
cit autem & a pituita agrotanti talia facere. Si vero stare non possit, in lecto ipsum
quamfrequentissime circumferre oportet, a quacumque causa agrotarit, per omnia si-
militer, ut ne intus chartilago concreseat. * Si vero concreverit, & articuli conglu-
tinati fuerint, omnino necesse est hominem claudum fieri. Et si clysterem adhibere
volueris, ei, qui a sanguine agrotat, quo sanguinem, ac pituitam a coxendicibus
abducas, haec infundere oportet. Salis pugillo trio, olei heminam, & de hordei
decocto duas heminas ammisceto, atque sic infundito. Si enim sic curationem fe-
ceris, celerrime sanum facies. Morbus autem gravis valde est, ac diuturnus. * Te-
tani tres. Si ob vulnus tetanus, sive distencio fiat, ager haec patitur. Maxillae con-
glutinantur, & rigent, & os aperire non potest, & oculi lachrymantur, ac detrahun-
tur, & dosum conglutinarum riget, & crura flectere nequit, neque manus, neque
spinam. Quum autem lethalis fuerit, potum, & cibos, quos prius acceperit, aliquando
per nares reddit. Hunc, quum sic habuerit, fovere oportet, & pinguiter unctum,
Hipp. Opera, O 4 ad ignem

- ad ignem non ita prope calefacere, & tepelatoria illito corpori adhibere. Et ablinthium, aut lauri folia, aut hyoscyami semen, & thus terreo, deinde vino albo diluta in ollam novam infundito, & oleum pari cum vino mensura affundito, & eum his calefactis large calidis corpus, ac caput illinito. Postea super pelliceam indumentum reclinatum, ita ut pars, ad quam fuit animalis caro sursum vergat, molli-
 345 bus, ac puris stragulis, ac vestimentis contegito, quo vehementer exsudare possit. A-
 quam veto nullam tepidam, si quidem hanc bibere poterit, per os exhibeto. Si ve-
 ro non poterit, per nares infundito. Vinum autem album quamjucundissimum, ac plu-
 350 rimum bibendum dato. Hoc quocidie facere oportet, donec sanus fiat. Est autem mor-
 bus gravis, & statim curatione opus habet. * Opilthotonos. In distentione
 retroriorum sientie (opilthotonum vocant) alia quidem eadem ager patitur. Fit au-
 tem, quum tendines, qui sunt retro, in cervice agrotarit. Agrotat autem aut aban-
 gina, aut ab uva, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquando etiam a capite fe-
 355 bribus succedentibus, convulsio succedit. Jam vero etiam a vulneribus. Hic trahitur
 in posteriorem partem, & præ dolore circa dorsum, ac pectora ejulat. Hic convelli-
 tur vehementer, ut vix detinere possint ipsum praesentes, ne e lecto excidat. Hic saepe
 in die dolore affigitur, saepe etiam levius degit. Huic si habenti eadem exhibe-
 re oportet, quæ priorei. Morbus autem adhæret ad summum diebus quadraginta.
 Si vero hos evaserit, sanus fit. * Alius tetanus. Hic tetanus minus lethalis est, 61
 360 quam priores. Fit autem ab iisdem. Multi vero etiam ex casu in partes posteriores a
 morbo correpti sunt. Patitur igitur ager hæc. Totum corpus convellitur. Aliquan-
 do vero quacumque corporis parte id contigerit, convellitur, & primum quidem ob-
 ambulat. Postea temporis progressu in lectum cadit, & rursus remittit & doloret, & con-
 365 vulsio, & si surrexerit, & fortassis ad paucos dies obambulat, postea rursus in iisdem
 dolores affligentibus jacet. Arque hæc patitur, ac transmutat per multum tempus; &
 si quid comedit, non secedit infra, nisi difficulter, atque hoc combustum. At in pe-
 ctorebus hæret cibis, & suffocationem inducit. Hunc, si iisdem curaveris, quibus prio-
 res, celestissime sanum facies, clystetem veto ex præsana cocta tenui, ac melle adhibeto.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE VIRGINUM MORBIS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Ad morborum naturam quatenus cognosci possit.
Spectra falso imaginata multis mortis
causam fuisse.
- 2 Cor quomodo satum reddatur, & ex torpore,
ex hoc delirium fiat. Similitudo.
Quomodo, & qua ratione sanguis pedibus
torporem inducens, ab aqua frigida ad se,

ipsum revertatur. Sanguis cordis torpore,
& delirium inducit. Febres croneæ
quando dicantur. Insania, clavoris, timor-
is, strangulationis, maroris, &c. in
mente motuum causa.

Poluptas sunt spectris, in animi impotentia.
3 Insania curatio est sanguinis detractio, in
virginibus autem, si viris jungantur, quam
citissime.

- 1 **P**RINCIPIUM fit mihi compositionis eorum, quæ perpetua
sunt in arte medica. Non enim possibile est morborum natu-
ram cognoscere, siquidem artis est invenire, nisi quis nove-
rit naturam in indivisibili, ex qua in principio differet sunt:
5 primum de morbo sacro appellato, & de attonitis, sive syde-
ratis, & de timoribus, ex quibus adeo fortiter pavent homi-
nes, ut delirent, & demones quosdam videre se putent, ip-
sis inelictis, quandoque nocte, quandoque interdii, aliquando vero utroque tempo-
re. Postea ab huiusmodi spectris multi jam se strangulaverunt, plures autem mu-
10 lieres, quam viri. Est enim muliebris natura animi magis dejecta, ac imminuti. Cæ-
terum virgines nobiles, & maturæ viro, hoc magis parviuntur, una cum mensium
descensu, antea non valde hinc afflicte. Postea enim sanguis in uteros confluit,
velut effluxurus. Quum igitur osculum exitus non fuerit apertum, sanguis autem
15 amplius influxerit propter cibos, & corporis augmentum, tunc sanguis non ha-
bens effluxum, præ multitudine refilit ad eor, & ad septum transversum. * Quum
igitur hæc repleta fuerint, eor satum fit, deinde ex satuitate torpore, postea ex
torpore delirium apprehendit. Quemadmodum quum aliquo longo tempo-
re desidente, sanguis ex coxis, ac femoribus depressus, in tibiis, ac pedes torpo-
20 rem inducit. A torpore autem pedes ad iter faciendum impotentes sunt, donec
sanguis ad se ipsum revertatur. Revertitur autem celerrime, quum steterit in a-
qua frigida, quæ ultra malleolos madefaciat. Atque hic quidem torpor facile ce-
dit. Cito enim propter venarum rectitudinem refluit. Et locus corporis non est
periculosus. At ex corde, & septo transverso tarde refluit. Venæ enim oblique
sunt.

sunt, & locus periculosus, & ad delirium, ac insaniam paratus. Quum enim hæ partes repletæ fuerint, & horror eum febre ingruit, erroneas febres appellant. 25 His autem sic habentibus, præ acuta quidem inflammatione, insanit, præ putredine vero clamat, præ caliginositate autem timet, ac formidat, præ compressione vero circa cor strangulationes parat, præ sanguinis autem malitia, animus mœrens, ac anxius mahum attrahit. Sed & alium horribiliter compellat, & in puteos proflire, ac incidere jubet, & strangulari, tamquam meliora sint hæc, & omnem vitæ utilitatem excedentia. Aliquando vero sine spectris, ac phantasmatibus voluptas quedam adest, ex qua mortem velut bonum aliquid amat, postquam autem reliquit homo, mulieres tum alia multa, tum pretiosissimas mulieres vestes Dianæ consecrant, a vatibus id iubentibus decerpit. * Cæterum curatio, ut hinc liberentur, est sanguinis detractio, si nihil fuerit, quod impediatur. Ego vero jubeo virgines, quum hujusmodi patiuntur, quamcunque viris cohabitare. Si enim conceperint, sanæ fiunt. Si vero hujusmodi non affuerint ipsis simul cum pubertate, aut paulo post corripientur, si non viro nupserint. At vero ex mulieribus viro innatis steriles magis hæc patiuntur. 35

40

HIPPOCRATIS COI LIBER DE NATURA MULIEBRI.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Muliebrium morborum causæ. Mulieres æque, exigua, viui colorem referentes. Juveniles, anicula, media. Loci frigidi, & calidi.
- 2 De aquæ inter cutem in utero nascentis signis, causis, & curatione.
- 3 De uterorum ad hepatis accedentium signis, & quibus hæc affectio familiaris. Item de mulieris viduæ, & virginis curatione. Necropem sequentem.
- 4 De uterorum foras egressorum signis, & causis.
- 5 De uterorum omnino foras egressorum, & dependentium signis, causis, & curatione.
- 6 De uterorum adylutinatorum signis, & curatione. Myrtina Calonia. Steriles ex uteris agglutinatis.
- 7 De uterorum complicatorum signis, & curatione. Urina humana ad uterorum os fovendum. Unguentum Egyptianum. Sterilitas ex hac affectione.
- 8 De uterorum ad coxam decurrentium signis, & curatione. Sepia ova.
- 9 De signis ex partu non purgata, & curatione. Medicamentum cum tæda.
- 10 De signis uterorum, pituita impletorum.
- 11 De uterorum inflammatorum signis, & curatione.
- 12 De ignis sacri erysipelatis in utero signis, & curatione.
- 13 De uterorum præter naturam biantium signis, causis, & curatione.
- 14 De uterorum ad medium lumborum progressivorum signis, & curatione. Steriles, & claudæ ex hac affectione.
- 15 De fluxu albi signis, causis, & curatione.
- 16 De carum, quæ concipiunt, alloqui natura steriles, æstibus, & curatione.
- 17 De acetabulis pituita plenis, signis, & curatione. De mensuum occultatorum signis.

- 18 De uterorum ad præcordia allapsorum signis, & curatione.
- 19 De scitu mensuræ in utero corruptione: curatione. Cur mulieres crassa non concipiant, & sint curatione. De oris uterorum duri curatione.
- 20 Mulierem partem non potentem quomodo purget, item qua ratione pituitam ex mensuris purgationibus cognoscatur. De mensibus omnibus omnino impeditis.
- 21 De uterorum ore humiditate. Mordentia sanguinem diffundunt. De uteris puerperæ in coxam incumbensibus. De uteris suffocatis. Suffocatum ex cornu funiculo lacernario, & phoca adipæ.
- 22 De puerperæ uteris inflammatis.
- 23 De uteris fixis.
- 24 De uteris ex partu inflammatis.
- 25 De muliere ab utero debili.
- 26 De uteris in lumbis, aut lateris molitudine.
- 27 De uteris siccis, & ad pudendum prominentibus.
- 28 Pharmacia mulierum quæ admittenda.
- 29 Potiones, & subdititia medicamenta quæ secundas educere, & menses attrahere possunt. Potum expellentia. Potiones fatum mortuum, & secundas ejicientia. Medicamenta in omni uterorum morbo commodum, & urinæ valde eient. Lac caninum. Potiones ad menses impeditas. Potio ad puerperæ purgamentum purganda. Potio ad omnem puerperam. Pessus ex scammonia in lalle muliebri. Subdititia, menses puerperæ purgamenta, & aquam ducentia, Leporis pili combusti. Uteri ad lumbos incumbentes. Alia potiones. Medicamenta subdititia, ac purgatoria. Terra Samia nigra. Ad fluxum, & dolorem uterorum. Purgatoria, & dolores sedantia. Quomodo uteri suffocantur. Stella marina nigra. Ad secundas expellentes. Uteri ad cor allapsi. Apposuita aeris, sanguinem ducentia. Sanguinem ducentia.

Glauc.

- Glauc Aegyptia. Suffusum sanguinem. Bilem purgantia. Uteri inflammati. Ficus pinguedo interna. Alia mollientia. Aquam purgantia. Sanguinem, ac menses ducentia. Fel suillum. Alia mollientia. Cervi medulla. Ad elucandos uteros. Fex vini combusta. Suffusio ad uteros. Phoca pulmo. Spina Aegyptia frustis. Fomenta humida. Pini cortex. Panis semissatus. Fomenta siccata. De aqua in uteris genita signis, & causis.*
- 30 *Menses occultati uteris duris, & ipsorum ore aspero, & eorum curatio.*
- 31 *De uteri indurati ore, & signis, & eius causis.*
- 32 *De uterorum ad latus allasporum signis, & curatione.*
- 33 *De uterorum ore conlato, & eorum signis, & curatione.*
- 34 *Uterorum obliquorum signa, & curatio.*
- 35 *Uterorum inflatorum signa, & curatio.*
- 36 *Sanguinis grumi in utero eocuncti, & eorum curatio.*
- 37 *De uterorum obtortorum signis, & curatione.*
- 38 *De uterorum duemotorum, & in loco non manentium signis, & curatione.*
- 39 *Uterorum oris hiantis signa.*
- 40 *Uterorum levigatorum signa, & curatio.*
- 41 *Uterorum ad venterem nutantium signa, & curatio.*
- 42 *Uterorum ad caput, & circa conuersorum signa, & curatio.*
- 44 *Mulier uteros duples, ac cibum auersa. De fluxu ex partu curatione. Coagulum hedi. Sanguinis vomitus ex partu, causa, & curatio. Lac vasa nigra.*
- 47 *Mulier diu non concipiens.*
- 48 *Ad uterorum morbum sedandum.*
- 49 *Ad uteros purgandos.*
- 50 *Uteri ad sedem conuersi, & secessum secedere prohibentes: curatio.*
- 51 *Uterorum os ulceratum.*
- 52 *Secunda non decedentes.*
- 53 *Uteri inflammati.*
- 54 *Uteri transmoti. Furfures hordeacei.*
- 55 *Menses remorati. Polypus vino suffocatur.*
- 56 *Pudenda ex seruido, ac superficiali ulcere ulcerata.*
- 57 *Urina stillicidium.*
- 58 *Uteri ad eum progressi.*
- 59 *Rigor ex partu.*
- 60 *Uteri inflati.*
- 61 *Graveolentia in pudendis, & culmenella. Pudendorum ulcera, & pruritus.*
- 62 *Genitorum non suscipiens, menses secundum naturam secutibus. Membrana ante os uteri eognitio.*
- 63 *Anelationes in mulieribus.*
- 64 *Parturienti inflata tepor ouillum, hui caprinum.*
- 67 *Ad lumborum dolores.*
- 68 *Ad menses remoratos.*
- 69 *Ad uteros conelatos.*
- 70 *Ad menses immodice fluxus.*
- 71 *Uteri transmoti aliquo allapsi.*
- 72 *Secundas educantia.*
- 73 *Menses non apparentes. Uteri moti cum dolore.*
- 74 *Uteri dolores maxime ad vesicam.*
- 75 *Uteri prominentes.*
- 76 *Ad fluxum. Stercus asinum.*
- 77 *Pudendorum ulcera.*
- 78 *Os uterorum ex partu exulceratum.*
- 79 *Uterorum dolores.*
- 80 *Pudenda ex seruido, ac superficiali ulcere exulcerata.*
- 81 *Uteri ascendentes, ac suffocantes.*
- 82 *Secunda non scopdentes.*
- 83 *Capitis in muliere dolores.*
- 84 *Fluxus. Cerei fluxuantes vino suffocari.*
- 85 *Ad uteros purgandos.*
- 87 *Uterorum dolores.*
- 88 *Lac extindum. Nesturtium lac purgat.*
- 88 *Ad imprugandam mulierem.*
- 90 *Fatum expellens.*
- 91 *Experimentum fecunditatis. Fel scorpi marini.*
- 92 *Testa combusta.*
- 93 *Ad recens coitum. Conceptum impeditia.*
- 94 *An mulier prohem sit.*
- 95 *Pregnantis pudenda exulcerata.*
- 96 *Virgini calculosa.*
- 97 *Cataplasmata.*
- 98 *Suffusio ad uteros. Cornu ouicula, aut capra. Terra ex asinorum pedibus detrasa.*
- 99 *Collusiones uterorum.*
- 100 *Malagnata.*
- 101 *Fomenta uterorum.*
- 102 *Purgatorium. Mulieris biliosa, aut pituitosa cognitio.*
- 103 *Uterorum fomenta per arundinem. Passus canis bubula.*
- 104 *Mensium purgatoria.*
- 105 *Purgatorium, si mulier non concipiat. Urina tauri. Substitutum pharmacum, ad conceptum faciens. Purgatorium molliens. Anseris medula. Purgatorium tepidum. Purgatorium detrahens, ac silens. Fel tauri tritum in potione. Uteros aperiens, & purgans. Ex partu non purgata.*
- 106 *Sanguinem purgantia.*
- 107 *Substitutum necros purgantia, & aquam ducentia. Purgatorium molle, aquam, pituitam, & pallidum, ac subternos menses detrahens. Oleum Aegyptium.*

SECTIO I.

DE muliebri natura, ac morbis hæc dico. Maxime quidem numen in hominibus causam esse; postea vero naturas mulierum, & colores. Nam quæ superabundant sunt, humidiores sunt & fluidiores. Nigræ vero dures, acerbioresque, ac adstrictiores. Quæ vero vini colorem referunt, medium quid inter utraque habent. Sic autem & in ætatibus contingit. Juvenulæ enim humidiores sunt, & multo sanguine plerumque repletæ. Antiquæ vero sicciores, & modicum sanguinem habentes. Mediæ autem medium quiddam inter utraque habent. Oportet autem, cum, qui hæc recte tractare velit, primum quidem ex his ordinari. Deinde mulierum naturas discernere, itemque ætates, & remota, & locos, in quibusque degunt. Frigidi enim loci fluidi sunt. Calidi vero siccæ, & stabiles. Initium autem faciam ab humido secundum naturam. * Si aqua intercus in utero oboritur, menses pauciores, ac deteriores fiunt. Deinde repente deficiunt, & venter intumescit, & mammae siccae fiunt, & reliqua male habent. Et in ventre sibi habere videtur, & ex his cognoscet, quod aqua inter cutem laborat. Sed & in ore iterorum significationem de se præbet. Tangentibus enim gracile apparet, & calor, & aqua ipsam corripit. Quum autem tempus amplius processerit, dolor inum ventrem, & lumbos, ac laterum molli tudinem occupat. Hic morbus maxime fit ex abortu. Accidit item ex aliis. Quum sic habuerit, calida lavare oportet, & tepescitiora adhibere, donec dolor sedetur, pharmacum autem deorh in purgans bibendum dare oportet, post pharmacum vero uteros bubuli stercoris fomento fovere, & postea medicamentum tum cantharide præparatum apponere. Et interpositis tribus diebus id, quod cum selle paratur. Una vero die interposita, per triduum aceto infuso colluatur; & si quidem venter mollis, & vacuus fiat, & febres sedate fuerint, & menses prodeant, viro condormiat. Sin minus, rursus eadem facito, donec menses prodeant, & aliquibus subditis utatur. Intermediis autem diebus crethmi corticem bibat, & prœterea grana nigra, & sambuci fructum, jejuna in vino, & mercurialem quamplurimam edat, & allium coctum, ac crudum, & cibis mollibus, & polytis, ac aliis mollibus utatur. Si vero pepererit, lava erit. * Si uteri ad hepar accesserint, menses derepente fit, & dentes conserit, & color niger fit, patitur autem hæc derepente, cum sana est. Fit autem hujusmodi affectio virginibus maxime antiquis, & viduis, quæ juvenulæ sunt, & pepererunt, ac viduæ manent. Quum sic habuerit, depulsionem per manum infra facta, sub hepate, aut sub præcordis fascia deligato, & aperto ore vinum odoratissimum infundito. Et graveolentia naribus adhibito, ac suffito. Sub utero vero bene olentia. Postquam autem resipuerit, pharmacum infra purgans bibendum dato, & lac asinum postea bibendum exhibeto. Deinde uteros odoratis foveto, & medicamenta cum bupesti præparata apponito. Postried vero metopon unguentum. Intermissis autem duobus diebus, uteros cum odoratis colluito. Et postried puslegium apponito, de vero una interposita, aromata suffito. Atque hæc quidem viduæ facito. Virginem autem ut viro cohæret, persuadeto, ad uteros vero nihil adhibeto, neque pharmacum bibendum dato, verum conyzam, & castoreum in vino jejunæ exhibeto, & caput odoratis ne ungat, neque odorata olfaciat. * Si uteri procederint, & foras egressi fuerint, calor habet maxime pudenda, & sedem. Et urina paulatim destillat, ac mordet. Hæc patitur, si ex partu progressa viro condormierit. Quum autem sic habuerit, myrti baccas, & loti ramenta in aqua coquito, & aquam per noctem sub dio exponito, & pudenda cum eo decocto quamfrigidissimo perfundito, & eadem trita pro cataplasmate adhibeto, postea bibens aquam lentum, & mel, & acetum, donec uteri fuerint elevati, vomat. Et lectum a gradibus altiores facito, et graveolentia sub pudenda suffito, odorata vero sub naribus. Cibis vero utatur mollissimis, ac frigidis. Et vinum aquosum album bibat. Ne lavetur autem, neque cum viro dormiat. * Si vero penitus ex podendis exciderint, dependent, velut scrotum, Et dolor corripit inum ventrem, & lumbos, et quum tepius processerit, ad locum redire non volunt. Morbus autem corripit, quum ex partu progressa uteros doluerit, aut cum viro in puerperii purgatione concubuerit. Quum vero sic habuerit, frigesfactoria ad pudenda apponere oportet, et quod foris est depurgatum, et cum vino nigro, in quo malum punicum coctum est, ablutum, intro derrudere. Deinde mel, et resina mixta mungere. Decumbat autem supina pedes sursum extentes habens, postea spongiis imposito, et ex lumbis delgato. Quum autem sic habuerit, a cibis quidem abstineat, potu vero quam paucissimo utatur, donec septem dies præterierint, et si quidem sic ingredi voluerint, bene habet. Sin minus, summas uteri oras deradito, calefacito, adluto, ac cerato picato illinito, et alligata ad scalam muliere, scalam juxta caput pulsato, et uteros cum manu intrudito, postea crura ipsius alternatim colligato, et sic per diem, ac noctem inito, et modicum pedana succum frigidum dato, aliud vero nihil. Postea die decumbenti cucurbitam quammaximam ad coquendam affi-

- cem affigito, & multo tempore trahere finito, postquam vero detraxeris, ne scarificato, sed reclinatum finito, & nihil aliud, quam succum exhibeto, donec septem dies præterierint. Si vero sitiat, aquam dato frigidam quam paucissimam. Ubi vero septem dies præterierint, cibis mollissimis, ac paucissimis utatur. Si vero ventrem exonerare velit, decumbens exoneret, donec quadraginta dies prætereant, postea surgat, & paucissime obambulet, & ne lavetur, sed inera pudendum graveolentium suffumini admittat, & modica edat. * Si uteri adglutinati fuerint, incumbunt, & si contigeris, videbis locum durum sub lateris mollitie, & dolor corripit inum ventrem, & laterum mollitudinem, & lumbos, & in crura dolor irruit, ea-
- 75 que extendere non potest. Saepè vero etiam suppurantur, & linamentis inditis curantur, ac fluentes moriuntur, si non inseris, aut secueris. Quum autem sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & multa calida lavare, ac fovere, & quum recens lota, aut forata fuerit, iubere, ut admota manu, cum digito os uterorum abstrahat, & myrrham caloniam suffiat, rosaceo affuso. Bibat autem
- 80 pæoniæ grana nigra quinque, castorio ammixto, in vino odorato, & in coxam sanam decumbat, & apponat. Baccarum unguentum, aut oleum album ad coxam sanam, & edat allium plurimum, & crudum, & coctum, & succum sorbeat, & cibis mollibus utatur. Postquam autem dolor quieverit, abduces euntem super sanam coxam, postea vero fomentum ex urina adhibeto, lauro insperfa, & a fomento
- 85 cyclaminum apponito. Postera die loca suffusis ex aromatis adhibeatur. Cæterum ex hoc morbo maxime steriles fiunt. * Si complicatum fuerit os uterorum, menses non procedunt. Si vero prodeant, pauci, ac pravi sunt. Et ubi cum viro coit, doler, & dolor inum ventrem tenet, ac lumbos. Et si contingat digitis, & os requirat, non est manifestum. Quum sic habuerit, urina humana foveatur,
- 90 & post fomentum lenticula decocto lavetur, & postquam lota fuerit, uteri unguento Ægyptio foveantur. Et si odor ad nares ascenderit, spes est ipsam sanam fore. Et quum dormire voluerit, Ægyptium oleum in lana subdat. Postera vero diē consideret, an magis correcti sint uteri, postea odoratis foveo, & purgatoria, quæ non mordeant, subito, & post subditiā medicamenta, pari mensura
- 95 aceti ad aquam ammixta, eluito. Quum autem menses prodierint, jejuna, & illota, & suffusa cum viro coeat. Maxime vero hoc morbo steriles fiunt. * Si uteri ad coxam decurrerint, & menses non procedunt, & dolor ad inum ventrem accedit, & ad lateris mollitiem, & digito contigeris, deprehendes os in coxa. Quum ita habuerit, calida lavato, & alia plurima edenda dato. Et lac ovillum purum bibat, & postquam lac purum exhauit, fomento adhibito, postea pharmacum infra purgans exhibeto. Quum autem purgata fuerit, rursus uteros foveo ex feniculo, & abstinio permixtis. Ubi vero recens forata fuerit, os cum digito abstrahito, & scillam apponito, & interposita die, postea id, quod præparatum cum narcissino adhibeto. Si vero tibi purgata esse vis fuerit, notopon apponito, &
- 100 postidie rosaceum unguentum. Cæterum prima mensium decurrentium die ab apponendo cessato; postera vero incipito, ubi defecerint. At in mensibus, si quidem sanguis eruperit, satis est; sin minus, cantharides quatuor bibat, pedibus, & alis, ac capite reiectis, & pæoniæ grana nigra quinque, & sepiæ ova, & apii semen, cum vino. Et si dolor habuerit, & urinæ stillicidium vexarit, in aqua calida desideat, & aquam nullam bibat aquosam. Si vero a prima non fuerit purgata, rursus bibat, donec fiat; postquam autem purgatio decurrit, jejuna cum viro coeat. In purgatione vero meturiale m edat, & polypos coctos, & cibis mollibus utatur. Liberabitur autem a morbo, si in ventre habuerit. * Si ex partu non fuerit purgata, tuncet venter, & crura, & rigor, ac dolor inum ventrem, ac lumbos tenet. Quandoque etiam ad viscera ascendit, & animo linquitur. Atque hæc patitur, incipiente morbo; progressu vero temporis cavæ faciei partes rubescunt, Quum igitur sic habuerit, fomento uteris adhibito, cyclaminum apponito. Bibat autem medicamentum cum tæda præparatum, donec fluxus fuerit commotus. Ad os vero uterorum adipem aserinum ilinito, & myrrham, & resinam tepidam, &
- 120 quammaxime deambulet, & ante cibum meturiale in coctam edat, & allium, ac porrum, & brassicæ sticcum sorbeat, & cibis mollibus utatur; & magis marinus, et calida lavetur. A pinguibibus autem, et dulcibus abstineat, donec sana fiat. * Si uteri pituita impleti fuerint, status oboritur, et menses albi pituitosi superveniunt. Aliquando etiam sanguis tenuis pelliculis plenus, et præ humiditate cum viro coire non vult, et pallida, ac tenuis fit. Interrogare igitur ipsum oportet, an quod fuit, mordeat, et exulceret, et si non mordeat, pronunciare a cerebro fluxum esse. Si vero mordeat, a ventre. Si quidem igitur a ventre fuerit, a lenticula decocto vomat. Deinde veratro purgato, postea idem in aëre immittito. Postquam autem superior venter tibi purgatus esse videbitur, pharmacum infra purgans bibendum dato. A cibis autem pinguibibus, ac dulcibus abstineat. Acres autem exhibeantur velut commodi, nisi pudenda fuerint exulcerata, præstant autem frigidi. Et modice lavent, non tamen calida, neque caput. Jejuna vero bibat hypericum, semen apii, salviā, in vino aquoso. Quum autem cessaverit fluxus, cum succo grossorum eluito, et postea acerbis colluito. Est autem morbus gravis. * Si
- 130 uteri

uteri inflammati fuerint, menſes omnino non prodeunt, aut pravi, & pauci. Et quum jejuna eſt, vomitus ipſam corripit. Ubi vero quid ederit, vomit cibos, & dolor imum ventrem, ac lumbos habet, & animi deliquium invadit. Venter autem aliquando durus, aliquando mollis eſt, & inflatur, ac magnus fit, & putat ſe in ventre habere. Si vero contigerit, plenitudo illa vacua fit. Huic inſique ad decimum menſem tumor paulatim augetur, velut in ventre habenti. Ubi vero decem menſes præterierint, venter aqua impletur, & umbilicus eminet. Et ſi digitum admoveris, os uteri gracile, & collapſum comperies. Et ubi menſes apparuerint, pauci ſunt, & pravi. Et claviculæ, ac collum attenuantur, & pedes intumeſcunt. Quum igitur ſic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dato, & ad uteros, quæ purgant, & non mordent, apponito. Et poſt appoſitionem uteros eluito, pari menſura aceti acerrimi ad aquam annimixta, & mercurialem edat, & ſuccum ejus, farina inſperſa, 145
12 ubi cocta fuerit, abſorbeat. Morbus autem eſt periculofus. * Si ignis facer, eryſipelas dictus, in utero oboritur, tumor fit a pedibus exorſus, & ad crura, & ad lumbos procedens. Quum autem tempus amplius proceſſerit, intumeſcit animus venter, & rigor, ac febris corripit, itemque debilitas. Præ dolore vero quieſcere non poteſt, ſed ſaſtat ſe ipſam. Dolor autem ex imo ventre aſcendit ad lumbos, poſtea ſuſum vergit ad præcordia, & pectora, & caput, Et mori ſibi videtur. Quum autem remiſerit, torpor occupat manus, aliquando etiam inguina, & crura, & poplites, & fluida ſit, & modico quandoque tempore ſibi melius habere videtur. Deinde ſuſus eadem patitur, & corpus puſtulis impletur, & facies rubefcit, & ſitis fortis tenet, & fauces ſiccæ ſunt. Hic morbus ſi prægnanti fiat, moritur, ſi minus, curata ſanatur. Quum igitur ſic habuerit, adhibere oportet, ſi dolor habeat, frigefactoria, & ventrem turbare, Et ſi quidem in ventre habeat, cibis, ac potibus utatur, a quibus ſorſus non corrumpitur. Si vero non ſecedant, clyſterem adhibito. Si autem in ventre non habuerit, pharmacum bibendum dato, & cibus paucaſſimis utatur molliffimis, ac frigidis, & mercurialem edat, & ſambucum, & neque falſa, neque pinguis, neque acra, velut eſtoriganum, aut thymus, aut ruta. Poſtquam autem calor, & ſtrangulatio remiſerit, & tumor non fuerit ſedatus, medicamentum fortius infra purgans poſtea bibendum dato. Morbum autem huic pauca effugiunt. * Si uteri præter naturam hient, & menſes plus, quam oportet, prodeunt, viſcoſioresque, ac frequentiores, & genitura non manet intus, Et ſi digito contigeris, os hians comperies, & febris, ac rigor, & dolor imum ventrem, & lumbos corripit. Hic morbus a fluxu ſanguinolento corripit. Fit autem, quum menſes ſuppreſſi derepente eruperint. Huic, quum dolor maxime habuerit, reſefactoria apponito. Et quum remiſerit, uteros ſoveto, & pharmacum infra purgans bibendum dato. Et quæ non mordent, ſubdros, & poſt ſubdros medicamenta, cum acerbis colloito, & quaminimum lavato. Cibus autem ſicciffimis utatur. Si vero ſi ſaſtis ſana non fiat, pharmacum bibendum dato, a quo ſuſum, ac deorſum purgetur. Et quum menſes mori fuerint, & quum quieverint, euſdem modi victum exhibeto. Morbus autem lethalis eſt. * Si uteri ad medium lumborum proceſſerint, dolor imum ventrem habet, & crura contrahuntur, & quum alvum exonerat, dolores acutiores ſunt, & ſtercus cum vi prodeit, & urina deſtillat, & animo linquitur. Quum ſic habuerit, ſtilula ad veſicam alligata uteros ſuſſiato, & fomentum adhibeto. Aut multo calido lavato, & male olentia ſub pudenda ſuſſito. Sub nares autem odorata. Quum autem dolor ceſſarit, lenticulæ decocto præpotato, pharmacum ſuſum purgans bibendum dato, a quo venter moveatur. Poſtquam autem uteri ad locum ſuum redierint, medicamentum infra purgans bibendum exhibeto, & poſtea lac bibendum dato. Poſtea ſomento ad uteros adhibito ex vino, medicamenta cum lauro præparata immittito, & apponito, quæ non mordent, annimixto aceto. Poſtea aromata ſuſſito. Cæterum ſteriles, & claudæ ſunt ex hoc morbo. * Quum fluxus albus obortus fuerit, velut urina aſinina apparet. Et dolor imum ventrem habet, & lumbos, & lateris mollitudinem, & tumores ſunt crurum, ac manuum, & cavæ elewantur, & oculi humidi ſunt, & color arcuatus, ac albus fit. Et quum iter facit, anhelat. Morbus autem fit, ſi ubi natura pituitofa eſt, febricitarit, & bilis commota purgata non fuerit. Si quidem igitur venter acuerit, ventris proſuvia ſiunt. Si vero ad uteros verſatur, fluxus fit. Poſtquam igitur ventris proſuvium habuerit, papaveris albi, ac rubri corticem pari pondere, & ſpinæ fructum in vino diluto terito, & polenta recenti inſperſa bibat. Si vero velis, malicorium calido cinere torrefactum, ac triſtum ex vino bibat, pari polenta, ac farina inſperſa. Minimum vero lavetur. Cibus autem utatur quamſiceſſimis, ac frigidis. Ubi vero fluxus quieverit, pharmacum bibendum dato, a quo ſuperna purgetur, & lac alinum bibat. Poſtquam autem infra purgata fuerit, bubulum lac bibat, ad dies quadraginta, ſi poterit meracum, ſub die per noctem expoſitum, quarta aquæ parte annimixta. Veſperi vero, ubi ebibit, aliam ſorbeat. Quum autem decem dies fuerint tranſacti, lactis, & aquæ decimam partem detrahit: quantum autem detraheris, tantam tepidi recens multæ portionem additam bibat, poſtridie vero, duas portiones, ut in decem portionibus pro modico diluto ſit meracum, et ad qua-

- ad quatuor dies bibat. Dum autem decimam partem detrahit, etiam de forbi-
 105 tione amplius addat. Postquam autem quatuordecim dies transegerit, decimam
 lactis partem bibens, postea tertiam aquae partem affundens, ad dies decem bi-
 bar, & eibus utatur, & sic fiant omnes dies quadraginta. * Quum conceperit, 16
 & iterum, ac partus gestarit, ea, quae natura sterilis est, primum quidem menses
 deficient, & pauciores sunt, & quae, in quo prius fiebant, transmittunt. Postea
 210 derepente multi fiunt, & puri, ac fortes, & si quidem semel facti fuerint, de cete-
 ro secundum rationem in ventre habet. Sin minus, & primum sunt, & iterum
 atque iterum in mense, postea ex se ipso desinet fluxus, pallidaque, ac tenuis sit. Phat-
 macum igitur & fursum, & deorsum purgans bibendum dare oportet. Et lac asini-
 num postea bibendum, aut serum. Postea adhibito fomento, uteros medicamen-
 215 to, quod non mordeat, purgato. Deinde cum aceto colloito. Postea aroma-
 tizzato. Haec autem facito, ut prima mensium die facta sint. Et ne sit illora, & im-
 pasta, cyceonem insulsum crassum bibens, & aromatis suffiatur, netopo affuso
 & unguento rosaceo. Postea cum viro coeat. * Si acetabula pituita plena fue-
 rint, menses quidem bene succedunt, & in ventre habet. Corruptum autem fec-
 220 tum, ubi fortior factus fuerit. Non enim retinere potest, sed abrumptur. Cogno-
 veris autem hoc modo. Humida sit, & mucosum, ac viscosum desit, & non mor-
 det, & in mensibus, ubi a fluxu purgari cessaverit, per duos, ac tres dies muci ab
 uteris prodeunt. Hanc grossiorum succo eluito, & collutione peracerba postea bis
 aut ter facta, de cetero apponito id, a quo pituita purgatur, & mollia fomenta ad-
 225 hibero. Et post subdititia apposita, pari mensura aceti ad aquam ammixta, elui-
 ro, & in mensibus aromata suffiis; postea impasta, & illota cum viro dormiat.
 * Quum menses occultati fuerint, dolor inum ventrem tenet, & onus incumbe-
 re ipsi videtur. & lumbos dolet, ac laterum multitudinem. Quum vero ad
 230 pancia uteri allapsi fuerint, suffocant, & ubi frequenter acida evomunt, ad modi-
 cum tempus melius habet. Dolor autem & ad caput, & ad colum procedit. Post-
 quam igitur allapsi parant, aut allapsi sunt, tepesfactoria adhibero, & graveolentia
 suffiis, infra autem odorata, & castorium bibendum dato, & conyzam. Ubi ve-
 ro deorsum proeiderint, infra graveolentia suffiis. sub nares autem odorata. Se-
 235 datis autem doloribus, pharmacum bibendum dato. Et lac asinum postea bi-
 bendum. Deinde succum, a quo vomat, dato, & ad nares apponito. Postquam autem
 purgaveris, fomento uteris adhibito. ex his, quae cum lauro preparantur, id, quod
 ex narcisso preparatur, apponito. Et tribus interpositis diebus, fomento adhibi-
 240 to, id, quod ex cantharide preparatur, apponito, & postera die adipem anseti-
 num, postea intermissis tribus diebus, collutione cum aceto parata, eluito. In purga-
 tionibus autem mercurialem ante cibos edat, & eibus mollissimis utatur, &
 aceria edat. Et bis in die calida lavetur. Si vero menses non fiant, ubi haec op-
 portuno tempore feceris, cantharides bibendas dato, & postquam prodierint, jeunia,
 & illota, ac suffiis cum viro dormiat. * Quum in ventre habens fecum men-
 245 struum, aut bimestrem, corripit, & ad perfectionem gestare non poterit, & tenuis
 praeter naturam fiat. Huius uteros purgare oportet, ac corpus pingueface-
 re. Non enim prius fecum perferre poterit, quam uteri ipsius crassi fiant, & robu-
 sti evadant. Si vero crassifecta fuerit mulier praeter naturam, non concipit in ven-
 tre. Nam omentum multum, ac crassum incumbens, uteros deprimat, & genitu-
 ram non suscipit. Hanc attenuare oportet, & pharmacum infra purgans, bibendum
 250 dare, & ad uteros apponere, quod purget ipsos, & status inducat. Si vero os
 uterorum durum fiat, aut cervix, digito intro misso, id cognosces. Itemque si ad
 eoxam fuerint aversi. Quum sic habuerint, nihil acre adhibito. Si enim os exul-
 ceraveris, ubi inflammatum fuerit, periculum est, ne penitus sterilis fiat. Verum
 apponito, quae non mordent, a quibus purgetur. * Si mulierem parere non poten-
 255 tem, purgare velis, & fuerit biliosa, aut pituitosa. Cognosces autem, citrum ho-
 rum sit, si arena substrata, quum menses fiunt, in sole sanguinem superfundas, ac
 ficcari linas. Si enim biliosa fuerit, supra arenam sanguis pallidus erit. Si vero pi-
 tuitosa, velut mucus erit. Et saepe utrum horum fuerit, infra purgato, & ad ute-
 ros subdititia apponito. Si menses omnino non fiant, si quidem pra dolore
 id contingat, primum ventrem infra purgato, deinde medicamentum, a quo sang-
 260 uis ex uteris purgatur, apponito, postea intermissa die una, aut altera, rursus id,
 a quo sanguis purgatur, apponito. Reliquo vero tempore corticem cisthi in
 vino tritum bibat. * Si humidius fuerit os uterorum, quam oportet, aceria appo-
 nito, quo morsum perreperit, & inflammatum valde durum fiat. Si vero indura-
 tum fuerit, aceria adhibero. Mordentia enim saniam diffundunt. Deinde mol-
 265 lia apponito. Sed & ad alios morbos non minus apponito. * Si puerperae
 uteri in eoxam incubuerint, aut ad lateris mollitudinem, ad sanam eoxam o-
 leum Aegyptium album, aut baccharum unguentum apponere oportet, & in sa-
 nam eoxam decumbat, & praeponit grana nigra quinque bibat, & fructus fambu-
 270 ci conchae testam maiorem, & castorii magnitudinem fabae in vino, postea lo-
 ta suffiatur, & potibus, ac eibus mollibus utatur, & mercuriali, & aeribus omni-
 bus, excepto raphano, ac cepis. Quum suffocant uteri, graveolentia om-
 nia suffi-

nia suffire oportet, bitumen videlicet, sulphur, cornu, lucernarum funiculum,
 23 phocæ adipem, castorium. Odorata vero subter pudenda. * Si vero puerperæ inflammari lucine uteri, ardet, & suffocatio habet. Quum autem sic habuerit, mulsicū marinum tenuem tritum super lintecolo extentum pro cataplasma-
 275 te adhibeto, postea crūdā hordeaceam farinam, & cinerem farinentitium, ac lini semen, oleo, & aceto affuso, coquito, donec velut farinæ subactæ massa fiat. Dein
 24 de quamq̃alidissima ferre potest, imo ventri imposito. * Si vero fixi fuerint uteri, lentem, & mentam multam in aceto coquito, ut vaporem inde in os trahat,
 280 & nares adhibeat, & graveolentia suffuso, & mercuriale edat, & in succo eius farinam coctam sorbeat. Quamecelerrime autem, & priusquam dolor occuper, exhibere oportet pharmaca, quæ uterū a dolore levant, & eibos per alvum secedentes
 25 assumat. Si vero venter calefiat, elysterem adhibeto. * Si ex partu inflamma-
 285 ti fuerint uteri, solani succum in pudenda infundito, & ubi hic calidus factus est, alium infundito, Si vero hic non fuerit, lentisci, aut rhamni, aut betæ, aut eucurbitæ succum expressum infunde, & quod in medio huius est tenerium, dera-
 26 ne. Si vero horruerit, tolle. * Si mulier ab utero debilis sit, & bilis ipsam suf-
 290 focet, & opus sit ipsam leviter purgare, & dolorem sedare, peucedani succum tri- tum cum cyathorum mensura bibendum dato. * Si in lumbis, aut lateris multitu-
 27 dine fuerint uteri, & transire velis, sulphur, & bitumen terito, & melle co- cto affuso, glandulam crassam facito, & in sedem indito, & uteri si siccī fiant, hæc
 28 quamecelerrime apponito. * Mulieri, si uteri siccī fiant, & ad pudenda promi-
 295 neant, & inguina dura fiant, & calor in pudendis insit, cancerari incipit. Quum sic habuerit, cucumeris sylvestris internam partem aridam terere oportet, & a-
 quæ hemina affusa, in sedem immittere, & purgati finire, donec purgetur. Quum autem mulieri pharmacum dederis, ammisee ad pharmacum ea, quæ
 uteros purgant, & quæ expellunt,

S E C T I O I I.

29

* *Partiones, & subsidia medicamenta, quæ secundas educere, & menses detrahere possunt,*

1

CAntharides quinque, avulsis alis, & pedibus, ac capite, deinde tribolos ad
 mare nascentes una cum radice mensuram, quantā est conchæ testa, terito, &
 5 anthemī pallidam, sive luteam internam partem siccam tritam, conchæ testam addi- to, & feminis apii tantundem, & sepis ova quindecim, & in vino dulci diluto bi-
 benda dato, & quum dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam
 aquosam bibat. Aliud. Ranunculi foliorum, & floris citri Æginei stare-
 ris pondus in vino dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album, &
 10 uvas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato, & tibi urinæ stillicid-
 ium vexarit, in aqua tepida desideat. Aliud. Adiantū staretem Ægina-
 ym in vino albo, pari aqua ammixta, bibendum dato. Aliud. Violæ albæ
 semen, quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino albo, eodem modo tem-
 perato, bibendum dato. Aliud. Leucoiti nigri radicem in vino eodem mo-
 do sumat. Aliud. Crinanthemum, quod in domibus nascitur, eodem mo-
 15 do misceto, ac bibendum dato. Aliud. Anchusæ foliorum pugillos duos in
 vino albo, aequali aqua ammixta, bibendos dato. Aliud. Chamæleonis rade-
 cem, velut veratri portionem, derafam in vino albo, aqua pari mensura ammi-
 xta, bibendam dato. Aliud. Brassicæ, & porri succum, ad utrumque fucci sil-
 20 phii obolis tribus ammixtis, ex vino albo cum pari aqua bibendum dato. Aliud.
 Olivas albas, priusquam oleum insit, compunctas siccato, postea tulas, & eribra-
 tas, ac in vinum injectas bibendas dato. Hoc & menses detrahit, & secundam
 expellit. Aliud. Dictamni ererici obolum in aqua bibendum dato. Et si hoc
 in potu dato, secundam ejicere non potes, sambuci succe cocto immisso fove-
 25 to, & cantharidem apponito. Hoc etiam foetum expellit, Quum autem mortuum
 intulerit, auferat, & toscæo unguento tinctum apponat, donec elapsa fuerit.
 Aliud. Populi nigre ereticæ grana novem trita in vino bibenda dato. Cum
 hoc etiam abluatur, si difficulter pariat. Aliud. Conyæ testam conche ma-
 30 jorem cum porri succe diluto, & netopi testam conchæ majorem ammisceto,
 & hæc in vino bibenda dato. Aliud, quod menses detrahit. Peucedanum, &
 30 & panaces, & prœnæ radicem in vino bibenda dato. Aliud, quod foetum mori-
 rum, & secundas ejicit. Violæ, & portulacæ semen contundito, ac misceto,
 & in vino albo veteri exhibeto. Aliud, quod menses detrahit. Seminis vio-
 35 læ albæ, quantum tribus digitis apprehendi potest, & stercoris capri pilulas
 quinque, aut sex, in vino odoratissimo permisceto, & bibenda dato, ubi prius fo-
 mentum ex aqua, & oleo immiseris. Adhibeto autem fomentum in sella, & ubi
 hæc bibit, quamecelerrime loram reclinato. Brassicam verq̃ edendam exhibeto,
 & succum

- & succum ejus sorbendum. Aliud. Seminis violæ asæ, quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino bibendum dato, & in aqua calida desideat. Si vero id non habeat, fœniculi radices contusas in aqua multa tepida macerato. Si exhibito. Aliud. Fraxini grana decem in vino bibenda dato. Hoc in omni uterorum morbo commodum est, & valde ciet urinam. Aliud. Succum silphii magnitudine erui, et nasciturii semen terito, ac ammisceto, et in vino, aut lacte canino bibenda exhibeto. Hoc etiam fœtum expellit. Aliud fœtum ejiciens.
- 45 Ranunculum herbam, et parum elaterii in aceto temperato mixta bibenda dato. Aliud ad idem. Brassicæ caulē tenerum, extremitate ex necropo illita, affricato. Aliud, si menses non fiant. Terebinthi fructum tritum, in vino, et aqua dilutum, ac excolatum, jejune bibendum dato, et calida lavetur. Aliud inmensa ciens. Rubra pæoniæ grana in vino jejune bibenda dato. Aliud ad puerperii purgamenta purganda. Fœniculi semen, et crethmi corticem, et thus in vino bibenda dato. Aliud. Tadam quampinguissimam in vino coquito, et pæoniæ grana quinque in vino terito, et hemina quadrantem bibendum dato.
- 50 Aliud. Mercurialis semen, et folia in vino bibenda præbeto. Aliud. Pæoniæ grana nigra quinque, et sepiæ ova in vino bibenda dato. Ad omnem puerperam. Ad irionem, et polentam oleum affunde, et coctum sorbeat, et cibis quammollissimis utatur. Aliud. Scammoniam in lacte muliebri tritam, lana exceptam appone. Aliud. Mercurialis folia trita in lineo subde. Aliud. Herbam artemisiā tritam, et unguento rosaceo imbutam, appone. Aliud. Albam radicem tritam, ac rosaceo unguento subactam, appone. Aliud. Pæoniæ radicem melle, unguento rosaceo, et Ægyptio subactam, in lana subde.
- 60 Aliud. Farinam non lotam eodem appone. Aliud. Lolii, et tritici farinam, simul melle subactas, in lana subde. Aliud, quod menses, et puerperii purgamenta purgat, et aquam ducit. Radicis struthii tusi triti, quantum tribus digitis apprehendi potest, melle subactum appone. Nascentur autem in Andro in litoribus.
- 65 Aliud ad uteros depurgandos. Mercurialis contusa, et cucumeris sylvestris modicum in vino tere, et melle subacta appone. Aliud. Pilos leporis combustos, ac tritos in vino, et melle coctos, et aqua subactos bibendos dato, et aqua calida lavetur. Aliud partus purgatorium. Polentam crassius fœsam dimidii hemichænicis mensura, in aque heminis quatuor coquito, et ubi effuerit, bis, aut ter sorbendum dato. Aliud purgans puerperii purgamenta. Sambuci folia coquito, et oleo affuso bibenda dato. Edat et brassicas coctas, et porrum. Aliud purgans uteros. Rhœis folia, et irionem terito, et in vino, polenta inspersa, bibenda dato. Aliud. Misys obolos duos tritos, et vino subactos apponito.
- 75 Aliud. Lini semen tritum, vino subactum apponito. Aliud. Trifolii semen in vino bibendum dato. Si vero ad lumbos uteri incubuerint, polypos coctos edat, itemque affatos, et vinum bibat nigrum, odoratum, metacum quamplurimum. Aliæ porciones, medicamenta subditicia, ac purgatoria. Rhœm rubrum, et vinacea in aqua coquito, et farina tritici recentis in aquam inspersa, bibendam dato. Aliud. Farinam in aquam injectam bibendam dato. Aliud. Mora rubi siccat, ac terito, et polenta recenti ammixta, amborum acetabuli mensuram in vino odorato, et aquoso bibat. Aliud. Terram nigram saniam in aqua tritam, tali magnitudine bibendam præbeto. Aliud. Hypocistidem in vino bibendam dato. Aliud. Mala punica vinosa exsuccato, et polentam cum succo subactam siccat. Postea tritam in vino bibendam dato. Aliud. Baccas myrti nigras tritas in aqua diluito, et polenta inspersa, bibendas exhibeto. Aliud. Mali punici dulcis affati drachmam in vino tritam bibendam dato. Aliud. Triticum, et hordeum torrefacta, trita, et ad farinam redacta, in vino nigro bibenda dato. Aliud. Mali punici dulcis internam partem, pari aqua ammixta, bibendam dato.
- 85 Aliud. Cicuta, quantum tribus digitis apprehendi potest, cum aqua bibendum dato. Aliud. Farinæ tritici recentis, et gypsi æuales partes mixtas in aqua bibendas dato. Aliud. Mali punici dulcis corticem, ac corum in vino bibendum dato. Aliud, si sanguis ex uteris fluat. Viticis folia in vino nigro bibenda dato. Aliud ad fluxum, ac dolorem. Rosmarini radicem in vino bibendam dato. Alias item porciones ad uteros habes. Cedri fructus, seseli, cuminum
- 95 Æthiopicum, casie fructus, juniperi baccas, milium, lentisci fructus, nigellam, dauci radicem, ac semen. Aromata vero, thymum, thymbra, ericem, hypericum, pappaver album, crethmi radices, ac semen, malvæ radices, mercurialis semen, et folia, urticæ semen, salviā, populum nigram, dictamnium, pseudodictamnium, animum, cardamomum, helenium, aristolochiam, castorium, adianum, draconium, peucedanum, ruta folia, ac semen, apii semen, fœniculi semen, hipposelini semen, et radices, hippomarathri semen, et radices, struthii semen, et radices, hyssopum, cilicium, irionem, pæoniā, panaces. Quodcumque horum volueris, et cum altero permixtum, et per se in vino aut aqua, prout volueris coctum, exhibeto bibendum. Commoda sunt, et purgatoria, et quæ dolores sedant. Malvæ radicem in aqua dato. Aliud.
- 105 Pæoniæ semen modico cedrino oleo ammixto, in vino bibendum dato, et uterorum dolores sedabis. Aliud, quum uteri suffocantur. Castorium, et caryzam

myzam in vino albo bibenda dato. Si vero ad pares accollerint, emidii internam partem albam, melle ammixto, naribus illant. Aliud sedans dolores. Malva radicem, & feniculi, ac crethmi corticem ex aqua bebenda dato. Aliud. Seellas marinas nigras, & brassicam misceto, & in vino odorato bibenda prebe- 110 ro. Aliud. Myrrhæ obolos tres, coriandri parum, resinam, pæoniæ radicem, cuminum Æthiopicum, hæc trita in vino albo diluta, leviter tepescata, bibenda dato. Aliud, quod secundas expellit. Ricini radicem bibendam dato. Aliud, si ad cor allapsi uteri strangularint. Vicia, & pæoniæ semen in vino bibendum dato. Apollititia acris sanguinem dicentia. Cantharidas quin- 115 que thuri, ac myrrhæ ammisceto, & glandulam longam magnitudinis gallæ formatam, & lana obvolutam linteo albo circumdaro, & unguento Ægyptio albo, aut rosaceo inademfactam apponito. Aliud. Buprestim, si parva fuerit, totam, si magna, dimidiam, ad prædicta ammisceto, & eodem modo apponito. Si vero mollioribus, uti velint, buprestidas in vinum mitte, & cuminum Æthiopicum, & seseli, ac anisum addito, ac fervescito, ad decem vero buprestidas acco- 120 tabulum olei ammisceto, reliquis omnibus aequali portione acceptis. Ammisceto etiam myrrhæ, ac thuris parum. Ex hoc pugillum accipito, & velut priorem glandulam subdito. Aliud. Nigellam terito, cum melle, & vino subactam in glandulam redigito, ac utere velut superiore. Aliud. Philistum eodem modo præparatum apponito. Aliud. Telephium eodem modo præparatum sub- 125 dito. Aliud. Anemone folia trita linteo excipito, & myrrhæ parum ammisceto, & eodem modo utitor. Aliud, quod sanguinem ducit. Glandem Ægyptiam terito, & sinum unguentum, quod est in terra Ægyptia, addito, & aqua diluta, ac lana involuta, apponito. Aliud bilem purgans. Cucumeris sylvestris medul- 130 lam tritam, ac melle subactam, & ad glandis formam redactam, apponito. Aliud. Colocynthidis sylvestris internam partem terito, & melle subactam, eodem modo subdito. Aliud. Elaterii porciones quatuor, adipe asinorum, & caprino, & misy ammixto, in glandulam formatam, & in linteo apponito. Aliud. Thlaspi tritum, & melle imbutum apponito. Aliud. Foliorum fici saniem de- 135 radito, & clasterii porciones duas ammisceto, & niri tantundem, melleque subacta apponito. Aliud, si uteri inflammati fuerint. Nitrum rubrum, ficus pinguedinem internam, utriusque pares porciones tritas, & ad gallæ magnitudinem efformatas subdito. Aliud. Cumini folia cum vino trita, in linteo subdito. Aliud. Radicem albam terito, & melle affuso fervescito, & glandulam in- 140 ductam subdito. Aliud. Succum filpii, & ficum, mixta in glandem formatam, apponito. Aliud. Cucumeris sylvestris semen tritum eodem modo. Aliud. Fel tau- ri, nitrum rubrum, necopon, cyclaminum terito, & de singulis gallæ magnitudinem, de cyclamino vero plurimum, melli ammisceto, & apponito. Aliud. Cyclaminica- 145 put purgatum, in aqua tritum, ac linteo illigatum apponito. Aliud. Myrrham, salem, cuminum, fel tauri, hæc melle subacta, ac linteo excepta, subdito. Aliud. Grana enidia triginta deligito, & tria Indici pharmaci oculorum, quod piper vocatur, & alia tria de rotundis, hæc tria in vino veteri trita, & oleo disci diluta, ac subacta, lan- naque excepta subdat, & urina eluatur. Aliud. Tithymali succum melle sub- 150 actum, ac linteo exceptum apponito. Aliud. Scillæ radicem longitudine digitorum sex sumito, & duobus digitis lana obvolutis subdito. Alia molli- entia, a quibus aqua purgatur, & sanguis, ac menses dicuntur, si non diutius fue- rint, & os uteri mollietur. Narcissinum, cuminum Æthiopicum, thus, absin- thium, cyperum: aliorum quidem singulorum æquales porciones sumito, narcis- 155 sinum vero partes quatuor. Hæc trita, & in glandulam efformata, linteoque cru- di lini excepta apponito. Aliud. Cyclaminum magnitudine tali, & florem æris magnitudine fabæ terito, melle subigito, & efformatam hinc glandulam subdito. Aliud. Pulegium, myrrham, thus, fel suillum, melle subigito, & in glandulam efformata subdito. Alia acerba. Rhoem vino nigro subactum ap- 160 ponito. Aliud. Cnicum eodem modo præparatum subdito. Aliud. Lotiamenta eodem modo apponito. Aliud. Rhoem, melle ammixto, subdito. Alia mollientia. Sulphur, adipem, vitellum ovi, farinam melle subige, & tepescata in lana subde. Aliud. Pinguedinem asneris, adipem ovillum, ceram albam, resinam, unguentum rosaceum, tenui linteo excepta, appone. Aliud. Medullam cervi, & adipem liquefacito, & in lana apponito. Aliud. Adi- 165 pem ovillum, aut caprinum, & ovi candidum, rosaceo unguento subactum, ac lana exceptum apponito. Quæ ad cluendos uteros infunduntur. Grossos hyper- nos in aquam missos ad lentem ignem coquito, & oleo ad decoctum affu- so eluxo. Deinde vero malicorium, & gallam, & lotiamenta in vino aceto co- 170 quito, & hoc excolatum infundito. Aliud. Fecem vini combustam in aquam mitte, & postea cum aqua collue, deinde malicorio, myrri bacis, foliis rhois in vino coctis, vinum excolatum infunde. Aliud. Lentisci, salviæ, hyperici so- lia in vino nigro coquito, ac infundito. Aliud. Si quid in uteris fuerit exul- 175 ceratum; buryrum, thus, myrrham, resinæ parum infunde. Aliud. Porrum in aqua coquito, & excolatam aquam ad vinum ammixtam infundito. Aliud, 178

- Sambuci fructum, anisum, thus, myrrham, vinum fumico, & hanc succum infundito. Aliud, Brassicam in aqua coquito, & in brassica succo mercurialem coquito, modico lini semine adiecto, & postea excolatum infundito. Aliud, Myrrhæ acetabulum, thus, seseli, anisum, semen lini, netopum, resinam, melle pinguedinem asneris, acetum album Ægyptium, horum singulorum aequales portiones terito, & in vini albi heminis duabus diluito, & postea tepida infundito. Aliud, Mercurialem in aqua coquito, ac excolato, & myrrhæ acetabulum, thus, netopi, singulorum aequas portiones ammisceto, ac tepida infundito. Aliud, Salviæ, & hypericum in aqua coquito, ac infundito. Aliud, Sambuci fructum, & lauri baccas, aequas portiones, in vino coquito, deinde vinum infundito. Aliud, Pulegium in aqua coquito, & oleo ad aquam affuso immittito. Aliud, Pinguedinem asneris, & resinam, colliquefacta infundito. Aliud, Butyrum, oleum cedrinum modicum cum melle liquefacto, & tepida infundito. Aliud, Cyperum, junceum rotundum odoratum, calamum aromaticum, pari portione myrrhæ ammisceto, & cum his sismaridium in vino coquito, ac infundito. Aliud, Semen apii, anisi, seselis, nigellam in vino coquito, ac infundito. Aliud, Cedrum creticum in vino coctam infunde. Aliud, Bryoniam albam, & myrrham in aqua diluta infunde. Aliud, Argenti florem cum vino, & aqua infunde. Aliud, Elatern portiones duas aqua dilutas infunde. Aliud, Cucurbitas, sive colocynthidas sylvestres duas in vini, aut lactis cocti heminis quatuor madesacio, expolario, ac infundito. Aliud, Cucumeris sylvestris medullam palmi parvi magnitudine in aquæ heminis quatuor coquito, & melle, ac oleo affuso infundito. Aliud, Radicis thapsiæ duas portiones, & mel, ac oleum in duabus aquæ heminis diluito, ac infundito. Aliud, Veratri duas portiones in duabus aquæ heminis tepida infundito. Aliud, Thlaspios acetabulum, melle admixto, in duabus aquæ heminis diluito, ac tepide infundito. Aliud, Cucumeris sylvestris magnitudinem palmi parvi in aquæ heminis quinque coquito, & melle affuso infundito. Aliud, Grana cnidia sexaginta oleo, & melle diluta infundito. Aliud, Si natura pituitosa fuerit, encori potionem tritam in aquæ melle hemina Ægyptiæ diluito, ac infundito. Aliud, Si biliosa fuerit, daphnes potionem odorare illius drachmæ pondus, scammoniz potionem terito, & in aquæ melle, aut aquæ vitæ passæ hemina Attica diluito. Aliud, Daphnoidis potionem eodem modo, & si biliosa fuerit, hæc infunde. Si vero pituitosa, grana cnidia electa, & succi cithymali potionem infundito; Similiter etiam encoro, & peplo, utriusque his uti oportet. Immitte autem cum infuso non ampliore, quam duarum heminarum, suffusus porro sunt hæc contusa, Gallam suffuso. Aliud, Ramenta loti ad oleæ folia sicca contusa misceto, & oleo subacta suffuso. Aliud, Prunas subicito, & hordei paleis humidis inspersis suffusum facito. Aliud, Super amphora oleariæ operculo stoben incendito. Aliud, Cupressi ramenta suffuso. Aliud, Scammoniam, myrrham, thus, unguento affuso, suffuso. Aliud, Bitumen, & hordei paleas misceto, ac addita pinguedine phocæ suffuso. Aliud, Fraxinum, cupressi ramenta, cyperi radicem, unguento rosaceo subacta, suffuso. Aliud, Calamum, cyperum, bryoniam, muscum arboreum, apii semen, anisum, simul mixta & unguento rosaceo subacta suffuso. Aliud, Resinam siccam cineri fervido inspersam suffuso. Aliud, Cinamomum, myrrham, casiam, paribus singula portionibus suffuso. Aliud, Cypreum ammixta myrrhæ, & musco, aequali cum croco portione suffuso. Aliud, Calamum, cneorum, crocum, sola rosarum rubra suave olentia trita, & siccata ad crocum ammisceto, & styracem damidia croci portione addito. Hæc trita mixta, & siccata, melle cocto modico subigito. Horum vero omnium suffusus sit oboli Attici pondus. Sufficiant autem super stercore bubulo. Formetur autem stercus vehit acetabulum olearium, habeatque fundum tenue, & sit siccum. Ignis autem sit fermentitius, in quo stercus jaceat, & ex illo mulier infidens contexta sufficiant. Aliud, Galbanum, resinam, mammam, unguento rosaceo subacta suffuso. Aliud, Panacis, & cupressi ramenta, unguento Ægyptio albo subacta suffuso. Aliud, Cinamomum, nardum, & myrrham unguento rosaceo imbuta suffuso. Aliud, Violæ albae semen, cedri ramenta, & galbanum, melle subacta suffuso. Aliud, Stercoris caprini pilulas, & leporis pilos, pinguedine phocæ subacta suffuso. Aliud, Coaguli phocæ pelliculam contusam, ac tritam, & spongiam, & muscum arboreum, trita simul mixta, atque phocæ pinguedine excepta suffuso. Aliud, Stercus caprinum, & pulmonem phocæ, ac cedri ramenta suffuso. Aliud, Stercus bubulum, cedri ramenta, & bitumen suffuso. Aliud, Spinæ Ægyptiæ fructum, & cedri ramenta, & myrri sicca folia. Hæc trita, & unguento molli subacta suffuso. Mulca vero aromata in unguento mixta. Aliud, Vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinam pinus, simul mixtas, & passo cocto subacta suffuso. Fomenta, Stercus bubulum contusum, ac cribratum, aceti dimidia mensura, & decocti ervi dimidia adiecta, leniter pro fomento adhibeto. Postquam autem fomentum adhiberis, lenticulæ decoctum bibendum dato, ac revomendum. Et sariam forsendam, ac vinum insuper bibendum. Posttidie vero granum cnidii devorandum exhibeto.

hibeto. Sequenti die, quod urinam ciet, hoc scilicet. Ciceris albi partes duas tri-
tas, uvæ passæ tertiam partem, affusa aqua ad dimidias coquito, deinde excola-
tam aquam per noctem sub dio exponito, & postridie bibendam dato. Et de ce-
tero salivam, ac lini senem, polenta ad ambo hæc ammixta, bis per diem in vini
diluti heminis quatuor dato. Aliud. Olei heminas dimidias tres, foliotum
fambuci manus plenæ mensuram. Hæc cocta in craterem calidum fundito, & per tes-
tas calidas immisissæ fomentum facito, muliere in sella collocata, ac vestimentis
cooperta. Aliud. Foliorum sambuci manus plenæ mensuram, & myrti tantum-
dem in aquam misissæ coquito, & ad excolatam aquam, hordei paleas injicito,
coquito, & linteis excipito, ac cum hoc fomentum facito, prout maxime calorem
ferre poterit. Aliud. Acetum, oleum, aquam, niel, hæc mixta valde servefaci-
to, deinde accepta vesica capiente congium, aut utriculo ex tenui corio facto,
infuseto, & panniculo lino obvoluto, foveo. Quum autem tepidus factus fue-
rit panniculus, alium obvolvito. Aliud. Pini corticem, & rhois folia in aquam
conjecta fortiter coquito, & in excolata aqua hordei paleas coquito, oleo affuso,
ubi vero simul coxeris, linteis excipito, ac foveo: Aliud. Loti ramenta, &
cupressi, aqua, & oleo affuso coquito. Deinde simil cocta linteis excipito, ac fove-
to. Aliud. Aromata in aquæ chœnicem conjecta coquito, & in excola-
ta aqua surfures triticeos coquito, & foveo. Aliud. Eodem modo gallam
contusam, & rhamni corticem in aqua coquito, & cum aqua surfures triticeos subi-
gito, ac oleum ammiscito. Postea semassatum panem duos chœnicos habea-
tem facito, linteisque excipito, ac foveo. Aliud. Brassicam, & porum deco-
quito, & cum succo eodem modo fomentum facito. Aliud. Hordei paleas
coquito, oleo affuso, & linteis excipito, ac foveo: Aliud. Solasum, & olæ
folia coquito, & eodem modo fomentum facito. Atque hæc sane, si quidem humi-
dis uti volueris, pro fomento velut scripæ sunt, adhibe. Si vero siccis, panes
parato, & exallatos, & semassatos, & cum his foveo. Sed et testis calidis linteis
involutis foveo, itemque cum ipsis linteis calefactis, & cum lenticulis vasis testa-
ceis, fervente aqua infusa. Apponito autem ad pedes. Aliud. Iridis radicem tun-
dito, ac coquito, & eodem modo foveo. * Si aqua in uteris rigatur, menses
pauciores fiunt, & deteriores, & per longius tempus, & prægnans est semper
per duos menses, aut paulo amplius. Quum autem hoc tempus advenierit, & cor-
rumpit, & aqua multa in ipsa gignitur. Hinc autem lac bibendum dare oportet, & pe-
plum, incoqua dictum, donec fetus moveri inceperit. Plurimumque vero ante hoc cor-
rumpitur, & per abortum extruditur, & uteri sanguine manant. Hæc autem patitur ni-
hilo magis ex labore, quam aliter. Hoc autem cognoscere poteris, quod hydrops inest,
ex digiti contactu. Conspicies enim osculum ipsorum gracile, & obsecratum, ac plenum hu-
miditate. Si vero non circa initia, sed dum jam movetur, fetus ipsi corrumpatur, ac
suffocetur, tunc & venter imus intumescit, & ad contactum dolet, velut ulcero
præsentē, & febris ipsam, ac dentium fremitus corripit. Et dolorem habet acu-
tum, & vehementem circa pudentia, & imum ventrem, & lumbos, & laterum mol-
litudinem, ac coxendices. Quum sic habuerit, calida ipsam lavare oportet. Et qua
parte dolor hæserit, tepesfactoria adhibere, experimento facto de eo, quod maxi-
mo admittat, & phasmacum deorsum purgans bibendum dato. Interposito vero
tempore, quantum tibi sufficiens esse videbitur, & collutione facta, & fomento
adhibito, dyelaminum apponito, ita ut melle subactam, & linteis exceptam deli-
ges, & ad os uterorum apponas. Cupressi etiam ramenta in aqua madefacta, eo-
dem modo apponito. Verum hæc breviori tempore, & per longius temporis
intervallum, quanto magis mordent, & exulcerant. Et specillum stanneum pa-
ratum immittito, & digitum eodem modo. Potiones quoque bibendas datas, expe-
rimentum faciens, quas libenter admittat, & cum viro dormiat, maxime oppor-
tuno tempore præsentē. Si enim genituram conceperit, & prægnans facta fue-
rit, ac pepererit, subexpurgantur & quæ prius in ipsa fuerant, cum ipso puer-
perii purgamento. Atque sic maxime sana fieri poterit. Si indurati fuerint uteri,
& os ipsorum asperum sit, & menses occultantur. Quum vero apparuerint, vel-
ut arena sunt, & genitura hoc tempore non fit. Si vero etiam digito contigeris,
asperum conspicies os uterorum. Quum sic habuerit, cyclaminum terere ope-
ret, & salem, ac ficum crudam ammiscere, & cum melle efformata apponere,
& fomento adhibito, purgatoria infundere. Edat autem mercurialem, & brassicas
coctas, & succum sorbeat, & calida lavetur. * Si indurati fuerint uteri, & men-
ses occultantur, & os ipsorum concipiet, & non concipit. Quum sic habuerit, si
digito contigeris, conspicies os asperum, & digitum non intrinmittit, & febris ip-
sam corripit, ac dentium fremitus. Et dolor habet imum ventrem, & laterum mol-
litudinem, & lumbos. Patitur autem hæc, si fetus in ipsa corruptus fuerit pu-
trefactus. Quibusdam vero etiam ex partu contingit. Sape etiam aliter. Quum
sic habuerit, multa calida ipsam lavare oportet, & fomentum adhibere. Quum
autem recens lota, aut fota fuerit, immisso specillo os aperito, ac dilatato, & per
digitum eodem modo, et velut in prioribus scriptum est, apponito. Et potiones si-
militer bibendas datas, et eodem modo curato velut priorem. * Si uteri ad la-

- tus allapsi fuerint, tussis detinet, & dolor sub latus, & uterus durus velut pila in-
- 315 lides, & ad contactum dolet velut ad ulcere. Et contabescit, & videtur peripneu-
monia esse, & convellitur, & gibbosa fit. Et menses omnino non apparent, quibus-
dam vero prius conspecti, evanescent. Tunc autem sientes, debiles sunt, ac
pauci, antea deteriores quam antea, & genitura non fit hoc tempore. Quum sic ha-
buerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & eo epoto, multa cali-
320 da ipsum lavato, & ex tepesfactoriis, quod maxime admittit, adhibeto, & a quibus
sanguis purgatur, ea apponito, & lini semen tostum, tustum, ac cribratum, &
peplum album, & salivam cum polenta tenui, & caseum caprinum, sordibus, et
salis muria deraſis, hæc misceto, ut casei sint partes duæ, reliquorum vero una,
polenta autem fir antiqua, non falsa, et jejuna in vino bibenda daro. Vespere ve-
325 ro cyceonem crassum, melle affuso, exhibeto, et ex potibus quemcumque libenter
admisit, bibendum dato. Et frequenter somentum adhibeto. Calidam vero asper-
gato, et per ceratum leniter molliro, ac a latere detruhiro, et latus fascialata de-
ligato, et lac bubulum quamplurimum ad dies quadraginta bibendum præbeto. Cibis
autem utatur quammolliſſimis. Morbus hic vehemens est, et lethalis, et pau-
330 ca, etiamſi curentur, ipsam effugiunt. * Si os uterorum concludatur, forte fit
velut grossus ficus. Et si digito contigeris, comperies durum, ac contractum, et
digitum non intransit, et menses occultantur, et genituram non suscipit hoc
tempore, et dolor habet inum ventrem, et lumbos, et laterum mollitudinem.
Quandoque etiam sursum procedit, et suffocat, Quum sic habuerit, pharmacum
335 deorsum purgans bibendum præbeto, et multa calida lavato, et quæ os molli-
unt, apponito, et specillum immittito, ac aperito, et digitum similiter, et calidam
aspergato. Quum autem inolle factum fuerit, ea, quæ sanguinem purgant, appo-
nito, et ex porionibus dato, experimento facto, quam libenter admittat, et bras-
sica edat, et succum ejus sorbeat. * Si uteri obliqui fiant, etiam os ipsum
340 obliquum fit, et menses ipsi nunc occultantur, nunc prius apparentes evanescent,
et non similes sunt, sed deteriores, et pauciores quam antea, et genitura non fit hoc
tempore, et dolor habet inum ventrem, et lumbos, et coxam, et attrahit ipsam.
Quum sic habuerit, pharmacum iusſra purgans bibendum dare oportet, et calida
lavare, ac fovere. Ubi vero recens fota, aut lota fuerit, digito immisso, os u-
345 terorum corrigit, ac dirigat, et odoratorum suffitum admittat, et ex porionibus da-
to, juxta experimentum, quam libenter suscipit. Cibis autem utatur molliſſis, et
alia edat cocta, ac cruda, et cum viro dormiat, et in sanam coram decumbat. Al-
teri vero somentum adhibeat. Morbus autem difficilis cedit. * Si inflati fue-
rint uteri, et venter attollitur, ac inflatur, et pedes intumescunt, et cavæ faciei par-
350 tes, Colot vero injungendus fit, et menses non fiunt, et genitura hoc tempore
non fit, et anhelat, et anxia moeret, et quum surrexerit, aut progressa fuerit, ere-
ctæ cervicis spiratio ipsam tenet, et quicquid edierit, aut biberit, ipsam moleſtat,
et gemit, et magis ægre tristatur, quam priusquam ederet. Sæpe vero etiam suffoca-
tur. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, et cali-
355 da lavato, ac somentum adhibeto. Interposito vero tempore quodam, apponito
ea, a quibus purgetur, ac non mordeatur. Frequentissime vero totum corpus fove-
ro. Tunc autem et sub pudenda odorata suffiantur. Sub nares autem graveolen-
tia, et poriones dato, quæ uteros purgant, et ad locum compellunt. Et mer-
curialem edat, et lac bibat, velut de latere dictum est. Morbus autem non est diu-
360 rurnus. * Si sanguis grumi in utero coierint, os ipsum velut eruo plenum
fit, et si attigeris, ita habere deprehendes, et menses non fiunt. Neque genitura re-
tinetur, quando sic habuerit, Quum igitur ita habuerit, cyclamini corticem detra-
hito, et allium, et salern, et ficium, et mellis parum terito, ac permisceto, et glandu-
lam hinc formatam ad uterum os apponito, et alia uteris convenientia me-
dicamenta subito, quæ videlicet acra sunt, ac corrodunt, et a quibus sanguis pur-
365 gatur, et de porionibus dato eas, quæ uteros purgant, et omnia circumradio,
et vesicæ pellicula, sive cuticula digiti obvoluta, os uterorum deraduo. * Si
oborti fuerint uteri, et menses non fiunt, et genitura non manet intus, et dor-
lor habet inum ventrem, et lumbos, et laterum mollitudines, et si digito contige-
370 ris, os uterum attingere non poteris, nam foriter secessit. Quum sic habue-
rit, pharmacum bibendum dare oportet, a quo sursum, ac deorsum purgetur, ma-
gis tamen deorsum, et os ipsius, ac uteros quammaxime fovere, ac calida lavare bis
in die, et de porionibus dato, quam libenter suscepit pro experimento, et viro
conformiar frequentissime, et brassicam edat. * Si uteri commoti in loco non man-
375 serint, quo prolapsi fuerint, dolores exhibent, et in conspicui fiunt. Quandoque ve-
ro eminent velut sedes prolapsa. Ex quum quidem supina decubuerit, in loco ma-
nent. Quum autem surrexerit, aut se inclinaverit, aut alias se commoverit, exeunt.
Sæpe vero etiam quietem habent. Hanc quammaxime quiescere oportet, et non mo-
veri, et lectum ad pedes altiores statui, et iisdem uti, velut in superioribus, et
380 cum acerbis insulis conspergere, et graveolentia suffire. Sub nares autem odora-
ta, et malum punicum in medio per umbilicum perforato, et in ipso picem, quæ ma-
xime congruat, cum vino tepescito, et non valde premens, quampenitissime appo-
nito.

- nito. Quum autem quid apposueris, lana fasciam exceptum, ex lumbis deligato, ut ne dilabatur, sed maneat, & faciat, quod expectitur, & pepulum cum cafeo, & potentilla bibendum dato, velut in allapui ad lacus dictum est, & ex potionibus quammaxime 385
39 admiserit, bibendam præbeo. Cibus autem mollissimis utatur, & cum viro quammaxime dormiat. * Si hiauerit os uterorum magis quam solet, menses plures sunt, & deteriores, & humidiores, & per longius tempus, & genitura ipsam non contingit, neque intus manet, sed rursus foras effunditur, & si digito contigeris, os uterorum hians comperies, & impotentia ipsam corripit præ mensibus, & febris, ac rigor, & dolor tenet inum ventrem, & lumbos, ac lateris mollitudinem. Partur autem hæc maxime, si quid in ipsa fufum fuerit, & corruptum computruerit, statimur etiam ex partu, & alia aliter. Quum sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, a quo sursum purgatur, & quum dolor habuerit, tepesfactoria apponere, & calida lavare, & interposito tempore, per insula colluere, velut scriptum est in priore, & de potionibus dare quamlibentissime suscepit, & suffire, quæ 395
40 siccant. Edat autem polypos, & mercurialem. * Si levigati fuerint uteri, & menses plures sunt, & deteriores, & humidiores, ac frequentiores, & genitura intus non manet, sed rursus exit, & si digito contigeris, comperies os leve. Et impotentia ipsam corripit præ mensibus, & febris, ac rigor, & dolor inum ventrem, & lumbos, ac lateris mollitudinem, maxime si quid in ipsa corruptum computruerit & ex partu, & alias. Quum sic habuerit, curare oportet, ubi dolor habuerit, velut scriptum est in priore. * Si uteri ad venterem nutaverint, dolor acutus, & vehemens contendens, & lumbos, ac laterum mollitudinem habet. Et crus claudicat. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, posttridie 405
41 vero suffire hoc modo. Hordei chœnices duas, & oleæ solia probe contusa, & gallam contusam, ac eribratam, & hyoscyami tertiam chœnicens partem. Hæc mixta, & olei hemidia dimidia assusa, efformata in olla per dies quatuor, ter in die suffuso. Noctū vero lac bubulum, & mel, & aquam bibat, & calida lavetur. * Si ad caput conversi fuerint uteri, signum hoc est. Venas in naso, & sub oculis dolere videtur. Hanc calida multa lavare oportet, etiam in capite, lauro, & myrto in aqua incoctis, & caput unguento rosaceo illinatur, & odorata subter fuffiantur, & brasicam edat, & succum absorbeat. * Si ad crura, & pedes conversi fuerint, ex hoc cognoscet. Magnus pedum digitis convellitur sub unguem. Et dolor crura, ac femora tenet. Quum sic habuerit, multa calida ipsam lavare oportet, & somentum adhibere, quod maxime libenter admiserit, & subter suffire graveolentia. Et nunguento rosato ungere. * Si mulier cibum averfans uteros doleat, & febris ipsam, ac rigor corripiat, pepi albi quintam dimidia chœnicens partem, & seminis urticæ tantundem, & casei caprini rasi dimidiam chœnicens, simul cum vino veteri mollito, deinde cocta sorbenda dato, 420

S E C T I O III.

- 43 * Si ex partu fluxus corripiat, & cibi in ventre non moeant, uvam passam nigram, & mali punici dulcis grana trita, & coagulatum hœdi vino nigro diluito, ac utitor, ita ut caseum caprinum derafum, & potentillam criticè correfactam adjicias, & bene temperata bibenda præbeas. 1
44 * Si ex partu sanguinem vomat, hepatis fistula fauciat est, & dolor ad viscera procedit, & cor convellitur. Hanc multa calida lavare oportet, & tepesfactoria, quæ maxime admiserit, adhibere, & asinum lac bibendum ad dies quinque dare. Postea vero vacuæ nigre lac bibendum præbere, ita ut sine cibo degat, ad dies quadraginta. Ad vesperam vero sesamum ritum bibat. Morbus hic est periculosus. * Si mulier diu non concepit, mensibus apparentibus tertia, aut quarta die, alumen tritum unguento dilutum, lana exceptum appono, & per tres dies appositum habeat. Tertia vero die fel bovis radito, & ramentum oleo dilutum, ac subactum, linteo exceptum apponito. Et tres dies appositum habeat. Sequenti 10
45 vero cum viro coeat. * Ad uterorum morbum sedandum, lini scissi una cum stipula pugillum tenuiter tufum, in vino albo quamcunctissimo per noctem madefactum, deinde excolatum in ollula tepesfacto, & in eo lanam mollissimam tinctam apponito, & vicissim priore detracta aliam subdito. * Si uteros purgare voles, primum quidem hordeum oleo imbutum in prunis suffire oportet. Posttridie vero carnem ovillam coquere, cum hordei decocto sub dio per noctem exposito. Sit autem decoctum hordei congrui mensura, & valde ipsas coquito. Ubi 20
46 vero coctæ fuerint, leviter tepidas edat, & iusculum sorbeat. Posttridie autem thus, & pulegium tritum, melle subactum, & lana exceptum ad rridum subdito. 25
47 * Si uteri ad sedem conversi fuerint, & secessus secedere prohibuerint, dolores habent & lumbos, & inum ventrem, & ilia. Quum sic habuerit, calida ipsam lavare oportet, & lumbos fovere, & graveolentia suffire, & apponere, quæ purgant, & impellunt ipsos uteros, & bibenda dare ea, quæ maxime admittit. * Si ulceratum fuerit os uterorum, aut inflammatum, myrrham, & adipem asinerum, 27
Hipp. Opera, P 3 & ceram

- & ceram albam, & thus in leporeis pilis, qui sub ventre sunt, misceato, ac terito, & in lana molissima apponito. * Si secunda decedere non possint, statim quidem a cibo abstinere oportet. Vitiis autem solia trita in vino, & melle, oleo assulso, tepescacito, & hemina mensuram bibendam dato. * Si inflammati fuerint uteri, sambuci solia tenerrima in tritici recentis crassiore farina coquito, & leviter tepida sorbenda dato. * Si uteri transinoti fuerint, hederam sicciissimam tritam, & linteolo tenui, illigatam, subdito, & pingue aliud nihil adhibeto.
- 35 Bibendum vero dato triticum recens, & pepulum tostum, & salvinam, & cyperum, & anisum. Hæc trita vino diluta cum furluribus hordei bis in die dato, pro vice dimidiam heminam. * Si menses constituto tempore non fiant, brassica solia, & rutam terita, postea paleas hordei chcenieis mensura madefacito, donec succescant, & per noctem sub dio exposito. Mane vero in hemina inde excolata brassicam, ac rutam diluto, & assulso oleo conquassato, & bibenda dato, postea poly-
- 40 pum vino albo suffocatum edendum dato, & vinum ebibendum. Si vero volueris, pisces odoratissimos coctos edendos dato, & jusculum sorbendum. * Si ex seruido, & superficario ulcere pudenda fuerint exulcerata, myrri bacis in vino coctis pudenda colluat. Et postea mali punici dulcis putamina in vino coquito, & myrrham, ac resinam simul mixta vino diluto, & inunctum in his linteum sub-
- 45 dito. * Si urinæ stillicidium corripat, cucumeris, sive cucurbitæ os, & fundum refecato, & subiecta prius cucumini circumponito, & inspersa in ignem myrrha, mulierem super cucumini locato, ita ut summam cucumeris partem quam penitissime in pudendum indat, quo vapor plurimus in pudenda transmittatur. Hæc ex
- 50 portionibus urinarum cientibus jejuna aliquas exhibeto. * Si ad cor progressi, uteri suffocent, et non decedant, porri semen tritum, & pulegium in aquæ cyathis tribus, et aceti albi cyatho uno, et mellis tertia cyathi parte diluto tepescacito, & jejuna sorbenda dato. * Si ex partu, aut abortu rigor corripuit, insperi-
- 55 fructum, & salvinam simul trita in aceti albi cyatho diluto, et vini albi diluti poculum assundito, versato, ac stare finito. Mane vero excolato, et tepescacito bibendum dato. * Si uteri inflati fuerint, et si ventus in utero fiat, et dolor, salvinam, et cyperum rufa madefacito per noctem, et mane excolato, et purum cremorem in ollam fundito, tritici farina crassiore adiecta, et aceti albi cyatho assulso, et succi silphii magnitudine fabæ addita, et cocta crudius sorbenda dato.
- 60 * Si in pudendis graveolentia fuerint, et columella nascatur, et dolor habeat, dolorem quidem sedabit apii semen jejuna in vino datum. Graveolentiam vero, anisum eodem modo datum. Columellam vero refecare oportet. Si ulcera fiant in pudendis, et pruritus corripiat, oleæ, et hederæ, et rubi, et mali punice dulcis solia trita in vino veteri dilue, et postea carnem recentem solis inter-
- 65 ge, et appone. Et habeat subditam per noctem. Mane vero eximat, et myrrum in vino decoquat, et cum vino pudenda colluat. * Si genitura non suscipiat, mensibus secundum naturam, hæmorrhagis, membrana ante uteri os excrevit. Contingit etiam ex aliis causis. Cognosces autem hoc, si digitum admoveris, membranz prætextum continges. Ad hæc medicamentum subditum facere oportet. Resinam
- 70 itaque, et æpis, florem melle diluto, et linteum, ex his rictum penitissime indito, filo ad extremam partem dependente illigato. Quum itaque hoc exiuerit, myrrum in vino coquito, et cum vino tepido eluatur. * Si anhelationes corripiantur mulierem, sulphuris magnitudinem fabæ, et nasturtii tantundem, et rutam, et cuminum Æthiopicum, hæc trita, et vino diluta, jejuna bibenda præbero. Oportet autem & a cibis abstinere, & non frequenter edere. * Si paries inflata fuerint, hepar ovillum, aut caprinum calido cinere obrutum, edendum dato meracius ad
- 75 dies quatuor, & vinum bibat vetus. Si lumbos doleat, anisum, & cuminum Æthiopicum bibat, & calida lavetur, & subcalidam bibat. * Si menses non fiant, restam crassam exurito, ac terito, & origanum in pinguedine anseris coctam terito, & ad testam in linteum ammisceto, ac tepida apponito. * Si uteri conclusi
- 80 fuerint, & menses non apparuerint, colocynthidem sylvestrem, & silphii semen, cuminum Æthiopicum, nitrum, salem thebaicum, adipem chenalet, farinam, myrrham, & resinam. Omnia hæc servescacito, simulque mixta, ac trita in glandulam efformato, & apponito. * Si uteri ad viscera conversi strangulantur, vinum cedri-
- 85 num, & cuminum Æthiopicum bibat, & calida lavetur, & subcalidam bibat. * Si menses non fiant, adipem anseris, & nepotum et resinam mulier lana excepta subdat. Si vero magis quam convenit, prodeant, fusium, & æpis linguam in lana apponat. * Si transinoti uteri aliquo allapsi fuerint, hordium decort-
- 90 eatum rritum una cum paleis sime, & cum cornu cervino vino subige, et hinc uteros suffice. * Si secunda decedere non possint, foeniculum vino, et oleo, ac melle servescacito bibendum dato. * Si menses non appareant, et vellis ipsos detrudere, crassorem tritici farinam, et hordium coquito, et oleo assulso edenda dato. * Si inflammati fuerint uteri, cotyledonis solia, et portum in crassiore
- 95 tritici farina coquito, et assulso oleo edenda dato. * Si moti uteri aliquo allapsi fuerint, et dolorem exhibuerint, oleæ scabiam, et lauri, ac cupressi famenta in aqua coquito, et linteo excepta apponito. * Si uterus doleat, et ad vesicam

fuerit

- fuerit dolor, porri semen in aqua tritum jejuna bibendum prabe, & repelactoria adhibe. * Si uteri prominuerint, lotos ipsos cum aqua tepida, & vino, ac oleo illitos rufus intrudito, & ex lumbis deligato, & graveolentia suffuso, & si urinam emittere non poterit, calida lavato, ac foveto, & cupressi ramenta suffu- 100
76 ro. Et portiones urinam cientes bibendas dato. * Si fluxus fiat, acerba suffuso, & stercus asini derafum, lana illigatum subdito. Sit autem stercus siccum. * Si in pudendis ulcera fiant, adipem bubulum illinco, & apponito, & cum vino, in 78 quo myreus cocta est, colluito. * Si ex partu os uterorum fuerit exulceratum, florem rosarium tritum, & vino imbutum, in pilis leporinis apponito, & acerbis 105
79 colluito. * Si uteros doleat, allii caput integrum, & nitrum rostum, & cuminum terito, & melle subacta subdito, & calida lavetur, & subcalidam bibat. 80
* Si ex fervido, ac superficiario ulcere pudenda fuerint ulcerata, adipem bubulum, & butyrum, & anseris adipem, ac sulinum unguentum misceto, & ex his pu- 81 denda illinito, & aqua tepida colluito. * Si uteri ascendentes suffocant, funi- 110
culum lucernarium accensum extinguito, & naribus admoveo, quo fumum attrahat, postea myrrham unguento dilutam, & lana exceptam apponito. Et resi- 82 nam oleo dilutam bibendam dato. * Si secunda non fecerat, conyzam tritam, 83 lana exceptam apponito, & ignem in vino tritam bibendam dato. * Si caput do- leat, & imum ventrem, & lumbos, bilis in utero est. Huc itaque pharmacum dare o- 115
portet, quod sursum, ac deorsum purgare potest, & calida lavare, & apponere, 84 quae bilem purgant. Et anisum, ac nigellam vino diluito, & bibenda dato. * Si fluxus oboritur, caneros fluviales in vino suffocato, & vinum bibendum dato, 85 & quae siccant, suffuso, & apponito. * Si fluxus oboritur, porri pugillum in vino tritum bibendum dato, & siccis, & acerbis utatur. Si fluxus oboritur, 120
mulsi stercus combustum, rufumque, ac cribratum, vino dilutum bibat. Reliquis au- tem eodem modo utatur. Si fluxus oboritur, & jam diuturnus fuerit, spon- giam combustam, ac tritam, vino odorato dilutam, bibendam dato, & per suffu- 86 tus resicca, & quae restringunt, appone. * Si uteros purgare velis, nitrum, cu- minum, allium, & ficus terito, & melle subacta apponito, & calida lavetur, & sub- 125
87 calidam bibat. * Si uteros doleat, cyclamini radices in vino jejunae bibendam 88 dato, & calida lavetur, & subcalidam bibat. * Si lac extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, sceniculi vero semen bibendum dato, & radices for- niculi decorticas, ac butyrum simul coquito. Quum autem cocta fuerint, frige- 130
facito, ac bibenda dato. Commodum est etiam hippomarachrum, & hippolefinum si- mul coctum. Si lac extinctum fuerit, porrum tritum, aqua dilutum bibendum prabe, & calida lavetur, & porrum, ac brassicam edat, simul coctis cythi solis, & succum socbeat. Si lac extinctum fuerit, salviam, cedri, aut juniperi baccis 135
adfectis coquar, & ad diffusum, vinum affundat, ac bibat, & ad caetera farina in- spersa, additoque bulbo, & modico oleo affuso, edat. Et acria, & acida, & salia, 136
89 autem olera omnia vitet. Nasturtium vero in vino potum commodum est. Nam lac purgat, & calida lavetur, & subcalidam bibat. * Si velis mulierem pregnantem fieri, ipsam, & uteros purgato, postea farinam jejuna edendam dato, & vinum me- racum insuper bibendum, & nitrum rubrum, cuminum, ac resinam, melle subacta in linteo subdito, & ubi aqua defluerit, nigros pessos mollitiores apponat, 140
& cum viro dormiat. Si pregnantem facere voles mulierem, ipsam, & uteros pur- gato. Deinde linteum tenuissimum resiccatum, ac melle imbutum in glandes effor- mato, & in fici succo tinctos apponito, donec fuerint aperti. Postea vero magis intrudito. Ubi autem defluerit aqua, vino, & oleo collata, cum viro dormiat. Bibat 145
90 autem & pulegium in vino cedrino, quum viro condormire voler. * Medicamen- tum, sœtem ex uteris pellens. Cucumeris sylvestris succum portionis mensura, in mazam conspergum apponito, ubi ad duos dies antea jejunavit. Aliud. Staphi- 91 dis sylvestris pugillos duos in aqua multa dilutos, bibendos dato. * Experimen- tum foecunditatis. Caput allii integrum derafum, uteris apponito. Postridie vero digitum immittat, ac contingens consideret, & si quidem oluerit inde os, bene ha- 150
bet; sin minus, rursum apponat. Aliud experimentum. Neropum modicum in lana involutum apponat, & consideret, an per os oleat. * Alia subditiia medicamen- 92 ta. Scorpii marini sel, in lana involutum, & in umbra siccatum apponito. Pule- gium siccum tritum, melle imbutum in lana apponito. Cucumeris sylvestris semen, & restam combustam, vino subactam, cum pilis leporinis, in lana subdita. 155
Alumen Aegyptium, lana involutum apponito. Cantharidas vino subactas, in lana subdito. Herbam artemisiâ vino subactam apponito. Nigellam in 93 vino tritam, in lana subdito. * Aliud ad recens enixam. Unguentum rosaceum, & ceram, in lana apponito. Bulbion ex tritico, tritum, & vino subactum, in lana subdito. Vini albi veteris fecem combustam, & vino albo extinctam, ac tritam, 160
in lana apponito. Galbanum, neropum, & mysi, cum unguento rosaceo, in lin- teo apponito. Elaterii portiones duas, & savum cum vino, in linteo apponito. Butyrum, & alumen melle subactum, in linteo subdito. Scammoniae succum, & adipem cum maza misceto, & vino imbuta, in linteo apponito. Si concipere no- lit, misyos sabæ magnitudinem, aqua dilutam, bibendam dato, & per annum non coq- 165
cipiet.

- cipiet. * Si periculum facere velis in muliere, an pragnans sit, aut non, rubro lapide 94
 five terra erithrea oculos sublinito. Et si quidem ingreditur pharmacum, præ-
 gnans est; sin minus, non. * Si pragnans pudenda tervido, & superficario ulce- 95
 re fuerint exulcerata, amygdala trita, & medullam bubulam in aqua coquito, & mo-
 dica farina adjecta, pudenda illinito, & baccatam myrti decocto colluito. * Si 96
 170 virgo ex lapide laborarit, semen radices Æthiopice in vino veteri ad dies decem
 dato. Deinde in aqua ad dies viginti, & bis in die multa calida lavato. * Cara- 97
 plasmatum, Allium, portulacum, apium, loti, & cedriamenta, trita simul, mixta aqua
 multa, diluto, & caraplasma hinc factum imposito. Rubi folia, myrti folia, si-
 mul trita aqua multa diluto, & polenta ammixta subacta imposito. Sambu- 175
 ci folia, myrti folia, terebinthi folia tenerrima, eodem modo apponito. Lori ra-
 menta, mori folia, simul trita, mixta, aqua diluta cum uva passa imposito. * Suffi- 98
 tus. Oviculus, aut capre cornu tustum, & hordecum tostum, ac frelum, oleo subigi-
 to, ac suffito. Cervi cornu, & olivas nondum habentes oleum, simul trita mixta
 180 suffito. Rhoem rubrum, & polentam tostam oleo subigito, ac suffito. Polen-
 tam, & stercus bubulum, & paleas oleo subigito, ac suffito. Loriamenta, &
 rhois folia, & cupressi sicca ramenta, vino nigro austero subacta suffito. Galba-
 num, mannam, & resinam, unguento subacta suffito. Capre cornu, & gallam,
 & adipem suillum, ac cedriam suffito. Terram ex asinorum pedibus deradito, &
 185 stercus asinum cum vino nigro subito, ac suffito. * Collusiones. Folia 99
 myrti, & lauri, ac hederæ in aqua coquito, & cum hac tepida colluito. Rhois,
 & mali punice, ac rubi folia in aqua multa coquito, & cum ea excolata colluito.
 Sambuci, & lentisci folia in aqua coquito, & excolatam leviter tepidam infundi-
 ro. Foeniculi, & brassicæ radices rufas in aqua coquito, oleo affuso, & postea
 190 cum excolata colluito. Oenanthen, & cyperum, & uvas passas in aqua mul-
 ta coquito, ac colluito. * Malaginata. Malvam, & fenogrecum in aqua ferve-
 facito, & cum excolata aqua leviter tepida colluito. Cupressi ramenta, & ama-
 racum in passo aqua temperato coquito, ac colluito. Serpillum, & violæ albæ ra-
 dicem, in aqua multa coquito, ac colluito. Hypericum, & lentiscum, & bæcas
 195 cedei in aqua coquito, & cum leviter tepida colluito. Favum, & buryrum, & resi-
 nam, & adipem asinum in aqua coquito, & colluito. * Fomenta. Lohum
 tostum, ac molitum in posca meracioris coquito. Postquam autem coxerit, linleo il-
 ligato, & soveti. Lentem testam, detriti caram, & in farinam crassiorem alicæ si-
 milem redactam, in aqua recocto, & linleo illigato, ac soveti. Ervum eodem mo-
 200 do parato, ac soveti. Commoda est & salvia eodem modo parata. Salviam,
 & hypericum in aqua coquito, & hordei paleas in decocto coctis, & linleo exceptis
 soveti. Loti, & cupressi ramenta in uva passa cremore coquito, linleoque ipsa
 illigato, ac soveti. Oleæ, & myrti, & hederæ, ac lauri folia in aqua coquito,
 & in decocto hordei paleas coquito, deinde linleo illigato, ac soveti. Cupres-
 205 si ramenta, & cedri, & hordei surfures simul misceto, & in uva passa cremore sub-
 bigito, ac panem formato, & cum hoc affuso, calido in lauteum illigato, soveti. Vio-
 læ albæ semen, aut radices in aqua coquito, & cum aqua surfures tritici subigito, ac
 panem formato, cum quo calido in lintheo involuto, soveti. Serpillum in aqua
 coquito, & surfure triticeo in aquam coniecto, eodem modo soveti. Spongiæ
 210 calefactæ, & adhibeto, & cum mollibus lanis, & panniculis lanæ, & vasistæ facias
 aqua insula, & utriculis eodem modo, & decactionibus in utres infusus, soveti.
 * Purgatorium. Si mulierem parere non potentem, facere velis, ut pragnans fiat, 101
 considerate oportet in menses, an biliosa, aut pituitosa sit. Cognosces autem hoc,
 arena tenui sicca ad solem conspersa, & quum menses prodierint, sanguine super are-
 nam in sole effuso, ita ut ipsum sicari sinas. Si enim biliosa fuerit, sanguis super
 215 arenam siccatus, pallidus sit. Si vero pituitosa, velut mucus existit. Horum igitur,
 utrum tandem fuerit, ventrem purgato, sive sursum, sive deorsum purgatione opus
 habere visa tibi fuerit, postea paucis diebus interpositis, uteros purgato. * Utero-
 rum fomenta. Si duri fuerint uteri, & non concipiat; vinum quamviscundissimum
 220 cum pari aqua temperatum, trium semicongiurum Atticorum mensura, & foeniculi ra-
 dices, & seminis fœniculi quartam partem, & unguenti rosacei semiheninam, hæc in
 vas novum fundito, & vinum affundito. Vasis autem operculum perforato, et imposi-
 ta arundine soveti. Arundinem vero cum operculo tollito. Si enim sine opercu-
 lo abstuleris, exutetur. Postquam autem fota fuerit, seillam apponito, velut infra scri-
 225 ptum est. Apponito autem, donec dixerit molle, et amplum esse uterorum osculum, et
 si quidem exulcerata fuerit, et pustule in purgatione fuerint, si summa labia ulcera-
 ta fuerint, anisum, et adipem asinum in rosaceo oleo terito, et in lana invol-
 vito, et accepta earne bubula, magno pedis digito erassiore, sex digitorum longitu-
 dine, ipsam pharmaco illinito, et lana exceptam involvito, et ad extremam carnis
 230 partem, quæ foras spectat, filum alligato, et reliquam in utero indito, ubi est ulcus.
 * Mensium purgatoria. Si non procedat menstrua purgatio, cucumeris syl-
 vestris internam partem pondere trium obolorum, et artemisiæ herbam, et thu-
 ris obolum terito, et ammixto melle in lana involvito, et ad os uteri apponito,
 quinq; in die hoc faciens. Aliud. Vitem viridem terito, et melle ammixto,
 lana

lana excipito, & eodem modo apponito. Aliud, Cupressi fructum, & cucume-
 ris sylvestris internam partem, & thus terito, & melle ammixto, lana excipito, &
 eodem modo subdito. Aliud. Cupressi fructum, & thus terito, & melle ammi-
 xto, lana excipito, ac subdito. Aliud. Abrotani obolos tres cum melle lana
 excipe, ac subdit. Aliud. Elaterij obolum, & myrrhæ obolum terito, & cum mel-
 le lana involvito, ac subdito. * Purgatorium, si mulier non concipiat. Tauri
 urinam collige trium heminarum mensura. Deinde artemisiam herbam, aut parthe-
 nium, aut adianthum, & laurum viridem, & cedri ramenta simul contunde. Deinde
 in effusa scrobe carbonēs accende, & imposita olla urinam tauri infunde, & contu-
 sa in mortario adice, postea sellam circumpone, & artemisiam herbam, aut hyssopum,
 aut origanum impone, & muliere super hæc collocata, donec sudet, sove. Ubi
 vero sudarit, lava cum calida, & in lavacrum artemisiam, & laurum immitte. Deinde
 subditum medicamentum adhibe. Aut artemisiam, aut bulbium in vino albo tritum
 lana involutum subdat. Hæc ad tres dies faciat, & deinde cum viro dormiat. Sub-
 ditum pharinacum ad concepum faciens. Ex nitro, & thure cum melle glandem
 formato, & apponito. Aliud purgatorium molliens. Caricam coquito, donec
 granula absciat, & hanc expressam, levissime tritam in lana cum rosaceo unguen-
 to apponat. Aliud acrius. Brassicæ, rutæ partes portiones tere, ac utere eo-
 dem modo. Aliud molle, & purgatorium. Medullam anseris, aut bovis, aut
 cervi, magnitudine sabæ, affuso unguento rosaceo, & lacte muliebri, terito, velut
 molle pharinacum teri solet, deinde ex hoc os uteri illinito. Aliud repidum
 purgatorium. Anseris medullam magnitudine nucis, resinæ lentissimæ aut terebin-
 thinæ magnitudinem nucis. Hæc in unguento rosaceo ad lentum ignem liquefa-
 cito, & velut ceratum facito, & deinde ex hoc tepido os uteri illinito, &
 pectinem madefacito, Aliud detrahens purgationem et sistens. Prænix grana
 nigra aut rubra, tria aut quatuor in vino trita bibenda dato. Si vero ma-
 gis detrahere voles, grana nigra eodem modo trita bibenda præbeto. Aliud
 purgans ac detrahens. Lauri baccas ad summum viginti, et seselis dimidium
 acetabulum, cum vino trita bibat. Aliud. Tauri sel, trium dimidiorum o-
 bolorum Attritorum pondere, in vino icuinæ bibendum dato. Et efformata quoque
 ex ipso catapostia devoranda dato. Aliud. Farinam recentem, myrrhæ obo-
 los tres, croci tantundem, castorei obolum, hæc cum unguento rosaceo trita ap-
 ponat. Aliud purgatorium. Semen utricæ, et malæ succum, cum adipē anserino
 tritum subdat. Aliud. Si non purgata fuerit ex partu, florū farinæ quantum
 tribus digitis comprehendere potest, coquito, & melle affuso, ventri velut cataplas-
 ma imponito, & bibendum dato. Aliud, quod uteros aperit, & purgat. Can-
 tharidas quinque acetō albo affuso terito, & non valde liquidum pharmacum faci-
 to, sed ut digitis effingi possit, & de ficu, alba pingui, sine granulis & pelle, du-
 pliam cantbaridum partem ammisceto, & efformatam glandulam tenui lana in-
 volutam subdito. Aliud. Si ex partu non fuerit purgata, trifolium in vino al-
 bo bibendum dato: hoc etiam menses educit, & fortis expellit. Aliud purgans
 uteros. Quum puero immortuo sanguis intus manserit, colocynthidem sylve-
 stre in melle tritam delingat, aut subdat. * Aliud sanguinem purgans. Sangui-
 nem ex uteris expelles, si violæ albæ semen tritum, vino dilutum, bibendum dederis.
 Aliud, quod similiter sanguinem ex uteris expellit. Rhois seminis, quum rubrum
 fuerit, grana viridia triginta terito, & rosas caninas rubras, rubicundo ex ipsis
 delecto, in vino bibenda dato, quum sanguis eruperit. Aliud purgatorium. Si
 menses non apparuerint, styracem & origanum terito, commisceto, & adipe anse-
 rino affuso apponito. Aliud, quod subditum uteros purgat, ac evacuat. Ab-
 sinthii radicem tritam cum melle, cum oleo apponito. * Subdititia uteros pur-
 gantia, aperientia, & aquam ducentia. Scillæ frustum longitudine sex digi-
 torum, & digiti parvi crassitudine accipito, & de hoc duos digitos circumderadi-
 to ac levigato, & reliquum lana fordida involvito, eam vero partem, quæ circumra-
 da est, ad os iterorum subditam, per diem ac noctem appositam finito. Postquam
 autem lavit & abstulit, aqua odorata colluatur. Aliud purgatorium molle, quod
 aquam & pituitam ducit, & pallidos ac subcruentos menses detrahit, si non du-
 turni fuerint, & os emollit. Unguentum narcissinum, cuminum quod edimus,
 myrrham, thus, absinthium, cupressum, salem, rosaceum oleum sumito. Et de al-
 lis quidem singulis congium accipito, narcissini vero partem quartam, & omnia
 in glandem efformata, ac crudi lini lintea excepta subdito. Aut linteam tenue
 pennæ circumdato ac deligato, & in oleo albo Aegyptio tinctum apponito, & tota
 die appositum finito. Deinde ubi lavit et abstulit, aqua odorata colluatur.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS MULIEBRIBUS

LIBER I.

Argumentum in Librum sequentem.

1. Mulieres, quæ purgationes a partu sunt expertæ, minus laboriose purgantur symptomata, quæ circa purgationis menses accidunt.
2. Mulier rariore carne præditæ, quam vir. Lanæ aequalis ponderis eam velle pura, & contexta, plus aquæ trahere. Mulier viro calidior. Vir muliere siccior propter labores.
3. Quomodo ex mensibus suppressis morbi generentur, & quæ ratione menses supprimantur, & quibus id frequenter accidat. Uterorum obstructorum causa.
4. Uteri conclusi. In tertiliis mensibus quatenus bene, aut male officiantur. In quartis. Signa in quartis mensibus expurgationibus mensibus impeditis. In quintis. In sextis incurabilis est. Signa in muliere, cui mensis purgationes ad sex menses occultantur.
5. Uteri ad stomachum allapsi. Pocis privatio, & stomachi morsus. Urina rubra. Alia signa.
6. Mensium ad pulmonem progressorum, ac receptorum signa eadem, quæ in tabe. Mensium suppurationum causa, & signa. Ulcera post menses suppurationis.
7. Steriles ex magnis in utero ulceribus. Mensis supra inguen erumpentes.
8. Tuberculum supra inguen sine capite magnam, rubrum, ex mensibus non suppurationis.
10. De mensium occultationum signis, & curatione. Crechmon in vino thadaceo.
11. De ulcerum in utero generatione. Menses reventuri, mulieres nunquam se prægnantes existimantes, fallunt. Menses suppurationis quinto, aut sexto mense supra inguen erumpentes. Menses putrefacti, & putrenti in pudendum prodeuntes.
12. Menses ad septimum mensem retenti. Mensis pituitosi.
13. Mensium pauciorum, quam convenit, signa.
14. Menses plures, & crassiores, quam oportet, prodeuntes, & eorum signa.
15. Mensium mensura infra, & tempus. Mulier sana ex mensibus cognoscitur. Plures quam quatuor dies, & infra tres purgari, quales mulieres officiat.
16. Suffocatio unde, & quibus potissimum accidat. Signa.
17. Uteri ad hepar, & præcordia. Asphus Herculeus. Uteri ad vesicæ stomachum. Uteri ad lumbos, & coxas conversi.
18. De mensium biliosorum cognitione, & signis.
19. Quibus menses plures, aut pauciores fiant. Semitis biliosis in mulieribus prægnantibus,

- bus, Venter turbatus. Levis biliosorum purgatio utilis. A fluxu bilioso non purgata, nec ulli signis apparentibus. Ex biliosis mensibus in acutum morbum transiunt.
20. Uteri ab ulceribus inflammati.
 21. Mensium pituitosorum cognitio, & causa. Menses terram instar aceti radentes.
 22. Non concipiuntum affectiones, & curationes. Genitura statim a coitu exentis causa. Postera die, aut tertia. Purgationis biliosa, aut pituitosa qualitas unde peritenda.
 24. Curatio a morborum causis inchoanda.
 25. Menses pituitosi a quibus prodeant. Fomentum purgationibus semper præmittendum.
 26. Quando prolis causa coeundum. Suffus instrumenta. Ut genituram mulier retineat. Mulierum dieta. Uteri humidiores, & uteri sicciores. Genituram ad decem, aut quoddecim dies retinentes, virum ne adcant.
 27. Uteri sani interdum non concipiunt.
 28. Genitura a coitu statim dissoluta.
 29. Os uteri elansum, vel dissolutum.
 30. Uteri magis, quam oportet, aperti. Os uterorum pingue. Phagus, glans trita.
 31. Quibus semina viri putrefacta. Genitura viri, gravolens a muliere reddita. Semen viri sexta, aut septima die emittentes.
 32. Mulieris siccioris, aut humidioris curatio dietetica. Biliosa, aut pituitosa in utero confluentia. Astorbum vires, & causa consideranda.
 33. Uterorum a contrariis curatio. Mulier quo tempore verum prolis causa adire debeat. Mulieres quando citius concipiant.
 34. Os uteri humidius genituram non attrahit.
 35. Diu non concipientis, suppressis mensibus, curatio.
 36. Genituram non suscipiens, mensibus prodeuntibus. Atrombra ostulo uteri præposita.
 37. De mulieribus facile quidem concipientibus, factum autem tertio, aut quarto mense corruptum. Factum corruptum quæ signa comitentur. Uteri levis quomodo corroborantur.
 38. Menses biliosi, & pituitosi quo modo cognoscendi. Conceptionis iuvencia.
 39. Mulieres quando maxime in utero concipiant. Os uterum maxime hiat, ac distentum est post purgationes.
 40. De eorum morbis, quæ in ventre habent. Prægnantibus menses secundis, aut tertio mense prodeuntes, cur malum. Sanguis in utero prægnantium a toto corpore descendit.
 41. Caput prægnantis pituitosum, & pituita erit in

- eris in ventrem descendens. Fetus quibus de causis corruptantur.
- 42 Lumborum dolor in muliere uterum gestante.
- 43 *Pregnans corpore male habens, ac biliosa.* Partus purgamenta valde nigra, ac biliosa: curatio.
- 44 *Menstruarius, ac ventris in pregnantibus antea, ossium mensum collapsus. Menses in pregnantibus apparentes.*
- 45 *Pregnans pituitosa, & ejus curatio.*
- 46 *Pregnantis liciosa & relativis affectionibus mensesuales.*
- 47 *Pregnans nimidia, & e bile vexata.*
- 48 *Si pregnantem bilis vexet.*
- 49 *Pregnantis suffocationis causa.*
- 50 *Fetus in latas, aut caput processus periculis.*
- 51 *Pregnantes quare cum virore pallida. Pregnantes cur debiles.*
- 52 *Uterus inflatus. Lumborum dolor, Ambulatio.*
- 53 *Purgationis multa in partu signa. Panis cinericeus.*
- 54 *Sicca, & que difficulter humectatur in partu, curatio.*
- 56 *Uteri tumorum in partu, aut ex partu curatio. Puerorum ruficentium curatio.*
- 57 *Prodenda pregnantium superficiali, ac servido mectre afflicta.*
- 58 *De puerperii purgamentis, & de his, que post partum exiunt. Febres, partus purgamentis, aut mensibus impeditis, & curatio. Oleum anthimum, & eprinum. In morbis omnibus, quibus solentium auxiliatur, melius est postea innigi. Si febris habeat, & balneis abstinendum &c.*
- 59 *Hæmor in partu non cum pueris, velut oportet, non prodens. Si in ventrem descendit. Ad puerperii purgationem. Si in ventrem delatus sit fluxus. Purgatio stimulari modica.*
- 60 *Purgatio puerpera non facile procedens. Urina velut asinina. Venter neque turbatus, neque purgatio procedens. Quando preceant puerpera.*
- 61 *Ultera in utero a partus purgamentis putrefactis signa.*
- 62 *Purgatio puerperii primis tribus, aut quatuor tantum diebus procedens.*
- 63 *Ex partu non purgata signa, & ejus curatio. Salis grana. Oleum martisimum. Atrammentum quid.*
- 64 *Purgamenta puerperii pauciora quam oportet.*
- 65 *Ex utero ulceratis, & puerperii purgamentis impeditis mala. Curatio ulcerum in utero follicitis adhibenda.*
- 67 *Partus purgamenta plura, & unde contingant.*
- 68 *Pulenti pars obstrata in puerpera. Afflictiis, que a puerperii purgamentis non purgantur, similes.*
- 69 *Purgamenta partus ad caput, & thoracem, ac pulmonem. Partus purgamenta per os, aut aures.*
- 70 *Purgationis ad faciem procedentis signa.*
- 71 *Fluxus ex partu, & cibi in ventre non morantes.*
- 72 *Sanguinem ex partu vomentis curatio.*
- 73 *Lactis extindio que medeantur. Que multum*
- lax faciant, & augent. Cynis. Capra Scyria casus.*
- Secunda in utero relissa.*
- 74 *Puerperii purgamenta in gravos conversa.*
- 76 *Secunda non statim exiens post partum. Secunda in utero relissa cassae. Secunda ex umbilico hæret, & umbilicus postremus ex utero exit.*
- 77 *Fetus menstruus, aut bimensem eprumpentis curatio. Secundas relissas que mala consequantur.*
- 78 *Uterus, vel ejus os ex partu ulceratum.*
- 79 *Uteri ex partu inflammati, causa, & curationes.*
- 80 *Adulter ex partu dolens.*
- 81 *Uterorum ex partu dolor. Viciis Puerperii.*
- 82 *Uteri puerpere inflammati. Uterorum distentionum causa.*
- 83 *Uteri pituita impleti. Sanguis menstruus conturbatus, & ter in mense comparsus, & ejus curatio.*
- 84 *Accetabula pituita plena.*
- 85 *De aqua intereunte in utero signis, causis, & curatione. Fetus bimensis corruptio, & ejus curatio.*
- 87 *De aqua intereunte laborante, splene magno, & aquo existente, & unde splen aquosus fiat. Aliud huius mali principium. Adenses velut aqua a carnibus. Fluxus non succedentis signa. Venter, & circa aqua impletur. Quibus frequenter fiat hic morbus. Adulterius morbi que cognita difficultes, & sæpe incurabiles. Adulterum mulierum, ac virorum cura differi.*
- 88 *Uterorum vehementer exaceratarum signa, & curatio. Polycarpon, & Polycnemum.*
- 91 *Uterorum ulcerationum ex abortu curatio, & signa. Uterorum curatio. Fluxus purgantes quidem, sed falsi, & biliosi qui infernas, & externas partes ulcerant. Purulenta, & compalla. Uterum curatio. Vinum Sicanum.*
- 92 *Valnus ex abortu. Puerperii purgamenta sponte eprumpentia. Uteri in partu valde ulcerati.*
- 93 *Abortus, qui discedere non potest, expellendi ratio.*
- 94 *Abortum duplicatarum, & uterorum osculo incumbendum, expellendi ratio.*
- 95 *Fetus viri, atque etiam mortui in partu, manum, aut crura promittentes.*
- 96 *Fetus mortui exfello. Fetus mortui venter tumidus perforandus. Puerum exfellatur quid observare debeatur.*
- 97 *Abola conceptus causa, & signa. Menstruus, somnia quadrimestris motum habet.*
- 98 *Puerperii purgationum mensura. Distantissima post partum purgatio quadraginta duorum dierum est extra periculum, si virginis quinque purgetur; masculi vero post triginta, extra periculum si virginis purgetur diebus. Ex puerperii purgamentis, & ei, que corripit satum, & ei, que peperit, affectiones eadem.*
- 99 *Lactis generatio. Adulterius quidam natura lactis carere.*

- 100 Ad menses detrahendos. Abollitoria, e quibus aqua, & urina purgatur. Menfes non prodeunt. Adedimentum substitutum, purgatorium, mollicorium. Purgatorium. Auferis medulla. Substitutum. Purgatorium. Purgatorium substitutum si menses non comparant. Uterus expurgans, ac sanguinem evacuans. Substitutia evacuans. Substitutia, si catapota non purgant. Substitutia acris sanguinem ducunt. Molliora. Substitutum efficax.
- 101 Ad conceptum medicamentum. Urina vetus cum ferri recrementis ad impragnationem. Clysteris ad impragnationem usus, & descriptio. Oleum platense. Pili alini albi. Lapi stereti. Parere nequens quae prius peperit. Aliud ad conceptum. Vitis ratio conceptui idonea. Adedimentum, quod similiter infunditur non concipiens. Secunda mulieris cum vernum earum caputibus in pecto. Aliud ad conceptum. Vermes earum. Menfes multi, nec tam concipiens. Substitutum ad conceptum. Aliud, quod utrum valde aperire potest, eum conclusum est, & contempere nequit, & ad aquam expurgandam. Sal Aegyptium.
- 102 Conceptum impediens.
- 103 Partum accelerans egre parienti. Praegnans multo tempore, & parere nequens.
- 104 Aliud, puerperii purgamenta melius purgans. Hepar testudinis marina adhuc vivens. Purgatorium puerperii purgamentorum. Purgatorium mensium, & puerperii purgamentorum. Erysimum, Vitis pampini, aut folia viridia.
- 105 Purgatorium, si ex partum purgetur. Purgatorium uterorum, quoniam puero mortuo, sanguis in hoc transferit. Ad omnia puerperii purgamenta.
- 106 Substitutum, quod secundam vellem eiciat. Ad secundas educandas, & menses, itemque factum emellum. Evanthemum. Aliud, quod secundas eiciat.
- 107 Facunditatis experimentum.
- 108 Alia substituta. Scorpius marini fel. Potiones ad secundas educandas. Factum expellentia. Senecio ancyonum. Holoconitidis radix qualis. Sefeli massiliense siphilium libyem berinacci marini triti. Aliud secundarum expulsiu. Quod uteris infunditur. Symea potio. Alius similis potus ad puerum, & mala inani existens.
- 109 Ad factum mortuum ejiciendum. Adeps gal-
- linatus. Testudinis marinae scrobium. Crocus Aegypti. Suffraginatum expulsiu, quod & sanguinem ventris expellere potest.
- 110 Abortus sanatio. Aturium stercus. Aliud expulsiu, quod puerum mortuum eicit. Aliud ejeciuium, quod puerum expellit lividum. Aliud, quod infunditur, si mortuus fuerit puer. Ad factum immobiliem corrumpendum.
- 111 Collutiones uteros purgantes. Collutionum uterorum mensura iunctis odoratis. Cuesfri potiones. Collatio corroborans, si ulcera pura fuerint. Collutiones, quae infunduntur ad vetera ulcera.
- 112 Alui profusum ex partu. Nucleus internus. Sanguis ex partu vomitus. Sedis ex partu dolor.
- 113 Uteri ex partu inflammati.
- 114 Crux claudum ex partu ab utero.
- 115 De inflammatione uterorum ex partu.
- 116 Bilem ex utero purgantia. Collatio, si biliosa, aut pituitosa fuerit. Collutiones purgatoria.
- 117 Collutiones bilem, & pituitam trahentes. Piper indicum.
- 118 Mulieris biliosa, & pituitosa ex menses purgationibus cogitatio. Cuesfri potio. Purgatorium molle, aquam, & pellentes ducens, ac sanum subcrensem. Lac mulieris mastelium alentis.
- 119 Glandens substituta ad menses quomodo formanda. Alia fortiora.
- 120 Potiones purgatoria, quae secundas eiciere, & menses detrahere, & factum emellum educere possunt.
- 121 Substitutia purgantia, si potiones non purgant. Purgatorium, quod sterilem purgare potest. Urina bubula. Salugo marina. Purgatorium mensium. Alitio purgatoria, & molliora.
- 122 Conceptum iuvantia. Tali substitutu virgi.
- 123 Os uterorum conclusum. Accipitru stercus. Auferis, & vulvis sterens.
- 124 De pudendorum ulceribus acerbis, & inflammationis.
- 125 Pudendorum fervido, ac superficiali ulcere laborantium curatio. Bubula carnis pessus in pudendorum ulceribus. Collutio ad uteros exulceratos, & wine stillicidium. Ad ulcera, quae in pudendo sunt, ac enasuntur. Ad ulcera in utero resicanda. Os uterorum ulceratum. Aqua ex uteris fluxu, cum ulceribus &c.
- 126 Ad factum mortuum expellendum. Fulgus de furno.

S E C T I O I I

- 1 **D**E muliebribus morbis sic sentio. Mulierem, quae non peperit, gravius, et citius e mensibus agrotare, quam eam, quae peperit. Quum enim peperit, venulae fluidiores sunt ad menses. Fluidas autem ipsas facit purgatio illa, quae fit a partu. Et ubi haec erumpit, vicinae maxime ventri, ac mammae corporis partes discinduntur. Discinditur item reliquum corpus, a quo vero hoc fiat, dictum est a me in natura pueri in partu. Discisso autem corpore, necesse est venas magis aperiri, et ampliores, ac fluidiores ad menses fieri, itemque uteros magis aperiri, nimirum puero per ipsos egresso, qui et vim, et dolorem induxit, et quum haec sic se habeant, mulier purgationem a partu experta, minus laboriose mensibus decurrentibus purgatur. Si vero etiam affectu aliqua mulieri, quae iam peperit, accidat, ut menses venientes probe purgati non possint, facilis dolorem feret, quam si non peperisset. Assueti enim sunt uteri, et corpus idoneum, ut impleatur, utpote in ventre habenti, et simul multa amplitudo in cor-

in corpore est. Major autem fit etiam amplitudo, ubi peperit, nimirum corpore dis-
 scisso, & corpus in amplitudine existens, nimis dolore affligitur, si non venæ super-
 implentur, & nimirum doleant. At vero ei, quæ non peperit, quum corpus non
 assuetum sit, si completa fuerit, & fortius, ac solidius, & densius sit, si purgationem a par-
 ti experiat, & quum uteri ægrius aperiantur, menses laboriose prædant, & affec-
 tiones plures accidunt, ut, propterea menses obtineant, si prius non peperit. Ha-
 bet autem res se hoc modo, velut etiam prius a me dictum est. * Dico mulierem ra-
 tione carue præditam, & teneriorem esse, quam virum, & hæc res sic se habet: a ven-
 tre trahit humiditatem, & citius, & magis corpus mulieris, quam viri. Etenim si quis
 super aqua, & per regionem aquosam, duobus diebus, ac duabus noctibus, mol-
 les lanas ponat, & vestem puram, & contextam æquali ad lanas pondere, subla-
 tis utrisque apponderatione facta, multo graviores lanas comperiet, quam vestem. Fit
 autem hoc ex eo, quod semper ab aqua sursum decedit in vasa ampliora oscula
 habentia, & lanæ quidem tanquam raræ, & molles ex decedente amplius suscipiunt.
 Vestis autem, ut quæ plena est, & ex contextu obdurata, explebitur, non multum
 ex decedente aqua suscipiens. Sic sane etiam mulier, velut quæ rarior est, am-
 pliorem a ventre humiditatem corpori attrahit, & citius quam vir, & tanquam teneriori
 carne prædita mulieri, ubi corpus sanguine repletum fuerit, si non ab ipso secesse-
 rit, carnibus impletis, ac calefactis, dolor oboritur. Habet enim mulier sanguinem
 calidiorem, & propterea calidior est, quam vir. Si veto amplior accedens sanguis se-
 cesserit, dolor non fit a sanguine, neque calor. Vir autem, ut qui solidiore carne præ-
 ditus est, quam mulier, neque in superna ventris parte adeo sanguine superimpletur, ut
 nisi aliquid sanguinis singulis mensibus secedat, dolorem fieri necesse sit, & san-
 guinis, quantum satis est, ad nutrimentum trahit, & quum corpus ipsi non sit tene-
 rum, non dolore affligitur, neque superinealescit plenitudine, velut mulieri. Mul-
 tum autem confert ad hoc viro, quod magis laborat quam mulier. Nam labor aliquid
 humoris abducit. * Postquam igitur mulieri, quæ non peperit, occultati fuerint men-
 ses, & viam foras reperire non poterint, morbus fit. Hoc autem contingit, si uterorum
 os conclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudendi pars contracta. Si enim ho-
 ium quid fuerit, menses exitum invenire non poterint, priusquam uteri ad sanam na-
 turam redierint. Fit autem hic morbus his maxime, quæ angustos uteros habent, aut
 cervicem ultra pudendum sitam. Si enim horum alterum fuerit, & mulier viro non mi-
 sceatur, & venter magis, quam oportet, evacuetur, ab hac affectione uteri obortquen-
 tur. Neque enim humidi in se ipsi sunt, utpote muliere non coeunte, & amplitudo ip-
 sis spatiofa est, utpote quum venter magis vacuus existat. Quare obortquuntur, dum
 siccior, & levior est venter, quam convenit, & aliquando dum ipsi obortquuntur, etiam os
 ipsorum distorti contingit, nimirum cervicem ultra pudendum sita. Si enim humi-
 di fuerint uteri a coitu, & venter non evacuetur, non facile distortquuntur. * Hæc igitur
 causa est, ut ipsi sint conclusi, nimirum a venere abstinent muliere. In tertio por-
 to mensibus optime afficietur, si quæ prius insunt, progressa fuerint educta. Sin
 minus, mulier hæc patietur. Suffocatio alias atque alias in ipsam irruet, & febris
 alias atque alias corripiet, ac horror, & lumborum dolor. Hæc patietur in tertis men-
 sibus, si ipsi non prodierint. In quartis vero, si non egressi prioribus exitum fecerint,
 etiam tunc tertii mensis afflictionibus omnibus magis affligetur, & maxime tem-
 pore mensium. Deinde minus. Sæpe vero etiam a dolore libera sibi esse videbitur.
 Erunt autem in quartis etiam hæc signa. Urinam multam, ac crassam efficiet
 alias atque alias. Et venter ipsius durus erit, & major quam prius, & denubis fremet,
 & cibum averfabitur, & vigilabit. Hæc patietur in quartis mensibus. Si vero cu-
 retur, etiam in his sana evadit. Et in quintis, si non multi menses descendierint, do-
 lor adhuc fortior accidit. In sextis vero jam incurabilis est, & iuxta priora qui-
 dem signa magis dolebit. Deinde ad ea etiam hæc aderunt. Anxia erit, & alias atque
 alias se ipsam iactabit, & animo deficiet, & putidam vomet, & sitis fortis ipsam
 corripiet, nimirum dum exurit venter ab uteris sanguine plenis, & ad conta-
 ctum dolebit, maxime pectinem. Et alias atque alias acutè febricit, & uteri alias atque
 alias murmurent, dum videlicet sanguis in ipsis commovetur, ac discutrit, &
 venter confuso modo non secedet. * Neque vesica urinam excolabit, maxime quum
 uteri ad stomachum, qui nervosus est, mulieri allapsi fuerint, & ad ventrem irru-
 erint, dolet spinam, & totum dorsum, & lingua ipsius resrenatur, & hanc non cla-
 ram habet, & animi deliquium adest. Aliquibus etiam vocis privatio, & stom-
 achus inordetur, & flava bilis exit, & spiritus offendens, & anxia est, & iactat se
 ipsam, & ardet. Postquam autem transmutati fuerint, & vesica tenuem sanguinem
 ab uteris trahet, tunc urina mingitur rubra. Et dolet quidem reliquum corpus,
 maxime vero collum, & spinam, & lumbos, ac inguina. Et ipsi ad hoc progres-
 ses, & venter attollitur, & crura supra modum intumescunt, & tibie, ac pedes, &
 mors succedit. Et circa hanc quidem se finiunt mensstruæ purgationes: ad sex men-
 ses occultata, sunt item hæc. * Quibusdam mulieribus menses biimestres in 80
 uteris existentes multi ad pulmonem procedunt, & ubi recepti fuerint, omnia
 patiuntur, quæ in tabe dicta sunt, & non est possibile ipsam superesse, suar &
 hæc. Quibusdam suppurati sunt menses, ubi per dios, aut tres menses mo-
 ram tra-

- ram traxerint. Hoc autem maxime fit, si a febre fuerint combusti. Signa vero sunt, si suppurati fuerint, dolores enim incidunt in pectinem, & pulsationes fortes, & contactum non sustinet; & si melius habitura est, menses ipsi erumpunt in pudendum, & procedit pus, ac sanguis, & procedit graveolens ad septem, aut octo, aut novem dies. In priore vero tempore dolet, velut dictum est antea. Postquam autem depurgata fuerit, optimum quidem est, si non fiant ulcera. Si vero reliquantur ulcera, ampliore curatione opus habebit, quo ulcera non putrescant, & graveolentia fiant. * Sterilis autem evadet, etiam si melius habebit, ubi magna ulcera fuerint, quae in utero facta sunt. Si vero non contingit, ut menses ipsi in pudendum procedant, suppurati facti, ad partes supra inguen, iuxta lateris molliitudinem erumpent, citra tuberculum, utpote pute rupto, & illa parte purulenta graveolentia procedent, & si hoc fiat, mulier non superstes manet. Si vero etiam superstes maneat, semper sterilis erit. Hac enim parte de exteriori via fit mensibus ut foras prodeant. Nam os uterorum ad hunc locum allapsum est. Fit & hoc. * Quibusdam, ubi bimestres, aut trimestres, aut daturiores fuerint menses, & ad lateris molliitudinem allapsi fuerint, quum non suppurati sunt menses, velut tuberculum fit supra inguen, sine capite, magnum, rubrum, & vulgus medicorum ignarum quid hoc esset, iam saepe secuerunt, & sic in periculum induxerunt. Ceterum id, quod velut tuberculum fit, tali modo fit. Frustr sanguine caro ipsa, utpote osculo uterorum lateris molliitudini adiacente, & impletur caro ab ipso, & insurgit, ac erinet, velut sanguine repleta. * Et aliquando sitransmotum fuerit os uterorum, & ad pudendum conversum, & menses procefferint per pudendum, id, quod circa lateris molliitudinem erinuit, sedatur. In utero enim distribuerit; hi vero foras laxantur. Si vero non conversum fuerit os uterorum ad pudendum, circa lateris molliitudinem suppuratur, & hac parte transiens fit mensibus, & eadem pericula sunt, quae prius sunt relata. Sed & ad vomitum convertitur, & quibusdam in sedem, velut in virginum morbis a me dictum est, & signas, & dolores eosdem ostendit, quos isthice retulimus. At hanc viam minus faciunt menses mulieribus, quam virginibus. * Quum menses fuerint occulati, dolor habebit inum ventrem, & onus quoddam incumbere videtur, & lumbos, & laterum molliitudinem inrum in modum dolet. Si vero omnino non procedunt, pra morbo aut crassi, & viscosi, aut glutinosi sunt. Primum igitur ventrem purgare oportet sursum, ac deorsum. Deinde uteros subditio medicamento, a quo sanguis purgeatur. Atque ita quiescere, & potandum dare pharmacum, a quo sanguis prodeat. Bibat etiam Crethmon in vino tardoceo. Si vero fluxus ipsi non fiat, continget, ut praegnans esse videatur, & dum cum viro coit, doleat, ut putet quid incumbere, & gravitas sit in ventre, & venter prominat, & desideris similibus afficitur, velut in ventre habeat, & stomachi dolore afficitur, maxime ubi quinquaginta dies praeterierint. Et dolor alias atque alias habet ventrem, & partem circa umbilicum, et collum, et inguina, et lumbos. Et postquam menses duos, aut tres praeterierint, quandoque menses acervatim ipsi in pudendum erumpunt, et quae prodeunt, velut carnem esso putat, quemadmodum ex foetus corruptione, et nigra. * Quibusdam etiam ulcera sunt in uteris, et opus habent diligenti animadversione. Multis vero contingit, ut putent se sex mensibus in utero habere, aut etiam paulo breviori tempore, et venter prominat, et alia sibi fieri putat, velut in ventre habenti. Postea sunt et quibus suppurati eruperunt supra inguen simul eum quinto, aut sexto mense, et viam ea parte patefecerunt. Quibusdam autem ulcera sunt in uteris etiam infra sub inguines, et periclitatur mulier de vita. Si vero etiam superstes maneat, sterilis erit. Quibusdam etiam in pudendum erumpunt, et prodeunt ipsi putrefacti, ac purulenti. Et ab his ulcera sunt in uteris, et periclitatur. Et oportet, ut ne antiqua fiant ulcera, cum attentione mederi. Sterilis autem, et haec fit, etiam si fuerit curata. * Si vero non erupetint menses sex mensibus insum conclusi, omnia patietur velut ea, quae non peperit, in qua menses viam invenire non possunt. Et si quidem curata fuerit, sanus erit; sin minus, etiam ad octo menses durans moritur. Multis vero contingit, ut mentes pituitosi ad multum tempus prodeunt, etiam pauciores sanis sint, sana autem talis fit, si convenienti cura fuerit sanata. * Si vero menses mulieri prodeant quidem, verum pauciores quam convenit, utpote osculo uterorum paululum a pudendo emoto, aut nuper conclusio ad hoc, ut prodeant quidem, verum obturentur ab ipsis etiam transitus, per quos penetrant, ubi ad uteros descendunt, moderati sane paululum prodeunt, sanguine semper perfecto osculo incumbente. Et postquam dies praeterierint, quibus purgari solet, et conclusus fuerit sanguis in uteris relictus, et alii menses subdescendentes non expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim gravant, et primis mensibus duobus, aut tribus non valde prodeunt. Postquam autem plures menses praeterierint, adhuc magis dolebit, et non habet in ventre, quandiu sane sic habuerit, et febris corripit ipsam debilis, maxime in diebus, quibus purgari solet. * Verisimile est etiam, et in intermedio tempore ipsam febrile, et horvere, et stomachi dolore vexari, et ad molliitudinem addere singulis diebus. Et dolet alias atque alias corpus, et maxime lumbos, et spina, et inguina.

- inguina, & articulos manuum, ac pedum. Verum his locis non simul dolet, sed alias
atque alias, & quæ parte sanguis dilatare, & in utero esse non potens, impetu suo
gravatur, & quæ sane corporis parte incubuerit, tumor est, frigæ etiam convulsio
fortis articulo corporis. Et alias aliud, ex relatis antea signis ipsi apparet. Hic
si quidem iuxta debitum modum curata fuerit, sana evadit, sin minus, mor-
bus septem mensibus, aut duobus major factus, lethalis fuerit, aut claudam faciat, aut
artres aliquas impotentes efficiat, si præ rigore, & cibi fastidio sanguis circa ner-
vos compactus fuerit, quemcumque tandem locum occupaverit. Hic autem mor-
bus magis, si his, quæ vitium non habent, Si vero morbi jam relati, aut qui-
cumque postea referentur, incidant in eam, quæ partum non sit experta, diuturniores
erunt, & minus dolorosi. Verum signa eadem, & iidem fines sunt ei, quæ non pepe-
rit, tum ei, quæ puerperia experta est, contingunt, si non curentur. Oportet au-
tem statim curationem facere: sin minus, statim comparent morbi. * Si vero
14 menses plures, quam oporteat, prodeant, & crassiores: nimirum corpore natu-
ra fluído existente, & oculo uterorum prope pendendum sito, & ad hæc multo
cum viro coiti utatur, & convivatur: semel aliquando multi descendentes, & cu-
mulate prodeunt, os uterorum impetu suo magis dilatant, & si ad hæc non inci-
dat vasorum evacuatio, sed fursum multus accesserit calor, & os amplum faciunt,
16 & corpus urpore dum convivante, & voluptatem, ac consuetudinem viti conse-
dante muliere, facili fluxu ad uteros etiam calor desertur, & decolor erit, quamdiu
sic habuerit, & si postea morbus aliquis, aut affectio incidit, ut corpus affligat-
ur, & uteri similiter juxta solum morem ampli sunt, & corpus facili fluxu in
ipsos præditum est. Et post hæc lebetis habet, & cibum averfarit, & anxia est, &
ænuis, ac debilis, & lumbos ex mensibus dolebit, & progressu temporis, si non
curata fuerit, omnia ipsam magis affligent in intermedio tempore, & periculum
ipsi imminet, ne sterilis fiat, aut a tempore, & morbo verata, si alius morbus co-
incidat, ex hoc moriatur. Prodeunt autem menses crassiores, & plurimi in interme-
15 diis diebus; incipientes autem, & deficientes, pauciores, & tenuiores. * Moderati
vero sunt menses prodeunt in omni muliere, si sana sit, ut duarum heminarum
Atticarum mensura secedant, aut paulo plures, vel pauciores, atque hoc ad duos,
aut tres dies. Longus autem tempus, aut brevius, morbosum, et sterile est. Con-
jectare porro oportet, mulieris corpus inspicendo, ut interrogare, collatione ad
priora facta, an semper morboſa vivat, aut non. Si enim pauciores, aut plures di-
ces, quam solent, prodeant, aut ipsi pauciores, aut plures fuerint, morboſi sunt. Nisi
18 natura ipsa morboſa, et sterilis fuerit. Si vero fuerit, et ad salubriorem statum
transmutatur, melius est, procedit autem sanguis, velut a victima, et cito conge-
latur: si sana fuerit mulier, quibus vero in natura est, ut plures quam quatuor dies
purgentur, et menses valde multi prodeant, hæc renes sunt, et foras ipsarum
renes, et emarcescunt. Quibus autem purgatio infra tres dies fit, aut pauci men-
ses secedunt, hæc crasse sunt, et bene colorata, virileſque, ac partus immemores,
et neque concipiunt. * Si suffocatio derepente accesserit, fit autem maxime his,
16 quæ cum viris non coeunt, et senioribus magis, quam junioribus. Leviores enim u-
teri ipsarum sunt, fit autem potissimum tunc, ubi mulieri vasa evacuata fuerint,
aut plus solito laboravit, refecati a labore uteri convertuntur, ut qui vacui sunt,
ac leves. Est enim ipſis locus spatiosus, ut convertantur, utpote ventre vacuo exi-
ſtente. Dum autem convertuntur, impetunt hepar, et juxta conſiſtunt, et ad
præcordia irruunt. Currunt enim, et progrediuntur fursum ad humiditatem,
tamquam a labore, magis quam opportunum est, refecati. Hepar autem humidum
18 est. Postquam autem impetiverint hepar, suffocationem faciunt, derepente perſpira-
tionem circa ventrem intercipientes, et aliquando simul incipiunt hepar impetere,
et a capite pituita defluit ad præcordia, velut ab eo, quod suffocatur, et aliquando
simul cum pituita defluxu descendunt ab hepate ad locum suum, et cessat suffoca-
tio. Descendunt autem detrahentes humiditatem, et gravati. Stridor autem ab ipſis
19 fit, dum ad sinam ipsorum sedem procedunt, postquam autem eo devenierint, aliquan-
do venter post illa humidior fit, quam superiori tempore. Laxat enim jam caput pui-
tam in ventrem. * Ubi vero apud hepar, et præcordia fuerint interi, et strangula-
rint, mulier albas oculorum partes subvertit, et frigida fit. Sunt autem et quæ li-
vidæ sunt. Quædam etiam dentibus frendunt, et salivæ ad os fluunt, et similes
210 sunt his, qui ab herculeo morbo deinentur. Si vero diutius moram traxerint
interi apud hepar, et præcordia, mulier strangulatur. Quandoque vero, ubi mulier
vasa evacuata habuerit, et insuper laboravit, uteri conversi ad vesicæ stomachum al-
labuntur, et urinæ stillicidium inducunt. Aliud autem nihil mali habet, et cura-
ta cito sanescit, quandoque etiam sponte. Quibusdam vero ex labore, aut inedia,
215 ad lumbos, aut ad coxas allapsi, dolores exhibent. * Si mulier corpore ma-
le habuerit, et menses bilioſi prodierint, ex hoc quoque cognosci possunt. Nigri
sunt valde, quandoque vero nigri, aut splendidi, et paucissimi prodeunt, et citissi-
me congelantur, et semen amborum, et maris, et femine evanescit, et non
habet in ventre, et incipiente quidem morbo, purgatur diebus, quibus solita fuit,
220 non pluribus; progredientibus autem mensibus, pluribus diebus purgatur, et
menses

- menses pauciores singulis diebus apparere. Et febres succedunt erronee ac-
 te, cum horrore, et cibi fastidio alias atque alias, et stomachi dolor, et dolebit maxi-
 me, ubi menses ipsi appropinquant. Postquam autem purgata fuerit, et ad mo-
 dicum tempus, superiorum respectu melius habuerit, postea rursus ad idem per-
 veniet. Dum autem curatur, cito sana fit. Si vero non curetur, et tempus proce-
 dat, omnia prius relata valde ipsum affligent, et dolor corripiet nunc ventris
 partem infra umbilicum, nunc inguina, nunc lumbos, et coxendicum ad sedem
 iuncturam, nunc collum; aliquando vero strangulatio sortis accidet, et caligo ante
 oculos obversabitur, et vertigo, utpote purgatione sursum vergente, ac ascendente.
 230 * Si enim corpus male habuerit, mulieri menses pauciores fiunt, et quibus
 corpus plenum fuerit, his menses plures prodeunt. At vero biliosa si menses
 prodeant, pusillanimitas incidit, et cibi fastidium alias atque alias, et anxietas, ac vi-
 gilia, et eructus frequenter, et non vult deambulare, et tristis est, et non videre sibi
 videtur, et rimet. Et si curetur, ex his sana erit. Si vero tempus processerit, adhuc
 235 magis dolebit. Optime autem cum hac agatur, si vomitus biliosus succedat, aut
 venter turbetur, non fortiter, et subeant biliosa, et si fluxus succedat ipsi non for-
 tis. Si enim quid ex his forte incidit in corpus afflictum, periclitabitur. Si vero
 leniter depurgetur aliquid biliosi, aut totum id, quod molestum est, sana fiet. Si
 240 veroneque curetur, neque quicquam horum fiat, moritur mulier, plerumque tamen con-
 tingit, ut fluxus incidat biliosus ex hoc morbo, et si fluxus fiat, primum quidem
 pauca sunt, quæ comparent, per omnes autem dies omnino plura contingunt. Tempo-
 ris autem progressu plerumque etiam morbus acutus fit, et uteri a purgatione bilio-
 sa prodeunte mordetur, ac exulcerantur. Sed et in hoc adhuc sana fit, si curetur,
 245 et fluxus compescatur. * Si vero uteri ab ulceribus fuerint inflammari, adhuc acu-
 tior morbus erit, et multa graveolentia, ac purulenta prodibunt, ab ipsis iteris
 jam egressa, et semper velut aqua de carnibus, et prius relata omnia ipsam ma-
 gis affligent, et ulcera adhuc magis effratiora erunt, donec ipsam vincant. Si vero
 etiam sanata fuerit, sterilis erit a cicatricibus. * Si mulier corpore male ha-
 250 buerit, et pituitosi menses prodierint; cognosci autem possunt, si pituitosi pro-
 deant. Pelliculosi enim apparent, et velut araneorum casses distenduntur, et
 subalbidi sunt. Hoc autem contingit, si corpus, et caput ipsi pituita repleta fuerint,
 et hæc non subpurgetur neque per nares, neque per sedem, neque per urinæ me-
 atum. Sed in mensibus, et in turbatione sanguinis, una cum purgatione foras
 255 exit. Et si hæc sic habuerint, ad duos quidem, aut tres menses nihil agrotat; post-
 quam autem amplius tempus progressum fuerit, et non curetur, magis dolebit,
 et febri erronea corripiet, et cibum alias atque alias fastidit, et stomachum do-
 lebit, et maxime dolebit, ubi menses appropinquant. Quum vero purgata fue-
 rit ad modicum tempus, superiorum respectu melius habebit, postea ad idem
 260 relabitur, et si non curetur, sed tempus procedat, fiunt ipsi omnia, quæ ei, cui bi-
 liosi menses prodibant, donec fluxus sistatur. Consequitur etiam, ut hæc fluxus
 pituitosum habeat, aut alia, quæ ego dicam paulo postea. Et si quidem fluxus
 succedat, semper procedunt per omnes dies nunc acervata, nunc pauca, et
 quandoque velut a carnibus aqua prodit, quandoque velut fames, et in hoc ipso
 265 multi sanguinis grumi insunt, et radit terram velut acetum, et mordet, ubicumque
 mulierem conrigerit, et uteros exulcerat. Et ubi ad hoc pervenit, reliqua qui-
 dem similiter patitur, velut prior. Minus vero, quam illa, caput dolebit, et ulcera
 neque deformia, neque magna, neque purulenta, neque graveolentia, similiter velut
 illi sunt, sed minus huic. Si vero curetur, sana evadit, etiam ubi morbus progres-
 sum fecit, et non valde morietur. Verum prægnans esse non potest, quæ sic ha-
 270 bet. * Quæcumque viro cohabitantes in ventre habere non possunt, interrogan-
 da sunt, an ipsis menses prodeant, aut non, et an purulenti sint, aut frigidi.
 Si quidem igitur responderit, interrogetur, an statim exeat genitalia, an postea
 die, aut tertia, aut sexta, aut septima. Si igitur dixerit statim exire, ubi co-
 275 ivit, uteri osculum rectum non est, sed distortum, et genitalia non capit. Si ve-
 ro dixerit, postera die, aut tertia, uteros perhumectus est, et semen elutur. Si ve-
 ro sexta, aut septima, semen computrescit, putrefactum vero exit. Si igitur ab ini-
 tio non suscipiat semen, os uteri primum curandum est, ut rectum sit. Si vero
 elutur postera, aut tertia die, uteros, et caput. Si vero computrescit, et exeat,
 280 et uteros, et totum corpus curetur. Atque hæc singula sic cognoscere oportet.
 * Quali vero purgatione opus habeat, hoc modo cognoscit. Quum menses pro-
 deant, liorem complicatum palmi magnitudine super tenue cinerem expan-
 dit, deinde ut quo exeat, super hoc desinant, curato. Præstat autem duo esse
 285 lintea, utrumque scorsim, alterum diurnum, alterum nocturnum; & diurnum qui-
 dem postera die lavare oportet, nocturnum vero, ubi per diem, ac noctem super
 cinere situm fuit. In lotura vero considerare oportet, qualianam fiant lintea
 lota, ubi in sole fuerint siccata. Optimum ramen est in tenebrosos loco ea resicca-
 ri. Si quidem igitur pituita fuerit, quæ conceptionem impedit, macula lineæ e-
 runt. Si vero propter falsitatem, & bilem impeditur, sulca, & sublivida. His igitur
 290 consideratis, & diligenti animadversione expensis, totum etiam corpus inspi-
 cito.

eito, an multa purgatione opus habeat, aut ſecus, ita ut & ad colorem, & ætatem,
 24 & robur, & anni tempus, & qua diæta utantur, reſpicias. * Curatio vero & totius
 corporis eſt, & uteros, ac oſculum ipſorum ſanare, & ſi hoc conſeſum fuerit, a-
 perire. Si vero illi diſtorti fuerint, dirigere oportet. Si autem humidi fuerint, reſi-
 care, & alia quoque facere contraria. Ferme autem omnibus multa curatio eadem eſt,
 25 excepta menſum detractiōe. Nam quibus nihil prodit, his detrachere oportet.
 Immo quicquid in menſibus mali ineſt, hæc auferre oportet: quum videlicet pu-
 turoſi ſunt, & pelliculoſi, & ſanioſi, & tenues, & albi, & grumoli, & quum nigri
 ſunt, & carbunculoſi, aut caliginoſi, aut acres, falſi, turbati, purulenti. Hæ om-
 30 nes cauſæ tollendæ. Prohibent enim in ventre concepium. * Quibuſcumque igitur
 menſes puturoſi, ac pelliculoſi ſunt, hæ carnoſæ ſunt, & his os humectum eſt, & ſa-
 livæ multa, ac viſcoſa. Et ſi acidum, aut acre quid gultaſint, ſputum in ore liquidius
 erit, & inſuſum, & ad omnia, quæ ederint, aut biberint, turbatio ſequitur, & ſup-
 35 primitur ipſis, ac atollitur venter, & nauſea adeſt, & anxietas, ac ſatiatio multa.
 Et a capite fluxus deſcendit, & omnia obducit, & multam humiditatem inducit, &
 partes ſub oculis lividæ ſunt, ac inſidæ. Has totas fovere oportet, & frequen-
 ter vorneræ & a cibis, & jejunas. Infernum autem ventrem mollire, ſed pharmacis
 omnino levis, quæ minime bilem ducunt, & ſemel in die cibum capere, & fre-
 40 quenter exerceri. Et cibo ſicciffimo uti, & potu pauciſſimo meracior. Melius
 autem eſt, ut venter facile ſolubilis conſervetur. Verum uteros, ſi ad hanc diætam
 non parierint, pharmacis ſubditiis non mordacibus purgare oportet. Fomen-
 tum tamen ſemper purgationibus præmittendum eſt, prius id quod ex ſtenuſculo
 paratur, deinde quod ex ſuſſimentis. Fomento vero, & ſubditiſſimis medicamen-
 45 torum facito, conſectura facta, ut omnia fiant, & pro ratione adhibeantur, quorem-
 pore menſes prodeunt. Si quidem igitur puri, & ſinceri, ac cruenti fiant, ita ad vi-
 rum accedat, incipientibus menſibus. Optimum autem, deſinentibus, & adhuc eni-
 50 tibus, magis quam ubi diſparuerunt. * Quum autem ad virum itura eſt, ſuſſimentum
 quoddam ex adſtringentibus ſuſſiat, atque hoc per caniſtrum, & arundinem, phar-
 maco calido cueri inſperſo. Quum vero inſperſeris, & caniſtrum, ſive operculum
 circumponito, & per arundinem inſidenti fomentum adhibeto. Ubi vero opus fue-
 55 rit ipſam ſuſſiri, plumbea fiſtula utere, ut aperto oſculo ſuſſiatur. Deinde quum ſu-
 rerit, rursus in lecto plumbeam fiſtulam apponat. Deinde ea ſubtracta, cum viro
 coeat. Et ſi ea, quæ a viro prodeunt, non fuerint ei manifeſta, extensis, & altera-
 tim poſitis cruribus queſcat. Jejunum autem utile eſt in hac die, præterquam ſi æ-
 60 conem velis non ſalſum in aqua. Hinc autem tunc bibat, quum vult ſuſſiri. Si
 vero ubi cum viro coivit, poſtſidie detineat genituram, & neque altera die exeat,
 a cibis quidem, & balneis prohibeatur. Bibat autem potentem in aqua non ſal-
 ſam bis, ac ter in die. Arque hæc diæta ſit per ſex dies, aut quod melius eſt, ſeptem,
 ſi non exierint ea, quæ a viro ſuſcepit, dum cum ipſo coivit. Illota vero maneat per
 65 omne tempus, & det operam, ut motus vitet. Si vero deambulare velit, deambulet
 in loco plano, & levi, nequaquam acclivi, neque declivi. Deſideat etiam ſuper mollia, ſi
 conceperit. Reliquum vero diætam eandem faciat iſque ad dies triginta. Illota autem
 ſit, aut ſi lavari opus habeat, pauca, & non valde calida lavetur. Caput vero ne ma-
 70 deficiat. Cibus autem utatur, & panibus, & maza, ſi velit. Ex carnisbus autem, pa-
 lumbe, & ſimilibus, ex marinis his, quæ alvum ſuſtinent, prohibeatur ab oleribus
 acris. Vino vero nigro utatur. Carnibus autem aſſatis potius, quam coctis, tum
 manſueris, tum ſerinis. Et hæc quidem ſi conceperit, hoc modo facere oportet. Si
 75 vero non conceperit, ſed ſecunda, aut tertia die exeunt ea, quæ a viro immiſſa ſunt,
 ſtuentia cum multa humiditate, manifeſtum eſt, quod uteri ſunt humidiores. Cura-
 re itaque oportet iuxta relatam modum, donec ſicci ſiant. Quum autem ſicci eſſe vi-
 80 deantur, ſic curato. Optimum eſt pharmacum mollitorium, & retro, & anteriori parte
 ipſi adhibendum, donec uteri ad naturam ſuam redeant, & rursus ad virum accedat,
 quum menſes non amplius multi, ſed pauci, & bene colorati fuerint, & ad libidi-
 nem concitatur. Sed & in aliis diebus cum viro conſuetudinem habere oportet,
 ſi optime habuerint uteri. Quum autem in relatis diebus conſuetudinem habuerint
 85 cum viro, ſi probe parati fuerint uteri, & ſi genituram ad decem, aut duodecim dies
 detinuerit, ne adeat virum. * Si vero non concipiat, uteri autem ſani ſint, contin-
 90 git enim & hoc plerique, quum debiles exiſtentes uteri, ab affectione macieſti
 ſunt, aut præ medicamentis, & ſonento multo genituram ferre non poſſunt,
 priuſquam aſſueti ſiant, & convaleſcant. Hoc autem ſic cognosci poſteſt. Quum ab ipſa
 95 exierint, ſecunda, aut tertia die exeunt, aut adhuc prius, craſſa, & compacta velut
 mucus, niſi mali quid ſit, & propter alium uterorum morbum genitura diſcedat.
 Quum igitur talia apparuerint, curatione quidem uterorum non eſt opus, verum
 reliqui corporis cura habenda eſt, quo huiuſmodi bonus habitus ſit ipſi, ut contra-
 100 ctum ſimul ſit corpus, & juſta mole præditum, ex paucorum balnearum, plurius
 vero, & levium laborum uſu. Ab acrisbus autem, & falſis prohibeatur. Vomitus
 utatur ante dies, quibus menſes fieri ſolent, & rursus fame naceretur, & alia per-
 105 ſiciat, quæ dicta ſunt. Arque hæc quidem harum curatio eſt. * Quibus autem ſtatim
 ubi coiverint, diſſolunt ea, quæ a viro ſunt immiſſa, his os uterorum cauſa eſt. Cu-
 rare vero

- 360 tare vero sic oportet. Si quidem valde conclusum fuerit, tædis, & plumbeis fistulis immisissis, aperito, & molle somento ex foeniculo fovero, & subdititis, quæ uterum attenuant, & in directum redigunt, purgato. Post purgationes autem, & fomenta, ex infundis, quæ causæ sunt contraria. * Quibus vero os distortum est, & ad eorundem allipsum, sunt enim etiam talia prohibentia, ne uterus semen suscipiat. Quum igitur tale quid acciderit, odoratis foementis fovere oportet, post somentum autem per digitum avulsim a coxa detrahit. Quum autem discesserit, tædis, & plumbeis fistulis immisissis juxta priorem rationem in rectitudine dirigito, ubi vero rectificata, ac appeti fuerint uteri, medicamentis subdititis purgato, & alia facito juxta relatam rationem. * Quum autem magis quam oportet, aperti fuerint uteri, purgatione opus habet, post purgationem autem collutionibus, & suffusionibus. Si vero propiora sint, quam oportet, vomitibus uteri opus habent, & somento scetido, donec ad suum locum redeant. Diæta vero utendum est relata. Si vero os pingue fuerit, & crassum, & propterea non concipiat, sinapi coctum jejunia edat, & meracum insuper bibat. Apponat autem nitrum rubrum, & cuminum, & resinam. Optimum autem fuerit nitrum vino ammiscere, & resinæ una cum cumino, & unguento albo. Aut cornu cervi urito, & duplum crudæ hordeaceæ farinæ cum vino ammiscito. Si vero non melius habeat, porrum coquito, & ipsam insidere facito. Aut phagum, id est glandem tetricam apponat. Et alio recenti vesicetur, & aqua mulsa insuper pota, vomat. * Quibus porro intus manet viti semen, & computrescit, & turbationem facit, his atriplicis semen, aut succum cum melle, aut cum cumino delingendum dato. Quum autem a viro immissa graveolentia fuerint, non concipit. Portulacam igitur, & adipem asferimam misceto, & apponito. Quibus vero sexta, aut septima die a viro immissa prodeunt putrefacta, his verisimile est ab utrisque fieri, & his, & falluginis influxu. Curare autem sic oportet, per veratrum, aut scammoniam, aut pepulum. Hæc enim suffum, ac deorsum pirurum, & bilem purgant, & flatus educunt. Ante purgationes autem foementis utendum est ex suffusionibus. Ubi vero somentum adhuc fuerit, per subdititia purgato eodem modo velut in prioribus. Et post subditiorum, ac purgationum usum, mollioribus uteris, & subditio medicamento ex mercuriali, & artemisia herba, & anemona, & veratro albo, aut nigro. Arque hæc quidem medicationes hoc modo his conducunt. * Diætam vero respectu ad totum hominis corpus facito constituere oportet, sive siccior, sive carnosior mulier esse videatur. Et si quidem siccior fuerit, balneis pluribus, & obsoniis omnibus coctis, tum matinis, tum carnibus utatur. Vino vero aquoso, & oleribus coctis, & pinguibus omnibus, ac dilucis. Hæc enim plerumque faciunt, ut humiditas sit tum in reliquo corpore, tum in utero. Si vero humidior fuerit, tales uteri nullo ex his opus habent, sed vice versa, neque contereare, neque lavare recenti motu facito oportet, neque suffire. Nam ad periculum hæc procedere solent. Et si magis quam pro natura fuerint humectæ, siccate sane, ac suffire oportet. Si vero biliosa in ipsos conflant, medicamentum dare, quod bilem purgat. Si vero falluginosa, lac asinum, et vinum, et alia auxilia. Morboquo potero vires considerare oportet, et causas, ex quibus morbi sunt, exquirere, argue si ad alia procedet, et morbos citra locos curare, et quæ quidem ob causam osculotum huiusmodi prohibentur, ut ne detineant in ventre, horum oscula præparare, ut probe diducta sint. Quum vero humiditas prohibuerit, hanc inspicere, ut ne impediatur, totis mulierum negotiis expensis, sive ex toto corpore quid moveri videatur, sive ex ipsis uteris, sive ex utrisque. * Uteros autem sic curare oportet, ut neque humidi sint, neque valde siccæ. Imo sicciores quidem, tanto magis bono succo, quanto sunt sicciores, eiusmodi humiditate, ut pingues magis fiant, quam graciles. Humectos vero, et madidos siccare, ita ut relinquant, quo humidi sint, et non valde tescerant. Excessus enim in his valde sunt vitandi. Concipit autem in ventre, neque ea, quæ humiditatem habet, neque quæ resiccata est, nisi quid botum in veteri natura fuerit. Cæterum virum adite ipsam oportet post adhibitam curationem, desinentibus, aut inchoantibus mensibus. Optimum est etiam, ubi quieverint. Maxime vero in his diebus experiendum est, an prægnans fieri possit, hi enim sunt opportunissimi. Si vero non statim concipiat, et reliqua bene habeant, nihil prohibet etiam aliis diebus cum viro coire. Nam hæc exercitatio alacritatem ipsi inducit, et venulæ hinc laxantur, et si ea, quæ a viro prodeunt, concurretint secundum rectitudinem cum eo, quod a muliere, citius concipiet. Hæc enim causa est his, quibus sive statim, sive posteriore tempore exiunt. Arque hæc quidem de his dicta sunt. * Si vero humidius fuerit os uterorum, genitura attrahere non possunt. Utendum autem est medicamentis subdititiis acerbis. Commotus enim, & inflammatus stomachus, solidus, ac firmus quandoque fit, & aliquo modo accommodatur. Sed & si in callum induratus fuerint, præstat acra apponere, quæ mordcant. Quæ enim tenuia, & fervida sunt, calli duritiam dissolvunt. Si vero mollitus fuerit callus, mollibus curato, & his, quæ non mordent. * Quod si diu non concipiat, mensibus non apparentibus, quum tertia, aut quarta dies aderit, alumen titrum, unguento dilutum, & lana exceptum apponito, & habeat per triduum. Quarta vero die sel bubulum siccum in oleo servescito, & lanam teneram eo imbutam subdito, & habeat per triduum. Postridie autem eximat, & cum viro coeat. * Si genituram non suscipiat mulier,

mulier, mensibus secundum naturam prodeuntibus, membrana præposita est. Fit etiam ex aliis causis; cognoscere autem, ubi digito objcem contigeris. Facito autem medicamentum subditum; resinam, & æris florem cum melle subacta in luteo apponito quampenitissime, filo ad extremitatem alligato; ubi vero hoc extraxerit, myrtum in vino coquit, & viro tepido perfratur, præstat autem membranam auferre. * Sunt autem mulieres, quæ facile quidem in ventre concipiunt, gestare vero non possunt, sed foetus ip-
 37 coquit, & viro tepido perfratur, præstat autem membranam auferre. * Sunt autem mulieres, quæ facile quidem in ventre concipiunt, gestare vero non possunt, sed foetus ip-
 435 sis corripimur aut tertio, aut quarto mense, nulla causa accedente, neque cibo incom-
 437 modo ingesto, & hæc est causa, quæ relata est, & maxime quum uteri augmentum
 foetus dimiserint, aut venter ipsis turbetur. Debilitas autem, & febris vehemens, &
 cibi fastidium incidit eo tempore, quo foetus corripunt. Est autem & hæc causa, si
 440 teri fuerint leves aut natura, aut ulceribus in ipsis innatis. Si enim leves fuerint,
 quandoque continentes ipsum pelliculæ, minus quam oportet, coherant, utpote quum
 uteri ipsi pleni existant; cognoverit autem quis hæc singula, si de his exacte interro-
 get. De levitate vero cognoverit, si alia mulier contigerit, dum uteri vacui sunt.
 Non enim hoc tempore manifestum fit. Si vero menses prodierint, his acervatum
 prodeunt. Quibusdam tamen ipsarum contingit, ut foetus edant. Et si qua curetur,
 spes partus adest, & de his quidem sic habet, 445

S E C T I O I I.

38 * SI mulierem puerperam facere velis, alias concipere nequeuntem, men-
 tes considerare oportet, an pituitosi sunt, aut biliosi. Cognoscere au-
 tem sic. Arenam tenuem, ac siccam subicito, & quum menses prodeunt,
 in sole sanguinem superfundito, ac siccare finito. Et si quidem biliosa fue-
 rit, sanguis in arena siccatus pallidus erit. Si vero pituitosa fuerit, velut mu-
 39 cus. Utrum igitur horum fuerit, ventrem purgato, sive supra opus habuerit, sive
 infra; postea uteros purgato. Si vero concipere voles, hederæ grana septem, aut
 folia, singulis mensibus in vino veteri, cessantibus mensibus, bibenda dato. Et mali-
 corum in vino odorato metaco coquito, & glandem ex hoc factam in meridie subdi-
 40 to. Aut alumen Ægyptium tritum lanæ illigatum apponito. Quum autem sol occide-
 rit, eo detracto, vino odorato perluatur. Hæc autem cessantibus mensibus facere o-
 portet. Sed & hoc sic habet. Quum purgatæ fuerint mulieres, maxime in ventre
 concipiunt cum viro consuetudine habentes, & genitura ipsas corroboratur, si quan-
 41 do oportet, coherint. Et semen viri facile ammicetur, & si prævaluerit, illi accom-
 modatur, ac appropriatur. Tunc enim maxime os uterorum hiat, & distentum est,
 post purgationes. Et venæ genituram attrahunt. At in priore tempore et os uterorum
 conclusum est, & venæ magis sanguine plenæ existentes, non similiter genituram at-
 39 trahunt. * Si vero genitura jugi cursu defluat, mulier viro misceri non cupit,
 & si miscetur, non concipit, & lumbis, ac coxendicibus doloribus vexantur, & fe-
 40 bris debilis corripit, & impotentia, ac animi deliquium succedit, & aliquando
 uteri in suo loco non sunt. Si quidem igitur præ plenitudine defluat, sine ipsam
 optimum est. Si vero uterus laxus fiat, diæta sit alica, caro suilla, aut palumbis, &
 40 vinum nigrum; portiones vero, quæ ad fluxum deferibentur. * Nunc porro di-
 cam de morbis earum, quæ in ventre habent. Pronuncio autem de muliere in ven-
 tre habente duos, aut tres menses, & ultra, si menses statim prodeant singulis men-
 41 sibus, necesse est tenuem ipsam fieri, ac debilem. Quandoque etiam febris ipsam cor-
 25 rripit his diebus, quamdiu menses prodierint. Et dum prodeunt, & postquam prodie-
 rint, pallida fit. Sed & pauci prodeunt. His uteri magis, quam opportunum est, hiant,
 & augmentum foetus dimittunt. Descendit enim, quum mulier in ventre habet, san-
 30 guis paulatim in uteros a toto corpore, & in orbem circa id, quod in uteris est cir-
 cumstans, illud augeat. Si vero hiant uteri magis, quam oportet, sanguinem sin-
 gulis mensibus, velut procedere solet, dimittunt. Et quod in uteris est, tenue, ac
 35 debile fit. Si vero curetur mulier, melior & foetus, & mulier evadit. Si vero non
 curetur, foetus corripitur. Sed & ipsa periclitatur, ne diuturnum habeat mor-
 bum, si purgatio, plus quam oportet, prodeat. Quia & post corruptionem pericu-
 41 lum imminet, nimirum uteris magis apertis. * Si vero mulieri in utero haben-
 ti caput pituitosum fuerit, & puerita acris in ventrem descendit, & a capite
 ventrem pertumpit, & febris debilis ipsam corripit, & palpitationes quibusdam
 debiles subexoluit, augescentes acutæ. Si vero etiam cibi fastidium, & impoten-
 42 tia corripit, periculum est, ne brevi foetus corripatur. Sed et ipsa in pericu-
 lum adducetur, si non curetur, ubi vero effugerit, utpote ventre fluído existen-
 40 te, statim concludere, ac restringere oportet. Multa vero etiam alia sunt pericu-
 la, in quibus foetus corripuntur. Nam si mulier in ventre habens ægrotarit,
 aut debilis fuerit, aut onus levaret, aut percussa fuerit, aut saltarit, aut cibum fa-
 stidierit, aut animi deliquio correpta fuerit, aut amplius, aut minus nutrimen-
 45 tum accipiat, aut timeat, et consterneretur, aut vociferetur, aut intemperanter vi-
 vat, foetus corripitur. Nam et cibus corruptionis causa est, et potus nullus.
 Sed et ipsi uteri naturas habent, quibus abortum faciunt, quum sunt flaccidi,
 Hipp. Opera. Q a densi,

- denſi, magni, parvi, & alia his ſimilia. * Si mulier in utero habens, venarem, aut lumbos doleat, formidare oportet, ne ſœtum per abortum edat, pelliculis, qui ipſum continent, ruptis. Sunt etiam, quæ ſœtus corumpunt, ſi acre quid, aut amarum ederint, aut biberint præter conſuetudinem, dum adhuc parvus in-
 tus eſt puerulus. Si enim puero quid accidat præter conſuetudinem, et ſi parvulus adhuc fuerit, moritur. Et ſi ejuſmodi edat, aut bibat, velut diximus, ut neceſſe ſit ipſi turbare ventrem, dum adhuc parvus eſt puer. Percipiunt enim, et concitantur ipſi uteri, fluxione ex ventre ſecedente. Et ſi laborarit mulier pluſquam oportet, et venter ipſius concidatur, aut magnus fiat, etiam ſi puer corumpitur, velut a labore calefactus, et a ventre preſſus. Plerumque enim, dum parvi ſunt, debiles ſunt. Quidam vero etiam magni corumpuntur. Quare mirari non oportet mulieres, quod invicæ corumpunt. Nam cuſtodia, et ſcientia multa opus eſt, ut in uteris geſtent puerum, et enutrient, et ut evadant ab ipſo in partu.
 * Si vero mulier in ventre habens, corpore male habeat, et fuerit biliſa, et doloribus vexata, et alias atque alias febricitet, et os examarſcat, et lingua cum virore pallida fiat, oculi velut morbo regio affecti, ungues biliſi, urina acris: hæc tum alias, tum ſi febricitet, alias atque alias ipſi accidunt, poſtquam vero etiam purgationem contigerit biliſam eſſe, plane timendum eſt etiam pueros debiles fore: hæc ſi biliſa per ſecellum, egerat (id, quod valde contingit) melius deget. Et ſi biliſa, aut valde nigra ſunt partus purgamenta, etiam ut plurimum pinguedo ſuccedit, et prodeunt paulatim, et non cito congelantur, et primo quidem tempore levius fert, poſtea vero gravius, et minus purgatur, quam oportet. Si enim corpus male habuerit, etiam partus purgamenta pauciora, ac deteriora ipſi procedunt. Parietur autem et hæc omnia, etiam ſi menſes prodeant biliſi. Verum breviore tempore agrotabit. Et morbus ad eadem pericula, et ſigna, et tranſmutationes deveniet. Aut enim ipſis vomitus biliſus, aut purgatio per venem in hoc morbo fit, et uteri exulcerantur. Multa vero cuſtodia mulier opus habet. Quum igitur tale quid factum fuerit, ut ne moriatur, ſterilis erit. Si vero nihil horum fiat, et non curetur, ſed partus purgamenta fuerint ipſi occulata, in triginta et una diebus ut plurimum moritur. Huic pharmacum in potu exhibendum eſt, quod bilem ducat. Prodeſt et aniſum, et quæ ad urinam ciendam dantur.
 80 Vomæ autem, et ſudores eliciantur, et alvus ſucco perſanæ, et melle, et ovis, et malvæ aqua inſuſa eliatur. * Quibus in ventre habentibus circa ſeptimum, aut octavum menſem derепente mammarum, et ventris plenitudo collabitur, ce ubeta gracileſcunt, et læc non apparet, his dicendum eſt, puerum aut mortuum eſſe, aut vivere, et debilem eſſe. Si enim in ventre habuerint, et apparuerint menſes, aut abortus ſiant, ſi plures fuerint, et male olentes, aut ſœtus morboſi ſint.
 * Si mulier in ventre habens, pituitoſa fuerit, et caput dolet, et alias atque alias febricit, et in capite obvolvitur pituita. Et gravitatem exhibet, ac frigus, et in corpus procedit, et in venas, quum caput fuerit repletum. Fit etiam colore plumbeo ſimilis, et vomit pituitam: lingua alba eſt, et urina communiter exalbefeſcit, frigida eſt, turbatio adeſt, et æger morus. Ubi vero pepererit, procedet ipſi purgatio pituitoſa, et apparebit pelliculoſa, et velut araneorum caſes in hac diſſenti erunt, et parietur quidem eadem omnia etiam ea, cui menſes pituitoſi prodeunt, verum breviore tempore agrotabit, et eadem pericula, et ſigna, et tranſmutationes morbus habebit. Contingit enim ipſi vomitum pituitoſum fieri, et affectiones ſimiles velut illi accidunt. Dependunt enim eodem modo partus purgamenta, et menſes pituitoſi, verum purgamenta partus breviore tempore quam menſes, et niſi eruperit ipſa purgatio, quæ diu moram traxit, moritur in quinque et quadraginta diebus, etiam ſi pituitoſum partus purgamentum ipſi prodierit. Curata autem mulier, ſana fiet, et inflabitur ab initio, ſi ſanata fuerit. Gravis enim erit hic morbus. Huic dare oportet pharmacum, quod pituitam ducit, et læc caprum coctum cum melle miſcere. Si vero ſæpe non obediât, naſturtium, aut enicum, aut cneorum, aut polyopodium, aut ſerum, aut medicamentum ex ſale compoſitum exhibebo, et quæcumque pituitam laxant, ac educunt. * Si vero mulier in utero habens, lienoſa fit a telaeiſ affectionibus, in hoc morbo menſes hydropi ſimiles, et pituitoſos demittit, et partus purgamenta procedunt hydropi ſimilia, et produbunt modo multa, modo pauca, et ſunt quemadmodum aqua a carnibus, velut ſi quis carnes cruentas abluit. Aliquando vero paulo craſſiora, et non congelantur. Et parietur eadem omnia etiam ea, cui menſes aquoſi procedunt, et pericula eadem, ac tranſmutationes morbus habebit. Contingit enim ipſi fluxum aquoſum fieri, aut purgationem occultari, et ad ventrem converti, et ad crura, aut ad pectus, aut aliquam harum partium, et pericula e-runt eadem, quæ prius ſunt reſta. * Si prægnans inſumefcat, urtica ſemen plurimum, et mel, et vinum diſtillatum odoratum potandum dato bis in die.
 * Si prægnantem bilis vexet, perſanæ ſuccum dato, rhoë rubro inſperſo, aut eo, qui ex moris paratur. Sorbeat autem frigidam, et liſteatur. * Si ſuffocatio derepente accidat prægnanti: fit autem hoc maxime, ubi mulier laborarit, et cibum ſaſtidiierit, uteris a labore calefactis, et pauciore humore ſœtui accedente. Et quum uterus, ac venter inaniſior ſit quam oportet, procedit ſœtus ad hepar, et præ-

& praecordia, ut quae sunt humecta, & suffocationem sortem derepente inducit. Intercipit enim perspirationem circa ventrem, & mulier voce privatur, & albas oculorum partes subvertit, & reliqua patitur omnia, quae relaxantur, si mulier non praegnatam ab utero suffocetur. Quam suffocatio fieri incipit mulieri in ventre habenti, quum a capite defluit pituita ad praecordia, utpote corpore respirationem trahere non potente. Et si quidem una cum pituita descensu foetus redierit ad suum locum, velut qui humorem attraxit, & a pituita delatus sit, mulier sana fit. Stridor autem fit, foetu locum suum occupante. Et venter mulieris ut plurimum humidus fit. Si vero non brevi redeat foetus in suum locum, duo jam sunt, quae foetum assigunt, pituita, quae a capite descendit, gravat enim, & insistens frigidat, & loci alienitas, & periclitabitur. Et si non brevi quis commodiorem dietam adhibuerit, mulier suffocabitur. Et de his quidem sic habet.

* Si vero mulieri in ventre habenti, tempus partus jam affuerit, & dolor partus tenuerit, & ad multum tempus mulier puerum edere non poterit, omnino obliquus, aut in pedes procedit. Utile est autem in caput procedere. Et si obliquus procedat, difficilis fit affectio. Sicut enim si quis in vas olearium angustioris nucleum immitat, non proclive est extrahere ipsum obliquum. Sic sane etiam mulieri gravis affectio est, ubi foetus fuerit obliquus. Difficile enim ipsum exire. Grave autem est etiam, si in pedes processerit, & saepe aut matres pereunt, aut pueri, aut ambo. Est autem & haec magna causa, ut non facile exeat, si mortuus, aut syderatus, aut duplicatus fuerit. * Quum mulier in ventre habuerit, tota fit cum virote pallida, quoniam purus ipsius sanguis semper quotidie ex corpore destillat, & in foetum descendit, & augmentum ipsi accedit. Et quum paucior sanguis sit in corpore, necesse est ipsam esse pallidam, & semper alienos cibos appetere, & sanguinea in ventrem intrare. Et debilis fit, quoniam sanguis minuitur. Assero porro mulierem, ubi pariet, frequentem spiritum emittere. Et si purgatio inceperit, venter plenus est, & calore pressus. Maxime vero frequenter respirat, ubi partus appropinquat. Et tunc maxime lumbos dolet. Nam & lumbi a foetu colliduntur. Dolet autem stomachum, sive ventriculi osculum in intermedio tempore alias atque alias, utpote dum venter, maxime vero uterus, circum foetum obvolvitur. * Et si puerpera uterus inscitur, ovicula, aut caprae hepar cinere obruito, deinde coquito, & hoc edat, ac vinum meracius verus, si nihil prohibuerit, bibat ad dies quatuor, si longius aberit a partu. Si vero lumbos doleat, anisum, & cuminum Aethiopicum bibat. Et calida lavetur. Si vero anhelatio corripuit, sulphuris magnitudinem fabae, & cardamomi tantundem, & ruta, ac cumini Aethiopici tantundem. Haec terito, & vino diluta jejuna bibenda praebeto. Et a cibis frequenter abstineat. * Si in partu purgatio multo prodierit, uterus contrahitur, & vesica, & intestinum, & neque stercore continent, sed & urinam emittunt. Ova igitur sorbenda dato, & panem cinerum edendum, & reliqua, quae scripta sunt. * Si vero ea, quae in partu est, sicca fuerit, & difficulter humectetur, oleum bibat, & locos oleo calido cum malya aqua irriget, & cerato liquido illinat, & anserinum adipem cum oleo infundat. * Si vero parere non poterit, resinam, aut cuminum, aut pinus corticem suffuso.

* Quicumque vero tumores uteri in partu, aut ex partu sunt, eos adstringere non oportet, velut medici faciunt, verum pharmaca optima exhibeto. Cuminum Aethiopicum, quantum tribus digitis capi potest, & anisi, & seselis granum quinque, aut sex, proniae radices, aut etiam seminis testam conchae majoris dimidiam. Haec in vino albo odorato maxime, jejuna exhibeto. Aut dauci Aethiopici radicem, seseli, proniae radicem, eodem modo. Aut hippofselini, aut danci Aethiopici semen, eodem modo. Aut crethmi radicem. Aut cuminum Aethiopicum quantum obolorum Atticorum pondere. Aut piper, anisum, daucum, proniae Atticae radicem, haec in vino terito, & bibenda dato. Aut myrtidani ramulos duos, aut tres, & cuminum Aethiopicum, & proniae radicem. Aut etiam lini semen si militet, quo etiam pueros insistentes nutriunt, cum ovi assaro vitello, & cum sesamo rosto. * Si praegnantis pudenda superficiatiora, ac servido ulcere affecta sint, amygdalas tritas, & medullam bubulam in aqua coquito, & modica farina adiecta, pudenda illinito, & aqua a coctis myrti baccis perluito. * Nunc vero dicam de puerperii purgantibus, & his, quae post partum exeunt. Quum mulieri aut partus purgantia non fuerint purgata, aut menses non prodierint, aut etiam uterus durus fuerit, dolor habet lumbos, & lateris mollitudinem, & inguina, & femora, & pedes amare dolet, & venter attollitur, & horrores per corpus discurrunt. Ex talibus autem febres sunt acutae. Hanc ita habentem, si quidem sine febre fuerit, balneis curato. Caput autem oleo anthino inungito. Malvam autem coquito, & oleo cyprino in aquam ejus insulo, mitigandi gratia insidere iubeto. In omnibus autem morbis, in quibus sumentum auxiliatur, melius est postea oleo ungi. Si vero febris habet, a balneis abstinere, fomentis autem, & tepidioris iunum ventrem, & lumbos curare. In potu autem exhibere pharmaca nterina, aut sepius ovis, aut castorio ammixtis, post hoc vero farinam cum ruta coctam, aut pisanæ succum sorbendum dare. * Si vero mulieri cum puero in

- partu non prodierit humor, velut oportet, sed si quidem in capite habuerit humorem a calore attractum, in partu, et anre, caput dolebit. Si vero in ventrem acervatum descendit, ubi concitatus fuerit, ipsum turbabit. Et non oportet longē progredi sinere, sed auxilium ferre, ut ne ex partu ventris profusivum succedens, corpore male habente, ipsam dolore affligat. Si vero a capite delatus fluxus ad puerperii purgationem vertatur, et multum concitetur, melius habebit. Si vero plus inoderato, curam adhibeto. Si vero in ventrem, facilius utique exitus puerro contigerit. * Si vero purgatio modica mulieri prodierit, dolor foris corripit lumbos, et omnem circa pudenda locum et intumescit, et femora ardent.
- Et ex ore, ac naribus pituita sicut fortiter aquosa, et dolet caput, et febris habet, et horror, et timet, et dentes stridunt, et venter, et velica constingentur, et oculos subvertit, et caliginosum visum habet. Quam mulieri puerperae purgatio non facile procedit, velut uteris inflammatis, et osculo ipsorum concluso. Obtrahitur enim stomachus uteri post pueri egressum; Si enim quid horum fuerit, purgatio non procedet. Si vero non processerit purgatio, continget ipsam febrere, et horrorem habere, et ventrem magnum esse, et si ipsam attingeris, totum corpus dolere, maxime si quis ventrem attingat, et alias atque alias stomachi dolore vexatur, et lumbos dolet, et cibi fastidium, et vigilie, et punctura adeit, postea quinto, aut septimo die quandoque venter turbatur, et secedunt nigra, et valde graveolentia alias atque alias, et urina velut asinina. Et si secesserint, videtur sibi melius habere, et curata, brevi sana fit; sin minus, periclitabitur profusio ventris forti ipsi illapso. Et puerperii purgamenta ipsi occultabuntur. Si vero venter ipsi non turbeatur, neque purgatio prodeat sua sponte, neque ea, quae commoda sunt, brevi exhibeantur, tempus autem progrediatur, multo magis ex praedictis affligetur. Et insuper periclitabitur, ne livida fiat velut plumbum, et aquam intercutem incidat, et umbilicus extabit ipsi, ab uteris elevatus. Et circumcirca nigrior erit, et ubi haec facta fuerint, fieri non potest, ut mulier superstes maneat. Percunt autem aliae alio tempore pro corporis, et affectionis ratione. Verum unam et vicesimam diem non excedunt, id quod plerumque sic contingit: Si vero purgatio ipsi eruperit sive a pharmacis, sive sua sponte: sit enim et hoc, si uteri os laxarint, a sanguine acervatum derepente delato coacti, et si eruperit, graveolentia purulenta depurgantur. Quandoque etiam nigra, et melius habebit, et curata sanescit. * Fiunt autem et ulcera in uteris, utpote puerperii purgamentis putrefactis.
- Si vero fiant, maiore cura opus erit, ut ne ipsi ulcera magna, et putredinosa fiant; periculum est autem, ne aut moriatur, aut sterilis fiat. Signa vero haec sunt, si ulcera intus fuerint. Quam purgatio ipsi prodierit, velut spina per uterum transire videtur, et calor ipsam corripit, ac maxime ventrem invadit. Et si attingatur, partem infra umbilicum dolet, velut si purum nervosum ulcus contingat. Post dolores fortes alias atque alias in uteros incidunt. Et febris aliquando ad contactum manus debilis, et alias atque alias puerperii purgamenta procedunt, maligna, purulenta, graveolentia. Haec sunt signa, si ulcera in uteris fuerint, et multa cura opus habent. Atque huius quidem morbi tot fines existunt. * Si vero purgatio puerperii primis tribus, aut quatuor diebus processerit, verum postea derepente evanescit, easdem affectiones consimiles priori parit, sed minus, et si transmutetur morbus, in idem transmutabitur. Diuturnus autem, et debiliior prior erit. Si vero curetur mulier, superstes erit, si cito curetur, et de hoc morbo sic habet.
- * Si vero ex partu non fuerit purgata, venter intumescit, et splen, et crura. Et febris habet, et rigor corripit, et dolores prosiliunt ad lumbos. Aliquando etiam ad viscera. Et perfrigeratur, et febris habet, pulsus debiles sunt, et aliquando acuti, et alias atolluntur, alias desciunt. Haec patitur incipiente morbo, et sic habet. Temporis autem progressu cavæ faciei partes rubescunt. Quum sic habuerit, leves cibos exhibeto. Et si turget, pharmacum infra purgans bibendum dabo, si biliosa fuerit, quod bilem purgat. Si pituitosa, quod pituitam. Postea veto uteros odoratis foreto, et mollitorum in die apponito. Si vero osculum solidum fuerit, tota die foveto, et mollitoria apponito. Deinde calida aqua lavato, et plumbas fistulas indito, postea salis grana, et myrrham in lincum illigato, et pieem coctam ammixtis aromatatis lana excipito, et singulorum pares porciones ad galle parvae figuram efformato, et per diem, ac noctem apponito. Deinde vero intermissis tribus diebus, iisdem foveto. Et grana cnidia decorticata duarum potionum mensura, et piperis grana erica, oleo Aegyptio albo, et melle optimo ammixto, in lanam infarcito, et pennae obvoluto, tota die, ac nocte apponito. Et si ribi purgata esse videatur, melius est sinere. Si vero purgatione opus habere videatur, duobus diebus interpositis, rursus id, quod ex cucumere sylvestri paratur, per diem, ac noctem subdito. Deinde netopon, et oleum rosaceum odoratissimum, et adipem cervi liquefacto, et die una in lana subdito, et multa calida, quamvis eius fieri potest, leniter lavato. Statim autem ubi purgatoris, et calida, fuerint purgata loca affecta, adipe asserino, et myrrha, et resina repida os uteriorum illinat, et foveat, uteros vero posttridie vino, et oleo narcissino eluat. Aut si narcissinum non sit, vino solo. Atque haec die uno ante menses faciat. Postquam autem

tem menses prodierint, primis diebus atramentum, hoc est spodium cyprum terat, & salis granum addat, & hæc lana excepta paululum in corpore habeat. Et ieiuna vinum meracum odoratum absorbeat. Ubi vero quieverint menses, per diem id, quod ex pulegio paratur, apponat, & vinum accedat. Et si in ventre conegerit, sana evadit. Cibis autem in purgatione utatur. Ad hæc commodat, mercurialem coquere, & porrum, allium, brassicam, & grana mali punci ammiccare, & succum torbere. Alius autem obsoniis marinis, potius quam carnisbutur. A dulcibus vero, & oleosis prohibeatur. Bibat autem semper ieiuna id, quod ex tæda paratur, donec purgetur. Et mensibus prodeuntibus idem valde bibat. Si vero paulo pauciora, quam oportet, prodierint mulieri puerperæ purgantia, velut uteris angusto ore prædictis, ac distortis, aut aliqua pendendi pars valde fuerit conclusa ab inflammatione, mulier acutè febricit, & stomachi dolore vexatur, & doler totum corpus, & moelle ferr, & ad articulos manuum, ac crurum, & lumborum dolor procedit, & locum circa collum, & spinam, & inguina dolebit, & quædam thoracis partes impotentes fiene. Postea calor quiescit, & horror valde manifestus. Vomunt autem & pituitosa, amara, acris, & de hac sic habet, & continget, ut si curetur, sana fiat. Sin minus, clauda, & quarundam corporis partium impotens erit. Non autem valde sterilis est hic morbus. Si quidem ulcerati fuerint uteri, & puerperæ purgantia non prodierint, velut oportet, omnia dolebit, & si non magna fuerint ulcera, curata brevi sanescit. Oportet autem curacionem ulterum in uteris exactè facere, ut quæ in tenera, & subtili sensu prædicta sint parte, & in nervosa cavitate. Multæ autem sunt partes, cum quibus licetiarom habet, scilicet, stomachus. Mens percellitur, & improba fit, & non facile intelligit. Si vero uteri angusti oris ipsi fuerint, & puerperæ purgationem non emiserint, inflammatur, & si non curetur brevi, omnia magis ipsam affligent. Et odor malus erit, & exitus intumescit. Et si non inflammati fuerint uteri, sua sponte exit malum graveolens, & lividum, aut nigrum grumofum, & mulier puerperæ purgantia purgantur. Quandoque vero non exit, sed mulieri mortem portendit, nisi quæ brevi venam fecerit, aut ventrem emolliet, præstat autem etiam clysterem adhibere. Si vero ad vomitum facilis fuerit, etiam vomitum inducere. Melius autem est locum cære, & exudare. Verum in his occasio optima est, quam opus his fuerit. Si vero ex partu purgata mulier fuerit, paulo plura, quam oportet. Contingit enim hoc, si uteri amplioris oleuli fuerint, & venæ quædam ruptæ sint, quæ sub utero tendant, præ violentia egressus ipsius foetus: febris, et rigor habebit ipsam tenuis, et calor per totum corpus. Aliquando etiam horror, et cibi fastidium, et omnino abominabitur, et tenuis erit, ac debilis, et pallida, et tumida, et cibum averfatur. Si vero quid edat, aut bibat, non concoquitur. Quibusdam vero etiam alvus, et vesica erumpit, et horror magis obtinet. Et de hac sic habet. Si vero puerperæ aliqua pudendi pars obnata fuerit, jam enim etiam hoc cognovi, si ulceratum fuerit os pudendi, ubi sane ulceratum fuerit, in partu a pueri exitu violatum, simile quid sit ulcere superficiali, ac ferventi, & valde inflammatur. Et labia præ inflammatione inter se coincidunt, et se mutuo contingunt, utpote quæ sunt exulcerata. Sed et frigus fit, et ambo labia clausa sunt, contriungentia purgationem relictam. Si vero prodierit purgatio, ulcera non conclusa essent. Nunc autem insinit, et aliena carne crassescunt. Proinde ea sanare oportet, velut in reliquo corpore, et ad cicatrices perducere. Locis autem levibus, et concolor reddatur. Mulier quædam patiebatur eadem, hæc præter uteri, dum a puerperæ purgantibus non purgaretur, et ad hæc dolebat pudendum. Et ex contactu cognovit, quod obnata esset, et narravit, et curata depurgata est, et sana evasit, ac fecunda. Si vero curata non fuisset, neque purgatio sponte erupisset, ulcus majus fecisset, et malo non remittente, periclitata fuisset, ne ulcera cancerosa fierent. Si vero procellerit mulieri puerperæ purgatio ad caput, thoracemque, ac pulmonem: fit enim et hoc, moriuntur læpe statim, si decineatur, ac firmetur. Si vero probe exeat per os, aut nares, sana evadit. Si vero morbus paulo diuturnior fiat, patietur sane mulier eas, quæ dicta sunt de virgine, cui menses primum comparantes, statim impetum fecerunt. Verum mulier longiore tempore superstes erit, quam virgo, et affectiones debiliores erunt, donec paulo purulentius fiat. Si vero puerperæ purgatio non exeat per os, sed solum tamen impetum fecerit, occultabitur, et non procedet iusto modo. Et tussis coarctat, et anhelationes. Et impleto pulmone a sanguine, valde dolebit latus, et dorsum. Et quum misceat, siccæ tussis. Aliquando vero spumolus expuet. Tempore autem progressu spiritum apparet subnigrum, et turbatum. Et calor pectora tenet, magis quam reliquum corpus, nimirum sanguine ipsa calefaciente. Et febricit mulier, et ventris ipsi coarctatur, et cibum fastidit, et vigilabit, et abominabitur, et non superstes manet, sed moritur plerumque vicesima prima die. Si vero purgatio statim progressa per os non exeat, neque in pulmonem venturatur, convertetur ipsa ad faciem, et erit hæc valde rubicunda, et caput grave, quod neque movere potest absque doloribus, et oculi valde rubicundi erunt, et ex ipsi sanguis totus fuerit. Et quibusdam ex naribus sanguis manat. Et si hic exierit, diuturnior mor-

- bus sit. Et aures non acute audiunt in hoc morbo, & stomachi dolore venatim, & eructat, & mente alienatur, & deliria sunt iustola. Quibusdam autem adest or-
 325 cillorum diffentorum ferocitas. Et reliqua omnia perperius, velut si purgatio ad pulmonem venturum. Verum non tulerit, neque expuerit eiusmodi, neque dorum similiter dolebit. Curata vero, sanis sit. Non multa vero ipse est de vita ipius. Et si etiam superflues maneat, lurdas, aut cecitas omnino ipsi accedit. Atque hic est
 330 huius morbi finis. * Si ex partu luxus corripiat, & cibi in ventre non maneat, tamen passum nigrum, & mali puniet dulcis grana terito, & vino nigro dilutis utroque, ita ut calcem caprinam dexam, & potentiam tritici torrefactam inspergas, & bene temperata bibenda praebeas. * Si ex partu languinem veniat,
 335 hepatitis fistula fauciam est, & dolor ad viscera procedit, & cor convellitur. Hanc multa calida lavare oportet, & tepelactoria, quae maxime admixta, adhibere, & hac assinum ad dies septem, vel quinque bibendum dare, postea vero vacce nigrae hac bibendum praebeere, ita ut sine cibo degat, si fieri poterit, ad dies quadraginta. Ad vesperam vero salsum tritici trahit bibat. Morbus hic est periculosus. Quo-
 340 modo autem hoc fiat, dictum a me est in pueri partu in nativitate, & alia similiter. * Si hac fuerit extinctum, porrum tritici, & aqua dilutum bibendum dato. Et calida lavetur, & in cibo potum, ac brassicam edat. Sed & cythi sola simul coquant, & succum forbeat. Bibat etiam foeniculi succum, & de radicibus foeniculi. Et hordeum molitum, ac buryum simul coquo, frigescentio, ac bibenda praebeo. Bonum est,
 345 & hippomarathrum, & hypolelinum, & cythius. Hac omnia simul multum lac faciant, & augent. Caprae item Scyriae, caesi autem maxime commodi sunt. Sed & salis vini coquant. Aut a juniperi bacis, aut cedri fructu succum diffundat, & vino assiso bibat, & reliqua oleo assiso edat, & ab acerbis, & salis, & acidis, & crudis oleribus omnibus prohibeat. Nasitum vero in vino potum commodum
 350 est. Nam hac purgat, & calida lavetur, & subalidum bibat. Vagris item fructum in vino bibendum dato, & beae succus potum multum lac fuerit. Salsum quoque recens, & hordeum trinitre, in mortarium coniecta terito, & succum per lineum exprimito, & mel, aut amamelidas ammisceto, deinde in vino nigro bibenda dato. Quin mulier peperit, & a secunda non fuerit liberata, praestat dare ea, a qua
 355 bus maxime purgantur perperii purgamenta: alia cocta, aut assisa in vino, & oleo, cum polypis, ac leporibus super prunis coctis, quicquid tandem ex his voluerit. Castoreum vero, aut nardum bibat. Bibat etiam quam in vino nigro dulci lejana, aut sine vino. Si vero vitum non fuerit dulce, melius est mel ammiscere. Edat etiam brassicam coctam cum ruta, & mercuriali, & senem aliquod utero commodum bibat. * Si vero perperii purgamenta in grumos fuerint coacta, & do-
 360 lor in uno ventre fiat, porrum coctum, & quicumque sylvestria, ac horrenlia olia dato, verum omnia pingua facito, & per tertium quicumque diem sub elementi cocto lavetur. Frigus enim hic inimicum est. Et post balneum amitte melius est, & non multa calida uti. * Quin secunda non statim exierit post partum, uni generis
 365 dolores sunt in laterum mollitudine, & rigores, ac febres. Et si discesserit secunda, sanatur etiam mulier. Sape vero putrescit, & discedit sexta, aut septima dies, aut etiam prius. Huic autem dare oportet pharimata, quae ego descriptam, & spiritum conungere iubet. Omnium vero optatum novi artemisiam herbam, & di-
 370 camnum, & violae albae florem. Et silphi succus optimus est fabae graecae magnitudine in aqua potus. Et si secunda excludere non poterit, a cibo abstinere. Et postea viticis sula in vino, & melle, oleo assiso, tepelacito, & hemina mensuram bibendam dato, & exibere. * Si mulieri secunda in utero relicta fuerit, hoc se
 375 contingit. Si per vim rubeus succus umbilicus, aut ab obsterice umbilicofeca per imperitiam relictus, cum videlicet umbilicum prius acciderit, antequam secunda ex utero exierit, & uteri forium retrahunt secundarias, utpote lubricam, & diffusam, & in se ipsis detinent. Nam secunda ex umbilico pueri haeret, & um-
 380 bilicus postremus ex utero exit. Si enim prius exierit, non accederet per ipsum pueri nutrimentum, quoniam ex ipso dependet. * Quin in ventre habens foetum corripit menstruum, aut bimestrem, & secunda exire non poterit, (fuerit autem tenus) huius corpus tunc purgare oportet, ac pinguescere. Non enim prius exierit foetus putrefacti, nisi lutes fuerint uteri, & probe compacti. Si mulieri secunda relicta fuerit, si non amplius fuerint uteri, purgatio ipsa minus, quam oportet, procedit, & ventris durus fit, ac magnus. Et frigus detinet, & febris acuta, & dolor per totum corpus, & ventris maxime partem eam, quae est in-
 385 fra umbilicum, & gravitas fit in utero, velut foetus iust. Et curata, secundum brevi ejus putrefactam, & sana evadit. * Si ex partu uterum ulceratum fuerit, costrum floribus curato. Sed & acerbis infusis colluatur. Si vero os eius ulceratum fuerit, ac inflammatum, myrrham, & adipem asinerum, & co-
 390 ram albam, et thus pilis leporinis sub ventre anatis misceto, & simul erit in lana apponito. * Si ex partu uteri fuerint inflammata, febris debilis corpus tenet, et caligo adest. Ex ventre vero nunquam debet calor, et frigus, et coras dolet, et venter immis foriter intumescit, et alvus turbatur. Secellus autem est malus, et ob-
 395 dus, et calor vehemens corripit, et cibum aversatur, et dolor iuxta sinipur est, et ven-

& venter stomachus non potest trahere cibos, ac potus, & concoquere nequit, & nisi curentur statim, plurimæ moriuntur. Venter autem est in causa. Sambucus igitur 395
 sola venetrima, in crassiore tritici recentis farina docta, leviter tepida sorbeat. Dato, & aquam mulsum, & vinum aquosum. Ex pectine cataplasmati frigida-
 toris integro. Cibum autem quamminimè edat, & venter sistatur, & caput cu-
 retur, præcordiis vero, & uterorum loco cataplasmata adhibeto. * Quam dolue-
 rit sedem, aut aliud quid, junperi baccas, aut apii, & urtica semen terito, ac bi- 400
 bendum dato. * Si ex partu doleat, resinam terebintuinam, & mel, & vinum
 tepidum sorbeunda dato. Et si inflammata fuerint uteri, inde sedantur. Si vero non
 doleat uterorum locum, amygdalas amaras tritas, & olea folia tenera, & anisum,
 & irionem, et organum, et nitrum. Hac misceto, terito, et uterorum collucta ef-
 foemato. Si vero inflammata fuerint, et dolor habuerit, rosarium folia, cymyo- 405
 mum, et cassiam simul terito, et acetopo affuso, placentulas, ac pastillos drach-
 miales formato, eoque in ollam novam sicilem igne candente utrito, circumloca-
 saque muliere, ac vestibus connecta, in uteros suffro. Huc dolores sedat. * Si vero
 ex partu uteri doluerint, calor debilis habet, verum veniens ignis intus igne ardet,
 et ad coarctandam aliquando uterifert, et dolor habet inveni venter, et late- 410
 rum mollescentiam. Et feculus biliosi sunt, et gravolentes, et si non sistatur ven-
 ter, desepente moritur. Quam igitur sic habuerint, ventrem frigidare oportet,
 cavendo, ne horrefcat. Bebat autem, si non sistatur, aquam de crassiore tritici fari-
 na in ipsa macerata, et panis farinam edat. Sorbeat autem mali puniei vinosi su-
 perius aqua dilutum, farina lentum inspersa. Et hoc coquito, misce lentem, et cy- 415
 mum, et saleum, et oleum, et acetum, atque hanc solutionem frigidam exhibe-
 ro. Lenticulam item acidam dato, et vinum vinolum primum insuper sorben-
 dum. Ab aliis autem cibis abstinere oportet, donec febris solvatur. Si vero vinum
 fuerit, etiam lavetur. Si vero debilis fuerit, potentiam bibendum dato. Et si imbe-
 cillior sit, ex aqua frigida. Cibum autem exhibeto levem, qui non evacuet, u- 420
 bi calor remiserit. Morbus hic acutus est, et lethalis. * Si inflammata fuerint
 puerperæ uteri, venter ardet, et magnus fit, et ad præcordia suffocatio habet.
 Quam sic habuerit, muscum marinum, quem super pisces injungunt, pro cataplas-
 mate adhibeto. Verum in mortario misceto, ac tundito, etiam hordeaceam fari-
 nam, et cinerem farinaceum, et lini semen tostum, et hac oleo, et aceto su- 425
 birigito, et velut cyceonem crassum facito, deinde coquito, donec velut farinam sub-
 actæ massa fiat, atque ita quamcunque illam imponito, et si opus fuerit, etiam misce
 facito. * Si puerperæ inflammata fuerint uteri, intumescunt, et ubi puerperæ
 purgamenta intus manserint, oculis discendunt, discendunt autem, ubi
 condensati fuerint a frigore. His, si quidem perspicerentur, catelacere conducit. Si 430
 vero inflammata fuerint, et frigas discernerit, medicamentum subditiuum facere,
 quod inflammationi adversatur, et simul lavare, ac fovere, et pharmacum adhibe-
 re, quæ ego describam, et vaporem in os, ac nares attrahere. Si vero suffocent,
 lentes in aceto, et sale, et organo multo coquere, et attractionem facere. Et mer-
 curialem edat, et in succo eius tenuem farinam sorbeat, et quamcunque, ac prius 435
 quam dolor corripiat, pharmaca dato, quæ uterinum dolores sedant, et cibos
 per alium sedentes assumat, et si venter sit inflammatus, elysiere adhibito quam-
 crassissime subluant. * Si uteri pituita fuerint impleri, statim in utero sunt, et
 menses procedunt pauciores, albi, pituitosi. Quandoque etiam sanguis tenuis, sin-
 cerus, pelliculis plenus. Quibusdam etiam conturbatur, et ter in mense com- 440
 pareret, et præ humiditate cum viro commisceri non vult, neque ibidine ad hoc fa-
 ciendum concutatur, et genus sit. Dolor autem intum ventrem, et lumbos, et in-
 guinas, et si mordet, quod effluit, et exulceret osculi uteri circumferentiam sum-
 mam, fluxionem diuturnam fore prognosato. Et si non multa fuerit fluxio, len-
 ticula decoctum cum veratro exhibeto ad vomendum. Deinde in nares intus- 445
 ducito, et pharmacum decorsum purgans bibendum dato. A tibus autem acerbis
 prohibeatur. Si vero gravetur, et frigeat, et torpido habeat, lac præbeo, et vi-
 num odoratum. Bibat autem jejuna hypericum, apii semen, salivam in vino odo-
 rato aquoso, et uteros medicamento ex vini fece colluat, et si ulcerati fuerint, in-
 terpositis diebus duobus, aut tribus, pharmaco ex grano enidio chaz, et postea 450
 cum acerbis lavet, myrti, ac lauri decocto, et medicamento ex flore argenti il-
 liquat. Morbus autem est gravis, et periculosus. * Si vero acerbata pituita ple-
 na fuerint, menses sunt pauciores, et si in ventre habuerit, corrumpit, ubi fortis
 fortior factus fuerit. Non enim corroboratur, sed desuit. Cognovetis autem
 hinc. Humida fit, et quod desuit mucosum, et viscosum, velut a ventre defecit, 455
 et non mordet, et in mensibus, postquam sanguine purgati deserit, per duos, aut
 tres dies muci ex utero prodeunt, et horror tenet, et calor non acuit, verum non
 deficit. Hanc succo grossorum colluto, a quibus omnis aqua purgatur, et hac
 acetum atque iterum. Postquam autem purgata fuerit, de cætero acerbis utatur.
 Apponet autem mollia, a quibus pituita purgatur, et foveat uteros medicamen- 460
 to ex lauro, et colluat pharmaco ex aceto, et aronatis suffrium faciat, postquam
 menses cessaverint, postea vero a cibis, et balneis abstinere oportet. Coeat autem
 cum vi-

cum viro, & cibis, ac vinum parce sumat, & calide degat, & segmenta cruribus circumdet, & oleo ulinat.

SECTIO III.

- 1 * **S**I aqua intercus in uteris nascatur, menses pauciores, & pravi sunt, & 85
 ante tempus deficient, & imus venter intumescit, & mammae solidae, molles sunt, & lac malum. Et putas se in ventre habere, & ex his cognoscere, quod aqua intercus est. Sed & in uterorum osculo significationem de se præbet.
- 5 Ad tactum enim graciles, & humidum apparet, & rigor, ac febris corripit. Quanto vero magis tempus processerit, tanto magis dolor habet immum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, ac inguina. Hic morbus ex abortu fit. Sed & ex aliis causis, & quin menses fuerint occultati. Hanc multa calida lavate oportet, & tepidatoria adhibere, si dolor habuerit. Postquam autem sedatus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & uteris medicamento ex bubulo stercore fovere. Deinde id, quod ex cantharide paratur, apponere, & biduum, aut triduum intermittere. Et si robur affuerit, netopos colligere, & si venter mollis fiat, & febres cessent, & menses secundum rationem prodiant, cum viro dormiat, & in medicamentis subditiis perseveret, & interposita die erethmi corticem bibas, & prœniz grana iugis quinque, & sambuci fructum in vino jejunia. Et mercurialem quamplurimam edat, & allium crudum, ac coctum, & mollibus ad somnum utatur, & multa portione, & aliis mollibus, & obsonis marinis, potius quam carnibus, & si pepererit, sana evadit. * Si hydrops in utero fiat, menses pauciores sunt, ac deteriores, & per longius tempus, & pauciores, quam oportet, aut paulo plures, & venter intumescit, & locus supra pectinem, & umbilicem, & lumbi. Ubi vero multum temporis processerit, & in ventre habuerit, corruptum, ac ejicit, & aqua cum ipso foetu effunditur, & mulier plerumque moritur. Sangui autem corrumpitur, & aquosus redditur. Huic lac bibendum dato, & pelium album potandum, donec foetus moveri poterit. Quin & ante hoc ut plurimum foetus corrumpitur, & per abortum ejicitur, & uteri sanguine, & aqua manant. Hæc autem patitur nihil magis ex labore, quam aliter. Cognoscere vero poteris, quod hydrops est, ex digiti tactu. Deprehendes enim osculum ipsorum gracile, & plenum humiditate. Si vero foetus in ipsa non circa inita, sed iam bimeltris corrumpitur, ac suffocatur, tunc & venter imus intumescit, & ad contactum dolet, velut ulcere præsentem, & febris magna ipsam, ac dentium fremitus corripit, & dolor acutus, & vehemens gaudenda, & imus ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, & coxas. Quum sic habuerit, calida ipsam lavato, & si dolor habuerit, tepidatoria adhibere, experimento facto de eo, quod maxime admittat, & pharmacum deorsum purgans bibendum dato. Intermissione vero facta per tempus, quantum tibi satis esse videbitur, & colluio, & foveo, et cyclaminum melle subactum, ac linteum exceptum, ad os uterorum apponito. Et cupressi ramenta in aqua madefacta, eodem modo apponito. Verum hæc breviori tempore, et per longius temporis intervallum, quanto magis mordent, et lancinant. Et specillum stanneum paratum immittito, et digitum eodem modo. Portiones quoque bibendas dato, quasvisque maxime libenter admisit, et cum viro dormiat, maxime opportuna tempore præsentem. Si enim gesturam conceperit, et prægnans facta fuerit, ac pepererit, subpurgantur, et ea, quæ prius in ipsa fuerunt, una cum ipsi puerperii prægnantis libenter. Aliqua sic maxime sana fieri poterit. * Si mulier aqua intercu- 87
 laborari, splene ipsius magno, et aquoso existente. Et autem splen aquosus ab hac affectione, quum febris habuerit, et non dimiserit hominem, ex his ipsius corripuerit foetus, et biberit, ac non revomuerit. Nam quod in vesicam penetrat, per urinam ejicitur. Reliquum vero splen capit, abstrahens a ventre ad se ipsum, ut qui tatus est, et spongiformis, et secundum ventrem situs. Et si his sic habentibus non exudarit, neque alvus laxetur, ab hoc splen attollatur, et hoc magis, si aqua fuerit potus, et si quis ipsam contingat, mollis est, velut mollissima pluma, sive lava: quandoque vero citius renititur. Elevatus autem, et impletus, distribuit per venas corpori, et maxime in omentum, et locos circa ventrem, et crura. Altera enim pars ad alteram delegat in corpore, ubi singulis plus, quam oportet, affluerit, et continere non poterit. Succedit autem ex hoc semper hydrops, ubi splen ad se ipsum trahente continuere, quum natura tarus sit, ac mollis. Quibusdam vero hoc morbi principium fit sine febre, si calor quidam in ventre constitit, velut pituita in ipsam collapsa, et si homo sitim non continuerit, neque vesica, neque venter, urinam, et sterqus nullo modo excollarint, neque commodam dietam homo utatur. Si vero hydropica fuerit, prodeunt menses multi deterpente, quandoque vero pauci. Et sunt aliquando velut aqua a caribus, sicut si quis cruentas carnes abluisset; aliquando vero paulo spissiores, et non congelantur, et anhelatio ipsam corripit, priusquam menses prodeunt, et dolor in splene, et magis si quid dulce ediderit, et venter attollitur, ac magnus sit. Et ubi plura, quam solita est, ediderit, dolet ventrem, et lumbos alina- 89
 aque

neque alias dolor vexat, & febris ipsam paulatim corripit. Postquam autem depurgata fuerit, melius sibi habere videtur superiorum respectu; postea ad idem relabitur, 65
& si curetur, velut convenit, sana evadet; sin minus, & fluxus compareret, & per omne tempus semper fluere paulatim velut serosa sanies, & ampliore curatione opus haberet. * Si vero fluxus non succedat, sed uteri a prioribus menses non laxarint, tunc & venter ipsi magnus erit, & gravitas intus erit, velut in ventre habenti, & velut puer in ventre ipsius moveri videbitur, nimirum dum uteri a 70
qua pleni sunt, & aqua movetur. Alias enim atque alias fluctuat in ipsis aqua velut in utero, & pars infra umbilicum ad contactum dolet, & claviculae, & thorax, & facies, & oculi attenuantur, & mammae attolluntur. Quibusdam vero & venter, & crura aqua implentur. Quibusdam autem alterum horum, & si quidem ambo impleta fuerint, nulla spes est de hominis vita. * Si vero etiam al- 75
terum horum, modica spes est, si curetur, & non valde fuerit attenuata. Diuturnus est autem hic morbus. Et sunt omnia magis his, quae non pepererunt, si-
cut autem saepe his, qui pepererunt. Periculosa vero sunt, velut dictum est, & pleniusque acuta, & magna, & intellectu difficilia, eo quod mulieres participant morbis, & aliquando neque ipsae sciunt, quod aegrotant, priusquam morbos experian- 80
tur a mensibus, & seniores factae fuerint. Tunc autem & necessitas, & tempus ipsas morborum causam docet, & quandoque non cognoscentibus, ex quo morbo aegrotent, morbi incurabiles sunt, antequam doceatur recte medici-
catis ab aegrotante, ex quo morbo aegrotet. Veretur enim narrare, etiam si sci-
ant, & praeter imperitia, ac ignorantia, turpe sibi id esse putant. Sed & medici si 85
nimis peccant non exacte causam morbi percunctantes, sed velut viriles mor-
bos sanantes, & multas novi jam huiusmodi affectionibus corruptas. Qua-
re statim causam exacte interrogare oportet. Multum enim differt muliebris
88 morborum, ac virilium curatio. * Si uteri fuerint ulcerati, sanguis, & pus
purgatur, & foetor gravis oboritur, & dolor acutus corripit lumbos, & ingui- 90
na, & intumescunt, & dolor sursum procedit ad laterum mollitudinem, & ad
costas, & ad scapulas. Aliquando etiam ad claviculas pervenit, & mordetur,
& caput vehementer dolet, & delirat. Progressu vero temporis tota intume-
scit, & debilitas ipsam corripit, & animi deliquium, & febris tenuis, & perfrige-
ratio. Intumescunt autem maxime crura. Morbus autem corripit ex abortu, 95
si qua corruptio, ac putrefactio intus puero non fuerit expurgata, & calor totum
corpus tenet. Corripit etiam ex fluxibus, & si in ipsis acrima fuerint, & biliola mor-
deant. Si in hoc modo habentem iucideris, ubi quidem dolores habuerint, mul-
ta calida lavato, & tepesfactoria adhibito, qua parte fuerit dolor, & si quidem su-
perne fuerint dolores, & mulier fortis est, totam fomentato, & pharmacum deor-
sum purgans bibendum dato, & ubi tempus anni fuerit, serum coctum insuper 100
bibendum praebito per dies quinque, si id facere poterit. Si vero non fuerit serum,
fac aluminis coquito, & per dies tres, aut quatuor bibendum dato. Post lactis au-
tem potum, cum aquis ipsam rescito, & cum cibis commodis, carnibus ovillis
teneris recentibus, & volucribus, & betis, & cucurbita. Abstineat autem a salis, 105
& acris, & marinis omnibus. Et a carnibus porcinis, & bubulis, ac caprinis.
Edat autem panes. Si vero animi deliquia teneant, & non valida sit, & perfrige-
retur, sorbitionem accipiat. Sunt autem quidam, qui his caput dolentibus, lac bi-
bendum praebent, quia caput dolent. Alii aquam, quia animo linquantur. Ego
vero vice versa, si caput dolent, & mente percellantur, aquam commodam puro, 110
Quum autem mordentur, & acrima sunt, quae pungunt, lac his lenitatem inducit.
Ubi vero tibi valida esse videbitur, uteros colluito primum medicamento ex vini
sece, postea interpositis diebus tribus, aut quatuor, eo quod cum brassica deco-
cto tepido paratur. Et rursus intermissis diebus tribus, eo quod cum bueyro pa-
ratur, eluitur. Et si ubi haec feceris, sanescant uteri, eo quod cum malicorio pa- 115
ratur, colluito. Super ulcera vero argenti florem, & gallam, & myrrham, & thus,
& spinæ Aegyptiae fructum, & cenanthem sylvestrem, & chrysocolam, & squa-
mam aris, & loti ramenta, & crocum, & alumen Aegyptium combustum illini-
to. Horum singulorum una aequalis sit portio. Alumen vero, & gallam, & cro-
cum, una omnium portione sumito. Haec omnia trita, & permixta in vino albo 120
dulci diluito, deinde coquito, donec mellis crassitudo fiat, & dato, ut cum hoc phar-
maco bis in die ulcera inungat, ubi aqua tepida prius lavit. Coquantur autem in
aqua, & hederæ, & salvia. Et ubi tibi haec facienti melius habere visa fuerit, lac ca-
peinum coctum praebendum una die dato. Postea vero lac bubulum praebito eo-
dem modo velut in prioribus, post lactis autem potum, per cibos quammaxime cras- 125
sescitatio, & ut in ventre habeat, facito. Sana enim fiet. Plerumque vero ex hoc mor-
bo evadunt, & steriles fiunt. Senioribus autem non valde quid horum accidit, post-
ea vero bibenda sunt pharmaca, lini semen torrefactum, & sesamum, & urticae se-
men, & praeonia radix amara, hae in vino nigro odorato trita bibat. * Si ute-
ri ulcerati fuerint, & sanguis, & pus, & serosa sanies fluat, putrescentibus enim 130
uteris, morbus ab ipsis fit, & venter intus elevatur, & attingitur, & ad conta-
ctum dolet, velut ulcere praesente. Et febris, ac fremitus ipsam occupat, & dolor
acutus,

- acutus, ac vehemens invadit pendenda, & pubem, & anum ventrem, & latera
mollitudinem, & lumbos. Morbus autem maxime corripit ex partu, si quid
135 in ipsis divisum computruerit. Itemque ex abortu, & alias sua sponte. In his si in-
cideris, aqua multa calida lavato, & qua parte dolor habuerit, tepidifactoria adhibe-
to, & spongiam ex aqua calida expressam, & colluto acerbis, & acerbis vitatis, mol-
lioribus vero ammixtis, prout tibi tempestivum esse videbitur, & lini semen, ac sambu-
140 cium fructum tundito, & ammixto melle pharmacum facito, atque bocutoris, calida
vero aqua lavato. Et acceptam spongiam, aut mollem lanam in aqua calida tingito, &
pudenda, ac ulcera expurgato. Deinde in vino meraco rursus spongiam, aut la-
nam tingens, eodem modo utere. Et postea pharmaco hoc iunge, quoties tibi
tempestivum esse visum fuerit. Postea resina, & adipe suillo mixtis simul illi-
145 to saepe interdii, ac noctu; postea vero lini semen torreto, tundito, ac cribrato, &
peplum album in polenta tundito, ac cribrato, & caseum caprinum affrato, & fore-
des, ac falinginem deradito, & pinguitudinem ejus, & polentae pollinem ammi-
sceto. Sit autem una pharmaci mensura, & casei, & polentae. Hac bibenda dato
mane jejunae in vino austero diluto. Ad vesperam autem misceto, & crassum
eyceonem praebeto, & quicquid muliercula maxime libenter admisit, biben-
150 dum dato. Et donec quidem sanguis multus fluxerit, & dolores acuti habue-
rint, & modico tempore intermiserint, hac facito. Postquam autem ulcus minus
fuerit, & dolores debiles apprehenderint, & per longius tempus pharmaca biben-
da dato, a quibus purgetur deorsum magis quam sursum, & intermisso tempo-
re, quantum opportunum esse visum fuerit, lenibus fomentis soveto, muliere in al-
155 ro collocata, prout tempestivum esse videbitur. Hac si fecerit, sana evadet. Mor-
bus autem est lenior, & lethalis, & paucae ipsius effugiant. * Si vero vehementer
exulcerati fuerint, sanguis, & pus purgatur, & odor sit gravis. Et quum dolor ap-
prehenderit, velut a partus dolore sunt ea, quae circa fluxum contingere solent. Et
quum tempus affuerit, erura, & pedes intumescunt. Et curant medici hunc mor-
160 bum velut hydropem, verum hic talis non est. Hanc si curandam acceperis, pri-
mam calida lavato, & calefacto. Et acerbis, ac molibus, & acerbis, & aqua, & vi-
no colluto. Et polycarpon, & polycnemum, ac mel simul coquito, deinde lanam
in his tingito, & pudenda illinito. Et resinam, ac mel, & pinguedinem suillam
illinito. Et bibendum dato semen lini, ac scsamum torrefactum, & butyrum, &
165 caseum caprinum, & polentam in omnibus. Bibat autem in vino jejunae. Ad ve-
esperam vero plurimum mellis affundito. Et donec quidem sanguis purgetur,
& dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint, hoc facito: Quum
autem ipsi minus prodierit, & dolores debiliores per longius tempus tenuerint,
pharmacum deorsum purgans bibendum dato, ac lipito. Hac si fecerit, sana eva-
170 det. Sobolis autem spes non adest. * Quaecumque ulcerationes in utero sunt
ex abortu, aut alia quadam causa, eas omnes respectu ad totum corpus facto cu-
rare oportet, quaecumque curatione opus habere visa fuerint, siue ex universo cor-
pore hominem curandam esse putaveris, siue ex ipsis uteris. Cognoscet autem,
an ab ipsis uteris sit, hoc modo: Quae enim ulcerationes ab ipsis uteris sunt,
175 purgationem exhibent purulentam, & compactam; quae vero non ab ipsis, re-
nuem, & saniosam. Quum igitur tenues sint fluxiones, eum pharmaco eas cura-
re oportet, & dare, quod & sursum, & deorsum purget. Primum autem sursum.
Et si quidem post pharmaci potionem fluxiones pauciores sunt, ac faciliores,
intermissione facta, rursus eodem modo medicari oportet. Post pharmaci vero
180 potionem talem victum praescribo, ex quo homo ipsa quamlibetissima fiat.
Id autem continget, si toti ipsius corpori per tertiam, aut quartam diem fomen-
tum adhiberis, & a fomentis statim vomitus seceris. Post vomitus autem, &
fomenta, dietam constituito ex illivie, et aquae potu, et panis cibo, nullo ve-
ro obsonio, quam vino nigro meraco. Nullo item olera. Quum vero vomitus
185 praeparas, multus, et acerbis oleribus opus habes, quibus ipsam impleas, mul-
tus etiam cibus, et obsonio quodcumque voluerit. Et ut impleas ipsam multo vino
aqualo, et ut a fomentis ipsam lavas multa calida. Atque hae quidem curatio est
huiusmodi fluxionum. Melius tamen est, ut utraque pharmacis cures, et vomitu-
m procures, et sursum trahas. Dieta vero siccatoria melior est, et illivies. Car-
190 terum uteros hoc modo curare oportet; primum quidem fovere sambuci foliis
in aqua coctis. Deinde post fomentum smegmate ex vini fece colluere. Et si qui-
dem putredo in ulceribus fuerit, et quae excuat graveolentia, smegmate meracio-
re. Si vero nihil tale, aquosiore, post fecem autem cum aqua, in qua cocta
est myrtus, et salvia. Postea vero cum vino colluere meraco, albo, rapido. Quum
195 autem mordetur jam a collutionibus, tunc jam pura sint ulcera, colluere igitur
oportet fece aquosiore, et vino nigro, post vinum vero adipem suillum recentem
liquaro, et pinguedinem anseris si affuerit, sin minus, aliam, maxime gallinace-
am, aut ex volucrum gente. Si vero neque haec adsit, oleum vetus ex olivis ammi-
200 sceto, atque hoc tepido colluto post vinum, per alium clysterem in os uteri infuso.
Et si fuerit ulceratius, linamenta ex mollioribus facta, apponito. Et si haec subdita ar-
dorem induxerint, his adeptis mulierem aqua tepida lavari iubeto, tali quali
collueba-

colluebatur. Si vero ad hanc diartam fluxiones non discedant, pauciores tamen
fiant, & vehementer mordeant, & ea, quæ effluunt, bilis fuerint, ac fallugo, & non
solum internas partes, sed etiam externas exulcerent, diartam transmutare opor-
tet, & totam humectare, quo fluxiones quamquamissimæ fiant, & minime morda-
ces, balneis multis calidis, maza, oleribus coctis omnibus pinguibus, piscibus
cartilagineis, cum cepis, & coriandro, in murie dulci coctis: coquantur autem pin-
gui modo: carnisbus coctis omnibus, excepta bubula, & caprina. His enim perco-
ctis cum anetho, & fœniculo, vino mellei coloris, fulvo, aquoso, uberiore lactis
potu cum vino dulci. Reliqua vero de collusionibus iuxta relaxatum modum fac-
ro. Atque hæc quidem est cussimodi fluxionum curatio. Quum vero purulenta, & com-
pacta exierint, harum quidem totum corpus non movere oportet. Verum collue-
re, & per collusiones totam curationem facere. Colluere autem oportet cum isdem
infusis, quæ prius dicta sunt, eodem modo. Conseribuntur tamen etiam alie collu-
siones. Uterum curatio. Cervinum adipem recentem, ac viridem subito, 210
Omnia vero statim vino stræo, sive sapa colluere oportet. Optimum autem est ceru-
sa, si ulcera fuerint, & oleo narcissino. Cibis autem mollissimis utatur, & non acri-
bus. Si vero sordida fuerint, & proserpant, ac proximum locum mordeant, purga-
to, & novam carnem productio, & carnem ad cicatricem perducito, facile enim re-
solvuntur, & maligna fiunt, & frequenter lavato. * Si vero mulier ex abortu vulnus
accipiat, aut ex medicamentis subdititis uteros exulceretur, qualia multa sem-
per mulieres faciunt, ac medicando excitant; & fœtus corruptus fuerit, & mulier
non purgetur, sed uteri inflammationi fuerint vehementer, ac conclusi, & purga-
tionem emittere non poterint, nisi primum emittant sanguinem, qui est in fœtu. Hæc
si quidem curetur, brevi sana evadet, verum sterilis. Si vero puerperii purgamen-
ta ipsi sua sponte eruperint, & ulcera sanata fuerint, etiam sic sterilis erit. Si vero
purgatio quidem ipsi fiat, ulcera autem non purgentur, periculum est ea putredino-
sa esse. Si vero purgatio prodierit ipsi jam afflicta, ac extenuata, moritur. Quin
& si in partu uteri valde fuerint exulcerati, fœtu non secundum naturam exeun-
te, eadem patientur, quæ patitur ea, quæ ex corruptione fœtus uteros ulceratos
habet. Et transmutationes, ac fines eisdem morbus habet, sive ex fœtus corruptio-
ne, sive ex partu uteri fuerint ulcerati, & si puerperii purgamenta omnia prodie-
rint, minus dolebit, nisi magna ulcera fuerint. Et si curetur, brevi sanescit.
Oportet autem curam cito adhibere, si ulcera in utero fuerint. Nam ut quæ in tene-
ro loco sunt, cito augescunt, & brevi putrescunt. Curare vero oportet ulcera, 235
velut etiam ea, quæ in reliquo corpore sunt. Nimirum ut inflammationem arce-
as, & repurges, & repleas, & ad cicatricem perducas. Danda est autem aqua in
potum, vinum minime, cibos item paucos, ac minime multos exhibeto. * Quicum-
que abortus facti discedere non possunt, dum aut toti, aut partes fœtuum sunt
maiores, aut minores, & obliqui, ac impotentes, tales si quidem secundum natu-
ram sui fuerint, pharmaco aliquo dato ex his, quæ ego referam, expellito, ubi mul-
ta calida prælaveris. Et si prodire volentes, non facile exeant, quum sit sint secun-
dum naturam, talibus sternutatorum admoveto. Apprehendito autem nasum,
& os comprimito, ac sic sternutet, quo sternutatio quammaxime efficax sit. Utatur
item concussionibus. Sic autem concussionem facito. Lectum alium robustum, ac
instratum summo, & mulierem supinam reclinato; pectus vero, & axillas, ac manus
fascia, aut molli lato loro ad lectum alligato, ac cingito, & crura incurvato, & mal-
leolis apprehensam detineto. Quum autem sic disposueris, fœmentorum mol-
lium fascem, aut aliquid huic simile parato, tantum quantum sufficit, ut lectum
non negligat excipiendo ipsum, dum in terram projicitur, quo non pedibus iux-
ta caput terram contingat. Postea vero ipsam manibus lectum apprehendere
jubeto, & lectum ad caput sublimem habere, ut declivis sit in pedes, animadver-
sione habita, ne pronua sit homo ipsa. Ubi vero hæc facta fuerint, & lectus subli-
mis fuerit, recto fœrmenta supponito, maxime autem dirigito, quo pedes terram
non contingant, dum lectus projicitur, & ut sint intra fœrmenta. Elevent autem
duo viri ex utroque pede hinc atque illinc, quo in directum lectus cadat plane, ac
æqualiter, & convulsio ne fiat. Concutiendum est autem maxime una cum par-
tus dolore. Et si quidem discedant, statim quiescendum, sin minus, interstitio
facto rursus concutito, & in lecto gestatam attollito, ac agitato. Atque hæc qui-
dem sic faciendi sunt, ubi recte, & secundum naturam discedant. Oportet autem
cerato liquido præillinare, quod in omnibus huiusmodi circa uterum affectioni-
bus optimum est, & malvæ aquam affundere, & scenigræci, aut potius præla-
næ triticeæ succum. Oportet autem usque ad inguina, sedem, & pudendum fove-
re, & infundere, ubi parvus dolor maxime infestant, & nihil aliud mente verfare,
eam vero, quæ medicatur, oscula mollibus aperire oportet, & leniter hoc face-
re. Umbilicum vero una cum fœtu attrahere. * Quicumque vero duplicati
complicantur, & in osculo uterorum incumbunt, eos, sive vivi fuerint, sive mor-
tui, rursus retro protrusos vertere oportet, quo secundum naturam in caput exe-
ant. Quum autem retrudere voles, aut vertere, supina ipsi reclinatz molle quid-
dam sub coxas substernere oportet, & sub lecti pedes, quo altiores sint hi a pe-
dibus,

- dibus, semper aliquid supponere. Sed & coxæ altiores capite sint, & ut nullum
 cervical sub capite sit, provideto. Quum vero retrusus fuerit foetus, & tunc
 atque illinc obvolvitur, ut secundum naturam constituantur, & quicquid sub le-
 gi pedes supposuisti, ac lapides, & quicquid sub coxas subdidisti, subtrahito.
 275 Capiti vero pulvinar subdito. Arque talia hoc modo curato. * Quicumque
 vero foetus vivi nianum, aut crus foras præmittunt, aut etiam ambo, eas oportet
 quamcelerrime, ubi exitum significarint, prædicto modo intra retrudere, &
 in caput vertere, & ad viam reducere. Et quicumque foetus complicantur, ad late-
 res mollitudinem, aut coxam in partu collapsi, eos dirigere, ac vertere oportet,
 280 & in aquam calidam desidere facere, donec mulier resocilletur. * Quicumque vero
 foetus mortui aut crus, aut manum foras protendant, eos optimum quidem
 fuerit, si id fieri possit, intro retrudere, & ambas has partes in caput vertere. Si
 vero hoc fieri non poterit, verum intumescit, secare hoc modo. Dissectum per
 285 scalpellum caput cum contusorio instrumento, ut ne in ramenta findatur, en-
 rundito, & ossa per osium vossellam, aut tractorium instrumentum iuxta clavicu-
 lam immisum, prout habuerint, extrahito, non multis simul, sed paulatim ex-
 emptis, ac rursus ablatis. Quum vero hæc foras extraxeris, & in ipsis humeris
 fueris, ambas manus in artibus cum ipsis humeris secato. Et ubi hæc extraxe-
 ris, si quidem fieri poterit, ut exeant, etiam reliqua facile extrahito. Si vero non
 290 obediant, totum pectus usque ad jugulum findito. Verum caveto, ne in ventrem
 feces, & aliquid de intestino denudes. Exit enim venter, & intestina, & stercus.
 Si vero horum quid excidat, majoris negotii jam res sit. Contundito autem co-
 stas, & scapulas contrahito. Et facile postea reliquum foetus procedet, nisi jam
 ventrem tumidum habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est ventrem foetus
 295 leviter perforare. Flatus enim solui a ventre exit, & sic facie prodibit. Si vero
 exciderit manus, aut crus, immortui foetus, si quidem fieri poterit, ambas par-
 tes retrudito, & foetum rite dirigit. Hoc enim optimum fuerit. Si vero fieri non
 poterit, ut hoc facias, quicquid sane foris fuerit, quantum potes penitissime re-
 secato, & reliquum profunditate intus explorata protrudito, & foetum in caput
 300 vertito. Quum autem vertere, ac secare puerum, voles, ungues de manibus tuis re-
 secato. Scalpellum vero, quo dissecas, incurvum potius sit, quam rectum, & huius ea-
 put occultato per indicem digitum, eodemque interna explorato, ac deducito, ita ut
 caveas, ne uterum contingas. * Caterum molæ conceptus hæc causa est. Quum
 305 multi menses modicum, & morbosum semen conceperint, neque conceptus re-
 ctus sit, & venter plenus est velut pregnantis. Nihil autem in ventre movetur,
 neque lac in mammis generatur. Mammæ autem turgide sunt. Hæc igitur ad duos
 annos, sæpe etiam tres sic habet, & si quidem una caro fiat, mulier perit. Ne-
 que enim fieri potest, ut superstes maneat. Si vero plures, erumpit ipsi per pudendum
 sanguis carnosus plurimus, & si hoc moderate fiat, servatur. Sin minus, a fluxu
 310 correpta perit, & morbus quidem talis est. Judicare vero oportet ex plenitudi-
 nis mole, & quod in ventre non movetur. Nam menses trimestris, scemina qua-
 drimestris motum habet. Postquam igitur tempore hoc prætergresso, non move-
 tur, nimirum hic morbus est, est autem hoc magnum signum, quod lac in mam-
 mis non generatur. Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut certe cum præ-
 315 dictione. Et primum quidem totum corpus foveto. Deinde per sedem chysterem
 adhibeto, quo sanguis multus erumpat. Fortassis enim quod compactum est, com-
 moveris, id quod foetus esse putatur, muliere a pharmaco concallescet. Sed &
 uteros colluto, quo sanguinem educaas. Sin ininus, subdititis utatur fortissimis
 e buprestis. Et dictamnium creticum in vino bibas; sin minus, castoris testem. Et
 320 retro cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito, & plurimum sanguinem
 detrahit. Atque hoc maxime, rerum, ac virium ipsarum conjectura facta, facito. Et
 hæcenus quidem dictum est de morbis a puerperii purgamentis fieribus. Sunt
 autem pericula in ipsis non parva. Acuti enim sunt, & cito transmutantur, & ma-
 gis affliguntur primiparæ, quam quæ sint partum expertæ. * Prodeunt autem puer-
 325 perii purgamenta sanæ mulieri sufficienter, primum tesquihemina mensura, aut pau-
 lo plura. Postea adhuc pauciora juxta hanc rationem, donec cessent. Prodeunt au-
 tem velut sanguis a victima, si sana, velut dixi, mulier fuerit, & sana futura est, &
 cito congelantur, ac purgantur, & post partum plerumque sanæ mulieri contingit,
 ut post puellæ partum in quadraginta duobus diebus diuturnissima purgatio
 330 fiat. Extra periculum autem est, etiam si viginquingue diebus purgetur. Post mas-
 culi vero partum purgatio diuturnior sit in triginta diebus, extra periculum est et-
 tiam, quæ in viginque diebus contingit, & in his, quæ scetus corruperunt, secun-
 dum horum dierum rationem purgatio contingit, & in junioribus, quæ corrupe-
 runt, paucioribus diebus. In senioribus autem, pluribus. Eadem vero sunt affectio-
 nes ex puerperii purgamentis & ei, quæ corrupe scetum, & ei, quæ peperit,
 335 si menstruum corrupe scetum & quæ corruperunt, magis periclitantur. Cor-
 ruptiones enim graviore sunt, quam partus. Non enim fieri potest, ut citra violentiam
 foetus corruampatur; aut pharmaco, aut potu, aut cibo, aut subdititis medica-
 mentis, aut aliqua alia re. Violentia vero malum est. In hujusmodi enim peri-
 culum

culum est, ne uteri exulcerentur, aut inflammetur. Hoc autem est periculosum. 340
 99 * At vero lac quomodo fiat, dictum est a nos in natura pueri in partu. Postquam autem pragnans fuerit mulier, menses non valde prodeunt, praequam quibusdam pauci. Dulcissimus enim humor ex cibis, ac potibus ad mammas vestitur, ac exsurgit. Et necesse est etiam reliquum corpus magis evacuari, & minus sanguine plenum fieri. Asque hoc ita contrahit. Sunt autem, quae natura sine lacte sunt, 345
 & quibus lac deficit ante tempus. Hae vero natura solidae sunt, & densae carnis, & propterea sufficiens humor non penetrat a ventre in mammas, quum via sit densa. 350
 100 * Ad menses detrahendos. Elaterii portiones duas sumito, & adipem ovillum de rhenibus pari elaterii portione ammisceto, & non conterito, verum duas glandulas subdititias facito. Aut melancholum ex tritico terito, & aqua subigito, & duas glandulas formato, atque has ante dies, quibus affuturi sunt, apponito. Si enim non prodeunt, rigores, ac febres inducunt. Mollitoria, & quibus aqua, & arena purgatur, ducunt etiam menses, si non fuerint diuturni, & oleolum emolliunt. Narcissum, myrrham, cuminum, thus, absinthium, cyperum, singula aequalibus portionibus sumito, narcissi vero solum quatuor portiones, & 355
 pulvillum super, dum pectinatur, studium linum ammisceto, & haec cum aqua origani cocti terito, ac glandem formato, & subdito. Aut cyclaminum magnitudine tali, & aris florem magnitudine fabae terito, & cum melle glandem formato, ac apponito. Aut pulegium, myrrham, thus, sel suus, ac bovis cum inelle subigito, & glandem efformato. Si menses non prodeant, adipem aniseris, 360
 & nepotum, ac resinam permixta, ac lana excepta apponito. Medicamentum subdititium, purgatorium, mollitorium, Caricam percoctam, ac expellam levissime terito, & in lana subdito cum rosaceo unguento. Aut acris brassicae, & rursus, utriusque dimidium terito, ac uritor eodem modo. Purgatorium. Medullam aniseris, aut cervi magnitudine fabae assulo unguento rosaceo, & lacte muliebri terito, velut pharmacum teri solet, & cum hoc os uteri illinito. Aliud subdititium molle. Medullam aniseris magnitudine nucis, ceram magnitudine fabae, resinae lentiscinae, aut cerebinthinae magnitudinem fabae. Haec cum rosaceo unguento ad lentum ignem liquefacito, & velut ceratum efficito, deinde ex hoc tepido os uteri illinito, & pectinem irrigato. Aliud purgatorium. Farinam recentem, myrrhae obol. iij. croci tantundem, castorei obolum, haec trita cum unguento irino apporiat. Aut urticae semen, & malvae succum, ac aniseris adipem simul permixta subdat. Aliud subdititium purgatorium, si menses non compareant. Syracem, & origanum terito, & permixtis adipem aniserinum affundito, ac apponito. Aliud, quod uteros expurgat, ac sanguinem evacuat. Absinthii radicem tritam, melle, ac adipe aniserino ammixtis, apponito. Aliud purgatorium. De buprestis caput & pedes, & alas tollito, & reliquum ipsius terito, ac sicut internam partem ammisceto. Si autem pinguitudinis sicut portio dupla. Hoc uteros inflat. Hoc etiam desperatis optimum est. Aut mercurialis folia trita subdito. Hoc tenuem biliosum purgationem ducit. Sed & artemisia facit velut mercurialis, & melius purgat. Veratrum quoque nigrum cum aqua tritum, velut aquam a carnibus ducit. Sed & alumen, ac resina idem facit. Cyperum, absinthium, anisothochium, cuminum, salem, mel. Haec omnia simul terito, ac apponito. Et veratrum cum vino dulci, & farina locii, ac tritici, melle subacta in lana subdatur. Subdititia, si cataportia non purgarint. Mercurialem, myrrham, vinam albam, cepam acerrimam, & melancholum, ac mentam, si suserat, permixta apponito. Subdititia acra sanguinem ducentia. Cantharidas quinque dempsis pedibus, ac capitibus, & myrrham, ac thus simul miscro, & mel addito. Deinde in oleum rosaceum, aut Aegyptium cinzum per diem subdat, & ubi mordet, tollat, & rursus in lac muliebre, ac unguentum Aegyptium tingat, & hoc per noctem apponat, & aqua odorata perluat, & adipem subdat. Conducent & buprestis, si quidem parva fuerit, sine alis, & pedibus, ac capite. Si vero magna fuerit, non commisceto eadem, quae cantharidibus, sed solum sumito, ac similiter apponito. Si vero molliore opus habuerit, ad buprestis vinum, & cuminum Aethiopicum ammisceto, uvam item passam, & pollinem felis, ac anisi, & vinum servelacito, eoque assulo reliqua, & pastillos drachmales efformato, eosque apponito, myrrha, ac thiure ammixtis. Facito autem eodem modo velut cum cantharidibus. Aut melancholum ex tritico, tritum, ac melle subactum apponito. Aut hoc ipsum melancholum cum melle tritum velut glandem efficito, circum pennam autem obducito. Subdititium efficax. Succum mandragorae, & cucurbitae sylvestris cum lacte muliebri apponito. Aut fecem 400
 siccam ex vino veteri albo urito, & vino extinguito, ac subdito. Cucurbitam item sylvestrem, mercurialem, nigrum, & irionem. Citius detrahik & mandragorae radix, cantharis, scrypsillum, lauri fructus, unguentum trinum, laurinum. Thyrmali succum permisceto, ac agitato, & detracto visco, ervi magnitudine exhibeto. Optimum est & glandem subdititiam ex eo facere. Si vero amplius prodierit, vino prolapsur. Aut as istum dissolvito, & tepidum lana excipito, ac apponito. 405
 101 * Medicamentum ad conceptum. Cedriae acetabulum, adipis bubuli drach. iij. simul terito, & talorum figuras efformato, quas jejuna apponat, & dum apposi-

- appositas habet, per diem jejinet. Apponat autem hās, mane, & vesperti, post men-
 410 les, post cenam vero lavetur, & cum viro dormiat. Aut melanthium contundi-
 ro, & in linteum illigato, & adipe anserino addito, subdendum dato. Aliud ad
 conceptum. Quo cures mulierem, ut in ventre concipiat, urinam sumito veterem,
 & ferri crementum tantum, ut in fragmenta resolvere possis, postea mulierem in
 415 sella collocato, & corpore, & capite velato, pelvique ad pedes supposita, ignita re-
 crementi ferri fragmenta tria pro una vice injecto. Sit autem vetus hac urina congl
 mensura, & cum his triginta solumnis ipsam foveo. Dum autem fomentum adhibes,
 caput lavato, ita ut donec sora fuerit, rursus lapides illos crementi ferri in urina
 420 extinguas, & fomentum rursus calefacias. Postea vero caput lavato plurimum, po-
 lia, & viticis foliis quamplurimis in aqua coctis. Hac autem facito ad dies septem. Tet
 vero per singula hac fomenta suffuso, antequam lavas. A balneo vero oleo laurino
 iungatur, post cenam autem, ubi cepas melle tinctas comedit, & aquam mussam
 tepidam quatuor heminatur mensura bibit, & paululum continuit, vomat, & supi-
 na reclinata, rutam habeat auribus, & naribus inditam. Et panem fermentatum sexta
 425 chanielis parte, in iusculum volucris confringat, habeat autem hoc iusculum apii
 chemam, & sic assumat, & rursus tantundem in cana dato. Et hoc per dies septem
 sumito. Postea vero ventri per dies septem clysterem adhibeto. Sit autem iusculum cly-
 steris, resina drachmæ quatuor, mellis acetabulum, olei platensis tantundem,
 430 sursum recentium succus, spumia niteri, ova remia. Sit autem insulum hemina o-
 cto, & ex his tres succi prianas. Obliquæ vero clysterem adhibeto, & parum la-
 vato. Apponat etiam glandes septem in die, & detineat, donec fuerint liquefactæ.
 Sint autem ex thure, nitro, galbano, melle cocto. Cibo vero eodem utatur. Suffo-
 ro autem asini albi pilos, & lupi sterco. De his plurimum prunis injice, ipsamque cir-
 cumlocatam, ac connectam suffuso, cavendo, ne comburas. Si vero mulier parere no-
 435 queat, quæ prius peperit, nitrum, & resinam, & myrrham, & cuminum Æthiopicum,
 & unguentum simul terat, & apponat. Aut pulegium sicum in linteo subdat. Bi-
 bat autem pulegium, ubi dormire volet. Aliud ad conceptum. Viæus rati-
 onem mulieri constituere oportet, quæ præhans fieri cupit, & ad edendum, ac bi-
 bendum exhibere ipsi, quæ libenter admittit. Viro autem mulieris reliqua dato,
 præter allium, & cepam, & legumina fresa cocta, & silphii succum, & quæ infant.
 440 Ab his sane abstineat. Medicamentum, quod similiter infunditur, si non concipiat.
 Lac mulieris masculum valentis, grana mali punici recentis terito, ac siccum
 cum exprimito, & testudinis marinas partem inter anum, & pudendum comburito, ac re-
 rito, & hac in pudendum muliebri infundito. Aliud, quod similiter infundi-
 445 tur non concipienti. Lac, & resinam, & mali punici dulcis succum. Hac omnia
 melle ammixto infundito. Aliud ad conceptum. Bulbi albi semen, aut flo-
 rem cum melle terito, & lanæ involutum per triduum ad uterum apponat. Quarta
 vero die malvam sylvestrem latissoliam terat, hæc muliebri ammixto, & lanæ in-
 volutam apponat, deinde cum viro dormiat, præforbeat autem pulegium in farina
 450 coctum, & bibat pulegium tenue in vino. Si vero huic non obediatur, conyzam odo-
 ratam contundat, & expressum succum vino mixtum jejuna bibat. Aliud.
 Asparagi semen similiter in vino bibat. Aliud. Secundum mulieris, & ver-
 minum carnum capra, & alumen Ægyptium cum adipe anserino diluito, & in lana
 ad os uteri apponat. Aliud. Æruginem, florem æris, utrumque oboli dimidii
 455 pondere, thuris masculi, aluminis scissi, fructus vitis sylvestris, gallæ, myrrhæ,
 maliciori, resinæ, polii, singulorum obolum, in melle tritum, per triduum bis in die
 apponat. Si vero fortassis aerius fuerit, anseris adipem, ac nitrum tostum ammi-
 secto. Vinum autem exhibeto, fortitudinem in ipso vitans. Aliud ad conceptum.
 Vermem carnum, qui caudum habet, accipito, & de ipso tres, aut quatuor par-
 tes sumito, & origanum tennem simul cum rosaceo tinguento terito, & hoc ad ute-
 460 ri os apponat. Aliud. Portulacam cum adipe anserino, & myrrhæ, & por-
 ri semine, & felle bubulo terito, & lanæ involuta ad os uteri apponito. Si men-
 ses quidem fiant multi, non concipit autem, floris æris obolos duos, & aluminis
 scissi tantundem cum melle terito, & lana excipito. Illiget autem mulier lanam
 in linteum cum filo, & sibi ipsi subdas, ita ut filum extra promineat. Deinde quum
 465 probe purgata fuerit, extrahat, & vino odorato myrti foliis injectis fervefacto
 proluat, & vinum accedat. Substitutum ad conceptum. Mel, myrrham,
 myrica fructum, resinam liquidam, adipem asernum, omnia simul trita lanæ
 involuta apponat. Aliud, quod uterum valde aperire potest, quum conclusus
 est, & concipere non potest, & ad aquam expurgandam. Accipe anchusam par-
 470 vam, & lentiscum, & cuminum, & cyperum, & cucurbitam sylvestrem, & nitrum
 rubrum, & sal Ægyptium, & anchusam magnam. Hac omnia tria per linteum ru-
 rum: excernito, & acceptum mel ad leutum ignem coquito. Postquam vero effe-
 buit, ectam, ac resinam ammixto. Deinde etiam aliis omnibus ammixtis oleum
 affundito, ac ab igne tollito, & tepida lanæ convoluta involuta utero apponito,
 475 donec purgata fuerit. Aliud. Si mulierem concipere velis, ad purgatoria qui-
 bus utitos, etiam vitum accedere oportet. Et baccas lauri nigras decem, thuris pu-
 gillos tres, & cumini modicum, cum melle trita in lanam succidam involvat, & so-
 mel in

- mel in die subdat, & semel auferat, ad quatuor dies, & isdem diebus a cibo abstineat. * Conceptum impediens. Si vero concipere non oporteat, mīfos magnitudinem fabae aqua diluito, ac bibendam dato, & per annum, ut ita dicam, non concipiet. * Partum accelerans egre parienti. Lauri radicem detasam, aut lauri baccas dimidii acetabuli mensura in aqua calefacta bibendas dato. Aliud partum accelerans. Dictamnii obolos duos trios in aqua calida bibat. Aut abrotoni drachmam, & lauri baccas, & anisum in vini dulcis veteris cyatho terito, & aqua cyatho affuso bibendum dato. Hoc donum est, si ante partus dolores fuerit datum. Aut dictamnii obolum, myrrhæ obolum, anisi obolos duos, nitri obolum. Hac cum vini dulcis cyatho uno terito, & aqua calidæ cyathus duobus affusis bibenda dato. Deinde calida lavato. Aliud partum accelerans. Resinam terebinthinam, mel, oleum duplum horum, vinum odoratum quamvis visissimum. Hac mixta tepesfacta sepe ebibenda dato. Oportet autem & uteros sedare, si fuerint inflammati. Aliud. Cucumeris sylvestris quicumque albus fuerit semen ceræ, infarcito, deinde lana rubra involutum, lumbis alligato. Si vero prægnans multo tempore cohibeatur, & parere non possit, sed diebus pluribus ex partus doloribus laboret, sit autem juvenis, in vigore, & multo sanguine repleta, secare oportet venas in malleolis, & sanguinem detrahre, virium selspectu habito, & postea calida, lauri corticibus incocctis, lavato. Vitis autem semen, & dictamnium creticum, utrumque pari portione in vino albo, aut aqua bibendum dato. Subdititium autem medicamentum facito, galbano, et baccis lauri, et oleo rosaceo in lana involutis, ac subditis. Aliud. Filicis quereinz radicem tritam in vino bibendum dato, et adiantum tritum in oleo dilutum illinendum, et in vino metaceo bibendum dato. * Aliud, quod puerperæ puerperii purgamenta melius purgat. Testudinis marinæ hepar vitide adhuc viventi, in lacte muliebri terito, et cum unguento irino, ac vico subigito, et apponito. Aut mercurialem tritam in lana apponito. Aut artemisiam tritam similiter in lana subdito. Aut mercurialis, et cucumeris sylvestris parum terito, et vino, ac melle subactam apponito. Purgatorium puerperii purgamentorum ex partu. Triticum tripestre fractum, ac frefum, dimidium chonica mensura in aquæ heminis quatuor coquito. Quum autem efferverit ter, aut quater, sorbendum dato. Aliud. Sambuci folia in aqua coquito, et aquam bibendam dato. Edat autem et brassicas coctas, et porum, et fœniculum, et anethum, et polypos, et locustas pisciculos. Aut rhois folia, et erysimum ex vino, aut polenta polinem bibendum dato. Aut mīsy duorum obolorum pondere tritum, ac vino subactum apponito. Purgatorium mēsum, et puerperii purgamentorum. Ducit etiam aquam, et alia. Radicis struthii zuli triti, quantum tribus digitis apprehendi potest, melle subactum apponito. Nascitur autem in Andro in litoribus. Aliud similiter purgans. Erysimum in aqua coquito, et ubi ebullit, oleum affundito, ac bibendum dato. Commoduū est etiam succum pro somento adhibere pro fissum, et cibis mollibus uti. Aliud, quod puerperii purgamenta purgat. Erysimum placide terito, et corticem distillato. Quum autem parum feceris, leviter terito, et aquam distillato, saleūque, ac oleum ammisceto, et ubi potentiam insperseris, coquito, ac sorbendum dato. Aliud. Si non descenderit purgatio, aut puerperii purgamenta non prodierint, cucumeris sylvestris internam partem tritum obolorum pondere fume, et artemisiam herbam, et thus oboli pondere, et hæc trita, et melle ammixto, lana involuta, ad uteri os appone. Et hoc semper noctu, ac interdiu per dies quinque facito. Aut vitis pampinis, aut folia viridia terito, et melle ammixto, lana excipito, et eodem modo subdito. Aut cupressi fructum, et thus simul trita, rosaceoque, ac melle diluta, et lana excepta, apponat. Aut abrotoni drachmam, et cucumeris sylvestris medullæ obolum, et thus cum melle terito, et in lana involuta apponito. Aut elaterii obolum, et myrrham cum melle terito, et lana excepta, apponat. Aut cupressi fructum, et cucumeris sylvestris internam partem, et thus, melle ammixto, in lana subdat. * Purgatorium, si ex partu non purgetur. Trifolium in vino bibendum dato. Idem etiam appositum menses erumpere facit, et fortum ejicit. Purgatorium uterorum, quum puero mortuo, sanguis in hoc manserit. Cucurbitam sylvestrem tritam cum melle delingat, aut apponat. Ad omnia puerperii purgamenta, si non probe prodeant. Erysimum coquito cum polenta, et oleo affuso, ubi coctum fuerit, sorbeat, et cibis mollissimis utatur. Aut scammonium cum lacte muliebri tritam, ac lana exceptam apponito. Aut radicem dulcem, melle, & rosaceo, aut Ægyptio unguento subactam, in lana subdat. Aut farinam lotam similiter apponat. Bibat autem crethmi, & seselis, & rutæ, & silphii semen, ita ut de singulis obolos duos simul teras, & in vino metaceo, si non febricitat, præbeas. * Subditicium, quod secundam telictam ejicit. Ex sambuci foliorum decocto prius fomentum adhibeto, & id, quod ex cantharide fit, apponito. Hoc & ea, quæ debilia sunt, sanant. Si vero lanciget, ac mordent, statim tollito, & lanam rosaceo tinctam subdat.

SECTIO IV.

- 1 **P**ortiones, quæ secundum educere possunt, & menses detrahere, itemque secum
 enectum. Cantharidas quinque alis, & cruribus, ac capite avulsis, & tribulum
 ad mare natum cum radice, ac foliis tritum concha mensura, & evanthemi, ac feminis apii
 tantumdem, & sepiæ ova quindectim in vino dulci temperato bibenda dato. Et ubi
 5 dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquam musam aquosam bibat, & vi-
 num dulce. Aliud. Ranunculi foliorum, ac floris tritum, statim Agineæ pondus,
 in vino dulci bibat. Si vero dolor habuerit, cicer album, & eas vallas in aqua co-
 quitos, perfrigerato, ac bibendum dato, & ubi urine stillicidium veniat, in aqua te-
 pida desideat. Aliud, quod ejicit secundas. Cucumeris sylvestris succum in ma-
 10 zari confectum apponit, ubi prius ad biduum jejunavit. Hoc nullum aliud præstan-
 tius invenimus. Facundiaris experimentum. Caput allii integrum decalum
 appone, & vide, an per os oleat. Aliud experimentum. Netopon modicum lana
 involutum apponito, ac videto, an per os oleat. 7 Aliud subditius. Scorpis marini
 fel, lana exceptum, & in umbra siccatum appone. Aut pulegium siccatum, & tritum,
 15 ac melle subactum, in lana apponito. Aut florem aris cum melle iurecolo illigatum subdi-
 dro. Aut cucumeris sylvestris semen, & testam combustam cum vino subigito, &
 leporinis pilis, ac lana excepta, subdiro. Aliud subditius. Alumen Hy-
 pium lane involutum apponito. Aut cantharidas tritas, vinoque subactas subdiro.
 Aut artemisiam herbam vino subactam apponito. Aut melanchium cum vino tri-
 20 tum in lana subdiro. Aut bulbium ex tritico tritum, & vino subactum apponito.
 Aut vini veteris albi secem combustam, & vino albo extinguito, terroque, ac in
 linteo apponito. Aut galbanum, & netopon, & mify cum rosaceo ungenti in linteo
 subdiro. Aliud. Elaterii poriones duas, & favum cum vino in linteo apponito.
 Aut butyrum, & alumen melle subacta similiter. Aut scammoniz succum, & adipem
 25 cum maza misceto, & vino ambura in linteo apponito. Portiones, quæ possunt
 secundam in utero detentam educere. Colocynthis sylvestris internam partem cum
 lacte muliebri tritam, in linteo apponat. Ad idem. Silphium magnitudinis sabæ
 in vino bibendum dato. Aliud, quod secum expellit. Mulierem sub alis apprehen-
 sam fortiter conquirato. In postea vero dato viticis folia in vino. Aut dictamnus ere-
 30 tius, oboli poudere in aqua terito, ac exhibeto. Aut conyzæ graveolentis manus
 plene mensuram cum porri succo diluito, & netopon cheuz plena mensuram addi-
 dro, atque hæc trita in vino bibendum dato. Aut eadem phlogisium cum vino duli-
 co coquito, tritum cyathorum mensura vini assusa, & galbani obolos tres, & myr-
 rham adscito, & ubi cocta crassa fuerint, tepida bibenda dato. Aut porri suc-
 35 cum, & myrrham, & vinum dulce simul exhibeto. Aut postulat semen terræ, & in
 vino albo veteri dato. Aut populi nigra cætieæ grana novem, in vino trita bibat.
 Aut ranunculi herbæ foliorum, ac floris triti, drachmæ Agineæ pondus, in vino
 dolet bibat. Si vero adhuc secunda intus detineatur, semet hæc angium obolum in
 vino terito, ac bibendum dato. Aut apii radicem, & myrris baccas equat, & per
 40 dies quatuor bibat. Aut cuminum Æthiopicum, & castorei obolum, & cantharidis
 parum, hæc in vino bibenda dato. Aut feniculi radicem in vino, & oleo, ac melle fer-
 vescentem bibat. Si secunda non prodierit, conyzam tritam in lana subdiro. Melius
 anemest, ut bibat. Aut conyzæ quantum manus capiat, & porri succum, & netopon che-
 maz mensura misceat, & hæc in vino bibat. Aliud, quod secundam ejicit. Holoos-
 45 mides dulcis radicem, est autem velut bulbus, & parva velut oliva. Hanc in vino
 terito, ac bibendum dato. Et si quidem parva fuerit, dias dato. Si vero major, una
 sufficit. Annisisco autem ex seminibus cuminum Æthiopicum, & selesi massilense,
 Aut silphii libyæ semen sicum cheonicis dimidiæ mensura, in vini heminis tribus
 coquat, & ad dimidiam redigat, & de hoc bibat. Aliud. Viticis semen, & seles-
 50 is pari portione simul cum myrrha terito, & cum aqua bibenda dato. Aliud secundas ex-
 pellentia. Viticis albo recentis acetabulum, in vino albo odorato tritum, bibendum
 dato. Aliud. Castorei, aut lagapeni obolum, binumini drach. ii. nari drach. ii.
 hæc omnia terito, & in vino dulci, ac olei hemina dimidia obolos quos jejune
 bibendos dato. Et calida probe lavato. Aliud similiter habens. Herinaceos ma-
 55 rinos tres rotos tenuiter tritos, in vino odorato bibendos dato. Aliud. Mentæ
 fasciculum parvum, & citræ, & coriandri, & cedri, aut cupressi semen in vino odo-
 rato bibendum dato. Et de herinaceis si habuerit, plurimum sorbeat, postea vero si-
 militer calida lavato. Aliud. Anisum, cedri baccas, semen apii, cuminum Æthio-
 60 picum, selesi, singulorum dimidium acetabulum, tenuiter tritum, ex vino albo bibendum
 dato. Aliud. Dictamnus fasciculum, & dauci seminis drach. ii. & melanchii tantum-
 dem tenuiter terito, & in vino albo bibenda exhibeto. Et multa calida lavato. Da-
 to autem iuxta corporis robur. Aliud. Galbanum olive magnitudine, in oleo cedri-
 no tritum apponat: hoc corrumpere, & ejicere morantes secundas potest. Aliud se-
 65 cundam expulsiuum, quod uteris infunditur. Quum secunda a frigore mortifica-
 ta computruerit, ubi ventris frigidus fuerit, crocum leviter tritum drachmæ pondere,
 cum adi-

- cum adipe anserino infundito, & ad plurimum tempus finito. Potius ad idem probe confers. Conyazam suave olentem, & mel, & resinam terito, inque vino odorato, aut in syrma potione moderate purgante bibenda dato, & calida lavaro. Alius similis potus ad puerum, & mala iunis existentia. Æruginem tritam cum melle, & syrma potione bibendam dato. * Aliud subditicium ad efficiendum foetum immortu. 70
 70 ris ramenta in molle linteum indita, ad os uteri apponito, & profuerit. Aliud. Testam recentem, & adipem anserinum terat, ac apponat. Aliud. Nitrum cum resina coctum, & in glandem efformatum, gallinaceo adipe tinctum appone. Aliud. Charien appellatur herba, huius radicem non multo adeo tempore ad umbilicem apponito. Aliud. Cucurbitam sylvestrem, & murum sterus, leviter trita apponito. Aliud; 75
 75 quod alligatur. Resinam, & adipem gallinaceum, trita, ac simul mixta, super umbilicum, ac ventrem deliget. Aliud subditum. Hederæ albe semen, & cedri ramenta terat, & glandes hinc factas subdat. Aliud. Testudinis marine cerebrum, & crocum Ægyptium, & salem Ægyptium terito, misceto, glandes formato, ac subdito. Suffimentum expulsiuum, quod & sanguinem ventris expellere potest. Salicis folia in ignem posita suffito, & mulierem circumlocaram finito, donec fumus in uterum intraverit. * Abortus sanatio. Quum mulier abortum fecerit, & puer non fuerit egressus, siue putrefactus fuerit, & incumuerit, aut aliud quid ejusmodi passus fuerit, 80
 80 post, & apii succum per linteum expressum, de utrisque colligito, & olei rosacei heminam, & adipis anserini quadrantem adijcito, resinaque obolos tres in oleo liquefacto, & ubi mulierem ad pedes altiores feceris, in uteros infundito, ac decubens ad plurimum tempus contineat, deinde ad dies quatuor desidere iubeto, & egreditur puer putrefactus. Sin minus, salem Ægyptium, & cucurbitam sylvestrem viridem accipito, & melle ammixto trita edenda dato. Et postquam ediderit, hinc & hinc moveatur. Aliud. Salem Ægyptium, & murum sterus, & cucurbitam sylvestrem sumito, 90
 90 & mellis semiocti quadrantem affundito, & resine drach. i. in mel injicito, & cucurbitam, ac murum sterus, omnia probe conterito, & in glandes efformato, easque ad uterum subdito, quamdiu opportunum esse visum fuerit. Aliud expulsiuum, quod puerum enectum ejicit. Helxinem in vino tritam bibendam dato. Aliud ejectorium, quod puerum lividum expellit. Veratri nigri radices tenues tritas, quantum tribus digitis apprehendere potes, & myrrham magnitudine fabæ, in vino dulci bibenda præbe. Aliud expulsiuum. Coriandrum cum radice, & netopum apponat, ac decambulet. Aliud, quod infunditur, si mortuus fuerit puer, ut ipsum ejiciat. Crocum terito, & anserinum adipem affundito, & excolata in uteros infundito, & ad plurimum tempus relinquito. Ad foetum immobilem corrumpendum, ac expellendum. Aluminis scissi drachmam unam, myrrhæ tantundem, veratri nigri obolos tres, in vino nigro leviter trita, in glandes efformato, et apponito, donec paulatim fuerit exolutus. * Collusiones uteros purgantes, si ex partu, aut inflammatione fuerint exulcerati. Grossos hybernos aqua assuâ fervefacto, et excolato, deinde oleo tepido affuso milce, et duas heminas ad summum infunde. 105
 105 Omnes autem collusiones non ampliore, quam hac mensura uteri infundantur. Mallicorium item, et manna thuris in vino nigro austero coquito, et excolatum vinum infundito. Alia collutio. Fecem vini ustam liquefacto, et cum aqua infundito. Deinde malicorium, myrrhæ baccas, juncum odoratum, lentes in vino coquito, et distillatum vinum infundito. Alia. Butyrum, thus, resinam, mel simul liquefacto, et assufo vino, tepida infundito. Aut sambuci fructum in aqua coquito, et excolata aqua, apum, myrrham, anisum, thus simul in ipsa terito, et vinum odoratum pari aquæ mensura affundito, excolatoque per linteum, et tepesfactum infundito. Alia. Brasicam, et mercuralem, et lini semen, et linum viride in aqua coquito, excolato, ac infundito. Aut foliorum myrræ acetabulum, myrrham, anisum, mel, resinam, unguentum Ægyptium, omnia terito, ac unito, assusque vini albi odoratissimi heminis duabus, excolato, tepesfacto, infundito. Aut lauri fructum, et pulegium in aqua coquito, et unguentum rosaceum affundito, et cum hoc tepido colluito. Aut anseris adipem resina ammisceto, assusque ad hoc vino, tepesfactum infundito. Alia. Butyrum, et oleum cedrinum in modico melle tepesfacto, ac infundito. Aut 110
 110 mel, butyrum, juncum odoratum, calamum odoratum, muscum magnum sumito, et in vino coquito, excolato, ac infundito. Aut apii semen, fesceli, myrrham, anisum, melanthium in vino coquito, et excolatum vinum infundito. Aut cedrum in vino coquito, et cum vino colluito. Aut hederam in aqua coquito, et aquam infundito. Aut elaterii, aut onestri potiones duas in aqua coquito, et duas heminas ex hac tepida infundito. Aut cucumeris sylvestris interioris magnitudinem digiti in duabus aquæ heminis coquito, et melle, ac oleo ad aquam assufo infundito. Aut radices raphanæ potiones duas leviter terito, assusque oleo, ac melle, in duabus aquæ tepida heminis diluto, ac infundito. Aut veratri nigri potiones duas vino dulci, et aqua dilutas, infunde. Aut grana cnidii feraginta terito, melleque, ac oleo, et aqua assufo infundito. Collutio corroborans, si ulcera pura fuerint. Grossos hybernos terito, et aquam affundito, et per totam diem macerato, et oleo assufo colluito. Aut mallicorium, et lori ramenta in vino nigro coquito, et infundito. Quum autem impura fuerint, et fordes deferantur, fecem vini ustam. 120
 120

- 135 cum vino, & aqua infundito. Aut malicorium, rhoem coriarium, myrtique, ac rubi folia in vino nigro coquito, ac infundito. Collutiones, quae infunduntur ad vetera ulcera. Succo brassicae cocto collue. Et mercurialem similiter, ac nitrum rubrum modicum ammisce, & myrrhae acetabulum, thus, sefeli, anisi, api semen, netopum, resinum, mel, adipem asnerinum, acetum album, unguentum album Aegyptium. Haec omnia simul trita, & vini albi heminis duabus diluta, tepida infunde. Aut mercurialem in aqua coque, & excola, & myrrhae acetabulum, thus, sefeli, nerupum, singulorum pares portiones adde, ac tepida infunde. Aut salivam, & hypericum in aqua coquito, & cum aqua colluito. Aut sambuci fructum, & lauri baccas, aequis portionibus, in vino coquito, & cum vino colluito. Aut pulegii aqua colluito. Aut adipem anseris in resina liquefaci, & similiter oleum cedrum modicum affundito, & cum melle liquefacito, ac tepida infundito. Aut argenti florem in vino, & melle, ac cera liquato, & cyperum, & juncum odoratum, ac calanum (quae sane etiam in unguentum ammiscuntur) & iridem, ac muscum in vino coquito, & infundito. Aut api semen, anisum, sefeli, myrrham, melanthium in vino coquito, ac infundito. Aut cedrum cretiam in vino coquito, aut in aqua, & infundito. Aut hederam creticam in aqua coquito, ac infundito. Atque haec facienda sunt, si vilius habet, & myrrham in aqua dilutam infunde. Aut elaterii portiones duas cum aqua infunde. Aut colocynthidas sylvestres duas in vino, aut in lacte cocto, quatuor heminarum mensura, macerato, & excolato, ac infundito. Aut cucumeris sylvestris interioris, palmi magnitudinem in aqua, heminis quatuor coquito, & melle, ac oleo affuso colluito. Aut radices thapsiae duas portiones, in vino dulci dilutas, cum aquae heminis duabus tepide infundito. Aut veratri portiones duas, in vini dulcis heminis duabus dilutas infunde. Aut thlaspius acetabulum, melle ammixto, in aquae heminis duabus dilue, & tepido utere. Aut cucumeris sylvestris magnitudinem palmi, & cneori portiones unam in aquae heminis quinque coquito, & melle, ac oleo affuso colluito. Aut grana enidia sexaginta, in melle, aut in oleo diluta, cum aqua infundito. Si ex parte alvi profusio corrumpitur, bibat uvam passam nigram, & punicum dulcem malicorium, & internum nucleum, & coagulatum hirci. Haec vino nigro diluta, & cisco caprino, ac polenta triticea mispersa, bibenda dato. Triticum autem modice torreto. Si vero ex parte linguium vomat, huius hepatis fistula facta est. Haec lac asini bibat, deinde vacet nixae, ad quadraginta dies. Et sesamum tritum, donec probe habeat. Bibat autem lac asini. Si ex parte sedem doleat, iuniperi fructum, & api radicem coquat, & ad dies quatuor bibat, & lactuca semen cum anserino adipe tritum edat. Si vero ex parte uteri inflammata fuerint, solani succum infundito, aut betae, aut thami. Si ex parte crus ab utero claudum factum fuerit, & exurgere non poterit, semen hyoscyami chemae mensura, in vino nigro ad triduum bibat. Si vero mente percellatur ipsa bibens, lactis asini poculum bibendum dato. Deinde pharmacum, a quo prius purgatur, ex lasidracha autem, & cerato, & pilis leporis per triduum suffusus sit. De inflammatione ex parte. Si ex parte uteri inflammata fuerint, solani succum intra pudentia infundito. Aut api, aut thami, aut betae, aut cucurbitae succum expressum, aut sambuci medullam, ac tenerum partem derafam, oblongum indito. Aut abinthium in aqua terito, & lana exceptum subdo. Si vero horuerit, tollito. Aut coryledonis folia, & porrum in calidioris tritici farina coquito, & oleo ipsi affuso praebero. Bilem ex utero purgantia. Cucumeris sylvestris internam partem tritae, ac melle subactam in glandem efformato, ac apponito. Pharmacum autem dare oportet, quod sursum, ac deorsum purget, & calida lavare, apponere vero anisum, aut melanthium, aut colocynthidas sylvestris internam partem terito, & melle subactam apponito. Aut elaterii portiones quatuor, ammixto adipe asnerino, aut caprino, in oblongiorem glandem redactas apponito. Aut nitrum, & euminum, & scallum, & ficum, omnia leviter trita, & melle subacta apponito. Calida vero laverur, & a balneo bibat. Aut thlaspi leviter tritum, & melle subactum apponito. Aut ficus veteris pinguitudinem derafam elaterii portiones duabus ammixtus, & vitro tantum, quantum est elaterium, cum melle subigito, ac apponito. Aut peucedani tres cyathos bibendus dato. Et anisum, ac melanthium vino diluta bibenda dato. Aut elaterii portiones quatuor, adipe ovillo ammixto, apponito. Et hoc ablato, aqua odorata laver, quae leniter adstringat. Aut elaterii portiones tres cum ovillo adipe in glandem circum pennam efformato, & ibi amoverit, sufficiens aqua probe eluat. Aut thlaspi portiones cum melle dato. Collutio. Si biliosa fuerit, elaterii portiones duas aqua dilue, & oleum nardissimum affunde, & cum tepido collue. Aut colocynthidas sylvestres duas in lactis asini cocti heminis quatuor macerato, & uvam excolato, ac oleum nardissimum ammisceto, & infundito. Alia collutio biliosa, & pituitosa. Cucumeris sylvestris internam partem, palmi magnitudinem, in aquae potabilis heminis quatuor coque, & melle, ac oleo anthino ammixto infundito. Alia pituita, & bilem purgans. Grana enidia sexaginta, melle, ac oleo anthino ammixto, cum aqua infundito. Aut cnestrum in aquae potabilis heminis quinque coque, & duabus excolaris, melle, & oleum anthinum, eorum varissimum ammisceto, ac colluito. Collutiones pur-

Gatoriz. Grossi hybernii usti in aqua macerantur, & ad aquam excolatam oleum am-
miscetur, ac infunditur. Postea vero collutio fiat ex malcorio, galla, lori ramentis. 205
Hæc autem in vino nigro coquere oportet. Aut fece vini usta utere cum aqua. Et
postea hæc infundito, myrti folia, & rhoem coriarium. Coquantur autem in vino ni-
gro odorato. Et postea lentifici folia, & hypericum, & salviam cum vino nigro odo-
rato cocta infundito. Aut cum brassicæ aqua, in qua mercurialis cocta sit, modico
nitro adjecto, colluito. Aut elatetii portionem cum oleo narcissino, aut anthino, te- 210
pidam infundito. Si vero biliosa fuerit, colocynthidas duas in lactis asinini
cocti quatuor heminis macerato, & cum excolato colluito, oleo narcissino, aut an-
thino ammixto. Aut cucumeris sylvestris internam partem palmi magnitudine in
aquæ potabilis heminis quatuor coquito, & melle, ac oleo anthino addito, col-
luito. Hæc collutio pituitosa, ac biliosa conducit. * Collutio pituitam trahens. Gra- 215
num enidum, et mandragoræ liquorem terito cum aqua. Nam purgatio multa, et om-
nis generis ex hac collusione contingit. Aut allii caput integrum, nitrum, fœcus in-
ternam pinguem partem, æquis portionibus, trita, ad gallæ magnitudinem efformato,
ac apposito. Aut cunini folia cum vino trita, in lana subdito. Aut radicem alban-
terito, et melle assufo fervefactam in glandem redigito, ac apposito. Aut silphii li- 220
quorem cum fœcis emollito, & glandem efformato. Bonum est et cucumeris syl-
vestris semen similiter tritum, ac præparatum. Aut fel tauri, et nitrum rubrum, et ne-
topum, ac cyclaminum, illorum quidem gallæ magnitudinem, cyclamini vero amplio-
rem portionem, melle ammixto, mulier, quæ curatur, apponat. Aliud subdi-
tium. Cyclamini caput purgatum aqua terito, et lana tenera exceptum apposito. 225
Aut myrrham, salem, cuminum, fel tauri, cum melle eodem modo. Aut grana eni-
dia triginta, et Indici pharnaci oculorum, quod vocatur piper, grana tria decorti-
cata, et rotundi item tria. Hæc autem terito, et vino veteri tepido diluta, instilar
glandis circum volueris pennam efformato, et sic adhibeto. Aut tithymali succum
melle subactum. Aut scillæ radicem longitudine digitorum sex, duobus digitis 230
lana obvolutis, subdito. Aut ipsam scillam absque radice terito, et similiter la-
na obvolutam apposito. Collutio, si pituitosa fuerit mulier. Veratri portio-
nes duas in vini dulcis heminis duabus diluito, et permixta infundito. Si purga-
tione opus habuerit, porrum coquere oportet, et sambuci fructum, anisum,
thus, myrrham, vinum. Hæc omnia terito, et cum succo horum colluito. Aut 235
brassicam in aqua coquito, et in huius succo mercuriale coquito, et nitri pa-
rum, et excolatum infundito. Aut cnestri portionem in melle dilutam immitto.
* Verum menses considerare oportet, an biliosi sint, aut pituitosi. Ad hoc arenam
siccam tenuem in solem subijcito, et quum menses prodierint, sanguinem superfun-
dito, ac siccari finito. Et si quidem biliosi fuerint, sanguis in arena siccatus vi- 240
ridis evadit. Si vero pituitosi, velut mucus conspicitur. Si igitur pituitosi fuerint,
cnestri portionem cum aqua mulsæ hemina infundito. Purgatorium molle a-
quam ducit, et pelliculas, ac saniem suberuentam. Detrahit et menses, nisi du-
turni fuerint, et uterorum os mollit. Unguentum narcissinum, et cuminum, quod
editur, myrrham, thus, ablinthium, cyperum, unguentum rosaceum. Horum sin- 245
gulorum pares portiones, narcissini vero quatuor partes sumito, et crudi lini
pulvillo, cum a stupa depectatur, ammixto, omnia terito, et glandem circum
pennam efformato, et linteo tenui circumdato deligato, et in oleum album Æ-
gyptium tngito, ac apposito, et per totam diem finito. Et ubi lavit, et amovit,
aqua odorata perluatur. Aliud purgatorium. Ducit aquam, et pelliculas, 250
et mucos, et saniem suberuentam. Myrrham, salem, cuminum, fel tauri, mel-
le subacta, et linteis indita apposito, et totum diem instita finito. Deinde, ubi
lavit, et amovit, aqua odorata perluatur. Aliud. Salem, cuminum, fel tau-
ri melle subigito, ac subdeo. Et silphium sicui ammisceto, ac apposito. Deinde
unguento rosaceo illinito. Aut grana enidia decorticata, portionemque ipsorum teri-
to, ac in glandem efformato. Aut allium, et nitrum rubrum, et ficum, paribus 255
portionibus melle ammixto subdenda dato. Et ubi amoveris, cervi adipem appo-
nat in vino liquefactum. Aut piperis grana quinque cum modico elaterio, mu-
liebri lacte instillato, in lana unguento tincta apponat, ac amoveat eodem mo-
do. Aut pinguissimam fœcis partem cum elaterii portione, et nitri rubri, ac mel-
lis æquali portione, eodem modo. Aut fel tauri, nitrum, rubrum, netopum, 260
cyclaminum, paribus portionibus eodem modo cum melle in glandem effor-
mato. Aut fel tauri oleo Ægyptio tinctum apponat. Et eo amoto rosaceum
illinat. Aut cucumeris sylvestris longi internam partem, exempto semine, cum
lacte mulieris masculum alentis, et myrrham puram, et modicum mel, et unguen- 265
tum Ægyptium terito, et apposito. Aut cucumeris sylvestris partem internam siccato,
et line semine tundito, et adiecto melle fervefacto, et glandem oblongam effor-
mato, atque oleo albo tinctum subdito. Aut sylvestrem cucurbitam eodem modo. Aut
elaterii portiones tres cum farinæ massa terito, et glandem formato. Aliud simili-
ter faciens. Grana enidia decorticata, trium portionum mensura coquito, et mel- 270
le assufo apposito. Deinde rosaceum illinito. * Quæcumque vero glan-
dem subdunt, eas prius lanam in glandem insigere, deinde linteum tenui cir-
cundare

- cum dare oportet, atque sic oleo Aegyptio tinctam apponere. Ductum autem hac maxime, & pelliculas auferunt. Subditiua purgatoria fortia, quae aquam ducere possint, & mucos, ac pelliculas, magis quam priora. Piperis grana quatuor maxima, aut etiam parua, si opus fuerit, ad elaterii potionem ammixta terito, & muliebri lacte infusillato, cum modico melle subigito. Atque hac in lanam mollem circum pennam obvoluito, & linteo circumdato apponito, ubi prius in oleum Aegyptium tinxeris. Maneant autem subditi per diem, & ubi amoverit, adipem cervi apponat. * Porrius similiter purgatoria, quae secundas ejicere possint, & menses detrahere, & foetum conatum educere. Cantharides quinque alis, & cruribus, ac capite avulsis, & tribulum ad mare natum cum radicibus, ac foliis rrium conchae mensura, & evanthemi viridem, sive luteam internam partem, & seminis apii tantundem, & sepiæ ova quindecim, in vino dulci temperato bibenda dato. Et ubi dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat, & vinum dulce. Alia. Ranunculi foliorum, ac stolis triti, aginei stateris pondus in vino dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, eicer album, & uvas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato. Et ubi prius stillicidium vexarit, in aqua tepida desideat, & vinum dulce bibat. * Subditiua purgatoria, si portiones non purgant. Mercurialem tritam, ac myrrham apponito. Aliud ad omnem morbum, & aperire, & purgare potens. Myrrham modicam, & salivam, & anisum terito, ac utror, Purgatorium, quod sterilem purgare possit. Si os uteri non recte habuerit, sterus bubulum sicum tulum, ac exibatrum quatuor cheniolum mensura, & aceti heminas decem, & urine bubule tantundem, & falguginis mariae heminas viginti pro fomento adhibito, & ad multum tempus hoc leniter facito. Deinde lota, ubi lentius delectum, & mel, ac acetum mixta bibit, vomat. Et farinam forbendam dato, & vinum odoratum vetus sub dio per noctem expositum, insuper bibendum. Cibum autem ea die ne gesserit. Sequenti vero granum cinidum devorandum dato. Tertia vero phargacum usquam ciens exhibeto, ita ut uvas passas, & cicee album, duagum ciceronum mensura, sumas, & aquae semicongios tres affundas. Deinde facta coctum excoles, & sub dio per noctem exponas, & postea die bibendum praebes, & subditiis pharmacis utatur. Aliud purgatorium mentium. Stercus bubulum velut conchae testam efformato, & cupressi ramenta ammiscero, ac subigito, & in sole siccato, & in hoc suffimenta injecto, ac suffito. Aliud, quod infunditur ad similem affectionem, si menses non prodeant. Spinæ albae folia trita, & excolata, ac resecta infundito. Illitio purgatoria, quae uteros purgat. Porri, & nasturtii semen tritum, & vino, ac lacte cocto dilutum, imo ventri illinito. Illitio mollioria. Ducit aquam, & mucos, & pelliculas. Et puerperit purgamenta detrahito, & non exulcerat. Myrrhæ optimæ dimidiam partem, & salis granum, & picem aromatibus conditam, contundito, ac trita insiceto. Sit autem myrrhæ dimidia pars, ad salem, ac picem contusam. Hac in linteam ad galle nigræ magnitudinem efformata immittito. Sint autem duo lintea, ut alterum in dies, alterum nocte habeat, donec colliquecant. Lavetur autem calida. Et deinde ubi amovit, aqua odorata perluatur. * Si voles mulierem concipere, ipsam, & iteros purgato. Deinde jejuna farinam edendam dato, & vinum meracum insuper bibendum, & nitrum rubrum, aut cuminum, & resinam melle subigito, & in linteis subdito, & ubi aqua desummit, nigros subditiis talos ad emolliendum apponito, & cum viro concumbat. * Si vero os conclusum fuerit, etiam fici succum apponat, donec fuerit apertum, & statim aqua eluat. Cæterum accipitis sterus in vino dulci terat, & jejuna bibat, & tunc viro condormiat. Aut ubi menses desierint, anferis, aut vulpis sterus in rosaceo unguento terat, & pulendum illinat, ac condormiat. * Si ulcera fuerint acuta, & inflammata, hac col-lutione utere. Adipem ascris, & resinam misce, & aqua tepida diluta infunde. Aut butyrum melli ammixtum liquificato, ac infunde. Aut bryoniae albae conchae testam parvam deradito, & myrrham, ac mel similiter. Hac in vino nigro odorato diluito, ac tepidum infundito. Si ulcerata, aut pusillis plena fuerint summa labra, carnem bubulam sumito, & butyrum, aut pulvis plena fuerint anisum, aut crocum, aut spodium Cyprum. Hac omnia terito, & carni oblita apponito. Si ulcera fiant, ac mordeant, bubulam carnem adipis illinito, & carnem subdito. Et si fordida fuerint, eluito, & fomentum ex fici radice adhibeto. Et post ea etiam de pinguedine in vino dulci bibat. Si in pudendis fiant ulcera, bubulum adipem illinito. Et myrrum in vino coquito, & cum vino perluat. Aut oleæ folia, & rubi, & mali punice, eodem modo. Sit autem vinum pramnium. Atque hac quidem sic facienda sunt. Et perleæ arboris videlicet folia terito, & ad pudentia apponito. Aut anethi, & apii semen tritum illinito. * Si febrido, ac superficiali ulcere pudentia laborent, sic curare oportet. Carnem bubulam longitudine duorum palmorum parvorum, crassitudine vero ligni, quod in foramen bipennis immittitur, pudenti videlicet virilis forma usque ad vesperam apponat. 340 noctu vero auferat. Postera die autem rursus apponat usque ad meridiem, & bibat, vinum dulce, melle ad vinum ammixto. Colluctio, si ulcerata fuerint uteri, &

ri, & si utina stillicidium vexarit. Porrum, sambuci fructum, fesceli, anisum, thus, myrrham, & vinum aequali mensura ad horum succum. Hac mixta, & servata, cuncta singulato, & moderare colluto. Aut mel, butyrum, medullam, & ceram immittito, ac illinito. Ad ulcera, quae in pudendo sunt, ac enascuntur. Folia oleae, & rubi, & hederæ, & mali punice dilectis terito, & vino veteri diluta, noctu in lana pudendis apponito, & pro cataplasmate adhibito. Quam autem dies venerit, detrahito, & myrri baccas in vino coquito, ac colluto. Aut anseris adipem, & testinam liquefacto, ac infundito. Aut butyrum, & oleum cedrinum, modico melle ammixto, infundito. Ad ulcera in utero resiccanda. Argenti forrem in vino terito, ac infundito. Aut butyrum cum melle infundito. Aut bryoniam albam, & myrrham, & mel, vino diluta infundito. Postdie vero vino nigro tepido eluto. Aut lenticuli folia in aqua coquito, & cum hac postea colluto. Si ulceratum fuerit os uterorum, butyrum, & thus, myrrham, resinam, medullam cetvinam infundito. Aut lenticulam in aqua coquito, & cum excolata aqua colluto. Quam vero aqua ex utero fluxerit, & ulcera fuerint, & lancinarint, anseris adipem, & ovum illinito. Aut ovillum, aut foetum adipem, & lentem in vino coquito, & hoc pari aqua temperatum infundito. Quae vero in pudendo sunt ulcera, cum hoc perlundito, & mannam thuris, rubum, pini corticem inspergito, & cum aqua horum lavetur. * Expulsiorem, si mortuus fuerit foetus. Galbanum olivæ magnitudine linteo involutum, ac oleo cedrino tinctum, ad os uteri apponat. Aliud. Calamum odoratum, & cucumeris sylvestris medullam cum adipe anserino terito. Deliget autem umbilicum, & pectinem, et de hoc modicum lane instillatum ad os uteri apponat. Et ab hoc paulatim extrahetur. Aliud. Rubiam, & cedri ramenta contrundito, et aqua assisa sub dio per noctem exponito. Deinde mane ad dolores partus exhibito. Aliud. Sulphii drachmam unam, et potri succi acetabulum, cedri olei dimidio cyatho parvo ammixto, bibenda dato. Aliud. Tauri fel oboli unius, aut semiboli pondere, in vino terito, ac exhibito. Aut fermento oblitum, torrefactum, devorandum dato. Aliud. Canceris fluviatiles quinque, et rumicis, ac ruta radicem, et fuliginem de furno, omnia simul trita, et cum aqua mullis unita, sub dio per noctem exponat, et jejuna ter bibat. Aliud. Cucumeris sylvestris modullam tritam, in cedrina pice lane involvito, et cum filo ad penitiam feligato, apponat autem intro, ita ut penne dura pars paululum foras promineat ex lana. Quam autem sanguis apparuerit, amoveatur. Aliud. Veratri nigri virgulam longitudine sex digitorum lane obvolvito, extremam vero ipsius partem nudam finito. Deinde quammaxime intro apponat, et ubi extrema parti cruentata fuerit, amoveat. Aliud. Veratrum nigrum, et cantharides, et conyzam in aqua terito, et glandulam mollem sex digitorum longitudine efformato, siccato, et ubi dura facta fuerit, lane involutam apponat. Summam autem partem cedria illinat, sique ipsa nuda. Quam vero sanguis apparuerit, amoveatur. Aliud expulsiorem. Si foetus mortuus, aut syderatus metus fuerit, ramunculum, et clateris parum in aceto meraco misceto, ac bibendum dato. Aut brassicæ tener coliculis, in summa parte nepro illius, immittatur.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS MULIEBRIBUS

LIBER II.

Argumentum in Librum sequentem.

1. *Asterismi fluxus albus, fulvus, & ruber quibus magis, & unde fieri, & eius signa.*
2. *Fluxus inchoantibus prædicendum. Diata in fluxum constantio. Subitantes. Petiores.*
3. *Spirandi difficultas in fluxu rubro.*
4. *Quæ circa fluxum curationes consideranda. Supercubida. Nigra. Vini colorem referentes. Favercula. Anicula. Asedia.*
5. *De fluxu in utero signis, causis, & curatione. Fumus a fluxu utero sedato.*
6. *Fluxus ruber qualiter fiat, & eius signa.*

Alipp. Opera.

Quæ, & quando possimum introdat, & de eius curatione.

7. *Sanguis fluxus ab articulis, a partu, a labore corrupta. Suffens ad uterum. Obstruenda de diluili olearii. Sordes effluvia sullorum. Serpentiis fruent.*
8. *Fluxus fulvus, & eius curatio. Diata constantio.*
9. *Fluxus albus, & eius signa, & curatio.*
10. *Fluxus albi alterius curatio, signa. Adcom.*
11. *Alus fluxus, & eius curatio.*
12. *Alus fluxus velut ex oco erudo, lintem subalbidum, & eius curatio.*
13. *Fluxus albus, & eius causa.*
14. *Purgatio velut a caribus effluviis, & eius causa.*

R 4

- caussa, & curatio.
- 15 Sanis fluxus curatio distorta, & sine
caussa.
- 16 Uteri ad caput conversi signa, & curatio.
Uteri ad cor propositi signa, & curatio-
nes.
- 17 Uteri ad praecordia allapsi strangulantes si-
gna, & curationes.
- 18 Uterorum ad praecordia consistentium signa,
Dignitatem, Exacerbationem, Pluram adeps.
- 19 De uterorum ad depar conversorum signa, &
curationibus.
- 20 De uterorum circa latas inflammatorum signa,
& curationibus.
- 21 De uterorum ad latera allapsorum signa, &
curationibus.
- 22 Uteri in lumbis, aut lateris molliedine
Glandula subditi. Uteri in se ipsos de-
valui ad intermedia lumborum, at con-
zarum partem.
- 23 Osculum alio inclinatum. Uteri ad coxam
allapsi signa, & curationes.
- 24 Cancerorum uterorum signa, & curationes.
- 25 Fomentis uterorum motus. Dieta. Solu-
dia.
- 26 Osculum uterorum, quod aperiri non potest.
- 27 Quia uterorum inflammatus.
- 28 Fomentum ex succulentis. Dieta. Scopia
cruda.
- 29 De uterorum ad coxam inflammatione signa,
& curationibus.
- 30 Ex parte morbus. Urina totum ad uterum
fontem. Steriles ex uteris ad coxam
decumbentibus.
- 31 Uteri ad coxam curatio.
- 32 Uteri pauperes ad coxam, aut lateris molli-
tutinem incumbentes, curationes. Uteri
loco moti quomodo curandi.
- 33 Quibus pharmacum siccum, aut densum
purgant, & quando exhibendum. Uteri
ad sedem conversi curatio.
- 34 In inguina, & supra montem incumbentes,
& eius curationes. Quovis occasio uteris
propellere potest, si quid mali habeant.
- 35 Uteri circumverso ex parte ad dexteram par-
tem propositi, purgantibus non fluentibus
signa, & curationes. Uteri ad sinistram
partem, & coxam inclinant signa, &
curationes.
- 36 Uterorum transfusum stercum signa, & cu-
rationes.
- 37 Uterorum extra naturam propositorum signa,
& curationes.
- 38 Uterorum pedibus extra pudendum clapsorum
signa, & curationes. Uteri uterum, pi-
cato curatio, illitio.
- 39 Quia uterorum extra pudendum clapsorum, caus-
sa.
- 40 Uteri extra prominentes multo tempore, &
inflati. Uteri scilicet compuncti signa, &
curationes.
- 41 Uteri ulcerati, & extreme foras propositi.
Pudenda in actionem contrahit. Uteri in lo-
co non moventes, sed modo hic, modo il-
lic transmutati.
- 42 Uteri clapsi. Uterorum ad crura, & pedes
conversorum signa, & curationes. Vocis
privatio in eis.
- 43 Uteri sentiri, & aliqui allapsi. Ovesis-
- mes, per quas uteri moriuntur.
- 44 Uterorum inflammation signa.
- 45 Uterorum velis in callum induratum signa,
& eius causae quae.
- 46 Uterorum obduratorum signa, & curationes.
- 47 Quia uteri genitum cum non suscipiens.
- 48 Uterorum durorum, & ad pudenda excreantium
signa, & curationes. Oris uteri duri si-
gna.
- 49 Uterorum convulsorum signa.
- 50 Oris uteri conclusi signa, & curationes. U-
teri conclusi ventibus non comparantibus.
- 51 Uterorum grammorum signa. Uterorum praeter
naturam biantium signa, causae, &
curationes.
- 52 Oris uteri amplius biantis, quam in mensu-
bus solet, signa, & curationes.
- 53 Uteri non conclusi. Uteri magis, quam con-
suevit, aperti.
- 54 Uterorum inflammatorum signa, & curationes.
- 55 Uterorum inflammatorum alia signa.
- 56 Uterorum corruptionem, ac vitiatum signa,
& curationes.
- 57 Ad delovem uterorum infusio.
- 58 Agnis sacri in uteris signa. Tumores fluidissi-
mi a pedibus eorum signa ad uteris. Agnis
sacri in uteris signa, & curationes.
- 59 Aqua interius in uteris signa. Adenses in-
tensis. Semine per fontem a muliere ef-
fusio. Substitutio.
- 60 Alia aqua interius uterorum, & eius cura-
tiones. Eclogia, quod delingit ad
quam interuenit.
- 61 Ventis in uteris signa, & curationes.
- 62 Agilis in utero a crassa puriora latus reco-
to. Ventis, & geniture in uteris signa, &
curationes. Mulieres valde attenuatae
rara sunt, & abeunt.
- 63 Uterus genituram non suscipiens. Peloris.
Causae.
- 64 Aqua bilis in uteris signa. Plava bilis mi-
lis. Plava in uteris signa.
- 65 Dentifricum ad oris medietatem, gingi-
vis malis, ac preteritis. Caput leporis.
Adges. Pharmacum densum purgans, &
bene oleum faciens. Indicum medicamen-
tum.
- 66 Admensis asperis quomodo medendum. Asca-
vidi in pudenda mulieris, aut infans
restito.
- 67 Ad faciem ornandam. Herbar tauri. Ad
lentiginem, rugas in facie levigatis. Ca-
pillorum desolatum. Calvis ad pilos pro-
ducendum. Stercus columbinum.
- 68 Ad maculas solares. Ad impetiginem.
- 69 Potiones fluxui rubro committit.
- 70 Potiones ad fluxum, & humores vitiosos, qui
ad uteris fiunt. Sanguinis fluxus, ex u-
tero.
- 71 Ad fluxum, & alvum. Emari fluxuales
vino suffocati. Aduli steres. Spongia
combusta.
- 72 Fomenta ad fluxum.
- 73 Collationes ad fluxum.
- 74 Sufficit ad fluxum. Caput pilorum sordes cum
co sedem.
- 75 Ad fluxum rubrum subtilitatem. Ad fluxum
refrigerandum.

- 76 Ad aqua fluxum ex potendis subactum, & usque. Chena. Pelliculis pro fluxu a quo dolo.
- 77 Fluxus sanguinolentus, aut albus.
- 78 Uterorum strangulatio, & arandum suffocatio. Uteri suffoco progressi. Uterorum strangulatio intra.
- 79 Uteri ad septum transversum, & praecordia. Ex lana aspersa suffocati. Uteri transmutatio moderata.
- 80 Cordis strangulatio. Uteri in lumbis inrambentes.
- 81 Penes in utero, Uteri transmutati praecordia, & strangulantes. Cuius scilicet in suffocatio.
- 82 Uteri strangulantes, strangulatione ex coarctatione. Uteri ad hepatis progressi. Uteri ad aqua inrambentes, Suffocati. Quercus siliis, Picea pulvis.

- 83 Uterorum functione. Uteri extra prominentes, & dependentes.
- 84 Uteri nullitoria. Subactio mollis, quae aqua ducant, & natus & pelliculas, & non exalcerant.
- 85 Ex uteris educata. Sanctorum cruciatum educata. Adori videri.
- 86 Atollitoria. Fomenta ad uteros purgandos.
- 87 Dolores repentinus, & animi deliquia.
- 88 Urina stilliditum, Strangulatio in uterorum dolore.
- 89 Ad uterorum dolorem. Aliud fomentum fortius ex bitumine, Uteri dolor. Uterorum morbi curatio.
- 90 Collatio. Infusum mensura.
- 91 Potenda ex fervida, ac suspensario ulcere exalcerata. Urina stilliditum. Penes in utero.
- 92 Collatio, & ulcera in potendis.

SECTIO I.



LUXUS albus in senioribus mulieribus magis fit, quam in junioribus. Fluxus sylvius in utrisque. Fluxus ruber in junioribus. Et ruber quidem fluxus fit ex febre. Magis autem ex abortu. Fit & ex mensium interceptione, quum coacti derespente eruperint. Fit etiam ex partu, & febris, & sanguis profuit valde multum, & grumi excidunt. Et dolor fit clavicularem, ac tendinum, & corporis corpor, & crurum perfrigeratio. Aliquan-

do vero etiam nasus effundit ad dentes, si amplius sanguis discesserit, & sudor multus diffunditur. Ad huc & stomachi morbus sunt, & perfrigerationes, & febris bilis merace, ac pruriginosa, & eadem die saepe rigent, & corpus sudant, & aliquando a suprenis locis convulsionem ipsis sunt, aliquando ab inferis, & ad inguina dolores acuti, ac fortis irruunt, procedentes velut dolores partus. Quandoque etiam urinae stilliditum adest, & os siccatum est, & siens premit. & lingua aspera est, & digiti pedum magni contrahuntur, & ad furas semper cum semore distenduntur. Et lumbi dolore venantur, & manus nervorum anteriorum, ac posteriorum distensionem fieri solent, a claviculis juxta iugum, ad maxillas, & linguam. A talibus vero paulo post retrosum, a reclinibus juxta spinam, ad lumbos, atque sic per violentiam perent. Prædicere igitur oportet fluxibus inchoantibus, & diartem constituere hoc modo. Mane quidem dandum est phatnacum ad fluxiones ex his, quae ego describam, quocumque maxime opus habere vis fuerint. Dandum autem & iter, & quater, si multus sanguis discesserit. Diarta igitur constituatur, si quidem sine febre fuerint, ex cibis. Si vero febricitant, ex sorbitionibus. Sunt autem ex sorbitionibus haec commodissima, panicum, lenticula, farina horni, ac recentis castici cocta, alia cocta sorbilis. zea cocta. Ex porcionibus vero polenta pollen in aqua, & ramenta a panibus derasa cocta. Et polenta recentes tenues in aqua madefacta, quas etiam insulas delingere prodest. Ex cibis vero panis exsiccatus in cinere. Oblonium autem sit leporis cito, & columba, ac palumbus cocta, & allata. Et hoc di caro assata, nullo assensio condimento addito, sed ut in acetum saltem intingant. Hepar item caprae, aut bovis in cinere assatum. Ovi tenue, aut ipsum luteum. Calfus insulsus. Ex oleis autem nullum gustent, neque coctum, neque crudum. Præ balneis abstinant. Et manus ipsis deligato, ita ut lana sordida ipsis circumdant, & laqueum immittas supra cubitos, & ad poplites supra genua. Et cum cucurbitis sub mammis affixis, ipsas elevato, modo ad dextram, modo ad sinistram partem translati. Si vero spirandi difficultas oritur ad cucurbitae admotionem, cucurbitam amoveto, sanguinem autem ne detrahit. Verum subditit utere, quae ego describam, & ad sistendum sanguinem in talibus sunt apta. Et si qui tem ex fluxionibus mulier evaserit, ubi multus sanguis discessit, & color est exalidus, & facies elevata, & sub oculis tumores laxi, & crura turgida, & uteris humidus, ac semper præter rationem hians. Et quae discedunt, aquosa sunt, velut a crudis carnisbus succus. Talibus, si robuste fuerint, vomitus ceter oportet, jejuniis, & post vomitum prandium exhibere. His conducit modicus cibus, Vinnum nigrum meracius. Illurves, aut frigida lotio. Deambulationes. Semel in die cibum capere, omnis refectio. Si vero ad haec non sedentur, neque coquant uteri, nequa fluxionibus liberentur, respectu virum corporis habito, si quidem robusta fuerit, veratrum dare oportet. Si vero non obediatur, caput purgare. Facta autem purgatione, per diartem reliqua

- curate eodem modo velut circa steriles. * Considerare porro oportet etiam natura-
 5 mulierum, & colores, & aetates, & tempora, & locos, & ventos. Aliæ enim frigida, aliæ humida, ac fluida, aliæ calide quidem, sicciores autem, & stabiles sunt.
- 10 Nam quæ supercalide sunt, humidiores sunt, ac fluidiores. Nigra vero sicciores, & acerbiores, ac adstrictiores. Quæ vero vini colorem referunt, medium quiddam inter utraque habent. Sic autem & in aetatibus contingit. Juuencula enim humidiores sunt, & multo sanguine plerumque referta. Anicula vero sicciores, & modicum sanguinem habentes. Mediæ vero medium quiddam inter utraque habent, ut quæ
- 35 nunc æquales exsistunt. Oportet autem eum, qui recte hac tractare volet, semper mulierum naturas discernere, et temporum occasiones, et aetates, et tempora, et locos, et ventos. * Si fluxus in utero obortus fuerit, sicut multus fuit, et graui compacti excidunt, et dolor occupat lumbos, et laterum mollitudinem, ac inum ventrem, et durus est venter, et ad contactum dolet, et rigore, ac febris acuta corripit, et debilitas oboritur, et omnia præter humeros, ac scapulas dolet, et calor invadit, et rubescit, et venter durus fuit, ac renitentes. Morbus hic maxime fit ex abortu. Fit, et quum menses multo tempore recentel dormiente eruperint. Huius, ubi sic habuerit, grossum siccum coenulum, ac cribrarum in linteum alligaro, ac apponito, et imo ventri perfrigerantia imponito, cavens, ne horreas. Postquam autem fluxus decreverit, oleæ sylvestris folia in acerrimo aceto coquat, eoque pudenda perluat. Bibat autem vinacea, et rhoem rubrum in aceti acerrimi hemina dimidia coquat, et co-
 60 pudenta perluat. Aut mora tubi rubra siccata, ac grana cum farina recentis, parti porzione mixta, jejuna bibenda dato. Si vero fortius facere voles, duobus farinæ partibus ammixtis, bibendum dato. Et ne lavetur. Cibus autem utatur siccus, et vino nigro vinoso. Si vero intumuerit, fluxum iam sedato, pharmaceum deorum purgans bibendum dato. Post pharmaceum autem uteros grossiorum decocto colloito, et postea acerbam infundito. Si vero his factis, humecta fuerit, suffragio faciat, donec refecerit. * Ruber fluxus fuit talis, qualis sanguis victimæ recentis mactatæ, et grani pellucentes. Aliquando vero etiam fluxum rubrum emittit, et venter inus artollitur, et attentariur, et impotens fit, et indurescit, et ad contactum dolet, velut ulcere præ-
 75 sente, et febris habet, et dentium fremitus, et dolor ad ipsa pudenda, et pubem, et lateris mollitudinem, et lumbos, et tendinem, et ventrem, et pectus, et scapulas irruit. Et alias omnes partes dolet, et impotentia, ac pusillanimitas occupat, et color mutatur. In principio quidem morbi hæc corripitur. Si vero hæc omnia moram trahant, adhuc magis debilitatur, et manifestus est morbus, et cavæ partes artolluntur, et pedes intumescunt. Morbus hic ex partu maxime corripit, si quid in ipsa dilaniarum non prodierit, sed totus computruerit, et coetus exasperatus fuerit. Hanc si in principio conigerit, spongiam humectam ipsi adhibeto, quum fuerit dolor. Aut linteum tenne molle rasum, aqua frigida madefactum, ventri imponito, et aqua per-
 85 fundito, et lectum a pedibus altiore facito, atque sic insisterito, et ad menses cientes medicamentum quodcumque magis admiserit, bibendum præbeto. Apii semen correto, tundito, ac cribrato, et erysimum similiter, et pepuli semen cum polenta cribratum, et urtica semen similiter, et scabium oleæ sylvestris, et gallam, et rutam, et origanum, et pulegium cum polenta cribrato, ac misceto, potentiam vero grassam torreto, et triticeam potentiam commolito, et cascum caprinum sordibus derafas, et de aliis quidem singulorum æquales portiones misceto. Origani vero, et rutæ, et scabii, et gallæ dimidium. Hæc jejuna ante motum bibenda dato. Miscere vero etiam oportet ad usum, si æriora prodierint, et cyceonem exhibere. Et de pharmaco quidem parva una sit, et casci una, et una potentia. Ad vespertam autem melle ammixto bibenda dato, et donec quidem principium morbi fuerit, et sanguis nullus prodierit, et modico tempore infermiserit, et dolores acuti tenuerint, hæc facere oportet. Si vero sanguis paucior fluxerit, et per brevius tempus ea, quæ decurrim, aut sursum ducunt, bibenda dato, et pudenda lenibus somentis foveto, prout semper opportunum visum fuerit, et zeam una cum cortice fractam, et grossos liccatos, tulos, ac cribra-
 100 tos, et oleæ rosa similiter, singulorum parvas portiones in cataplasmate adhibeto, et lac bubulum coctum, aut crudum bibendum dato, respectu ad id, quod recte habet, facto, et prout opportunum esse visum fuerit, et videtur morbus hic debilis, ac lethalis esse, et pauca ex ipso effugiant. * Quum mulieri sanguis ab articulis fuerit, a partu, aut a sabore corruptus, quidam putant ex medicis hoc fluxum esse. Est autem aliud. Nam hoc, quod ex articulis, et ex lumbis, ac coxendice aliud est, glutinosum est simul cum sanguine. Illud vero, quod ab utero, et cavis venis fuit, sanguis purus est. Hanc suffice oportet hoc modo. Zea fracta semodium aceto modico subm-
 105 to, ut ne per totum uteros humectet, et sulphuris vivi semibolum ad zeas tritas ammisceto, et aceto subacta per noctem finito. Mane vero multo igne accenso, obturamenta de dolis oleatis imponito, et lorde offusæ fullonum, et serpentis semen ammisceto. Mox autem multum ignem tollito, et non urito, sed maxime suffumigare facito. Oportet autem fellam perforatam adesse, et mulierem vestibus coniectam insidere, ut eo quid præterspiret. In ignem vero medicamentum cum aceto præparatum inspergito, neque de semine serpentis, sed et myrrha ammixta sufficit, ut
- 115 suffra pudendorum cruciantionem sedet. Si vero satis habuerit, erysimi semen tor-
 relatum

8 *refectum ternis, & in vino exhibeto.* * Fluxus ulvus fiat velut ex ovo vitioso mulcus, et graveolens, et uteri inflammantur, et dolor ex lumbis, et sanguibus emergit, et prodeunt multa sunt, et si non liberetur, celesset fluenta. At etiam si tempus accedat, quæ resstant, putrefacit, quammaximè id fieri potest. Regerim, et velut a caribus allatis humor defluit, et cum his simul febres, fortes, ac rigores fiunt. Ex huiusmodi viroribus multa pereunt, pauca effugiant, et si quidem in principio accesseris, sic curare oportet. Si sine febre fuerint, ac robusta, veratrum ipsis dato, et intermalis trabis, aut quatuor diebus, pharvacum deorsum purgans exhibito. Post purgationem vero sic diætam constituere debes, quo fluxiones aequales sint, ac tenues. Mane quidem jejuna pharvacum aliquod ex his, quæ ego describam ad fluxum, ebibendum dato in vinum inspersum. Post pharvacum autem alia diætâ curato. Uteros vero sic curato. Si quidem inflammari facine, ac conchis, fomenta adhibere oportet mollia, donec os uterorum molle fiat. Post fomenta, infusus, qualibus opus habere visæ fuerint, colluto, sive magis purgantibus, sive mollioribus. Post collutiones mollitoria apponito. Si vero non facile solubile sit osculum, foveo, et subditiis mollito, quæ ego describam, donec apertum fuerit. Quod si ad hæc fluxiones non sedentur, caput purgato, et sic victus rationem constituio. Si quidem sine febre fuerit, asinum lac bibat, et oleribus coctis hortensibus, ac sylvestribus utatur, excepto alio, porro, brassica, et raphano longo. Ex marinis autem rasa levi, scorpio, congro, topedine, anguilla, passete, gobio: coquere vero oportet cum cepis, et coriandro in muria dulci, ac pingui, ita ut probe percoquantur. Ex earibus autem maxime suilla, deinde agnina, aut ovilla, coctis potius quam allatis, et ipsarum jusculis. Vino vero albo mellei coloris, aut aquoso. Balneis autem non valde calidis, neque multis, excepto capite. Si vero ex hac diætâ ab ulceratione, et inflammatione liberentur, humidum vero sint uteri, pro balneis quidem, illuvie, pro fulvis autem vinis, nigris, et pro aquosioribus, meracioribus, et pro polenta panibus, et pro piscibus caribus allatis, et omnibus cibis siccantibus, quibus sane in alvi profluvio utimur, a collutionibus autem omnibus abstineat, excepto vino, et aqua. Suffusus autem fiat per additgentia. Optimum autem esset, si conciperet. Si vero juvencula fuerit, frequenter jejuna vomat, et postea parum prandeat. Atque hæc harum fluxionum diætâ est. * Fluxus albus sicut, velut alba alini urina, et in facie sunt tumores albi, et partes ambæ sub oculis tument, et hydropiformes, ac non valde bona specie præditi sunt oculi, et splendor abest, et lachrymosi sunt oculi, ac hebetes, et color corporis exalbidus, ac pustulosus, et venter imus tumidus, et in maxillis pustula paulatim rubentes, parvæ, aquosæ, ac malignæ, et in cruribus tumores laxi, et si præsseris digito, notæ imprimuntur velut in fermento, et os saliva impletur, et stomachi motus percipitur, quum jejuna fuerint, aut etiam vomuerint velut acidam aquam, et si adacclivem locum procedat, anhelatio citius corripit, et strangulatio, et crurum perfrigeratio, et genuum impotentia, et in ore ulcera fervida, ac superficiaria, et uteris præter rationem aperitur, & ad osculum procidit grayis veluti plumbum. Et dolores per femora tendunt, & omnia inferna perfrigerantur, ab uno ventre inchoantia usque ad pedes, & plantæ torpent, ac ingredi non possunt. Tales difficile est a morbis liberare. Nam & arare procreta sunt, & afflictiones confescent, nisi casus aliquis spontaneus forte fortuna allapsum ipsas solvat. Has exaurire oportet, quum redundarint, per pharvacum, quæ bilem flavam non purgant. Sed utinam clementia his pota conferent, & capris purgationes, & illuvies, & epithymi albi potus, & decambulationes, & omnis ressecatio in victu. Hæc ubi fecerint, sane quidem penitus non sunt, facilius antem degunt. * Fluxus albi alteriuscutio. Purgatur album subluteum, & quum tingit, morsum percipit, & lancinatur, & uteris ulceratur, et febris corripit acuta, et calor multus, sitis, vigilie, et mente moventur. Et quum aliquid festinanter egerit, anhelatio ipsam invadit, et membra exolvuntur. Hanc mecona, hoc est peplum album bibere oportet, et urtica senem, et quod præstat, mali punice dulcis radicem, et rhoem, ac gallam. Hæc in vino acerbo bibenda dato, & mali punice succum, aut caseum caprinum ammiscito. Sinter autem suffro zeam, et grossos hybemos, et olea folia, et scabiem ejusdem, et cucumeris sylvestris cortices ex tertia parte, reliqua paribus porcionibus. Sorbeat etiam olea cocta, et sorbitiones ex amygdalis, et sesamo, et gesseretur, ac eurus vebatur, et non quiescat. * Alnus fluxus. Defluit multum velut otina ovilla. Color est albus, & tota intumescent, et in tibiis eminentiæ laxæ, et rubicundæ emergunt, et si digito attingas, nonne foveas præ se ferentes tibiis, ac pedibus imprimuntur, et si quid edat, impletur, ac inflammatur, et ubi iter fecerit, et opus aliquid obierit, anhelatio, et dolor ipsam corripit, et color albus, quandoque subluteus. Huic, si robusta, et juvenula fuerit, et alia apparuerint, ab initio pharvacum sursum, ac deorsum purgans bibendum dato, et caput purgato, si pituirosa est, per ea, quæ pituitum purgant. Si vero biliosa, per ea, quæ bilem, et si tempus anni fuerit, et a natura non est lienosa, et si quid ex relictis fuerit, serum dato. Decoquatur autem hoc, et bibat quamprimum tempore, et ad vesperam vinum dulce aquosum, si opus habuerit. Cibum vero ne contingat. Si vero debilis fuerit, sorbitione modica utatur, et non lavet. Postquam autem tempestivum esse tibi videbitur, a potu cesset, et post purgationem cibis utatur, ita ut abstineat a pinguis, &

- 185 bus, & acerbis, & dulcibus, ac salis, & ab oleerbis acerbis. Utatur autem piscibus periosis, & carnibus ovillis, aut volucrium, pane frumentaceo, aut ex hordeo yselo, & oleerbis coctis utatur, & sylvestribus, quæ cruda eduntur, itemque hortensibus, acerbis exceptis, & deambulet mane, & a cibo. Ubi vero his factis siccior esse visa fuerit, uteros fere vini colluito, & tribus, aut quatuor diebus interpositis, postea acerbis infundito, & intermissione facta, si quidem siccata fuerit, quiescit. Et si natura fuerit biliosa, aut pituitosa, a victu vero, & pharmacorum potione attenuata, & se recolligere non poterit, lac bubulum bibat per quadraginta dies, residuum de vacca. Præstat tamen pituitosam cibis quampancissimis uti, quamdiu lac biberit. Sit autem mensura sex heminarum Atticarum. Incipiatque a duabus, & singulis diebus unam apponet, donec sex fiant, & inde paulatim ad duas rursus descendat, & post lactis potum cibis resisto, & per victus rationem, & post lactis potum, mane jejuna adiantum bibat: hoc siccatum, tufum, & exacte eribatum in vino nigro odorato diluto exhibeto. Si vero revertatur morbus, totam ipsam fovero, & rursus phatmacis infra purgato, & postea uteros colluito, si quidem natura fuerit pituitosa, per cnidium granum, aut thapsiæ radicem. Si vero biliosa, scammonia succo, aut colocynthide sylvestri. Hanc enim conjectam, duabus aque heminis affusus, coquere ad dimidias oportet, & huic mel, & oleum narcissinum, aut anthinum ammiscere. Sit autem mellis quadrans heminae, olei vero hemioliolum mellis, hoc est mensura ipsius tota, insuperque dimidia. Postea vero colluendum est melle, & vino, & oleo solo, & suffusus adhibendi, & tribus, aut quatuor diebus quiescendum. Bibat autem adiantum, & si in ventre non conceperit, morbus revertitur, & si morbus revertitur, perit. Quam vero seniores morbus hic corripuerit, etiam uteri computrescunt. Valde vero paucae evadunt. * Alius fluxus. Purgantur velut ex ovo crudo luteum subalbidum, & ulcerat pudendum, & tumet pedes, ac tibias, & cava oculorum partes
- 190 intumescunt, & oculi humidi, ac lachrymosi sunt, & si iter faciat, anhelatio ipsam corripit, & debilitas oboritur. Si vero evaserit, morbus pituitosus fuerit, & si non purgata fuerit, febricitat, bile vehementer commota. Seniores autem hic morbus magis invadit, quam juniores. Quam sic habuerit, si quidem vehementer intumuerit, pharmacum deorulum purgans bibendum dato, quod pituitum, & bilem purgat. Si vero non
- 205 fortiter intumuerit, & pituitam ipsam prelerit, pharmacum sursum purgans dato, & si quidem potens fuerit, veratro purgetur, sin minus, pharmaco, quod bilem, & pituitam ducit. Post pharmacata vero serum coctum bibendum dato per plurimos dies cum modico sale. Edat autem insuper mentam. Ad vesperam cibum ne attingat, sed modicum sorbeat, & vinum dulce insuper bibat, si opis habuerit. Si vero non affuerit serum, lac aluminum coquito, & exhibeto per quatuor dies. Ad vesperam vero eadem faciat, nisi febris noctu corripiat. Si vero natura fuerit lixiosa, aut statiosa, & exanguis, neque serum, neque lac bibat, sed purgantibus inferne purgato, & ubi tibi tempestivum visum fuerit, uteros colluito primum quidem medicamento ex vini fecibus, aut ser, post hoc, scammonia succo. Affundito autem ad hunc, vinum dulce, heminae
- 210 Atticæ mensura, & olei narcissini maxime quartam heminae partem. Postmodum vero cum vini hemina colluito, & mellis quarta heminae parte, & resinae tertia mellis parte. Okum autem sit mellis æquale. Si vero ea, quæ ab infusa collutione secedunt, prodierint pituitosa, etiam rursus colluito, interpositis tribus, aut quatuor diebus. Postea grani cindii duas potiones decorticato, & ipsas infundito. Si vero non affuerit cnidium granum, radium thapsiæ potione unam infundito, & postea usdem colluito, postquam autem purgata fuerint ea, quæ secedunt ad has collusiones, & si prodierit aliquid cruentum velut ab ulcere, per acerbam postea colluito, & si post hæc, ipsa interrogata dixerit, os uterorum durum esse, & dolorem habere, eodem modo eo quod paratur, cum buryro colluito, donec uteri fuerint resicati, & sana esse videbitur, diebus vero inter collusiones intermediis, sambuci fructum bibat, & leporis coagulum, & pepuli corticem, & urticae semen, & malpunicis dulcis corticem, ita ut de singulis partes portiones terat, & polentam, ac adiantum ammiscat, & in vino nigro odorato jejuna bibat, cibis autem utatur mollibus, non salis, necque acerbis. Carnes autem præstantiores sunt piscium, aut volucrium, aut leporinae, & lavetur calida non multa. Si vero non quiescat fluxus, sed relinquatur, & uteri humescant, medicamentum ex malicorio suffuso, & postea virum accedat, & si in ventre conceperit, sana evadit. At seniores a morbo levati non possunt, sed pereunt præ debilitate. * Fluxus alius. Fluit subluteum velut ex ovo, & viscosum, & venter inus intumescit, ac durus fit, & si contingas, dolet, & dentibus stridet, & febris occupat, & dolor ad pubem, & ad pudenda, & ad anum ventrem, & ad humbos irritat, & animi deliquium, & anxietates, & perfrigerationes, & sudor multus, & pulsus ad manum accelerantes, debiles, deficientes, & statim pereunt. Si vero superflues manserit, & color ipsi mutantur, & sit velut favus, aut cera, & si corpus digno prematur, mollescit, & notæ velut in massa farina subacta fermentum imprimuntur, & pedes intrumescunt, ac crura. Hic autem morbus fit maxime, si in ipsis aliquid dilaniarum fuerit, aut in eis computrescit in partu. Seniores autem magis afficiuntur, & humilioris morbus non est valde levis. * Alius fluxus. Purgatur velut a carnibus assatis humores, & pudendum exulceratur, & ad quamcumque aliam corporis partem

- destillavit. Ex rigor, & febris acuta, densa, magna, & simul horror corripit. Do-
lores autem, quales in omnibus fluxibus. Hæc tota intumescit, & infra umbeli-
cum, & eruribus; & color fit morbi acuat. Talis autem fluxus ex hoc fit. Postquam
sanguis exhaustus subbiliosus factus fuerit, & non fuerit purgatus. Quum sic ha-
buerit, pharmacum bibere oportet. Si quidem fortis fuerit, ex veratro. Si vero de-
bilis, radicem, & elaterium, & posteriore tempore lac caprinum. Aut pharmacum de-
oriorum purgans dato, quod bilem, & pituitam ducit. Uteros autem medicamento cum
brassicæ decocto parato colluito. Bibat autem salivam, hypericum, apii semen, sin-
gula in vino nigro austero. Jejuna autem hæc bibenda dato. Si vero ulceratum fue-
rit pudendum, postea butyro colluito. Deinde pharmacum bibendum dato, & ulce-
ra butyro, resina, myrrha, flore argenti illinito. Perluantur autem myrti, ac salivæ
ex aqua decocto repido. Cibis utatur neque salis, neque acris, ut ne inordax uri-
na fiat, & a marinis prohibeatur, & carnibus bubulis, & ovillis, ac porcinis. A-
liis autem carnibus utatur coctis. Edat etiam panem, & vinum vetus odoratum ni-
grum bibat. Si vero hæc fecerit, & sana non fiat, totam fovero, & postmodum phar-
macum sursum purgans dato. Deinde intermissione facta, rursus quod infra pur-
get, & si quidem manifest fluxus post pharmaca, decoctum serum quotidie biben-
dum præbet. Vespere vero sorbitionibus, & vino dulci albo utatur. Si vero non
assuerit serum, lac asinum coctum per dies quatuor bibat. Ad vespere autem isdem
utatur. Postea per dies quadraginta lac bubulum calidum bibat, & per diem subil
edat, ut ita dicam. Optimum enim hoc est. Nam & purgatur, & nutritur, & fluxus
obundat ab humilimodi lacte. Vespere vero coctæ carnis volueris modicam
assatam, & panem modicum subcineritum. Bibatque insuper vinum nigrum vetus vino-
sum, quamdiu lac hiberit, si multa prodierint, & acrimonia vexarit, & si his factis
in ventre conceperit, sana fit. Quicumque vero seniores sunt, in his morbus quan-
doque revertitur, & percutit. Juvenculis autem non est lethalis. * Diuturna porto
est saniosi fluxus curatio. Fluit autem talis subcreuitus velut a carnibus affatus hu-
mor, & mordet velut muria, & corripit, ac exulcerat pudenda, & uteris exulce-
ratur circumcirca, et femora, & alia partes, & ubi super vestes destillat, tinguntur,
& ære ejus polluit, & venter attollitur, ac durus fit, & ad contractum dolet, & calor
corripit, & dolor ad pudenda, & sedem, & inum ventrem, & laterum mollitudinem, & co-
xas, & lumbos irruit, & imposita adest, & color mutatur, velut morbi acuat. Si
vero tempus, & morbus producat, hæc omnia amplius corripit, & cavæ partes
attolluntur, & pedes tument, & crura a lumbis. At hæc morbus corripit, ubi quidde
fectu dilaniatum fuerit aut in abortu, aut in partu. Oportet autem fomenta adhibere,
& suffire, & bibenda præbere omnia ea, quæ fluxum sistunt, & lac asinum, & alia exhi-
bere, & vomere, si opus fuerit. Si vero sine febre fuerit, & debilis febris habuerit,
siccum fomentum adhibere melius est. * Quum ad caput conversi fuerint uteri, &
hæc parte suspensio desinit, caput gravat. Verum aliis alicubi alias finis habetur.
Signum autem hoc est. Venas in naso, & partes sub oculis dolere dicunt, & sopor al-
tior tepet, & spumata, ubi levius habuerit. Hanc multa calida lavare oportet. Si ve-
ro non obediatur, frigida etiam circa caput, ita ut laurum, et myrrum in aqua coquant,
ac frigefactas. Utinque autem rosasque caput illinatur, & odorata subter suffiantur,
graveolentia vero sub nares, & brassicam edat, & succum sorbeat. Si vero ad eor
progressi uteri suffocent, & ær impeditus violenter attrahatur, anxia est, & vo-
mit, & quibusdam statim tractus deorsum cedit, & status exit, & aliqua quidem vo-
mit, spumosa, alicui vero quies contingit. Quibus autem non decedunt, his porti se-
men, et populum, trita, et tribus aquæ cyathis diluta, bibenda dato. Auxiliatur et a-
ceri albi cyathus potatus. Aut juniperi spiritum, et salivam dato, aceto, aut vino ad
hæc species amixto. Oportet autem ipsam caleheri. Aut adipem sumere asinerum,
et ceratim resinatam, ac picem in ipso liquefacere, et subditiis glandulis efformare.
17 re. * Quum autem ad præcordia allapsi strangulant, ubi hæc fuerit affectionis solidi-
tas, et vomitus servidus acris corripit, et modico tempore mitior fit, et dolor ad
caput, et ad collum penetrans. Tepefactorius igitur apponito, si sursum strangu-
larint. Sub nates vero graveolentia suffro, sensum progrediendo. Si enim acerva-
tum uteri infra decedunt, turba oboritur. Odorata vero inferne, et castorium, ac co-
nyazam bibenda dato. Quum vero deorsum tracta fuerint, abomanda subter suffro,
sub nates autem odorata. Si vero dolores quieverint, pharmacum deorsum pur-
gans bibendum dato, et postea lac asinum, aut serum bibenda præbet, si non he-
nosa fuerit a nativitate, aut exanguis, aut decolor, aut aurum sonitus habuerit, vel-
ut hæc, quibus propter cognationem morbi a juventute sunt familiares. At super-
num ventrem ac movero, cecutient enim, aut circa fauces turbationes, et alia in-
festabunt. Verum prænata succum dato. Si vero etiam valde facilis sit ad vomitum, vomat.
Collusio autem optima est ex narcisso. Subditivum vero id, quod ex cantharidibus
18 preparatur. * Quum uteri apud præcordia constiterint, suffocatur velut a veratro,
et recta cervice spirat, et stomachus fortiter vellicatur. Quædam etiam vomunt
quandoque salivam acidam, et os aqua impletur, et crura perfrigerantur. Tales, si
non brevi a præcordiis uteri discedant, loqui non possunt, et partes circa caput, ac lin-
guam torpor occupat. Proinde ad uteros quidem lanam quammaxime fieri potest,
ad fora-

- ad foramen apponito, ita ut penna obvolutam, unguento albo, aut *Aegyptio*, aut Bacchario, aut amaracino tingas. In nares vero, de pharmaco nigro ad caput
 225 preparato, specillo exceptum intarcias. Si vero hoc non fuerit, filphii succo nares illinas. Aut pennam aceto tingito, & immittito, nareque illinito. Aut sternutatorium apponito. Quum autem conclusum fuerit oculum, & internus trames, calthorium in vino bibendum dato. Nares vero phocæ adipe illinito. Lanam autem appositam finito, donec conficiant. Quum autem quieverint, auferre oportet. Si vero ea ablata rursus re-
 330 cursarint, lanam rursus eodem modo apponere. Sub nares vero cornu capræ nigrum, aut cervinum suffire, scalpnum, & in cinerem calidum inspersum, quo maxime suffumigetur, & nidorem sursum per nares quammaxime potest, trahat. Suffuso etiam phocæ adipem, prius testæ impositis, ipsaque obvelata, & capite imminente, quo odor maxime ingreditur, ita ut de adipe instilles, & ipsa odorem sursum trahat, os vero
 335 clausum habeat. Et si quidem sursum allapsi fuerint uteri, hæc facere oportet. * Si vero ad hepar conversi fuerint uteri, mulier derepente voce destituitur, & dentes conferti sunt, & color lividus sit. Derepente vero hæc patitur lana existens. Contingit autem maxime virginibus antiquis, & viduis, quæ pepererint aliquando, & viduitatem agunt. Maxime vero contingit omnino non serentibus uterum,
 340 & sterilibus ex partu. Non enim prodit puerperii purgamentum, & non inuemescit uterus, neque molliuit, neque vomunt. Quum sic habuerit, tumorem ab hepate cum manu infra leniter detrudito, & præcordia cum fascia deligato, & os aperito. Vinum vero odoratissimum dilutum infundito, quando sane etiam graveolentia ad nares adhuc, ac suffire convenit; ad uteros vero odorata, & suffimenta, & postquam sic curaveris, pharmacum deorsum purgans bibendum dare oportet, si quidem biliosa fuerit, quod bilem purgat, si vero pituitosa, quod pituitum. Et postea lac asininum coctum bibendum præbeto, & uteros odoratis foveto, & medicamentum, quod cum buprestis preparatur, apponito, postmodum vero netopum. Interpositis autem duobus diebus rursus uteros odoratis colluito, & postea intermissio diei, aromaticis
 345 suffiso. Atque hæc vidua faciat. Optimum autem in ventre habere. Virginem vero persuadeto, ut viro cohabitaret. Ad nares autem nihil adhibeto, neque medicamentum jejuna bibat. Verum calthorium, & conyzam in vino odoratissimo bibat per dies viginti, & caput odorato aliquo ne ungat, neque aliquid odoratum olfaciat. * Si
 350 vero uteri inflammati fuerint circa latus, si contigeris, durum apparet, & quum ad præcordia allapsi fuerint, strangulant, & vomit pituitam acidam, & dentes stupescunt, & ubi vomuerit, melius habere videtur. Quum vero deorsum processerint, discedunt de ventre alias alio. Maxime vero ad laterum molliitudinem quandoque incidunt, et ad vesicam, et urinae stillicidium corripit, et ad sedem, et cacatæ sibi videtur, et menses prius, aut posterius solito sunt, aut non statim huic apparent. In hoc
 355 morbo, si sursum strangulant, tepesfactoria apponito, et graveolentia ad nares suffiso, ad uteros autem odorata, et conyzam feminam, et calthorium in vino jejuna bibat; postquam vero ad naturam suam fecederint, placide suffiso. Bibat autem urinam clementia. Atque hæc faciat, quamdiu dolores tenuerint. Ubi vero quieverint, totam foveto. Deinde pharmacum deorsum purgans bibendum dato, si biliosa fuerit, quod bilem purgat, si pituitosa, quod pituitum ducit, et lac asininum bibendum dato, aut serum capræ decoctum. Si vero lienosa fuerit, lac ne bibat, neque serum, et in purgationibus cibis utatur mollioribus, et per alvum feculentibus, pisces autem meliores sunt caribus, et uteros foveto, aut subditis purgato, ipsosque colluito, et ubi suffrium admisit, ad vitum accedat. Solutio vero morbi contingit, ubi in ventre conceperit. * Si uteri ad latera allapsi fuerint, tussis obinet, et dolor subla-
 370 tus, et insidet uteris durus velut pila, et ad contactum dolet velut ab ulcere, et contabescit, et videtur ipsi peripneumonia esse, et contrahitur, et gibbosa fit, et menses non apparent. Aliquibus autem, quibus prius apparuerunt, etiam pereunt, et si tunc prodeant, imbecilles sunt, et pauci, ac deteriores, et genitura non fit hoc tempore. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, et multa calida lavato, et ex tepesfactoriis quæcumque admisit, adhibeto, et a quibus sanguis purgatur, ea apponito. Et lina semen torreto, tundito, ac cribrato, et pepulum album, et sal-
 375 viam cum tenui polenta, et caseum caprinum, muria darsa. Hæc misce, ut casei sine parte dicit, reliquorum vero, et polentæ non salta pars una, et jejuna in vino bibenda dato. Vesperti vero cyceonem crassum melle affuso exhibeto, et ex poribus quæcumque admisit, bibendum dato. Et frequenter fomentum adhibeto, et calidam aspergito, et per ocratum leniter molliato, ac a latere detrudito, et latus fascia lata deligato. Et lac bubulum quamplurimum ad dies quadraginta bibendum præbeto. Cibus autem utatur quammolliissimis. Morbus hic vehemens est, et letalis, et paucæ, etiam si sic eurentur, effugiant. * Si vero in lumbis fuerint uteri, aut in lateris molliitudine, et spiritus sublimis iverta, et suffocatio habeat, et anhelatio densa ipsam corripit, ac moveri non vult, sulphur, aut bitumen, aut cicutam, aut myrrham terito, et melle cocto affuso, glandulam longam efformato, ac crassam, eamque in sedem indito. Si uteri devolverint se ipsos ad intermedium lumborum, ac coxarum partem, dolor habet unum ventrem, et crura contrahuntur, et
 390 juncturas coxarum ad sedem dolet, et quum alvum exonerat, dolores emergunt acuti,

acuti, et stercus cum violentia prode exiguum, et usina densat, et pusillanimitas ipsam corripit. Quin sic habuerit, stilulam ad vesicam alligare oportet, et oleum calidum in utero infundere. Et fomentum adhibere, aut multa collida aqua lavare, et in oleum, et in aquam descendere. Suffire autem subter pudenda graveolentia, sub nates vero odorata; postquam autem dolor quiescerit, pharmacum sursum purgans dare. Infernum vero ventrem turbare non oportet. Ubi vero uteri, condescerint, pharmacum deorsum purgans bibendum dare, et lac asinum, si non fuerit lenius. Postea fomento adhibere, uterisque aspergite, et subdignum purgatorium, quod cum lauro preparatur, et non mordet, apponito. Deinde aromatis suffusa, ad virum accedat, et si in ventre habuerit, sana fit. Verum plerique
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995

steriles, et æturibus mutilate sunt. Quibuscumque osculum alio inclinatur, et ad coxam allabatur. Contingunt enim et hæc, quæ uterum purgari prohibent, et genuram suscipere, et liberos gignere. Hanc odoratis fovere oportet, et post fomentum, digito revellere, et a coxa disparare, et postea radulis, ac plumbeis fistulis immixtis digere. Non enim velociter cogi potest, velut dictum est. Quam autem ad naturalem suum redierit, et uteri aperti fuerint, subdignis molibus purgato, et alia convenienter facito. Quibuscumque uteri ad coxam collabuntur, si non brevi discedant, et rursus in locum suum redeant, ad coxam resciantur. Necesse enim est, ut osculum aversum esse, et in supernis detineri. Quam vero aversum fuerit, conclusum esse. Ex aversione vero, ac conclusionem, durum fieri, et mutilatum esse. Ubi vero uteri conclusi fuerint, menses sursum ad mammam delegare, et ad pectus ascendere facit, et inus venter attollitur, et inexpectat in venter se habere putant. Talia enim patiuntur, qualia prægnantes, usque ad septem, quæ octo menses, et venter pro temporis ratione crescit, et pectora elevantur, et lac inanes videtur. Quam autem hoc tempus præterierit, et mammae gracilescent, ac minores fiant, et venter idem perpetuus, et lac evanescit. Venter item eo tempore, in quo se parituram sperabat, evanescit, ac concidit. His vero contingentibus, utero modico tempore fortiter contrahuntur, et osculum ipsum reperire non datur, adeo omnia contrahuntur, ac resciantur, et in mammis tubercula sunt dura partum maiora, partum minora. Hæc autem non sunt suppurata, sed semper duriora. Deinde ex ipsis nascuntur cancri occulti. Quam autem cancri futuri sunt, prius ora amarescunt, et quicquid ederint, omnia amara esse videntur, et si quis plura dederit, accipere renunt, et compescenda faciunt. Mente vero percelluntur, et oculi duri sunt, et non acire vident, et ex mammis dolores ad iugulum transiunt, et sub scapulas, et sitis tenet, et mammae graciles, et ipsa per totum corpus attentata sunt, et nates sicæ, ac obstructæ sunt, et non levantur. Spiritus est imminutus, et nihil omnino olfaciunt, et in auribus dolor quidam non obnolet, verum aliquando callosa concretio. Quam igitur ad hoc tempora progressæ fuerint, sanæ fieri non possunt, sed percutit ex his morbis. Si vero postquam huc perveniant, curare fuerint, et menses soluti fuerint, sanæ sunt. Ad vero curare tales oportet hoc modo. Primum quidem omnino, si adhuc foramen assumpseris, reliqui corporis respectu habito, quacunque tandem purgatione corpus habere videtur, medicamentum exhibere. Ubi vero corpus preparaveris, ad uterum medellam procedito. Si vero totum corpus minime movendum esse videris, neque morbi causæ hinc proficisci, verum uteri a se ipsis morbum habeant, curam hoc modo auspicare. Primum quidem uterum sic foveto. Olla duas lentulas capientis operculum imposito, ac adaptato, ut nihil præterspiraret, deinde vero operculi fundum perundito, ac foramen facito. In foramen autem arundinem indito longitudine cubitalem. Oportet autem arundinem operculo probe adaptari, ut penitus nihil præterspiraret. Quam autem hæc paraveris, operculum olla obdito, lutoque oblinito, et ubi hæc feceris, fossam duorum pedum altitudine effodito, et magnitudine, quæ ollam capere possit, fossam vero ligna immissa arde, donec fossa ab igne exardescat. Quod ubi factum fuerit, ligna, ac primas, quæ crassissimæ, ac ignitæ fuerint, eximito. Cinerem vero, ac favillam in fossa relinquito. Quam autem olla effuderit, vapor sursum processerit, si quidem valde calidus fuerit vapor, abstergeat. Si vero non, summx arundinis parti insideat, ipsamque in uteri stomachum indat, atque sic fomentum admittat. Si vero perfrigeretur, primas ignitas adscito, cavendo, ut ne acutum fomentum facias. Si vero adjectis primis, acutum fiat fomentum magis quam conveniat, primas detrahit. At vero hoc fomentum elementi celo parare oportet, ubi ventus non assari, neque perfrigeret. Ipsam autem indumentis obvelatam esse oportet. Ceterum in ollam alium sicum inficere oportet, idque magis comminutum quam ea, quæ sunt coarsius, et aquam affundere, quo ipsum permadescat, et aqua tribus digitis ipsum excedat, et phoca oleum superfundere, atque sic calefacere, ac fomentum adhibere per multum tempus, post fomentum vero, si potius fuerit, laverit toto quidem corpore ad volupratem, lumbis autem, et partibus infra umbilicem, amplius. In cetum porro dato marum, pinem, et allium coctum. Postridio vero si quidem exoluta fuerit a fomento, eam diem intermittito, si natus, rursus fomentum adhibeto. A fomento vero, si considerare hoc potest, osculum con-

- lum contingere iubeto, nam fomentum ipsum uterus statim implet. Si enim statim impleatur, osculum ex valida aversione, & ad coxam allapsu magis dirigunt, ac aperiantur. Tamquam igitur tale sit fomentum, & hac facere possit, sic fovere oportet. Quum autem fomentum adhibebis, allium injicere oportet, & phoeæ adipem superfundere. Acque hoc faciendum est, donec uteri videbuntur inflati, & osculum fortiter sursum tractum. Nam ad hoc fomentum talia contingunt. Post fomentum vero diatam constituto, velut priusquam fovebatur. * Quum vero commoti fuerint uteri, ac facile solubiles fiant, fomiculi radicibus foveo, & aliam ollam eodem modo preparato. Radices autem fomiculi elotas contundito, & in ollam mitto, & affusa aqua, eodem modo fomentum facito. Postea verolavato, & ad vesperam mazam coenat. Si vero panem volueris, & bolbida parvi polyporum generis, & sepiolas parvas in vino, ac oleo coquito, & edenda dato. At inter fomenti adhibitionem osculum contingere coepis, an fomentum uteris propinquissime adducat. Hos fovere oportet ad dies quinque, vel sex, hominis consideratione habita, & si quidem exolvatur, ac debilis sit, differre ad sufficiens tempus. Si vero non exolvatur, fovere per omnem diem. Post fomenta vero subditiua apponere coenat ex albicante tarda pinguisima. Illitio autem sit oleum, facito autem hac longitudine quidem digitorum sex, numero vero quinque, vel sex, figura vero in angulum abeunte. Sit autem alterum altero paulo brevius, crassitudo vero ejus, quod crassissimum est, sit digiti indicis, & forma similis digito, summa parte tenuissima, in processu vero crassior. Hac autem levissima, ac rotundissima facito, cavendo, ne ulla adsit fissura. Apponat autem primum id, quod tenuissimum est, & ubi appositus, quiescat, observans, ne excidat. Apponatque primum summam partem, deinde semper amplius, simulque obtorqueat, ac circumcirca eadem intro tradat, & ubi parum susceperis, in hoc parvo se contineat, cavendo, ne excidat, postea rursus eodem modo intro tradat, donec quatuor digitorum mensura intra osculum uterorum recipiatur. Quum autem hoc susceperis, alterum postea apponat, simul ut prius initium auctet, quo penicillum osculum conniveat, recipiatur, dum adhuc rectum est, & apertum. Hoc autem ita continget, si alterum eximatur, alterum autem indatur. Oportet autem & plumbum simile figura crassissima tarda formatum intrudere, quod cavum sit, quo continere quid possit, plumbi vero ampliando sit talis fabricata, qualis in ulcera impellitur, ita ut os ipsi leve sit, & non laucet, formato autem hac velut etiam subditiua ex tatis. Quum autem factus fuerit hujusmodi plumbeus penicillus, adipe ovillo crito, ipsum expleto, & ubi ita preparatus fuerit, eadem quidem subrahito, plumbum autem indito. Si vero plumbum appositum ardorem exhibeat, plumbum quidem detrahito, eadem vero rursus apponito. Et plumbum in aquam frigidam immergitur, & postea rursus apponito, ac eadem eximito. Semper autem aliquid appositum esse oportet, & interdum quidem melius est eadem habere, noctu autem plumbum. Si vero surgere volueris, cum cautione hoc facias, quo penicillus intus quiescat, sin minus, statim rursus subdatur. Si vero ex tarda appositus nullus suscipiat, renouorem facito, donec suscipiat, ex his ad illa transiendo, & obediens uteros faciendo. * Si vero neque osculum aperiri poterit, neque uteri prope accesserint, rursus ad veterem medicinam redito, a prima ad secundam, donec mollescant, & propinquissime accedant. Et postquam aperti fuerint, subditiua facito apponito. Sint autem magnitudine olivæ. Horum autem alterum appositum sit, donec liqueat, & deinde alterum apponito. Quum autem apponere voles, ipsum subditiuum medicamentum ex resina preparatum, in oleum rosaceum, aut irinum, tingito. Nam alias ab osculo uterorum recedit. Prius tamen plumbum appositum esse oportet, quo recto osculo in internam osculi partem attrahatur. Postea vero mollitoria apponito. Laver autem calida & ante, & post subditiua medicamenta. Et in eterna exhibeto quid ex relapis marinis. Exhibeto autem duobus, aut tribus diebus ab appositione, consideratione habita, an osculum uterorum bene habeat, & perum sit. Quod si est, ab hoc subditiuo quiescat. Postea vero mollitoria apponito. * Quum vero inflammatum fuerit os uterorum, rursus eodem modo pharmaca apponito, reliqua facito juxta relatum modum. Ubi vero probe habuerit corpus, velut dictum est, fustato. Sed & osculum, & interos fustate oportet sit. Subditiuum factum cum sic apponito, duo autem subditiua facito, & antequam subdas, fomentum adhibeo ex fomiculo prius relatum, postriedie vero post fomentum, apponito medicamentum, & quum apponere voles, præ omnibus subditiis, ubi prius laveris ipsam ita apponito, postea autem die mollitoria auxiliantur, quamdiu inflammata fuerint, post inflammationem vero alia facito juxta priorem rationem, facito item de hoc subditiua talia, qualia de priore. Et si quidem in mense semel appositum, satis videbitur instillare uteros, quiesceto. Si vero aliqua opus habueris, rursus apponito eodem modo, quo prius. Postea vero, ubi bene habere tibi visa fuerit, & tempestivum esse, fomentum ex susfimentis preparato. * Preparatur autem hoc modo. Cyperum rutilum preparato testæ conchæ mensura, & calamus unguentarius eadem mensura, & junce unguentarii tantundem, cardamomi tantundem. Cumini rem Aethiopici, & anisi, &

tuta sicca, & hyperiei, ac foeniculi feminis. Quin autem hac paraveris, vini au-
 steri albi odoratissimi heminas sex in ollam intindis, & de contusis quadrantem
 inspergito, ac permisceto. Deinde unguenti Aegyptii opemita, aut amaracini, aut
 irini, trium obolorum pondus affundito, permisceto, & molli-fomento plurimo tem-
 pore foveo. Ante fomentum verò lavato, & duos, aut tres dies foveo. Quam autem
 fovere desierit, operculum quoddam fomento imponere oportet, ut ne transiret.
 Postea vero radis, & plumbis utere. Quin autem duobus, aut tribus diebus fo-
 mentum adhibueris, alias duas, aut tres intermittito. Intermedii autem diebus bis
 in die lavato. Edat autem porrum coctum, & eridum, & raphanos, & nasturtium,
 & alium assatum, ac coctum, & potus sit meracior, & marinis prædictis utatur.
 Quin vero intermedii dies præterierint, rursus fovere oportet, ita ut modicum
 de singulis contusis ad prius fomentum inspergas, & vinum insuper affundas; si
 opus esse videbitur, itemque oleum, atque cum hoc foveas. Postquam autem fomenta
 bene habere tibi visa fuerint, & osculum molle esse, ac apertum velut convenit, &
 ipsi uteri prope, postea die a fomento, pharmacum, quod cum myrrha præpara-
 tur, apponito. Sunt autem apposititia duo, postredie vero post purgationem molli-
 toria subdito, quamdiu uteri fuerint inflammati, postea vero radis, ac plum-
 bels penicillis utere. Post hæc intermissis diebus, quotquot visum fuerit respec-
 tu ad inflammationes uterorum habito, & vinum corporis conjectura facta, tur-
 sus, velut scriptum est, resoveo. Si quidem prius fomentum adhuc sufficiens esse
 videbitur, conjectis ad hoc suffimentis velut prius, & vino, ac oleo affuso. Si vero
 inutile esse prius illud fomentum videatur, aliud ex integro præparato. Oportet au-
 tem hoc pharmacum renovare in singulis adhibitionibus, quamdiu subterientia pur-
 gantur. Si vero talia purgata fuerint, quiescat. Dicta porro hoc modo constituat-
 ur. Interrogato, in quibus diebus menses ipsi prodierint, & ab his initio facto,
 hanc dietam præscribo. Primum quidem multa calida lavetur, capite excep-
 to. Quin autem cessaverit, casum aerem, & rutam, vino nigro pari aqua tempe-
 rato diluto, & postea polenta inspersa, statim ex balneo bibenda dato. Deinde
 prandium tempestive exhibebo. Edat autem nazam, aut panem, & porrum coctum,
 aut eridum, & de huiusmodi omnibus acerbis præscripis, & aliquando legumi-
 nis fracti decoctum, spumam autem ne detrahit, & silphium multum derafum addi-
 to, ac multa alia incoquito. Obsoniis autem utatur piscium, chartilagineis omni-
 bus coctis aceto mulso dulci, aut savorum cremore cocto; bolibdis, polypo-
 diis in vino, & oleo, & silphii semen tritum bibat, & quamprimum tum in prandio,
 tum in coena edat. Lavetur autem post cenam, quum requiescere vult. Hæc die-
 ra ad dies quinque, vel sex utatur, post hos dies, mane jejuna sambuci fructus bac-
 cas sex in vino meraco dato, & sepius ova decem, aut duodecim. Hæc trita simul
 mane jejuna bibenda præbet, post hoc vero pharmacum potionem dato. At ubi
 interquievit, lavetur. Sit autem potio, rita, & casus, atque sic prædeat præscripto
 modo. Serius autem coenat, & semper bis in die lavetur. Hæc autem dieta ad dies
 tredecim, aut quatuordecim procedat. Quin vero hi dies præterierint, cataporia
 ex succo silphii-fabæ magnitudinis formato, atque hæc primum dato, postea vero
 alia præscripta facio. Quin autem dies transacti fuerint viginti-quinque in hæc die-
 ta, reliqua quidem facio eodem modo. Ante prandium vero, ubi prandere volei,
 alia segmenta quatuor, & casum aerem tali magnitudine terito, & polentam mo-
 dicam amulseto, ac massam efformato, eamque primum edendam dato. Ante ce-
 nam vero meracum absorbeat, atque ita cibum capiat. De extero vero eadem dieta
 utatur. Quin autem novem dies reliqui fuerint ad tempus mensium, primum hoc
 dato. Cum ovis, & sambuco, cuminum Æthiopicum, & castorii obolum. Ubi vero
 duo dies reliqui fuerint, ab his omnibus portionibus, ac catapotis abstinat. Ve-
 rum pharmacum cum tæda præparatum jejuna, ubi lavit, sumat. Post medicamentum
 vero potum, mercurialem, & brassicam simul in aqua cocta dato cum aceto mulso
 dulci, aut savorum cremore cocto, sale, silphio, & oleo condita. Atque hæc in prandio
 edenda præbet, & sneos sorbendos, & potum meraciorem bibat. Obso-
 niis autem utatur polypodio cocto, aut sepiolis, & hæc quidem in prandio. In coe-
 na vero sumat carnem caprinam, aut ovillam, aut agninum percoctam, & porrum,
 & alia acra, quacunque voluerit. A coena vero lavetur, & hæc sit dieta postremis
 duobus diebus. Si vero ex hæc dieta menses non fuerint detracti, sequenti men-
 se eandem dietam ab initio reperito usque ad postremos duos dies. In quorum
 priore apposititia facta apponat, iuxta superiorem rationem, ex pharmaco in aqua
 facto. Apponat autem prælota. Verum considerare oportet etiam uteros, quomo-
 do habent, quo semper omni tempore bene habeant, & os rectum, ac apertum sit, &
 si ita visum fuerit, ante appositionem fomenta adhibebo. Quod si eruperint men-
 ses, si quidem frequentes fuerint, paucioribus lavacris utendum est, & reliqua
 dieta, ac curatione. Si vero pauciores, pluribus. Si vero significationem de se præ-
 buerint, rursus eadem dieta utendum est, ac curandum, donec menses apparuerint.
 Quin autem semel talibus prodierint, optimum fuerit in ventre concipere. Atque
 hæc est omnium huiusmodi morborum curatio.

S E C T I O II.

1 * SI uteri contingant coxam, & incumbant, dura, ac solida sit coxa ad
 lateris mollitudinem, & dolores imi ventris, & ad ipsam lateris mol-
 litudinem, & lumbos, ac crura dolor incidit, ac extenditur, & suppurantur, &
 linamentis opus habent, nisi quid feces, aut uras. Quum sic ha-
 5 buerint, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & multa calida lavato, &
 uteros foveto, ita ut urinam vetetem in pelvim infundas, ac fervefacias, & supra
 ipsius cavitatem nihiliter colloces vestibus contextam, ut ne praterfipiret, & si tri-
 getiat urina, ferri igni frustra in urinam immittas, & fomentum facias, donec
 se obscure videre, & animo deficere dixerit. Lavato autem calida aqua, & post-
 10 ea digito contingens os uterorum ad sanam coxam trahar. Et noctu mollitoria ap-
 ponat. Postquam autem dixerit directum esse, facto prius cum odoratis fomento, rus-
 sus mollitoria quaedam apponito. Imo & plumbeos penicillos per triduum, singu-
 lis diebus unum, post hos vero bryoniam albam, aut scillam per triduum, postea vero
 consideratis mensibus, disce an biliosi sint, aut pituitosi, aut an sanguis sit corru-
 15 ptus, & si opus fuerit ipsi sanguinem purgare, quocumque maxime opus habere tibi
 visa fuerit, id apponito. Et postea cum ejusmodi colluito. Apponito autem subditi-
 cia medicamenta, donec sanguis purus educatur, & hoc per triduum facito. Dein-
 de cervinum adipem liquatum, molli lana eo imbuta, apponat, postea per diem pule-
 gium subdat, & aromatis suffusa sic ad virum accedat. * Si vero ex partu mor-
 20 bus fiat, ubi ex urinae fomento penitus purgata est, statim ad odorata accedat, &
 postea lota, oleum album Aegyptium ad sanam coxam apponat, & super hanc de-
 cumbat. Si vero neque ad haec transmoveantur uteri, jejunia praeconia grana nigra quin-
 que in vino odorato bibat. Et in cibo sumat allia cruda, & assata, & cocta. Obsonia
 autem utatur paucissimis. Si vero sana non fiat, similiter ipsam purgato, velut in
 25 priore dictum est. Ceterum in hoc morbo, si non statim in ventre habuerint, stercora
 sunt. Si vero sic habuerint, mensesque non fiant, neque febrilis calor corrumpat,
 primum pharmaci sursum maxime purgato. Si vero debilis fuerit, deorsum. Et
 post pharmaci potionem, si pituitosa esse visa fuerit, vomat jejunia, & accepto ci-
 30 bo, & plerumque sana fiet. * Si uteri ad coxam decurrerint, menses crassi exi-
 stentes non prodeunt. Verum dolor ad imum ventrem procedit, & ad lateris molli-
 tudinem, & morsum percipit. Quum sic habuerit, multa calida lavato, & allia plu-
 rima edenda dato, & hac convenienter bibendum, deinde vinum meracum, & co-
 tam foveto, & pharmacum sursum purgans exhibeto. Si vero debilius fuerit, in-
 fra. Si vero curata fuerit, uteros cum scenicula foveto, & ablinthum ammisceto.
 35 Postquam autem recens fota fuerit, os uterorum sensum cum digito ad sanam coxam
 detrahit, ita ut & ipsum os, & partes circumiacentes affectas leniter mollias, & mol-
 litorium quoddam apponas, & postea plumbeos penicillos, & mox scillam, dein-
 de narcissum, una die interposita. Quum vero pura esse visa fuerit, necropum ap-
 40 ponat in lana, & poltride oleum rosaceum. At mensibus prodeuntibus, melius
 est non apponere. Si vero non prodeunt, cantharidas quatuor, sine aliis, sine pedi-
 bus, & sine capite, & praeconia grana nigra quinque, & septe ova, & apii semen mor-
 dicum in vino bibat. Et si dolor assuerit, & urinae stillicidium venerit, in aqua ca-
 lida desideat, & aquam nullam aquosam bibat. Si vero non pergerit, rursus phar-
 45 macum bibat. Si autem purgatio prodeat, jejunia cum viro coeat. Si vero non pro-
 deat, dato, quod detrahar ipsam, respectu ad vires mulieris habito, & tunc tutum
 est, ut ad virum accedat. Si enim in ventre habuerit, sana evadit. In purgatione vero,
 si multa prodeat, mercurialem edat, & polypos teneros doctos, & cyba mollibus
 50 utatur. * Si puerpera uteri in coxam incuberint, aut ad lateris mollitudinem,
 ad alteram coxam oleum Aegyptium albam, aut rosaceum apponito. Sed & in sa-
 nam coxam decumbere melius est. Bibat autem praeconia grana nigra quinque, & san-
 buci fructus in radis concha testam majorem, & castorum magnitudine fabae. Et ejus-
 55 dem utatur mollibus. Concedat autem mercurialis ante cibum, cocta velut brassica.
 Sorbeat autem & ipsam decocti aquam, & acrim comedat, exceptis raphano, &
 cepis, & nasturtio. Optima est et lactuca. * Quot vero morbos ex utero fieri
 60 contingit? Dico autem, quum uteri ex loco moti fuerint, alio alias allabantur. Ad
 quaecumque vero locum lapsi fuerint, dolores ingentes incumbunt. Et si quis vesti-
 cam contingat, dolorem exhibent, et urinam non suscipiunt, neque genitium in se
 ipsos trahunt, et ambo doleat, et si non celeres solutiones fiant, uteri postea suppur-
 rantur juxta eosdem locos, si ad ipsos decurrerint. Contingit autem hoc et in laterum
 65 mollitudine, et in inguinibus, et super pectine. Ceterum in principis, quum do-
 lor habuerit, sic curare oportet, et tepelactoria adhibere, et in aqua calida fede-
 re. Bonum enim et hoc est, aut spongiis ex calida aqua expressis fovere, et pharma-
 ca uteris commoda bibere. Si vero ad haec non solvatur, pharmaco sursum, aut
 deorsum purgare, utro tandem opus fuerit, cognosces autem id hoc modo. Si enim
 65 ad inguina, et pectinem, et velicam irruerint, hac purgatione sursum opus habent.

Si vero

Si vero ad laterum mollitudinem, et præcordia, hæ pharmacæ deorsum purgantem indigent. At vero huiusmodi morbi omnes senioribus magis, quam junioribus fiunt, ad mentes suppressos; sunt etiam iuveniculis, ubi multo tempore viduæ manserint. Si vero ad sedem convertantur uteri, scæculus recrementa impediuntur, et dolores occupant lumbos, et inum ventrem, et intestinum rectum, ac podicem. Quum sic habuerit, calida ipsam lavare oportet, et lumbis fomentum adhibere, et postea graveolentia subter suffire, et apponere, quæ purgant, et impellunt uteros, et bibenda dare quæcumque libenter admisit ex maxime conferentibus. * Si vero incommodum bane in inguina, et urinæ meatus, dolores sunt fortes, et torpor in cruribus, et urinæ meatus obturatur, et urinam non emittit. Curare vero oportet hoc modo. Ad nares quidem odorata apponito, et unguenta. Ad uteros vero graveolentia suffuso. Porro omnis occasio uteros propellere potest, si quid mali habeant. Nam et a frigore pedum, ac lumborum, et a salatione, et terrore, et lignorum sectione, cursu ad accelivum, ac declivem locum, et ab aliis multis propelluntur. Proinde hæc considerare oportet, ad totum corpus respectu habito, quum præsentis morbi affuerint, propter talia enim omnia necesse est plus, aut minus agrotare, et postquam hæc relaxerint, maxime hæc parte repentini morbi manifesti sunt. Quum igitur hæc advenierint, penitus ex tota homine deprehendere oportet. Nam quæcumque perfrigerationes crurum, aut stupefactiones ex frigore sunt, hæ omnes etiam in uterorum morbis uteros elevant. In talibus itaque aquam calidam affundere oportet uteris, et circumfusiis locis, et ipsos, ac crura excalefacere, quum allapsi fuerint. * Si circumversus fuerint uteri ex parte dextram partem, et puerperii purgamenta non fiant, et dolor inum ventrem habet, et lumbos, et laterum mollitudinem, et dextrum crus gravatur, et torpor occupat, et non tremat, et osculum uterorum contingere non potest, sed ipsos leves, ac fortiter planos deprehender. Quum sic habuerit, pharmacum bibendum dato, a quo sursum, ac deorsum purgetur, magis vero deorsum, et totum corpus fovero, et præsertim uteros leniter, et calida bis in die lavato, et ex potibus quæcumque libenter admisit, experimento facto, præbeto, et viro frequenter condormiat, et brassicam edat. Si uteri ad sinistram partem, aut coxam declinaverint, dolor acutus, ac vehemens habet lumbos, et laterum mollitudines, ac ipsum crus, et claudicat. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, et postea die suffire hoc modo. Hordei cheniæ duas, et oleæ folia parum confringito, et gallam contundito, ac cribrato, et hyoscyami tertiam cheniæ partem. Hæc mixta, et olei hemina dimidia subacta in olla nova, per dies quatuor suffuso. Nocte vero lac bubulum, et mel, et aquam bibas, et calida lavetur. * Si uteri transversim solum habeant, et obliqui fuerint, itemque os ipsorum, menses ipsi partim occultantur, partim prius conspici evanescent, et non similes sunt, sed deteriores, et pauciores quam antea, et genitura non fit hoc tempore, et dolor habet inum ventrem, et lumbos, et coxam, et ipsa attrahitur. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, et calida lavare, ac fovere. Ubi vero recens fota, et lota fuerit, digito iminulo, os uterorum corrigat, ac dirigat, & odoratum suffusum admittat, & ex potibus dato iuxta experimentum, quem libenter susceperit. Cibis autem utatur mollissimis, et alia edat cruda, ac cocta, et cum viro dormiat, et in sanam coxam decumbat. Alteri vero fomentum adhibeat. Morbus autem hic agre cedit. * Si vero propinquissimi fuerint uteri, frequenter vomat. Uteros autem graveolentibus suffiat, donec in locum suum firmitati fuerint. Dieta vero ventrem non emolliente utatur. Si uteri extra naturam progressi fuerint, febrilis calor habet pudendum, et inum ventrem, et urina frequenter, ac paulatim destillat, et pudeodum vehementer mordetur. Patitur autem hæc, si recens ex partu viro condormierit. Quum igitur sic habuerit, myrti bacas, et loti ramenta in aqua coquito, et aquam per noctem sub dio exponito, atque sic frigidissimam pudendo affundito, et leviter tuta hæc apponito. Postea aquam lentiam cum melle, et aceto bibens vomat, donec uteri fuerint retracti. Sed et lectum a pedibus altiore facere oportet, et pudendum graveolentibus suffire, nares autem odoratis. Cibis vero utatur mollissimis, ac frigidis, et vinum aquosum album bibat, et ne lavetur, neque cum viro coeat. * Si penitus ex pudendo exciderint uteri, dependent velint serotum, et dolor corripit inum ventrem, et lumbos, et inguina, et quum tempus processerit, non volunt in locum suum redire. Morbus autem hic corripit, quum recens ex partu laboravit, aut fatigata fuerit, ut uteros contactu læserit, aut cum viro coiverit in puerperio purgatione. Quum sic habuerit, frigefactoria mitigantia apponere oportet ad pudendum, et quod extra propenderit depurgatum, malo punico in vino nigro cocto abluere, et intro protrudere. Deinde mel, et resinam pari utriusque portione colligare, et in pudendum infundere. Et decumbat supina pedes sursum extensos habens. Postea spongiæ apponat, et ad lumbos deliget. Quamvis vero sic habuerit, a cibis quidem abstineat, potu vero parcissime utatur, donec septem præterierint dies, et si quidem sic obedire voluerint, et redire, satis sit; sin minus, summas uteri oras derasas, et ablutas, picato cerato illinito. Deinde pedes ad scalam deligato, ut caput deorsum pendat, et manū intro detrudito. Postea lavato, et crura ipsius vicissim

- 35 colligato, atque sic per noctem, ac diem finito, & modicum prisanæ succum frigidum dato, aliud autem nihil. Postera vero die reclinato, & cucurbitam quam maximam ad coxam affigito, & multo tempore trahere finito, & ubi ipsam detraxeris, ne scarificato, sed reclinatam finito, & nihil præter succum prisanæ exhibito, donec septem præterierint dies. Si vero sitis vexet, modicum aquæ bibat. Quum autem septem transierint dies, cibis mollissimis, ac paucissimis utatur. Ubi vero ventrem exonerato, voluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim prætereant dies. Deinde tepidis fomentis colluatur, melius autem est calida velut ex sole, & quamparcissime deambulet, & ne laetur. Ventrem autem ne solveris. Cibis vero paucissimis utatur, neque aeribus, neque salis, & pudendum graveolentibus suffiatur, & postquam obambulare inceperit, subligar gesserit. * Si vero extra pudendum os uterorum exciderit, utpote cervice uterorum prope pudendum sita, & ampla existente, sit autem hoc magis sterilibus, contingitque maxime ex fatigatione, quum mulier laborarit, & uteri calefacti fuerint, ac exudarint, tunc erigatur os ipsorum per cervicem, ut quod in humidiore, ac lubriciore, & calidiore sit loco, quam in priori tempore, & ubi hoc contigerit, procedunt uteri foras ad frigus, & osculum ipsorum eversum prodit. Et si quidem brevi curata fuerit, sana sit, verum sterilis penitus relinquitur. Si vero non brevi, osculum durum semper ipsi extra erit, & super illic alias atque alias saniosus humor viscosus, ac graveolens. Et si menses prodierint, si adhuc ejus ætatis fuerit, in lecto decumbet. Temporibus autem progressus hujusmodi morbus incurabilis sit, & consensueunt, uteros foris habentes. * Si vero uteri extra prominuerint, ablutos ipsos aqua tepida, oleoque, ac vino illitos rursus indito, ac deligato, & graveolentia subter suffito. Sub nares autem odorata. Si vero multo tempore uteri prominent, & stupide perfrigerentur, multam calidam aquam affundito, quo resocillentur. Si vero jam insentur, etiam aceto ad aquam ammixto foveo. Sitque hæc aqua, aut lauri, aut myrti decoctum, & leniter protrudito, & cerato unguento illinito, & si paruerint, satis est, sin minus, equi aqua ablutos, & aceto modico tepesfacto persundito, deinde illinito. Ubi vero considerint, ablutos, velut dictum est, indito, & alia prædicta facito. Oleum vero ne adhibeto, neque aliud pingue, aut pinguitudinem habens. Si quid ex osculis uteri complicatum fuerit, menses non fiunt, aut pauci, & pravi, ac dolorifici, & quum viri condormierint, dolet, & quiescat vir inmisit ex coitu, exit, & contingi non vult, neque attrahit genituram. Et dolor habet imum ventrem, ac lumbos, & os uterorum ad contactum non compareret. Quum igitur sic habuerit, utrinque veteri foveo, deinde vomat a lentis decoctum, melle, & aceto ammixto, postea aqua calida laetur. Deinde oleo albo Ægyptio in phialam argenteam, aut æneam infuso, & sale addito contacta phiala insidat, & si quidem odor olei per os ipsi penetrarit, ipsam paritum esse, & postera die sanam fore pronuncia, ac considero iube, & ubi dormire volet, oleum Ægyptium in lana apponar. Postridie vero consideret, an os uterorum magis sit directum, & si esse dixerit, per triduum odoratis foveo, & subditiua, quæ non mordeant, apponito, purgatoque, & eum odoratis, ac mollibus postea colluito totidem diebus velut prius. Quum autem menses prodierint, jejuna, & illota, aromatis suffra, ad virum accedat. Pleraque vero ex hoc morbo steriles fiunt, si non curatis fuerint. * Si ulcerati fuerint uteri, & extremæ foras processerint, oleo illis manibus indito, & myrtæ puræ pilulas tres devorandas præbe, & laurum viridem tritam bibat vino dilutam, & sic sana fiet. Si in ætatem contracta fuerint pudenda, subditiuum apponito. Anisi videlicet semen, & apii tritum pudendis subdito. Si uteri non in loco manserint, sed modo huc, modo illuc transierint, ut dolores exhibeant, & nunc inconspicui fiant, nunc exeant velut sedes, & quum quidem lupina fuerint, in loco maneant, quum vero surrexerint, aut ex somno expergierint, aut se inclinaverint, aut alium quemdam motum fecerint, exeunt, sæpe vero etiam, dum quiescit. Hanc quammaxime quiescere, & non moveri oportet, & lectum a pedibus sternere altius, & vomitibus uri. Oportet enim ipsos sursum revellere, & acerbis persfundere, & graveolentia subter suffire. Sub nares autem odorata, & ex malis punicis quodcumque maxime convenerit, & nihil impedierit, in medio per umbilicum perforatum, in vino tepesfactum quamparitissime subdito, deinde lata fasciâ deligato, ac circumdato, ut ne elabatur, sed maneant, & quod opus est, faciat, & de pepio eum caleo, & polenta bibendum dato, quemadmodum supra in allapsu scriptum est, & de potionibus experimento factis, quancumque maxime admiserit, bibendum præbeo. Cibis autem mollissimis utatur, & eum viro ne dormiat, donec ad locum suum redierint. * Si uteri exciderint, hederam siccissimam tritam, ac linteo alligatam apponito, & nihil pingue adhibeto. In potu autem exhibito triticum recens, & pepulum album, & salyam, & eyperum, & anisum. Hæc trita, vino diluta, cum fursibus hordei bis in die dato, pro vice heminam dimidiam. Si ad crura, & pedes uteri convertantur, cognosces sic. Magni pedum digiti convolvuntur sub ungues, & dolor habet crura, ac femora, & incumbit, ac premit nervos circa femur. Quum sic haberit, multa calida frequenter lavare oportet, & fomentum adhibere, si ferre poterit, & graveolentia subter suffire. Et femora rosaceo oleo inungat. Si vero loqui non poteris, crura de repente frigida repereris, & genas, & manus,

- & manus, & si uterum contigeris, non in suo mundo est, & cor vibratur, & dentibus
 frendit, & fudor est multus, & alia, quæ a sacro morbo correpti patiuntur, & quæ
 ab aure exsulant. His frigidam aquam multam affundere oportet super enuræ, & ma- 205
 nus, & alia facere, velut prius dictum est. * Si commoti uteri aliquo allapli fuerint,
 & dolorem exhibuerint, oleæ scabiei, & lauri, ac expressi ramenta in aqua cocta,
 lana excepta subito. Quum mulier recens enixa, onus majus, quam pro natura le-
 varit, aut timeurit, aut ligna secuerit, aut cucurrit, aut alia, quædam huiusmodi 210
 fecerit, meri exsulant ob hæc maxime, aliquando vero ad sternutationem. Non e-
 nim violatur, si per vim sternutans, non apprehenderit nates. Proluere itaque aqua
 repida uteros oportet. Deinde heræ succo servefacto similiter, postea vino ni-
 gro merato. Si vero non obediat, mollitoria facere oportet. Verum hæc facere o-
 porter, priusquam perfrigerentur, & leviter intro indere. Deinde crura extendere, ac 215
 subalternatum ponere, & molle quiddam ipsis supponere, a potu vero coerceri opor-
 tet tales quammaxime, & ventrem custodire, ut ne exuratur. Naribus autem odo-
 rata adhibere. Huiusmodi vero postea si non quieverint, sed moveantur, venarum pur-
 gare oportet. Et si non sara fuerit, etiam vomitus facere, & non lavari, tacerique
 ac quiescere. * Si inflati fuerint uteri, venter attollitur, & inflatur, ac sonitum edit, 220
 & pedes, & cavæ faciei partes intumescunt, & color injunctus sit. Et menses oculan-
 rantur, & genitura hoc tempore non manet intus, & anhelat, spumarque, ac anxia
 est, & quum exsperserit e somno, recta cervice spiratio ipsam corripit, & quic-
 quide dedit, aut biberit, ipsam mollescat, & suspirat, ac eristatur magis, quam priusquam
 edit, & suffocatur, et nervi contrahuntur. Et uteri, ac vesicæ dolent, et manus con- 225
 tactum non admittunt. Neque lotium emittunt, neque genitura suscipiunt. Quum
 sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, et calida lavet, ac fre-
 quenter infideat toto corpore. Quandoque etiam usque ad umbilicum fomentum adhi-
 beto, et interposito tempore ea apponito, a quibus purgetur, et non mordeatur.
 Sissimiger autem odorata subter pudentia, sub nates vero graveolentia. Et potio- 230
 nes dato, quæ uteros purgant, et ad locum impellunt. Et mercurialem edat, et
 postea læ bibat, velut de latere scriptum est. Morbus autem hic non est diuturnus,
 43 * Si velut in callum indurati fuerint, et osculum exasperatur, et menses oculan-
 rantur. Quum autem prodierint, asperi apparent velut arena. Si vero etiam digito con-
 tingerit, os uteri asperum comperiet, et semper velut callus accrescit. Quum sic habuerit,
 cyclaminum terere oportet, et salern, ac sicum simul miscere, et cum melle glandulam ef-
 formare, ac subdere, et fomentum adhibito, purgantibus eluere. Edat autem mercurialem,
 et brassicam coctam, et succum sorbeat, itemque porrum, et calida lavetur. Si vero-
 velut in callum indurati fuerint, et menses oborquentur, et osculum ipsorum
 clauduntur, et non concipit, et velut aliud quid est, et si contigeris, velut lapis illie
 esse videtur, et est os asperum, ac multis radicibus præditum, et non leve aspectu, 240
 et qui ipsum considerat, digitum intromittere non potest, et febris circumfrigerans
 corripit, et fremitus, et imum uteros habet, et imum ventrem, et laterum mollitu-
 dinem, ac lumbos. Patitur autem hæc, si ipsi corrupti menses computruerint. Quan-
 doque vero etiam ex partu, et frigore, aut mala dieta, et aliter. Medicamentum igitur
 bibendum dare oportet, et multa calida aqua lavare. Oleo item utere, et fomen-
 tum adhibe. Quum autem recens lota, aut lota fuerit, specillo minime aperito, et os
 ipsorum dilatato, idemque cum digito similiter efficit, et mollitoria, velut dictum est,
 46 apponito, et potiones similiter bibendas dato, et eodem modo enuræ. * Si vero
 obduruerint uteri, osculum ipsorum durum sit, et clauduntur, et menses non prodeunt,
 sed pauciores, et deteriores, et dolor incidit, et febris, et rigor corripit circa imum
 ventrem, et lumbos, et laterum mollitudinem. Quum sic habuerit, multa calida la-
 vato, et tepesfactoria adhibeto, si dolor habuerit, et uteros multo tempore eum aqua
 decocti cucumeris sylvestris foeto, deinde mollitoria apponito. Atque hæc per tri-
 duum facito, et si ex contactu osculum uterorum molle apparuerit, ex crudo lino 255
 tres penicillos suppuratorios indito, primum tenuem, secundum paulo crassorem.
 Crassissimus autem sit magnitudine digiti parvi, longitudine vero quinque digito-
 rum, ita ut hos adipe aspersio illius subdas. Sed et ubi fomentum adhibueris ex
 odoratis, glandem mollitoriam apponito. Aut nitrum tali magnitudine illitum, ut ne
 sanciat. Non enim pungere oportet, et appositum sit ad duos dies. Decedit autem
 velut cortex, et pellicula crassa. Intermissis vero tribus diebus, cyclaminum cum
 narcissino subito. Si vero hæc non purgant, cum multa consideratione appo-
 nito id, quod cum hypressi paratur, et appositum maneat per diem, et ubi fortiter
 momorderit, glandem extrahat, et pudentium colluat cum aqua calida, et in oleo in-
 fideat, postredie vero lota, cervinum adipem liquatum, et molli lana exceptum appo-
 nat, et si tibi adhuc purgatione opus habere videatur, tribus interpositis diebus,
 id, quod cum narcissino paratur, subito, postredie autem netopum. Deinde rufus tri-
 bus diebus inappositus, uteros odoratis, et pinguibus colluito, postredie vero
 pulegium per unum diem apponito, et sequenti die cum aromatis suffito, ac loteto. Uta-
 rur autem cibis acerbis, marinis, aut carnibus. In mensibus vero castoreum bibat, 270
 47 et jejuna illa iussita, et eyeonem bibens, ad virum accedat. * Si vero os uterorum
 non suscipiat genituram, sed durum fuerit, ac conclusum, phimbecum penicillum appo-
 nat, ve-

- nat, velut dictum est per aridum, ubi calida lota est, & mollitoria utatur, & supina decumbat, & in aquam calidam incidat, & lanam unguento imburam apponat. Verum
- 275 uocū magis apponere oportet. Juxta coas vero velles lanens, aut lineas molles supponat, ut ne corpus in alterutram partem dilabatur. Utatur & subdititis mollibus ex myrrha pinguisima, pice, cera, & adipe anserino. Sic autem myrrhæ damidium, reliquorum vero duplum, & in lana subdat, duo vero sint subdititia, quorum alterum lota per diem subdat, alterum per noctem, donec molle factum fuerit, & ubi
- 280 hoc detraherit, aqua odorata colluatur. Aut grana cnida decorecata quindecim, & Indici medicamentum aliquantulum, si ita vilum fuerit, in lacte mulieris masculum lactans terito, & cervi medullam, & alia, quæ dicta sunt, ac modicum mellis ammisce. Sic autem lana, quæ hæc excipiuntur, mollis, & pura, & ad diem subdat. Si vero
- 285 fortius facere voles, myrrhæ parum quid ammisce. Optimum autem est ovi candidum, & adipe caprinus, & mel, & oleum rosaceum: his ammiscere farinam, & tepescere ad ignem oportet, & quod desillat, lana colligere, ac apponere. Aut adipe rubrum anseris aromatis conditum, & unguentum rosaceum, permixta, & lana excepta apponito. Præstat autem anseris adipem, & adipem ovillum, ceram album, resinam, necopumque oleum rosaceum, hæc simul liquare, ac miscere. Ubi vero
- 290 lota est, hæc repida intro ad uterum osculum apponat. Aut cervi medullam, & anseris adipem liquato, & rosaceo, aut vino oleo ammisce, in valde molli lana apponito. Quam mulieri uteri duri facti fuerint, et ad pudenda egerint, dura sunt inguina, & ardor in inguinibus est, & omnia cancerantur, Quam igitur sic habuerit, cucumeris sylvestris internam partem, & savam terito, & aqua hemina affusa in sedem infundito, & purgatur. Si os uterum durum fiat, & cervix præ siccitate, & morbus laxiter hæserit, ex digiti contactu cognosces, & si ad
- 295 coxam devolvantur, nihil aere adhibeto. Si enim exciderint, aut inflammetur, periculum est, ne penitus fissilis fiat. Verum apponito ea, quæ non movent, a quibus purgeretur. Quam vero duri fuerint uteri, & sic doluerint, subdititia apponito, velut est cervi medulla, aut anserinus, vel suillus adipe, & unguentum tritum cum melle, & cyalureum, accecam album, velut earum aplasmamollo, & hordeaceam, aut triticam farinam cum aqua, & ruta coquito. Si uteri conclusi fuerint, oscula
- 300 ipsorum dura sunt, & genitura non amplius suscipiunt, sed statim ubi cum viro condormierit, dum crura inquit, erit, & dolores inum ventrem, & limbos, & inguina occupant, & menses omnino non procedunt. Si vero exeat, pauci, & pravi, ac decolores procedunt. Quam sic habuerit, multa calida lavato, post balneum vero castorum cum prunis radice in vino nigro odorato permixta, bibenda dabo. Cibis autem velut puerpera utatur, & si manifesti fuerint menses, diem unam
- 305 intermitto, & totam foreto, & pharmacum potandum dabo, si aduersa fuerint, sursum portans, aut si egerit visa fuerit, deorsum. Lac inaque alinum, aut ferum exhibeto, & leniter foreto, & mollitoria utero apponito, & cyalaminum, & narcissimum. Cucumerum vero parvorum sylvestrium internam partem luto, & ex divulsis seminibus, ac lacte mulieris masculum lactans affuso terito, myrrhæ pura, & melle optimo annuatis, oleoque Aegyptio albo, et ne liquidum facito medicamentum, sed sicum, atque hoc in lanam mollem puram infarcit, et in oleo Aegyptio albo tingat, & lota apponat. Subligetur autem, et subreclinant, quam purgat.
- 310 Postquam autem suffecerit habere tibi visa fuerit, quiescat, sin minus, rursum aliud apponat, postea vero obvolvatur lanam mollem, rotundam faciat, et necopum immittat, et diem unam subdat, postidie vero oleum rosaceum itidem in lana. Deinde rursus cervi adipem, etiam ipsum liquare in lana. Lavetur autem calida aqua semper ante subditiorum appositionem. Et odoratis leniter foveatur multo tempore. Postea vero una interposita die, colluto, si quidem pienitosa fuerit, eo quod cum grano casio paratur. Si vero biliosa, eo quod cum scammonia, post hæc ambo
- 315 postidie etiam narcissino cum vino dulci colluto. Si vero narcissinum non fuerit, cum antino, antimo quamoprimo. Sic autem olei terena vini paræ, deinde interpositis duobus diebus, id quod cum pulegio præparatur, unum diem apponat. Si vero prodierint menses, jeuna per triiduum bibat castorum eam vino odorato albo, ubi vero desierint menses, et stabiles fuerint, lavetur, et aqua frigida perluta, cyceonem bibat non fassum. Cibum autem ne contingat, et cum viro dormiat duobus, aut tribus
- 320 diebus. Quanto vero tempore purgatur, mercuriale in aqua coquens, ubi cocta fuerit, exprimat, et altum ac cuminum, et salem subdeat, et oleum his ammiscens, et modico succo affuso fervefaciat. Arque hoc edendum ante cibos edat. Allium item coctum, ac assatum quamplurimum accipiat. Si vero mercuriale non fuerit tenera, tritam cum brassica coquere oportet, et condire, et lenis erit, et si in ventre conceptus, sana evadet, et omnia ipsi juxta ornatum procedent. Si os uterum
- 325 conclusum fuerit, si forte velut grossum, et si digito contigeris, deprehenderis durum, ac convolutum, et digito non admittit, et menses occurrantur, et poniturum non suscipit hoc tempore, et dolor habet inum ventrem, et limbos, ac laterum molitudinem. Quandoque vero etiam sursum ascende, et suffocas. Quam sic habuerit, pharmacum deorsum purgans bibendum dare oportet, et multa calida lavare, et apponere ea, quæ os mollant, et specillum immittere, ac apertire, itaque

- itemque dignum, & similiter levigare. Quum autem molle fuerit, apponere ea, quæ sanguinem purgant, & poriones exhibere, & experiri, ut præbeas quodcumque aliud libenter fuisseperit. Brassicam autem edat, & succum sorbeat. Si uteri conclusi fuerint, & menses non apparuerint, colocynthidem sylvestrem, & silphii semen, & cuminum Æthiopicum, & nitrum, & salem thebaicum, & adipem the-
nalem, & sarinam, & myrrham, & resinam, omnia simul servefacito, et trito mixta, et in glandem efformata, apponito. * Si grumosi facti fuerint uteri, os ipsorum velut ervo plenum sit, et si contigeris, videbis ita habere, et menses non sunt, neque genitura intus manet. Quamdiu sic habuerit, cyclaminum cortice detracto, et al-
bium, et salem, et ficum, ac modicum mellis terito, misceto, ac glandem forma-
to, et ad os uterorum apponito. Itemque alia subditiia, quæ acra sunt, ac corro-
dant, et a quibus sanguis purgatur, et de potionibus dato eas, quæ uteros pur-
gant. Si uteri præter naturam hiant, menses plures procedunt, et viscosi, et fre-
quentes, et genitura intus non manet, et osculum hians est, et fieri non potest, ut
genitura attrahatur, et febris, ac rigor corripit infernum ventrem, et lumbos. Mor-
bus autem corripit ex fluxu sanguineo. Fit et quum menses suppressi derepente
etuperint. Dieta itaque ratio prius relata est. Oportet autem subditiis curare, in
principio quidem purgatoris simulque mollibus, deinde leniter adstringentibus,
et partes infra umbilicum per spongas fovere cum mytti, aut rubi aqua, aut ex oleo,
aut rosarum, aut cœnanches, aut vitæ foliorum decocto. * Si os uterorum hiant
amplius quam in mensibus solet, menses ita hiant plures, et deteriores omnes, et li-
quidiores, et per longius tempus, et genitura non attingit, neque manet, sed rursus
exit, et si permanserit, osculum comperies disparatum, et impotentia præ mensibus
obinet, et levis est, ac debilis uterus, et ulterius procedit, et vires laxantur, et
febris debilis, ac rigor, et dolor habet intum ventrem, et laterum mollitudinem,
ac lumbos, patitur autem hæc maxime, si quid in ipsa corruptum computue-
rit, ac compactum fuerit. Quædam vero etiam ex partu patiuntur, alia etiam a-
liter. Quum itaque sic habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, et facilius
iudicabitur, et si dolor habuerit, tepidioria adhibeto, et frigida lavato, ac inter-
missione facta, colluto, et ex potionibus dato quamcumque maxime libenter
admiseric, et suffito ea, quæ resicant, et polypos edat, ac mercurialem. * Si
vero non conclusi fuerint uteri velut oportet, in aqua desideat, in qua cocta sit myr-
rus, aut lentiscus, aut vitis, aut oleæ folia, aut rosarum. Dieta vero sit, quæ re-
lata est in tubo fluxu. Optimum vero ipsi auxilium est sitis, frequentes vomitus, et
prohibitiones balnearum. Quum uteri, magis quam convenit, fuerint aperti, et
non conclusi, et purgatione opus habent, et collutionibus, et suffimentis. Si ve-
ro menses effluerint, plures hiant, et deteriores, et liquidiores, et frequentes.
Et genitura non manet intus, sed quando illi prodierint, perit. Et si os contingas
digito, comperies ipsum leve. Et impotentia ipsam præ mensibus corripit. Et fe-
bris, ac rigor obinet, et dolor intum ventrem, et lumbos, et laterum mollitudinem
corripit, maxime si quid in ipsa corruptum computuerit, itemque ex partu, et ali-
ter. Quum igitur sic habuerit, curare oportet, ubique tandem dolor fuerit, ve-
lut in superioribus scriptum est. * Si uteri inflammati fuerint, menses obtor-
quentur, et cervix multis tenuibus vasis ad telarum aranæ similitudinem varie-
gatur. Et febris est acuta, et mentem percellens, et menses pravi, ac pauci ipsi
comparent. Et quum jejuna fuerit, vomitus quidam ipsi supervenit. Quum vero
quod comedet, revomit. Et dolor occupat intum ventrem, et lumbos, et animo
languitur, et per totum corpus perfrigeratur. Venter autem nunc durus, nunc mol-
lis est, et incenditur, et atollitur, et putat se in ventre habere. Quandoque vero
ventris moles aqua apparat, et alvus aqua impletur, et umbilicus prominet, et
osculum gracile fit, et derepente apparent menses stridentes, et pauci, ac pravi,
et attenuatur circa claviculas, et collum, et pedes intumescunt, et præsertim pe-
dum extremitates. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendum da-
to, et subditiis utatur, et fomentis uteri foveantur odoratis. Per diem vero plum-
beis penicillis utatur, et ante appositionem aqua calida non mordenti colluto,
et post appositionem hoc infuso colluto. Cnestri duas potiones in aquæ hēmi-
na coquito, et aquam excolato, ac infundito, oleo narcissino, aut anthino ammi-
ro. Post hæc tres dies intermitto, deinde cum eo, quod cum aceto paratur, col-
luto, et ante cibum, mercurialem cum aliquantulo vino coquens edat velut brassi-
cam, et suum sorbeat. Si vero permanserit, pharmaca bibenda dato, a qui-
bus aqua de utero purgatur. Cibus autem utatur panibus, et oleribus coctis, flae-
cidis. Murinis autem potius quam canibus. Aut extremis partibus coctis, flae-
cidis, et lactore quamplurimum et ante, & post cibum, & quamminimum lavetur frigida,
& a dulcibus, ac pinguibz omnis generis arceatur. Diebus autem purgationum
intermediis, adiatum bibat jejuna in vino diluto. Ar morbus hic lethalis est, et
paucos effugere possunt, si non in ventre conceperint. * In uterorum inflammatio-
ne menses obtorquentur, & quum jejuna est, vomit. Ubi vero comedat, do-
lor habet intum ventrem, & lumbos. Et totus venter modo durior, modo mol-
lis fit, & non valde confidet. Alvus magna fit, & non purgatur, & sibi prægnans
app. Opera.

- esse videtur, & patitur quæcumque prægrantes perpeti solent. Et si ventrem contigeris, levem comperies rumorem velut in utro, & quum parvus tempus esse vitium fuerit, uteri concidunt, & menses pauci, ac deteriores fiunt. Hunc pharmacum deotlum purgans bibendum dare oportet, & purgatoria apponere. Purgata vero, sana evadit. * Si inflammatus fuerit uterus, vellicatur. Si vero quid corruptum fuerit, ac vitium recruduerit, febris corripit acuta, & magna, & horror durus partes circa pudenda, & horribiliter afficietur, & mordetur, & concitatur, & si quis digito contingat, rursus pejus habet, & pungitur, & caput dolet, ac incipit, & caligo adest, & sudor frontis. Extremæ partes perfrigerantur, ac tremunt, & sopor profundus aliquando occupat, & audire non potest. Neque reliquus sensus operatur, fastidium cibi est multum, & stomachus, & venter omnino non continent cibum, & vociferatur, & exilit, & pectinem dolet, & inguina, & lumbos, & occultos pudendi locos, & cito moriuntur. Si vero dolores ad extremam debilitatem deduxerint, spongiis calidis ex aqua, & oleo expressis fovero, & subditiis mollia apponito, medullam cervi, adipem asnerinum, & ceram albam, & ovi luteum. Aut ceratum picatum cum resina subdito. Vino vero, aut lacte caprino purgato, aut volucris fusculo. Vinum autem ne bibat, & persanz succum forbeat. * Ad dolorem uterorum medicamentum infusile. Si dolor solum fuerit vebemens, & violentus, caligo in uteris inest, & status non exit, sed isthic manet malum. Oportet igitur sic curare. Attripcis sylvestris semen, & beras simul trita, & tepefacta, in uteros infundito. Aliud dolores uterorum sedans. Vini suavissimi parti aqua temperati tres semicongios Atticos sumito, & fœniculi radices, ac seminis ejusdem trientem, & olei rosacei heminam dimidiam. Hæc in ollam novam immittito, & vinum superfundito, deinde fovero. Apponito autem & seillam, donec osculum molle factum fuerit, & ad laxonem idoneum, ac aptum. Et quum in purgatione pustula circa osculum uteri exorta fuerit, sic curo. Carnem bubulam cum butyro, aut adipe asnerino, & aniso præis illine, & ipsam carnem in pudendum inde.

S E C T I O III

- * SI ignis sacer habuerit uteros, intumescunt pedes, & mammae, & corpus, & dolor ipsam corripit, & recta cervice spiratio fit, & dolet laterum mollitudinem, & partes sub ventre, & pectora, & caput, & tremor occupat, & torpor manus, & inguina, & poplites tremunt. Quandoque vero & in poplitibus lividæ fiunt, & modico tempore melius habent ex hoc colore. Maxime vero mammae attolluntur juxta genitalitatis cognationem. Attamen non valde dolet, & febris, ac rigor corripit, & facies rubicunda fit, & situs fortis est, & hepar resiccatur. Hæc si prægnanti acciderint, moritur, & non poterit effugere. Si ignis sacer in uteris fiat, rumores fiunt lividissimi a pedibus exorti usque ad crura tota, & ad lumbos. Quanto vero tempus amplius progressum fuerit, etiam pectus percipit, & intumescit, & tota perfrigeratur, & febris habet magna, & rigor supervenit, & spiritus dealus, & animi deliquium, & debilitas, & dolor totius corporis, & tristatur, & mente variatur. Et affectio ascendit ex inferno ventre ad lumbos, & ad dorsum, & præcordia, & pectora, & collum, & caput, & stomachum. & mortua esse videtur. Quum autem dolor solutus fuerit, torpor habet lumbos, & inguina, & crura, & in poplitibus hvores fiunt, & modico tempore melius habere sibi videtur, deinde rursus affligitur, & corpus pustulis completur, & rubores conspicui, ac manifesti faciem occupant, & guttur sicum est, & lingua aspera. Hic morbus, si prægnantem invaserit, occidit, sin minus, medelam adhibere oportet, & lac alinum bibendum dare, ac purgare. Si vero sic non solvatur, ventrem mollioribus frigidioribus perfrigerare, & subditiis non molestis, & levibus paulatim purgare, itemque vomere. Ad hoc commodum est sambuci folia sumere cocta cum origano, aut thymo, aut ruta. Si vero febris dimiserit, etiam vinum, ac cibos dulces dare. Verumtamen paucæ curantur. * Aqua interens si in uteris fiat, menses prodeunt nrenosi, & aquosi, & non valde cruenti. Intumescit & uterus, & vena, & propinquissimæ partes, & prægnans fit, deinde suffocatur, & mammae fiunt, & inus venter durus est, ac intumescit, & omnis circum cetera locis, & dolet, si quis ipsum attingat. Et febris, ac stridor dentium corripit, & dolor vebemens laterum mollitudinem, ac lumbos, & semen in somnis effundit, & pejus habet. Hanc calida lavare oportet, ac tepescere, pharmacum autem bibendum dare, & cum debilibus fovere, & cyclamini obolos tres in lineo deliget, ac apponat. Et cypressi succum in aqua madefaciat, ac cantharidas eadem rerat, & modico tempore apponat, & per multum temporis intervallum. Efficax est Subditiis. Cuminum chemæ mensura, uva passa alba. Aliud. Urticæ semen, arl radix. Horum quodcumque voles, leviter apponito, ubi vero expurgaveris, colluatur, ita ut detrahas, & cum infuso pudenda colluas, & simul cum viro dormiat, & si scetum ad parvus tempus gestarit, tota expurgatur, & sana fit. * Alia aqua

- aqua intercut uterorum. Subcreuentum quiddam fuit saniofum, & purgatur, & mordet valde, & ulcerat pudenda velut muria, & circumfistas partes, & quocumque deftillarit, ulcerat, & color est morbi arcuati. De cetero vero purgatur copia velut in aliis fluxionibus. Morbus autem hic & debilius est, & aliquando lethalis fit, si uteri egressi fuerint. Hanc curato velut eam, quæ a fluxu albo vexatur, & lac albinum bibendum dato, & extenuato, & prædictis pharmacis curato. Eclegma. Quod delingitur ad aquam intercutem. Si aqua ex utero fluat, sulphur, & anferis adipem delingat. * Si ventus in uteris fuerit, flatus exit, & stridet, & tota intumescit, & febris habet, & ardor, & ad hæc valde exilit præ dolore, & virum non admittit, & valde agre fert coitum, & erigi non potest, & velut onus grave ipsi in uteris jacet, & caput dolet, & anxia est, & loqui non potest. Si vero dolor accesserit, clamat, & dolet omnia, & lumbos, & pubem, & sedem, et urina supprimitur, et venter suffocatur, et mori cupit, et præcordia distenduntur, et stomachus mordetur, et os amarum est, et vomit acida, et pura, ac meraca, et frequenter rutat, et melius habet. Sin minus, intumescit, et si attigeris, renititur, et dolet. Proinde uterum cum aqua mulla, et aceto mulso, ac oleo colluere oportet. Et cuminum, aut anisum tritum fumere, et lini folia terere, et volucrinum adipem cum ovis in aqua infundere. Subditiis vero, ac potionibus utere, quæ ego describam. 55
 Desideat autem in oleo calido, et aromata in ipsum immittito, iunci odorati florem. Aut in aqua lauri, aut marina desideat. Optimum autem est mollibus infusis ventrem purgare, aut glandem apponere, quemadmodum puero venter solvitur, lanam illotam cum melle. Si vero antiquior fuerit, cepam in oleum, aut mel tinctam apponito. Aut taurinum fel, aut alicum cum melle. Aut mali punici acidi nucleum cum melle, et hordeacea faripa. * Si mola ipsi innascitur in crassa genitura intus retenta, thymbriam tritam in aceto, et aqua, liquidam bibendum præbeto. Aut hyoscyami semen tritum, et cum muria, ac filpii succo, et aceto colluito. Aut si opus fuerit cum aqua. Optimum vero est aquam mullam infundere cum aqua lenium, aut ervi, aut floris violæ. Si vero purgata fuerit a talibus, quæ sunt velut igne ambusta, myrrum coquito, ac perluito, et myrrham, ac netopum cum lana apponito. Si ventus in uteris fuerit, ac momorderit, et qua transit, colorem facit, et præ ardore intumescit, et dolet, et virum averfatur, et coitum valde agre fert, et tenditur, ac intumescit pecten, et erigi non potest, nec dirigi. Quum sic inveneris, scito, quod ventus, et genitura in uteris est, et propterea nunc agrotet. Accipe itaque mel, ceram, lini folia trita, et adipem volucrinum, et hæc in vino odorato tepelata per clysterem in utero infunde. Apponat autem folia lini. Aut semen lini terito, et in lanam involvito, et ad os uteri apponito; sin minus, efficaciore utere. Icinum, et crocum, et lini folia, et adipem volucrinum terito, et lacte muliebri diluta, rasura de tenuibus linteoilis derasa excipito, ac illigato, et ad uteri osculum apponito. Et si pinguendo carposior enascatur, quod consumat, indito, et mediocriter attenuato. Quæ enim valde attenuantur, rara sunt, et abortiunt. * Si vero genitum non suscipit uterus, sed dimittit, et calorem in se ipso non habet, instrumentum parare oportet, cui insidens vaporem intra uterum recipiar, ita ut vestes circumcirca ponantur. Suffire autem oportet casiam, cinamomum, myrrham, (singulis pari portione vino sirao, sive sapa subactis, et super prunas coniectis. Modice vero lavetur, et modice cibum sumat. Opitulatur et subditiis huiusmodi. Myrrham mollem cum melle efformato. Sit autem oblonga velut glans, et sæpe hæc facito, virum respectu habito. Prodest et pelecigi in frumento nascentes, cum myrrha triti. Mel quoque coquito, et cum tædis agitatum permisceto, et saba Egyptiæ magnitudinem apponito, fel item taurinum, et rhoem rubrum pari portione. Conyza herba est similis apio crisgo, nascitur autem prope mare in locis arenosis, odor vero eius æger tolerari potest. Hanc cum melle, et vino apponito. Aut bulbion, conspicitur autem in tritico, maxime Egyptio, acre simile cumino Æthiopico; hoc et allium, et patrum simul apponito. Venter antea lavetur. * Quum mulier caput dolet, et 64
 sinaput, ac collum, et vertigo præ oculis obversatur, et timer, et tristis fuerit, et urina nigra, et similia etiam præ uterum prodeunt, et anxietas, ac mixer ipsam reuertit, atra bilis in utero inest. Curetur autem sic. Cucumeris sylvestris anniculi internam partem, fel tauri, florem aris cum bacchare terito, et subditiis formato, et pharmacum bibendum dato, ac lavato. Quum vero mulier uteros mordetur, et 65
 dolet, lacinaturque, et bilem flavam mingit, et uterus harrit, et oculi fuerint velut morbo regio affectorum, scito, quod bilis in utero est. Quapropter optimum est expurgare totum corpus, et ipsos uteros subditiis, quæ bilem educunt. Quum vero petrificatur uterus, et onus insitum esse videtur, et color non est clarus, et compactus est uterus. Quum sic habuerit, purgare oportet cum eo, quod piam- 100
 tam dicit, et attenuare, ac frequenter vomere. * Quum mulieri male olevera ex ore, et gingivæ nigra fuerint, ac prava, caput leporis, et mores tres seorsim exure, et ex duobus curibus ventrem exime, hepar autem, et rhemes non, et in pila lapidea marmor, aut lapidem album tere, ac cribra, deinde singulorum partes portiones miscere, ac dentes conficcare oportet, et locos in ore, et postea lana succi- 105
 dissipa fricet, et cum aqua colluat. Tingat autem lanam succidam in melle, et con-
 fricet

- fricet dentes, ac gingivas, & internas, ac externas partes. Terat item anisum, & anethi semen, & myrrham pondere duorum obolorum, atque haec in vini albi meraci hemina dimidia diluat, & cum his os colluas, & multo tempore in ore contineat. Hoc autem frequenter faciat, & jeuna gargarisset, & post cibum. Optimum vero est modico cibo uti, & optima quoque ingerere oportet. Hoc pharmacum dentes purgat, & bene olentes facit. Vocatur autem Indicum medicamentum.
- ⁶⁶ Quum mulieri mamma aspera facta fuerit, stoebeas, aut rubi fructum cum aqua, & oleo coquito, & cataplasmate facto mammas integro, & betae folia superponito. Deinde ex linteo velut pileum confuito, & magnitudine ut mammae capiat, atque sic mammam indito. Si vero suppuretur, secato, & ex lana succida hiamentum, sive penicillum immitto, & eadem superponito. Postea vero ex lenticula cocta cum polenta permixta, cataplasma adhibeto. Si in pudendo mulieris, aut in testino recto ascarides nascantur, viticis semen, aut folia cum felis bubuli obolo permiscerint, & oleo cedrino subigunt, & lana succida molissima excipiunt. Induuntur autem tertio quoque die per noctem, ac diem. Postridie vero ubi amovir, calida lavetur, & allium coctum, ac crudum edat, & ascarides exeat, ac moriuntur. Muria vero etiam colluere oportet. Ad faciem ornandam. Hepar tauri terito cum oleo, illinito autem cum vino meraco. Fel autem furfures exeret. Sed & prisana succus similiter illustrat, & ovorum candidum, & farina lupinorum, & ervi, cum ficiis in cataplasmate adhibita. Et brassica radix, ac semen. Haec etiam lentiginis tollunt. Itemque aleyonionum. Et si pulvis faciem laeset, ceratum liquidum ex rosaceo preparatum subinito, & aquam frigidam affundito. Et rugas levigat hoc. In pila lapidea plumbiginem terito, & menstrua ex sira aqua assula pastillos formato, qui ubi resiccati fuerint, oleo dilutos rigosa faciei illinito. At si capilli desuant, ladanum cum rosaceo, aut anthino unguento terito, & cum vino illinat. Aut terram cinoliam cum vino, aut rosaceo, aut omphacino, aut acacia. Si vero calva facta fuerit, cuminum impone, aut sterces columbinum, aut raphanum trinum. Aut cum cepa confricet, aut cum beta, aut urtica.
- ⁶⁸ Ceterum solares appellatas maculas tollit ervi decoctum, betae succus, ovorum candidum, prisana, cucumeris sylvestris radix secca cum vini fece trita, ac illita. Aut fici folia adhibita. Item sesamo trito fricari, aut amygdalis amaris, & urticae semen, & alii cortex superligatus, & lepidium. Impetiginis omnes extrahit acetum, manna thuris, pumex, sulphur cum aceto, nasturtium sylvestreustum, & in cinerem reductum, viperæ exuvium, rumicis sylvestris radix. Teratur autem cum aceto vinoso. Si vero pustula emergant, etiam spuma argenti utere. Potio ad fluxum rubrum commoda. Cornu cerviustum ad duplum crasse hordeaceae farinae ammisceto, atque haec in vinum pramnium inspersa bibat, & sistatur. Alia. Adianti radicem tritam, & cicer correfactum, & lentium farinam ex melle bibat, aut uelut potum exhibeto. Aut farinae tritici recentis acetabulum, gummi albi dimidium, mannae thuris tertiam partem, & sinei odorati, parium. Aut de pinu, vel cupressi aqua dilue, & bibendum præbe. Bibat autem in die. Aut cornu cervi comburito, ac terito, & crudum hordeaceam farinam cum cedri baccis quinque, & vinum austerum nigrum cum tædis ammisceto. Aut mali punici dulcis assati succum cum vino nigro bibat. Aut cupressi baccas tres, aut quatuor, & myrti baccas nigras, & simul, & ipsas per se ipsas, ad robur corporis mulieris respectu habito. Cum vino vero potio fiat. Aut castorii obolum in vino nigro austero terat, ac bibat. Potio ad fluxum, & omnes morbos, qui ab utero sunt. Præparat semen, & radices, cuminum Aethiopicum, & melanthium in vino albo exhibeto. Aut ferulae rase acetabulum, & porri succum in vino albo diluto. Hoc etiam ex naribus manantem sanguinem sistit. Aut malum punicum in vino nigro coquito, ac decorricato, & interna in vino nigro terito, & cum polente farina exhubeto. Aut linum, vel erysimum coctum, & olea folia viridis, & radicem nigram aspalathi, & pepulum plenum, haec trita in eodem vino diluto bibenda dato. Aut coagulum asininum, & mali punici dulcis radicem, & gallam, omnia æquis portionibus, & mali punici dulcis succum cum vino bibat. Aut rumicis semen cum galla parte externa circumdata. Haec simul terito, & postea cytheonem facito, ac exhibeto. Si sanguis largus ex utero fluit, viticis folia cum vino nigro dato. Accipiat item omnia fluxum sistunt, vino nigro ammixto. Ad fluxum, & dolorem
- ⁷⁴ Canchryos radicem in vino nigro bibat. Si vero amplior fuerit, terebinthi fructus tritus prodest. Oportet autem vino, & aqua diluere, ac bibere. Si fluxus fiat, caneros fluviatiles in vino suffocato, & de tali vino cum aqua bibendum dato. Si vero adhuc ferat fluxus, promalon, sive myricam torreto, & tritam in vino dato. Aut porri succum. Si vero multus defertur fluxus, mali sterces comburito, terito, & cum vino dato. Si autem diuturnus fiat fluxus, sponsia combusta auxiliatur. Terenda est autem sponsia, & cum vino odorato exhibenda. Cataplasma ad fluxum. Allium, & portulacum, & apium, & loti, ac cedri tamenta trita simul misceto, & cum aqua multa diluito, & cataplasma facito. Aut rubi, & rhamni, & olea folia trita simul misceto, & in aqua multa diluito, & cum polenta in cataplasmate adhibeto. Aut sambuci, & myrti folia in cataplasmate adhibeto. Aut loci

- 72 ramenta, & mori folia, ac rosæ folia, cum uva passa ad cataplasma redigito. * Fo-
menta ad fluxus. Loliaceam farinam torrefactam in polea meraciore coquito, &
linleo ibidem pro fomento adhibeto. Aut lentis torrefactas, ac decorticas in
crassiotem instat alieæ farinæ redigito, & in aqua coquito, ac similiter adhibeto.
Aut eruvum eodem modo. Comoda est & salvia. Aut paleas hordei in salivæ, & hy-
perici decocto coquitos & imposito. Aut loti ramenta, & eupressi, in uvæ passæ
cremore cocta, linleo inducto, ac pro fomento adhibeto. Aut oleæ folia, aut he-
dæ, aut myrti in aqua coquito, & cum his etiam hordei paleas coquito. Aut sur-
fures triticos in aromatum aqua coquito. Aut surfures triticeos in uvæ passæ
cremore coquito. Aut violæ albæ semen, vel radices coquito, & ad aquam deco-
cti surfures triticeos injecto, ac foveo. Aut cum eo decocto surfures triticeos
subigat, & panem faciat, eoque calido lanæ involuto foveatur. Aut in serpilli deco-
cto surfures triticeos injecto, & eodem modo foveo. Sed & fomentum adhiben-
dum est cum spongiis calidis, & cum mollibus lanis, si dolore vexetur, & cum vasibus
refectis aqua infusa, & cum vesicis oleo calido plenis. * Collusiones ad fluxus.
73 Myrti folia, & lauri, & hederæ in aqua coquito, & cum hac tepida colluito.
Sambuci, & lentisci folia in aqua coquito, & cum excolata leviter tepida col-
luito. Aut cenanthen, & cyperum, & uvæ passas in aqua multa coquito, ac col-
luito. Aut cum sœnogræci aqua, aut rubi decocto, aut oleæ viridis, aut stupres-
sis, aut serpilli, aut mali pomice, aut radicis violæ albæ, aut lentisci decocto leviter
tepido colluito. Aut medicamentum ex buryto, & resina, & adipæ asfermo insun-
dido. Aut id, quod ex medulla, & adipæ fistilo præparatur. * Suffusio ad fluxus.
74 Hordeum tostum prunis inspersum suffuso. Aut cervi cornu cum olivis im-
maturis. Aut rhoen rubrum, & polentam torrefactam cum oleo, & vino duplo.
Aut paleas hordei, & siccus bubulum similiter. Aut loti ramenta, aut rhoen, aut
eupressum siccat cum vino nigro austro suffuso. Aut galbanum, aut mannam
thuris, aut resinam vino subactam. Aut capræ cornu, & gallam, & siccatur fluxus.
Alii suffusio. Effodere oportet isrobem, & vinaceorum uvæ duarum chœ-
nicum. Attigiam mensuram torrefacere, & de cinere in isrobem mittere, & vinum
odoratum irrogare. Mulier autem circuminsidens, ac se ipsam contegens, ac convolvens,
suffusum admittit. Aut lordes pilorum circa sedem capræ siccas rindro, & torre-
ro, atque cum hordeo fracto, & oleo subactis suffuso prunis inspersas. Aut hordei pa-
leas iidem prunis injecto. Aut eupressi ramenta in unguento subacta suffuso. Aut eieu-
tam, aut myrthanum, aut thus, & unguento affuso suffuso. Aut bitumen, & hordei pa-
leas similiter. Aut eupressi radicem rosaceo oleo persusam suffuso. Aut ad ealy-
mum, junctum odoratum, cyperum, apii semen, anisum, oleo rosaceo affuso suffuso.
Similiter autem & resinam prunis injecto. Et cinamomum, & myrthanum cum ru-
bi foliis, aut rosarum foliis, aut menta, addito modico croco, & styrace. Hæc omnia
singul terito, ac suffuso, oboli Attici pondere, in cinere fermentorum vitæ, aut in ster-
core bubulo instat acetabuli formato. Sit autem ignis ex sarnientis vitæ. Mulierem
vero imposito prius, ut ne odorem percipiat. Nam si odorem senserit, melius est
non suffuso. * Subductio ad rubrum fluxum. Myrrha, & bulbum cum melle tri-
tum, optimum præstant subductum. Aut rosæ in aqua cocta, quas sine cum rosa-
ceo unguento tritas, ac lanæ involutas apponito. Aut loti florem in aqua coqui-
to, & deinde cum rosaceo unguento terito, & in lana ad uteri os adhibeto. Aut cy-
perum, & anisum, & anisum, singula pari portione, cum rosaceo unguento trita, intro
in uteri osculum detradito. Aut myrti nigre folia in vino albo terito, & pini corti-
cem ammisceat, & similiter facito. Aut eupressi fructum, & thus, pari portione
simul ambo in unguento terito, & apponito. Si refectare fluxum opus fuerit, ca-
lamineham in vino nigro coquito, & linleo involutam apponito. Aut hyoleiyami
folia, & eieutam simul coquito. Similiter porrum, & malvam, & ceram, ac aniseris
adipem ammisceat. Deinde tepida ad pudenda subdito. Aut vinum meracum cum
resina, & malicorio cocto terito, ac similiter apponito. Aut cinicum cum vino tri-
tum subdito. Aut loti ramenta similiter. Aut lentisci folia. Aut rhoen melle cocto
amiquato apponito. Si vero non cesset, fusinum, aut bitum herbam, quæ velut sun-
76 gna est, in lana ad subductum efformato. * Ad fluxum aquæ subductum, & infu-
sile. Si mulieri aqua sinat ex pudendis, resinam siccatam, & myricæ folia, et lini se-
men in vino terito, et volucrium adipem ammisceat, et per clysterem in puden-
da insundito. Aut farinæ purissima chemam, sive conchæ testam cavotem,
aut amyllum in lana ad uteri stomachum apponat. Aliud similiter infusile.
Quam aqua ex pudendo fluxerit, myricæ folia, et thus, et resinam cum amse-
no adipæ terito, et per clysterem in pudenda insundito. Si pecten præ fluxu aquo-
so doleat, viticis semen cum melle terito, et in cataplasmate pectinis probe adhi-
bero. Si fluxus sanguinolentus, aut albus, aut qualiscunque fuerit, sulphur, et
mandragora in vino meraco terito, et lana excepta, apponito. Et supina dor-
mias, et immota maneat. Aut malicorium siccum in vino prunio terito, ac bibendum
77 dato. * Ad fluxum album potus. Hederæ albæ semen, et pini corticem in vino
austro exhibeto. Aut cornu cervi ussi parrem unam, crude hordenceæ farinæ par-
tes duas, et cedri buccas quinque aqua terat, ac bibat. Quam ab uteris trian-
gularur,

- 245 gularur, castorium, et conyzam in vino, & seorsim, et simul utramque bibat. Aut bituminis obolos tres. Aut phocæ adipis, quantum duobus digitis apprehendi possit. Aut radicis prœniz dimidiam potionem in vino odorato bibendam dato. Quum vero uteri suffocantur, et simul tussierit, sandarach obolum, et sulphuris vini tantundem, et amygdalas amaras depurgatas tres, aut quatuor misceto, et in vino odorato exhibeto. Si vero adhaeserint uteri, hordeum terito, et una cum paleis, et cornu cervi, oleo subigito, et suffuso. Quum autem sursum ascenderit, et cor, ac stomachus prematur, et subliterint, myrrham, aut refinam, aut nectopum, aut castorium, aut filphi succum bibendum dato. * Quum uteri strangularit, spiritus autem acervatim sursum commotus fuerit, et gravitas incubuerit, et mens percussa fuerit, et loqui non potuerit, et perfrigeratio adest, ac spiritus offendens, et oculi obscurantur, caput quameitissime radio, et per fasciam supra umbilicum, si opus fuerit, deligatam derudito. Dato autem castorium, et conyzam, et rutæ aquam, cuminum Æthiopicum, raphani semen, sulphur, myrrham. Ad nâres graveolentia ad uteros bene olentia adhibeto. Si vero sustinuerit, etiam grani enidii internam partem, albam illam, melle subactam, ac mixtam, naribus illinto. Aut schinum scillæ speciem, quæ mordet. Quum autem dolor habuerit, ac suffocatur, malvæ radicem, aut acetum mullum, aut feniculi corticem, aut crethmum in aqua bibendum dato. Optimum vero est cruciatu, et sedentem collocare, et sternutationem facere, aut veratrum naribus admovere. * Si vero sub septo transverso, ac præcordiis uteri sedere videantur, derepente voce destituitur, et præcordia dura fiunt, et strangulatur, et dentes conserit, et vocata non audit. Oportet igitur sub nâres suffiri lanam accensam, bitumen in ignem coniectum, et castorium, et sulphur, et picem. Inguma vero, et femora iunguento odoratissimo intus iungere. Aut stellas marinas nigras, et brassicam vino odorato misceto, ac bibat. Aut myrrhæ obolos tres, coriandri parum, refinam, prœniz radicem, cuminum Æthiopicum, hæc in vino albo, et aqua trita, aut cum aqua mulla diluta, leviter tepida bibat. Auxiliatur et peucedanum, aristolochia, cepæ lachrymæ, panaces in vino, aut aqua leviter tepida datum. Uteros ad lœcum suum reducit erotionis radix pota, aut cuminum Æthiopicum, aut apium, aut feniculi, et anis semen, anepiper, aut myrrhæ, et papaveris succus potus. * Si eos strangulatur, ab utero reprimuntur, et spiritus habet, et anhelatio. Viticis, et prœniz semen in vino bibere oportet. Aut abrotanum, et panaces, et hammoniacum. Aut rutam, aut formicem papaveris succum. Rursus igitur, si similiter habet, melanthium terito, et melle subigito, et velut glandulam efformato, ac pennæ circumdato, et apponito. Aut philistion similiter subdito. Aut telephum, aut anemones folia trita, in linteam indito, et modica myrrhæ amantia apponito. Si in lumbos uteri incubuerint, suffocatio vero caput non contigerit, polypos coctos edat, et vinum nigrum odoratum meracum quamplurimum bibat. Quum vero velut ad viscera conversi strangulati, vinum cedrinum, et vinum Æthiopicum bibat, et calida lavetur, et odoratis somentis utatur. * Si ventro inflati fuerint uteri, aromata omnia in unguentum immittuntur, et kauris, et myrrus, et cedri, ac eupressi tamenta. Hæc contundito, et trita cribrato, et in vinum odoratum inspergito, et oleum totifacem superfundito. Quum vero transvoti uteri presserint, hordeum una cum paleis, et myricam, et cervi cornu vino subigito, ac suffuso. Quum assistentes strangularint, funiculum lucernarium accendito, et præ naribus extingnito, quo subligo, et odor ipsas ingrediantur, et picem, et castorium, et peucedanum, et myrrham unguento igneo diluto, et subacta apponat. Bibat autem refinam oleo dilutam. Si valde strangularint, aut testudinis iuxta mare nata obolos tres in vini albi hemina, vel cyathis tribus tritos, bibendos dato. Aut cedro in lucernam infuso, lucernam accendito, et ubi extincta fuerit, ad nâres adhibeto. Aut eoenum scetidissimum similiter. Aut lanam incensam sub nâres mulieris suffuso. Aut bituminis parum tritum in vino albo bibat. Aut erysini conchæ testam, & castorium in vino albo bibenda dato, & lavato. Si vero etiam tussiat, sandarach obolum, sulphuris vini obolos duos, amygdalas amaras depurgatas tres, aut quatuor, & castorii obolum cum vino odorato misceto, & bibenda dato. * Si vero strangularint uteri, & strangulatio cor contigerit, & os conchilium fuerit, acetum calidum forbendum dato, & os paxillo, aut radio aperito, & vinum inodorum similiter exhibeto, & cum aceto mullo. Si vero valde strangularint, & voce destituta fuerit, cepam in vino tepido tritam, in nâres instillato, & excusato. Si vero usque ad hepatis ascenderit, & suffocatur, voce destituitur, & nihil videt, & dentes conserit, & dura sit, & nihil sensit, & frequenter respirat, & non audit. Hanc sub præcordiis manibus comprehensam frequenter iungito. Et dentibus cum paxillo ductis, vinum meracum tepidum infundito, si nihil prohibuerit. Et plerumque statim melius habet. Si ad inguma incumbant, ac innantur, caprini stercoreis pilulas, & leporis pilos, phocæ adipem subigito, ac suffuso. Aut hederæ fructum, aut folia, aut corticem siccatum, & quercus folia, ac refinam ammisceto, oleoque subigito, ac suffuso. Aut coaguli phocæ pellem conterito, & spongiam, ac mulsam cum phocæ adipem ammisceto, ac suffuso. Aut stercoreis caprinis pilulas, & phocæ pulmonem, ac cedri tamenta suffuso. Sed & bubulum stercus suffuso. Aut co-

- num bovis ramenta, & bitumen. Aut spinæ Ægyptiæ fructum, & cedri ramenta, & myrti folia sicca. Hæc molli unguento lubacta suffrago. Multa vero ardata in unguento immixto. Aut vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinam pineam, simul mixta, & passo cocto subacta suffrago. * Fomenta, a quibus discedunt.
- 83 Stercus bubulum contusum, acceti dimidia mensura, & decocti ervi ex aqua marina, aut dulci similiter dimidia adjecta, pro somento adhibeto. fovero autem leviter, & lentius decoctum bibendum dato, ac revolvendum. Et farinam sorbendam, & insuper vinum. Postridie vero grænam cnydium dato. Sed & quodurimum erit. Ciceris partes duas teras, uvæ passæ optimæ tertiam partem, affuso aquæ congio coquito, deinde excolatam aquam per noctem sub dio exponito, & postridie bibendum dato, & de cætero salyiam, & lini semen, & polentam bis per diem in vini diluti heminis quantitas dato: Aut olei heminas dimidias tres, soliorum sambuci manus plenas mensuram, hæc coquito, & cum calidis fovero, aut testis calidis immixti somentum facito, muliere in sella collocata, & vestimentis cooperta. Aut sambuci folia cum myrto coquito, & in excolata aqua paleas hordei coquito, & somentum facito, si calorem sustineret poterit. Aut acetum, oleum, mel, aquam. Hæc permixta, ac valde fervefacta, in vesicam insundito. Aut pini corticem, & rhois folia in aquam immixto, & fortiter coquito, & in excolatam aquam etiam hordei paleas immixto, ac coquito, & affuso oleo fovero. Aut loti, & cupressi ramenta, aqua, & oleo affuso, probe coquito, ac fovero. Aut cum aromatatis unguentum insundito, & gallam immixto, & rhamni corticem, & polentam triticæam cum aqua. Si vero uteri extra promingerint, & dependet velut serotum; myrti baccas, loti ramenta, rubi, & oleæ folia simul coquito, & leviter tepide fovero. Aut cum vino una cum illis, & cum graveolentibus similiter. Externas autem partes cum ovi candido oblinito. Quum vero perfrigerantur, & livide factæ fuerint, cum aqua calida. * Mollitoria uteri. Adipem ovillum, ovorum vitellum, mel, oleum rosaceum succum, & cum his farinam subigito, & ad lentum ignem tepescacito, & quod destillat lana exceptum emollito, ac apponito. Aut adipem ovillum aromatis conditum, & nitrum rubrum, aniseris adipem, & oleum rosaceum colligata, & lana excepta apponatur. Aut aniseris adipem, ovillum adipem, ceram albam, netopum, rosaceum oleum. Hæc quamoptime permisceto, & tenuibus linteis excipito, & statim, ubi lota est, apponat tepida osculo uterorum. Aut cervi medullam, & aniseris adipem in rosaceo oleo liquefaciat, & molli lana excepta subdat. Mollia subdixita, quæ aquam ducunt, & mucus, & pelliculas, & non exulcerant. Myrrham quamoptimum, & salis granum, & pipem aromatatis imbutam terito, & apponito. Aliud. Grana cnydia decorticata triginta, Indicum, quod Persæ piper vocant, & in hoc inest rotundum, quod appellant myrridanum, cum lacte muliebri simul terito, & melle diluito. Deinde lana mollis, ac pura excepta, & pennæ obvoluta subdito, & per diem finito. Si vero fortius facere voles, modicum myrrhæ ammisceto, restam videlicet partem, sive trientem, & lanam in oleum puram semisuccidam. * Ex uteris educant, & oleum mollioræ narcissus, caminum, myrrha, thus, absinthium, ciperis. Hæc ipsa per se ipsa, & cum oleo rosaceo, aut albo, aut Ægyptio. Apponantur autem, ubi lota est. Aliud, quod saniepi cruentam educere potest. Cum radis misceto myrrham, saltem, sel tartarium, cuminum, mel, & in lana subdito. Aut cumini folia similiter in vino trita. Aut silphii succum ad sicum ammisceto, & glandulam inde factam subdito. Idem facit & mori radix cum melle, & postea rosaceo illinito. Efficax est & alii caput integrum, & nitrum rubrum, & ficus pinguis, pari portione, misceto autem & gallam parvam, & glandem facito, eamque liquore aliquo tinctam subdito. Et postea lota, cervi adipem in lana subditum habeat. Aliud, quod cruenta omnia magis prioribus dicere potest, & mollire. Piper, elaterium, & lac muliebri misceto, & cum his terito etiam mel, & oleum album, & cervi adipem, & linteæ excepta subdat. Vehementer vero ducit omnigena hoc, sici pingue, elaterii portiones duas, nitrum rubrum, quantum elaterii, mellis parum, cum linteis, aut cum lana glandem facito. Aliud. Netopum, sel tauri, nitrum, cyclaminum, gallam cum melle terat. Postea vero lota, adipem cervi subditum habeat. Aut pulegium, & sel tauri tritum penne obducit, & in oleum Ægyptium tinctum subdat. Aut cyclaminum magnitudine tali cum aris flore. Aut anemones caput cum farina tritum pennæ obducit, & in oleo albo tingito. Aliud, quod omnia ducit. Cucumeris sylvestris oblongi internam partem, exempto semine, cum lacte terito, & myrrham puram una cum ipsis, adjectoque modico melle, & oleo Ægyptio, molli lana excipito. Aut cucumeris sylvestris internam partem siccatam, & melle affuso terito, ac glandem formato. Postquam autem lota fuerit, adipem subdat. Aut elaterii portiones tres cum aqua.
- 84 * Mollitoria. Ovi candidum, fatigam, mel, ceram albam, hæc simul tepescacito, & quod destillat, lana exceptum apponito. Aut adipem aniseris, ceram albam, resinam, unguentum rosaceum, cervi medullam liquefacito. Aut ovillum, vel caprinum adipem, ovi candidum, unguentum rosaceum. Ex his aut glandem facito, aut lana excipito. Fomenta, per quæ uteri purgantur, si duri fuerint. Vinum suavissimum pari aqua temperare oportet, trium semicongiarum Atticorum mensura, & feniculi radices, ac lemnis ejusdem quadrantem, & olei rosacei heminam dimidiam in ollam mittere, cuius operculum foramen habet, & vinum superfundere, & arundine indita somentum facere, & postea

- & postea scillam apponere. * Si dolores repentini irruerint, & animi deliquia affuerint, rosarium folia, cinamonum, myrrham puram, netopum, gapyrae sucum, hæc in pastillos drachmales efformato, & super frusto amphoræ candenti ponito, & pro suffimento utitor. Aut styracis modicum in oleum mistito, ac utitor velut priore. Omnia, quæ in unguenta insiciuntur, tundito, ac cribrato, & super stercore bubuli initrito, itemque styracem, & netopum, rosaceum oleum quamopimum, & Ægyptium album affundito, & post purgationes suffito. Aut lauri, & myrti folia tundito, & cyperi fructum cum unguento albo Ægyptio subigito, addito etiam netopo, & super stercore bubulo suffito. Auxiliatur & manna thuris, & cupressi ramenta, & cyperi radix tusa. Sed & juncum odoratum aromaticum, & cardamomum & iridem tundito, ac cribrato, atque hæc omnia misceto, et rosaceum oleum, ac netopum ipsis affundito, et utitor in crassiore tritici farina. Aut resinam in recens formato fictili suffito, castoreo, aut aliquo ex aromatis adjecto. Caput vero oleo rosaceo tingito, in aures autem myrteum, aut melinum oleum infundito. Et cicer album, et uvæ passas coquito, ac decoctum bibendum dato, et in aqua calida desideat. Et olivas alias, priusquam oleum remittunt, lancinato, ac siccato, et in vino odorato terito, et acetabulum Atticum præbeto. Aut cantharidum ventres, aut adiantum, et nitrum rubrum Ægyptium, et serulae radicem, et apii semen tritum, hæc exhibeto. * Si vero urinae stulicidium corripiat, in aqua desideat, et vinum dulce bibat. Si maxime stranguriam in uterorum dolore, vinum suavissimum pari aqua temperatum, tritium semiconiorum Atticorum mensura, et feniculi radices, et seminis caudem trientem, et olci rosacei heminam dimidiam. Hæc in novam olam mittito, et vino superfluo foveto. Et scillam apponat, donec osculum molles et amplum esse dixerit, et si exulceratum fuerit, ac pustulae ubique in ipsis fuerint, præstat adipem anserino cum thure curare. Ad uterorum dolorem, Peucedanum, aristolochiam, panacem, hæc simul in vino dulci misceto, et tepescita bibenda dato. Et peplum album sorbeat, et urticae semen. Aliud fomentum, sive suffimentum. Si dolor habuerit, malicorum punice dulcis, loti ramenta, oleæ folia siccata. Hæc cum oleo subigere oportet, et super ignitum stercore bubulum mittere. Aut galbanum, myrrham, thus, oleum album Ægyptium, super vitæ sarmenta. Aliud fomentum fortius ex bitumine. Bitumen, radicem xanthii, pilos leporis, rutam, coriandrum sicum, hæc omnia terito, et formatas inde placentulas, sive pastillos suffito. Aut ad piecem, et sandaracham tulam trientem, cupressi ramenta ammisce, et unguento assulo placentulas formato, et in ignem missas suffito. Aut cornu capræ in sarmenta confectum oleo subigito, et in ignem missum suffito. Aut effusa scrobem vinacea uvæ torreto, et cinerem in scrobem mittito, et vino odorato insperse, mulieri circuminsidenti fomentum facito. Sint autem vinaceorum cheimices duo, atque hæc ipsa quammaxime sicca. * Si vero uterus doleat usque ad vesicam, porri semen cum aqua tritum bibat, Aut cyclamini radicem in vino albo jejunæ bibendam dato, et calida lavetur, et subcalidam jejunæ bibat, et tepescitura apponat. Aut alii caput integrum, et nitrum tostum, et cuminum trita, ac melle subacta apponito, et calida lavetur, et subcalidam bibat. Ad omnem uterorum morbum curandum. Lini scissi una cum stipula pagillum tenuiter tulum, in vino albo quamsuavissimo per noctem madefacito, deinde excolatum in ollula tepescacito, et in eo laqueum molliissimum tinctam apponito, et vicissim priore detracta aliam subdito. Opuntiarum autem et crocus, et myrrha, et ponticae nuce, alba, et pura lana accepta, et cum adipem anserino, ac unguento irino appolita. Si dolor vexarit subditiis, purgatam, myrrhæ acetabulum, thuris tantundem, melanthium, cyperum, fesceli, anisum, apii semen, netopum, mel, resnam, adipem anserinum, ovi candidum, unguentum Ægyptium, singula paribus portionibus in vino albo dulci, duarum heminarum mensura terito, et tepidis insusis colluito. Si dolor vehementius habuerit, cantharides, cyperus, calamus, juncus odoratus, et iris prosunt. Hæc in vino nigro coquito, ac utitor. * Alia collutio. Si dolor, et urinae stulicidium vexarit, porri succum, sambuci fructum, fesceli, anisum, thus, myrrham, vinum, in succum redigito, misceto, ac infundito. Aut myrrhæ acetabulum, thuris tantundem, melanthii, et cyperit tantundem, fesceli, anisum, apii semen, netopum, mel, resnam, anseris adipem, ovi candidum, unguentum Ægyptium, singula paribus portionibus in vino albo dulci diluto, ac infundito. Aut mercurialis aquam decoctam cum myrrhâ, thure, netopo. Aut salviâ, et hypericum in aqua coquito, ac infundito. Aut apii semen, anisum, melanthium, fesceli, myrrham, calis fructum in vino coquito, ac colluito. Alia collutio. Si dolor fuerit vehemens post purgationem, sambuci fructum, et lauri baccas in vino nigro coquito, ac colluito. Aut sambucum in aqua coquito, et aquam excolato, et vino dulci affuso colluito. Si post collutionem insulam dolor oboritur, aromata, quæ in unguenta insiciuntur, coquito, et de aqua duas heminas excolato, misceto autem adipem anseris, et oleum rosaceum, et tepida infundito. Amplius autem insusum nulli, ut senectudinem, competit quam duarum heminarum. Aut mercurialem in aqua coquito, et ad succum, myrrham ammisce, aut thus, et netopum pari mensura, et tepidum infundito. Si vero uterus doleat, cyclamini radicem in vino albo jejunæ bibendam dato, Et calida lavetur.

91 *venae, et subcalidam bibat.* * Si ex fervido, et superficario ulcere pudenda fuerint exculcerata, myrris baccis in vino coctis colluat, & meliorem apponatur. Et mali punici dulcis puramina in vino coquito, & myrrham, ac resinam simul mixta vino diluio, & unctum in his linteum subdito. Et si urina stillicidium corripit, forisepum adhibeto, & pectinem illinito. Desideat autem in decocto rosarum, aut rubi, aut myrris, aut olea, aut pampinorum vitis, aut juniperorum baccarum, aut salvia. Si ventus in tupo abortus fuerit, & dolor vehemens, & fluxus non exit, cuminum apponatur. Et salviā, ac cyperum tusa madefacito per noctem, & mane excolato, & lucidum, ac clarum cremorem in vas infundito, & crassorem tritici farinam cum vino albo ammisceto, & filipii succum magnitudine fabae, cum farina coquito, & nudus sorbenda dato. Si columella in pudendis nascatur, dolor obtinet. Et doloris quidem medela est apu semen. Columellam vero resecare oportet. Si ulcera in pudendis oboriantur, & pruritus corripit, olea solia, & hederæ, & rubi, & mali punici dulcis trita, & vino veteri diluta, cum recenti carne apponito, ita ut folia carni oblinas. Et habeat subditam per totam noctem. Mane vero exiens, & myrrum in vino coquens, cum vino pudenda colluat.

Norba ad finem primi libri de morbis mulieribus adjecta.

ARGUMENTUM.

- 1 Ad tussim pueri. Ad alvum pueri solvendum. Ad anhelitum. Purgatorium.
- 2 Plurimum solvendum. Corrosivum. Pharmacum nigrum. Ad anginam illino. In doloribus podagricis.
- 3 Medicamenta ocularia. Pulvillus.

- 4 Ad argemoneculi ulcus. Oculi dulcis myrrina fluxus. Piliis inspersis ad oculos. Ad pilos corporis, aut circa oculos extirpandos.
- 5 Ad intestinorum levitatem. Ad gravitatem. Infusum sedis pituitam docens.
- 6 Bilem dulcentia. Stercus eductum pharmacum nullum bibita.
- 7 Infusum ad dysenteriam. Potio.

1 **A**D tussim pueri. Thapsiam in polenta edendam dato. Aliud. Ex ovo affato vel elum acceptum terito, & sesamum album tostum, & saltem cum melle delingenda dato. Ad alvum pueri solvendum. Lanam illotam melle tinctam indito. Si vero antiquior fuerit puer, ceparum internas partes tritas cum melle indito. Si lac non fuerit, recentis tritici farinam elotam, melle, ac oleo ammixto, tepidam sorbendam dato. Ad anhelitum pueri facit thus in vino dulci, & illuvies. Purgatorium. Glandulas facito ex mellis hemina, anisi acetabulo, bituminis drachmis duabus, felle bovis, myrrhæ drachmis tribus, elaterii porione. Hæc in vase æneo coquito, & anseris adipem ammisceto, & ubi uti voles, glandulis ansetino, aut ovillo adipe illinito, lana autem utere molli. Vomum solvit ocymi incus in vino albo. Aliud. Farinæ tritici recentis excuticatz ammisceto, Corrosivum sic paratur. Veratrum nigrum, fundaracem, squamarum eris, singula paribus portionibus seorsim terito. Quam autem trita fuerint ad unam partem, duplam calcem ammisceto, & cedræ subacta illinito. Aliud corrosivum pharmacum sic paratur. Florem eris pure combustum, donec ruber fiat, terito, ac nitro. Pharmacum nigrum. Squamam eris, & florem eris, species facito. Unam fortissimam, quæ habet ad squamam, tertiam floris partem. Alteram, quæ quartam. Tertiam, quæ quintam. Hoc pharmacum ad omnia conveniens est. Illitio ad anginam. Roris marini semen, flaphis sylvestris, absinthium, elaterium, mel. In doloribus podagricis. Abcessus pitro toto aqua diluto, cataplasmatibus modo integito, & tribus diebus non lavato. Ubi vero laveris, rursus nitrum rubrum nudum cum modico melle terito, & hoc semper utitor. Inflammata illine portulaca cum farina massa, & lactuca rubra drachma, ex aqua dissoluta. Medicamenta ocularia. Asellum, arugo, tel capre, myrrha, hæc dissolvuntur, & omnia simul aqua vino albo diluantur, postea in arundinem confecta, sicca in usum veniant. Pulvillus. Misy preparatum in pila terito, & spuma argenti chrysidis appellatur. cinerem lotum ammisceto. Sint autem cineris partes tres, misyos una. A misy in maza combinato, vitans, ne dissuat. Nam dom torretur, liquecit, ubi vero probe tostum fuerit, puiceum fit. Alius pulvillus. Cerula eodem modo cum misy tosto miscetur, velut chrysidis cinis. Alius pulvillus. fortior prior. Spodium tyrricum ex fulgine lora, & cerusa, & misy torrefactum. Sunt autem duæ partes cerule de spodio, una vero misyos. In hæc anemone folia contusa exprimo, & in eris rubri vase ad solem expono, & ut nihil illabatur, contegito. Quam vero crassa facta fuerint, pastillos formato, deinde siccat, & siccatos quamaxime fieri potest, comburio, & postea perfrigeratos leviter terito, & de spodio ex fuligine loto partem portionem misceto, deinde netopon instillato, & patum terito, deinde

- 40 deinde melle diluito, & resicata in vase aereo asservato, ac utitor. Pulvillus mollis. Spodium cyprum, chalcitis non lota leviter trita, flos aris. Hæc paribus portionibus misceto, ac terito. Alius. Spodium cyprum, chalcitis leviter trita, & cinis chrysidis illotus. Hæc inter se terito. Alius. Spodium lotum, chrysidis, & aris flos, paribus partibus trita. Alius. Uva acerbe succus, & spodium cyprum. Uvam immaturam in vigore constitutam sume, & succum per linteum in vas aeris rubri exprime, & acetri albi acerrimi tertiam partem ammiscce, atque sic in sole coque, & quinquies in die agita, ac conturba. Esurientissus factus fuerit succus, spodium cyprum tritum adice, ac permisce, ita ut, ubi sex, aut septem dies in sole positus steterit, ad heminam succi Atticam, spodium drachmas octo immittas. Si vero acrius efficere medicamentum velis, minus de spodio, sed mollius, plus. Postea vero siccato hæc, donec in pastillos formari possint. Deinde domi siccato, sursum in fumum suspensa, atque hoc tandem, donec testacea fiant, ut inter terendum non adhareant, postea sic utere. Reponito autem in loco humiditatem nullam habente. Alius. Spodium, chalcitidem acceto albo subigito, deinde factos inde pastillos siccato, & ubi oculum sublimiter volēs, quamoptime terito, & vino veteri dulci concalescificato. * Ad argemontoculi ulcus. Populi nigre lachrymam, læ guliebre misce, ac utere. Si oculus lachrymetur, & dolor vexet, mali punici dulcis succum expressum in aereo vase coquunt, ut niger fiat instar picis. Si vero æstas fuerit, ad solem exponito, deinde liquidum subligito. Si vero dulci lachryma suat oculum, quum uva fuerit saba, valde matura, & gracilis in vite, decerptam exprimito, ac excolato, deinde in sole siccato, & ubi siccas factus fuerit succus, detradito, & æruginis dimidium obolum Attici ponderis ammisceto. Deinde hoc subligito. Pulvillus insperditis. Plumbum, & spodium aquis partibus, myrrhæ decimam partem, succi papaveris parum, vinum verus, arida tere, ac utere. Alius. Accipitur leortia, sive recrementum plumbi, & spodii tertia pars, & cerula tertia, & charta usta sexta, & myrrhæ pars decima. Si pilos ex corpore extirpare velis, vitis lachrymam cum oleo illimito. Si vero etiam circa oculum tollere velis, evelito, & illinito, & cum tenui cuticula discedet, & locus rubicundus, ac boni coloris erit.
- 70 * Ad intestinorum levitatem. Lentis, ac triticum recens, duarum cheniolum mensura, aqua macerato, & ubi mollia facta fuerint, in pila, aut mortario fortiter conterito, deinde aquæ heminis sex affundito, ac fortiter commovito, & ubi purgamenta discesserint, in ollam insundito, & modico melle affuso coquito, & valde cocta correfacito, ac edenda præbeto. Si vero sitieris, vinum vetustissimum bibat, atque hoc utatur, donec sanus fiat. Ad gravedinem. Si quis gravedinem habeat, myrrham tritam, ammixto melle, linteo excipiat, & nares conficeret. Infusum sedis piruitum ducens. Thapsiæ potionem, & uvæ passas quadraginta, aut grani enidi, aut cnestri potionem sumito, & mellis dimidiam heminam, ac olei tantundem ammisceto, & aqua marina diluito, in qua fursures cocti sunt, aut priscana, donec pinguis facta fuerit. Aut adipem betæ succo ammisceto, & niter drachmas decem. Aut salis heminam plenam aquæ marinæ ammisceto. * Si vero hæm ducere velis, succi siphii potionem, elaterii drachmam unam, & dimidiam, colocynthidis drachmam terito, & isdem, quibus prius, diluito. Si autem vehementius ducere velis, cucumeris sylvestris internam partem quartam drachmæ parte in dimidia aquæ hemina macerato, et per sedem insundito, et si in egressu mordeat, priscanæ succum postea insundito. Aliud. In lacte asinino cocto, aut in betæ succi heminis tribus internam cucumeris sylvestris partem macerato, et saltem, mel, ac oleum ammisceto, et postea priscanæ succum insundito. Aliud. Colocynthidis drachmam terito, et in lacte asinino macerato, eodemque misceto. Aliud. Cucumeris sylvestris interioris drachmam, elaterii potionem, salis quantum tribus digitis apprehendi potest, mel, oleum, aqua marina diluito. At si stercus educere velis, nullum pharmacum bibito, sed aliter utere. Infusum ad dysenteriam. * Punici dulcis malicorium in vino ad dimidias coquito, et olei quartam heminæ partem ammisceto, et thuris quartam drachmæ partem. Aliud. Unguenti rosacei dimidia hemina, priscanæ succus, aqua marina cocta. Aliud. Veratri potiones duas tribas in aquæ dimidia hemina diluito, et olei tantundem affundito. Potio. Mala cotonea, discarato, et in aqua macerato, et ubi aqua odorem acceperit, bibendam dato. Alia. Priscanæ farinam in congium aquæ missam coquito, donec pinguis fiat. Alia. Mala concisa siccata, et favum mellis in aqua macerato, ac simul terito, et ubi subdulcis facta fuerit, excolato, et apii folia injecto. Alia. Uvam passam albam, et calamisthen, et favum mellis in aquam missito, ac terito, donec aqua subdulcis fiat.

HIPPOCRATIS COL LIBER DE STERILIBUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Quot, ac qualia mulieribus contingunt, propter quae non pariant, antequam curentur, & propter quae omnino steriles fiant. Os uterorum omnino a pudendo aversum, distortum, omnino conclusum, recens conclusum magis, quam oportet.
- 2 Uterorum levisitas unde. Ulcus in utero.
- 3 Reliqua ex mensibus materis. Uteri magis, quam currunt, bidentes.
- 4 Menses omnino suppressi. Menses pauciores. Menses plures, quam debent.
- 5 Os uterorum ex pudendo elapsum. Menses non procedentes, velut debent.
- 6 De experimentis, per quae indicatur an praegnant sit mulier.
- 7 Quomodo mulierem famellam, aut masculum gestantem cognoscat.
- 8 De curatilibus ad conceptum.
- 9 In stomacho recto, & molli, & sano menses non procedunt.
- 10 Pharmacis, & potibus nihil iuvantibus, quid tentandum. Uteri a pinguedine laesi.
- 11 Coitus tempora, & coitusviri diata. Per non tempus conceptus aptissimum. Mulierem purgatam quomodo ex verticis ulla cognoscat. Alia curatio.
- 12 De mulieris non concipientis, quae prius concipere solebat, curatione. Pars in utero unde.
- 13 De membrana in osculo uterorum nascente, alia curatio.
- 14 De curatione mulieris parere non potentis. Mulieris biliosa, aut pituitosa ex mensibus cognatio. De mulieris non concipientis, nec vero miseri potentis curatione.

- 15 De uteri gracilitate, osculo ipsorum exasperato, & concluso, & eius causis. Cur mulier praeter naturam exasperata non concipiat. De oris uterorum duri curatione.
- 16 De mensibus multis procedentibus.
- 17 Catuli fomentum.
- 18 Physica cognitio medica necessaria.
- 19 Conceptuum summum.
- 20 De mola conceptu, causa, & signis. Molam gestantibus, lae in mamma non generatur. Mola interdum ad duos, aut tres annos gestantur. Mola erumpens. Maris, & femella motus, aut etiam status quatenus curanda.
- 21 De illis, quae ad uteri purgationem faciunt sive ex parte, sive etiam alias. Suffocationes. Purgatio ex parte moderate facta, venter manens, aut etiam status conclusus.
- 22 Dolor ex partu corruptione. Substitutum uterorum, Uteri ulcerati, aut osculum exasperatum.
- 23 De praegnantis satum menstruum, aut bimestrem corruptentis curatione. Uterum infansia.
- 24 Praegnantis decimum mensem perficere nequens, & satum corruptum. Genituram coarctans, nec praegnantis tamen.
- 25 Abortum invito faciens quomodo curanda.
- 26 Genituram non continentem curatio. Uteri genituram tertio die exstantes. Callorum ex utero expulso.
- 27 Quando praegnantibus menses desinant. Venter uni dolor a coitu, & sanguis recens apparens. Uteri extra naturam progreffi.
- 28 Uteri extra pudendum dependentes.



E his quidem, quae accidunt mulieribus in singulis affectionibus, prius dictum est. Nunc autem ostendam, ob quas causas mulieres omnino steriles fiant, & cur non pariant, antequam fiantur. Causam vero hanc esse dico: si os uterorum omnino aversum fuerit a pudendo, non concipiunt. Non enim fuscipiunt uteri genituram, sed statim foras exit. Contingit autem hoc etiam, si partum distortum fuerit os uterorum praeter naturam a pudendo. Et si omnino conclusum fuerit os uterorum, neque sic fuscipiunt. Neque si recens conclusum fuerit magis, quam oportet. Singula vero relata manifesta sunt. Ex enim si omnino aversum fuerit, aut conclusum, menses non procedunt omnino, aut prodeunt violenter cum morbo, si sanguis coegerit uteros pro igne converti. Et si purgata fuerit mulier, aliquando os uterorum ipsi a pudendo avertitur. Si vero partum distortum, aut recens conclusum fuerit, prodeunt quidem menses, prodeunt autem violenter, & paulatim per multos dies. Haec autem omnia manifesta sunt, si sic habent contingenti mulieri, & si horum aliquid fuerit, curata mulier facunda fit. Quandoque vero etiam sua sponte. Haec autem singula cur fiant, dicitur. Dum autem est & in mulieribus morbis. Si leves fuerint uteri. Contingit autem hoc & ex natura quibusdam, & si ulcera innata magnas cicatrices reliquerint. Si leves igitur uteri fuerint, mulier in ventre non concipit. Nam genituram fuscipiunt quidem uteri, si non alia aliqua causa obstitit, non autem concipiunt, sed semen foras emittunt. Hoc autem maxime clarum fit contingenti, & si innotescatur, an aliquando ulcera in uteros ipsi oborta fuerint. Menses vero sano quidem modo prodeunt in hoc morbo. Verum talis plerumque incurabilis est, & haec causa est, ut in ventre ne concipiat. Si ulcus in utero factum fuerit ab affectione.

- 25 sectione quadam ex relaxis, & non statim sanatum, sed impurum factum fuerit, permanet ulcus ad multum tempus, quemadmodum & id, quod in aure exiit, & male olet mulier, & quandoque ignes male olens ipsi ex pudendo fiunt, & quamdiu sane ulcus habuerit, in ventre non concipit. Non enim concipiunt uteri genitalia. Huius autem menses sano modo procedunt. Verum ex contractu, & interrogatione maxime clarum fit de relaxis. Curata vero fecunda fit, exigua tamen spes est. * Si quid ex mensibus in utero remanens scissuram, ac legmentum habeat, quod circa osculum, aut paulo penitus calescat, & rursus frigescat, neque sic in ventre concipit. Impedimentum enim hoc incumbens, genitalia, quo oportet, transire non permittit. Et si quidem in principio curretur, nascitur, & fecunda fit. Si vero tempus accesserit, sterilis manet. Manifesta est autem affectio maxime ad contactum. Durum enim quiddam intus est. Et si magis, quam convenit, uteri hiant, neque sic pragnans fit. Non enim concipiunt uteri semen genitale. Sed & hoc ad contractum clarum fiet, & menses acervatim prodeunt, & per paucos dies. Fit autem & natura hæc affectio, & a relaxis morbis. Et si quidem a natura fuerit, incurabilis est morbus; sin minus, non sani prodeunt menses, utpote muliere non exsistente sana, neque sic pragnans fit. Non enim compingitur semen a sanguine morbofo. Sed sanguis, qui a corpore morbofo descendit, genitalia serofam facit. Serofa vero facta genitalia, tempore modico, aut multo foras progreditur una cum sanie. Atque hoc ex corpore mulieris, & ex mensibus manifestum fit.
- 45 Prodebunt enim ipsi menses, velut dictum est, sive biliosa, sive pituitosa, sive aquosa fuerit. At brevi curata fecunda fit; sin minus, non. * Si vero mulieri menses non prodeant omnino, aut ab omnibus relaxis, etiam sic non concipit. Venæ enim sanguine plene genitalia non suscipiunt, & in uteris aliquid inveterati sanguinis inesse necesse est, quod genitalia nutrirī prohibet. Si vero pauciores quam debeant, menses prodeant, neque sic pragnans fit; causa vero in priore morbo relaxis sunt; fit autem hoc manifestum ex interrogatione, & si quidem a natura pauci menses prodeunt, incurabilis est. Si vero ab affectione aliqua ex relaxis, brevi curata, fecunda erit. Et si plures, quam debent, menses mulieri prodeant, neque sic in ventre concipit. Uteri enim, sanguine evacuato, genitalia non concipiunt præ debilitate. Si vero etiam conceperint, sanguis multus derepente in uteros mulieris descendens, genitalia suffocat. Manifestum autem & hoc est ex mensibus, qui multi prodibunt. Et si quidem natura mulier multos menses demittit, sterilis fit. Si vero non natura, sed ab aliqua ex relaxis affectione, brevi curata fecunda erit. * Et si os uterorum ex pudendo exciderit, neque sic concipit. Nam os durum fit, & genitalia non suscipit, & intumescit, & propterea in totum infecunda fit.
- 60 Manifesta est autem hæc affectio ex eo, quod contingit. Et si non prodeant menses, velut debent, sed deorsum processerint in sedem, neque sic in ventre concipit. Manifestum est enim, quod os uterorum a pudendo aversum est, aut conclusum, & si quidem ad sedem aversum fuerit osculum, aut conclusum, curata fecunda fit. Utrumque vero ex interrogatione, ac responsione manifestum fit. Si enim menses semper sic prodierint, clarum est, quod hic morbus causa est. Atque tot, ac talia mulieribus contingunt, propter quæ non pariunt, antequam curentur, & propter quæ omnino steriles sunt. Quare mirari mulieres non oportet, quando coeunt quidem, non autem facie pariunt. Experimenta, per quæ indicatur, an pragnans fiet mulier. Si cognoscere voles, an mulier pragnans fiet, butyrum, & lac mulieris masculinum plentis bibendum dato, & si eructaverit, concipiet; sin minus, non. Aliud. Netopum, modicum lana exceptum subdat, & postea mane, an quod subditum est, per os oleat, consideret; & si quidem oleat, concipiet; sin minus, non. Aliud. Cuiusque mulieri a subditis non valde fortibus dolores ad articulos processerint, & stridor dentium ipsam habuerit, & vertigine affecta fuerit, & oscitaret, huius maior spes est, ut pragnans fiat, quam ei, quæ nihil horum paritur. Aliud. Caput alii interum depurgatum, ad detersum ad uterum apponat, & postridie videat, an per os oleat, & si oluerit, concipiet; sin minus, non. Aliud. Si cognoscere voles, an mulier concipiat, animum in aqua tenuissime tritum bibat, ac doluiat, & si quidem pruritus ipsam circa umbilicum corripuerit, concipiet; sin minus, non. Prægnantem mulierem, si non ex alio cognoscas, ex hoc cognosces. Oculi videntur distracti, ac caviore; & candidum in oculis, albedinis naturam non habet, sed lividius apparet. Quæ in ventre habent, maculam solarem in facie habent, & postquam conceperunt, vinum odio habent, & cibos averfantur, & oris ventris morfus, ac livida pleni sunt. Mel, & animum tenuissime terito, deinde in aqua diluito, ac exhibito, & dormire finito, & si quidem tormen ipsi fiat circa umbilicum, pragnans est; sin minus, non est. Post hæc autem omnia farinam bibat, & mel, & organum in vino, & oleo. * Quæcumque in utero habentes, maculam solarem in facie habent, formellam gestant. Quæ vero bene coloratæ permanent, masculum plerumque gestant. Si papillæ sursum conversæ fuerint, masculum gestat. Si deorsum, formellam. Accipe de lacte, & farinam misce, & pastillum forma, & ad lentum ignem assa. Et si quidem comburatur, marem gestat. Si vero diffundatur, formellam. Aut idem hoc lac super solia emulsum contemplare. Et si quidem condensatur, masculum.

8 masculinum gestat. Si vero diffusum fuerit, scemellam. * Curationes ad concep-
tionem experimento cognita. Si qua liberorum generationem expectat, quæ sine
haberi sit, & si qua jam antea prægnans fuerit, nunc autem non pariat. Quum sto-
maghus uteri durus fuerit totus, aut summa parte, & concilius, & ac non rectus fue-
rit, sed ad alteram coram avertus, aut ad intellum rectum inclinatus, aut in se i-
psum contractus, aut sibi stomachi sibi ipsi incuberit. Undecumque igitur aut as-
per fuerit, aut callidus, sit autem durus & a conciliione, & a callositate, his men-
ses non apparent, aut multo pauciores, aut peiores, quam oportet, apparent, & per
longus tempus. Et mentes quidem iuxta sanitatem corporis, & uterorum, exitum
inveniunt. Itemque juxta naturalem, ac iustum modum, & a calore, & humiditate
mentium, & stomacho non valde læso. At genituram rursus non suscipit pro-
pter læsionem, quæcumque tandem impediens susceptionem a stomacho non bene
habente. Fluic post fomentum toto corpori adhibitur, pharmacum bibendum dare
oportet, & corporis purgationem primum facere sive sursum & deorsum, sive de-
orsum solum. Et si quidem sursum purgans pharmacum dederis, ante purgatio-
nem fomentum ne adhibeto, sed postea. At fomento prius facto, pharmacum de-
orsum purgans, bibendum dato. Si vero sursum purgante non opus habere videat-
ur, præmisso fomento, deorsum purgans bibendum dato. Quum autem cor-
pus probe habere visum fuerit, postea fomentum adhibeto, ita ut uteris frequen-
ter infundere facias in fomento, quod maxime conferre visum fuerit. Injeto autem in
fomenta, cupressi ramenta, & lauri folia contrita, & multa calida saepe lavato. Quum
vero recens lota, & foras fuerit, uteri osculum dilatato, sinulque dirigito, si opus fue-
rit, cum specillo stanneo, aut plumbeo, a tenui aspicatur. Deinde cum crassiore, si
admisserit, donec probe habere videatur. Tinguo autem specillum in mollitorio dila-
to, quodcumque liquidum factum, conferre videbitur. Specilla vero retro lata facito.
Deinde lignis longis adaptato, ac sic utitur. At vero hoc tempore in vino albo
dulci, quamvisissimum, tædam pinguisissimam in tenuia frusta concisam coquens, bi-
bat, & apii semina confusum, & cimini Aethiopici semen, & thias quamopimum.
De hoc jejuna bibat moderata copia per quot dies bene habere visa fuerit, & e-
dat cartilos pingues percoctas, & polypum in vino dulcissimo coctum, & de iuscu-
lo bibat, & brassicam coctam, & vinum album insuper bibat, & ne coenat, & his in
die lavetur. A cibis vero hoc tempore abstinat. Postea vero, si processerit secun-
dum stomachum, & purgationem aliquam foras ostenderit, de porione aliquid bi-
bat per annum atque alterum diem, & a specillorum usu cesset, & conetur uteros
purgare subditis, & medicamentis. * Cumque vero stomacho recto, & molli,
& sano, & probe habente, & in debito loco sita, menses omnino non apparue-
rint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sanis, morbum perscrutatus,
quem uteri habent, & an corpus etiam aliquid conferat, compares causam, a qua
prægnans non fit, & quum quidem sic habet, curationem facito, adhibens id, quod
convenit, si admisserit, curationem incipiens a fortibus, prout tempestivum esse vide-
bitur, desinens autem in molliora, donec uteris probe purgatus esse visus fue-
rit, & stomachus consistere recte habens in sufficiente loco situs. * Si vero a
pharmaco, & a potione non processerit, neque ubi ipsum bibit moderato tempo-
re, a potione quidem hac cesset. Quum vero probe habuerit, per usum specillo-
rum os stomachi molliato, & ut hiet, facito, ad viam subditio præstandum, tum
a medicamentis suffragabilibus, tum a mollitoris. Postquam autem probe
mollium, ac suffitum esse videbitur, appositis pharmacis uteri purgationem
facito, donec probe habere visum fuerit, incipiens a mollibus ad fortiora, desi-
nens autem rursus in mollia odorata. Pleraque vero ex fortibus medicamentis stoma-
chum emulcerant, & prohibent, ne rectus consistat, & probe habeat ad genitu-
ræ susceptionem, & uterum siccum faciunt. Si vero mulier a pinguedine uter-
os sibi læsos esse putet ad conceptionem, attenuato ipsam quammaxime, & ad reli-
qua gracilem facito. * VERNUM autem tempus optimum est ad conceptum. At vir non
sit ebrius, neque vinum album bibat, sed fortius, ac meracius, & cibos edat fortissi-
mos, & calida ne lavetur, & robustus sit, ac sanus, & a cibis abstinat, qui ad rem
non conducunt. Quum autem mulier purgata visa fuerit, & stomachus ingri recte ha-
bere, lavetur, & caput friceur, & nihil omnino illinatur. Postea linteo modico lo-
to capillis circumdato, reticulo loto nihil olente deliget, linteo primum suppo-
sito. Deinde ubi galbanum ad ignem, aut solem calefactum, ac probe mollium sub-
didit, coalescat. Postea mane exoluto reticulo, ac linteo, caput suum alicui olfacien-
dum exhibeat, & si probe fuerit purgata, olet, sin minus, non olet. Verum hæc a
cibis abstinent faciat. Si vero non secunda apposueris, nunquam olet, neque purga-
ta, neque alias, & si prægnanti apposueris, neque sic olebit. Quæ vero saepe concipit,
& secunda est, ac sana, ei si apposueris, etiam si non purgata, olebit ipsius verum,
alibi vero non. Quum vero cognoveris ipsam recte habere, ad virum accedere
jabeto, & mulier quidem a cibis abstinat. Vir autem non sit ebrius, verum frigi-
da lotus, & cibis paucis conducentibus pastus, & si mulier genituram se concepisse
cognoverit, primo tempore non amplius ad virum accedat, sed quiescat. Cognito-
scet autem, si quidem vir dixerit semisisse, mulier autem præ siccitate ignorat. Si

- vero uterus rursus reddideit genituram eadem die, humidus erit, & si humidus factus fuerit, rursus cum viro misceatur, donec concepiat. Alia curatio. Ubi fomentum rotæ corpori adhibueris, medicamentum bibendum dato sursim, ac deorsum purgans. Deinde lacte alvino posita in potu exhibito, uteros per fistulam duobus diebus soveto cum urina muliebri putrida, nitro injecto. Tertia vero die cum urina bubula. Quarta autem, & quinta, foeniculi semen tritum, & sambuci folia, ac lauri, & cupressi ramenta. Hæc coquito, aqua affusa. Oportet autem post fomentum, multa calida lotam, apponere adipem aromatizatum, statim a fomento, & ad noctem. Posita vero hoc preparato. Myrrham statim, butyrum, adipem aserinum, medullam cervi, resinam, & netopum. Horum singulorum aequales portiones permixtas, ac liquefactas apponat in lana Milezia molli quamoptima. Deinde plumbeis penicillis quinque, ad octo digitorum longitudinem fabricatis, uterum aperito. Primus ex his sit tenuis, alter crassior, & reliqui alius alio crassior sit. Apertuntur autem per dies quinque, & semper lota apponat, & ex lumbis deliget, ut ne excidant, & semper ulterius intrudat. Postremum vero quampenitissime. Postquam autem aperueris, purgatorium appone, cantharidas tritas quinque, & colocynehidis longæ internam spongiolam partem, & myrrham. Hæc melle cocta subacta, & in glandem efformata, lana involuto, excepta summa parte, Deinde in oleum suavisimum tingito, ac apponito. Utere autem & hoc purgatorio, felle tauri, & flore æris affato, & nitro, & myrrha modico melle dilutis, ac linteo tenui deligatis, & linteo superne pharmaco obducto apponito. Utere & buprestis cum myrrha, & elaterio cum melle cocto, & cantharidibus cum elaterio, & myrrha. Postquam autem purgata fuerit, postredie tibi lavit, uterum colluto. Cuminum Æthiopicum tritum, & melanthum, & resinam, & oleum, & mel, ac vinum dulce. Hæc mixta, & tepidatâ infundito. Postquam vero infunderis, erectam obambulare iubeto, quo collutio infusa conglutietur. Subdito autem crocum, & myrrham, & thus, singula paribus portionibus sicca linteo illigata, ita ut anserinum adipem ammisceas, ac linteo oblinas. Atque hæc apponito per dies septem. Octavo vero suffium facito cum myrrha, bitumine, & hordeo, oleo odornato subactis; his lento igni injectis, ac suffito per fistulam facto. Postquam autem suffium feceris, postredie castoris testem terito, vino albo affuso, & ipsum melle oblitum, & lane involutum apponat in noctem. Mane vero eo sublato, ac emollito, ad virum accedat, & ubi condormit, quiescat, & si non prima vice conceperit, eodem rursus apposito, virum adeat. Cæterum hunc medicationis ductum incipere oportet, ubi menses prodierint. Desinentibus autem mensibus, conceptorio medicamento apposito condormire. Priore vero tempore neque mulier ad virum accedat, neque vir ad mulierem. * Quam autem mulier non conceperit, prius concipere solita, uteri vero viri genituram in se ipsos suscipiunt, penitus necesse est mulierem terotam hanc facere. Quandoque enim in uteris pus innascitur, pus autem in uteris a tuberculis fit. Et sane ob hoc genitura viri, quando cum viro coit, uteros non contingit, quo videlicet ipsa viri genitura compingatur. Nam pus ipsam dissipat, ut ne afferatur. Mortificat enim pus, & putrefacit genituram, proinde & pus ex uteris expurgare oportet, & tuberculum in utero sedare, quo de cætero non impedit, genituram compingi, ac efferri. Festinare itaque oportet ad expurgandum, proutquam pus in uteris in callum conuerseat, & uteros colligere hoc modo. Lac equinum coctum exacte colato, ut tenuissimum, & porissimum evadat, & hoc infundito, elysetris instrumentis idoneo facto. Et summa quidem elysetris pars levis sit, argentea velut specilli, & statim modico intercedente spatio, foramen perforetur. Sane autem & alia foramina, non magna, sed angusta, hinc atque hinc, ex transverso elysetris aequali interstitio distantia, & elysetris quidem apex solidus sit. Reliquum vero totum cavum sit velut fistula. Alligare autem oportet vesicam suis foeminae, atque hanc probe radete, ac confricare; postquam autem alligaris, lac in vesicam infundito, foramina vero tenui linteo obstruito, ne lac affluat. Ubi vero obturaveris, vesicam deligato, & ipsi mulieri dato, cui collationem infundere paras.
- 113 Illa vero, exceptis obturamentis, in uterum indat. Ipsa enim sciet, ubi indere oportet. Posita autem tu vesicam manu premto, quamdiu pus foras effluerit. Manifestum autem hoc erit, ubi non amplius pus simul cum lacte exierit, palam etiam elatum est, quod non amplius ingit. Atque tunc cessare oportet, & post hoc, ubi paululum recreata fuerit, ad modicum tempus, cucurbitæ sicæ fundum resecat, itemque apicis summam partem, quo perforata sit, ita ut similem efficias in reliquis, excepto apice velut elysetrem; crassitudine vero paulo tenuior sit, quam virile pudendum. Hanc cucurbitam sic formatam vasi circumponito, vase vino impleto. Sit autem vinum odorem fragrantissimum, & siccissimum, ac vetustissimum, deinde lapidem nigrum pellucidum in vinum injecto, deinde cucurbitam ex ære albo factam circumponito, & mulier circuminfundat, pudendum circum cucurbitæ glandem adhibens, qualiter oportet, quo cucurbita vera super æream emineat, duorum digitorum intra pudendum mensura. * Quam mulier genituram suscipere non poterit, necesse est membranam superexcrevisse in osculo uterorum. Oportet igitur ætuginem æris, & sel tauri, & serpentis adipem simul miscere, deinde pharmaco hoc lanam imbueri, & in byssinum linteam involvere, linteo melle sublato, & sacere subditicium magnitudine maximæ olivæ, & apponere ad pudendum per totam noctem. Supina autem jaceat, & in die auferat, & calida aqua lavetur quamplurima ex myrri

ex myrti decocto. Apponatur autem & postea singulis noctibus, & deinde cum viro
coeat. Alia curatio. Marrubii foliorum manus plenae mensuram in vas Atticum
mijcitur, & aquae potabilis heminas Atticas quatuor affunditur, & ubi per novem
dies praemaceravit, per alios novem dies icjuna, lota, duos cyathos de hoc bibat, 235
pari mensura passii albi ammixta. Quum autem tertiam diem potando transegerit, fo-
mentum adhibeatur, cicuræ foliis in ignem missis, per novem dies, & post fomentum
lavetur. Atque sic rursus de hoc bibat. Quum vero per triduum fomentum adhibuerit,
marrubium ipsum tritum in die apponatur per triduum, & mercurialem tritam in melle
Atreio bis in die. Praemaceretur autem in vini albi congio, hippomarathri, & sceni-
culi radix, & tædæ pinguis ramuli, & rubiae quarta pars, & sceniculi semen, 240
& verbenacæ radices multæ, praemacerenturque diebus non minus quam novem, &
postea lota capite, in balneo heminam per diem de meri cremore bibat, & postea re-
clinata se ipsam concalasciat. Atque hunc post potum alternis diebus id, quod ex fel-
le paratur, per diem ad dies sex apponatur. Quum autem jam virum accedere vult probe 245
purgata, hyoscyami folia, ac radices in aqua ferveant, & ex his quamcalidissimis
per triduum ad noctem fomentum adhibeat, & lota virum accedat, post hoc vero fo-
mentum etiam cervi pudendum siccum sufficit, & de hoc in vinum album dilutum de-
radens, per triduum bibendum, & quum partus dolor insisterit, bibendum dato. Nam
hoc partum accelerat. * Alia curatio. Fel tauri fervescent, & alumen melium, 250
& cornu cervi usum terito, & permixtis, ac in glandulis efformatis uritor. Alind
curativum. Cuminum in vino nigro coctum, tritum, in glandem efformato, & ad no-
ctem apponito, post hæc vero lecem vini albi, tenuissimam videlicet fecis partem, com-
burito, & combustam in penna auferas, linteoque illigatam ad noctem subdas, & por-
rum coctum edat, post hoc trigram terat, & melle dilutum in noctem apparet, & dein- 255
de tragii fructum tritum, in vino albo dilutum, tædæ ramentis adjectis, bibendum dato,
& postea origanum alternis suffuso, & sic ad virum accedat. Alia curatio ad mulierem pa-
rere nequeuntem. Si mulierem parere nequeuntem, puerperam facere velis, in men-
sibus considerare oportet, an biliosa sit, sive pituitosa; cognosces autem, utrum hor-
um magis sit, si ubi menses prodeant, arenam tenuem, & siccam in sole substraveris, 260
& de sanguine infuderis, & si quidem biliosa fuerit, sanguis in arena siccat, lin-
teus fit. Si vero pituitosa, velut mucosus. Utrum igitur horum fuerit, ventrem pur-
gabis, sive sursum, sive deorsum opus habere videris. Deinde intermissis tribus
diebus, uteros purgato, & si humidus uterorum osculum fuerit, acria apponito,
quo commorsum, & inflammatum os oterorum durum evadat. Si vero mulier inter-
nis partibus non febrat, neque præ uteris concipiat, neque viro misceri queat, sed 265
dormiat, & cibum aversetur, vinum melle ammixto pudendis infundatur, & myrrham
suffuso. In sedem vero glandes indat, & vinum adipe anserino ammixto in puden-
dum infundat. Deinde etiam oleum pari melle mixtum infundat. * Si mulieri uteri
gracilescant, et osculum ipsum exasperetur, et concludatur, et menses ipsi non ap-
pareant, neque concipiat. Sed febris corripit lenta, et dolores incidunt ei in lumbos, et
in unum ventrem. Morbus autem hic maxime fit, quum quid in ipsa fuerit corruptum, sit au-
tem et ex parte. Hanc calida lavare oportet, et fovere. Quum autem lota, ac lota fuerit, os
uterorum dilatare cum specillo, & myrrham tritam cum pari neropo apponatur. Aut un-
guentum, aut oleum rosaceum in linteo, et plumbum instar glandis formatum apponatur, 275
felle bubulo illitum. Et in quatuor diebus infecundas cognosces, et fomentum ad-
hibeto, et pharmacum bibendum dato. Si vero præter naturam mulier fuerit crasse-
facta, in ventre non concipit. Nam omentum crassum, ac multum incumbens, os u-
terorum deprimit, et genituram non suscipiunt. Hanc attenuare oportet, et phar-
macum deorsum purgans bibendum dare, et ad uteros apponere, quod purgat, ac fla-
tum inducit. Si os uterorum durum fiat, aut cervix, ex digiti contactu cognosce-
tur. Itemque si ad coxam averis uteri fuerint. Quum sic habuerit, nihil acre adhibeto. Si
enim os uterorum exulceraveris, quum inflammatum fuerit, omnino periculum est, ne
sterilis fiat. Verum apponito, quæ non mordent, a quibus pituita purgatur. * Quum
menses mulieri proderint, et præterierint, primum quidem caput purgare opor-
tet. Deinde veratrum exhibere, sive semel, sive bis opus fuerit. Postea vero fo-
mentum adhibere, fomentatorio ex cucurbita constructo, sic autem facto. Aquam ma-
rinam in vas infundito, et porro immisso, fistulam cucurbitis imposito, et eum lu-
to quamoprimo illinito, ut ne transiret. Deinde per sellam erectam quadrangu-
lem transmittito ipsam fistulam, quo duorum digitorum mensura emineat altera fe-
ctionem, deinde pignus subaccendito, et in defleu caveat, et quum defiderit, et quum
surgit, ut ne comburatur. Sed desideat, dum adhuc frigidum est fomentatorium, et
surgat, dum fistula est perfrigerata. In hoc vero fomento plurimam diem partem
consumat, et in hujusmodi fomenti usu ad quinque dies perseveret. Per decem vero
dies pro porro allium in fomentum immittito, et hujus fasciculum ebullitum in aquam 295
marinam injicito. Postea vero reliquis diebus ipsa sola aqua marina foveatur,
ut ultra ne procedat per totam curationem. Cæterum postremum fomentum, quum a cu-
ratione desistere voles, sic facito. * Capulum recentissimum resecato, et aromatum om-
nium generis odoratissimum, ac siccissimum species contrindito, et incineratis ca-
tuli exemplis, atomata indito, ac expleto. Subiectis autem lignis, et catulo in vas mis- 300

Lipp. Opera.

T 3 so, vinum

- fo vinum odoratissimum affundito, & fomentum per fistulam facito, & si vires per-
miserint, totam diem cum hoc fomento ipsam foveto, ac interrogato, an odor aromaticus
per os olere videatur, non enim exiguum hoc signum est ei, quæ curatur, ad conceptionem.
Subdixim vero utere, croci quantum voles, & myrrha magnitudinem fabarum
325 duarum, & saltem sufficientem permisce illorum respectu, & sellis taurini fabarum
duarum magnitudinem. Si vero mitiore uti voles, minus sellis amitte. Si fortio-
re, plus. Hæc trita melle insillato tere, donec id, quod teritur, fiat tale, ut digi-
to efformare possis. Quanto autem magis trivetis, tanto siccior, & viscosior, ac me-
lius erit. Ubi autem efformaria crassius quam glandem, & summam partem acutam, & me-
dium crassius, & deinde consequenter quo ad iterum apponitur, in hoc ipsum foveolos
330 organi duos, levigatos infigito. Sint autem longitudinis sex digitorum. Deinde la-
na mollissima surculos involvito, & filo tenur superne deligato, & premineat si-
lam quatuor digitorum longitudine præ foveolis infixis, postquam autem perfuderit, &
puram se ipsam fecit, ipsum ad uteri os apponat, linteum sub coxas subjiciens, & per
335 noctem appositum sinat. Erut autem ipsi purgatio aquosa, posttridie ubi surrexit
lavetur, & ea die super fomentum ne insideat. Quam autem fomentum adhibuerit,
& de fomento surrexerit, ceratum sic quamoptimum prima illa die factum, & in ipsum cer-
vi maxime medullam commisceto, sin minus, adipem anserinum, & quam a fomen-
to surrexerit, quotidie, ubi se perfuderit, & puram circa ventrem secit, cerato iterum in-
340 ungit. Aut reliqua quidem omnia superioribus amisceto, excepto selley origa-
num vero levissime tritum in glandem permisce, & apponat. Aliud. Reliqua qui-
dem omnia ad eundem modum facta, verum pro origano abstinere amisceto,
& eodem modo efformare apponat. Aliud. Ex tritico melanthium deligito,
& probe terito, melleque ammixto, in pile formam tedactum apponat. Verum
345 febres inducit, & articulum tumefacit, & vehementer mordax hoc est. Aliud.
Mel, & vesarium, agrum tenue non multum, coquito. Vehementer enim mordax
evadet. Sed & hoc febricitum est. Eodem modo mel coctum, & elaterii portio-
nem coquito, & factum inde glandem subdendam dabo, & hoc febricitum est. Dicte
autem & sanguinem. Quendam vero ex his etiam pelliculas, si vero voles, etiam dra-
350 cœnium derade (est autem lene) & hoc cum melle cocto, aut erudo in pile figuram vel-
lut magnam gallam efforma. Ceterum coare, ut phlegmatis, ad hominis habitum,
ac robur respiciens. Ex his enim nullus est, qui non omnia attenuassim faciat. Proinde
ex his ipsis conjecturam faciens, totius corporis, & capitis purgationibus, me-
dicamentis, & uteri fomentis, ac appositione uti coare. Hæc autem elementa tibi
355 sunt. Verum medela horum unicuique particularis est. Et tibi horum quid non feceris,
semper in fomento perseveret. Hoc enim est, quod mollior, & dicit ferrosior, ac sanio-
sus humoris. Postquam vero ab hac curatione desiveris, his, quæ secundam naturam
sunt, desineatibus, sanguinem de manu detrudere oportet, si quidem fortis fuerit,
de ambobus brachiis, si vero debilis, de altero sufficere. At vero diara, qua in his
360 curationibus uti oportet, alibi a me indicata est. Si vero suffire voles, lolium ex tri-
tico deligito, & molito, factoque igne samenticio lentissimo, in catinum mitito,
& mulierem super sellam impositam, mollibus linteis instratam, sedere iubeto, cruri-
bus quamaxime ductis. Atque hæc curatio, si quidem sufficiens tibi fiat, in quatuor
365 mensibus bene est, sin minus, ad hæc præcipe etiam ut ad virum ne accedat eo tem-
pore, quo curatur, inter curandum autem etiam in aqua macerato, & de hinc cyathum bi-
bendum dabo. & penicillum, sanqueum assidue subditum habeat, & coryledones, sive
umbilicos veneris una cum sale, & cumino in aqua coquito, & repidum sorbendam
exhibeto. Et laxa quidem coryledones foemellas gignere videntur, parvæ vero, &
370 conclusæ, masculos. Conceptorium summum. Melanthium. Mulieri in vi-
ro nigra acerbo bibendum dato. Mulierem juvenentiam fluxus ruber infesta-
bat, & medicamentis datis, & capite purgato, ac vena secta, nihil melius habebat.
Videbatur autem hæc causa ipsi esse, ut ne conciperet. Dabam itaque ipsi vi-
num album, in quo aspalathi radices effruebant, mane, & ante cenam, & si-
375 xus sedatus est, & non longe post concepit, & peperit masculum. Erat autem corpo-
re coloris candicantis, & probe carnosa. De mola. Mola potro conceptus
causa hæc est. Quam multi menses modicum, & morbosum semen conceperint,
neque fetus factus sit, & venter plenus est velut pregnantis. Nihil autem in ven-
tre movetur, neque hic in matris generatur. Mammarum autem turgide sunt. Hæc
380 itaque & ad duos annos, sæpe etiam tres sic habet. Et si quidem una caro fiat, mul-
ier perit. Neque enim fieri potest, ut superstes maneat. Si vero plures, erumpit ipsi
per pudendum sanguis multus, ac carnosus. Et si hoc moderate fiat, servatur, sin
minus, a fluxu correpta perit, & morbus quidem talis est. Iudicare vero opor-
tet ex plenitudinis mole, & quod in ventre non movetur. Nam mas trimestris,
385 forma quadrimestris motum habet. Postquam igitur tempore hoc prætergresso,
non movetur, nimirum hic morbus est. Est autem hoc magnum signum, quod
lac in mammis non generatur. Hanc igitur maxime quidem ne curato, aut cer-
te cum prædicatione. Et primum quidem totum corpus foveto. Deinde per se-
dem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat. Fortassis enim quod com-
390 pactum est, commoveris, id quod fetus esse putatur, muliere a pharmaco con-
calcata.

- calefacta. Sed & uteros colluito, quo sanguinem educas, sin minus, subdititium 370
utatur e buprestis, & dictamnium creticum in vino bibat, sin minus, castoris res-
stem, & retro cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito, & plurimum sangui-
nem detrahito, atque hoc maxime conjectura virum plus facta. * Ad uteri
21 purgationes, quum non sunt sive ex partu, sive etiam alias, tadam pinguis-
simam contusam in vino albo coquito, & etiam cyathorum mensura utatur. Aut
paeoniae grana quatuor, cumini Aethiopici parum, & seselis paulo plus. Aut ce-
dri haecae. Si vero suffocationes affuerint, castorei parum. Si vero purga-
tione moderata ex partu facta, venter maneat, aut etiam situs conclusus, & do-
lore vexetur sive cum febre, sive citra febrim, succi scammoniae quinam portio-
nis partem, aut seseli, aut aliud quoddam ex odoratis, & rutam in vino albo biben-
dam dato. Si autem bibere nolit, illitionem ad sedem facito, velut verbi caus-
22 fa, ex selle taurino, & melle, ac nitro. * Si vero ex purgationis corruptione dolo-
re vexetur, & odoratis exhibitis nihil cedat, & febris adsit, lactis capri hemi-
nas duas decoquito, deinde eo perfrigerato pinguedinem detrahito, excolatoque,
& aquae mulisae tertiam partem ammisceto, quo dulcius fiat. Bibat autem hoc ter
jejuna. Si vero dolor non quiescat, neque venter subeat, ad vesperam in calidam
aquam in folio insideat. Quum autem perfusa fuerit, ubi inde surrexit, cum vi-
no nigro austero aqua diluto, olei dimidia parte addita, tepide colluito, & inde
dormiat. Subdititium uterorum. Si conclusum fuerit, aut durum osculum utero-
rum, sicuti albam expurgato, & nitrum Aegyptium purissimum tritum ammisceto,
23 & subdititium facito magnitudine galles non magnas, quod in lana molli
in unguentum irinum tinctum apponat per tres, aut quatuor dies, prout visum
fuerit. Post hoc conducite fomentum odoratum, postea vero molli quodam opus
est subdititio, quod saniosa maxime duat. Deinde mercurialem, si tenera fuerit,
cum unguento rosaceo, in linteo ad diem, ac noctem subdar. Ad idem. Fel tau-
24 rinum, & salem servefacito, & sulphure trito ammixto, in oblongam spiram, ac
tractum efformato, & ad duos dies, ac noctes nudam, aut ipsos uteros apponi-
to. Er deinde rursus mercurialem. Post hoc myrrham puram inspergito, & rosaceo,
ac irino unguento ammixto diluto, indeque uteri osculum quamperitissime illinat.
Ad idem. Iridem odoratam contusam, ac cribratam seorsim, & cyperi tantum-
dem, & crocomagma magnitudine massae manum implentis, vino odorato dilu-
to, & ad unguenti formam redigito, & splenis palmi longitudine induta, &
illita, in parvam pyxidem reconde, ut ne transpirent, & apponat. Si vero ul-
cerati fuerint uteri, aut osculum exasperatum fuerit, aut ab aliquo subdititio com-
25 morbi fuerint, adipem in lana illinito, & rosaceum, ac ceram parum inungito. * Quum
pregnans corrupterit foetum menstruum, & ad finem perficere non poterit, & te-
nus praeter naturam fiat, huius uteros purgare oportet, & ipsam medicamentis
curare, & crassescere. Non enim ad perfectionem gestare poterit, donec se ipsam
refecerit, & uteri robusti facti fuerint. Si vero concipiat quidem, corruptat au-
tem foetus bimestris, exacte eodem tempore, & neque prius, neque posterius, & hoc
26 perperla fuerit bis, aut ter eodem modo. Aut etiam ad amplius rempus progressum
corruptum eodem modo. Huius uteri non amplius extenduntur, foetu in ipsis auge-
scente, & ex bimestri, aut trimestri ad ampliorem modum excedente. Verum soe-
tus quidem augetur. Uteri vero non crescunt, & propterea multae eodem tem-
pore corrumunt. Huius uterum colluere oportet, & subdititium quammaxime melle,
aut hisce medicamentis, Colocynthidis internam partem tulsam cribrato, & filipii
parum cum puilo ampliore melle cocto ammisceto, & haec circum specillum obdu-
cito ea crassitudine, quantum stomachus ad uteri os suscipere potest, & semper
ultra protrudito, donec ad internam uteri partem penetrarit. Quum autem pharina-
cum colliquerit, specillum eximito, & rursus eodem modo paratum elatetum,
27 & colocynthidem sylvestrem, similiter velut prius medicamentum apponito. Edat
autem hoc tempore alium multum, & filipii caulem, & reliqua dicta utatur, quae sta-
tum maxime in ventre inducere potest. Apponat autem subdititium tertio quoque die,
donec bene habere visa fuerit. Quandoque vero pluribus diebus interpositis, &
in summa, prole libenter admiserit. Interiectis autem diebus, utatur mollibus, post-
quam vero per emollitoria osculum uteri praeparaveris, & menses apparuerint,
28 parum remorata, ubi iam secca fuerit, cum viro coeat. * Quum autem statum in u-
terum inducere voles, alii caput integrum, & filipii succum ad subdititium ammisceto.
Quod si qua praegnans decem menses perficere non possit, sed corrumpit, & hoc sa-
pe patitur, ex huius utero aquam purgato, & ipsam medicamentis curato, quo
aqua purgetur. Si vero genitura continens, non praegnans fiat, id quod
multis contingit, stomacho uteri praeter naturam hianse, menses plures, quam
convenit, & humidiores prodeunt, ut & id, quod a foemina prodit semen, ad fo-
tificationem non concipiatur, & viri genitura insuper accedens corrumpatur.
Contingunt autem haec, & corpore, & uteris aegrotantibus. Verum oportet
29 huius medicamenta deorsum purgantia dare, & interposito aliquo tempore, to-
rum corpus fovere, & uteros cum aceto, & aqua marina, specillis, ac ferramen-
tis ignitis innisis. Conspiciantur autem in fomentum cupressi ramenta, & lauri
Hipp. Opera. T 4 viridis

- viridis folia confusa, & polycnemidis folia. Faciendum est hoc fomentum tempore
 440 opportuno, post hoc vero lavetur, & fomentum adhibeatur ex loti ramentis, &
 rosis, ac polyenemidis foliis aceto incoctis. Ad finem autem suffusio fiat ex verba-
 sci foliis confusis, ac loti ramentis. Verum ante lotionem suffuso myrrham, & thus,
 utraque æquis partibus trita, & myrti, ac lauri folia. His permixtis, & in lentum i-
 gnum coniectis, recens adhibito fomento suffuso, bis in die, fomentum autem adhi-
 445 beatur recens lotæ. Sed & post suffusum lavet, & uteri stomachum ad pristinam
 naturam reducat. Et si vires sufficiant, ante hæc omnia venam in manu sinistra
 secato, atque ita teliqua facito. Si vero stomachus sic habeat, menses autem non pro-
 deant, aut vitiose, aut minus, ad reliqua omnia ampliore purgationem adhibe-
 to, & sic curato, subditiis etiam utens, si opus habeat, & ex prioribus lavans, &
 450 suffusum faciens, ac siccans. * Si mulier invita abortum faciat, nec ita eicere ve-
 lit, triticum torrefactum, & molitum, & uvam passam albam confusam, aqua mul-
 sa dulci diluta, modico oleo affuso, jejunæ bibenda dato, postea raphani semen
 tritum, & acetum, ac adipem anserinum, permixta bibat, & lauri folia trita appo-
 nat. Deinde bibat origanum, & pulegium, & polentam ex aqua, ita ut lauri folia
 455 trita, ac trita ammixto gummi, aquæ inspergat, diluat, ac bibat. Aut adipem
 ovillum, & anserinum, & mel simul mixta, ac trita delingenda præbet. Aut pas-
 tinacæ semen levissimè terito, & lacti superstantem concretionem ammisce-
 to, & adipem anserinum eliquatum. Hæc servata forbenda dato. Aut origani
 folia viridia, si haberi possint, sin minus, sicca levissimè trita, ex aqua bibenda
 460 dato. Aut lauri baccas levissimè terito, & suis feminæ adipem liquatum, & mel
 ammisce, & simul omnia trita delingenda præbet. Aut pastinacæ semen le-
 vissimè tritum ex vino diluto bibendum dato. * Si uteri genituram non conti-
 26 neant, plumbum, & lapidem, qui ferrum ad se rapit, leviter terito, & lineo illi-
 garo, quo in malicæ lacte tincto, subditiis utatur. Aut aris florem tritum, ac
 465 melle dilutum subdat. Quum uteri genituram viri eruant tertia die, ne-
 cesse est mulieris, quæ hæc patitur, uteros callos repletos esse, & non potest viri
 genitura intrus in utero manere, sed excluditur, & propterea concipere non potest,
 quamdum callus in utero fuerit. At calli expulsi sic fit. Pennas sumito mi-
 nutissimas, ac mollissimas, hisque simul colligatis, uteros illinito, quemadmodum
 470 oculos illinere solent, ita ut pennas exarques, ipsarumque summas partes tenuissi-
 mo filo deliges, & multo rosaceo illinas. Sic autem facito. Supinam reclinato, &
 sub medios lumbos pulvinar subicito, & specillum immixto, ita ut crutibus mulie-
 ris extensis, & hinc atque illinc diductis, specillum sursum, ac deorsum vertas, do-
 nec promineat, postquam autem videris in osculo uteri collum, optimum quidem
 475 hoc fuerit, si non adhæreat in coxa, sed ultro sequatur. Si inque in osculo uteri in-
 hæret, vossella tenuissima prehensum extrahere conare, providus ut placeat hoc
 fiat, & non violenter. Et postea viro condormiet. * Si prægnanti iussus com-
 pareant, sterus asinum sicum, & rubricam, & sepæ testam terito, & lineo illi-
 gata apponito. Aut pæonæ semina nigra in vino diluto trita bibenda dato.
 480 Si vero a coitu inum ventrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini se-
 men tritum, & muscum mollem, & adipem anserinum mixta, ac molli lana exerce-
 pra imposito. Si uteri extra naturam progressi fuerint, calor habet maxime pu-
 denda, & sedem, & urina paulatim destillar, & pudendum mordet, patitur au-
 tem hæc, si recens ex partu viro condormierit. Quum sic habuerit, myrridibac-
 485 & loti ramenta in aqua coquito, & aquam per noctem sub dio exponito, atque sic
 frigidissimam pudendis affundito, & trita hæc apponito. Postea aquam leatium
 bibens, melle, & aceto ammixtis, vomat, donec uteri fuerint recta, & lectus a
 pedibus altior sit, & graveolentia sub pudenda suffuso, odorata vero sub nares.
 Cibis utatur quammolliissimis, ac frigidis, & vinum aquosum album bibat, & non
 490 lavetur, neque cum viro dormiat. * Si vero omnino ex pudendis excederint, de-
 pendunt velut serotum, & dolor corripit. Hoc autem contingit, quum ex partu la-
 borarit, ut uteros contraxerit, & cum viro dormierit in puerperii purgatione. Quum
 sic habuerit, frigidifactoria apponat, & quod foris est, depurgatum, ac cum vino ni-
 gro vinoso, in quo malum punicum coctum est, ablutum intro detradat. Deinde
 495 mel, & resina, pari mensura eliquata, in pudenda insundant, & decumbat su-
 pina pedes sursum extentos habens, postea spongia apponat, & ad lumbos deli-
 get. Quamdni vero sic habuerit, a cibis abstinere oportet. Potu vero quampaucissi-
 mo uti, donec septem dies prætereant, & si quidem sic redire voluerint, bene est;
 sin minus, summas uteri partes deradito, lavato, & cerato picato illinito. Deinde
 500 pedes ad scalam deligato, scalamque juxta caput pulsat, & cum manu intrudi-
 to. Postea erura ipsius alternatim colligato, & diem, ac noctem finito in quie-
 te, & modicum prisnæ surcum frigidum dato, aliud autem nihil. Postera die ip-
 sam reclinato, & cucurbitam quammaximam ad coxam affigito, & multo tempore tra-
 here finito, & quum detaxeris, reclinatum facere finito, & nihil aliud præter pris-
 505 næ succum exhibeto, donec septem præterierint dies. Cibis autem tunc molliissi-
 mis, ac paucissimis utatur. Si vero ventrem exonerare voluerit, decumbens id fa-
 ciat, donec quatuordecim dies prætereant, postea surgat, & quamparcissime deam-
 bulat.

bulet, & ne laveur, & cibis modicis utatur, sub pudenda vapo suffusus per gravaculentia fiat. Et postquam obambulare incepit, subligar gestet.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS POPULARIBUS LIBER I.

Argumentum in Librum sequentem.

Aeris status austrinus quales in Thaso morbis generavit. Febris ardentes. Tubercula circa aures circa febrem. Quibus ista tubercula fuerunt. Tussis sicca. Inflammationes cum dolore in testiculis. Tabidi. Febris hucida, continua, acuta. Febris semitertiana. Albus turbata. Urine, Tussis. Faucium dolores. Astatis, & autumnii morbi. Tabidis solum ex descripta temporis constitutione fuisse mortuos. Solumus secunda constitutio temporis secunda.

Aeris constitutionis humide, & Aquilonis in Thaso morbi. Lippitudines. Lema. Lienteria. Dysenteria. Tenesmi. Alvi profusio. Urine fluxiones cum dolore biliosa, aquosa, rancida. St. Punitus punitosi, biliosi, & ciborum crudum rejectim. Sudores, & omnibus undequaque multa humiditas. Tabidi cum dolore. Febris continua. Febris tertiana. Febris quercana. Febris diurna, quotidiana, nocturna, & errans. Convulsiones. Rigores. Sudores. Frigiditas extremitatum. Somni. Ventris turbas. Urine. Tussis. Dysenteria. Tenesmi. Lienteria. Alvi profusio. Hydrops. Papula parva. Tumores iuxta aures. Urinae stillidium. Urine. Cancrolianes. Cruda. Circa morbus duo excreta. Ars ex tribus constat. Capitis, et colli dolores.

Constitutio temporis tertia. Resolutions ex consideratione. Febris ardentes. Sanguinis e naribus eruptio. Sanguinis e naribus larga erupcio in febribus ardentibus multas servavit, modica vero accidit. Aderbus regius, & ejus solutio. Sanguinis eruptiones quibus frequenter acciderint. Ex sanguinis eruptione ad dysenteriam transitus. Tubercula iuxta aures. Adulterii ex partu, & post partum laborantes. Sanguinis e naribus, & mensium eruptio simul. Pregnantes. Phrenitici. Phrenitis non statim ab initio. Qui maxime

ex his mortui sint. Quatuor signa, quibus in ea constitutione servabantur. Adultus non ex uno signo servatus fuisse, sed per omnia transcurrisse. Lacryma invite in febribus acutis magis ardentibus. Tubercula iuxta aures. Indicationes morborum similes, aut dissimiles. Indicationes eorum, quibus tubercula iuxta aures fiebant.

Stitio tertia. Aeris inde dissonantur. Febris differentia. Febris continua cum acutissimis morbis conjuncta. Quartana febris secessissima, ac facillima. Febris nocturna, diurna. Febris septimana. Novena. Tertiana. Quintana. Astedi, constitutiones, & exacerbationes singularum harum febrium. Febris, que paribus diebus exacerbantur, paribus indicantur, & contra.

Egerit quatuordecim. Prima. Febris acuta cum sudore. Clyster in febris acuta, secunda die. Spiritus rarus, & magna. Splen elevatus, & orbiculari gibbositate. Sudores frigidi. II. Febris ex lassitudinibus, potationibus, ac exercitiis intemperatis. Urina nigra, nigram subsidentiam habentes. Præcordii palpitatio assidua. III. Febris acuta cum alvo sicca velut in tenebris. IV. Febris post partum, & purgationem naturalium. V. Rigores ante partum, quos febris infrequenter est. Bilis vomitu die quadragesimo in febris acuta. VI. Erranca febris species. Subsidentia rubra in febris erranca. VII. Febris volens, & lumborum gravitas dolorosa. VIII. Febris a cæca. Urina intranscæca. Febris perpetua cum sudore. IX. Febris pedis dolorem a magno digito sequuta. X. Febris post capitis, lumborum, ac colli dolores. XI. Febris acuta a præcordiorum dolore. XII. Febris acuta ex largiore potione, & vomitu. Urina oleosa. Crurum dolor in febris acuta. XIII. Febris nulieris trimestri fæta gravida. XIV. Febris ex capitis, colli, & pectoris dolore.

SECTIO I.

Constitutio Temporis Prima.

IN Thaso autumnii tempore circa æquinoctium, & sub pleiadas, & aque multe, assidue, molles velut in austrinis, hyems austrina, parvi venti æquilonares, squalores, & omnino hyems qualem fieri solet. Ver autem austrinum, frigidum, pluvie parvæ. Æstas plerumque nubila, aquarum inopia. Etæstæ parum, modice, spiritum spirant. Quam autem totus hic aeris status ad austrina vergeret, ac cum siccitatibus fieret, ante ver quidem ex priore statu, subcontrario, & æquilonio fiente, paucis obortæ sunt febres ardentes, atque

- tes, atque his omnino boni status, & paucis sanguis eripit, neque ex his moriebantur. Tubercula vero circa aurem alteram multis erant, plurimis ex utroque, circa febrem erecte obambulantibus. Quibusdam vero etiam parum incallescabant. Exincta sunt omnibus absque nocumento. Neque cuiquam suppuravit, quemadmodum ea, quæ ex aliis causis sunt oborta. Erat autem natura ipsorum hæc: laxa erant, magna, diffusa, non cum inflammatione, doloris exortia, omnibus obscure evanuerunt. Fiebant autem hæc adolescentibus, juvenibus, in vigore constitutis, & ex his plurimis, qui circa palæstram, & gymnasia exercebantur. Mulieribus vero paucis fiebant. Plurimis vero tussis sicca, qui tussiebant, & nihil rejectabant, & voces non longe postea raucosæ. Quibusdam vero etiam interposito tempore inflammationes cum dolore in altero testiculo, quibusdam in utroque. Et alius quidem febres, aliis non. Hæc autem plurimis laboriose fiebant. De ratero vero, quantum ad ea, quæ in officina medica ad chirurgiam pertinentia sunt, sine morbo degabant. At vero ante æstatis initium, & per æstatem, ac hyemem multi ex his, qui longo jam tempore subcorrupti erant, tabidi decubuerunt. Nam & multis, qui ambigui erant, tunc tabes confirmata est. Quibusdam vero primum coepit. Ex his natura ad tabem vergebat. Moriebantur autem multi, & plurimi ex his. Ex de his, qui decubuerunt, haud scio, an quis etiam modico tempore supervixerit. Moriebantur autem citius, quam tales morbi transigere solent. Nam alios & longiores, & cum febribus conjunctos facile ferebant, & non moriebantur. De quibus paulo post scribetur. Solus enim, & maximus ex his, qui rum vigeant, tabidis morbis multos occidit. Erant autem plurimis ipsorum affectiones hujusmodi: febres horridæ, continuæ, acutæ, in totum non intermittentes. Modus autem erit semiterrianus, una die leviores, altera amplius exacerbescentes, & in summa acutiores increbescentes. Sudores vero semper, non per totum, frigiditas extremorum multæ, & quæ vix recalesceret. Alvi turbatæ, biliosæ, ex paucis, puris, tenuibus, modicis, frequenter ad exonerandos se surgebant. Urinæ tenues, & crudæ, & decolores, & paucæ, aut crassitudinem habentes, & subsidentiam parvam, non probe desidentes, sed cum cruda quadam, ac intempestiva subsidentia. Tussiebant autem, paucæ, condensatæ, concoctæ paulatim vix eductes. Quibus vero violentissima accidissent, his neque modice concoctio aderat, sed cruda spere perseverabant. Paucæ autem plurimis horum ab initio, & perpetuo dolebant, ruborem habentes cum inflammatione, fluxiones parvæ, tenues, acres. Brevi colliquecebant, & affligebantur, omnes cibos perpetuo fastidientes, sitis exortes, & plerique circa mortem deliri. Ex circa tabidos quidem hæc. Cæterum æstate jam, & autumno febres multæ, continuæ, non violentæ, diu quidem agrotantibus, non autem alias ita male habentibus oboriebantur. Plurimis alvi turbatæ, ita ut valde toleranter ferrent, & nihil memorabile lædebant. Urinæ item plurimis boni quidem coloris, & puræ. Verum tenues, & post tempus circa indicationem concoctæ. Tussiebant autem non valde, neque ea, quæ per tussim rejectantur, difficultatem exhibebant. Neque cibum fastidiebant, sed etiam valde licebat ipsis offerre. In summa subagrosabant tabidi, non tabido modo, febribus horridis parum insudantes, alias alii, ut qui erroneo modo exacerbarentur, febribus quidem in totum non intermittentibus, sed quæ juxta naturam febris tertianæ morem exacerbarentur. Judicabantur autem, quibus inter hos brevissima essent circa vigesimum diem, plurimis circa quadragesimum. Multis circa octogesium. Quibusdam neque sic, sed vasto modo, & circa judicationem deficiebant, horum autem plurimis febres rursus non multum tempus intermittentes reversæ sunt. Ex recidis autem in istem circuitibus judicabantur. Multis vero ipsorum producebantur, ut sub hyemem agrotarent. Ex omnibus porro in hac temporis constitutione descriptis, solis tabidis lethalia acciderunt, in aliis autem febribus non.

SECTIO II.

Constitutio Temporis Secunda.

- 1 **I**N Thaso ante autumnum tempestates non tempestive, sed derepente in aquiloniis, & austrinis multis, humidis, & præcurrentes. Huiusmodi vero durabant usque ad pleiadæ, & sub pleiade. Hyems autem aquilonia. Aquæ multæ, largæ, magnæ. Nives. Plerumque mixta aeris serenitas, & hæc quidem fiebant omnia, frigora vero non admodum intempestiva. Jam vero post brumale solstitium, & quando favonius spirare incipit, posterior hyems magna erat, aquilonia multa. Nives, & aquæ assidue multæ, & conium procellosum, ac nubium. Hæc autem durabant, & non remittebant usque ad æquinoctium. Ver autem frigidum, aquilonium, aquosum, nubium. Æstas non valde æstuosa fiebat. Etheis assidue spirant.
- 10 Mox circa ærcturum in aquiloniis, aquæ valde multæ. Quæ autem annis totus humidus, & frigidus, & aquilonius esset, per hyemem sævo modo plerumque habebant. Ante ver autem multi quidem, & plurimi morbidi degebant. Primum igitur coeperant lippitu-

lippiudines fluidæ, dolorosæ, humide, crudæ. Lævæ parvæ, & multis difficul-
ter erumpentes, plurimum revertebantur, defecerunt sero ad autumnum. Aestate jam,
& autumno hæmorrhæ, & dysentericæ, & tenebræ, & alvi profluvia ex biliosis, te-
nibus multis, crudis, & mordacibus; quibuldam vero etiam aëiosis. Multis autem
& urinae fluxiones cum dolore biliosæ, aquosæ, ramentosæ, purulentæ, cum stillici-
dio, non rheumaticæ, sed his alia pro aliis. Vomitus pituitosi, biliosi, & ciborum cru-
dorum rejections. Sudores. Omnibus undique multa humiditas. Fiebant autem
hæc multis erecte obambulantibus, non febrientibus. Multis item febrientibus,
de quibus paulo post scribetur. In quibus autem omnia hæc præscripta appare-
bant cum dolore, tabidi fiebant. Jam vero autumno, & sub hyemem febres continuæ,
& quibuldam ipsorum paucis ardentes, diurnæ, nocturnæ, semitertianæ, tertianæ,
exactæ, quartanæ, erroneæ. Singula vero prædictæ febres multis fiebant. At arden-
tes & paucissimis obortæ sunt, & ex agrotis hi minimum laboraverunt.
Neque enim sanguis erupit, nisi valde parum, & paucis. Neque delirabant, aliaque
omnia tolerabilia erant. Judicabantur autem plurimis valde bono ordine, cum inter-
mittentibus in septem, ac decem diebus. Neque mortuum aliquem tunc in febre ar-
dente novi, neque phlegmæ tunc cuique factam scio. At vero tertianæ plu-
res quidem quamardentes febres erant, ac graviiores, verum ordinare in his omnibus
a prima accessione quatuor circums habebant, in septem autem perfecte judica-
bantur, neque ulli horum revertebantur. Quartanæ vero multis quidem ab initio
ex ordine quartanæ coeperunt. Quibuldam autem non paucis, ex aliis febribus, ac
morbis abcessus ad quartanas fiebant, atque hos diu, quemadmodum solent, &
adhuc diutius tenebant. Diurnæ vero quotidianæ, & nocturnæ, & erroneæ
multæ multis, & multo tempore permanebant, & erecte obambulantibus, & do-
cumbentibus. Plurimos horum sub pleiada, & usque ad hyemem febres consequebantur.
Multos convulsiones, magis autem pueros ab initio, & fiebant, & in febrili-
bus convulsiones fiebant, & erant hæc plerisque diuturnæ, verum innocuæ, nisi ad
hæc etiam ex aliis omnibus perniciosæ adellet. At continuæ quidem in totum, &
nihil intermittentes, exacerbescerent autem omnibus ad naturæ tertianæ modum,
una die sublevantes, & una exacerbescerent, omnium, quæ tunc fiebant, violentissi-
mæ erant, & longissimæ, ac cum maximis doloribus leniter auspicantes, & in totum
semper augescentes, & in judicatoriis diebus exacerbescerent, & in pejus proceden-
tes, parum allevantes, & statim rursus ex intermissione violentius exacerbescen-
tes, in judicatoriis pleniusque diebus peiores fierent. Rigores vero omnibus
quidem inordinatæ, & erroneo modo fiebant, paucissime autem, et minime his. Ve-
rum in aliis febribus majores. Sudores multi, his minimi, nihil allevantes, sed subcon-
trario modo damnæ, inferentes. Frigiditas extremorum, his multa, & vix recale-
scens. Neque somni in totum, maxime vero hi etiam rursus soporosi. Ventres autem
omnibus turbati, et mali, his autem longe peiores. Urinae vero plurimis horum aut
tenues, et crude, et decoloræ, et post tempus parum concoctæ judicatorio modo.
Aut crassitudinem quidem habentes, verum turbatæ, neque consistentes, neque subli-
dentes, neque compactæ. Aut paucæ, et crudæ, ac malæ, et subdolorosæ. Pessimæ au-
tem hæc, omnes. Et tales quidem ad febres commutabantur. Verum non habeo,
quod scribam, an detrimentum, aut utilitas tunc ex rursu conigerit. Diuturna igitur,
et molesta, et valde inordinatæ, ac erroneo more, et citra indicationem, plu-
rima horum perseverabant tum his, qui perniciosè habebant, tum his, qui non. Si
enim aliquos ipsorum parvulum relinquerent, statim rursus revertebantur. Quibul-
dam vero paucis ipsorum judicabantur, quibus brevissime adessent, circa octoa-
gesimam diem, et horum aliquibus revertebantur, ut plurimi ipsorum per hyemem ad-
huc ægrotarent, plurimis autem citra indicationem defecerunt. Hæc vero pariter ac-
ciderunt et his, qui superfluitas manserunt, et qui non. Quam autem multa, et varia
fieret indicationis impedio ex morbis, maximum etiam, ac pessimum signum perpe-
tuo comitabatur, quod plerique omnes cibos fastidirent, et ex his maxime hi,
quibus etiam alia externa erant. Sæculosi vero non adeo intempestive in his febrili-
bus erant. Quam vero tempus produceretur, et dolores essent multi, ac colliquisio
mili, his abcessus succedebant, aut majores, quam ut sepe possent, aut minores,
quantur quicquam prodessent, sed statim recurrerent, et ad pejus colligerent. Erant autem,
quæ his fiebant, hæc: dysentericæ, tenebræ, hæmorrhæ, et alvi profluvia. Quibuldam
etiam hydropes, partim cum his, et partim absque his. Quicquid autem ex his violenter
accidebat, statim vires deciebat, aut rursus nihil subderat. Papula parvæ, et
non pro dignitate rationis excretionis morborum, et statim rursus evanescentes.
Aut iuxta aures tumores, qui non solvebantur, et nullam de se significationem præ-
bebant. Quibuldam in articulis, maxime vero in conentidæ, paucis judicatorio
modo cessantes, et statim rursus ad habitum ab initio invalescentes. Moriebantur
autem ex omnibus, et plurimi ex his pueri iam ablactati, et majores natæ, octen-
nes, ac decennes, et nondum puberes. Fiebant autem hæc his, non sine prius scriptis.
Priora vero multis, sine his. Solum vero bonum, ac maximum inter ea, quæ fiebant, si-
gnum, et quod plurimos in maximis periculis constitutos liberavit, quibus ad
urinae stillicidium convertebantur, et ad hoc abcessus fiebant. Accidit autem plerisque
urinae

- urina stillicidium; maxime his ætatibus. Fiebat et aliis multis, tum erecte obambulantibus, tum in morbis. Statim vero etiam magna quedam mutatio omnium his fiebat. Alvi enim, etiam si humectæ essent, maligno modo mox sistebantur, cibosque omnes libenter sumebant. Ex febres postea mites erant. Verum urina stillicidium his diuturnum, et laboriosum erat. Urina vero his erant mites, crassæ, variez, rubræ, purulenta cum dolore. Atque hi omnes superstites manserunt, et nullum ex his mortuum novi. Quæcumque vero non periculosa sunt, concoctiones excrementorum omnes indiquaque tempestivas, aut bonas, et judicatorios abscessus considerare oportet. Concoctiones, celeritatem, judicationis, et securitatem sanitaris significant. Cruda vero, et inconcocta, et in malos abscessus conversa, aut judicationis sublationem, aut dolores, aut diuturnitatem, aut mortem, aut eorundem recidivas. Quod vero ex his potissimum futurum sit, ex aliis considerandum est. Præterita dicito, præsentia cognoscito, futura prædicito. Hæc tractato. Exerceo circa morbos duos, ut juves, aut non doceas. Ars ex tribus consistat, morbo, ægroto, et medico artis ministro. Ægrotum cum medico adversari morbo oportet. Capitis, et colli dolores, ac gravitates cum dolore, cum febribus, et sine febribus, phreniticis quidem convulsiones. Sed et virofa vomunt, et quidam ex his subito moriuntur. In ardentibus autem, et aliis febribus, quibus colli dolor, et temporum gravitas, et caligo vertiginosa circa oculos, aut etiam præcordiorum distentio non cum dolore sit, his sanguis per nares erumpit. Quibus autem gravitates quidem totius capitis, oris autem ventericuli morbus adiunt, et nauseabundi sunt, hi biliosa, et purulenta vomunt. Plerumque vero pueris in talibus afflictionibus convulsiones sunt. Mulieribus autem tum eadem, tum ab uteris dolores. Senioribus autem, et quibus jam calor superatur, paraplegiæ vocatæ, leves siderationes, aut infanzæ, aut oculorum privationes.

Constitutio Temporis Tertia,

- I**N Thaso paulo ante æturo, et sub æturo, aquæ mites, magnæ, in aquilonis. Circa æquinoctium autem, et usque ad pleiada, austrina pluviz pauca, hyems aquilonia, siccitates, frigidi venti, magnæ nives. Circa æquinoctium hyemes maximæ. Ver æquilonum, siccitates, pluviz pauca frigida. Circa solstitium æstivum aquæ pauca, magna frigora usque ad canem. Post eam usque ad ætutum æstas calida, æstus magni, non ex accessione angustæ, sed continui, ac violenti. Aqua non delapsa est. Etesie spirant. Circa ætutum pluviz austrina usque ad æquinoctium. In hac autem constitutione per hyemem quidem receperunt resolutiones ex sideratione, et multos inviderunt, et quidem ex ipsis subito moriebantur. Nam hic morbus satis popularis erat. Cætera incolumes debebant. Ante ver autem coeperunt febres ardentes, et usque ad æquinoctium, et ad æstatem durabant. Quicumque igitur vere, et æstate incunto statim ægrotare coeperunt, plurimi servabantur, pauci vero quidam moriebantur. In autumno jam et quum pluviz fierent, lethales erant, et plures peribant. Erant autem febrium ardentium affectipes. Quibus quidem bene, ac large sanguis per nares erupit, per hoc maxime servabantur, et nullum novi, qui in hac constitutione mortuus esset, si recte ipsi sanguis profuisset. In Philisco enim, et Epaminone, ac Sileno quarta, ac quinta die parum de naribus stillavit, et moriebantur. Plerique igitur ægroti circa judicationem rigebant, maxime hi, quibus sanguis non erupisset. Idem vero etiam postea insuper tegerunt, et exsudarunt. Quibusdam morbus regius accidit sexta die. Verum his purgatio per vesicam, aut alvus exturbata profuit, aut larga sanguinis erupcio. Velut Heraclides, qui decumbebat apud Aristocymem, nam huic et ex naribus sanguis erupit, et alvus turbata est, et per vesicam purgatus est. Vigesima die judicatus est, non velut Phanagoræ servus, cui nihil tale factum est, et mortuus est. Sanguis autem plurimus erupit, maxime adolescentibus, et in vigore constitutis, et talium plerique perierunt, quibus sanguis non erupit. Senioribus vero ad morbum regium res devenit, aut alvi ipsis turbatae sunt, aut dysenterici facti sunt. Velut Bioni apud Silenum decumbenti contigit. Populi lariter grassabantur etiam dysenterici per æstatem, et quibusdam, qui ægrotarunt, quibusque etiam sanguis erupit, ad dysenteriam transitus factus est, velut Eratonis filio, et Mylo, qui multa sanguinis eruptione facta, in dysentericorum statum delapsi, superstites manserunt. Multis igitur maxime hic tumor tedunnavit. Nam et quibusdam circa indicationem sanguis non erupit, sed tubercula iuxta aures excitata evanuerunt. Quæ ubi evanissent, iuxta sinistri lateris mollicudinem, et ad summam coxam gravitas fuit. Quum autem dolores post judicationem fierent, et urinz tenues prodissent, parum sanguinis profondere coeperunt. Verum circa quartam, et vigesimam abscessus ad sanguinis eruptionem fiebat. Antiphoni Crirobuli filio, quæ sedata est, et perfecte judicatus est circa quadragesimam. Mulieres porro multæ quidem ægrotarunt, pauciores autem, quam viri, et pauciores etiam mortuæ sunt. Plurimæ vero graviter ex partu laborarunt, et post partus

post partum insuper agrotarunt, & hæc maxime perierunt. Velut Tekbuli filia, quæ legem a partu die mortua est. Plurimis itaque in febribus menses apparebant. Quibusdam vero ex naribus sanguis erupit, & virginibus multis id primum factum est. Quibusdam & ex naribus sanguis, & menses proruperunt. Velut Detharsei filiz virginis apparuerunt tunc primum, & sanguis largus e naribus fluxit. Neque ullam mortuam novi ex his, quibus aliquid horum probe factum esset. Quibus autem pregnantibus contigit agrotare, omnes foetus perdidērunt, quas ego novi. Urinæ vero plurimis boni quidem coloris, verum tenues, & subsidientias modicas habentes ex recrementis tenuibus, ac biliosis. Multis autem aliis judicatis, ad dysenterias res devenit, velut Xenophani, & Cratæ. Urinæ aquosæ, multæ, puræ, tenues post judicationem, & subsidientia bona facta, & aliis probe judicatis. Mentionem faciam eorum, quibus factæ sunt, Bioni, qui apud Silenum decumbebat. Cratiæ, quæ apud Xenophanem; Aretonis filiz uxori Mnesticarati. Postea vero omnes hi dysenterici facti sunt. Quod urinas minuerint aquosas, considerandum est. Circa acturum autem multis undecima die judicatio facta est, & his recidivæ non pro ratione fientes reversæ sunt. Erant autem soporosi circa tempus hoc, phrenitici autem pueri, & hi omnium minime moriebantur. At vero circa æquinoctium, & usque ad plejadæ, & sub hyemem comitabantur quidem febres ardentes, sed & phrenitici plurimi tunc fiebant, & plerique horum moriebantur, fiebant autem & per aestatem pauci. Quum igitur febres ardentes inciperent, significationem de se præbent, quibus perniciem immineret. Statim enim ab initio febris acuta, parum insuper tangebant, vigilantes erant, siticulosi, anxii, patum exudantes circa frontem, & clavículas, nullus per totum, multrum delirabant, tumores, tristitiae, extremitates subfrigidæ, pedes summi, & maxime manuum summæ partes. Exacerbationes in diebus paribus. Plurimis autem quarta die dolores maximi, & sudores plerumque subfrigidæ, & extremitates non amplius recalescentes, sed lividæ, subfrigidæ, & neque fruebant. Ad hæc urinæ his nigrae, paucæ, tenues, & alvi sistebantur, neque sanguis e naribus erupit ulli ex his, quibus hæc accidissent, sed parum stillavit. Neque ad recidivam ulli horum tres devenit. Sed sexta die mortui sunt cum sudore. Phreniticis autem acciderunt præscripta non omnia. Judicabantur autem his plenioribus die undecima, quibusdam vigesima. Quibus non statim ab initio phrenitis coepit circa tertiam, aut quartam diem, sed moderate habebant primo tempore, his circa septimam morbus ad acumen transit. Magna itaque erat morborum multitudo. Ex ægris autem maxime moriebantur adolescentes, juvenes, in vigore ætatis constituti, leves, subalbicante curre, rectos itaque nigros capillos habentes, & oculos nigros, & qui in quære, & otio vivebant, & alta voce, aut gracili, aut aspera præditi, balbi, iracundi, & mulieres plurimæ ex hac specie moriebantur. At in hac constitutione ex quatuor signis maxime servabantur. Quibus videbatur sanguis e naribus probe erupisset. Aut urinæ multæ, & multam subsidientiam habentes per vesicam prodissent. Aut per ventrem turbata, biliosa tempestive processissent. Aut qui dysenterici facti essent. Acciditque multis, ut non ex uno præscriptorum signorum judicarentur, sed per omnia percurrerent, & gravius quidem habere videbantur, conservabantur autem omnes, quibus hæc accidissent. Mulieribus autem, & virginibus accidebant item præscripta signa omnia. Quibus autem, vel horum quippiam bene accideret, aut menses large apparent, per hæc servabantur, ac judicabantur, neque ullam interisse novi, cui ex his aliquid accidisset. Philonis enim filiz sanguis ex naribus large fluxit. Septima autem die inteipetibus cœnavit, & mortua est. Quibus in febribus acutis, magis ardentibus, lachrymæ invitæ defluunt, his sanguinis a naribus eruptionem expectare oportet, si etiam alia perniciosa non habeant. Nam his, qui male habent, non sanguinis eruptionem, sed mortem significat. Tubercula juxta aures in febrientibus cum dolore oborta, quibusdam febre judicatorio modo deficiente, neque sedantur, neque suppurantur; hæc biliosum alvi profluvium, aut dysenteria, aut crassum urinarum subsidientia solvit. Velut Hermippo Cla- zornio. Judicationes autem, ex quibus cognoscimus, aut similes sunt, aut dissimiles. Velut duo fratres, qui simul eadem hora agrotare coeperunt. Decumbebant autem juxta theatrum Epigenis fratres. Horum seniori sexta die judicatio facta est, juniore vero septima. Recidiva facta est utrisque simul eadem hora. Intermissit dies quinque. Ex recidiva judicatio facta est utrisque simul in totum, die decima septima. Plurimis autem sexta die judicatio facta est, intermissit sex. Ex recidivis autem judicatio facta est quinta die. Quibusdam vero septima judicatus est morbus, & septem diebus intermissit. Ex recidiva vero judicatus est tertia. Quibusdam autem judicatus est quinta, intermissit septem, rediit per tres, intermissit unam, insuperque unam rursus occupavit. Aliquibus vero judicatus est sexta, intermissit sex, rediit per tres, intermissit unam, & una judicatus est. Velut Evagonti Daipharris filio. Quibusdam autem judicatus est sexta, intermissit septem, ex recidiva vero judicatus est quarta. Velut filiz Aglaide. Plerique igitur ex his, qui agrotarunt in hac constitutione, hoc modo agrotarunt, & nullum novi ex his, qui superstites manserunt, qui non redissent recidivæ secundum

cundum rationem fientes, & servati sunt omnes, quos ego novi, quibus hoc genus recidiva facta sunt. Neque agrotantium hoc modo ulum aliquem novi, quem recidiva iterum repetrisset. Mortebantur autem in morbis his plurimi sexta die, velut Epaminondas, & Selenus, & Philifeus Antagoræ filius. Quibus autem tubercula iuxta aures facta essent, his judicatio facta est vigesima die. Restincta autem, ac sedata sunt omnibus, & non suppurata sunt, sed ad vesicam conversa. Craniotacti, qui apud Heracleum habitabant, & Scymni fullonis ancilla suppuraverint, & morui sunt. Quibus autem judicatus est septima die, intermisit novem, reversus est morbus. Judicatus est ex recidiva quarta die. Quibus autem judicatus est septima die, intermisit sex, deinde rediit, & judicatus est septima, velut Phanocrito, qui decumbebat apud Gnathonem pictorem. Sub hyemem circa solstitium hyberum, & usque ad æquinoctium perseverabant quidem & febres ardentes, & phrenitides, & multi moriebantur. Judicationes tamen transmutatae sunt, & judicatio facta est plurimis ab initio die quinta, intermisit quarta, recidiva facta est, ex recidiva vero judicatio facta est quarta die. In summa quatuordecim diebus. Sic autem facta est judicatio pueris plurimis, immo etiam senioribus. Quibusdam vero morbis judicabatur die undecima, revertebatur decimaquarta, judicabatur perfecte vigesima. Si vero aliqui insuper rignissent circa vigesimam, his judicabatur quadragesima. Superriquerunt autem plurimi circa judicationem ab initio. Qui vero circa judicationem ab initio rignerunt, etiam in recidivis una cum judicatione rignerunt. Rignerunt autem paucissimi vere, æstate plures, autumno adhuc plures, hyeme longe plurimi. At sanguinis eruptiones cessabant.

SECTIO III.

Morbos dinoscimus, edocti ex communi omnium natura, & ex uniuscujusque propria, ex morbo, ex agroto, ex his, quæ offeruntur, ex eo, qui offert. Ex his enim & breviores, & graviore redduntur, ex tota, ac partiali constitutione coelestium, & uniuscujusque regionis, ex victu, ex vitæ studiis, ex ætate, ex cultu, fermonibus, moribus, taciturnitate, cogitationibus, somnis, vigiliis, infomniis quibusdam, & quando, vellicationibus, pruribus, lachrymis, exacerbationibus, successibus, urinis, sputis, vomitibus, & quæ, ex quibus, in quos, successiones morborum, & qui abcessus ad perniciem, & ad judicationem. Sine, rigor, frigiditas, tussis, sterutationes, singultus, spiritus, ructus, flatus silentes, strepentes, sanguinis eruptiones, hæmorrhoides, ex his autem, & quæ per hæc sunt, considerandum. Febres quadam continuæ sunt, quadam interdum tenent, noctu intermittunt. Aut nocte tenent, die intermittunt. Semitertianæ, tertianæ, quartanæ, quintanæ, sextimanæ, nonanæ. Sunt autem acutissimi, & maximi, ac gravissimi morbi, & maxime lethales, in continua febre. Securißima vero omnium, & facillima, ac longissima est quartana. Non enim solum ipsa se ipsa talis est, sed etiam ab aliis magnis morbis liberat. At in semitertiana appellata contingit quidem & acutos morbos fieri, & est hæc præ cæteris maxime lethalis. Sed & tabidi, & quicumque ex aliis longis morbis agrotant, ex hac maxime agrotant. Nocturna non admodum lethalis est, verum longa. Diurna longior. Quibusdam autem & ad ratem vergit. Septimana longa est, verum non lethalis. Nonana adhuc longior, & non lethalis. Tettiana exacta cito judicatur, & non est lethalis. Quintana pessima omnium est. Nam & ante ratem, & iam tabidis superveniens, occidit. Sunt autem modi, & constitutiones, & exacerbationes singularium harum febrium æque continuarum, ac intermittentium. Velut verbi causa, continua quibusdam ab initio floret, & viget maxime, & ad deterius procedit. Circa judicationem vero, & una cum judicatione imminuitur. Quibusdam vero molliter incipit & submisce, augefcit autem & exacerbatur quotidie. Circa judicationem vero, & una cum judicatione avertam elucet. Quibusdam leniter auspiciat augefcit, & exacerbatur, & ubi aliquamdiu in vigore fuit, rursus remittit usque ad judicationem, & circa judicationem. A quo hæc contingere solent in omni febre, & in omni morbo. Oportet autem victurationem ex horum consideratione offerre. Multa vero etiam alia signa his sunt cognata, de quibus partim scripsum est, partim scribetur. Ad quæ ratiocinari oportet, examinareque, ac considerare, cui horum acutus, ac lethalis sit morbus, antequam superstes sit futurus, & cui offerendum sit, aut non, & quando, & quantum, & quid offerendum erit. Quæ vero paribus diebus exacerbantur, paribus judicantur. Quorum autem exacerbationes in imparibus fiunt, ea in imparibus indicantur. Est autem primus judicatorius, ex circuitibus diebus paribus judicatorius, quartus dies. Deinde sextus, decimus, decimusquartus, decimusoctavus, vigesimus, vigesimus quartus, vigesimus octavus, trigessimus, trigessimus quartus, quadragessimus, sexagesimus, octogessimus, & centesimus vigesimus. Ex circuitibus vero in imparibus diebus judicantibus, primus est dies tertius, deinde quintus, septimus, nonus, undecimus, decimus septimus, vigesimus primus, vigesimus septimus, &

mus, & trigessimus primus. At vero nosse expedit, si aliter judicatio fiat, extra
prescriptos dies recidivas fore significat, & fuerit sane perniciofa. Oportet au-
tem animadvertere nosse, in his temporibus iudicationes futuras esse ad salu- 45
tem, aut perniciem, aut inclinationem ad melius, aut deterius. Erroneæ puto
febres & quartanæ, & quintanæ, & septimanæ, & nonanæ in quibus circui-
tus judicentur, considerandum est.

Egroti Quatuordecim, Primus.

Philiscus prope muros habitabat, decubuit. Primo die febris acuta, sudavit,
noctem laboriosam habuit. Secundo die omnia exacerbatata sunt. Vespere ab 50
infuso per clysterem adhibito, bene habuit, noctem quietam. Tercio mane, & usque ad
meridiem vilis est a febre liber esse. Ad vespertam febris acuta cum sudore, siculo-
sus erat, lingua resiccabatur, nigra minxit, noctem molestam habuit, non dormivit,
omnino deliravit. Quarto omnia exacerbatata sunt, urina nigra, nox tolerabili-
or, urinae melioris coloris. Quinto circa meridiem parum de naribus stillavit non mi- 55
xium. Urinae variae, quæ habebant innatacia quadam rotunda, genitrix similia,
dispersa non subsidebant. Subdita glande, fistula paucæ prodierunt, noctem habuit
laboriosam, somni parvi, sermones, deliramenta, extremitates undique frigidae, &
non amplius recalescentes, minxit nigra, dormivit parum, ad diem voce destitutus est,
frigidum sudavit, extremitates livide. Circa meridiem sexta die mortuus est. Hujc 60
spiritus ad finem usque velut revocant, rarus, & magnus. Splen elevatus est orbicula-
ri gibbositate. Sudores frigidi perpetui. Exacerbationes diebus paribus.

Egroti 16.

Silenus habitabat in Pharamone, prope filios Evalcidis. Hunc ex lassitudinibus,
& potationibus, ac exercitiis intempestivis febris corripuit. Cœpit autem aggra-
tare ex lumbis, & capite gravitas tenebat, & colli distensio erat. Ab alvo prima die 65
biliosa, mera, spumosa, abunde colorata, multa prodierunt. Urina nigra nigram
subsiditiam habentes, siculosus, lingua resiccata, nocte nihil dormivit. Secunda
die febris acuta, feculibus plures, tensiones, spumosa. Urina nigra, nox mole-
sta, parum deliravit. Tercia omnia exacerbatata sunt, præcordii distensio strin-
genda ad umbilicum submolli. Secus tenuis, subniger. Urina turbata, sicuti 70
græ. Nocte nihil dormivit, sermones multi, rursus, canis, continere se non po-
tuit. Quarta per eadem. Quinta feculibus, meri, biliosa, levis, pinguis. Urinae te-
nuis, pellucida, parum resipiscibat. Sexta circa caput parum sudavit, extremita-
tes frigidae, livide. Jactatio multa, ab alvo nihil prodit. Urina suppressa sunt,
febris acuta. Septima de voce destitutus est, extremitates non amplius recalesce-
bant, nihil minxit. Octava sudavit frigidum per totum sudorem, papulae cum sudo- 75
re rubrae, rotundæ, parvæ, velut vasti permanebant, non abscedebant. Ab alvo ve-
ro cum parva irritatione, stercore tenui velut incoacta, multa prodiebant cum do-
lore. Urinam reddebant cum dolore mordicæ. Extremitates parum recalescebant. Somni
tenuis, soporosi. Vox intercepta. Utiæ tenuis, pellucida. Nona per eadem. 80
Decima potum non suscipiebat. Soporosus erat, somni autem tenuis. Ab alvo
similia. Minxit acervatum suberassum, depositum subsidens, subsiditiam crassa
farinae similis, alba. Extremitates rursus frigidae. Undecima mortuus est. Ab initio
huic, & ad finem usque spiritus magnus rarus, præcordii palpitatio alidua.
Ætas erat circa annos viginti.

Egroti 17.

Herophonti febris acuta. Ab alvo pauci ab initio velut in tenebris. Postea
vero tenuia prodiebant, biliosa, frequentiora. Somni non aderant. Urinae ni-
græ, tenuis. Quinta mane sursum. Exacerbatata sunt omnia. Splen elevatus est.
Præcordii distensio. Ab alvo pauci, nigra prodierunt, deliravit. Sexta delirabat,
ad noctem sudor, frigiditas, delirus permenebat. Septima perfrigerabatur. Siculo-
sus delirabat, noctem resipiscibat, obdormivit. Octava febriçitavit, splen minueba- 90
tur, intelligebat omnia, doluit iuxta inguen, tumor primum & directio splen-
is. Deinde dolebat utraq; tibias; nox tolerabilis. Urinae coloris melioris par-
vam subsiditiam habebant. Nona sudavit, judicatus est morbus, intermisit. Quin-
ta reversus est. Statim autem splen elevatus est, febris acuta, surditas rursus. Post 95
recidivam tertia die splen minuebatur, surditas minor erat, crura dolebant, noctu
sudavit. Judicatus est die septimadecima. Neque deliravit in recidiva.

Egroti 18.

IN Thaso Philini uxorem, quæ filiam pepererat, quum purgatio secundum na-
turam facta esset, & alias leviter degeret, decimaquarta a partu die febris ve-
hemens

- 100 hemens corripuit cum rigore. Ab initio vero cor dolebat, & circa præcordium dexterum, muliebrum partium dolores, purgatio cessavit. Ubi vero glandem subdidisset, hæc quidem leviora facta sunt. Capitis autem, colli, & lumborum dolores persistebant, somni non aderant. Extremitates frigide. Sticculosa erat, alvus combesta, pauca excreta. Urinæ tenues ab initio decolores. Sexta die ad noctem multum deliravit, & rursus resipiscebat. Septima sticculosa, secessus biliosi, abunde colorati. Octava supertiguit, febris acuta, convulsionibus multæ cum dolore, multum delirabat. Glande subdita exurgebat, multaque cum fluxione biliosa prodibant. Somni non aderant. Nonæ convulsionibus. Decima parum resipiscebat. Undecima dormivit, omnium recordata est. Sextim autem rursus deliravit. Urinam autem reddebat cum convulsionibus, acervatam, multam, illis autem parum adnomentibus, crassam, albam, qualis est ex his, quæ subsident, ubi multo tempore sita fuerint concubata, non subsidebat, color, & crassitudo talis, qualis est in urinis iumentorum. Talis ingebat, quæ & ego vidi. Circa decimum quatuor diem palpitationes per totum corpus, semones multæ, parum resipiscebat. Verum statim rursus delirabat. Circa decimum septimum
- 115 voce destituebatur. Vigesima mortua est.

Egræa P.

- E** Picratis uxorem, quæ decumbebat apud Archegetem, parvi jam propinquam, rigor fortiter corripuit, non incaluit, velut dicebant. Et postridie eadem erant. Tertia die peperit filiam, & alia omnia iuxta rationem venerunt. Postridie a partu febris acuta eam invasit, cordis dolor, & muliebrum partium. Ubi vero glandem subdidisset, hæc quidem leviora facta sunt. Capitis autem, & colli, ac lumborum dolor. Somni non aderant. Ab alvo modica biliosa, tenuia, purga prodibant. Urinæ tenues, subnigræ. Sexta die, a quo febris ipsam corripuit, ad noctem deliravit. Septima omnia exacerbata sunt, vigilans deliravit, sticculosa, secessus omnes biliosi abunde colorati. Octava supertiguit, pluri dormivit. Nonæ per eadem. Decima crura laboriose dolebat. Cordis dolor rursus, capitis gravitas, non deliravit, magis dormivit, alvus restitit. Undecima sudavit, minxi molius coherata, multam subsidentiam habentia, levius degebat. Decimaquarta supertiguit, febris acuta. Decimaquinta vomuit biliosa, flavas, satis multa. Sudavit sine febre. Ad noctem febris acuta. Urinæ crasse subsidentiam albam habentes.
- 130 Decima sexta ad noctem exacerbata est, & cum molestia non dormivit, deliravit. Decima octava sticculosa, lingua combusta est, non dormivit, multum deliravit, crura dolebat. Circa vigesimam mane parum riguit, soporosa, quiete dormivit, vomuit biliosa, purga, nigra. Ad noctem surditas. Circa vigesimam primam lateris sinistri gravitas, per totum eum dolore, parum intus perussit. Urinæ crasse, turbata, subnigræ, quæ depositæ non subsidebant, cætera leviora, non sine febre. Statim ab initio fauces dolebat, rubor aderat, columella revulsæ, fluxio acris, mordax, salis perpetuo perseverabat. Circa vigesimam septimam febris libera, in urinis subsidentia, latus dolebat. Circa primam, & trigessimam febris corripiebat, alvus ex biliosis turbata est. Quadragesima die vomuit pauca, biliosa. Iudica-
- 140 ta est perfecte libera a febre die octogesima.

Egræa P. II.

- C**learchiden, qui supra Heracleum decumbebat, febris corripuit erroneo modo. Dolebat autem caput ab initio, & latus sinistrum, & aliarum partium dolores asperant lassatorum modo; febres exacerbabantur alias aliter inordinate. Sudores quandoque, quandoque non. Exacerbationes plurimum in iudicatoriis diebus maxime accedebant. Circa vigesimam quartam summas manus dolebat. Vomuit biliosa, flavas, satis multa. Paulo post autem æruginosa. Ab omnibus allevatus est. Circa trigessimam sanguis ex utriusque naribus erumpere cepit, atque hoc erroneo modo paulatim usque ad iudicationem. Non autem falsidiebat cibum, neque sticculosus erat per totum tempus, neque infornis. Urinæ tenues, non decolores. Circa quadragessimam mixxit subnigra, subsidentiam multam valde rubram habentia, allevatus est, post hæc autem urinæ varic quandoque subsidentiam habebant, quandoque non. Sexagesima urinis subsidentia multa, & alba, & levis. Remiserunt omnia, febres intermittebant. Urinæ tenues quidem, verum boni coloris. Septuagesima a febre liber permansit diebus decem. Octogesima riguit, febris acuta corripuit, multum sudavit, Urinis subsidentia rubra, levis, perfecte iudicatus est.
- 155

Egræa P. III.

M Etoneum febris vehemens corripuit, lumborum gravitas dolorosa. Postridie ubi aquam habisset satis multam, ab alvo probe prodit. Tertia capitis gravitas. Secessus tenues, biliosi, subnigri. Quarta omnia exacerbata sunt. Fluebat a dextra nare bis sanguis modicus. Noctem moleste tulit. Secessus similes tertie diei.

diei. Urinæ subnigræ, habebant quiddam in medio innatans, subnigrum, divisum, non subsidebant. Quinta effluxit ex sinistra nare sanguis largus, merus. Sudavit, iudicatus est. Post iudicationem insomnis delirabat. Urinæ tennes, subnigræ. Capitis lotionibus usus est, dormivit, resipiscebat. Huic recidiva facta non est. Sed sanguis erupit sæpe etiam post iudicationem,

Egrætu VIII.

ERasimum, qui habitabat circa Bootæ torrentem, febris vehemens corripuit post cenam, nocte turbatus fuit, diem primam quiete, noctem laboriose transiegit. Secunda omnia exacerbata sunt, ad noctem deliravit. Tertia dolorose, multum deliravit. Quarta molestissime, ad noctem nihil dormivit. Insomnia, & ratiocinationes, deinde pejora, & magna, & periculosa, timor, molestia. Quinta mane resipiscebat, ac intelligebat omnia. Verum ad meridiem multum insaniit, continere se non potuit. Extremitates frigide sublivide. Urinæ inconcoctæ. Circa solis occasum mortuus est. Huic febres perpetuo cum sudore, præcordia sublimia, distentio cum dolore, Urinæ nigræ habentes quædam in medio suspensa innatantia rotunda, non subsidebant. Ab alvo stercora prodibant. Sitis perpetuo non valde. Convulsiones multæ cum sudore circa mortem.

Egrætu IX.

CRitoni in Thaso erecte obambulant, pedis dolor fortis a magno digito cepit. Decubuit eadem die, horridus, anxius, parum subcalescens, nocte desipuit. Secunda die tumor latus per totum pedem, & circa malleolum subrubens cum distentione. Pusillæ nigræ, febris acuta, insaniit. Ab alvo vero mera, biliosa, fæcis multa prodibant. Mortuus est altera ab initio die,

Egrætu X.

Clazomenium, qui ad Phryaichidæ puteum decumbebat, febris vehemens corripuit. Dolebat autem caput, collum, lumbos ab initio. Stetum autem surditas. Somni non aderant. Febris acuta invasit. Præcordium elevabatur cum tumore. Distentio non valde, lingua sicca. Quarta ad noctem desipuit. Quinta laboriose omnia exacerbata sunt. Circa undecimam parum remiserunt. Ab alvo vero ab initio, & usque ad decimam quartam tenuia multa aquei coloris prodibant. Toleranter ea, quæ ad secundam pertinent, ferebat. Postea alvus restitit. Urinæ perpetuo tennes quidem, verum boni coloris, & multa in medio suspensa habebant divulsa, non subsidebant. Circa decimam sextam minix paulo crassiora, habebant subsidentiam parvam, pusillum alleviarunt, resipiscebat magis. Decima septima rursus tenuia. Circa utrasque aures tubercula existerunt cum dolore. Somni non aderant, delirabat. Circa crura dolebat. Vigesima a febre liber iudicatus est, non sudavit, omnia intelligebat. Circa vigesimam septimam eoræ dextræ dolor fortis, cito quievit. Tubercula vero iuxta aures neque sedata sunt, neque suppurrata, verum dolebant. Circa trigessimam primam profluvium alvi ex multis aquosis, cum ejusmodi, quæ in dysenteria prodire solent. Urinas crassas mingebat. Tubercula circa aures sedata sunt. Circa quadragesimum oculum dextrum dolebat, obscurus videbatur. Restitutus est,

Egrætu XI.

DRomeadæ uxorem, quæ filiam pepererat, & aliis omnibus secundum rationem factis, secunda die rigor corripuit, febris acuta. Cæpit autem prima die dolere circa præcordia fastidiosa, ac nauseabunda, horrida, anxia, & sequentibus non dormivit. Spiritus rarus, magnus, statim revulsus. Altera a rigore die, stercora ab alvo bene prodibant. Urinæ crassæ, albæ, turbatæ, qualis sit ex his, quæ subsiderunt, ubi multo tempore sita, fuerit conturbata, non subsidebant, nocte non dormivit. Tertia circa meridiem superriguit. Febris acuta. Urinæ similes, præcordii dolor, fastidiosa, ac nauseabunda, nox molesta, non dormivit. Sudavit per totum subfrigida. Statim autem rursus recalefacta est. Quarta die sub præcordia parum allevata est. Capitis gravitas cum dolore, in soporem incidit, parum de naribus stillavit, lingua sicca, sticculosa. Urinæ tennes, oleosæ, parum dormivit. Quinta sticculosa, fastidiosa. Urinæ similes, nihil ab alvo. Circa meridiem multum deliravit, & statim rursus parum resipiscebat, exurgens in soporem incidit, frigiditas parva, nocte dormivit, deliravit. Sexta mane superriguit. Stetum autem recalefacta est. Sudavit per noctem. Extremitates frigide, deliravit. Spiritus magnus, rarus. Paulo post convulsiones a capite ceperunt. Statim mortua est.

Aegrotus XII.

- 215 **H**omo quidam calefactus conavit, & bibit amplius. Vomuit omnia noctu, febris acuta. Præcordij dexteri dolor. Inflammatio submollior ex interna parte, noctem moleste tulit. Urinæ ab initio rubræ, crassæ, deposita non subsidebant. Lingua sicca, non valde sicculosa. Quarta febris acuta. Dolores omnium. Quinta minxit leve, oleosum, multum, febris acuta. Sexta vespere multum deliravit. Noctem dormivit. Septima omnia exacerbata sunt. Urinæ similes, serinones multæ, continere se non possunt. Ab alvo cum irritatione prodierunt liquida turbata, cum lumbricis. Nox laboriosa. Mane riguit, febris acuta. Sudavit calidum. A febre liber esse visus est, non multum dormivit. A somno frigiditas, sputatio. Vespere multum deliravit. Paulo post vomuit nigra, pauca, biliosa. Nona frigiditas, multum delirabat, non dormivit. Decima crura dolebat. Omnia exacerbata sunt, deliravit. Undecima mortuus est.

Aegrotus XIII.

- 220 **M**ulierem, quæ decumbebat in litore, trimestri foetus gravidam febris vehemens corripuit, statimque lumbos dolere cepit. Tertia dolor, colli, capitis iuxta claviculam, & manum dexteram. Statim lingua voce destituta est, dextra manus resoluta est cum convulsione velut his, qui aliqua siderantur parte, contingere solet. Delirabat penitus, noctem moleste tulit, non dormivit, alvus turbata est, ex biliosis, meris, paucis. Quarta die lingua voce soluta est. Convulsiones eorundem, dolores omnium remanebant. Iuxta præcordia tumor cum dolore, non dormiebat, penitus delirabat, alvus turbata. Urinæ tenues, non boni coloris. Quinta febris acuta, præcordij dolor, plane delirabat, secessus biliosi, ad noctem sudavit, a febre libera. Sexta resipiscebat. Ab omnibus allevata est. Verum circa sinistram claviculam dolor remanebat, sicculosa. Urinæ tenues, non dormivit. Septima tremor, in soporem incidit, parum deliravit, dolores iuxta claviculam, & sinistram brachium remanserunt. Reliqua allevata sunt. Omnia inireligebat. Tres dies a febre libera mansit. Undecima reversa est, supererigit, febris vehemens corripuit. Circa decimam quartam vomuit biliosa, flava, latis multa, sudavit. A febre libera judicata est.

Aegrotus XIV.

- 245 **M**elidiz, quæ decumbebat iuxta Junonis templum, capitis, & colli, & pectoris dolor fortis cepit. Statim autem febris acuta corripuit. Menfes pauci apparebant. Dolores omnium horum continuus. Sexta die soporosa, anxia, horrida, rubor in maxilla, parum deliravit. Septima sudavit, febris dimisit. Dolores remanebant. Rediit somni pauci. Urinæ perpetuo boni coloris, verum tenues. Secesus tenues, biliosi, mordaces, valde pauci, nigri, graveolentes prodiebant. In urinis subsidentia alba, levis. Sudavit iudicata est perfecte undecima die.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPULARIBUS

LIBER II.

Argumentum in Librum sequentem.

Sectio prima. Carbunculi æstivi in Canone a pluvio continuis &c. Febræ ardentes. Afebriles. Morbi autumno provocantes. Astorbi quibus temporibus facillime inducentur. Per omnino saluberrimum. In morborum principis quid considerandum. Quorum morborum indicationes sint velociores. Crude iudicata. Abortientium signa. Testium tumores tumores finiant: pectoris, mammarum, genitura, & vocis convulsio. Abscessus quibus partibus fiant, & qui boni, & qui mali. Abscessus tussiculosi. Sanguinis & navibus

eruptiones. Lingua dura, vel molles. Capita longa ex vivendi ratione &c. Pene ampla, & ventres, & ossa ampla. Pellium ruptiones. Hepatici unde. Qui morborum regionum ab hepate color. Morborum a splene color. Ulcera quæ ægre perseverant. Occasiones morborum consideranda. Ulcera iudicantia. Ad crudos, & liquidos secessus.

Sectio secunda. Oris ventriculi dolor. Morborum mutationes, & fines. Ventris turbatio. Ex valendi morbo, in superna palpebra hordolum. Tibiarum tumores ex defatigatione cum calore. Testis sinistri tumor ex febribus modicis. Splen magna. Adama dextra, &

crus syderationis modo soluta. Alibi circa-
ner dolores a crapula. Dolores fortissimos
quomodo quis dissolvat. Aqua levissima qua.
Cibi, & potus. Abortus. Dysenteria qui
magis laboret. Pusilla per corpus lallantis.
Urine stillicidium. Cere dolor ante conce-
ptionem. Pusilla infra in tibia pregnan-
tis. Puer carosus sine ossibus. Gemellarum
partus, & modica purgatio. Rutilus acidus
intestinarum levitatisque, Peratri potio. He-
patitis elevatio splenico modo. Astilla multa
cum sanguinis fluore ex nare sinistra. Splen
in gibbum elevatus. Anginosorum affectio-
nes. Glandula nulli unquam insumuerunt.
Venarum in temporibus, capite, ac cervicis
elevatio. Tumor rellus, nec in alteram par-
tem vergens. Tumores ad alteram partem
vergentes. Resoluciones lepiditer sydera-
torem.

Sectio tertia. Febres ardentes in Perintho bre-
ve austrina, vere, & aestate sicis. Aspi-
ritudines in cute miliariae. Adedicamentorum
compositionis ratio. Febris acuta ex tussi ma-
tura. Disparientia sine signo indicatorio male
indicatur. Quae febres in glandularum tu-
moribus male. Spiritus. Astidus oestratio.
Spiratio. Relicta post iudicationes, morbos
faciant. Lænis elevationes. Sanguinis erup-
tiones quarta die. Febres una die intermit-
tentes. Febres ex mucosis, & biliosis. Pe-
llinis intentio. Collectiones circa linguas,
humiles calendi, & quae podagricis sunt.
Quartana annua. Delapationes in venarum
sectionibus. Rutilus acidus. Rigores maliorum.
Partes vitales. Humiditas per prudencia.
Astruorum purgationum circuitus est. Lac
primiparum. Tumor in vulneribus fortibus
non apparet. Astruorum purgationes, similes
ostimulibus. Tumores, prae rationem ele-
vati.

Sectio quarta de venis. Hepatidis vena di-
stributio. Septum transversum. Vena dupli-
ces a claviculis. Arteria ex rene. Nervus
duo a cerebro. Crurum impotentia ex assiduo
usu leguminum. Excandescencia utilitas.

Oculi utri ad coxam, & crux ex partu
conversio.

Sectio quinta de natura indiciorum notionibus.
Natura indiciorum notio. Mali. Boni. Hy-
dropicorum species. Lingua offendentis. Sur-
ditas. Sanguinis e naribus traspio. Infa-
nia. Puerperis convulsio quomodo solven-
da. Capitis os confusum. Uleus. Desi-
pienti quid adhibendum. Ventositas. Fluxio.
Infecundum remedia. Vocis repentina de-
stitutio. Pituita functiones oculorum ex mam-
mis. Tassis sicca. Hydropici tassis. Coxarum,
ocularum, celsium, & mammarum
commotio. Partes circa faciem graciles.
Hydropicus. Auris dolor. Vena pulsans in
cubito. Pulsus sanguinem fundens. Ori-
is ventriculi dolor. Vomitus solutio. Cor-
ruptorum corporis sanatio. Ad ocales. Pa-
rices calvorum. Ad vitiliginem, & le-
pam. Secundarum, si non descendant, pur-
gatio.

Sectio sexta de natura indiciorum notionibus.
Pracundi qui longa vita. Boni. Homo ad-
aptatus. Vocis in convulsionibus impari die
solutio. Puer quo mense natiatur. Solutio
voci similis. Venarum in manibus pulsatio.
Ad gutturalis dolorem. Peritris turbationis cu-
ra. Interceptio morbi quando fieri debeat.
Asteri neminem, nisi die, mense, & anno
imparibus. Oculi non robusti. Ternarii nu-
meri vis. Angina. Lippitudo. Intestini vul-
neratio. Bilem generantes. Dextra partes
plurimum vim circa naturam habent. Ad
nerves sistentes. Trimestris puer. Lactis mul-
tus flor factum debilitat. Mammis maxi-
mam confluentia partem inesse. Urine stil-
licidium. Ceteri generationem quae sequantur.
Anxietas, horro, ostentia. Supernarum
partium dolorem quae solvant. Auris dolor.
Pulsus mollis. Pracordiorum distentio. Pa-
roechia ungum abscessus. Aqua fecerenti.
Asteri concipere volenti. Capitis dolor ex
crapula. Calori, non a bile, neque a pitui-
ta, sed a lassitudine, quomodo medendum.
Infantia futura signa.

SECTIO I.



ARBUNCULI in Cranone æstivi: pluebat in ardoribus aqua 1
larga. Conringebat hoc per totum, & maxime ab austro, & sub-
nascebantur quidem in cute famies, dum autem intro concipie-
bantur, calecebant, & prurium inducebant. Deinde pusillæ
velut ab igne inustæ excitabantur, & sub cutem uri sibi videban-
tur in ardoribus siccitatis. Febres plerumque citra sudorem.
In his vero, si minutæ imbris guttæ deciderint, magis sudato-

riz sunt ab initio. At hæc difficiliora iudicati manent, quam aliter. Atramini-
nus, si non propter hæc fuerint, sed propter morbi modum, Febres ardentes in
æstivis magis sunt, & in aliis temporibus. Rescancant autem magis æstate. 10
Autumno maxime ferunt, & oris ventriculi dolor, quamquam & ipse minus ma-
lescus fuerit, ipso morbo tali existente. Ascarides vesperi similiter huius, & illæ
tunc infestavit in die plerumque, non solum ideo quod magis affligunt, sed etiam ipsæ
per se ipsas. In autumno acutissimi morbi, & maxime lethales, & omnino similitu-
dinem habent, eo quod vesperi exacerbantur, tamquam annus ipse habeat circuitum 15
morbosum. Quale est dies morbi, quale est vespertinum tempus ad exacerbationem;
tale est morbi, & uniuscuiusque constitutionis inter se, ubi non quid in superiori
specie fuerit innovatum, sin minus, alia sane constitutione hæc imperium obti-
nuerint. Quare etiam annus ad se ipsum hoc modo se habet. In quietis, ac constan-
tibus temporibus, & annis tempestive tempestiva præbentibus, boni status, & 20

- judicatu facillimi morbi sunt. In inconstantibus veto inconstantes, & qui difficulter judicantur: quum sane in Perincho defecerit, aut abundaverit quid, ut aut veniet sint, aut non veniet, aut aqua, aut siccitates, aut ardores, aut frigora. Ver autem omnino saluberrimum, ac moxime lethale. Circa principia morborum considerandum, an statim floreat. Clarum autem hoc fit ex incremento. Incrementa vero ex circuitibus, & judicationes quoque hinc manifestae sunt, itemque ex acerbationibus in circuitibus, si citius accedant, aut non, & si diutius durent, aut non, & si magis affligant, aut non. Ex omnibus autem continuus, aut intermittens, & diuturnus, & vulnerebus, & spuris, & doloribus, Itemque tubercolorum inflammationes, & quaecumque alia posterius apparent, fortassis autem & ex aliis communibus rebus, quae quidem citius sunt, breviora sunt. Quae vero tardius, longiora, quum etiam in circuitibus citiorem recursum, ac reliquum augmentum morbus neget. Nam & corum, qui statim pereunt, velociores sunt judicationes, quoniam & dolores & contusui, ac fortes. Quae vero ad melius judicant, non statim apparent. Judicatoria non indicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis judicationis. Quae praedicta sunt, si crude judicata fuerint, recidivae erunt, sin minus, judicationis impeditioes, aut male judicationes. Possunt etiam fieri perniciose ea, quae non parva sunt. Quaecumque judicatoria signa fiunt, eadem haec, si non fiunt, difficilis sunt judicationis, Quae vero contraria significant, malum, non solum si tuncurrant, sed etiam primarier naturae contraria repentia. Quemadmodum etiam malorum signum ea, quae ad contraria repunt. Considerate vero sic oportet, in cibus, compassioneibus venarum, tumoribus praecordiorum, sursum vergentibus, deorsum vergentibus. Sed & multa sunt ejusmodi, velut abortientium mammae graciles fiunt, neque enim contrarium est. Neque ulles diuturnae, quoniam ubi testis intrinsevit, cessant, & testis tumor a tussi cessat, & allevatur, quae res communefacit nos communionis pectorum, mammarum, geniurae, vocis. Abscessus aut per venas, aut per ossa, aut nervos, aut citum, aut alias emotiones. Boni autem sunt, qui infra morbum fiunt, velut varices, lumborum gravitates ex supernis. Optimi vero potissimum sunt inferni, & longissime infra ventrem, & remotissimi a morbo, & qui per effusionem fiunt, velut sanguis e naribus, pis ex aure, sputum, urina, quae per effusionem fiunt. At abscessus, quibus haec non fiunt, sunt velut dentes, oculi, nasus, sudor. Sed & quae sub cutem abscedunt foras tubercula, velut putrescentia, & quae suppurantur, aut ulcus, aut ejusmodi pustulae, aut squamae, aut desilium capillorum, virilgines, lepra, aut ejusmodi, quae abscessus sunt acervatim fluentes, & non semiprepentes, & quaecumque alia dicta sunt, & si non pro rationis excretionis morbi dignitate fiunt, velut Temeni nepti, ex morbo forti ad digitum decubuit, qui quum non sufficeret ad suscipiendum morbum, recutit, Mortua est. Abscessus aut per venas, aut per alvum, aut per nervos, aut per cutem, aut iuxta ossa, aut secundum spinalem medullam, aut secundum alias effusiones, os, pudendum, aures, nares, ex utero menses. Judicationes posttride fiunt, velut ad lumbos, aut ad femur, & ad testes. Quandoque ex tussi, & testis ipse a se ipso. Tussiculosi abscessus, qui supra ventrem fiunt, non similiter perfecte liberant. Sanguinis eruptiones large ex naribus plerumque liberant, velut Heragorae, quod medici non animadverterunt. Qui voces asperas natura habent, his etiam linguae subasperae sunt, & quaecumque asperitates a morbus similiter. Quae igitur durae sunt linguae a natura, etiam sine morbo hoc habent. Molles vero tardiores sunt & ad peccatum, & ad bonum, quam prior natura. Consideranda sunt etiam longa capita ex vivendi ratione, & cervices longae ab inclinationibus, & venarum amplitudo, & crassitudo ab eadem, & angustiae, ac latitudines, & brevitates, ac tenuitates ex contrariis. Quorum venae amplae, & ventres, & ossa ampla, hi sunt, qui tenues sunt. Pingues vero his contraria habent, & in his, qui fame macerantur, mediocritates. Ab his consideranda ea sunt, quae propterea incrementa unicusque detrahunt, & quae diminutiones adaugent, & ea, quae incrementa coadungent, & quae corroborant. Et quae sunt communes venarum dissectiones. Pectum raptiones, quae quidem circa pubem fiunt, plurimum statim sunt innoxiae. Quae vero paululum supra umbilicum in dextera parte, hae dolorosae sunt, & anxiosae, & stercoris vomitum inducunt, velut etiam Pitracoe accidit. Fiant autem hae aut a plaga, aut vulsura, aut alterius insultu. Quibus id, quod medium est inter abdomen, & cutem, inflatur, & non sedatur, color est, velut qui multum pallidus est, & qui ex candicante palles, quoniam omne huiusmodi ab hepate est, & ex hoc fiunt hepatici in his morbis, & morbi regii ab hepate ad subalbidum colorem vergunt, & qui ex aqua inter cutem, & ex pituita alba laborant. Qui vero a spleue sunt, tum hydropes, tum morbi regii, nigriores sunt. Sed & ulcera, quae agre perlanantur, exalbidiorum sunt, qui fere lentis colorem referunt, & cutis, distringitur, ac labia, velut Antiochus habuit, & Aleyas, ab humoribus ex corpore falluginoso, quod sub cute maxime, & a capite coniungitur, quum a pulmone fuerit calefactum. Occasiones unde quis agrotare cepit,

cœpit, considerare oportet, siue capitis sit dolor, siue auris, siue lateris. Signum 90 autem sunt in quibusdam dentes, & in quibusdam inguinum tumores. Ulcera sientia, ac judicantia febres, & tubercula. Quibus hæc non sunt, judicatio subleata est. Quibus intus relinquuntur, certissima recidivæ, ac celerissima. Crudos, ac liquidos fecçus, milium solidum in oleo coctum sistit. Exemplo est nautæ puer, & Myriocharne.

S E C T I O II.

Mulier cor, hoc est os ventriculi dolebat, & nihil remittebat dolor. Huic 1 polentæ pollen in mali punici succum inspersus, & semel in die acceptus in cibo satis fuit, & non revomebat, velut Charion contigit. Mutationes profunt, si non ad prava mutantur, velut his, qui a medicamentis vomunt febrium gratia. Fines in meraciora desinentes, puræfactionem significant, vel 5 ut Dexippo. Serapis ex liquida alvo intumuit. Pruritus autem hand scio quot diebus, non ultra. Habebat autem & abscessum quemdam in lateris molitudine, qui nigrescens occidit. Et Strymargi uxor ex ventris per paucos dies turbatione, ubi milium in sistendo laborasset, & post pueri sensus foeminei quadrimestris ex corruptione discessum sana facta esset, intumuit. Mo- 10 scho e calculo laboranti fortiter, in superna palpebra hordeolum abortum est magis ad autem. Deinde intro exulceratum est. Quinta, & sexta die ex interitis pus erupit. Infernas affectiones solvit. Glandularum tumor, ac inflammatiõ circa aurem erat, itemque inferne in collo, e directo superius tumoris. 15 Aristai uxoris frater fatigatus in via inalelecebat. Deinde in tibia tumores fiebant terebinthi fructui similes. Postea febris continua fiebat, & postidie sudor factus est, & aliis paribus diebus semper idem fiebat. Adhuc autem febris renebat. Erat autem sublenosus. Ex sinistra nare sanguis erumpere frequenter, & pariter. Judicatus est. Postidie iuxta sinistram autem tumor. Sequen- 20 ti die etiam circa dentem, sed hic minor, & insuper tepefcebat. Hi evanuerunt, & non suppurati sunt. Qui ab Akibiade venit, ei ex febris modico ante judicationem testis sinister intumuit. Habebat autem splenem magnum, & sane tunc iudicata est febris vigesima die. Deinde alias æque alias subincalescebat, & subdordum speubar. Cuius manus dextra, & crus sinistram, quum ex nulli parum, & nihil memorabile eiecisset, siccationis modo resolu- 25 ta sunt, alio vero nulla re alterata est, neque facie, neque mente. Nec vero adeo fortiter illis paribus. Cœpit ad melius procedere circa vigesimam diem. Factum autem hoc est Ali fere circa mensum eruptionem, & fortassis tunc primum apparebant. Erat enim virgo. Apocemantus, & pater fabri illius, qui caput fregit, & Nicotratu non extussibant quicquam. Erant autem alibi circa 30 rhenes dolores. Interrogationes factæ sunt, dicebant ipsos semper repleri potu, aut cibo. Dolores fortissimos quo modo dinoverat quis conficiat, fuga, tolerantia, experientia, & timiditates indicant. Aqua, quæ cito calefcit, & cito frigescit, semper levior est. Cibi, & potus experientia opus habent, an ad æqualitatem maneant. Dicendum quod, ubi sanguis effluxit, 35 excalescunt, & quæcumque alia huiusmodi. Abortus masculus sexagimæ dierum, an partum suppressionibus salubet. Hercules intumescerebat mali ipsius die octava. Magis ex dysenteria laborat quisquis sane etiam e renelino vexatur. Quidam lactans pustulas per corpus ubique habebat. Postquam autem lactare cessavit, sedata sunt per æstatem. Coriarii illius, 40 qui coriacea præparabat, urori, quum peperisset, & perfecte exoluta esset, visum est de secundi membranofum quiddam remanere, discessit autem quarta die male. Nam urina stillentio vexabatur. Statim concipiens peperit mascululum. Habebat autem jam multos annos, & postremum neque menses prodibant. Quod autem peperisset, urina stillentium paululum intermittebat. 45 Quædam priusquam conciperet, coxam dolebat. Postquam autem concepit, non amplius dolebat. Ubi vero peperit, vigesima die rursus doluit. Peperit igitur masculum. Prægnanti in tibia inferne dextera, tertio, aut quarto mense pustula, ad quas manna thuris utimur, itemque in manu dextera iuxta magnum digitem, haud scio, an peperit, reliqui enim ipsam semestrem, ha- 50 buebat autem, velut ego puto, in ædibus Archelai ad rupem. Antigænis uxor habitabat iuxta Nicomachum, peperit puerum carnosum quidem, verum qui haberet maximas partes discretas, magnitudine vero esset quatuor digitorum, & sine ossibus, deinde crassus, ac rotundus. Hæc autem ambiciosa erat ante partum. Deinde simul cum partu pus revomuit modicum, velut ex 55 furunculo vocato tuberculo. Quæ filias peperit gemellas, & difficultè peperit, & non valde purgata est, tota intumuit. Deinde venter ipsi magnus fiebat. Reliquæ vero reprimabantur, & rubicunda prodibant usque ad sextum mensem. Deinde alba valde per omne jam tempus. Arque hæ fluxiones ve-

- 60 neri officiebant, & mera rubicunda ipsi profuebant. In diuturnis intestinum levitatibus ructus acidus fiens, antea nunquam factus, signum bonum, velut Demanetæ contigit. Fortassis autem licet etiam ante parare. Nam turbationes eiusmodi alterant. Fortassis autem & ructus acidi intestinorum levitatem solvant. Sanata est veratri potione Lycea, postremum splen magnus, & dolores, & febris, & ad humerum dolores. Et vena, quæ in splene est, in cubito secabatur, & saliebat quidem sæpe. Aliquando vero etiam non est secta, sed una cum sudore sanguis penetravit, aut sua sponte. Ex quo autem prodibat, splen dextera parte intendebatur, spiritus intus duplicabatur, non tamen magnus. Mente movebatur, contegebatur, stans inerat, non prodibat interne quiesquam, neque mingebat, Morua est ante partum. Quæ circa fauces ad alterutram partem repentina processerunt, exulcerata non sunt, ad sinistra transiverunt, ad splenem dolor venit citra iudicationem. Hieroni iudicatio facta est decima quinta die. Cui forori hepar elevatum est splenico modo. Morua est secunda die. Non simul multum mingebat, quod non subsidebat, & sanguis ex sinistra nare manabat. Erat enim & splen sursum in gibbum elevatus, ac durus, superstes mansit, recidiva. Erant autem anginosorum affectiones hæ. Colli verticula intro vergebant, quibusdam amplius, quibusdam prope. Et collum forissecus conspicuum cavitatem intro habebat, & hæc pars ad contactum dolebat. Erat autem & cuidam intra os dentis appellatum, quod non similiter acutum est, quibusdam veto etiam valde rotundum, maiore circumferentia. Si non cum dente appellato, fauces non inflammatae, verum iacentes. Partes sub maxilla tumide, non inflammatae similes. Neque glandulae ulli intumuerunt. Sed magis secundum naturam, linguam non facile vertebant, ipsique & maior esse videbatur, & prominentior, & sub lingua vena conspicua, deglutire non poterant, aut valde difficile. Immo ad nares fugiebat, si valde cohereret, & per nares loquebantur. Spiritus autem his non valde sublimis. Quibusdam vero vena in temporibus, & in capitibus, ac cervice elevata. At rerudescitibus, ex his, parum quiddam tempora calida, etiamsi alias non febrilearent. Non suffocabantur plurimi, nisi quum deglutire cupiebant aut salivam, aut aliud quiddam. Quibus igitur tumor, erat salus, nec in alteram partem vergebat, hi neque leviter sideratorum modo resolvebantur. An vero aliquem perisse viderim, in memoriam revocabo. Quos autem nunc novi, superstes manserunt. Erant autem partim celestique allevantia. Plurima vero ad quadraginta dies deveniebant, & in hoc plerique etiam sine febre. Multi vero etiam ad valde longum tempus, partem aliquam tumoris habebant. Et deglutitio, & vox indicabat, & columella liquescentes significationem quandam pravam exhibebant, quamvis nullum gravius malum habere videbantur. Qui vero tumores ad alteram partem vergentes habebant, hi unde verticula inclinata fuerant, isthic resolvebantur. Atque inde ad alteram partem distrahebantur. Erant autem hæc in facie maxime conspicua, & in ore, & intersepto iuxta gurgulionem. Sed & maxime interne pro ratione immutabantur. Ceterum resolutiones leviter sideratorum modo, non per totum corpus fiebant veluti ex aliis, sed etiam ad maxillam, ab anginosa affectione. Atque hi & maxilla expuebant, etque pauca, ac difficile. Quibus autem in rectum tumor tendebat, eundem expuebant. Quibus vero etiam cum febre, hi multo magis, & difficiliter spirabant, & aliena loquebantur, & vena hæc magis elevata. Et pedes omnibus quidem frigidissimi erant, maxime autem his. Et hi ad erecte standum impotentiores erant. Et quidam non statim moriebantur. Quos autem ego novi, omnes mortui sunt.

S E C T I O III

Consuetudo Temporis.

- 1 IN Perinthum cetera solstitium fere æstivum venimus, facta autem est hyems clementi celo, austrina. Ver, & æstas valde sine aquis usque ad pleiadum occensum. Nam si etiam quid aquæ decidisset, id erat velut minuta roris gutta. Et Etesia non valde spirant. Et qui spirant, divulse id fecerunt. Æstas febres ardentem populariter grassare sunt multa. Erant autem sine vomitu, & alvi turbatae ex tenuibus, aquosis, non biliosis, spumosis, multæ, quæ aliquando deposita etiam subsidentiam habebant, ex quibus sane etiam id, quod sub duo noctu exponebatur, simile erat. Aequales specie alvi fecerunt semper, malum. In his insuli soporosi erant, & mente mori, hi vero ex somnis tales fiebant. Quum autem fuscitati essent, omnia intelligebant. Spiritus sublimis, non tamen valde. Urinae tenues quidem plurimis, & pauca, alias autem non decolo-

detolores. Sanguinis eruptiones e naribus non fiebant nisi paucis, neque parotides juxta aures, de quibus postea scribam, neque splenes attollebantur, neque dextrum præcordium, neque dolorosum valde, neque fortiter intenteum erat. Erat tamen quid, quod judicationem faciebat. Et maxime judicabantur omnia plerumque circa decimam quartam diem, pauca cum sudore, pauca cum rigore, & valde paucis recidivæ fiebant. At vero sub montas velut rosis guttas, quæ in æstate fiebant, apparebat sudor. In febricitantibus etiam quidam sudores statim ab initio fiebant, non tamen maligno modo, & quibusdam sub hoc tempore etiam judicatio facta est cum sudore. Fiebant autem in febribus æstiva, circa septimam, octavam, & nonam diem, aspretudines in cute miliares, cuticum moribus maxime firmes, non valde pruriginosæ. Hæ perseverabant usque ad judicationem. Nulli equidem masculo tales eruptiones vidi. Mulier autem nulla mortua est, cui hæ fiebant. Et gravi auditu prædixæ, & soporose erant. Prius autem non valde soporose erant hæ, quibus illæ asfuturæ essent. Non tamen in totum durabant. Verum soporose, & somnolentæ erant per æstatem, & usque ad pleiadum occasum. Postea vero magis vigilæ aderant. Sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur. Alvum igitur per cibos sistere non dabatur, immo præter rationem putasse quis mederi conducere, etiam si minus multa quibuldam prodirent per hoc, quod in frigore quis jaceret strato supposito. Nam ulcerar quidem frigidum, calefacit autem ejusmodi species sensim progrediendo adhuc magis, etiam si nulla afflictio naturæ accedat, & in quibus, & qualia signa, & plura, aut pauciora sientia, oscitatio, tussis, sternutatio, distentio cum elestatione, eructatio, flatus, omnia talia corrumpunt. Quibus in febribus anxiosis, horridis, rubefcent facies, lassitudines, oculorum dolores, capitis gravitates, resolutiones leviter sideratorum modo, & menses si apparuerint, maxime quibus primum, sed & virginibus, & mulieribus, quibus per tempus, sed & quibus non, in quo solet tempore, aut velut oportet, apparent. Deinde pallidæ fiunt. Magnum autem in omnibus, id quod & consequenter fit, & in quo tempore, & in quibus. Valde biliosis, in febribus maxime, omnino quibusdam ad crura purgatio, Medicamentorum modos scimus, ex quibus qualia, & quæ fiunt. Non enim omnes similiter, sed alii aliter componuntur. Et alibi citius, aut serius in manuum tractationes assumuntur, velut est aut siccare, aut undere, aut coquere, & ejusmodi. Omisso plurima, quæ unicuique, & in quibus morbis, & quo tempore morbi, ætatem, speciem, victum, qualis hora anni, & quæ, & qualiter procedat, & hujusmodi. Zoilo juxta murum ex tussi matura, febris acuta, & faciei rubor, & alvus intercepta, præterquam ad necessitatem coactæ, lateris sinistri dolor, & auris e directo valde dolorosa, & caput non usque adeo. Spuens semper suppuratum ægrotabat. Sed alia judicata sunt, & juxta aurem pus multum erupit circa octavam, aut nonam diem. Principia vero noni diei ex dolore auris. Haud scio, quomodo sine rigore judicatio facta est. Sudavit caput valde. Et hic sudor firmus erat, quod quidem ardor etiam sinistri lateris esset. Superne una cum aure dolor sedatus, maxime circa scapulas. Sed & ante spura multa, ab initio florida rejecta, & circa septimam, aut octavam diem. Deinde laboriosa. Alvus resitit usque ad nonam, & decimam diem. Dolor extinctus est. Tumor remittebat, & sudores fiebant parvi, non autem judicabant. Manifesta autem erant hæc tum ex aliis, tum ex secessu. Nam incipiente auris dolore, etiam venter turbatus est. Erupit autem ex aure nona die, & judicatus est morbus decima quarta sine rigore eadem die. Sed & spurum largius ibat, & matutinus, postquam auris eripit. Sudores autem, & serpentina ulcuscula ad multum tempus in capite fiebant. Resiccata sunt tertia die. Quæcumque sine signo judicationis judicatorio disparent, male judicata sunt, velut erysipelas ancillæ Polemarchi. In glandularum tumoribus febres, malum, exceptis diarris. Et in febribus glandularum tumoribus, deteriores, qui in acutis ab initio vigorem remittunt. Spiritus, præcordiis elevatio mollis, & intentio neutra, in ipsis superne rotundum, in dextris velut circumferentia suppuratoria, aliud longius magis, aliud diffusum, aliud dorsum repens, & hinc atque hinc distentio usque ad umbilicum. In omni sursum versus e directo latrone, si revocatur, & in rotunditatem concludatur, quatenus quidem spiritus fuerit, citra judicationem calorem attenuatur. Si vero hunc effugerit, ad suppurationem procedit. Spiritus densi parvi, magni rari, parvi rari, extra magnus, intra parvus, alius quidem extendens, alius vero urgens, dupla intro revocatur, velut superinspirantibus, calidus, frigidus, Medella affluarum oscitationum spiratio longa. Non potantibus, & vix, spiratio brevis. E directo etiam laterum intentio dolorosa, & præcordiorum intensiones, & splenis elevationes, e naribus eruptiones. Quæ relinquuntur post judicationem, recidivas facere solent. Primum itaque lienis elevationes, si non ad articulos finierint, sanguinis e naribus eruptio fit, aut præcordii dextri intentio, si non so

penetraverint urinæ. Hæc enim est interceptio utrorumque, & recidiva horum merito sunt. Abcessus igitur horum facere oportet, si non fiant, eos vero, qui jam sunt, declinare. Eos autem excipere, si prodierint jam, & qualia oportet, & quæ paræ oportet. Qui vero non valde, eos coadjuvare. Eos vero
 85 avertere, si omnino incommodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt; sin minus, & jam veniunt. Quarta die sientes sanguinis e naribus eruptiones agere judicant. Febres, quæ una die intermittentes, altera superrigent, una cum judicatione ad septimum circuitum durant. Scopo ex mucosis, biliosis, & faucium inflammatione, malo visu ulvis suppressa est, & febris acuta facta, & lingua florida, & vigil sine somno. Pectus intentio fortiter, æqualiter, passatim ad infernam partem in dextris. Spiritus subdensus, præcordia dolebat, & respirans, & quum verteretur. Sine tussi vero excrebat suberassa. Pepsus ipsi datus, a præcordio quidem depulsi, transivit autem nihil. Post
 90 die glandes duæ appositæ non apparuerunt. Urina crassa, & turbata. Subdientia levis, & plana, & refertur alvus in turbulentia, venterque mollior erat. Et spiritus elevatus, & deorsum urgens factus est. Potu utebatur aceto melleo dulci, aut savorum eremore cocto. Decima sanguis ex sinistra nare agnosus paucius venit, non autem valde infirmus erat ob hoc ipsum, & urina subdientiam habens. In subdientia vero subalbus quiddam adherens vasi, renne, neque
 100 genituræ similes, neque dissimiles. Defluxit hoc brevi. Postridie judicatus est, a febre liber, & subit subviscosum undecima die. Hoc vero circa defluxum erat quid biliosum. Urinæ vero purgatio multa tum copia, tum subdientia, & priusquam vinum bibere inciperet, sere pituita similis. Penetravit autem undecima die, ut quæ non esset multa. Viscosa vero erant stercorea, & turbata. Huiusmodi autem judicatorio modo fiebat. Nam & Antigenis in Petasmo tale erat. Quæ circa linguas elevantur collectiones, & humiles calculi, & quæ podagricis sunt, circa debiles illorum articulos sunt. Nam osium natura caussa est, ut hæc & indurentur, & distendantur. Collectio Hippocrati uxori ex quarantina annis ad fastigium elevata est, quæ subfrigida palam esse
 105 videretur, impetus in totum corpus factus est, & sudor. Judicata est hoc modo, & postea menses plures copia, & tempore. Tunc enim suppressi fuerant. Abcessus non consistere visus est. In pulsantibus sanguinem fundentibus figura ampla, & in totum si ex omnino declivi acclive fiat. Quapropter etiam deligationes in venarum sectionibus impetum faciunt, fortes vero sanguinem impediunt. Sanguineum, & subbiliosum ructum acidum facit. Foras
 115 is autem ad atræ bilis morbum, his desinet. Rigores incipiunt mulieribus quidem magis a lumbis, per dorsum ad caput. Sed & viris posteriore corporis parte magis, quam anteflore, velut cubitis, semoribus. Sed & eutis rara. Indicat autem pilus aulmancium. Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis parvus virales sunt. Apparentia, in quibus menses sunt. Labores in circuitibus. Quicquid in sepeuaginta movetur, in triplicatibus perficitur. Post menses dextera, & sinistra hiant. Humiditas per prodeuntia requirit diartam siccissimam. Quod citius motum est, ac discretum, rursus augetur etiam tardius, & ad longius tempus. Labores circa
 125 quinquagesimum tertium diem, & circa centesimum sextum. Labores tertio, quinto, septimo, nono mense, & secundo, ac quarto. Quæ nolle oportet ad septimum mensem, aut a mensum fluxu numerandi sunt novem menses, aut a conceptione, & ad septuaginta, ac ducentos dies, græci menses sunt, & si quid amplius ultra hos est, & aut masculis, aut etiam foemellis hæc sunt, aut contraria. A cibis, & potibus humeri, ac mammae instantur, & impotentia, & inflationes in capite incrementa faciunt, donec ossa fuerint solida facta. Menstruorum purgationum circuitus est. Quæ ante has sunt gravitates, si
 130 menses sunt laboribus octimestribus. Primipararum hæc, alimento quidem transmutationem accipiente, octimestri vero perferente. Si in vulneribus fortibus tumor non appareat magnus, malum. Laxi bonum, fursum pascentes, pejus. Menstruæ purgationes, similes octimestribus, in tendentibus ad decimum mensem sientes, malum. Quibus tumores in ulceribus, non valde convelluntur, neque infaniant. His autem derepente dissipatis, quibus quidem ad posteriores partes, convulsionem cum doloribus, quibus autem ad anteriores, aut infanzie, aut dolores lateris acuti, & dysenteria rubra. Tumores præter rationem alle
 140 vantes, pravom, velut Andronici filio Erysipelas recurrit, si non ad eundem locum rediens, bonum quid significet. Hoc ex nativitate circa aurem, ad pubem distributum est. Alteri tertia ex nativitate die factum, suppuratum est nona. Hic septima die sanus evasit. Maligniora sunt, quæ derepente disparent.

S E C T I O I V.

De Venis.

Hepatitis in lumbis usque ad magnum verticulum, inferne etiam verticulis se ingerit, hinc sublevata per hepar, & per septum transversum ad cor, & quæ quidem recta est, ad clavículas, hinc alia quidem ad collum, alia vero ad scapulas, alia deorsum deflectentes, ad verticula, & costas declinant. Et ex sinistris quidem una prope clavículas. Ex dextris vero ad quemdam ipsarum locum. Alia vero utrinque deflexa. Alia paulo inferius deflexa, ubi quidem illa deficit, costis se ingerit, donec ad venam in ipsum eor accesserit, ad sinistras deflexa. Infra autem decurvata ad vertebrae descendit, donec perveniat, & inde incipit elevari, ingrens costis reliquis omnibus, hinc atque hinc singulis ramulos præbens, quum sit una, a corde quidem ad locum quemdam a sinistris magis procedens, Deinde infra arteriam, donec consumpta fuerit, & venerit eo, unde hepatitis sublevata est. Præquam autem eo venit, circa extremas duas costas divisa est, & partim ab hac, partim ab illa verticulorum parte progressa consumitur. Quæ vero recta a corde ad claviculam tendit, supra arteriam est, & ab hac, velut etiam juxta lumbos infra arteriam, ad hepar insilit, partim in portas, & pinnas, partim in reliquum deinceps procedit paulo infra septum transversam. Septum autem transversum adheret hepati, neque facile est ipsum separare. Duplices porro venæ a clavículis, alteræ hinc, alteræ isthinc, sub pectus ad pectinem procedunt, quo vero hinc, nondum scio. At septum transversum infra juxta verticulum, quod est infra costas, quæ rhene ex arteria ea parte conjungunt. Verum arteria ex ipso rhene oriuntur, hinc atque hinc ab arteria nervum habentes. Atque hac parte alicubi in recurrente a corde Hepatitis definit. Cæterum ab hepatitis per septum transversum maximæ duæ, altera hinc, altera isthinc, subliines feruntur, multitudineque per septum sunt, & circa ipsum consistunt in superna parte, atque hæc magis sunt conspicuæ. Duo vero nervi a cerebro sub os magni verticuli, ex supernis & ad gulam magis, ab utraque arteria parte descendunt, & uterque in se ipsum incidens, uni similis, ubi verticula, & septum sunt, ibi desinunt, & quidam ambigui, ex hac societate ad hepar, & splenem ipsos tendere putaverunt. Alius nervus ab utraque verticulorum parte juxta claviculam ad spinam procedit ex obliquo verticulorum, & ad costas distribuitur, & quemadmodum venæ, sic hæc septum ad mesenterium mihi tendere videntur. Ubi autem hæc deficiunt, rursus hinc, ubi septum exoritur, ab eo coherentes, ac continui existentes, juxta medium infra arteriam, deinceps ad verticula distribuuntur, quemadmodum venæ, donec ad sacrum os progressi consumuntur. In Aëno ac assiduo leguminum esu, scemina, & masculi, erum impotentes facti sunt, ac vitam degerunt. Sed & his, quiervo velcuntur, genua dolent. Diligentia adhibenda est, ut excandescencia indicatur, & coloris reparandi, & sanguinis in vasa subter cuticulam colligendi gratia, itemque læticia, & timor, & hujusmodi, & si quidem reliquum corpus simul ægotaret, simul curare, fin minus, satis est. Stymargi famula Idumæa erat, quæ ubi filiam peperisset, cooversum est ei utri osculum, & dolor ad coxam, & erus. Juxta malleolum secta vena, liberata est, & quidem quum etiam tremores totum corpus detinerent. Verum ad causam devenire oportet, & ad causæ principium.

S E C T I O V.

Natura Indisiorum Nati.

Quicumque fulvi, naso acuto, oculis parvis, mali. Quicumque fulvi, simi, oculis magnis, boni. Hydropici tivos oculos habent, & calvi sunt. Vocis gracilitatem fulvit varix ad sinistrum, & dextrum testem, absque horum altero fieri non potest, ut solvatur. Magni, calvi, balbi, gracili voce præditi, boni. Morbos autem habent, balbus, aut calvus, aut gracili voce præditus, aut hirsutus, fortiter atrobilarios. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt potentes, eos necesse est, dum illa solvantur, suppuratos fieri. Dolorem in locis infernis fortem surditas solvit, itemque sanguis multus ex naribus erumpens. Insauius magni morbi ex morte fientis solutio. Si puerperis convulsio fiat, febrem excitato, & cerato multo tepido in vesicam immisso, ac per clysterem infuso colluito. Si capitis os contrafactum fuerit, lac, & vinum, ammixta aque pari mensura, bibenda dato. Si vero ulcus fuerit, internas venas secato, si non febricitet. Si autem desipiat, caput irrigato, si non præcordia fuerint elevata. Si caput doluerit, ad pectus descendit, deinde ad præcordia, postea ad coxam. Omnia vero ut

- 15 ro ut doleant, fieri non potest. Ventositatem flatuosam venæ sectione, fluxione pharmaco illito sistito. Fluxus enim ex venâ magna est. Si vero sua sponte multum fluat, ieiunet, aut aquæ partes duas, lactis quatuor bibat. Infundendas somentis, ac medicamentis curato. Quicumque de repente voce destituerit, si sine febre fuerint, ipsis venam secato. Pinxit fluxiones ex mammis trahunt oculi, & eructant per nates ad pulmonem. Quibus tussis sicca est, his non solvitur, nisi dolor fortis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat. Si hydropicum tussis corripiat, si quidem statim animo linquat, calidis omnibus utatur; sin minus, inebriato, ac cibis ipsum impleto. Venas autem intestinas secaro, dum morbus magnus in intentione est. Solutio coxtarum doloris, oculorum distortiones, cæcitas, testium tumoris, mammarum elevatio.
- 25 Si febre tenente, partes circa faciem graciles fuerint, in die impari, sequenti die solvetur. Hydropicus si tumorem in cruribus habens, tussiat, malum. Si auris doleat, lacte utatur. Si non in die impari febris dimittat, recidivare necesse est. Cui vena in cubito pulsarit, insanus, & iracundus est, cui vero quiescit, stupidus. Vultus si sanguinem fundat, ulcus ne madefacito, verum caput calida tigato. Si os ventriculi doleat, panem calidum cum vino merato exhibito. Vomitus solutio: aquam calidam bibendam dato, & vomat. Quicumque corrupta torpescunt, evulsa vena ulcerato, ac sanato. In convulsione digitum manus circa febre, venam secaro, si non caput doleat, sin minus, a-
- 35 quam calidam affundito. Ad oculos. Spodii partem duodecimam, croci quintam, nuclei olivæ unam, cerusæ unam, myrrhæ unam. Aquam frigidam super caput fundito, & alia cum maza edenda dato. Varices calvotum, si non magni fuerint, furiosi sunt. Ad vitiliginem, & lepram. Calcem in aqua adhibito, ut ne exulescentes. Secundarum purgatio, si non discedant. Sternutatorium ad nares apponito, ut sternutet, & sternutantis nares, ac os apprehendo.
- 40

S E C T I O VI

Natura Indiciorum Notia.

- 1 **C**Aput magnum, oculi parvi, balbi, iracundi sunt. Qui longæ vitæ sunt, plures dentes habent. Balbi, celeri lingua præditi, atræ bilis humori obnoxii, biliosique sunt, oculis non nictantes, iracundi. Magnum caput, oculi nigri, & magni, nasum crassum, & sinum habentes, boni. Oculi rari magni, caput magnum, cervix tenuis, pectora angusta, congrue adaptati hominis sunt. Caput parvum habens, neque balbus esse poterit, neque calvus, nisi fuerit glaucus. In convulsionibus si vox in die impari solvitur, a magno morbo liberat. Puerperæ febricitant, & dolent aquam affundito, & prisanam crassam ter in die calidam dato. Puer nutritur septimo mense, aut nono, aut decimo, & voce firmatur.
- 10 **E**t robustus sequitur, & manibus validus fit: dum vox solvitur, omnia solvuntur. Solutio enim similis est voci. Solvitur autem in die impari. Si venæ pulsaverint in manibus, & facies sana, ac robusta fuerit, & præcordia non fuerint mollia, diuturnus fit morbus, qui sine convulsione non solvitur, aut sanguinis multi ex naribus eruptione, aut dolore ad coxas. In gutturis dolore aquam calidam super caput fundito, si non frigus fuerit, sin minus, farinam quamcalidissimam dato, & vinum meracum. In turbatione ventris fabas coctas dato, si non superne partes abunde fuerint biliosæ. Aut cumini cum sabis edendum dato. At interceptio morbi fieri non poterit, nisi in die impari. Neque principium fieri poterit, nisi in die pari, itemque mense, ac anno pari. Nitrum autem Ægyptium, & coriandrum, ac cuminum cum oleo terito, & ventri illinito. Qui moriuntur, eos necesse est die impari, & mense impari, & anno impari mori. Bonum autem fuerit prædicte mortem, aut dolores sortes. Quorum oculi robusti non sunt, his mors brevi imminet. Si vero in impari anno fiat, ab utrisque impates fieri necesse est. Si autem in anno pari, & die pari, necessarium est in impari die mori. Ex numero rerum sortissima est. Anginam, & lippitudinem venæ sectio. Vulnerato intestino, respiratio prodit inferne inconspicua juxta vultus, & evacuantur pectora. Dato igitur lac, & vinum, pari aquæ mensura amixta. Quorum pectora bilem generant, balbi, furiosi, & calvi sunt. Quicumque horum ex nativitate etiam strabones, hi imprudentes sunt, aut calculosi, aut infantes. Quibus autem non, alterius mali solutio fit. Circa naturam plurimam vix habet mamma dextra, oculi dexter, & quæ infra sunt hac parte. Nam & masculi dextris inhaerent. Mulieribus menses ut sistas, cunctatam maximam ad mammam affigas. Trimestris puer omnia præ se fert, & lac tunc habet. Si multum fluat lac, necesse est satum debilem esse. Si solidiores fuerint mammae, sanior est fetus.
- 35 **V**ena crassa est in utraque mamma, quapropter maximam habent prudentiæ partem. Utinæ stillidum solvit venæ sectio. Si superi loci turgent, qui sunt circa caput, ulcerum purgatio, vomitus, hydrops. A veneris turbatione, aut

ne, aut a tussi, si careat fiat, os amarefcit. Dato autem elaterium bibendum bis, aut ter, si non balbus fuerit. Deligare vero oportet florem aris ultium, donec fulvus evaserit, & spongiam, si non balbus fuerit. In anxietate, horrore, oscitatione dato vinum, pari aquæ mensura ammixta, & lac. Ad aures dolorem cuedrbitam affligit. Quicquid supernarum partium doluerit, dolor ad coxas, aut ad genua, & anhelatio fiens, omnia hæc solvit. In volvulo molli frigidum vinum multum meracum pro ratione dato, donec somnus, aut crurum dolor fiat. Solvit autem & febris, & dysenteria circa dolorem. Si præcordia diftenta fuerint, manu comprimito, ac lavato. Ad paronychieum unguium abfcessum, galla nigra cum melle. Aqua secedente, lactis heminas octo bibendas dato. Si vero vomat, & non bibat, allii, aut ceparum intritum dato. Ut mulier in utero concipiat, polypos parvos super flamma calidissima afflato, & fere semiambulos, edendos dato. Et nitrum Egyptianum tritum, coriandrumque, ac cuminum in pastillos efformato, in pudendumque subdito. Si ex crapula caput doleat, vini meraci heminam bibat. Si vero aliter caput doleat, panem quamealidissimum cum vino meraco edat. Si hominem calor corripit non a bile, neque a pituita, sed aut a lassitudine, aut alias febricit, aquam multam calefacto, deinde ea supersufusa caput rigato, donec pedes sudarint, & farinam erassissimam coquito. Postquam autem pedes sudarint, farinam plurimam, & calidissimam edens, ac vitium meracum insuper bibens, vestimentis contextus facile quiescat. Aut narcissi duo, aut tria capita in cœna edat. Qui infania corripitur, ei hoc signum præfigit, fungus colligitur ipsi ad mammas.

HIPPOCRATIS COI DE MORBIS POPULARIBUS. LIBER III.

Argumentum in Librum sequentem,

Sectionis prima Egrorum primus. Tremor manuum ante febrem acutam. II. Febris vehementi post lumborum, & capitis dolorem, III. Febris ex capitis gravitate, & temporis dextri dolore.

Sectionis secunda Egrorum IV. Febris ex diuturno capitis dolore, V. Febris ex potu, VI. Febris sine siti perpetua, VII. Anginosa, VIII. Febris ex lassitudinibus, laboribus, & cussibus insolis. IX. Volvulosa multæ præcedentia, & vomitus multi. X. Febris ex abortu infantis. XI. Febris ex abortu circa quintum mensem. XII. Febris a partu masculi.

Sectionis tertia, Constitutio temporis pestilens, Ignis

factus, Febris ardentium constitutio, Viri parum illa temporis constitutione malitia. Egrorum sedecim, Primus, Febris acuta ab initio continua, II. Febris acuta a filie partu. III. Febris acuta ex laboribus, lassitudinibus, & neglecta villis ratione, IV. Phreneticus. V. Febris acuta græci ex dolore dextri femoris, VI. Sublensans, & capite gravatus. VII. Alia febris ardens. VIII. Febris acuta cum lateris dolore assidu. IX. Febris ardens acuta post capitis dolorem. X. Febris ex venere, & potu, XI. Febricula tenuis ex marore, XII. Febris ardens acuta. XIII. Erethe titubans, XIV. Febris horrida acuta post gemellarum partum, & medicam purgationem. XV. Febris horrida ex marore, XVI. Aduvus ex potationibus, & venere.

S E C T I O I.

Egrorum I.



PYTHION, qui habitabat juxta telluris templum, Corpis tremor a manibus prima die, febris acuta, delirium. Secunda omnia exacerbat sunt. Tertia eadem. Quarta ab alvo paucâ, mæra, biliosa prodierunt. Quinta omnia exacerbat sunt, tremores perseverabant, somni tenues, alvus restitit. Sexta spūta varia, subrubra, Septima os distractum est. Octava omnia exacerbat sunt. Tremores perseverabant. Urinæ ab initio quidem, & usque ad octavam tenues, decolores, in medio pendens nubilosum quiddam habebant. Decima sudavit. Sputa aliquantulum mæra, judicatus est, & urinæ subtenues circa judicationem. Post judicationem vero, quadraginta diebus postea suppuratione circa sedem, & abfcessus factus est cum urinæ stillicidio, P. M. V. Q. S. hoc est, probabile multitudinem urinæ quadragesima sanatum,

Egrorum

Ægrotus II,

Hermocratem, qui ad novum murum decumbebat, febris vehementis corripuit. Cœpit autem dolere caput, lumbos. Præcordii distentio nulliter.
 15 Lingua ab initio adusta est. Surditas statim, somni non aderant. Sticculosus non valde. Urinæ crassæ rubræ, depositæ non subsidebant. Ab alvo vero non pauca combusta prodiebant. Quinta minxit urinas tenues, habebant quid in medio pendens, non subsidebant. Ad noctem mente motus est. Sexta morbo regio correptus est, omnia exacerbata sunt, non resipiscebat. Septima molesta fuit. Urinæ tenues similes, similiter etiam sequentibus diebus. Circa undecimam omnia visa sunt allevata esse. Sopor cœpit. Urinæ crassæ subrubræ, infra tenues, non subsidebant. Placide resipiscebat. Decima quarta a febre liber, non sudavit, dormivit, intelligebat omnia, Urinæ consimiles. Circa decimam septimam rediit, calefactus est, sequentibus diebus febris acuta.
 20 Urinæ tenues. Rursus autem vigesima die iudicatus est, a febre liber, non sudavit. Cibum fastidiebat per totum tempus, resipiscebat, loqui non poterat, lingua arida, non stitabat, dormiebat soporosus. Circa vigesimam quartam calefactus est, alvus lubrica multis tenuibus fluxus, & sequentibus diebus febris acuta, lingua combusta est. Septima & vigesima mortuus est. Huic furor peripetuo perseverabat, Urinæ crassæ, & rubræ non subsidentes. Aut tenues decolores, & in medio quid pendens habentes, gustare autem non poterat.
 30 P. S. S. V. S. M. hoc est, probabile fecibus suppressis vigesima septima motum.

Ægrotus III,

Qui in Dealeis horto decumbebat, capitis gravitatem, & tempus dextram dolorosum habebat multo tempore. Cum occasione vero, febris corripuit, decubuit. Secunda die ex sinistra, nare modicus merus sanguis fluxit. Ab alvo stercore probe prodierunt. Urinæ tenues, variae, in medio pendens quiddam habentes minutim dispersum, velut farinæ crassiores, & geniturae similes. Tertia febris acuta, Secessus nigri, tenues, spumosi, subsidentia secessibus livida, somno graviore aliquantulum premebatur, moleste surgebat. Urinis subsidentia livida, subviscosa. Quarta vomuit biliosa, flava, pauca, paulo post ærginosa. De sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Secessus similes. Urinæ similes, sudavit circa caput, & elaviculari, splen elevatus est, femoris dolor directo. Præcordii dextri distentio subnulla, nocte non dormivit, parum mente
 45 motus est. Quinta secessus plures, nigri, spumosi, subsidentia secessibus nigra, nocte non dormivit, mente motus est. Sexta die secessus nigri, pingues, viscosi, graveolentes, dormivit, intelligebat magis. Septima lingua sicca, sticculosus, non dormivit, mente motus est. Urinæ tenues, non boni coloris. Octava secessus nigri, pauci, compacti, dormivit, intelligebat, sticculosus non valde. Nona rigit,
 50 febris acuta, sudavit, frigiditas, mente motus est, dextro oculo distortus est, lingua arida, sticculosus, infomnis. Decima circa eadem. Undecima intelligebat per totum omnia, a febre liber, sudavit, urinæ tenues circa iudicationem. Duobus diebus a febre liber fuit, decimaquarta rediit. Statim autem nocte non dormivit, penitus mente motus est. Decima quinta urina turbata, qualis ex his, quæ subsiderunt, fit, quam fuerint agitata, febris acuta, penitus mente motus est, non dormivit, genas & tibias dolorosa habebat, ab alvo, subdita glande, stercore nigra prodierunt. Decima sexta urinæ tenues, habebant quid in medio vehens, nubilosum, mente motus est. Decima septima mane extremitates frigidae, contegebantur, febris acuta, sudavit per totum, allevatus est, intelligebat magis, non
 60 a febre liber, sticculosus. Vomuit biliosa, flava, pauca. Ab alvo stercore prodierunt paulo post nigra, pauca, tenuia. Urinæ tenues, non boni coloris. Decima octava non resipiscebat, soporosus. Decimanona per eadem. Vigesima dormivit, omnia intelligebat, sudavit, a febre liber, non stitabat. Vigesima prima parum mente motus est, paululum stitabat, præcordii dolor, & circa umbilicum palpitatio perpetua. Vigesimaquarta urinis subsidentia, intelligebat omnia. Vigesima septima coræ dextra dolor. Urinæ tenues, & subsidentiam habebant, in reliquis commodissime habebat. Circa vigesimam nonam oculi dextri dolor. Urinæ tenues. Quadragesima egressit pisuosa, alba, aliquanto plura, multum sudavit per totum, perfecte iudicatus est.

S E C T I O II.

Egratus IV.

IN Thaso Philistes caput multo tempore dolebat, & quandoque etiam aliquan-
to graviore somno pressus decubuit. Quum autem ex potationibus febres
continue oborta essent, dolor exacerbatu est. Nocte excalefactus est primum.
Prima die vomuit biliosa, pauca, flava primum, postea vero plus æruginosa. Ab
alvo autem stercora prodibant, noctem habuit molestant, Secunda die surditas, 5
febris acuta, præcordium dextrum distentum est, declinavit ad internas partes.
Urinæ tenues, pellucidæ, habebant quiddam in medio pendens genituræ simi-
le. Parum insanivit circa meridiem. Tertiam diem molestant habuit, Quarta con-
vulsiones, exacerbata sunt omnia. Quinta mane mortuus est.

Egratus V.

Chætionem, qui decumbebat apud Demanetum, ex potu febris corripuit. Sta- 10
tius autem capitis gravitas dolorosa, non dormivit, alvus turbata ex tenuibus
biliosis. Tertia die febris acuta, capitis tremit, maxime autem labii inferi, paulo
post rigor, convulsiones, penitus mente motus est, Noctem moleste tulit.
Quarta per quietem, parum dormivit, parum deliravit. Quinta laboriose omnia
exacerbata sunt, delirium, noctem moleste tulit, non dormivit. Sexta per eadem. 15
Septima superriguit, febris acuta, sudavit per totum, judicatus est. Huic perpe-
tuo ab alvo secessus biliosis, pauci, meri. Urinæ tenues boni coloris, in me-
dio nubilosum quiddam pendens habentes. Circa octavam minxit urinas me-
lioris coloris, habentes subsidentiam albam, paucas, resipiscebat, febris inter-
misit, Noxæ redijt. Circa decimam quartam febris acuta, sudavit. Decima se- 20
xta vomuit biliosa, flava, satis multa. Decima septima superriguit, febris acuta,
sudavit, a febre liber, judicatus est. Urinæ post recidivam, & judicationem, me-
lioris coloris, subsidentiam habentes. Neque mente motus est in recidiva. Decima
octava parum calecebat, insuper sitiebat. Urinæ tenues, quod in medio pende-
bat, nubilosum erat, parum mente motus est. Circa decimam nonam a febre liber, 25
collum dolorosum habebat. Urinis subsidentia, perfecte judicatus est vigesi-
ma, P. M. B. V. V. S. hoc est, probabile multitudinis biliosarum urinarum vi-
gesima sanarum.

Egratus VI.

Euryanactis filiam virginem febris corripuit. Erat autem sine siti perpetuo,
nihil ad gustandum admittebat. Ab alvo pauca prodibant. Urinæ tenues, 30
paucæ, non boni coloris. Incipiente autem febre circa sedem dolebat. Sexta die
a febre libera, non sudavit, judicata est. Quod vero circa sedem erat, parum sup-
puratum est, erupit una cum judicatione. Post judicationem septima die ri-
guet, parum incaluit, sudavit. Post judicationem octava die, riguit non multum.
Postea vero extremitates frigida semper. Circa decimam post factum sudorem, 35
mente mota est, & rursus brevi resipiscebat. Dicebant autem ex gustato botro
ipsam hæc pari. Die vero una intermissa, rursus duodecima multum delirabat,
alvus turbata est ex biliosis, paucis, meris, tenuibus, mordacibus, frequenter sur-
gebat. Die septima ab ea, qua mente mota fuit, motua est. Hæc incipiente mo-
to fauces dolebat, & perpetuo ruborem habebat, & gurgulis revulsus, fluxio- 40
nes multæ, parvæ, tenues, aeres. Tussiebat, manuum nihil educebat, Omnes
eos per totum tempus fastidiebat, neque ullum aliquem appetivit, sine siti erat,
neque quicquam memorabile bibi. Tacens nihil loquebatur, Tristitia desperata
rursus corripiebat. Erat autem & iniqua quedam tabes.

Egratus VII.

Anginosa illa, quæ apud Britonem erat, primum a lingua coepit. Vox non 45
clara, lingua rubra fescata fuit. Prima die horrida, incaluit. Tertia rigor,
febris acuta, tumor subituber, durus colli, & pectoris ex utraque parte, extremitates
frigida, livide, Spiritus sublimis, potus per nares fundebatur, deglutire non
poterat, alvi secessus, & urinæ suppressa erant. Quarta omnia exacerbata sunt.
Mortua est anginosa. P. S. S. Q. M. hoc est, probabile secessus suppressi quin- 50
ta mortuam.

Aegrotus VIIA

Adolescentem, qui decumbebat in mendacium foro, febris corripuit ex lassitudinibus, & laboribus, ac cursibus insolis. Prima die alvus turbata ex biliosis, tenuibus, multis. Urinae tenues subnigrae; non dormivit, siticulosus. Secunda omnia exacerbata sunt. Secessus plures, intempestiviores, non dormivit. Mens turbata, parum sudavit. Tertia moleste habuit, lusciculosus, anxius, multa jactatio, desperatio, inerte motus est. Extremitates lividae, ac frigidae, praecordii intensio submollis utrinque. Quarta non dormivit. Malum in pectus procedebat. Septima mortuus est. Aetate circa vigesimum annum erat. P. N. S. M. hoc est, probabile novationibus septima mortuum.

Aegrotus IX.

Quae apud Tisamenum decumbebat mulier, ei voluolosa moleste procedebant. Vomitus multi, potum continere non poterat. Dolores circa praecordia. Et in infernis partibus juxta ventrem dolores, tormina continua, non siticulosa, incalecebat. Extremitates frigidae perpetuo, anxia, insomnis. Urinae paucae, tenues, secessus crudi, tenues, pauci, prodelle non amplius quicquam poterat. Mortua est.

Aegrotus X.

Mulierem ex his, quae apud Pantimedem degebant, ex abortu infantis prima die febris corripuit. Lingua arida, siticulosa, anxia, insomnis. Alvus turbata ex tenuibus, multis, crudis. Secunda die superpiguit, febris acuta, ab alvo prodire multa, non dormivit. Tertia die dolores majores. Quarta mente mota est. Septima mortua est. Alvus semper lubrica, ex secessibus multis, tenuibus, crudis. Urinae paucae, tenues, febris ardens.

Aegrotus XI.

Alteram ex abortu circa quintum mensem febris corripuit. Ab initio soporosa erat, & rursus insomnis, lumborum dolor, capitis gravitas. Secunda alvus turbata est paucis, tenuibus, meracis primum. Tertia plura, deteriora, nocte non dormivit. Quarta mente mota est. Timores, tristitiae, dexter oculus distortus est, sudavit circa caput sudorem modicum, frigidum, extremitates frigidae. Quinta omnia exacerbata sunt, multum delirabat, & rursus brevi resipiscebat. Sitis, insomnis. Ab alvo multa, intempestiva, perpetuo prodibant. Urinae paucae, tenues, subnigrae. Extremitates frigidae, sublividae. Sexta per eadem. Septima mortua est phrenitide.

Aegrotus XII.

Mulierem, quae decumbebat in mendacium foro, primum tunc enixam dolores maleculum, febris corripuit. Statim ab initio siticulosa, anxia, cor dolebat, lingua arida, venter turbatus est tenuibus, paucis, non dormivit. Secunda die parum riguit, febris acuta, parum circa caput sudavit frigidum. Tertia laboriose ab alvo cruda, tenuia, multa prodierunt. Quarta riguit. Omnia exacerbata sunt. Insomnis. Quintam laboriose tulit. Sexta per eadem. Ab alvo vero prodierunt liquida, multa. Septima riguit, febris acuta, sitis multa, jactatio. Circa vespere frigidum sudorem per totum sudavit, frigiditas, extremitates frigidae non amplius recalescebant, & rursus ad noctem riguit. Extremae partes non recalescebant, non dormivit, parum mente mota est, & rursus brevi resipuit. Octava circa meridiem recalescens est. Siticulosa, soporosa, fastidiosa, ac nauseabunda. Vomuit biliosa, paucis, sublava. Noctem moleste tulit, non dormivit. Urinam minxerunt multam acervatam inscia. Nona remiserunt omnia, soporosa. Ad vespere parum riguit. Vomuit pauca, biliosa. Decima rigor, febris exacerbata est, nihil dormivit. Mane multam urinam subfidenciam habentem minxit, extremitates recalescens sunt. Undecima vomuit virosa, biliosa. Non ita longe postea superpiguit, & rursus extremitates frigidae. Ad vespere sudor, rigor. Vomuit multum, noctem laboriose transiit. Duodecima vomuit multa, nigra, graveolentia, singulus circa meridiem voce destituta. Decimaquarta sanguis per nares. Mortua est. Huic perpetuo alvus lubrica, horrida, Aetas circa annum decimumseptimum.

S E C T I O I I I

Constitutio Temporis Pessilens.

Annus austrius, pluvius. Venti perpetuo quiescentes. Quam squallores fuissent superioribus temporibus ad annum, in austriis circa arcturum aquae multa. Autumnus umbrosus, nubilus, aquarum copia. Hyems austrius, humida, mollis. Post solstitium longe postea, prope aequinoctium serae hyemes. Et iam circa aequinoctium aquilonares venti nivosi non multo tempore. Ver rursus austrius, sine ventis. Aquae multae perpetuo usque ad canem. Aestas serena, calida, aestus magni. Etesiae parum dispersum spirant. Rursus circa arcturum in aquilonaribus aquae multae. Quam autem esset annus austrius, humidus, & mollis, per hyemem quidem sani debebant, exceptis tabidis, de quibus scribetur. Ante ver autem simul cum sentibus frigoribus, sacri ignes multi, quibusdam cum occasione, quibusdam non, atque hi maligni multos peremerunt. Multi fauces doluerunt. Voces vitatae, febres ardentes, phrenitici, ora ulcere fervido affecta, in pudendis tubercula. Lippitudines. Carbunculi. Alvi turbatae. Ciborum fastidia. Aliqui siticulosi, aliqui non. Urinae turbatae, multae, male. Diu soporosi, & rursus insomnes. Multae iudicationes penitus interceperat. Quaedam aegre sentientes. Hydropses, tabidi multi. Atque hi quidem erant populares morbi. In singulis autem relatis speciebus agroti, & moriebantur multum. Acciderunt autem singulis horum hoc modo. Multis equidem ignis sacer cum occasione, ex vulgaribus, & valde parvis vulnusculis, in toto corpore, maxime sexagenariis, circa caput, si vel parum neglecta essent. Multis vero etiam in ipsa curatione inflammationes magnae fiebant, & sacer ignis multus, brevi, undique deposcebatur. Plurimis igitur ipsorum abscessus ad suppurationes contigerunt, carni, & nervorum, ac ossium elapsus magni. Erat autem & fluxio collecta non puri similis. Sed alia quaedam putredo, & fluxio multa, ac varia. Quibus igitur circa caput horum quid fieri contigit, his glabries totius capitis, ac menti fiebat, & ossium denudationes, ac elapsus, & multae fluxiones, & haec in febris, & sine febris. Erant autem haec horrenda magis, quam mala. Quibus enim ad suppurationem talium maturatio pervenit, horum plerique servabantur. Quibus vero inflammatio quidem, & ignis sacer discessit, talem autem nullum abscessum fecit, horum multi perierunt. Similiter autem & si alibi in alia corporis parte horum quid oberaret, haec acciderunt. Multis enim brachium, & totus cubitus defluxit. Quibusdam vero haec assigebant laetera, aut anteriorem, aut posteriorem aliquam partem. Quibusdam autem totum semur, vel tibiam denudabant, & totus pes. Erat autem ex talibus omnium gravissimum, ubi circa pubem, & pudenda accidisset, & circa ulcera quidem, & cum occasione, huiusmodi erant. Multis autem in febris, & ante febrem, & ex febris ignes sacri inciderunt, & qui quidem horum abscessum fecissent per suppurationem, aut per alvum turbato quadam rempessiva, aut urinarum bonarum excretio contigisset, per haec solvebantur. Quibus autem nihil horum accidisset, verum obscure disparuisset, hi lethales erant. Plerumque igitur plurimis accidit sacer ignis vere, consequebantur autem & per aestatem, & sub autumnum. Multa vero turbatio quibusdam, & circa fauces tubercula, & linguae inflammationes, & abscessus circa dentes. Vocesque multis significationem de se praebant, quod essent vitatae, ac impedatae, & involutae. primum quidem, tabidis incipientibus, immo etiam ardenti febre correptis, & phreniticis. Ceperunt igitur febres ardentes ante ver, itemque phrenitis, post facta frigora, & plurimi tunc agrotant. Acuta vero, & lethalia symptomata his aderant, Erat autem constitutio febrium ardentium hoc modo. Ab initio soporosi, anxii, horridi, febris acuta, non valde siticulosi, non deliri. De naribus parum stillavit. Exacerbationes plerisque diebus paribus. Circa exacerbationes oblivio, exolutio, & vocis privatio. Extremitates manuum, ac pedum semper his frigidiores, praesertim circa exacerbationes, & rursus tarde, ac non bene recalescebant, rursusque & intelligebant, & loquebantur. Detinebat etiam ipsos sopor continens, non somniculosus. Aut vigilae cum doloribus, plurimis horum alvi turbulenta, secessibus crudis, renuibus, multis. Urinae multae, tenues, nihil neque iudicatorii, neque boni habentes. Nec vero aliud aliquod iudicatorium ita habentibus fiebat. Neque enim sanguis bene erumpebat, neque alius aliquis abscessus iudicatorius fiebat. Moriebanturque unusquisque, prout contigit erroneo modo, plerumque circa iudicationes. Quidam vero diu voce privati. Multi sudantes, & his quidem, qui perniciose habebant, haec accidebant. Confusilia vero etiam phreniticis. Sine igitur autem hi erant. Neque quisquam phreniticus insanivit, velut ex aliis, sed alia quadam mala, ac lenta in somnum delatione graviter peribant. Erant insuper etiam aliae febres, de quibus scribetur. Ora multis ulcere fervido affecta, ulcero.

- ulcerosa. Fluxiones circa pudenda multæ, ulcerationes. Tubercula foris, in-
 65 tus, circa inguina. Lippitudine humida, longa, diuturna, cum doloribus.
 Eruptiones palpebrarum foris, intus, multorum oculis corruptentes, quas
 flicus vocant. Erumpebant etiam in aliis ulceribus multa, & in pudendis.
 Carbunculi per æstatem multi, & alii, quæ seps vocantur, pustula magnæ.
 Herpetes multis magni. At vero circa alvum multis multa, & nociva accide-
 70 rent. Primum quidem tenesmi multis dolorose, plurimis autem pueris, & om-
 nibus, qui erant ante pubertatem, & plurimi horum peribant. Lienterici
 multi, dysenterici, neque hi valde dolorose. Secessus autem biliosi, & pingues,
 & tenues, & aquosi. Et multis quidem ipse morbus ad hoc decubuit, & sine fe-
 75 bribus, & in febribus, cum doloribus, tormina, & volvuli maligni, multoties,
 quæ in corpore erant, & suppressa erant exitus, & exeuntia progressa dolores non
 solventia, & his, quæ offerebantur, difficulter cedentia. Nam purgationes plu-
 rimos amplius lædebant. Ex his autem, qui sic habebant, multi quidem cito
 peribant. Multi vero longius vitam debebant, & in summa omnes, & qui
 80 longis morbis agrotabant, & qui ex acutus, maxime ex his, quæ per alvum se-
 cedebant, mortui sunt. Omnes enim alvus sustulit. Cibum autem fastidiebant om-
 nes ob cunctos præscriptos morbos, in quos sane ego incidi. Multi vero, &
 maxime hi ipsi, & qui tales erant, sed & alii, perniciose habebant, & sticu-
 85 losi alii erant, alii non. Ex his, qui febribus, aliisque laborabant, nullus sticu-
 losus intempestive. Sed licebat circa potum victus rationem constituere, prout vel-
 les. Urinæ autem prodeutes multæ quidem erant, non pro potus ingesti ratio-
 ne, sed multum excedentes. Verum multa quædam malicia urinam ejectarum
 erat. Neque enim crassitudinem, neque concoctiones, neque purgationes bonas
 habebant. Nam in multis morbis purgationes per vesicam sicutæ, bonæ
 sunt. Significabant autem plurimis colliquationem, & turbationem, & dolo-
 90 rem, & nullam iudicationem. Soporosi vero maxime phrenetici, & febre arden-
 te laborantes erant. Sed & in aliis morbis omnibus maximus, qui cum febre fie-
 bant. In totum autem plurimos aut gravis sopor comigabatur, aut parvos, ac
 tenues somnos habebant. Multa præterea alia febrium genera populariter grassa-
 95 ta sunt, tertianarum, quartanarum, nocturnarum, continuarum, longarum,
 æronearum, anxiarum, inconstantium. Omnes autem hæc cum multa turbatione
 fiebant. Nam alii plurimis turbatæ, horrores, sudores non iudicatorii, & uri-
 næ velut præscriptum est. Atque hæc plerisque horum longa erant. Neque enim ab-
 cessus his sicutæ iudicabant, velut in aliis. Et omnia quidem omnibus difficul-
 100 ter iudicabantur, & nullæ iudicationes fiebant, & diuturnæ, maxime vero his;
 paucis autem horum iudicatio circa octogesimum diem fiebat. Plurimis, prout
 contigit, defecerunt. Moriebantur autem horum pauci ex hydropere erecte obam-
 bulantes. Multos vero etiam in aliis morbis tumores infestabant, maxime vero
 105 tabidos. Maxima autem, & gravissima erat tabes, & plures occidit. Nam
 multi per hyemem incipientes, partim decumbebant, partim erecte obambula-
 bant. Ante ver autem plerique ex decumbentibus moriebantur. Aliorum vero tus-
 ses nihil defecerunt. Verum æstate remiserunt. At sub autumnum omnes decubue-
 runt, & multi mortui sunt, plurimi vero horum diu agrotaverunt. Cœpit igitur
 plurimis horum decedente ex his afflictio, frequentes horrores erant, sæpe
 110 febres continuæ, acutæ, sudores intempestivi, multi, frigidi perpetui. Multa
 frigiditas, & vix rursus recalescebant. Alii varie adstrictæ, & rursus brevi hu-
 miscentes. Ex quæ circa pulmonem erant omnia, infra distribuebantur. Multi-
 tudo urinarum non bonarum, colliquationes malæ. Tussis autem aderant qui-
 115 dem perpetuo multæ, & multa educentes matura, ac liquida, non autem val-
 de cum doloribus. Sed etsi aliquantulum dolerent, valde tamen leniter omnibus put-
 gatio a pulmone fiebat, fauces non valde mordaces, neque fælugines quicquam
 infestabant. Viscosa tamen, & alba, & liquida, ac spumosa multa de capite de-
 scendebant. Magnum autem malum, & hos, & alios comitabatur ciborum fastidium,
 velut præscriptum est. Nam neque potum cum cibo libentes sumebant, sed valde si-
 120 pe si degebant. Gravitas corporis. Soporosi, plurimis ipsorum tumor, & ad
 hydropem deveniebant. Horridi, deliri circa mortem. Forma tabidorum erat
 levis, subalbida, lentis colorem referens, subnubra, rava, pituita alba repleti. Sca-
 pulas alarum modo eminentes habentes, & mulieres sic. Atque bilis item forma,
 & sublinguina, febres ardentes, & phrenitides, ac dysenterie hos tentabant.
 Tenesmi juvenibus pituitosis, longa alvi profluvia, acresque secessus, & pingues,
 125 biliosus. Erat autem omnibus præscriptis gravissimum quidem ver, & multos
 occidit. Alti autem facillima, & paucissimi perierunt. Autumno vero, & sub
 plejada tussis multi moriebantur quartanarii.

Aegroti sedecim. Primus.

IN Thaso Parium quemdam, qui decumbebat supra Artemisii ardes; febris corripuit acuta, ab initio continua, ardens, siticulosa. Principio soporosus, & rursus infomnis. Alvus turbata in principio. Urinae albae. Sexta die minxit urinam oleosam, mente motus est. Septima exacerbata sunt omnia, nihil dormivit. Sed & urinae similes, & mens turbata. Ab alvo vero biliosa, pinguis prodierunt. Deinde octava parum de naribus stillavit. Vomuit virofa pauca, parum dormivit. Nona per eadem. Decima omnia remiserunt. Undecima sudavit, non per totum. Circumfrigit quidem, verum brevi rursus incaluit. Duodecima febris acuta. Secessus bilioli, tenues, multi. In urinis quiddam in medio vehabatur, mente motus est. Decima septima laboriose transmissa est. Neque enim somni, neque febris augebatur. Vigesima sudavit per totum, infomnis, secessus bilioli, cibum fastidians, soporosus. Vigesima quarta recidiva facta est. Trigesima quarta a febre liber. Alvus non suppressa est. Et rursus incaluit. Quadragesima a febre liber, alvus non multo tempore suppressa fuit. Cibum fastidians, parum rursus febricitavit, & semper erroneo modo, partim sine febre, partim non. Nam etsi reliquisset, & allevata esset, rursus revertebatur. Eduliis quoque multis, & vitiosis utebatur. Somni mali circa recidivas, mente motus est. Urinas crassitudinem quidem habentes tunc mingebat, verum turbatas, & pravas, & alvus iam adstricta erat, & rursus soluta. Febriculae continuæ, secessus multi, tenues. Centesima vigesima die mortuus est. Huic alvus assidue a prima die lubrica erat ex biliolis, liquidis, multis, aut adstricta ex servidis, ac crudis. Urinae vero perpetuo malæ. Soporosus plerumque cum doloribus, infomnis, cibum fastidians, febris ardens continueiter.

Aegrotus II.

IN Thaso decumbentem apud frigidam, a partu ubi filiam peperisset, & purgatio facta non esset, febris acuta, horrida tertia die corripuit. Multo autem tempore ante partum febriculosa erat, decumbens, cibum fastidians. Postquam autem riguisset, febres continuæ, acutæ, horridæ. Octava multum mente mota est, & sequentibus diebus, & brevi rursus resipiscebat. Alvus turbata ex multis tenuibus, aquosis, bile permixtis. Sine siti erant. Undecima resipiscebat, verum soporosa erat. Urinae multæ, tenues, & nigrae, infomnis. Vigesima parum circumfrigit, & brevi rursus incaluit, parum deliravit, infomnis. Alvi secessus iidem. Urinae aquosæ, multæ, Vigesima septima a febre libera, alvus adstricta est. Non multo tempore postea coxæ dextræ dolor fortis multo tempore. Febres rursus comitabantur, & urinae aquosæ. Quadragesima dolores circa coxam allevati sunt. Tussis autem assidue, humida, multæ, alvus substitit. Cibum fastidians. Urinae in iidem, febres autem in totum quidem non deficientes, erroneo vero modo exacerbescerent, partim ita, partim non ita. Septuagesima tussis quidem obscure defecerunt. Neque enim aliqua sputorum concoctio ferebat, neque alius consuetus abscessus. Maxilla vero ex dextris divulla est, soporosa, rursus desirabat, & brevi resipiscebat. Cæterum a cibis aversum animum habebat, & maxilla quidem ad locum suum rediit. Alvus autem biliosa, pauca egressit, febricitavit acutius, horrida, & sequentibus diebus voce destituta est, & rursus resipiscebat, ac loquebatur. Octogesima mortua est. Urinae huic perpetuo erant nigrae, & tenues, & aquosæ, & sopor comitabatur. Cibum averians, tristis, infomnis. Iæ, molestæ, meus melancholica.

Aegrotus III.

IN Thaso Pythonem, qui supra Herculeum templum decumbebat, ex laboribus, & lassitudinibus, & neglecta victus ratione rigor magnus, & febris acuta corripuit. Lingua arida, siticulosus, biliosus, non dormivit. Urinae subnigrae, quod in medio ipsarum pendebat, sublime erat. Secunda die circa meridiem frigiditas extremarum partium, & magis circa manus, & caput, loquela, & voce destitutus. Brevispiras ad multum tempus, rursus incaluit. Sitis. Nox quieta. Sudavit parum circa caput. Tertia dies quieta. Vesperti vero sub solis occasus parum frigit. Turbatio nocte dolorose, nihil dormivit. Ab alvo pauca compacta stercoia prodierunt. Quarta mane quietus. Circa vespem omnia exacerbata sunt. Frigiditas, loquela, & voce destitutus, in deterius recalcitrans est post tempus. Urinas minxit nigras in medio quid pendens habentes. Nocte quiete dormivit. Quinta visus est allevatus esse. Verum juxta alvum gravitas cum dolore, siticulosus. Noctem laboriose tulit. Sexta mane quietus. Vesperti dolores majores, exacerbatus est. Vesperti clystere adhibito, ab alvo probe egressit. Nocte dormivit. Septima die anxius, submolestie ferebat. Urinam minxit oleosam,

oleosam, noctu turbatio multa, delirabat, nihil dormiebat. Octava mane parum dormivit. Mox autem frigiditas. Vocis interceptio. Spiritus tenuis imminutus.
 190 Vesperi rursus exalefactus est, mente motus est. Jam autem ad diem parum allevatus est. Secculus meri, pauci, biliosi. Nona soporosus, anxius, quum excitaretur, non valde siticulosus. Circa solis occasum moleste ferebat, delirabat, noctem malam habuit. Decima mane voce destitutus, frigiditas multa, febris acuta, sudor multus, mortuus est. Dolores huius in diebus paribus.

Aegrotus IV.

195 P Hrenicius prima die decumbens vomuit aeruginosa, multa, tenuia. Febris horrida, sudor multus, continuus per totum. Capitis, & colli gravitas cum dolore. Urinae tenues, in medio ipsarum pendentia, parva, divulsa, non sudavit. Ab alvo stercorea acervatim egressit, multum mente motus est, nihil dormivit. Secunda mane voce destitutus, febris acuta, sudavit, non intermisit. Palpitationes per totum corpus. Nocte convulsionem. Tertia exacerbata sunt omnia. Quarta mortuus est.

Aegrotus V.

120 I N Larissa calvus, femur dextrum doluit repente: ex his, quae offerebantur, nihil proderat. Prima die febris acuta, ardens, quiete tenebat, dolores autem consequebantur. Secunda femoris quidem remisit dolores, febris autem acuta est, submoleste ferebat, non dormiebat, extremitates frigidae. Urinarum non bonarum copia prodibat. Tertia femoris dolor quievit. Mentis emotio, & turbatio, & multa iactatio. Quarta circa meridiem mortuus est celerrime, & acutissime.

Aegrotus VI.

210 I N Abderis Periclem morbus corripuit acutus, continuus, cum dolore. Sitis multa, anxietas, potum continere non poterat. Erat autem sublieuolus, & capite gravatus. Primo die sanguis e sinistra nare erupit, multa tamen febris augebat. Urinam minxit multam, turbam, albam, deposita non subsidebat. Secunda omnia exacerbata sunt. Urinae tamen crassae quidem erant, verum magis subsidebant, & anxietas levata est, dormivit. Tertia febris emollita est. Urinarum copia, quae concoctae multam subsidentiam habebant. Nox quiesca. Quarta circa meridiem, multum calidum sudorem per totum exclusit. A febre liber, iudicatus est, non rediit, morbus acutus.

Aegrotus VII.

215 I N Abderis virginem, quae decumbebat in sacra via, febris ardens corripuit. Erat autem siticulosa, & insomnis. Menses autem primum ipsi descendebant. Sexta anxietas multa, tibus, horrida, moesta. Septima per eadem. Urinae tenues quidem, verum boni coloris. Venter non vexabatur. Octava sorditas, febris acuta, insomnis, anxia, horrida, intelligebat. Urinae similes. Nona per eadem, itemque sequentibus sic sorditas perseverabat. Decimaquarta mens turbata, febris remisit. Decima septima sanguis per nases fluxit multus. Sorditas parum remisit, & sequentibus anxietas, sorditas aderat, & delira erat. Vigesima pedum dolor, sorditas, delirium intermisit, sanguis paucus per nases erupit, sudavit, a febre libera. Vigesimaquarta febris rediit, sorditas rursus, pedum dolor permansit, mentis emotio. Vigesima septima sudavit multum, a febre libera. Sorditas defecit, pedum dolor restabat. De cetero perfecte iudicata est.

Aegrotus VIII.

220 I N Abderis Anaxionem, qui decumbebat ad Thracias portas, febris acuta corripuit, lateris dexteri dolor assiduus. Siccam tussim habebat, neque expuebat primis diebus. Siticulosus. Insomnis. Urinae boni coloris, multae, tenues. Sexta delirus. Ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose agebat. Nam & febris augebat, & dolores non remittebant, & tussis vexabat, difficulterque spirabat. 225 Octava cubitum secui, effluebat sanguis multus, velut debebat. Remisit quidem dolores, tussis tamen sicca comitabatur. Undecima remisit febres, parum circa caput sudavit. Tussis adhuc, & quae a pulmone prodibat, liquidiora erant. Decima septima incepit pauca, matura spueri, allevatus est. Vigesima sudavit, a febre liber, post iudicationem allevatus est. Erat autem siticulosus, & a pulmone prodientium purgationes non bonae. Vigesima septima febris rediit. Tussis, eduxit magna multa. Urinis subsidentia multa, alba. Sine siti erat, bene ipsi.

bene spirans. Trigesima quarta sudavit per totum, a febre liber, penitus iudicatus est.

Egrotus I L.

IN Abderis Heropythus crecte obambulans caput dolebat. Non multo antem tempore postea decubuit, habitabat prope superiorem viam, febres ipsum 245 corripuit ardens, acuta. Vomitus ab initio multorum biliosorum, sicculofus, multa molestia. Urinae tenues, nigrae, id, quod in medio ipsarum pendebat, sublimis erat aliquando, quandoque non, noctem dolorose transegit. Febris aliter exacerbescebat, plerumque inordinate. Circa decimam quartam furditas, febres augetebant. Urinae per eadem. Vigesima multum mente motus est, nemque sequentibus. 250 Quadragesima multus sanguis ex naribus erupit, & magis intelligebat. Surditas aderat quidem, sed minor, febres remiserunt. Sequentibus diebus sanguis erumpebat frequenter, & paulatim. Circa sexagesimam sanguinis eruptiones cessarunt. Coxae autem dextrae dolor fortis, & febres augetebant. Non longo tempore postea dolores omnium infernarum partium, Contigique aut febres esse maiores, & furditatem multam, aut haec quidem remittere, & leviora fieri, infernarum autem partium circa coxas dolores esse maiores. Jam vero circa octogesimam omnia remiserunt. Nihil tamen defecit. Urinae enim boni coloris, & plures subsidentias habentes prodibant, & deliria minora erant. Circa centesimam alvus multis biliosis turbata est, & tempore non modico multa talia prodibant, & 260 rursus dysenterica cum dolore. Reliquorum vero quies erat. In summa & febres defecerunt, & furditas cessavit. In centesima vigesima perfecte iudicatus est. Febris ardens,

Egrotus I.

IN Abderis Nicodemum ex venere, & potu febris corripuit. Initio autem erat anxius, & cordis dolore vexabatur, sicculofus, lingua combusta fuit. Urinae 265 tenues, nigrae. Secunda febris exacerbata est, horridus, anxius, non dormivit. Vomuit biliosa, flava. Urinae similes. Nox quies, dormivit. Tertia die remiserunt omnia, & quies erat. Circa solis occasus rursus moleste ferebat, noctem laboriose tulit. Quarta rigor, febris multa, dolores omnium. Urinae tenues, & quid in medio ipsarum pendens. Sexta mente multum motus est. Septima quies. 270 Octava alia remiserunt omnia. Decima, & sequentibus diebus aderant quidem dolores, verum omnes minores. Exacerbationes autem, & dolores huic ad finem usque in diebus paribus magis erant. Vigesima minxit urinam albam, quae crassitudinem habebat, & deposita non subsidebat. Sudavit multum, visus est sibi a febre liber esse. Vespere vero rursus incaluit, & dolores iidem, horror, sitis, parum mente motus est. Vigesima quarta multam urinam albam, multam subsidentiam habentem minxit. Sudorem multum calidum per totum exsudavit, a febre liber, iudicatus est,

Egrotus II.

IN Thaso mulier morosa, ex moerore cum occasione, crecte obambulans, infamis facta est, & cibi fastidians, & erat sicculosa, & anxiosa, habitabat autem 280 prope Pylade aedes in Leio. Prima die sub initium noctis timores, sermones multi, tristitia, febricula tenuis. Mane convulsiones multae. Quam autem intermississent convulsiones illae multae, delirabat, turpia loquebatur. Dolores multi, magni, continui. Secunda per eadem, nihil dormiebat, febris acutior. Tertia convulsiones defecerunt. Sopor autem & in somnum graviores delatio aderat, & rursus vigilae, exiliit, continere se non potuit, multum deliravit, febris acuta. Ad hanc noctem multum sudorem calidum per totum corpus exclusit, a febre libera, dormivit. Penitus resipuit, iudicata est. Circa tertiam autem diem urinae nigrae, tenues, quod in medio ipsarum pendebat aliquandiu rotundum, non subsidebat. Circa iudicationem menses multi prodierunt, 290

Egrotus XII.

IN Larissa virginem febris corripuit ardens, acuta, insomnis, sicculosa, lingua fuliginosa, arida. Urinae boni quidem coloris, sed tenues. Secunda die laboriose degebat, non dormivit. Tertia ab alvo multa prodierunt aquosa cum virore pallida, iridemque sequentibus diebus prodierunt eiusmodi tolerabiliter. Quarta urinam egressit tenuem, paucam, habebat in medio pendens illud sublimis, non 295 subsidebat, mente mora est ad noctem. Sexta per nares sanguis multus large fluxit, quumque inhotruisset, sudorem multum calidum per totum effudit, a febre libera, iudicata est. In febris autem, & jam iudicata menses nunc primum prodierunt.

Alipp. Opera.

X 2

Erat

Erat enim virgo. Perpetuo vero, anxia erat, horrida, faciei rubor, oculorum dor-
lor, capitis gravitas. Huic non rediit, sed iudicata est, Dolores diebus paribus.

Aegrotus XIII.

A Pollonius in Abderis erecte situbans obambulabat multo tempore. Erat
autem magnis visceribus praeditus, & circa hepat dolq multo tempore
familiaris ipsi comitabatur, & sane tunc etiam morbo regio tenebatur, statuo-
sus, coloris subalbi. Quum autem edisset, ac bibisset intempestivius carnem bu-
bulam, incaluit parum primum, decubuit. Lacte vero usui cocto, & crudo, mul-
to, capripo, ac ovillo, & victu malo, omnium lachiones magnae sequuntur sunt. Nam
& febres exacerbatae sunt, & alvus nihil memorabile de ingestis egressit. Urinae
tenues, & paucae prodibant. Somni non aderant, insitatio mala, sitis multa, sopor-
osa, praecordii dexteri elevatio cum dolore, extremitates undique subfrigidae, parum
delitabat. Oblivio omnium, quae loquebatur, mente movebatur. Circa decimam
quartam, ex qua quum signisset, incaluit, decubuit, & insaniit, elamot, turbatio,
sermone multi, & rursus quies, & tunc sopor accessit, postea vero alvus turbata,
multis, biliosis, meris, erudit. Urinae nigrae, paucae, tenues. Multa mole-
stia. Seccessus varie habebant. Aut enim nigri, & pauci, & auginosi erant, aut
pingues, erudi, & mordaces. Per tempora vero videbatur etiam lactosa egere-
re. Circa vigesimam quartam lenitas erat, & sediva quidem in isdem perve-
rabant, parum autem resipiscerebat, ex quo vero decubuit, nullius meminit. Rur-
sus autem brevi desipiebat, Omnia in peius procedebant. Circa trigessimam fe-
bris acuta, Seccessus multi, tenues, delirus, extremitates frigidae, voce destitutus.
Trigesima quarta mortuus est. Huic perpetuo, ex quo ego novi, alvus turbata,
Urinae tenues, nigrae, soporosis, insomnis, extremitates frigidae, delirus perpe-
tuo, phreniticus.

Aegrotus XIV.

IN Cyzico mulierem, quae gemellas filias magna difficultate peperit, & non
valde purgata est, primum invase febris horrida, acuta. Capitis, & colli gra-
vitas cum dolore. Insomnis ab initio, taciturna, ac tetrica, & non obsecundans. Uri-
nae tenues, & decolores, siccilofae, anxia, plerumque alvus erroneo modo turbata,
& rursus adstricta. Sexta ad noctem multum delirabat, nihil dormivit. Circa unde-
cimam insaniit, & rursus resipuit. Urinae nigrae tenues. Et rursus tempore in-
terposito oleose. Et alvus multis tenuibus turbata. Decima quarta convulsionem
multa, extremarum partes frigidae, nihil amplius intelligebat, Urinae suppeffae
sunt, decima sexta voce destituta est, decima septima mortua est, phrenitis.

Aegrotus XV.

IN Thalo Dealcis uxorem, quae decumbebat in Leio, febris horrida, acuta, ex
maerore coarripuit. Ab initio contegebatur, & ad finem perpetuo, semper ta-
cita manibus palpabat, vellebat, sealpebat, pilos legebat. Lachrymae, & rursus
rursus, non dormiebat, ab alvo irrationes, nihil prodibat, parum communia bi-
bebat. Urinae paucae, tenues. Febres ad manum tenues, extremarum partium fri-
giditas. Nona multum delirabat. Et rursus sedata est, tacita. Decima quarta spi-
ritus rarus, magnus, per tempus. Et rursus brevissima, decima septima ab alvo
irratio turbulenta, postea vero ipsi potius percurrerant, neque consisterant, o-
mnino nihil sentiebat. Cutis arida circumscriptio. Vigesima sermones multi, & rur-
sus sedata est, voce destituta, brevissima. Vigesima prima mortua. Huic perpe-
tuo ad finem usque erat spiritus rarus magnus. Omnino nihil sentiebat, semper
contegebatur. Aut sermones multi, aut tacita perpetuo, phrenitis.

Aegrotus XVI.

A Dolefens in Meliboea, ex potationibus, & venere multo tempore calefa-
ctus decubuit. Horridus autem, & anxius erat, insomnis, & non siccilo-
sus. Ab alvo prima die stercore multa prodibant cum multa defluxione, & se-
quentibus multa aquosa cum virore pallida prodibant. Urinae tenues, paucae,
decolores. Spiritus rarus, magnus, per tempus. Praecordii intentio submolli,
oblonga ex urisique. Cordis palpitatio perpetuo continua. Urinam minxit oleo-
sam, decima sensum mente, motus est, moderatusque erat, ac quietus. Cutis arida,
& circumdistenta. Seccessus multi, & tenues, aut biliosi, & pingues. Decima quar-
ta omnia exacerbata sunt, mente motus est, multum deliravit. Vigesima insaniit,
jaqtatio, nihil mingebat, paucos potus continebat. Vigesima quarta mortuus
est, phrenitis. Videtur porro mihi aestas illa, quae tunc fuit, iuxta rationem
commoditatem attulisse. Nam aestivos morbos hyems succedens solvit. Et hye-
malis

males æstas succedens transmutat. Quamquam ipsa in se ipsa, quæ tunc erat æstas, non stabilis erat, sed derepente calida, & austriua, & sine ventis. Atamen ad a-
 360
 365

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPULARIBUS

LIBER IV.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Erentia, & mucosa supra aures prodeun-
 tia, Ulcus in externa tibia parte.
- 2 Pelloris ulio. Abortiens sexto die. Morbo
 regio correpti, abunde colorati.
- 3 Splenis parui, præcordia extensa, & ad ma-
 num submoventia.
- 4 Lambries per os. Caput efflu percussus, duo-
 decima die febricitans.
- 5 Quartana correptis, rursus, sedatus est.
- 6 Colli, & aliarum partium impotentia. U-
 rina erum, & lentum farinam refe-
 rans.
- 7 Vinum undatum meracum insania causa &c.
 Bilis atra vomitus: Atensis motio ex flu-
 xu sanguinis & nervibus.
- 8 Auris sinistra fluxio viscosa, crassa &c. post
 febrem diariam. Dentes ex phagedæna e-
 rosi. Nasus medius quibus excidit, &
 quibus latus. Dens quintas ab antero-
 ribus.
- 9 Auris suppuratio post dentium dolorem. Fe-
 bris post elementum pleiaderum. San-
 guis biliosus & nervibus. Penarum circa um-
 bilicum pulsationes.
- 10 Morborum exacerbationes ad principia consi-
 deranda.
- 11 Quibus purgatio sepius astramento similis.
 Doloris coxarum curatio. Ex equo lapsus.
 Abortus masculi triginta dierum. Lien-
 tismum flux. Urina velut erui lota-
 ra.
- 12 Abortus femelle sexaginta dierum. Piliatum
 ma in albis, alia in rubris mensibus na-
 ta. Febricitans siccæ permanent. Pustula
 ex lassitudinibus.
- 13 Regueris vomitus biliosus, & pituitosus.
 Hemorrhoides hyeme per duos annos. Ex-
 crementa ab initio nigra, post viridia &c.
 Febricitans ex levato asmo. Præcordii dex-
 tri inuentio.
- 14 Viriditas pallor. Acuto morbo laborans.
- 15 Recidiva quibus post longissimum tempus. Sup-
 puratio iuxta oculum.
- 16 Abscessus ad oculos in febribus ardentibus.
 Hipp. Opera.

Rigore, dentes postremi corrosi. Adulter ex
 capite gravata.

- 17 Præcordia spiritusosa, & insensita, præcordia
 magna, & splen.
- 18 Recidivam quæ faciant. Urina cruenta.
- 19 Durum quid in præcordiis collectum. Umbili-
 cus ex nativitate denigratus.
- 20 Adensurorum eruptio in ambelosa. Sanguis e-
 sinistra nare. Febris ex splen.
- 21 Callum, caput &c. torpida. Capitis gravi-
 tas, & stridor secundum pulmonem. Dy-
 senteria sine tenebris, mensibus per se-
 ptem annos retentis. Secus electrum re-
 ferens.
- 22 Marcor, & corruptio, expressione duriore
 post sectionem. Quædā a febricitantium na-
 ribus ab inditiis prodeunt. Maturi in mor-
 bis abscessus. Laterum mollitudo a flatu-
 bus elevata.
- 23 Lumborum, & erum doloris symptomata.
 Oculorum suppuratio.
- 24 Digniti, labia, & alia partes subterrens.
 Præcordium cedens, & gibbosum.
- 25 Urina stasidis simile. Dissentio submolli in
 plicentis. Tumores in dextris elevati.
 Temporum constitutio. Figures morborum.
- 26 Abscessus recidiva. Contractiones, vena
 temporum. Colorum mutationes ante in-
 dicationes. Catu circumfensionibus absque
 indicatione. Lachryma voluntaria, &
 involta. Piscosa circumcirca in dentibus.
 Ulcus in tibia. Capite vulnerati. Hy-
 dropica.
- 27 Tussitantes, ac manibus laborantes. Stupida
 modo non morbo, absque febre. Nystalo-
 pes. Pudentorum ex ore flux.
- 28 Pedes etiam in horribus calidi. Lumbricus
 crassus, a sene furioso. Signa ante dieti-
 dicatioris duplicia.
- 29 Peripneumonici spora biliosa. Sceminis per
 sanum effusio. Infomiorum in febribus
 vexatio.
- 30 Ab hemorrhoidarum curatione insani. Aqua
 frigida in febribus acutis ad vomitum.
 Nervii ipsi in se ipsos trahunt. Tussis siccæ
 quæ potissimum laborant.



- OST equinoctium, & post plejada, qualia sunt erodentia, & mucosa, quæ caput aperuerunt, supra autem prodierunt. Eius qui apud Leocydis aedes habitabat, in pede. Phanodico digiti in pede, in pectore. Qui tibiam secutus est, hæc parte etiam nigresfactus est. Erat ulcus magnum in externa tibia parte, & retro prodibat. Quum purum factum esset, lateris dolor, & pedis suiltri e directo, & febres. Mortuus est a febre. Biliosum testuario abunde coloratum. Et istoria adhibenti circa equinoctium, sanguis multus deorsum prodit, Seni valde vehementer abscessit, non ultra quatuordecim dies. Vulnerato ab Anthiphilo, isto, iudicatio facta est die septima, bilioso, stupido. Tertia post iudicationem sanguinem spuit, superflues manebat, & recidiva facta est postea. Iudicatus est, velut par erat, circa plejadum occasum primum. Post plejadum autem occasum biliosus ad insaniam usque, iudicatio facta est, supervixit circa nonam diem absque sudore. Circa equinoctium Chalcidionis a portis delatus ad forum, ex ruptione circa mammam dextram dolens, spebat alias atque alias pallem subinde. Venter crederet. Sodor aspicatus septima, tenuis puerumque usque ad octavam, iudicatus est decimaquarta. Circa quadragesimam tubercula exorta ipsi circa urasque aures, haud immerito putabatur suppuratur fore. Non fractum est, Pectus Aristodemus ulum est.
- Philidis filio, quum abscessus factus esset ex casu, & ipsi pectus ulum est. Erat autem dolor quidam etiam antea, post æquinoctium autumnale recidiva, & alias usque ad solstitium hyemale, & cum sole æstivo. Acheloi uxor sexta die abortivit, quum esset sanguinea, & horrida, & sudores. Iudicatio facta est decimaquarta, quod mensum fuerit foetus, haud scio. Mactulum autem etiam alium ad dies viginti le abortivisse dixit, an vera dixerit, non scio. Circa solstitium hybernæ aquilonæ venti erant. Morbo regio eorripiebatur abunde colorati, & partim horridi, partim non. Lingue combustæ tertia die. Et turbationes circa sextam, & septimam, acque hæc diu durantes. Decimaquarta ventres resistentes, & in medicationibus non obediens. Pro ratione febrium etiam nulli sudores. Splenes quibusdam parvi, ad præcordia dextra extensi, & ad manum submurmurantes. Sanguinis fluxiones, & urinis purgatio, ac iudicatio. Multo autem magis infra nitebantur. Nam & hoc sub illud tempus correpiebat. Quibus non sic erat, splenes vero etiam elevati, his sanguis ex sinistra nase. Solstitium præterierat, hyberna hyberno modo in aquilonibus, paulo vero post austrina erant, ad quindecim dies. Postea vero nives quatuordecim diebus. Circa hanc anni constitutionem, morbi regii abunde colorati vivebant, & non sincere iudicabantur, recidivabant. Post nives, austrina succedebant, & pluvie, gravesdines eruperunt & cum febribus, & sine febribus. Cuiusmodi vero etiam ad dentes, qui antea ex medio doluerat, ad dextra, supercilium, & oculos. Erant autem, & ranciosi, & fauces inflammatae, & glandule isthæ spongiæ appellatæ intumesciebant, & tubercula circa aures, & maxillam mollia, & cum febres sedabantur. Insuperantibus febricitare fiebat superne, & in utralique partes pleraque horum, & spongiæ quibusdam sub autumnum, & hyemem, sed & perigrines. Et multæ omnibus modis abortiebant, & difficulter pariebant. Sexta die virginii iudicata, sexta revertunt, iudicata vero sunt per sextam. Omnia in his temporibus sexta, & octava iudicabantur, circa plejadum occasum. Meandri cæci uxor statim cum pallore viride, & statim purulentum spuit circa sextam, & hepatis servor, & deorsum feculentus modicus, carnosus plenus sursum paucus, albus, lara expuebat, cibum fastidians. Mortua est prope vigesimam diem. Ex vicinis Thestoris famula, ex uxoribus.
- secellu bilioso, nullo, præcordio intenso. Sexta die ex suppressione alvus ipsi tenuis, multa, una vice egressa, & statim sudavit, & iudicata est, & alvus substat, eadem autem hora, quum signisset, febricitavit, & nris eadem hora. Thestori uxor, quum pituita alba prædita non valde esset, lactans acuta febre correpta est. Huius lingua combusta est, dum alia comburentur, sub hoc tempus, linguæque exasperabatur, velut grandine multa. Et lumbrici pectoris. Circa vigesimam autem non perfecte iudicata est. Circa plejadum occasum Metrophanii filius, caput percussus ab alio puero, per testam, quum pervenisset ad duodecimam diem, febricitavit. Occasus autem erat, quod quum detergeret partes circa ulcus, perfricuit, & perfrigeratus est, & labia statim sunt elevata. Attenuata est autem curis, multis locis uterius ab ulcere, quum autem secus esset tarde, neque pus effluxit, neque allevatus est. Juxta autem vero videbatur suppurari, in maxilla ad dextram. Hæc enim parte etiam ulcus erat. Postea & hoc non suppuratum est, & humerus dexter suppuratus est cito. Mortuus est circa vigesimam quartam. Post plejadum occasum is, qui autem doluit, circa vigesimam diem postea voce destitutus est, & dextrarum partium impotens, sine febre sudavit, dextra auris, dexter oculus, consistebat non valde, & attrahebat quid ex inferna parte. A sinistris autem distortus est oculus graviter dolens, collum durum factum est, tertia hora posteaquam doluit. Post plejadum occasum, servus Attici a quarta correptus, stupidus sedatus est. Alius eodem tempore vera stupida infania, ex phren-

- phrenitide, ac lethargo mixta, correptus est. Ad coxas, & crura venit dolor, quievit, quoto die haud leno. Eodem tempore horridi, vomentes, & post iudicationem cibum averfantes, & biliosi, & splenes magni, duri, dolorosi, & sanguinis eruptiones. Quibusdam vero eodem tempore, post plejadum occasum, ex naribus sanguis biliosus ob splenes. * In Cranone uxorem Nicoftrati correptam decimaquarta die, statim occupavit impotentia colli, & aliarum partium, & eibus inclusus fuit usque ad decimam. Spiritus densus parvus, impotentia, palpans digitis, delirans, sudores, distracta sunt ad dexteram partem collum, os, oculus, natus. Urinarum subsidencia alba, erum referens, alia alba, alia ramentosa, cum pallore subviridis, farinam lentum referens. Huic quandoque velut adpositum quiddam superflabat, arque hoc acervatum, non multum dispersum, velut quod in medio ipsarum pendere solet disparatum, velut extrinsecus ex ovicula, postea veretiam non subsidens mingebatur, & alia quidem talis erat, alia subsidens, alia talis modice ad latitudinem dispersa, alia conturbata, alia talis. Quod in medio vehi solet, nubeculae subnigrae simile, quae putaretur crassitudinem habere. Laxum autem aliud tenue, aliud tenue rale, aliud velut equi, aliud velut sint caliginosa. * Qui primus delatus est adolefens, huic urina pura tenuis. Omnium secessus tenuis, multus, sine bile, lingua valde aspera. Febris adurens, informis, alvus gibbosa. Hic mente motus est, octava arborator die, protervum in modum, exurgebat, pugnat, turpia fortiter loquebatur, quum talis non esset. Huic quum urinae multae tenues prodissent ex suppessione, somnus obortus est continuus, & sudor, qui iudicatorius esse putabatur, ex quo talis erat forte circa decimam diem. Verum postea rursus insanit, & brevi mortuus est undecima die. Occasionem fuisse puto, quod meracum multum bibisset, priusquam insaniret. Paucos habebat annos, propemodum viginti. Eumenis nixor autumnum vomuit bilem atram. Sed & odores manifesti erant, & febres horridae, & cordis, sive osculi ventris dolores, biliosa pauca vomebat, & humbericum. Secessus tenues per omne tempus. Ante plejadum occasum desinebant statim sanguinis eruptiones, & breviores erant febres, ac statim revertentes brevibus recidivis, & cibum averfantes, & velut excocti, & anxii, & cor dolentes, & ferini in iudicationibus, & rigore affecti, & biliosi. Adolefens peregrinus erat, cui tertia die sanguis ex naribus multus fluxit, itemque quarta, ac quinta. Sexta compositae consistebat, mente motus est. Septima die alvus substitit, soporofus erat. Recidiva tertia die, alvus citi cessavit. Urinam non vidi. Circa iudicationem velut debebat. Ac vero circa plejadum occasum austrina, & pluviae erant, & tunc adolefens multum, subbiliosa, viscosa, multa secretamenta egerbat, febris vehementer continua, lingua arida. Sexta iudicatus est. Septima rursus invasit, dimisit eadem die cum tremore. * Auris sinistrae fluxio viscosa, crassa, die sexta. Puer ab ulcere phagedaena eroso, dentes inferni, & ex superni, ac infernis anteriores emergebant, cavitatem habebant. Quibus ex palato discedit, his medius confidet nasus. Quibus vero superni dentes anteriores, his latus est summus nasus. Qui quintus dens ab anterioribus numeratur, quatuor radices habet, singulis paribus ad utrumque vicinum dentem connexis, extremitatibus omnibus ad internam partem reflexis. Circa tertium dentem suppurationes plures, quam iuxta alios omnes. Et ex naribus fluxiones crassae, & a temporibus dolores ex hoc maxime sunt. Corroditur hic, maxime quintus, ex medio quidem nodum habebat unum, duos autem anteriores. Parvus primus intrinsecus iuxta duos corrodabatur. Septimus radicem unam crassam, acutam habebat. * Athenaez puer masculo doluit a sinistra parte infernus dens, a dextra supernus. Huius auris dextra suppurata est, dum non amplius doleret. Post plejada clemens coelum, nubilosum, & caligines, iudicationes quintanae, & sextanae, ac septimae. Jam vero etiam duratioribus, febres recidivantes, & quandoque erroneae, & cibum averfantes, & biliosae, & dysenteriae cibum fastidientes, febriculosae. Circa plejadum occasum, austrina fortiter erant, sanguinis eruptiones, & febres tertianae, naturam referentes, & lenes. Qui in iurrina decumbebat, sanguinem abunde biliosum & naribus effudit. Secessus modicus, iudicatus est septima cum rigore. Servus in extrema caupona quarta die sanguinem e naribus effudit, multa statim nugarum, alvus renitebatur. Praecordium dolorosum, durum. Ad subdram glandem sexta die subierunt mafa, cum pallore viridia. Septima mane lactatio, clamor multus, venarum pulsationes circa umbilicum. In acutissimis febribus pulsus densissimi, & maximi. * Quale est ad vesperam exacerbari, tale erat in omni morbo. Ceterum ad principia consideranda sunt etiam exacerbationes, & an citius redeant, & continuas, & anni tempus. Post plejadum occasum, austrina. Quae quinta die iudicabatur, intermissa una repetebant. Ar vero laxa pustulosa erant, velut Acanthio Lapyro. Circa plejadum occasum subfaba, & aspera erant pruriginosa, nullas lachrymas emittentia, & magis quidem hoc tempore. Sed & impetiginosa turgentia. Haec erant in Pythodori uxore, & Capelo, cum febre, sub cuius initium fere Pythodori uxori coxae importantes. Post plejadum occasum horrores, sanguinis e naribus eru-

- priones. Sutor quidam septima iudicatus est, una intermissa, altera redit.
- 140 Narsus quarta iudicatus est. Alius ex his, qui a Leocyde venerant, septima iudicatus est. Alius quarta. Mosebus nona. Largus sanguis ex finitima, modicus e dextra nare. Ad decimam quartam ad iudicationem, si quatenus debebant ab initio exacerbarentur. Delinquentes circa edulia decimam septimam fiebant. Circa autem in dextra parte tuberculum, parvum intus durum, foris parvum laxum.
- 145 dolorosum, nihil remittens, decima nona noctu factum est. Valde biliosus 11
suppuratus, purgatio sepius atramento maxime similis. Qui cucurbitam affixit, quum in coxa esset dolor, huic ad crus decursum venit, & melius habuit. Qui in Ceramico ab equo lapsus est, cui non statim cucurbita affixa est, ulcus est intro, & vigesima die recruduit malum, sanguinis eruptiones foeculentas, & erodentes. Tenedia quarta die abortivit masculum triginta dierum. Alius liquida, tenuia egessit, lingua combusta fuit, iudicatio quarta die. Post plejadum ocellum lientola, usque ad quintum diem suebant, iudicata sunt. Cuidam septima die urina velut ervi lotura, similis ipsa sibi ipsi, postea putra cecidit. Intermissit etiam Megaris filio, verum sanguis non fluxit. Urina velut Aurigenis alba, crassa, similis. Circa solstitium hybernum, sydis non parvum, quinta, & sexta postea terra motus, Quae in Perintho moribatur anhelosa, Antigonis uxor, quae non sciebat, an praegnans esset, mentis comparentes tubri. Venter alias atque alias parvus, alias magnus. Tussiens semper, velut si celerius iter perfecisset. Mensis erat octavus, sedata est prius febricitans.
- 160 Apemanti fratris uxor septima die abortivit foetellam, velut dixit sexaginta dierum. Circa nonam turbata est, post iudicationem dexteram paries dolebat, velut recidiva. Hec & concipiebat cito, & perdebatur. Alia quondam in albis mensibus filiam peperit Alia in rubris, velut convolvebat. Horridi, anxii, cibum averfantes, recidivantes, biliosi, sanguine manantes, subplemici, doloroso modo plurimi ex similitis affecti, Apemanti uxori. hac parte oculis distortus est dexter, ad alteram vero partem lateris mollitudo. Aristophontis filia tertia, & quinta febricitavit, sicca plerumque perseveravit. Venter tamen huic turbatus, neque iudicatio fiebat, ultra triginta dies cessavit. Pusulae ex lassitudinibus non valde fortibus, perveniunt ad septimam livide. Rigor anellae recto Heronem, obortus est. At vero alba magna, neque ipsa valde bona, gravi sopore pressoriam, & somnolentiorum, & non confidentium, & hile renitente, & sine lubrica, live dura fuerit alvus, non confidentes. Zoli fabri pulsus tremuli tardi. Urina, & alvi feces moderate decolor, pectus dissentio utriusque in directum, usque ad umbilicum, cum febre acuta, cibum averfans, siticulosus. Filia adilis apud Teomazum, quum obitum esset ipsi, quod uterum gellaret, secundi mensis initio erupit vomitus puritulos, aliquando vero biliosus, difficulter peperit, perfecte purgata est. Vomitus similiter usque ad trigesimam diem perseveravit, postea venter turbatus est, & vomitus cessavit. Lienteria. Mensis non prodibant per duos annos, hyeme habuit hantorrhoidas. Duos fratres
- 180 Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant, subciculenta, edulia ex sanguine confecta colore referentia, ea ex spumosis bile abunde coloratis viridia erant. Qui asinum ex pacto elevavit, statim febricitavit. Tertia, & quarta, & quinta, & septima, & octava sanguis erupit, iudicatus est, alvus lubrica. Vir metallicus praecordium dextrum intuentum, splen magnus, alvus intenta, subdura, spirituosus, decolor. Huic ad genu sinistrum, recidiva, per totum iudicatus est. Temenez filius habebat quid spiritus, ut viridantis palloris esset, ad doctum, ad manus viridantis palloris. Marius Lechus puerpera apud Siendochum, arduo morbo infestatus, ad quem septima die ingressus sum, octava moriebat, neque murgens, neque egerens. Praecordia magna, & dura, & spiritus densus. Hic moriens ne frontem quidem sudore humectavit praedolore. Huius uxor eiecit foetellam septimestrem, septima die. Apparuit autem quarta die. Hanc a principio quidem pedum dolor tenebat. Delinquate vero febre, spiritus non est solutus, sed intus relictus, dolor ad manus, & brachium. Recidiva per longissimum tempus coarpsit eos, quibus urina ante
- 185 te iudicationem suppressa fuerant, Quae erat apud Temenez ipsius locor, cum rigore iudicata est. Quum autem viridans pallor cito delinqueret, manus, & humeri doluerunt, horum autem cessante dolore, caput, oculorum palpebrae superne elevatae sunt, & lachrymae profusabant, reliqua non novi, iudicata est primum septima die. Menandri vinitor similiter, verum alvus ab initio tenuis egerebat, postea suppressa est, itemque urina iudicata est, non riguit, septima die, quoniam alvus antea turbata fuit. Poramonis filio alvus non egerebat septima die, duobus diebus ante iudicationem non riguit, quapropter neque urina suppressabatur. Dens Hegesistratio, cui suppuratio iuxta oculum, suppuratus est iuxta extremum, & rursus sanatus est oculum, & secundum nares pus descendit crassum. Iuxta gingivam cartuncula parva rotunda abfcesserunt. Huic circa tertiam diem suppuratio affuturam putabatur, postea avertebatur. Derepente vero intumuit maxilla, & oculi. Qui

- bus abscessus ad oculos in febribus ardentibus, hi maxillas rubent, & sanguinem ex naribus spoliunt. Sed & quibus ad aures sunt. Fortassis autem & abscessus ad articulos magis, non tamen clare novi. Rigores tremulis, præcordii incartio. Menses apparuerunt decima septima, iudicatio fiebat ita perpetuo. Si tamen non sic itus permansissent, iudicabantur tertia, quædam quinta, quædam septima. Hegelistratio postremi duo dentes parte inter se contigua corrodébantur, postremus habebat super gingivam duos nodos, unum iuxta cavemam, alterum ex altera parte. Quæ vero parte duo nodi erant, ibi radices latae similes singulis paribus concidebant, ad alteram partem medietas una rotunda. Mulier, cui sanguis e naribus erupit quarta, & sexta, septima iudicata est: rubicunda erat. Mulieri ex capite tortiter gravitæ, iudicatio facta est circa vigesimam. Vigesima præcordia æstus. Septima die, non valde sanguis e naribus erupit. Secellus repens, ad oculum dextrum circa octavam. Viro eadem, verum septima iudicatus est. Sublentosus e sinistra parte. Huius octogesima die, & disjunctio oculi affectiones, fortassis quoniam post iudicationem, & quia multe. Uxor Teimena spiritus præcordia, & intentæ. Menses per tempus apparuerunt. An vero etiam prægnans fuerit, haud scio, alius primum suppressa, & tunc vomebat, postea non amplius, alius enim multa viscosa, ac biliosa exerebat, præcordium non impediebat. Undecima ad magnum dextræ diguum infaniam, alii egestio etiam, penitus precedebat. Quibus contingentibus, melius habebat. Nam & in somnum delatio minor erat, & febres, & quodammodo facilius spirabat, quoniam super malum vomitur, vomituræ. Decimalexta lenius lacus est spiritus densus, & febres, mortua est. Hæc febricitavit ante abscessum. Septima post abscessum perit. Erat & hæc rubicunda. Filius mulieris ipsius Apemanti fortis, præcordia magna, & splen, spiritus, secellus amara bilis, aliquantulo stercore amixto, huius ex operibus. Vigesima die ad pedes, & iudicatio certe huius ad articulos, non ad oculum, præcordia vero erant intentæ, & sane erat etiam rusticula, quædam impode siccæ. Quæ relinquuntur post iudicationem, recidivam faciunt, & in ipsis morbis, quæ excutuntur, spiritum præmaturum, alii secellus, interperies, & similia. Apemantis, cui dolores in sede, in dexteri lateris mollitudine, & iuxta umbilicum paulo inferius, & e dextra parte, ante dolorem urinae, cruentam mungebat, desit tertia die. Et fæbet in altera parte, ex eadem in directum, & huc quoque utinam æruentam eieciat. Quæ ubi cessasset, ambo subidentes in urina habebant, & hoc tertia die. Apemantis autem plurimum soiebat. Aliter vero non sentiebat, nisi in dextra parte. Et Nicolaito accidit aliquid iuxta ultimas partes a dextris, inferius quam quibusdam sinistris, longe vero subter lateris mollitudinem, usque ad umbilicum attigisse. Ancula apud Soligen alba pinguis relecta. Tibiæ duræ tumoribus, albis, laxis, itemque pedes, verum minus. Erant autem & in partibus infra femora, etiam plerisque distichis huc exitus patet, immo & in lumbis, & venæ tenuis erat præcordia subnulla, spiritus non valde. Erat autem desinerebus plurimæ etiam alia cura, ubi glauci lacti erant oculi. Atque oculorum quidem cura paulo moderator erat. Coxa vero, ac eruit affectiones uterinae erant, quæ dolores esse quarentur. Apposita etiam, ac substitutio medicamento odorato ex fatiga, & ugento, contigit, ut brevi discederentur, ac desinere. Tempus autem abscessus ad oculum, annus. Circumcisa durus fuit, cui etiam pustula non perfecta contabuerunt. Sunt autem & a disquamatis talia. Servus in Hippolochi villa, qui in præcordiis utrinque quid collectum erat durum, & fulgorem aliquantulum habens infome, qualis erat in fæbi ferrarii uxore hydropica. Cui tenuis recemera progressa partem aliquam evacuaverunt. Erat autem & hoc ipsum ad dexterum, planum quiddam supra ea, quæ circumferentiam habent elevatum. Huius umbilicus ex nativitate denigratus erat, & ulcus profundum fiebat, & umbilicus non valde cicatricem contraherebat, & pudendum summo parte denudatum erat, quum non statim tale fuisset, veque contritum, & adhuc magis fiebat. Hic plurimum vomebat, febres, cibi salidum, sanatus est. Verum circa septimam a decubitu dñe (nam & pueræ aggrorant) equam mukam bibens, & fortassis aliter contemners, iudicabatur, & aliquantulum convellebatur. Desinente autem convulsione, circa animadversionem extinctus est. Ante hoc vero urinae æveram mixturam, & statim cum eripitu prodierunt, & superne partes minime sunt evacuatae. Quum autem mortuus esset, statim etiam & illæ fortiter emoluit sunt, & reliqua tubefacta sunt, velut a flagris per totum corpus, excepta ea partes, ubi tumor ille maxime elevatus erat, & malum quoque calidus erat. Caudam vero in Abderis dorsum erupit. Cnidam autem anteriore parte immiscebatur sine febre. Tumor ad contactum suppurato similis erat.
30. Famula anhelose, quum vasa menstruum sanguinem funderent, anhelationes ille cessabant, febris fiebat, mamma sinistra superne suppurata est, & ab initio etiam aures. Olympindoni famula sanguis ex sinistra nare, & iudicata est ad vigesimam, quemadmodum etiam febricitantibus, & secellus quales etiam

- etiam estate populariter grassati sunt, & quales Hipponactis. Hyle famula Aristidis, octava die in pharmacorum purgatione, interne signa habuit, qualia facile ferunt, & si non præter rationem debilitantur, & neque spumola, neque sublinguolenta, sed qualia sunt ova, velut Heraclida uxor purgata est multum, & facile tulit. Quia in Bulagora villa depurgata erat, corpit febricitare ex splene (Qui vero dextrum præcordium habent non quidem sublime, verum intentum, hi etiam magis rubicundi sunt) rubicunda quum esset, alvum in principio turbatum habuit: expectabam ad oculum decubitur. Huic septima die sanguinolenta lachryma mordax ex oculis prodit, & secundum nasum, & fauces, & aurem sinistram. Decima quinta sudavit cum rigore, non judicabat ante rigorem, pallida facta est valde, & faciei circumfusus, ac contractio. Aurem e directo splenis, ac lateris dolebat. Pueris ventres turbati, & tussis sicca, quandoque ad humerum suppuratio fiebat in tussibus posterioribus diebus. * Fullo collum, caput, septima manus torpida. Nona crus torpidum, rursus cessavit. Cui maxilla distracta fuit, in quinto mense in ventre distracta erat ad sinistram partem. In Cranone Lycino Grammatico, ex febre biliosa ex splene, capitis gravitas, stridebat secundum pulmonem, in Jabiis utrisque ulcera, incisus rotunda, parva, postea etiam sanguinis quid ex nare e directo manavit. Famula, quam recens emtram vidi, cui durities in dextris erat magna, non valde dolorosa, & venter magnus, ac circumfusus, non similis hydropicæ, & alias pinguis, ac mollis, & non valde difficulter spirans, verum decolor. Menses septem annis non proderant, facta est dysenteria, & non tenuissimo tentata. Et sub hac durities in dextra dolorosa erat, & febres tenues, & non ultra septem dies etiam alvus turbata est, secessus electrum referens, subviscosus, multus ad aliquot dies. Sanata est, & menses postea proderunt, & partes secundum ventrem molles fiebant, & corpus boni coloris, ac crassum ipsi erat. * Minori uxor ex sectione, pressa ab eam administrantibus durius, marcorem, ac corruptionem incidit, malo ad pulmonem deveniente, brevi significationem de se dedit, quotquot diebus supererat, erat & alius quiddam interitus. Quæ induitur in nares si febricitant, si quidem solutus fuerit dolor, crassa per nares effluit. Si vero neque dolor, neque febris, tenuia, & fortassis fervida. Veluti tenuem quidem Hegesippo, quum ad noctem quid indidisset. Crassum vero illi in Corintho eunuchus similis, Celeuris filio erat. Maturi in morbis abscessus an iudicent, si gnium est, si dum fervida sunt mala, non febricitant, & dum molesta sunt, facile porrantur. Velut quæ in sede acciderunt Charoni. Leambio vero, quum intestinum ulcerosum esse putaretur, in dysenteria pharmacia curato, humerus, & sedes ulcerata sunt in sinistra parte, circa febrem. Cui a statibus laterum mollitudo elevabatur, & aliquantulum dolebat, huic, quum laci uberius, & meracius bibisset, & insuper dormisset, statim nausea, & calor accedebat. Deinde ignem intendenti, & pro cibis farinam crassiorem in craticula coctam comedenti, alvus subsistit, & purulentum tamen quiddam egressit. Quum autem sedes esset inflammata, sine febre, & sine dolore sufficienter erat, hoc assero. * Senex in lapideis vestibulis lumbos doluit, & ambo crura, & utrique dolores descendebant ad femora, & quandoque tibias, & aliquando ad genua, & quum durissime durarent, recuriones multe fiebant, tumor in pedibus, lumbis, tibia, breves inguinum tumores, venter durus, & totus pectus intensus, ac dolorosus. Plerumque compertus est etiam vesicam duram habere, ac dolorosam, & popularum eruptiones, & calores oculis, auribus, naribus, manu. Judicationes, & alia, per quæ cognoscimus de ipso agro, an fuder, aut tangat, aut aliquid olfecerit, aut gustaverit, itemque alia cognoscuntur. Pili, color, cutis, vena, nervi, muscoli, carnes, ossa, medulla, cerebrum, & sanguine viscera, & venter, bilis, alii humores, articuli, & postea an doluerit iuxta autem, iuxta ipsam collectum tuberculum, glandulam non attingens, os non suppurans, & hoc disparuit, & tunc statim febricitavit. Pulsus, tremores, convulsiones, singultus, circumspiratio, secessus, per quæ cognoscimus. Suppuratus oculis, & dum erumpunt, ulcera magna sunt, & dum secantur, profunda, & utroque modo oculi ulcerantur. Aristæas ex pago Amphilochoi quarta die mentis morus est, alvus subviridia egerebat, & somni salubres, albicanti coloris. * Quibusdam ab initio subterfemali digiti, & labia ubi loquerentur, videmque alia partes, & proterve lingua extior, ac volubiliore præditi, his rubor in facie maxime erat. Hi ebriosi erant, aut vomitu commode nisi intumescebant. Qui iuxta Medasæ rædes habitabat, cui tenuia, non biliosa, aquosa, multa per secessum prodibant, præcordium cedens, & gibbosum, soporosis fiebat. Circa decimanquartam ad judicationem maxime progressa, rigor sine tremore, dissolutio, resolutio, contractio, secessus, & egestiones, soporosis, mente morus, ex somno non infanti, judicatus est circa decimanquartam, nihil e judicantibus contrarium. Alius similiter in principiis secessus, subviscosi, ex quibus quod crassum est, judicatorium est, infans, postea subviscosi, subbiliosi, maturi, biliosi, non tenues, qui ubi compacti fieri cœpissent, judicationes celeres. Præcordium intentum apparuit inflammari, aut venarum intentarum modo, circa sextam. Postea dormivit septima, judicatus

35. dictus est circa nonam, albicans coloris ambo, non tulus. Quam fecessus aquo-
si sub dio expoliti essent, superne leves, tenues, laridi valde similes fuerunt, in-
ferne vero subditiorem habebant. Quibus in dextris distentia tumidior, phre-
nitici sunt, si non solvantur febre desistente. Quibus autem a mollitudine ven-
tris in hac ipsa febre quiddam collectum, aut durum dolorosum sit, & valde ma-
lignum diffundi non potest, ex talibus fortassis suppurantur. In dextris tu-
mores elevati, si quidem si quis plurimum, ac maxime premat, submurmura-
runt, non valde maligni putandi sunt. Velut in dentem illi, qui ex Amphilocho
pago erat, & ei, qui iuxta Medosade ades habitabat. Hi soporosi erant, & in
somnia mente mori. Constitutiones quales, in quibus temporibus, ac regionibus
magis, & minus sunt. Vigores morborum, & ad iudicationem, & quoti-
die, & an citius fiant, aut serius, tertia, quarta, circiter, & in quibus circuli-
bus iudicantur, imbecilia, eruenta, & non. Quibus abscessibus recidive
fiant, vena temporum, & contractiones, & colorum mutationes ante iudicationes,
ex rubre ad viridem, ac pallidum, si non iudicent, & curis circumventionibus absque
iudicatione, & oculorum contractione, corporis duritia siccata. Qui quidem volentes
lachrymantur, non malum est. Quibus autem in vitis, lachrymae profluent, ma-
lum. Quibus in dentibus circumcirca viscosa sunt, malum est subhiare, ac si-
xis oculis intendere. Qui in tibia ulcus habebat, & Attico usus est, huic pu-
stula elevata, rubra, magna, acque hoc pro tussi, quae postea accessit, prius enim
non tussit. In Aeno quicumque capite vulnerari horridi erant, maligni, & sup-
purati ex reuelino, ex peregrinatione, ac itinere dolor pedum, & in turbationibus
lassitudinis. Clinia cibum averians, colliquescens, purulentum, aliquando
parum eruentum, purulentum tumidum eiecit. Hippae uxor hydropica, quae
etiam per tres annos vere incipiente tussit, amplius autem suppurata est, ad hyme-
nem aquosa facta est, ab illis autem pharmacis curata melius habuit. Mortua est an-
cilla. Ex tussientibus qui manibus laborabant, velut servus ille, qui farramenta
obtorquebat, & Amyntas filius, ambo sola dextra resoluti cessaverunt, quando-
quidem perpessi sunt hoc tussientes. Qui vero aut equitabant, aut iter fecerunt,
in lumbis, ac semoribus resoluti sunt. Plurimae vero tussis siccatae erant, sin mi-
nus, violentiae sane. Uxor Emmyria modo non morbofo, abique febre, stupi-
da esse videbatur, postea ad tremorem totius corporis res ipsi devenit, & ad col-
liquationem, & cibi fastidium, ac sitim, & frigida erat. Nyctalopes, qui plurimum
minuissimus, postea parum quiddam mingebat. Verum tussientes, & insuper febrientes
ruberula ad aures habebant, erumpentia circa septimam, aut octavam diem.
Emmyria, filia febricitabat, & ex aure purulentum fluxat, circa octavam haud
pro comperto habeo. Quibusdam vero etiam deus corrosus fuit, tertius ma-
xime ex supernis. Prae omnibus autem hic reperitur corrosus, ad hanc do-
lor, & quibusdam etiam circumsuppuratio. Quibus vero ad aures, hi ma-
gis tussiebant, quam illi. Quibus autem cum febribus ad suppuracionem, septi-
ma recedit. Cuius postquam exacerbat fuit, praecordium solum non est, alvo
autem emollita, inerant poica subviscosa, compacta, non bona ulla eruenta co-
loris, spebat autem spiritum spirituosum. Ille, ad quem Cynicus me induxit,
septima exacerbat fuit, circa decimanonam iudicatus est. Disparesia, mala
fuit, pituitus fauces, pauca, lava, matura expuens, ex naribus parum sanguinis stilla-
vit, capite gravatus erat. Manuum, ac pedum dissolutio, alvus soluta profuit.
Pedes semper calidi, somni aderant ipsi, & iuxta aurem non eruberebat, quoniam
matura squisset. Demarati uxor, pedes etiam in horribus calidi, quae ad
suppuracionem, siue non tenderat, perit. Senex, qui a vita decessit, agrota-
bat simul cum uxore sua, furiosum quiddam in se habebat. Postea vero ubi pro-
disset ab ipsa lumbricus subcrassus, & modicus cibus, statim sedatus, & dormi-
vit, & sanus erat hic senex, & corporis curis euenientis, extremae partes fri-
gidae, molles, tremulus ab initio, & labus, & manibus, & voce, mente motus est,
moderate habebat, ac fixis oculis intendebat, non valde difficile spirabat, die-
bus haud scio quot ultra vixit mortuus est. Quibusdam praecordia, & al-
vus subegesserunt compressa, acervatum, non cum murmuracione, velut in Ab-
deris vetumum speciem per se ferentia. Quaequid contingit priore iudicato-
rios dies praecedente die, & mala, & bona signa sunt in diebus, quibus qui ex-
acerbantur, duriores sunt, & quibus desinentes remorantur. Quaedam non
fideliter allevantur, & quaedam per se ipsi exacerbantur. Spota peripneumonici-
cis quibusdam biliosa, quum desinere volunt. Valde flava brevia sunt. Si qua-
lia sunt, quae in principis aduasi, talia postea appareant, haec non valde conco-
qui puto, sed iudicare velut ei, qui apud praecptorem erat, & velut alias quoque
vidi. Naeippus in febribus per somnum semen effudit, & nihil ad peius proce-
dit, & hoc ipsum sopo ipsi factum est, & nihil laesit. Praedictum est ipsi id de-
sisturum, postquam febres iudicatae forent, & sic factum est. Critias in febrili-
tate ab infamias vexabatur, quae novissima, & cessavit etiam ipse eadem somnia-
re una cum iudicatione. Aescippus quum haberet haemorrhoides, a curatio-
ne prohibebatur. Curans insaniit, febre acuta succedente cessavit. In febrili-
bus acu-

- 415 bus acutis siticulosis, a medicis potu interdicto, aut etiam a se ipsis abstinentes, multum sibi bibere posse videntur, his aqua frigida dara ut revomant, prodest. Biliosa enim aderunt. Quod nervi ipsi in se ipsos trahunt, signum est. Si quidem enim nervi in supernis manus lauciati fuerint, manus deorsum notabit, dum ab infernis nervis trahitur. Si vero contra, vice versa. Tussient siccam tussim, qui testes affectos habent, & ex tussi vena secra, ad restem solutio fit, & inflammari tussione, & in febris ex inguinum tumoribus insuper tussione.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPULARIBUS.

LIBER V.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Inveni a liberaliore potatione curatio.
- 2 Peripneumonici delirantis symptomata. Ventris scissus, corpore a cibi vacuo, & ejus curatio.
- 3 Coxa, inguinis, & commissurarum dolor.
- 4 Præigo totius corporis, maxime autem costarum, & frontis. Hydropticus ex pruritu corporis & cutis crassitudine, post balneum calidorum usum. Cholera laborantes. Alvi scissum sibilis vomitus.
- 5 Adenses ad quadriennium suppressi, prætor valde modicos. Conceptus formella, mensibus annis quatuor impediatis. Superfuditio quadragesimo post partum die exidens.
- 6 Mulier caput circumcirca dolens. Sanguis mulieri pregnant, mense decimo prodians. Puer in utero mortuus, cum dextro brachio lateri adnato. Purgamenta alba.
- 7 Coxa, & ossis marcor.
- 8 Fronte percussus supra oculum dextram, & eius curatio. Vesica scabiosa, & urina viscosa.
- 9 Pregnans cibi fastidius. Bilis combusta vomitus præ cibi abstinentia. Penter inferior a medicamento ulceratus. Alvi scissus aqua multa fuerit alvi assusa.
- 10 Alvi, & intestini ulceratio a bile sponte commota. Hemorrhoides furæ, ac duntaxat. Alvi turbita in hemorrhoidibus, Cancer in hemorrhoidibus.
- 11 A tergo infra umbilicum sauciatus. Bilis subita, & nigra vomitus.
- 12 Coxa, & maxillæ rigida. Sanguinis vomitus. Dolor corporis totius post Ventris usum. Lapis in utero asper magnitudinis verticilli fusi.
- 13 Costa a curru causto contracta.
- 14 Saturnum lesio cognita difficilis, adeo ut Hippocrates ipse in capite quodam percussio se deceptum fateatur. Capitis vulnus.
- 15 Suppuratus infernum ventrem usus. Pomerum ossis tempore calidissimo. Ventris profusio mortuus. Coxa dolor acutus ab immunditia non purgata, & a prætor purgatione.

- 16 In anchoram incidens, ac ventrem sauciatus. Pharmacum purgans, suffocata longe postea datum, per scissum exiit. Deorsum multum purgatus. Purgatio per tres dies. Adnatus suppuratus usque ad cubitum.
- 17 A bile suffocatus. Ventrem, & hepar a nullo percussus. Cibi non deorsum prodians.
- 18 Pes marcore sua sponte corruptus. Penteris dolor a catapodio conceptus gratia sumpto. Frigida usus in ventris dolore.
- 19 Circa venteris dolor. a catapodio. Dentium dolor in phagedena ulcere corroso. Femoris punctiorem sine sanguine mors tercia die consequuta. Sagitta percussus iuxta inguen.
- 20 Cuspis ex inguine sexto tandem anno exempta postquam esset infixæ. Spicula retrosum infra collum percussus.
- 21 Perna dolor ex via aspera. Ad collum percussus. Pygo lata manu in scipus percussus mortuus.
- 22 Cibi fastidium citra febrem per duo menses. Gibbositas insipina ex phrenitide. Ex pharmaco ad satum perducendum mortuus. Origenem oculis, & dentibus malum. Vocis ex causa aliore intercepto.
- 23 Probelcus curandi per lac, & aquam ratio. Oculis incommoda. Lumborum, crurum, coxarum ex laboribus dolores. Inguina dura, exuberantia.
- 24 Caput lapide percussus. Faculo illum retro in latum. Hepar iaculo percussus.
- 25 Angina, Engastrimythi. Penteris in morbis quando suppurgandi, aut sursum.
- 26 Cubito vulneratus. Surditatis curatio. Maxilla ex dentis dolore in tumorem elevata curatio. Tuberculum in collo durum marginum, cradum, ac dolorosum.
- 27 Gingivæ dolor, ac tumor. Hydropticum curatio. Affectio cholerica susum, ac deorsum exento ex carnis esu &c. Diffusio in naves hyeme, Timocbari per Penterem suffocata est.
- 28 Febris cum sudoribus. Digiti index, & infernum ex dextera manu ab anchora contractum.
- 29 Luxatio infra in pede magis digiti. Oleum circa tibiam malleolum. Nervorum distentio ex cholericis affectuionibus.

Fecit

30 *Fortis interceptio, Tibicine timor noctu tantum.*

31 *Caculentem corpore exultum sibi videri. Pontem, aut scrobem non transiens &c. Oculi dextri affectio, velut sudor eluens. Tristitia, ac decedendi e vita cupiditas.*

32 *Asente mota ex capitis dolore. Serpens Arges appellatus per os adolescenti ebrio ingressus. Horror ex potationibus.*

33 *Dysenteria ante partum. Coxa dolor in morbo articulari, mensibus non predeventibus.*

Humeri dolor, & gravitas in brachio. Pulula velut cuticulae morsus.

34 *Catapulta, in pectus percussus, in dorsum percussus.*

35 *Frontis denudatio, cutis ab affluu citius pui discedens. Sagitta in superiorem ventrem percussus. Maxilla marcor ex dentis dolore.*

36 *Carcinoma circa pectus. Capitis dimidiis dolor ex diffinitione. In partu conculsa. Anginosa. Hydropicus voce repente defectus.*



N Helide Olitoris uxor: febris corripuit ipsam acuta, & medicamenta bibens nihil sentiebat opis. In ventre infra umbilicum erat quid durum, & altius altero, & dolores exhibebat fortes. Huc enim manibus cum oleo fortiter compressum, ac emollitum est, & postea sanguis frequens ipsi deorsum processit, & sanata est, & vixit. In Helide Timocrates amplius bibit. Infans autem ab atra bile, bibit pharmacum. Hic purgatus est, purgatio multam pituitam, ac bilem atram egerebat per diem, & ad vesperam purgatio cessavit, & dolorem pertulit in purgatione multum, & quum potentiam bibisset, somnus ipsam corripuit, & tenuit per noctem, donec sol oriretur. In somno autem presentibus nihil respirare videbatur, sed mortuus esse, & neque quid diceretur, neque quid fieret, sentiebat. Extentum autem fuit corpus, & rigidum. Verum vivebat, & excruciatum est. Scomphus in Oeniadis pleuritide correptus, mortuus est septima delirus. Pharmacum autem bibit infra purgans, priore ante potionem die mentis compos erat, & purgatus est non multum, quum autem purgaretur, deliravit. Phoenici in Oeniadis, & Andree fratribus maxilla alvea intumuit, & labium, quod est ante maxillam, & oculum, & neque intus nec quicquam spectanti apparebat, neque totius faciem supparabat. Sed tumens arida putredine putrescebat. Et alter eadem percussus est. Mortuus est autem alter septima die, & pharmacum bibit, & nihil profuit. Verum Phoenici circulus putridus exsectus est, & ulcus purgarum est magna ex parte, priusquam moreretur. Mortuus est autem & hic, ubi durius vixisset. Eutidamus in Oeniadis in peripneumonia decima die incepit delirare. Curatus ad mentem rediit, & spura erant puriora, & motus ad melius procedebat, & somno multo perturbatus est, & oculi morbum regium contrahebant, & inortuus est ad viginti dies. In Oeniadis vir quidam morbo tenebatur, quum sine cibo esset, fortiter in ventre ipsius iugebat, & dolebat, & quum edisset, ac cibi contrarii essent, tempusque post cibum accessisset, non longe postea idem hoc pariebat, & tacebat corpus, ac consumebatur, & alimentum ipsi non continebat a ciborum usu, & per alvum secedebat cibus pravus, & combustus. Quum vero recens cibum accepisset, eo ipso tempore imimine iugebat, neque dolor aderat. Hic omnis generis pharmaca bibens sursum, ac deorsum purgantia, nihil opis sentiebat. Ubi vero vena ipsi secta esset in utraque manu, donec exanguis redderetur, postea utilitatem percipit, & a malo liberatus est. Eupolemus in Oeniadis dolebat coxam dexteram, & inguen, & commissuram propinquam ad coxam, ab inguine, & coxa in anteriore parte. Huic sanguis detractus est a talo, multis valde, & niger, & crassus, & pharmacum bibit alvum deorsum purgans, & multum purgatus est, & melius quidem habebat. Dolores autem non remittebant, sed suppressam habebat & coxam, & commissuram in ipsa ad sedem, & partem circa inguen, quibus locis etiam amplius dolebat. Pus autem ad os magis fiebat, quam ad eam, in profundum, & per tempus sic habens negligebat, donec valde debilis fiebat, postea crusta ipsi inusta sunt, valde multa, & magna, ac inter se propinquas. & pus effluxit multum, ac crassum, & mortuus est postea paucis diebus tum pre magnitudine, ac multitudine ulcerum, tum ex corporis debilitate. Huic si una ampla sectio incisa fuisset, & per sectionem pus emissum esset, & si opus fuisset, etiam altera sectio facta esset, hæc sane in tempore si facta fuissent, mihi quidem videtur, quod sanatus esset, Lycón in Oeniadis reliqua quidem eadem patiebatur. Verum dolores etiam ad eris non ita valde progrediebantur, & non factus est suppuratus, sed sanus multo tempore. Bibeat autem pharmaca, & cucurbitas adhibeat, & venam secabat. Atque his factis, melius habere videbatur. Homo quidam Athenis prurigne toto corpore vexabatur, maxime autem testibus, ac fronte, vexabatur autem valde vehementer, & cutis crassa erat per totum corpus, & velut lepra aspectu, & ex nulla parte cutem apprehendere potuisset pre crassitudine. Huic nemo opulari potuit. Transgressus anem ad Melum, ubi sunt calide balneæ, & cutis crassitudine liberatus est, verum hydropicus factus mortuus est. Athenis virum cholera corripuit, vom-

- vomebatque, & deorsum egerat, & dolebat, & neque vomitus, neque per alvum feces sili poterat, & vox ipsum destituebat, & ex lecto moveri non poterat, & oculi caliginosi, ac cavi erant, & convulsionem tenebant ab alvo, & intestino, & singultus. Verum feces multo copiosior erat, quam vomitus. Hic vetatrum in lentum succo bibit, & alterum lentum succum insuper bibat, quantum potuit, & postea vomuit, & coacta sunt, ac adstricta ipsi ambo. Frigidus autem factus est, & lavabat inferne usque ad pendula, calida valde multa, donec etiam supernae partes calefactae sunt, & vivebat, postera vero die polentam bibit ex aqua. * In
- 65 Larissa uxori Gorgiae menses suppressi erant per annos quatuor, praeter valde modicos. Verum in utero, ad quamcumque partem se inclinasset, pulsus exhibebant, ac gravitatem. Haec mulier concepit, & peperit, & puella viva nono mense edita est, ulcus habens in coxa, & secunda consequentes, ac sanguinis fluxus valde multus successerunt. Postridie, & tertia die, ac quarta etiam grumi sanguinis concreti, & febris tenebat usque ad decem primos dies, & de cetero prodit ipsi sanguis ruber, & facies fortiter intumescerebat, itemque tibiae, ac pedes ambo, & alterum semur, & cibos non admittebat. Sirm autem habebat vehementem, & frigidissima aqua conferebat. Vinum autem nequaquam. At vehet post primum puerum modice emollitus est, valde autem non confidit, sed durior erat, dolor autem non aderat. Quadragesima veto die a prima superforatio exiit, earunculae quaedam, & venter considit, omnesque tumores, & fluxio tenuis, ac sanguis olens prodit, & sana evasit. * Mulier in Pheris caput circumcirca dolebat multo tempore, & nemo poterat illi quiequam opis conferre, neque dum caput purgaretur. Melius autem habebat, quum menses ipsi facile prodibant. Haec quum caput doleret, ex subditiis odoratis ad uterum appositis opem sentiebat, & modice depurgata est, & quum concepisset, dolores caput relinquebant. Mulier in Larissa praegnans erat. Huic decimo mense sanguis prodit multus per quatuordecim dies. Plurimus autem tribus diebus ante pueri editionem. Decima quarta excidit ex utero puer mortuus, habens dextrum brachium lateri adnatum, & tertia die noctu eadem hora, qua puer, prodit secunda, & purgamenta alba deinde post haec per tres dies, ac noctes multa moderate prodierunt. Postea febris corripuit per duos dies, totidemque noctes, & dolebat omnem ventrem, & coxas, maxime vero pectinem. In Larissa Hippocrati peripneumonia apprehensus esse medicus videbatur, erat autem nequaquam, verum principio lucens in duro loco cecidit supinus, adversario ipsi ilapso, & lavatus est frigida, & coenavit, & gravior factus esse sibi videbatur. Sequenti autem febricitavit, & tussis apprehendit sicior, & spiritus densus. Quinta die cruentum excrevit, non multum, & delirare incipiebat. Quando tussiebat, dolebat pectus, & dorsum. Sexta autem ubi sternutasset, sanguis fluxit & naribus quatuor heminarum mensura. Ad vespertam neque loquebatur, neque sentiebat, neque quid fieret, neque quid diceretur. Undecima mortuus est. Per quinque vero dies modo sapiens erat, modo non. Erat & sine febre. Spiritum autem nullum recipiebat, neque stercorem habebat. Non enim erat sputum. * Scamandrus in Larissa & in coxa marcorem habuit, & in osse diu disparato. Ipse vero sectus est sectione magna, etiam ad os ipsum, & postea usus est, & tunc die duodecima post sectionem cepit convulsio, & valde obtinuit, convellebatur autem crus hoc usque ad costas, & ad aliam quoque partem convulsio progrediebatur, flectebatur autem crus, & extendebatur, & alia membra movebat, & maxillae compactae riguerunt. Hic mortuus est convulsus octava die post convulsionis invasionem. Curabatur autem tepectactoriis utriculis, & somentis ervi per totum corpus, & insusum per clysterem immisum est, & tunc modicum stercoreis prodit, & pharmacum bilem abunde purgans bibit, ac insuper cataplorum deglutivit, & fecerit quidem, nihil autem a cataploro opis sensit, & somnus modicus venit, & tussis pharmacum idem foris ad vespertam bibit, ac sole emergente mortuus est. Videbatur autem multo tempore morbum ferre potuisse, nisi ex pharmaci vi perisset. * Equisio Palamedis in Larissa undecim annorum percussus est in frontem supra oculum dextrum ab equo, & videbatur os non sanum esse, & exiebat ex ipso modicus sanguis, & sectus est sectione magna usque ad secundam laminam, & curabatur sic habens ipsum os, quod etiam antea statim os peperit. Vigesima tumor cepit circa aurem, & febris, & rigor, & in die magis intumescerebat, ac dolebat tumor, & ab initio febricitavit ex rigore, & oculi intumuerunt, & frons, & tota facies. Patiebatur autem haec in dextra magis capitis parte. Progressus est autem tumor etiam ad sinistram, nihil tamen hic laesi. Denique febris continua corripiebat. Atque haec minora erant usque ad octavam diem. Vixit autem usus, & per cataplorum purgatus, & cataplasmate tumori imposito. At vero ulcus nullius mali causa erat.
- 120 In Larissa Theophorbi filius vesicam scabiosam habebat, & viscosam urinam mingebat, & dolebat, dum & inciperet mingere, & dum desineret, & confricabat podendum. Hic quum bibisset pharmacum urinam eiens aere, in vesicam quidem nihil processit, verum multum purulentum, & bilem evomit,
- 125 & deorsum alia huiusmodi egerat, & venter dolebat, & intussecus at-

- debat. Reliquum vero corpus frigidum erat, & totus resolutus est, & nihil alsumere volebat. Huic exulceratus est venter fortiter valde a vi medicamentis, & mortuus est tertia post potionem die. * Uxor Antimachi in Larissa 9
9 prægnans erat diebus circiter quinquaginta, & reliquo tempore præ fastidio a cibo abstinebat, & per septem dies uterum dolebat, & cor, & febris eorripiebat. Eo tempore nihil per alvum egerebat. Huic datum est catapotium deorum purgans fortius, quam conveniebat, & evomit bilem combustam, præ cibi abstinentia, & febre. Nam neque ullo potu utebatur. Evomit autem paucam violentem, & grumosa, & ubi concitata fuisset, ac ipsam emisisset, debilis esse videbatur, & non volebat aquam bibens evomere. Postea vero dolor fortis tenebat infernum ventrem, exulceratus enim erat a medicamento, & prodibat ipsi statim post ster- 135
cus, suberuentum ramentosum. Semper autem amplior fiebat, & debilitas, & cibi fastidium, & purgamenti erant heminae quinque. Siscebatur autem alvus aqua multa super ventrem affusa, aliud autem nihil potuit admittere. Mortua est circa mediam noctem. Videbatur vivere potuisse, si aquam bibere potuisset, ac statim vo- 140
10 mere, priusquam deglutivisset. * Famula Onesidemi in Larissa ulcerata est al-
vum, & intestinum a bile sponte commota, & prodibat sursum, ac deorsum bilis, & sanguis, & febris tenebat. Huic debili datum est pharmacum deorum purgans in potu, debile, aquosum, ac modicum, & vomuit ab ipso multum, & infra amplius subiit, & vesperi rediit. Postridie febris erat, sed debilis. Alvus autem ulcera- 145
batur, & adhuc eadem egerebat. Tertia die ad vesperam mortua est, quum febris valde fortis ipsam corripuisset. Quapropter cunino moritura esse videba-
tur. Minime vero ideo, quod aquam frigidam biberat, donec vomitus tenebat. Postquam autem perfrigeratus est supernus venter, depurgatus per aquam, steco-
frigidum postea potu, sic postea insusum per clysterem immisum est. Eude- 150
mus in Larissa, hæmorrhoidas habens fortes, ac diuturnas, quum exanguis es-
set, bilis commota est, sed leniter in corpore, & alvus turbata deorsum biliosa egerebat, & hæmorrhoides intumescabant. Pharmacum deorum purgante potu, probe depurgatus est, et rursus bibit succum, et amplius alvis turbata est, et dolor ad præcordia consiltebat. Huic quum venter non probe haberet, sed adhuc 155
curatione indigeret, manus hæmorrhoidibus admotæ sunt, et vomuit. Postea quum cancer successisset, febris irruit, et non dimisit, antequam occideret. Quan-
doque etiam quum rigor subrepens dimisisset, febris venit, et prodit ipsi bilis, et status, et partim prodibat, partim intus erat, et dolor in ventre. Hæmorrhoides autem extra intestinum rectum erant, reliquo tempore a purgationibus suspensæ, 160
ræ, et status per ipsas prodibat, et ad sternutationem principium fiebat. 165
11 * In Larissa vir quidam faucibus est cominus ex manu per hastam latam a tergo, et summum eius penetravit infra umbilicum per multum spatium, quod lividum erat, et tumidum. Postquam autem vulneratus fuit, dolor obtinebat primum fortis, et venter intumescerebat. Huic postridie datum est pharmacum deorum pur-
gans, et egressit modicum cruentum, et mortuus est. Videbatur intestina hu-
jus non esse sana, et venter sanguine plenus esse. Apellus Larissæns ara-
tem habebat annorum circiter triginta, aut parum aberat. Corripiebatur autem morbo, a quo vexabatur noctu magis in somno, quam interdum. Agrotabat au-
tem ad duos annos ante mortem. Vomebat bilem sulvam aliquando ubi excita- 170
tus esset. Vomebat etiam nigram. Hic purgatione a capite forti valde ad mul-
tum tempus purgabatur, et quum pharmacum bis bibisset, sex menses ipsius penetravit. Erat valde vorax multi cibi, et quum corpus haberet biliosum, mul-
tum luctatus, valde fignit, et febris corripuit, ac motus ad noctem, postridie 175
sanus esse sibi videbatur, et rursus altera die. Sequenti vero nocte motus inva-
sit cœnanti a primo somno, et per noctem, ac diem, et usque ad cœnari re-
nebat. Morbus est, priusquam resipisceret. Convellebatur primum circa de-
xtras partes, faciemque, ac reliquum corpus, postea in sinistris, et quum videretur quiescere, soporem habebat, ac stertebat, et rursus succedebat morbus. 180
12 * Eunelius Larissæns rigida habuit crura, et manus, et maxillas, et non pote-
rat necque extendere, neque flectere, si non alius flecteret, ac extenderet. Et neque maxillas diducere poterat, si non alius diduceret. Aliud vero nihil neque dole-
bat, neque edebat, nisi mazam, et aquam mullam bibebat. Vigesima die sedens 185
cadit supinus, et caput ad lapidem vehementer offendit, et vertigo ipsi caliginosa offusa est, & paulo post surgens, sanus erat, et solita erant omnia, præter-
quam post somnum, ubi excitaretur, articuli modice ligati erant. Erat autem duodecim, aut tresdecim jam annorum, et agrotavit mensibus tribus, aut qua-
tuor. In Larissa virgo, quæ sanguinem vomuit non multum, suppurata facta, febris eorripientibus, non liberabatur, priusquam moreretur. Mortua est ter-
tio mense. Ante mortem vero obsiderunt ei aures, et non audiebat, nisi 190
13 quis valde exclamasset. Verum ante sanguinis vomitum debilis erat. Fa-
mula Dyslerides in Larissa, quum juvenula esset, ubi venere uteretur, fortiter circumcirca dolebat. Alias autem sine dolore erat. Concepit autem nunquam. Et quum sexaginta esset annorum, dolebat a meridie, velut ex partu vehementer la-
boraret,

- 195 boraret. Hæc quum ante meridiem portum edisset multum, postquam dolor ipsam corripuit vehementissimus, & priores omnes excedens, eurgens asperum quiddam in ore uteri deprehendit, postea quum ipsa animi deliquium incideret, alia mulier, immissa manu, expressit lapidem asperum, magnitudine verticilli fusi. Et sana tunc statim, & postea erat. * Malienſi curus onustus 13
- 200 inductus est supra costas, & costas confregit, & per teipsum subſtitit ipſi pus infra costas. Uſtus ſub ſplenem penicillis, ac linamentis utebatur, & pervenit ad decem meſes. Reſecta vero cute, caveria apparuit ad renue inteſtinum utrinque procedens, & ad rhenem, & ad oſſa procedebat putrida. In hoc non animadverſum eſt, quod & corporis habitus bilioſus erat, & in corpore putredo ſicca tenuis inteſtini multa, & aliarum earum, quas ſtatim eiecere oportebat, ſi quis poſuiſſet ſiccæ pharmaco, dum robur aliquod homo habebat. Nam ab humidis nihil remittebant, ſed putreſcebant. A linamentis vero inditis quum humor ſiſteretur, rigor corripiebat, & febris, & magis putreſcebat, aſſuebat autem iſthic putridum quiddam, ſubnigrum, graveolens. Præſequam vero curationis aggreſſio fieret, quotidie multum foras penetrabat. Erat autem non probe ſtuidum. Cognitum eſt naturam morbi eſſe magis remotam, quam ſubter cutem. Quod ſi vero etiam omnia recte facta eſſent, tamen non videbatur fervari poſſe, etiamſi ventris proſuvium ipſum corripuiſſet. * Autononus in 14
- 215 de ex manu iſtius, in ſuturas in medio ſincipite. Quare non animadverſi ipſum ſecari opus habere, deceperunt enim me ſuturæ habentes in ſe ipſis jaculi leſionem, poſtea enim conſpicuum id fiebat. Primum quidem ad claviculam, poſtea ad latus dolor fortis valde, & evulſio ad ambas manus venit. In medio enim capitis, ac ſincipitis ulcus habebat. Sectus eſt autem die decimaquinta, & pus prodiit non multum. Membrana vero cerebri imputreſcæta apparebat. Faſcula in Ohilo ex capitis vulnere, duodecim annos nata, moritur in media ætate, decimaquarta die. Januam quidam ipſi impegerat, & os conſtruderat, ac ruperat. Sutura vero in ulcere erant. Quare cognitum eſt recte ſectione opus habere. Secta eſt autem, non velut oportebat, ſed quantum relictum eſt, pus in ipſo factura eſt. Octava, rigor, febris invaſit, habebat autem, non velut oportebat, ſed quantum etiam prioribus diebus quando febris non tenebat. Nona vero die reliquum reſectum eſt, & valde modicum pus cum ſanguine ſubtus apparuit, & membrana cerebri pura erat, & ſomnus quidem occupabat, febris autem non dimittebat. Convulſio vero manum ſiniſtram invadebat. Nam in de-
- 230 xtris magis ulcus habebat. * Cyrenius in Ohilo ſuppuratus factus, infernum ventrem uſtus eſt, triginta diebus ſerius quam oportebat, & manſiſſe ſe habebat, & reſecatum eſt pus in venere. Verum in calidiſſimo tempore edens fructus pomorum, & alios cibos non conferentes, a ſecbe correptus eſt, & a ventris proſuvio, & mortuus eſt. Hecaton in Ohilo, velut etiam alter ſerius uſtus eſt, attamen reſecatus eſt venter, modico excepto. Dyſenteria vero arripiebat ipſum, quam ubi effuſiſſet, omnia edebat, donec totus mutuit, & erupit ipſi pus deorſum, & ventris proſuvio mortuus eſt. Hecaton in Ohilo, ab immunditia non purgata, & a prava purgatione, dolorem acutum in coxa habebat, & hic quidem diſceſſit, ſucceſſerunt autem ipſi febres, & multo tempore in lecto decumbebat, neque bibens quicquam, neque ſiticens, & debilis, & horridus. Huic commode quidem ablatus eſt morbus, velut conveniebat. Opem autem percipiebat ex his, quæ offerebantur. Tandem vero erupit morbus deorſum, & totus ſeceſſit præ multa bile, & mente motus eſt, & mortuus. Videbatur autem morbum evaſurus eſſe, * Qui in Salamine in anchoram iniecit, 16
- 245 in ventrem ſauciatus eſt, & circumſcirca dolebat. Bibit autem pharmacum, & non egreſſit deorſum, neque revomuit. Mulier, quæ jugulavit ſe ipſam, ſuffocabatur, & datum eſt ipſi longe poſtea pharmacum deorſum purgans, & per ſeceſſum ipſi exiit. Qui ex Euboea venit adoleſcens, quum multum eſſet deorſum purgatus, intermiſſione facta, quictus febricitavit. Deinde quum pararet ſe purgatione ſurſum verſus opus habere, non validam radicem veratri bibit, & poſt potionem quarta die mortuus eſt, nihil expurgatus. Verum ſomnus ipſum tenebat, & ſitis ſedari non poterat. Serva illa, cui a catapotto ſurſum quidem pauca prodibant, ac ſuffocabant, deorſum vero multa, nocte mortua eſt. Erat autem barbara. Quidam homo Eubæus poro pharmaco deorſum purgante, per tres dies purgabatur, & mortuus eſt. Habebat autem manum ſuppuratam uſque ad cubitum, * Symmachi filius a bile ſuffocabatur noctu quum dormiret, & febris eum teneret. Pharmacum autem, ubi biſiſſet, non continuit, neque purgatus eſt diebus ſex, antequam moreretur. Qui juxta curiculum habitabat, quum noctu ſanguinem vomuiſſet, poſtridie mortuus 17
- 260 eſt, ſanguinem vomens multum, & ſtrangulatus. Ad ipſem vero, & deorſum multus ſanguis ipſi prodibat. Puer a mulo percuſus ventrem, & hepatis, mortuus eſt quarta die. Spiritum autem denſum habebat, & non intelligebat quicquam, & febris tenebat. Hermophili filius ægrotabat diebus undecim.

- eim. Febris autem tenebat, & cibi non deorsum prodibant, & primum quidem deliravit, nocte vero cessavit. Sequenti autem die voce destitutus jac-
cebat stertens, distortos habens oculos, febricitans. Penna vero immixta vomuit bilem atram, & quum infusum per clysterem immisissum esset, stercus pro-
dixit multum. * Setvæ Aristionis pes sua sponte marcere corruptus obor-
puit, iuxta medium pedis intrinsecus ex obliquo; & ossa putrida facta abscesse-
runt, & prodibant paulatim fistulosa, & ventris profluvium succedebat, & mor-
tua est. Mulier sana, crassa, a catapotio conceptus gratia accepto, dolorem
habebat ventris, & tormen in intestino, & intumuit. Spiritus autem sistebatur,
& desperatio erat cum dolore, & sanguinem vomuit non multum, & emortua
est quinquies, ut vita decessisse putaretur, & neque vomitu facto ab aqua frigi-
da laxabatur, neque dolor praesens, neque spiratio. Superfusus vero sunt ipsi
quæ frigidae amphoræ circiter triginta super corpus, & sane hoc solum prodes-
se videbatur, & postea deorsum processit bilis multa. Quum autem dolor obti-
neret, nihil poterat secedere, & vixit. * Antander a catapotio accepto, cate-
ria sanus erat. Verum circa vesicam dolorem habere videbatur, purgavit ipsam
celeriter multo purgamento, & a meridie dolor tenebat fortis valde, & in pos-
teram diem strangulatio, & desperatio, & jactatio, & vomebat, & nihil per se-
cessum egerebat, & noctu pariebatur, & somnus non accedebat, postridie ve-
ro egerebat multum, & postea sanguinem, & mortuus est. Athenæda pue-
ro masculo a Phagedæna ulcere corroso, doluit a sinistra parte dens infernus, a
dextra supernus. Hujus auris dextera suppurata est, dum non amplius dole-
ret. Sutor in Pityo, dum soleas veteramentarias fueret, pupugit se ipsum supra ge-
nuum in femur, & ferre longum digitum immerisit. Huic sanguis quidem nul-
lus effluxit. Vulnus autem cito clausum est, femur autem totum in tumorem ele-
vabatur, & procedebat hic tumor usque ad inguen, & lateris molitudinem. Hic
tertia die mortuus est. * Quidam iuxta inguen ligitra percussus, quem nos vidi-
mus, maxime præter omnem opinionem servatus est. Neque enim cuspis exem-
pta est, erat enim valde in profundio, neque sanguinis eruptio ulla memorabilis
hiebat, neque inflammatio, neque claudicavit. Cæterum cuspidem invenimus nos,
ipsamque exeminus, quum sex iam essent anni, ex quo fauciatus erat. Suspicio au-
tem erat hæc, inter medios nervos cuspidem occultatam fuisse, nullamque venam,
aut arteriam dissecam esse. Qui percussus est spiculo acuto retrorsum paulo
infra collum, vulnus quidem habebat non memorabile aspectu, neque enim in
altum ferebatur, verum non multo tempore postea exempto spiculo, distendeba-
tur in posteriorem partem tractus, velut opisthotonici, & maxillæ fixæ erant, &
si liquorem aliquem in os sumeret, eumque deglutire conaretur, rursus relideba-
tur ad nares. Cæteraque statim pejora fiebant, & secunda die mortuus est. * Ado-
lescens per asperam viam cursu facto, dolebat pernam, maxime inferna parte.
Abscissum autem locus accepit nullum, velut qui colligeret humorem. Verum
tertia die totus locus nigrescebat usque ad talum, astragalum appellatum, & us-
que ad cavitatem, quæ est ad pectus pedis, & quod denigratum erat, non diffinge-
batur, sed prius moriebatur. Vixit vero dies ex toto a cursu vixit. Qui ad oc-
culum percussus est, percussus quidem est in palpebram, descendens autem cuspis
alte satis, barbæ vero summum supereminēbat. Secta palpebra, subalta sunt o-
minia. Nihil erat mali. Oculus enim permanfit, & compendio sanus factus est.
Sanguis autem effluxit large, & multa copia. Virgo illa pulchra Neris fi-
lia, erat quidem annorum viginti, verum a muliercula amica ludente, lata manu
perculsa est in sciniput, & tunc quidem verrigine capta est, & sine spiritu erat,
& quum ad domum venisset, statim febris vehemens corripiebat, & caput do-
lebat, & rubor circa faciem erat. Septima die circa aurem dextram pus proce-
ssit graveolens, subrubrum, amplius cyatho, & videbatur sibi melius habere, &
allevata est. Rursus augebatur febris, & in soporem deferebatur, & loqui non
poterat, & faciei pars dextera trahebatur, & difficulter spirabat, & convulso, ac
tremor aderat, & lingua derinebatur, & oculus stupidus erat. Nona mortua est.
* Cleomenis filius hyeme initio facto cibum aversabatur, & ejus fastidio ci-
tra febrem vexabatur, & vomebat cibos, ac pituitam, & per duos menses cibi
fastidium durabat. Coco in spina gibbositas facta est ex phrenitide. Huic
nulla medicamenti potio conferebat. Verum vinum nigrum, & panis eius, &
balnearum abstinentia, & strictio, & lenis solus non eum multo somento, sed
placide. Cuidam, quæ circa vigesimum ætatis annum biberat pharmacum
ad solum perendum, accidit dolor, vomitus, biliosorum, malarum, pallido-
rum, ac prasinorum. Quum bibisset, convulso tenebat, linguam commovebat.
Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum, & erat ei lingua magna, nigra. O-
culorum autem alba erant rubra, infans. Quarta mortua est ad noctem. Ori-
ganum potum oculis, & dentibus malum est. Puella, quæ de rupe cecidit,
voce destituta, jactatio aderat, & vomuit ad noctem sanguinem multum, quum
ad sinistram aurem impigisset, amplius inde fluebat, Aquam mulsam difficul-
ter deglutiebat, stertor, spiritus densus, velut morticinium. Venæ circa faciem

- differt, decubitus supinus, pedes supidi, febris debilis, vocis interceptio. Septima vocem ruit, calores sequiores tenebant, supellex mansit. * Pythoelis 12
- 335 agrotantibus aquam, & lac multa aqua ammixta dabat. Perniones per-
tundendi, & calefaciendi sunt pedes, sic ut maxime exalefacias igne, & aqua.
Oculis incommoda sunt lentacula, fructus pomorum dulces, & olera. Dolori-
bus circa humeros, & crura, & coxam ex laboribus obortis, aquae marinae,
340 ac etque calidum fomentum confert, ita ut vel aspergas, vel spongiam his im-
butam adhaereas. Deligare vero oportet lanis succidis, & pelibus agnitis. Ful-
lonibus inguina extirperabant dura, & sine dolore, & circa pubem, & in collo
similia erant tubercula magna; febris ante decimum diem, Tussi vexabantur a
ruptionibus. Tertio mense, aut quarto venter colliguit. Calores successer-
unt, lingua sicca, fuit, egestionis deorsum malignae, mortui sunt. * Qui la- 14
- 345 pide in caput percussus est a Macedone, & corruit, tercia die voce destitu-
tus erat; anxietas, febris tenuis, pulsus non valde in temporibus. Nihil om-
nino audiebat, neque sapiebat, non querus, sed quarta movebatur; humiditas
circa frontem, & sub nasum, & usque ad mentum, & mortuus est. Enia-
tes in Delo iaculo ictus retro in latum in sinistra parte, ulcus quidem sine do-
350 lore habuit. Tertia vero ventris dolor vehemens; non egerebat, insulsum vero per
clysterem immisso, stercus prodiit ad noctem, afflicto intermittebat. Sedes ad
scorum extrabat. Quarta & ad pubem, & ventrem dolor irruerat, quie-
scere non poterat, biliosa vomuit abunde colorata, Oculi quales animi deli-
quium incidentium. Post quintum diem mortuus est. Calor quidam tenuis inerat.
- 355 Ei, qui hepar percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum, per cor-
pus diffusus est, oculi cavi, anxietas, molestia, Mortuus est, priusquam concio
solueretur, quum sub diei exordium percussus fuisset. * Polemarchi uxori hye- 25
me anginosae, tumor sub gurgure, febris multa, vena secta est, cessavit suffo-
gatio ex faucibus, febris conuabatur. Circa quintam genu dolor, ac tumor si-
nistri, & circa cor videbatur ipsi aliquid colligi, & respirabat velut hi, qui sub-
mersi fuerunt, respirant; & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore loquun-
tur, Engastrimyrihi, quasi ex ventre loquentes, Graecis appellari. Tale quiddam
contingebat. Circa septimam, aut nonam ad noctem alvus deorsum prorupit,
& multa liquida, quae mala putantur, egressit. Ipsa vero voce intercepta, mor-
365 tua est. Venter subpurgare oportet in morbis, quum matura fuerint, infra qui-
dem, ubi confidisse videris. Signum anxii, si neque anxii, aut capite gravati
fuerint, & quum calores mitissimi fuerint, aut quum post exacerbationes ces-
sant. Sursum vero in exacerbationibus. Tunc enim etiam sua sponte elevan-
tur, quum anxii, & capite gravati fuerint, ac se iactant. * Ex casu vulne- 26
rato cubito, ossi corruptionem cubitus suppurat. Quum autem iam maturus
est, viscosa sanies exprimitur. Velut etiam Cleogenico, & Demarcho Aglaote-
lis filio. Similiter autem, & valde ex iisdem pus nullum. Velut Aeschyl-
li filio contigit. Suppuratis autem plurimis horrore, & febris succedebat.
Parmenici filio surditas accidit. Contulit clysterem agricolarium non adhibe-
re, verum lana solum indita perpurpare, & oleum infundere, aut netopum.
- 375 Praecipere vero, ut deambulet, mane surgeret, & vinum biberet album.
Aspasi uxori dolor dentis vehemens, & maxilla in tumorem elevatae sunt.
Quum vero castorium, & piper collueret, opem sentiebat, Callimedonitis
pietro contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, &
380 crudum, ac dolorosum. Sectio venae brachii, & lini torrefacti cataplasma im-
ponere subactum vino albo, & oleo amburum, ita ut deligeret neque calidum, ne-
que valde doctum. Aut cum aqua multa coquantur fœni graeci, aut hordei, aut tri-
tici farina. * Melissandro quum gingiva dolore corripere, & vehementer in-
tumesceret, sectio venae brachii, & alumen Aegyptium in principio sedabat.
- 385 Hydriopium labribus sarigari oportet, sudare, panem edere calidum, in
oleo bibere, non multum lavari, & caput tepide. Vinum autem album, & tenu-
e, & somnus auxiliatur. Biantij pugili quum natura vorax esset, contigit ut
in affectiones cholericas, bili sursum, ac deorsum exeuntis delaberetur, ex carnis
esset. Maxime vero ex porcinis caribus crudioribus, & ex ebrietate vini odorati,
390 & placentis, ac dulcariis ex melle, & cucumere, peponis, & lacte, & polenta re-
centi. In aestate vero affectiones cholericæ, et febres intermittentes. Timocha-
ri hyeme destitutio, maxime in naves, quum vendere usus esset, refecti sunt om-
nia, lassitudo, calor successit, caput grave, sudor a capite multus, desinebat au-
tem et per totum corpus. Erat autem etiam sanis sudare aduersus. Tertia die evasit sa-
nus. * Post canem febres fiebant sudorosas, et non persisterant omnino post
395 sudorem, sed rursus amplius incalecebant, et longae, et leniter sine iudicatione, et
non valde siticulosae, paucis in septem, et novem diebus cessabant. Undecima, et de-
cimaquarta, et decimasextima, et vigesima iudicabantur. Polycratem feb-
bris invadebat, et sudor qualis praescriptus est. Purgatio a pharmaco deorsum
400 facta est, et febris erat lenis. Rursus in temporibus sudores parvi, et circa collum
ad vesperam. Deinde in totum, et rursus incaluit. Circa duodecimam, et decimam
quartam

- quartam diem febris augeſcebat, & ſecceſſus pauci, poſt purgationem ſorbitionibus uſus eſt. Circa decimam quintam ventris dolor circa ſplenem, & lateris mollitudinem ſiniſtram. Calidiorum adhibitiones minus proſuere, quam frigidorum. Quum autem lenis, ac molli per clyſterem inſuſo uſus eſſet, dolor ceſſavit. Magnæ navis gubernatori anchora digitorum indicem, & infernum os dextræ manus conſegit, inflammatio ſuccceſſit, & marcor, & febris. Subpurgatus eſt moderate. Calores lenes, & dolores, de digito quid decedit. Poſt ſeptimum diem fanies exibat lenis, poſtea per linguam dixit ſe non omnia poſſe enunciare. Prædictum eſt opithotonum adventare. Ad hoc conſerebant maxillæ conſertæ, & ad collum rigidæ. Tertia vero die totus convellebatur in poſteriorem partem cum ſudore. Sexta a prædictione mortuus eſt. * Harpali filius ex liberta Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepit, inflammatus eſt, & doloroſus erat, & ubi reſpoſitus eſt, & dolor remiſit, proſciſcebatur ad agrum, rediens lumbos doluit, lavit, maxillæ ad noctem conſerebantur, & opithotonus aderat. Saliva ſpumola vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus eſt. Thrinon Damonis filius habebat circa tibiz malleolum ulcus juxta nervum ſane jam purum. Huic a pharmaco corroſo contigit, ut opithotonum moteretur. Proſecto in omnibus ſuppurationibus, & hiis, quæ circa oculum ſunt, dolores ad noctem. Tuſſes hyeme, maxime in anſtrinis, craſſas, & multa alba exſeuerantibus, & febres ſuccedebant leniter, & quinta die ceſſabant. Tuſſes autem circa quadraginta, velut Hepeliſoli. Eutychedes ex cholericis affectionibus, in cruribus ad nervorum diſtentionem deſivit, una cum ſecceſſu deorſum. Bilem multam abunde coloratam vomuit ad tres dies, ac noctes, valdeque rubram, & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat neque ex porribus, neque ex cibis, & urinae, ac tranſitus deorſum ſuppreſſio multa. Per vomitum ſex mollis prodit, & deorſum quoque erupit. * Androphani vocis interceptio, ignorantia, delirium. Hiſ ſolutis ſupererat adhuc diu multis anniſ, & recidivæ fiebant. Lingua vero per totum tempus permanebat ſicca, & ſi non collutione uteretur, loqui non poterat, & plerumque erat valde amara. Aliquando etiam dolor ad cor, quem venæ ſectio ſolvit. Huic aquæ potus, aut aqua multa conſulit. Veratrum nigrum bibit, neque biliolum prodibat, ſed modicum. Tandem hyeme decubuit, & mente motus eſt, & lingue affectiones ſimiles, calor tenuis, ſine dolore, lingua decolor. Vox peripneumonica, de peſtore ſtragula rejicebat, & ſe educi jubebat. Nihil autem poterat clare loqui. Ad noctem mortuus eſt. Nicanoris affectio erat, quum ad convivium progredereſſet timor tibicinz, quum ſub initium vocis tibiz, in convivio tibia canere audiviſſet, præ timoribus turbationes. Vix ſe ſuſſerre poſſe dixit, quum nox eſſet. Interdum vero audiens, nihil commovebatur. Talia comitabantur ipſum multo tempore. * Damocles, qui tum illo erat, cecutire, & corpore exſoluto eſſe ſibi videbatur, & non acceſſiſſet ſine ad præruptum locum, neque trans pontem, neque minimi ſerobis altitudinem tranſgreſſe poterat, ſed per ipſum ſcrobem. Hæc per tempus aliquod ipſi aſſueſcunt. Phœnicis affectio ex oculo dextero talis quædam erat, plerumque velut ſulgur elucere putabat. Quum autem non diu ipſum continuiſſet, dolor ad tempus dextrum inſtabat, & per totum caput, ac collum. Caput intumeſcebat retro ad verticula, & diſſentio, & durities circum tendens, & ubi caput commoveret, aut dentes diducere conabatur, non poterat, ſi qui valdes diſtendeſſent. Vomitus, ubi facti fuiſſent, prædictos dolores avertebant, & leniores faciabant. Sed & venæ ſectio prodereſſet, & veratri poſio, eduxit autem varia, & omnigena, maxillæ vero præſina. Patmenico etiam ætius inſeſcebat æſtitiæ, & decedendi & vita cupiditas. Quandoque vero ruriſus lætitiæ. * Cononis ſerva ex capitis dolore incipiente, menſis mora eſt clamor, quæſte mulx, raro quies. Circa quadageſimum diem mortua eſt. Decem autem diebus ante mortem voce deſtituta, & convulſa fuit. Adoleſcens quidam multo meraco potio, ſupinus in habitaculo quodam dormiebat. Huic ſerpens Arges appellatus in os ingreſſus eſt, & ſane quum ſenſiſſet, & loqui non poſſet, dentibus ſtridiſſet, & ſerpentem devoravit, & dolore magno tenebatur, & manus prætenſas adhibebat, velut qui ſtrangularetur, & jactabat ſe ipſum, & convulſus mortuus eſt. Timocharis ſervus, ex atrabiliariis eſſe putatus a talibus, ac tot viris, ſimiliter mortuus eſt circa eſdem dies. Nicolai filius circa ſolſtitium hybernæ ex potationibus horruit. Ad noctem febres, poſtridie vomitus biliſus, merus, modicus. Tertia die quum concio forti adhuc plena eſſet, ſudor totius corporis. Ceſſavit. Diopithis ſorori in ſemiteriana, circa acceſſionem etiam cor graviter dolens, & concomitabatur etiam is dolor tota die, & huiusmodi cordis dolor etiam aliis ſimiliter aderat. Verumamen ſub pleiadis occaſum viris talia rariora fiebant. * Epicharmi uxori, antequam pareret, dyſenteria erat, dolor vehemens, ſecceſſus, ſecrementa ſuberuenta, mucola. Ubi peperciſſet, ſtatim ſanata eſt. Polamachi uxori, in morbo articulari, cum dolor, quidam vehemens caſſa erat, quod menſes non prodirent. Vix, intercipiebatur per totam noctem uſque ad meridiem. Audiebat autem, & ſapinebat, & per ma-

- num significabat, quod circa coxam esset dolor. Epicharmo circa plejadum oocafum, dolor humeri, & gravas in brachium, anxietas, vomitus multi, aque potus. Euphranoris filio pustula vultu culicum morsus, verum modico tempore: postmodum febricitavit. Siccitates multae post Favonium factae sunt usque ad autumnum autumnale. Sub canem aestus magni, calidi venti. Febres sudorificae. Tubercula iuxta aures multis oborta sunt. * Tychon in obsidione circa Datum a catapulta percussus est in pectus, & paulo post rufus erat circa ipsum tumuloquosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquisse aliquid de speculo in septo transverso. Et quum ipsi videretur, ad vesperam infusum per clysterem adhibuit, & pharmacum deorsum purgans dedit. Noctem primam transiegit moleste. Statim vero ubi dies illuxisset, & medico, & aliis melius habere videbatur. Erat enim quietus. Praedictio facta est, quod ubi convulsio fieret, brevi esset mortuus. Sequenti itaque nocte moleste habens, insomnis, plerumque in ventrem decubens, tertia exoriente die convellebatur, & tunc mortuus est. Billo percussio in dorsum, spiritus multus per vulnus cum strepitu processit. Sanguis erumpebat. Ubi vero medicamentum cruentis vulneribus destinatum adhibuit, ac deligarum esset, sanatus est. * Contigie & infelicissimo Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris, deinde os livescitum est. Mortuus est. Et Phanie, & Evergetae filio, livescitum ossibus, & febricitantibus, cutis ab osse discessit, & pus non comparuit. Aristippus in supernum ventrem violenter, ac graviter sagittae ictu petitus est. Ventris dolor vehemens, & brevi ardebat, deorsum vero non egerat, anxius erat, biliosa abunde colorata quum vomisset, melius habere videbatur, paulo post rursus dolores vehementes, & venter velut in volvulis, calores, sitis, & in septem diebus mortuus est. Neapolis similiter percussus, eadem passus est, acri infuso per clysterem immisso, alvus deorsum eruperit, color per corpus diffusus est, tenuis, pallidus, niger, oculi ficci, stupore rigidi, intus conversi, inuentes in corde. Metrodori filio ex dentis dolore, maxillae mareor, & gingivarum carnis superexcrescentia. Moderate suppuratus est, exciderunt dentes molares, & ipsa maxilla. * Mulieri in Abdera earcinoma obortum est circa pectus, & per mammas stuebant sanies subcrevuta, obstrata vero fluxione, mortua est. Plerique ex defillatione secundum dimidiam capitis partem dolebant, & humore secundum nares procedente febricitabant leniter, & in quinque diebus perfrigerabantur. Et quae in partu concussio fuit, dolor circa pectus, & latus factus est, excretionibus purulentis. Tabes constitit, febres per sex dies. Rursus alvi profluvium, quies, febris, alvus adstricta est, & circa septimam diem mortua est. Anginosa quadam dextram manuum, & crus doluit, febris tenebat debilis, strangulatio tertia die remisit, quarta convulsa, voce destituta, stertor, dentium contritio, maxillarum rubor. Mortua est quinta, aut sexta die. Signum circa manum sublividum. Alia quoque in palato stertorosa, lingua sicca, peripneumonica, non desipiens mortua est. Et in Olyntho hydropicus, derepente voce destitutus, desipiens per noctem, ac diem, mortuus est.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPULARIBUS.

LIBER VI.

Argumentum in Librum sequentem.

§. I. Capitis gravitas ex abortu, & tumoribus ad coxam convolvitur. Acuta capitis. Capitis dolor, & nervi fluxio. Nasus medius quibus confidat, & quibus fumum sinuat. Nervus dolor. Puerorum eluctescit. Aescit aqua diu permanent. Ad rigores fortes progressa. Urinarum suppositiones ante rigores. Abscessus non valde quibus rigores. Crurum effusionem. Tubercula quae bona, & quae mala. Autumno frequentes morbi. In morborum principis quae consideranda. Tussis in infantibus cum ventris motibus. Tumor infra umbilicum. Suppuratio in utero solutio. La-

grima ulcra, & involuntaria. Palpebra circumfusa. Oculi inarescens. Squalliditas. Febris varia differentia. Deflectiones corporis, & articularum duritia. Oculi audacia.

§. II. Curatio per contraria. Abscessus vultus glandularum tumores. Spirituum qualitates. Oscillationis remedium. Spiratio longa. In non potantibus, & vix spiratio brevitas. Pene temporum non considerat, neque viriditas splendida. Sitis intus relicta. Orirescens, & incontinentia. Cibi solidum. Post indicationem relicta. Splenis elevatio. Quarta sanguinis eruptio ante indicat, febris per die intermitentes. Febris tertiana. Tussis sicca. Catarrhis quae-

paulatim, fella accensione, adhibenda sunt. Capitis dolor parte posteriori. Praecordiorum succussiones. Revulsio. Pustula lata, non valde pruriginosa sunt. Quaeque concoqui oportet, conclusa esset, convenit. Oculorum fluxionem ad sanctos revulsio. Transitus apertus esse oportet. Facies bona in multis morbis. Urina graviora similis. Sanguis ferens. Splenis doctum vergentis signa. Quibus suppurationibus umbilicus terminus. Capitis gravedine qui minus laborant. Circa agrotos consideranda. Concretum. Solidum fessum.

Señio III. Caliditas. Infirmitatum attritio. Detrahitio. Corpus extenuatum, & expletia. Exercitationum signum. Splen magis natura. Recidiva quibus minus fiant. Quaequid supparatur, non revertitur. Venter inflatus, & ventris strepitus a Febre. Scapulae alarum modo emittentes. Frigidum valde venas rampit, & tussis movet, velut nix, & glacies. Concretio post millionem. Figura magis allevantur. Femoribus extenuatas ex labore montano. Lateralis natura secpulas alarum modo eminentes habent. Rigori in mulieribus, sicut & viris, qui parit magis iacipiant. Rellu se habentium probatio, & non rellu se habentium redargutio inde petenda. Sanguinis a neribus eraptio. Quae, ac quibus transsacere oportet. Venteris asum qui sequantur. In accessibus strepitum edentes, &c. Mutationes curanda. Cibus modicus. Omnis attenuatio laxat cutem; deinde circumciditur. Cutis confidenter corrugatio, remittitur extensio. Herodicas quibus felicitantes interfecerit. Non sive facientia. Occasione morborum consideranda. Ulcera. Spata rotunda delirium significant. Hamorrhoidum bonum. Humorem detritum ad aliquem locum. Loca alterius morbi locus exipientia. Sanguinis detrahitio quibusdam non convenit. La spontibus impedimenta.

Señio IV. Tubercula circa aurem. Urina crassa, alba. Intestini dextra parte dolor. Anhelatio, & coxae dolor post crepitum in pedale ex sublatu nocte. Spumosum spiritum. Capitis tumor serpens. Intestina hominis, canis similia, & aliquando majora. Agrotis gratificandum. Aqua decolla perfrigeratio. Aqua interius. Si qualia oportet purgari, purgantur, facile ferant. Crurum impotentia ex leprosum estu in Arno. Figulae palam calidior externis partibus, frigidior autem internis. Dormiens vice versa. Calida natura qui convalescat. Villus frigidi, & villus calidi. Aquarum ratio que. Cubile quatenus calidum naturam crassifaciat, vel attenuet. Sanitatis scopus, seu exercitatio. Sitis quatenus somno, & somnus siti medela. Pote maxima qui praediti. Venas eminentes qui habent, & ad idam magis propti. Quae terra voluerit abundet. Testes. Corporis robur ex oculis coniectatur. Signa lethalia. Labores cibos praedant.

Señio V. Morborum natura medici. Hominis anima semper producit usque ad mortem.

Atorbi comutari quomodo desinam. Sanatio. Excandescencia, & lassitia in corpore humano facultates. Cibus. Somnus. Cura. Sanguinis concursus. Ad auri dolorem. Lingua vinum significat. Urinarum differentia. Lingua emolior. arthritibus ipsum humoribus. Cura humana fella ad gulum. Mamillae rum papilla. Aurium fides dolores. Lacerum in morbis longis mactatio. Cibi debiles. Conarum fixio. Cibus quibus morbis commodus. Partis potius, ac cibi. Atra bilis. Cibus. Frigiditas. Cibus. Venterum ac cito purgat. Sanguis in somno. Riser in ventre superiore. Saporuonatum. Cibi frigidissimi. Ulcerum causa. Corpori calido ab internis, & externis causis dolor. Ciborum differentia.

Señio VI. Carnes atrabiles & ex ventre, & extrinsecum. Frigidior in frigido tempore, ac regione calidior eris. Venter proximus in doloribus purgandus. Quarta a maioribus morbis tunc reddit. Bilia generatio. Caliditas acrimonia signum. Laterum dolores in mente motis desinunt. Per aures ex auriibus plerumque scitis die moriuntur. Cuius aridas, ac dura. Mutationes in recidivis profunt. Sanguinis a neribus fluxio quibus profert. Nares, & genitura humidior. Spata rotunda. Urina multa subsidentia. Quarta post pilorum defluxum non ultra evanet. Aurium emptiones. Olfium, venarum, &c. natura ex capite astuanda. Biliosum, & sanguineum corpus, atrabiliarium fit.

Señio VII. Tussis ex frequenti Astralium, & aquilinarum, ac microformi transmutatione. Angina. Leves systeratime. Nollalopes. Ad lambos, aut cura impotentia abeguitatime, &c. Tussis durissima, & violentissima ad levem systeratime, ac resolutionem perdacentes. Facie ad tussim frastilla. Oculorum astra partes variatae. Atulorum morbi diversi a virilibus. Vena circa cervicem, & tempora elevata. Aamidiolum inde. Inguinum, glandularumque tumorum causa. Ventrium abundantia turbationem ferunt. Hydropicarum curatio. Facis qualitas. Atorbi quatenus talem inducant. Tussis laboriosa contingunt locos laesos, & maxime articulos. Tabescentibus qui anni tempora inimica. Cibi subsidia in longis dysteratime, mala. Ulcera circa glabra, maligna sunt. Pustula, qui sepi vocatur, in lambos delente. Renum affectiones. Dysnomis exacerbata.

Ex parva tabula quae consideranda. Atorborum populariter grassantium modi. Tumores in supernis palpebris. Tumores, aut livores in lippitudinibus, aut alteribus erumpentes. Termina circa mensem. Sacri tynes. Leborum in febribus ulceratio. Villus rationes in agrotis, quatenus fieri potest, cognoscenda. Similitudines bonis medicis parum errant, ac difficultates. Figula refracta. Apex hepatis complicatus. Semen pro somnum mirum. In caput lapsus. Atrabiliaris etiam morbo cervicali corripit, & vicissim comitatus atrabiliaris fieri. Atulor foudana alogia, ex mensibus suppressis hirsuta est fella.

S E C T I O I.

- 1 **Q**UIBUSCUMQUE ex abortu circa uterum, & tumoribus ad
capitis gravitatem convertitur, & iuxta sinciput maxime dolo-
res, & quicumque alii ab uteris, his in octo, aut decem men-
sibus ad coxam morbus definit. Acutum habentes caput, qui
quidem validam habent cervicem, robusti sunt tum alias,
tum ossibus. Qui vero caput dolent, & aures fluentes habent;
his palatum cavum est, & dentes inter se non e directo
respondentes. Quibuscumque os de palato discessit, his medius confidet na-
sus. Quibus vero inde dentes prodeunt, his summus nasus sinus fit.
10 Puerorum elucescentia simul cum pubertate, in quibusdam mutationes habent etiam
alias. In rhenem dolor gravis, quum implentur cibo, vomunt piruitam.
Quum vero redundarint dolores, aeruginosa, & melius quidem habent. Solvun-
tur autem, quum eibus evacuati fuerint, areolaeque fulvae subsident, & cruentum min-
gunt, torpor femoris e directo, quiescere non conducit. Sed exercitia, non impleri,
15 juvenes veratro purgare, poplitem secare, urinam crescentibus purgare, attenuare,
& mollire. Menses aquosis diu permanent. Quum vero non brevi prodie-
rint, intumescunt. In Cranone antiqui dolores frigidi, recentes autem cali-
di, ex sanguine vero plurimi, & quae ex coxa, frigida sunt. Quae ad rigores
fortes progressa sunt, non valde mitigantur, nisi prope vigorem. Ante rigo-
rem urinarum suppressiones, si ex bonis fuerint, & alvus egerat, & somni ad-
sint, fortassis autem & febris modus, fortassis etiam quae ex lassitudinibus.
20 Abscessus non valde, quibus rigores. Crurum effusionationes, veluti si aut
ante morbum iter fecerint, aut statim ex morbo: eo quod fortassis ex las-
situdinibus in articulos abscessit, ex quo crurum effusionationes. Tubercu-
la extra extuberantia, & acuta, & fastigiata, & aequaliter maturescentia, & non
obdura, & deorsum vergentia, & non bilida, meliora; contraria vero, mala, &
quanto plus contraria, pessima. Ferinum autumnio, & oris ventriculi dolo-
res, & horrores, & atra bilis. Circa initia exacerbatones considera, & in
omni morbo, quale est ad vesperam exacerbari, & annus ad vesperam, et asca-
rides. Infantibus tussicula cum venis turbatione, ac febre continua, signifi-
cat post iudicationem biestri, in totum vigesima die, etiam tumores ad ar-
ticulos. Si quidem infra umbilicum constiterint, in infernis articulis super-
na, bonum; si vero supra, non similiter morbum solvunt, nisi suppurata fuerint.
25 Quae vero in humeris suppurantur tantillis, mistellae cubito praeditos, parvum-
que, ac macilentum brachium habentes faciunt. Solverit autem et ulcusculor-
um inferne eruptio, si non rotunda, et profunda fuerint. Talia enim per-
niciosa etiam alias sunt pueris. Solverit itidem sanguis fluens. Magis autem
in perfectioribus is apparet. Lachrymae in acutis male habentibus, ultro-
neae quidem bonae, involuntariae vero defluentes, mala. Quibus circumdendi-
tur palpebra, malum. Malus est etiam oculus inarescens, velut spuma, et
obscuro oculorum mala est. Et squalliditas mala, et qui intrinsecus corrugan-
tur, et rigentes, et qui vix convertuntur, et qui intus conversi sunt, et quicumque
alia omittuntur. Febres aliae quidem mordaces sunt manni, aliae lenes. Aliae
vero non quidem mordaces, verum augescentes. Aliae autem acutae quidem, sed
quae a manu vincantur. Aliae statim adurentes, aliae semper debiles, siccae. Aliae
35 sanguinolae. Aliae inflatae, horrendi aspectus. Aliae ad manum humectae. Aliae
rubicundae valde. Aliae valde pallidae. Aliae lividae, et alia id genus. Distentiones
corporis, et articulorum duritiae, malum. Et ipse dissolutus. Et contraactiones
articulorum, malum. Oculi audacia delirii signum est, et oculorum dejectiones,
40 ac perversiones, malum.

S E C T I O I I.

- 1 **D**ilatare, constringere, alia quidem, alia vero non. Humores alios qui-
dem expellere, alios vero siccare, alios autem indere, et alia quidem parte,
alia vero non. Attenuare, crassificare, corpus, cutem, carnes, et alia, et ali-
qua quidem, aliqua vero non. Levigare, exasperare, indurare, mollire, alia qui-
dem, alia non. Excitare, torpescere, et quicumque alia huiusmodi. De-
rivare, subcedentia statim revellere, resistentibus concedere. Alium humo-
rem non prodeuntem ducere, prodeuntem vero simul effundere, operari simile,
velut dolor dolorem sedat. Dissimilia, si vergant sursum elevata, inferne fol-
vere

vere, & contraria per eadem, velut est capitis purgatio, venæ sectio, quando non temere detrahitur. Abscessus velut glandularum tumores, signum quidem sunt earum partium, quæ germina habent, sed & aliarum. Maxime vero circa viscera. Maligni autem hi sunt. Spiritus parvi densi, magni rari, parvi rari, magni densi: extra magni, intus parvi: intus magni, extra parvi: alius extendens, alius urgens: dupla intro revocatio, velut superinspirationibus, calidus, frigidus. Medela affiduarum oscurationum, spiratio longa. In non potantibus, & vix, spiratio brevis. E directo & laterum, & præcordiorum intentiones, & splenis elevationes, & e naribus eruptiones, & aures e directo. Horum plurima etiam ad oculos. Utrum igitur omnia aut quæ quidem ex infernis sursum, e directo: qualia sunt, quæ iuxta maxillas, aut circa oculum, aut aurem: quæ vero ex supernis, deorsum, non e directo? Atqui & anginosi rubores, & laterum dolores e directo. Aut etiam quæ infra hepar sunt ex supernis distributa, velut in restes, ac varices? Consideranda sunt hæc, quo, & unde, & propter quid. Venæ temporum non confluentes, neque viriditas splendida, si spiritus intus retineantur, aut tussis sicca, non ferina: ut in articulos decumbat, expectare oportet, e directo ascensionum secundum ventrem plurimum. Habent autem horum plurimi & facies rubicundas, & ex natura sunt modi albidioris, & de naribus sanguis non erumpit, aut parum erumpit, & si quidem ex affusis intus relinquatur, paratus est abscessus. Sitis intus relicta, & oris resiccatio, & inieunditas, & cibi fastidium, eodem modo. Febres autem non acutæ ejusmodi sunt, verum revertentes. Quæ relinquuntur post indicationem, recidivas facere solent. Primum itaque splenis elevationes, si non ad articulos sinerint, aut sanguinis e naribus eruptio sit, aut dextra præcordii intentio, si non penetraverint tinnus. Hæc enim est interceptio utrorumque, & recidivæ horum metio sunt. Abscessus igitur horum facere oportet, si non fiant. Eos vero qui jam sunt, declinare. Eos autem excipere, si prodierint jam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui vero non valde, eos coadjuvare. Eos vero avertere, si omnino incommodi fuerint, maxime si hi affuturi sunt: sin minus, si jam incipiunt. Quarantæ sanguinis e naribus eruptiones ægre judicant. Febres, quæ una die intermittentes, altera superirrigent una cum indicatione, ex quinque ad septem circuitus dirant. Quæcumque tertianæ naturam habent, his non molesta ante exacerbationem: quæ vero sequitur, tolerabilior plerumque est. Tussis sicca parum irritans a febre adurente, non pro ratione situlosa, neque lingue torrefactæ, non feritate, sed spiritum. Constat id inde. Quum enim loquuntur, aut hiant, tunc tussint, quum vero non, minime. Hoc autem in febris ex lassitudinibus obortis maxime coniungit. Nihil temere affirmandum, nihil contemnendum. Contraria, paulatim facta accessione, adhibenda sunt: & interquiescendum. Dolenti capitis partem posteriorem, recta vena in fronte secunda profuit. Successiones præcordiorum ex quibus qualia alterant, & viscera inflammationum qualia possint, sive ex hepate spleni, & vice versa, & quæcumque huiusmodi. Revellere oportet, si non qua oportet, repare. Si vero qua oportet, hi oscula aperire oportet, qualiter singula repunt. Laræ pustulæ non valde pruriginosæ sunt. Quales Simon habebat hyeme, qui ubi ad ignem ingereretur, aut calida lavaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderant. Arbitror, si quis calida adhibuisset, opem ferre potuisse. Quæcumque concoqui oportet, conclusa esse convenit. Contraria vero siccare, & aperta esse. Oculorum fluxiones, si alias conducere videtur, revellere ad fauces convenit. Et ubi eructatio conducit, & quæcumque alia huiusmodi. Transitus apertus esse oportet, veluti nares, & alia, quibus opus est, & velut opus est, & qualia, & qua parte, & quando, & quantum opus est, velut sudores, & alia sane omnia. In magnis malis facies si fuerit bona, bonum signum est. In parvis autem, contraria significans bonæ significationi, malum: Apud magnum Theatrum ubi mulier retro heroum, morbo regio superveniente, permansit ipsi. Apud Temenæ nepotem ille nigricantis erat coloris. In Perintho genituræ similis utina talis, quæ esset iudicatoria, etiam pectinis affectionum. Nam huiusmodi urinæ talia sanant, quoniam neque flatu multo, neque stercore multo egresso, evacuabantur. Non enim profecto magnum erat præcordium. Brassicam septima die quis comedit, quum adhuc difficulter spiraret, postquam pecten emollitus est, recte spirans factus est, alvus ipsi expulit. De sanguine ferroso, quoniam in pavidis talis, aut in his, qui vigilarunt, & sive malus, sive bonus. Quibus splen deorsum vergit, pedes, & manus, & genua calida sunt; nares, & aures semper frigida. Num propter hoc, quod tenuis sanguis? Num & natura talem hi habent? Suppurationibus umbilicus terminus, quibus suppurationis ventres turbantur. Splen durus non superne, inferne, rotundus, latus, crassus longus, tenuis longus. Minus capitis gravedine laborantibus. Circa ægotantem administratio, & de morbo interrogatio: quæ narrat quas, quomodo accipiendi sermones: quæ ad ægotantem, quæ ad præsentem, quæ ad externos. Quod in calidiore, solidiore, in dextris: & nigri propterea, &

venæ extrinsecus, & multo biliosiores. Concretum est, compactum est citius: ubi motum est, definit, & tardius augetur, & ad amplius tempus. Quod soli
80 dum factum est, & biliosius, & sanguinolentius est; hic calidior est locus animali.

S E C T I O I I I.

- 1 **C**utis raritas, veneris densitas, cutis constrictio, carniū incrementum; ventris torpor, univerforum confusio, valorum immunditia, cerebri consumptio. Quapropter & calvities, instrumentorum attritio. Detractio curfus, hūctis, quiete, multis celeribus deambulationibꝫ, carne ovilla, maza cocta
5 plerumque panis modicus. Detractionis signum eandem horam diei servare, derepente enim trahitur. Remittito labores, aut defuerit. Similiter enim totum concedit. Quum vero jam conciderint, carnes suillas affatas exhibeto. Quum autem implentur, signum est, quod corpus rursus floridum sit. In exercitationibꝫ signum, sudor fluens guttatim, qui exit velut ex canalibus, aut collapsio
10 ex elevatione. Mulier quam primum curavi in Cranone: splen ipsi magnus natura, febris ardens, rubicunda, spiritus, decima sudor plerumque superne. Sed & inferne, decima quarta. Minus his, qui ex capite grayedine, ac ravedine laborant, ubi febre correpti fuerint, recidivæ velut puto, sunt. Quicquid suppuratur, non revertitur. Ipsa enim maturatio, & judicatio simul, & abscessus.
15 Quibusdam, ubi venere utuntur, venter inflatur, velut Damagoræ. Quibusdam vero in hoc strepitus. Arcefilao vero etiam intumescerebat. Flatusositas simul caussa est in his, qui scapulas alarum modo eminentes habent. Sunt enim flatusosi. Frigidum valde, venas rumpit, & rursus movet, velut nix, glacies: & constringit, velut sunt eminentiæ oblongæ, & rotundæ, Pheroa
20 & Gongronæ a satyrorum circa aures eminentiis, & arborum quarundam tuberculis appellatæ. Simul caussa sunt etiam durities. Post mictionem concretio, pueris magis, num quod calidiores? Figuræ magis allevantes, velut qui farnenta manu necebat, & oborquebat, præ doloribus decumbens, arrepta paxilli summa parte supra se ipsum infixa, inhærebat, & melius habuit.
25 Quem ex montano labore circa pontem ego vidi crura iactantem, altera tibia minime extenuabatur, femoribus autem valde. Urinæ, & genitura non supprimebantur. Quæcumque laterum naturæ, scapulas alarum modo eminentes habent, propter causæ debilitatem, in destillationibus malignis, sive excretio fiat, sive non fiat, malum. Rigores incipiunt mulieribus quidem magis a lambis,
30 & per dorsum, & tunc ad caput. Sed & viris posteriore corporis parte magis quam anteriore. Horremus enim magis exterioribus, quam interioribus corporis partibus, velut cubitis, femoribus. Sed & cutis rarior. Indicat autem pilus. A quibus autem alis rigent, fortassis ulceribus, incipiunt a valis. Summa ex nativitate, & caussa, & plurimis rationibus, & paulatim in cognitionem venientibus colligentem, ac addiscentem, an similia sint inter se, & an non similia
35 sint inter se: quo ex dissimilitudinibus similitudo fiat una. Sic sane fuerit via. Sic etiam eorum, quæ recte se habent probatio, & non recte se habentium redargutio. Sanguinis ex naribus eruptio, aut subpallide nigricantibus, aut rubicunde pallentibus, aut subpallidis. Parum dimittentem crassescere oportet sicco. Alii vero minus crassificatione opus est. Sicco autem opus est albo, velut galla, alumen. Postquam venere uti inceperint, aut hircire, sanguis ipsis
40 & naribus erumpit. In accessibus alii quidem strepitum edunt, velut Arcefilæus. Alii vero accessuri, horridi sunt, ac rugosi. Alii postquam accesserint, venter inflantur, velut Damagoræ. Mutationes cavendæ. Cibus modicus, non delassari, non sitire. Omnis attenuatio laxat cutem, deinde circumtenditur. Renutritio vice versa. Cutis confidentis corrugatio, renutritæ extensio. Rugosum, læve, utriusque signum, itemque subbiliosum, & substriatum. Sic etiam detractas esse mammas, graciles autem sursum tractas esse, & circumtensas, etiam si quis non propterea putaverit id fieri, sed in carnosis. Claviculæ conspicuæ, venæ pellicuæ. Herodicus febricitantes interficiebat circuncitis, luctis, multis sumentis: mala est febriculofitas, insumica fami, luctis, circuitibus, curfus, frictioni: laborem labore. Ipsi venarum rubor, livor, pallor, laterum dolores molles. Non sitire faciunt, continere os, tacere, ventum cum potu
55 frigidum inducere. Occasiones unde ægrotare cœperint, considerare oportet, sive capitis fuerit dolor, sive auris, sive lateris. Signum sunt dentes, & in quibusdam inguinum tumores. Ulcera sientia, ac tubercula judicantia febres. Quibus hæc non sunt, judicatio sublata est. Quibus intus relinquuntur, certissimæ recidivæ, ac celerrimæ. Sputa rotunda delitium significant, velut in Pleno. Qui hæmorrhoidas habent, neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagædena, neque furunculis, neque tuberculis terebinthi figuram habentibus
60 corripuntur, fortassis autem neque lepris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen intempestive curati, talibus non tarde correpti sunt, & sic perniciosæ fuerunt:

fuerunt, & quicumque alii abscessus, velut fistulae, aliorum medela sunt. Decubitus humorum ad aliquem locum, in quibus factos affectus liberat, in his prius ipse factus, illos impedit. Alterius loci morbos loca excipientia, aut 65 ob dolorem, aut ob gravitatem, aut propter aliud quiddam liberant, aut quod aliis sunt communicationes. Propter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed juxta humoris cognitionem talia spunt. Convenit quibusdam sanguinem detrahere, tempestive in talibus. In aliis autem velut in his non conve- nit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni, pleuritis, bilis. 70

S E C T I O I I

Tubercula circa aurem, quibus circa judicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus recidiva fit pro ratione recidivarum. Recidiva vero siente, rursus inflammantur, & permanent, velut febrim recidivae in simili circuitu: his spes est ad articulos abscedere. Urina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febris quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si vero ultra hoc, etiam sanguis e naribus large eruperit, etiam valde. Cui intestinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est; erat quietior. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat. Agalis filia, quum esset puella, densum spiritum habebat. Mulier autem facta, a partu non diu dolore correpta leviter, magnum onus sustulit, & statim quid 10 dem in pectore aliquid crepuisse visum fuit. Postera die & anhelationem habebat, & coxam dexteram dolebat, & quum hac doleret, tunc etiam anhelatio habebat: coxae vero dolore cessante, etiam anhelatio cessabat. Spuebat spumosa, ab initio vero florida. Ubi vero confidisset spiritum, vomitui bilioso tenui simile erat. Dolores maxime erant, quum manu laboraret. Hanc ab alio accere 15 visum fuit, porcoque, ac ovicula, & bove. In rebus autem agendis, a clamore, & exandescencia. Cui in capite tumor depascendo proferpebat, ei primum alumenustum profuit. Habuit alium abscessum, forte quod os abscessurum esset. Abscessit sexagesima die supra aurem, sursum ad verticem vulnus erat. Intestina crassa habet, qualia sunt canis, verum majora. Dependunt autem 20 ex medianis membranis, Mesocolis hac parte appellatis. Haec vero ex nervis, de spina, sub ventrem. Aegroxantibus gratificationes, velut est pure prae- parare potus, ac cibos, & ea, quae videt; molliter ea, quae contingit. Aliae gratificationes, quae non magnopere laedunt, aut facile reparari possunt, velut frigida, ubi hac opus est. Aliae gratificationes sunt, introitus, sermones, habitus, 25 vestitus, agrotanti, tonsura, unguis, odores. Aqua decocta partim ut aere admittat, partim ut vas non plenum sit, & operculum habeat. Quod ex sanguinis eruptionibus, aqua inter ceterum corripuitur. Si qualia oportet purgari, purgantur, facile ferunt. In Aeno legumina comedentes assidue, foeminae, mares crurum impotentes facti sunt, & permanserunt. Sed & 30 erum comedentes, genium dolores habebant. Palam vigilans calidior externis partibus, frigidior autem internis. Dormiens vice versa. Calidae naturae frigiditas, potus aqua, quiescere, somnus in frigore, contactio, somnus sedentium, erectorum nictatio. Debiles victus, frigidi: robusti vero calidi. Aquarum arte non preparatarum, quae quidem ab aethere excreta est, 35 aut cum coitruo, aestiva, procellosa vero mala. Aqua vorax, vigilia vorax. Percalidam naturam calido tempore, in frigore cubile crassescit, in calido attenuat. Exercitatio sanitas est vesci citra saturitatem, non refugere laborem. Inter vigilandum sibi levi somnus medela est. Siti voto ex somno, vigilia in quibosdam. Quibus plurimus calor est, maxima voce praediti sunt. Nam & plurimus est frigidus aer. Ex duobus autem magnis magna etiam, quae generantur, existunt. Ventriculo calidi, carne frigidi, & tenues, hi eminentes venas habent, & iracundiores sunt. Terra siccitatibus squallida, volucrum genus abundat. Hircine incipiens, uter testis extra apparuerit, si quidem dexter, masculum; si vero sinister, foemellam portendit. 45 Oculi prout validi fuerint, ita etiam corpus. Sed & color in pejus, aut melius vergit. Iustum est autem, prout se habuerit alimentum, ita & quod foris fecit sequi. Signa lethalia, per cutem, nares, calidus vapor: ubi prius nares frigidum spiritum emisserunt, Signa vero vialia, contracta sunt. Labores cibos praecedant. 50

S E C T I O V.

Morborum naturae medici. Invenit natura ipsa sibi ipsi aggressionem, non ex praemeditato, partim velut est nictare, partim vero & ea, quae lingua subministrat, & quaecumque alia huiusmodi, non edocta natura, & nullo magistro

- magistro usa; ea quibus opus est, facit. Lachrymæ, natium humiditas, sternutationes, autis sordes, oris salivæ ductio, spiritus introitus, exitus, oscitatio, tussis, singultus, non ejusdem omnino modi. Urinæ secessus, & status, & hujus alterius alimentis, & transpirationis, & ea, quæ sceminis solis adiunt, & in reliquo corpore sudores, pruritus, corporis distentiones cum oscitatione, & quæcumque alia humilemodi. Hominis anima semper producitur usque ad mortem. Si vero effluerit, una cum morbo etiam anima corpus depascitur.
- Morbi connutriti, in senectâ, & per concoctionem, & per solutionem, & per rarefactionem desinunt. Sanatio contra sentientem non consentire affectioni. Frigidum & auxiliatur, & occidit quæcumque ex calido sunt. Excandescencia retrahit cor, & pulmonem in se ipsa, & ad caput calida, ac humidum. Læticia vero relaxat cor. Labor articulis, & carnibus; cibis, somnus, visceribus. Animæ deambulatio est cura hominibus. In vulneribus sanguis concurrit, opitulandum igitur ut vacuum expleatur. Si auris doleat, lana digito obvolvatur oleum calidum instillato. Deinde lanam intus in volam manus positam sub aurem subdito, ut aliquid ipsi existisse videatur, postea in ignem immittito. Dolus. Lingua urinam significat. Lingue virides cum pallore biliosa; biliosum autem a pingui; rubicunda vero a sanguine. Nigræ ab atra bile. Sicca a fuliginoso ardore, & uterina parte. Albæ vero a pituita. Urina concolor cibo, & potui, & qualis intus est humidus colliquatio. Lingua concolor attingentibus ipsam humoribus, quapropter per hanc humores cognoscimus. Si falsæ carnes gustanti, redandantiæ signum. Si mammarum papillæ, & rubor pallidus fuerit, morbosum uteri vas est. Hominibus sordes in auribus, dulcis quidem lethalis, amara veto non. Terram mutare commodum est in longis morbis. Debiliores cibi brevem vitam habent. In fluxionibus ad coxam, venas retro aures secato. Coitus morbis ex pituita commodus. Calido ventriculo præditos, fortes potus, ac cibi perturbant. Atra bilis velut similis est hæmorrhoids. Augescentes morbos coitus. Frigiditas ea, quæ in ventre sunt, indurat. Coitus ea, quæ in ventre sunt, indurat. Eum, qui veratrum bibit, si citius purgare volueris, lavare oportet, aut comedere. Sanguis in somno intro magis fugit. Rigor a superiore ventre, secat ab inferiore magis. Attractio, pulmo, siccus ardor; Supervacuatum secat & somnus multus. Frigidissimus cibus, lentes, milium, cæcumbit. Ulcera exoriuntur, si quis, dum impurgatus est, laboraverit. Mulier, capra, claterium, aut cæcumereon sylvestrem comedentes, pueris purgatio. Calido corpori id, quod comedit, intersitus frigiditas est, forissecus autem dolor a sole, igne, ventu, in tempore æstivo. Contrario veto contrario modo. Cibi patina celetiget superantur, partim tarde.

S E C T I O V I

- 1 **C**arnes attractrices, & ex ventre, & extrinsecus. Indicium est sensus ipse, quod expirabile, ac inspirabile est totum corpus. Calidissima venula sanguinis multitudine, id quod fuliginosum est, exerit, & statim secerit. Eo quibus quidem pingue, bilis flava; quibus autem sanguis, atra. Mentis, memorie, olfactus, aliorum etiam famis instrumentorum exercitatio. Labores, cibi, potus, somnus, res veneræ, omnia mediocria. Frigidior in frigido tempore, ac regione calidior erit. In doloribus proximum ventrem purgato, sanguinis autem ventrem secato. Ustio, sectio, calefactio, perfrigeratio, sternutationes, plantarum succi, in quibus vim habent, & cyceonis mixtura. Maleficorum autem lac, allium, vinum servescatum, acetum, sal. Homo ex lassitudinibus, ex itinere, imbecillus, gravatus exiit. Tussivit enim ex vertice. Febres acuta, ad manum submordens. Secunda die capitis gravitas, lingua combusta fuit, natis unguibus conscalpra sanguinem non effudit. Similiter splen magnus, & durus dolebat. A quartana correpti, a magno morbo non corripantur. Si vero corripantur prius, & succedat quartana, liberantur. Pro quibus qui morbi. Bilis fit, velut de vulneribus dixi, quod sine biliose. Caliditas acrimoniæ signum est. Turbationes, transitus. Nam mento moris dolores laterum desinunt: quibusdam & febres, quibusdam non. Sed cum sudoribus, quibusdam autem cum turbatione; quibusdam vero cunctis arida, & circumtensa, ac saliginosa. Torpesciones quales ex quibus, & quales illi, cui coxa. Per aures, ex auribus, plerumque tertio die moriuntur. Quibus cutes circumtenduntur arida, ac duræ, sine sudore; quibus laxæ sunt, ac rare, cum sudore moriuntur. In recidivis mutationes profunt. His transmutare oportet ad ea, quæ conveniunt, antea quam male afficiantur, velut Cherion. Quæ irritantur ex quibus, stridule saucium asperitates terminum præscribunt. Quibus quidem id, quod sanum est, relinquatur.

quitur, causa deorsum submissa, eos aut purgato, aut deligato, aut ejicito, aut resecato, aut exurto. Quibus vero non, non. Quibus sanguis multus fuit ex naribus, qui quidem decolores mero modo sunt, his parum prodest. Quibus vero colores rubicundi, non similiter. Et quibus capitis sunt, quae facile tollerant, prodest. Quibus secus, non. Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, ac copiosior, hi morbosius sani sunt. Plurimis autem quibus ex morbo, vice versa. Spina rotunda mentem emovet, velut illi in Plinio. Huic sanguis ex sinistra nare erupit, & solutus est quinto die. Urina multam sublidemiam habens, a mentis emotione liberat, qualis erat Dexippi. Post pilorum deluvium quartana febris non ultra annum. Autum eruptiones aestate quinta die sunt, quandoque vero etiam diutius durant. Ita & circa gingivas, & circa nares suppurationes. Quibus in dentium dolore de supercilio tenuia descendunt, his a pipere probe affricio postredie crassiora descendunt, si etiam alia non obtinuerint. Nam Hegesippo soporiferum solutum non obtinuit, sed magis, & violentius insuper provocavit. Ossium naturam ex capite colligere oportet, deinde nervorum, & venarum, & carnum, & aliorum humorum, & supernorum, ac infernorum venterculorum, & mentis, & morum, & eorum, quae per annum sunt, tempore quodam anni praecognitione, velut pustulae, & hujusmodi. Simile enim est his, quae quotidie citius, aut serius accipiuntur. Similiter & biliosum, & sanguineum corpus atrabilarium sit, si non habet evacuationes. Lycimo postrenum splen magnum dolorosius in quarta, aut quinta.

S E C T I O VII.

Tussis coeperunt circa solstitia hyberna, decima quinta, aut vigesima die ex frequenti australium, & aquilonarum, ac nivolorum transmutatione. Ex his aliae breviores, aliae diuturniores fiebant, & post haec multae peripneumonicae affectiones. Ante annum rursus plerisque revertebantur, quadragesima usque plurimum ab initio die: & aliquibus sane valde breves, ac iudicatu faciles erant, aliquibus autem sauces inflammatae sunt, quibusdam anginae obortae, quibusdam leves syderationes, aliis nictalopes, atque hi magis pueris. Verum peripneumonicae affectiones valde breves erant. Facium vero inflammationes post tussim, aut omnino parum pro tussi fiebant, atque haec breves, magni autem nictalopes. Anginae vero, & leves syderationes, aut durae, & siccae, aut parvae, & raro maturae educentes: quibusdam vero etiam valde. Qui igitur aut vocibus amplius se fatigaverunt, aut risu, in angina magis decesserunt. Qui vero manibus laboraverunt, manibus tantum syderati, ac resoluti sunt. Qui vero equitaverunt, aut amplius iter fecerunt, aut alios labores eruribus perfecerunt, his ad humbos, aut crura impotentiae resolutiorum oborta sunt, & ad femora, ac tibias latitudo, ac dolor. Durissima autem, & violentissima tussis erant, quae ad levem syderationem, ac resolutionem perducebant. Verum omnia haec in recidivis fiebant. In principijs vero non ita valde. Plerisque autem horum tussis in medio remiserunt, sed perfectio non desecrunt, verum cum recidiva affuerunt. Quibus voces frangebantur ad tussim, horum plurimi ne febricitarent quidem. Quidam vero parum. Sed neque peripneumonicae affectiones ulli horum fiebant, neque leves syderationes, neque ullus alius morbus de se significationem praebuit, sed in sola voce judicabatur. At vero nictalopicae affectiones firmabantur, ut quae etiam ex aliis causis fiebant. Fiebant autem pueris maxime. Oculorum autem nigrae partes aliquantum variabantur, quae pupillas parvas habebant. In summa oculus niger usque plurimum erat. Et magis, quam parvos oculos habebant, & plurimi rectos capillos, ac nigros. Ceterum mulieres non similiter a tussi afflictae sunt. Verum paucae febricitant, & ex his valde paucae ad peripneumoniam affectionem deveniunt, atque haec seniores, & omnes superstites evaserunt. Causarum autem hoc fieri, eo quod non similiter velut viri prodirent, & quod nequaquam similiter ut viri morbus corripuntur. At anginae liberis duabus oboriebantur, atque haec manifestissimi moris erant: abundantius autem famulas corripiebant, quibus & violentissima fiebant, ipsaeque celerrime perimebant. Viris vero multis fiebant, qui partim evaserunt, partim perierunt. In summa, qui solum deglutiunt non poterant, his valde mites, ac tolerati faciles erant. Qui vero etiam insuper obscure loquebantur, his molestiores, ac diuturniores. Quibus vero etiam venae circa tempora, & cervicem attollebantur, his aliquantum male erant. Pessima vero his, quibus & spiritus sublimis coelestis erat. Hi enim etiam incalecebant. Nam sicut scriptum est, ita confortia affectionum habebant. Et quae quidem primum scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant. Quae vero posterius, non sine prioribus. Celerrime autem moriebantur, ubi febrili

- febelli rigore insuper rignissent. His ita pressis nihil memorabile proderat, non venetis turbatio, non vene sectio, neque quaecumque alia tentavi. Secui etiam venam sub lingua, quoddam & sursum purgavi. Hæc igitur omnino in æstate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multæ, & potissimum in siccitatibus lippitudines dolorosæ populariter grassabantur. Sanguinis venarum suppressiones faciunt animi deliquium, figura alterata, interceptio, linamentum intorum, appositio, deligatio. Inguinum, glandularumque tumores plurimi plurimi fiebant, eo quod hepatitis affecta esset. Erat autem & ab arteria male affecta malum signum, veluti Posidonie. Quibus sanguis erumpebat, morientes fronte non exudarunt, sed velut contracti præ siccitate erant. Et anhelosi, ac cum sudoribus pereuntes, male liabebant. Ventrium abundantie turbationem ferunt, veluti Posidonie: & quæ animalcula in alvo inducunt. In attenuatione circumfensio ante obitum, & umbilicus oblongus ipsi protractus est: & gingivarum dentes ambiendum exulcerationes. Mula de unoquoque recte præcipi possunt, quæ partium eadem possint, partim non: velut est talia diffundis, exolvi, & educi, & indurari, & maturari, & ubi mutatione opus est, de lecto propellere timidos, & torpentes excitare ad ea, quæ relinquunt. Hydropicos citius secare oportet, tabescentes statim urere, caput secare, & huiusmodi. Hydropicorum pectinem ne contingito, neque internas partes. Simile est enim multis genibus. Affectiones circa cor, sive ventriculi osculum Xenarcho, & calidum accervatim existare, & ultius per evacuationem ab initio fovere. Vox qualis est irascensibus, si talis fuerit non irato, ex natura fuerit, & oculi tales fuerint ex natura turbulenti, tales sunt, ubi irascuntur hi, qui tales non sunt. Et alia iuxta morborum rationem, velut verbi causa, morbus tabidam speciem inducit, si talis ex natura arger fuerit, ex tali morbo superstes evadet: & alia eodem modo, Tussis laboriose contingunt locos læsos, & maxime articulos. Sed & in febribus lassitudinem inducentibus, tussis sicæ ad articulos decumbunt cum febre, si intus relinquuntur. Spiritus tabescentibus obicuri mali, & non parientibus, & quicumque alii tales ab eadem constitutione. Tabescentibus autem minus malus. Malum item ver, quum sic folia cornicis pedibus similia fuerint.
75. In Petinthe vere plurimi agroarunt. Simul causa fuit, autis per hyemem populariter vagata, & aliis quicumque diuturni sunt morbi. Nam & in ambiguis confirmati sunt. Quibusdam vero diuturni non sunt oborti, velut hi qui dolores rhenales habent. Sed & alius, velut homo ille, ad quem Cyniscus me adduxit. Dolorum in lateribus, & pectore, & aliis partibus, tempora an multum differant, considerandum est. Nam quum melius habuerint, rursus deterior habebunt, non delinquentes. In longis dysenteris cibi fastidia malum alias, tum si insuper febricitint. Ulcera circumglabra maligna sunt. Lumbos dolenti recursum ad latus, & pustula, quæ seps vocantur. Rheum affectiones non vidi sanatas supra quinquagesimum annum. Quæ in somnis exacerbantur, & quibus extremæ partes perfrigerantur, & mens turbatur, & alia, quæ circa somnum fiunt eiusmodi, & quibus contrariis. Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partibus vitales sunt. Apparentia in quibus mensibus fiunt. Labores in circuitibus, quicquid in septuaginta movetur, in triplicitate perhorit: & quicquid in nonaginta movetur, in triplicitate perficitur. Post meos dextera, & sinistra hiant.
90. Humiditas per prodeuntia, diæta sicca opus habet. Quod citius discretum, ac motum est, rursus augetur tardius, & ad longius tempus. Labores tertio, quinto, septimo, nono mense, & secundo, ac quarto.

S E C T I O VIII.

Hæc ex parva tabula consideranda sunt.

1. Vetus ratio sit repletionem, vacuationem, ciborum, potuum. Mutationes horum, quæ ex quolibet, prout se habent. Odores delectantes, offendentes, implentes, placantes. Mutationes ex quolibet, prout se habent. Illabentes, ingressos, aut egressos spiritus, aut etiam corpora. Sermones, qui audiuntur, alii meliores, alii offendentes. Et a lingua ex quolibet qualia allicuntur. Spiritus, tanta caliditas, frigiditas, crassities, tenuitas, siccitas, humiditas, plenus, imminutus, & copiosior, a quibus mutationes, quales ex quolibet, prout se habent. Continentia, aut contenta: aut intus permeantia corpora. Sermonibus, silentio, dicere quæ vult, sermonibus quibus dicit, an magni, aut multo ti, veri, aut conficti. Prodeuntia, & egresta nosse oportet, unde ceperunt, aut ubi deservunt, aut quantum divulsa sunt, itemque colores, in quibus aut caliditatem, aut salfuginem, aut dulcedinem, aut tenuitatem, aut crassiciem, æqualiter, aut inæquali-

inæqualiter, corpus, tempus. Mutationes quales ex quibus habent. Inco-
 pit eructationem, non obtinuit. Lachrymæ volenti, nolenti, multæ, pau-
 calidæ, frigida, crassities, sapor. Sputum an per se excrecet, aut tussiendo
 rejiciat, itemque vomitum. Solis calor, frigus, humectatio, siccitas. Mutatio
 per qualia, ex quibus, ad qualia se habet. Labores, otia, somni, vigilie,
 Quæ in somno sunt, insomnia, cubilia, et in quibus, et ex quibus. Men-
 tis intelligentia ipsa per se ipsam, circa instrumenta, ac negotia, tristatur, læ-
 ratur, timet, confidit, sperat, desperat, velut Hippothoi domestica famula men-
 tis suæ per se ipsam gnara erat, et quæ in morbo acciderant, fenebat. *Æta-*
tem ab ætate discernere oportet, et an prius, aut posterius quam convenit, quid
fiat, veloci si resolutus est hyeme, et seni ætate, aut infanti, et ætate aut prius,
aut posterius quam convenit. Dentium emissiones, pilorum productiones, geni-
tura magis, et minus, pilorum augmentum, crassitudo, robur, imminutio,
quod cognatum est, et quod per se ipsam, quanto magis, et minus. Anni
tempus, in quo et citius, aut serius. Tempus, in quo factum est, phlogium,
aut siccum, frigidum, aut calidum, sine ventis, aut cum ventis, et quibus ventis.
Temporis in principio, aut medio, aut fine, aut semper, præterito, aut præ-
sentis. Morbi tempus, et hora, æcidentia, circuitus, et ex circuitibus majores,
et per amplius tempus: incrementa, et totius morbi incrementum, remissio,
vigor, et magis, et minus perficiens, et quando, et qualiter, et in quali hora, ac
ætate. Populariter grassantium morborum modi, et si quis ex incipientibus
incoeperit sine vomitu, veluti aut ubi biberint quid continentes, aut pa-
rum purgati. Febriculosi fortassis valde candidi, quorum etiam labia, glia-
lis modus, tempora. Corpus, actio in considerationem ducatur. Visus, auditus,
nasus, tactus, lingua, cogitatio consideretur. Tumores in supremis
palpebris relictæ, dum alia circummerca gracilescent, recidivas faciunt. In extre-
mitate vero subfrigidum, duri, et valde viscosi, et insurgentes, ac inhamen-
tes in his sunt, velut Phalarisio Polymedi. Erumpentes ruores, aut livo-
res, in lippiudinibus, aut ulceribus. Sed et quæ deferuntur ex tuberculis, ac sup-
purationibus, quia signa sunt. Circa mensem tormina circa umbilicum, et
dolores, quandoque a porro. Sed & ab alio his postea. Sacri ignes quibus-
dam a collo, & circa has partes in facie judicabuntur. Nigri etiam, quibus a collo,
mali erant, & si pustulæ essent, malæ erant, & quibus alvus turbata esset.
Adamantus atrabiliarius a peplis pluribus vomuit aliquando ingra, quando-
que a cepis. Febres, in quibus ulcerantur labia, fortassis intermitcentes:
& tertianis perfrigerationes. At amburentes statim ad manum solvuntur sem-
per. Quale inest in articulis considerandum, an non suppurantur. Consue-
tudo autem, ex quibus sani degimus, victus modis, tegumentis, labori-
bus, somnis, rebus veneris, mentis affectionibus. Quomodo morbos fe-
rant, a quibus quæ figuræ, ad quos locos conversi sunt, quando coeperunt,
affuerunt, desiverunt, in quibus intemperans horrendus. Contrariæ in mor-
bo victus rationes, qui faciles, qui agre toleratur. Victus rationes quan-
tum fieri potest cognoscende. Nam non nosse, multarum calamitum res
est. Bonis autem medicis similitudines pariunt errores, ac difficultates. Verum
contraria facit causa, & occasio. Scio, quod difficile est ratiocinari, ac
cognoscere vias, veluti si sit acuto capite, simus, subaridus, bibulosus, agre vo-
mens, facile vomens, niger, juvenis, qui temere vitam degit. Hac simul inter
se consentire difficile est. Cui fistula refringebatur, tussicula permanere im-
pediebant. Cui apex hepatis complicatus erat, cum concussis, dereperit
dolor sedatus est. Saryrus in Thaso cognomento Grypalopex vocabatur, hic
quum annorum viginti quinque esset, sæpe per somnum semen effu-
dit, & interdum quoque frequenter ipsi prodibat. Quum autem ad annum
trigesimum pervenisset, tabidus fiebat, & mortuus est. In Abderis palæstræ
cultus, qui Sthenes dicebatur, multum luctatus adversus fortorem, & in cap-
ut lapsus, digressus multam bibit frigidam aquam. Postea illa nocte vigilie ob-
ortæ sunt, angustæ, & extremarum partium frigiditæ. Postridie ingres-
sus ad domum, & glandula alvo subdita, non subit, verum parum minxit, prius
autem nihil minxerat: ad noctem lavit, nihilominus vigilie, & angustie aderant, desi-
ravit. Tertia die frigiditas extremarum partium, excalescens fudavit, porta autem aqua
*multa tertia die mortuus est. Atrabiliarii etiam comitiali morbo corrip-
 plerumque solent, & vicissim comitiales fieri solent atrabiliarii. Uterque vero mor-*
 bus magis fix, prout ad alteram partem inclinavit. Si quidem enim ad corpus
 inclinavit, comitiales sunt. Si vero ad animum, atrabiliarii melancholici dicti.
 In Abderis Phædrusa Pythææ uxor priore quidem tempore secunda e-
 rat: quum autem maritus ipsius in exilium abiisset, menses multo tempore sep-
 preffis sunt, postea dolores, & rubores ad articulos oborti sunt. Hæc autem ubi
 contrigissent, & corpus virile factum est, & hirsuta penitus evasis, & barbata pro-
 duxit, & vox aspera facta est. Et quum nos omnia tentassemus, quæ ad men-
 ses detrahendos conferre visa essent, non prodierunt, sed mortuus est, quum non
 ita multo

ita multo tempore postea vixisset. Idem hoc contigit etiam Namyliæ Gorgippi uxori in Thalo. Visum est autem omnibus medicis, in quos sane ego incidi, unam spem esse, si menses secundum naturam prodirent. Verum & huic proli-
85 ci non potuerunt, omnia nobis molientibus, sed paulo postea mortua est.

HIPPOCRATIS COI

DE MORBIS POPULARIBUS.

LIBER VII.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Febres sudorifica post eam, nec omnia perfrigerantes.
- 2 Sedor octava die in febre continua. Decoctionum malicorii. Pectoris dolor. Cuminum cum ovo.
- 3 Dysenteria cum febre. Silax candefacta in lac, ac serum immixta. Oblivio in dysenteria cum febre. Circa umbilicum palpitatio neque a cursu, neque a timore.
- 4 Lac in farina, in ventris dolore.
- 5 Febri cum curis dextra, & capitis dolore.
- 6 Tumores aquosi circa pedes pregnantis. E-cleptus ex melle, ac fabis.
- 7 Febri circa cervice sydas.
- 8 Crurum, ac manuum impotentia.
- 9 Febri ardens cum multo bilivomitibus. Aqua de serina crassa in ipsa macerata. Potus descendens strepitus in bibente circa pe-ctus, & ventrem.
- 10 Febri hyemis tempore cum capitis dolore.
- 11 Lateris sinistri dolor, & tussis. Peripneumoniam. Febri post Pleuriam occosum.
- 12 In palato sterens lingua secca, peripneumonica.
- 13 Anginosa dextram manum, ac trus dolens. Hydropicus ex febre ardens. Subleptus.
- 14 Febri acuta post solstitium hybernium.
- 15 In febre vehementi, sanguinis eruptio brevis.
- 16 Lateris dextri dolor cum tussi, & febre.
- 17 In anginosa hyemis tumor sub gutture cum febre multa. In superna ventrem sagitta percussus.
- 18 Hepar iaculo percussus, Caput percussus, In latius iaculo retrorsum percussus.
- 19 Frontis denudatio. Oculi lividifacili. Febri ex solis ardore. Febres post ossa fracta.
- 20 In caput retro percussus, castoreo offe, ac nigrofallo. Adagius digitus, & os dextra manus contrahit. Opisthotoni signa. Luxatio in pede magni digiti. Ulcus circa Nibam, & malleolum.
- 21 Lateris sinistri dolor ex febre astiva, & alvi profluvio.
- 22 Febri acuta ex casu in altissimam fetum gestante.
- 23 Abscessus ex febre ardenti iuxta aurem. Pusilla purpurifusa, calida velut igni ambu-85 fla, per totum corpus.
- 24 Lassitudo, horro, & calor circa solstitium hybernium.
- 25 Alvi agitatio ante, & post febrem, ad mul-
tum tempus.
- 26 Comitialis convulsiones post anfrictum in bel-
luis. Tumor ad genu dextrum ab exercitiis,
nullis usu. Ad eris dextra.
- 27 Humeri dolor, & gravitas. Pectoris, &
lateris dolor in parte concussa. Calores ex
fomentis.
- 28 Febri sexta die intermittens. Dolor circa
umbilicum corrodens. Pituita genitura si-
milis per vomitum rejecta.
- 29 Capitis futura valde cavata.
- 30 Tumor tuberculosus iuxta hepar ad iunum ven-
trem descendens, alve multo tempore li-
quefacta. Capitis dimidium partem dolens.
Suppuratibus, & affectionibus omnibus
circa oculum, dolens ad noctem.
- 31 Tussis hyeme, ac aestro spirante. Calores
multi sedati. Febri acuta ex casti popu-
lariter grassante. Urina trivi lotura si-
milis.
- 32 Calliphylly potus. Ventre quando purgandi.
Cubiti proctus ex casu sancatus.
- 33 Cordis dolor post venum affectionem. Aqua
marina in cisternis. Fursum decoctum in
cisternis, renibus affectis.
- 34 Syrdus, Dentis, & maxilla dolor vehemens.
Urina stillicidiana, Capitis ex microdolo-
res, Uteri affectiones. Colli tuberculum.
- 35 Gingivæ dolor. Nervorum in cruribus disten-
tio. Regio morbo laborantes.
- 36 Desillatio, tussis multa. Veneris in desil-
latione usus. Cubi circa febrem fastidium.
- 37 Gibbositas in spina ex phrenitide. Oculorum
fluxiones. Ad pregnantium dolores ex ca-
su, aut convulsione, aut plaga. Dolor ex
pharmaco ad statum perendum.
- 38 Pythocelis curandi ratio. Pernices. Oculis
incommoda. Lumborum, coxæ, & cru-
rum dolor ex laboribus. Origonum oculis,
dentibus malum. Puer desillatus ex casu.
Humeri dolor ex desillio.
- 39 Phrenitidis.
- 40 Inguinum tubera, Cholericæ bilis erupiones
fursum, ac desorsum ex carnis esu. Cho-
lericæ affectiones, & febres intermittentes
quando magis sunt.
- 41 Lateris dolor.
- 42 Macula in corpore, cuticum moribus similes.
- 43 Potus interceptio, inquantia, febrium. Po-
tus interceptio non servans. Tibicina
timor vestis tantum.
- 44 Cæcure, & corpore evoluta sibi videri. O-
culi affectio velut fulgur elucens.
- 45 Tristitia, & desiderium a vita descedendi.
Agnita mata ex capitis dolore. Atrochilarius.
46 Effervor ex potationibus, ad noctem febri
postidie

pestilentie vomitus biliosus. Urina cineris speciei.

- 47 Febrius, & lateris sinistri dolor circa pleuridem. In semitertia anxietas, & vomitus, & simul horror febre incipiente.
- 48 Cordis dolor in semitertia circa accensionem. Abortus gemellorum quinto mense ex causa. Venter dolor nono anno ex gemellorum abortu.
- 49 Lateris sinistri dolor ex nausea, & lassitudine. Dysenteria, alvi egressiones subruptae, & mucosa, ante partum. Coxa dolor in morbo articulari.
- 50 Vomitus absorptionum per quatuordecim dies circa febrem. Anxietas, strangulatio, & dolor ventris, ex sanctorum crudorum esu.
- 51 Humeri dolor, & gravitas vehemens ad brachium, anxietas.
- 52 Pustula in gravibus, coxis, lumbis, &c.

Suppuratus ante hydropem.

- 53 Alvi egressus multa in febre ardenti inedia moderata. Cruditates ex via, & potu. Vomitorium ex aqua, aceto, & sale. Pedis digiti ulceratio cum febre.
- 54 Carcinoma in facibus ulnus. Urina quales in capitis doloribus.
- 55 Maxilla ex densum dolore corruptio. Splenicus & vitiatu coloris. Nephriticus sanguinem movens.
- 56 Carcinoma circa pectus. Umbilicus sanctus. Febrius repetens, & in sanum colapsio.
- 57 Ad splenis dolorem vehementem. Febrius acuta, & rubor faciei ex nulla manifesta causa.
- 58 Catapulta pectus ictus. Emacius ex venatione, & discursu hydropicus. Inguinum tumor ad sex annos, variis, & coxendicem dolores. Natura concitata, ac aversa, Calvaria per medicina delictum.

S E C T I O I.



OST canem febres fiebant sudorifica, & non perfrigerabantur penitus post sudorem, sed rursus incallescabant: & leniter longae, & iudicatu difficiles, & non valde singulose, paucis in septimo, & nono desinebant, aliis undecimo, & decimo quarto, & decimo septimo. Polycrati febris, & sudor, qualis descriptus est, a medicamento purgatio deorsum vehementer, & febris adeo lenis facta est, ut obscura consisteret, praeterquam in temporibus, & sudores ad vesperam circa caput, collum, pectus. Deinde rursus etiam per totum ventrem, & rursus incallescerebat. At circa duodecimum, & decimum quartum febris aucta est, & modice alvi subegestiones. Post purgationem usus est forbitionibus. Circa decimum quintum dolor ventris iuxta splenem, & sinistram lateris mollitudinem. Calidiorum appositio minus profuit, quam frigidorum. Quum infuso per clysterem molli usus esset, cessavit dolor. Idem quoque Cleocydi profuit ad dolorem similiter habentem, itemque febrem. Circa decimam sextam calores leniores esse videbantur, & egestiones bilis meracae, & animus audacior, spiritus autem moderatus. Quandoque vero acervatim attractum, rursus acervatim expirabant, velut praeter animi deliquio, aut velut in umbra desidens respirare solet is, qui per aestum iter fecit. Decima septima itaque die desidens in sellam, animi deliquium incidit, & multo tempore sine voce, ac sensu jacebat, & vix aquam mulsam hauriebat, fibras in collo distendens, utpote faucibus ressecatis, ac omni virium exolutione praesente. Vix itaque intra se ipsum erat, & calores leviores fiebant. Postea vero desuit morbus vigesima secunda die. Pythodoro eodem tempore febris continua, & grava die sudor obortus est, et rursus incallescerebat. Decima rursus sudor, duodecima forbuit siccum, et usque ad decimam quartam obscura erat, in temporibus autem comparebat, et sine siti erat, et ipse sibi ipsi sanus esse videbatur. Sudores fiebant omni die. Decima quinta iusculum pulli sorbens, vomuit bilem, et alvus infra exturbata est, et febris exacerbata est; rursus desuit, et sudores fiebant multi, et corpus totum perfrigeratum erat, exceptis temporibus. Pulsus non desecit. Videbatur quiescere modico tempore, ut incallescere se putaret. Vigesima quarta quum jam gustaret cibos multis diebus, et pransus esset, multa erat febris, et ad vesperam delirium, accedente simul etiam somno. Detinebat itaque jam continua, et vehemens, et quandoque unam, quandoque duas noctes vigilabat, reliquo vero tempore somnus abunde continebat, ut operosum esset excitare, et delirium in somno, nisi quis quando ex somno excitatus esset, vix ipse sui ipsius carnis compos. Sitis exors. Spiritus moderatus, talis aliquando, qualis Polycrati. Lingua non decolor. Post septimum recidiva succi exhibebantur, post decimam quartam cibis. Circa primos septem eructabat, ac revomebat, quandoque cum potu subbiliofum, circa anxietatem, donec alvus deorsum soluta esset. Sudores post recidivam desecere, nisi quis circa frontem esset tantillus, ut vix significationem de se praeteret, lingua ex somno, si non collaueretur, subalba praesecitate, et ruptiones ulcerum circa ipsam, et in labio inferno, et circa dentes, alvi egestiones paucae. Circa decimam quintam ut recidiva facta est, frequentiores, et viscosae. Decimum malicorii sedavit ipsas. Urinae quales sunt daturae. Sub ultimum tempus dolor pectoris deglucientis potum, et manus in pectore. Cuminum, et ovum abfor.

- absorbenti sedatus est, lingue raritas proliuit. Quinquagesima a prima circa arctum sudores breves iuxta lumbos, & pectus; & corpus perfrigerabatur, exceptis temporibus, valde modico tempore. Prima & quinquagesima remisit, nec iterum apprehendit. * Eratolai filius circa aequinoctium autumnale dysenterici se habebat, & febris tenebat. Egestionis alvi erant biliosæ, tenues, multæ, & moderate subquentæ. Dolor autem ventris vehemens. Ubi serum, & lac bibisset, silice candefacta immissa, dolores, & subquentæ egestionis moderatores fiebant, sed biliosæ comitabantur, & sæpe ad exonerandam alvum surgebat, sed minore dolore. Febricula vero & ægroto, & multis omnino non adesse videbatur per omne tempus, post primos sex dies adeo obscura erat. Verum iuxta tempora pulsus erat, & lingua præ siccitate subalba, & moderate siticulosus, & sine somno. Sorbitionibus autem jam utebatur, & vinis. Quum jam ad decimum quartum diem pervenisset, tubercula circa aurem oborta sunt tum alteram, tum utramque, dura, ac cruda; omnia disparuerunt, moderate autem dolorosa erant.
- 60 Quum autem non desinerent egestionis, & semper biliosæ essent, absorbenti herbam in farina, biliosæ egestionis, & dolores ad tempus aliquod mitiores facti sunt, liquidus vero multas sæpe egerebat, & cibos valde averfatur, & omni necessitate coactus admittebat. Calor autem, & lingua, & sitis tales sequebantur, quales dicti sunt, & sudores nulli. Oblivio vero huiusmodi quædam. Ubi interrogasset de eo, quod paulo antea audivisset, modico interposito tempore rursus interrogabat: & rursus repetebat, velut qui non dixisset, & se desiderie obliviscatur, nisi quis ipsum commonefecisset, & ipse sibi ipsi conscius erat huius affectionis, neque ignorabat. Spiritus qualis sano. Ultra trigessimum vero usque ad quadragesimum diem, & dolor ventris multum augetur, & supinus decumberebat, & se convertere ne tantillum quidem poterat, & quia dolor vehemens erat, alius, qui cibum exhiberet, opus habebat. Alvi egestio erat multa, & secreta, tenuis, & calotes viscosi, quæcumque tandem ingessisset, & quandoque subquenti, & corporis dolor, colloquatio extrema, & impotentia, & tunc aliquod sublevante surgere amplius poterat. In medio vero limbalis, ac ossis pectoris, circa hanc sedem adhibita manu, talis palpitatio erat, qualis neque a cursu, neque a timore circa cor generari possit. Bibenti lac asinum coctum, novem heminarum Atticarum mensura ad duos dies, biliosa purgatio vehementer oborta est, & cessaverunt dolores, & ciborum appetentia accessit. Postea vero bubuli lactis crudi quatuor heminas Atticas bibi, pro vice una cyathos duos, in diem.
- 80 primum sextam aquæ partem ammiscens, & vini nigri austri parum. Semel autem in die cibum capiebat ad vespertam. Panis erat ad mensuram dimidiæ chœnicis subincertus, & pisciculus petrosus simplex, aut caruncula capræ, aut oviculæ. Potus lactis post primos decem dies, ad quadragesimam usque sine aqua, cum vini nigri modica parte. Post septuagesimum jam a primo diem, a balneo ad noctem, sudor exiguus obortus est. Utebatur autem modico potu, & post cibum potu austriore. * Crescerat lac in farina magis quam serum caprinum contulit, quum dolor esset circa totum ventrem, & dolores cum multa ad egerendum succisione, ac subquentia egestionis, et tumor circa pedes fere jam ad dies viginti quinque esset. Et Adriano eadem contulerunt. Verum Cæsar filio lac asinum coctum. * Cydis filio circa solstitium hybernum rigor, et febris, et auris dextræ dolor, et capitis dolor. Talis autem auris dolor statim a parvo puero ipsum comitabatur, fluidus, fistulosus, et gravis odoris. Quum autem ita se haberet, plerumque doloris exors erat. Tunc autem dolor erat vehemens, et capitis dolor, secunda, aut tertia die bilis vomitus, desideria exonerandi ventris gratia, prodiit exercementum subbiliosum viscosum, velut ex ovo subpalidum.
- 95 Quarta, et quinta ad noctem aliquantulum delirabat, et dolor capitis, ac auris vehemens, et febris. Sexta alvi egestio a mercuriali, et calor, et dolor cessasse videbatur. Septima velut sanis. In temporibus autem dolor non defect, sudor nullus obortus est. Octava succum sorbuit, ad vespertam autem betæ succum, et in noctem somnus, et valde doloris exors, et nona lætatur ad solis occasum. Verum ad noctem capitis, et auris vehemens dolor. Contigit quoque autem pure manare circa hoc tempus, quum maxime doleret statim a principio. Totam vero noctem nonam, et sequentem diem, ac noctis magnam partem, neminem noscebat. Verum suspirans perseverabat. In die vero intra se ipsum erat, et dolores cessabant, et calor moderator erat. Quum autem sorbisset meteuralem, undecima egressit per alvum pituitosa, mucosa, maleolentia; duodecima, et decima tertia moderate habebat. Decima quarta initio mane fuit, usque ad meridiem per totum corpus sudabat, cum somno, et sopore multo, ut operosum esset ipsum excitare, ad vespertam expectatus est, et corpus quidem moderate perfrigeratum est, in temporibus autem pulsus perseverabat, decima quinta, et decima sexta succi usus est. Decima septima venit rursus dolor eorundem ad noctem, et delirium, et pus fluerebat. Decima octava, et decima nona, ac vigesima infanti modo degerebat. Vociferabatur autem attollere se ipsum nitens, sed capiti dominari non potens, manibus protensus semper aliquid frustra venabatur. Prima et vigesima sudor

fudor exiguus circa latus dexterum, & pectus, & caput. Vigesima secunda fu-
dor circa faciem plurimus erat. Voce autem hoc tempore, si quidem valde co-
naretur, quæ volebat perfecte loquebatur. Si vero ex tempore citra conatum,
semiperfectæ & os exolutum, & maxillæ labia semper in motu, velut qui lo-
qui vellet, & oculorum frequens motus ac intuitus, & color in dextro oculo ve-
lut dictum est submentis, & palpebra superna intumuit, & iuxta maxillam
ruber in fine, & venæ omnes in facie manifestæ adeoque contractæ, & oculis non
amplius nictabæ, sed inente intuebatur, & palpebras diducebat ad supernam
partem, velut fieri solet ibi quid in oculum incidit, & quum biberet, descendens
potus in pectora & ventrem strepitus audiebatur, qualis & Chartadi. Spi-
ritus leniter semper moderatus, lingua qualis est peripneumonici cum pallo-
re albicans, ab initio & semper capitis dolor. Collum semper immobile, ut una
cum capite circumageretur opus haberet, & pars secundum spinam ex collo res-
cta ac inflexibilis, decubitus quales dicti sunt, & non semper supinus decumbe-
bat. Ar pus jam ferofum album, multum negotii ad detergendum cum spon-
giis exhibebat, odor ejus valde excellens, circa postremum tempus pedum con-
tractum non valde percipiebat. * Harpalidæ sorori prægnanti circa quartum
aut quintum mensem tumores circa pedes aquosi fiebant, & oculorum caviæ
partes intumescabant, & totum corpus in tumore elevatum erat, velut in pi-
tuita alba affectis. Tussis sicca, rectæ cervicis inspiratio, & ejusmodi anhelatio, &
quandoque strangulationes a spiritu, ut sedens in lecto perseveraret, decumbe-
re autem non poterat, sed etiam si qua somni expectatio esset, desidebat. Sine fe-
bre erat leniter, & fortis ad plurimum tempus immobilis erat, veluti corruptus,
& translabebatur. Comitabatur autem anhelatio fere ad duos menses. At quum
fabis melle ammixto, & elegebate mellis ipsa esset, & Æthiopicum cuminum
in vino bibisset, melius habuit. Postea tussiendo eduxit multa, matura, pitui-
tosa, alba, & spiratio illa cessavit, peperit autem semellam. * Polycratæ uxori
aestate circa caniculæ fidus febris. Spiritus matutinus minor, a meridie magis,
& paulo densior spiritus. Tussis, & excreatio statim ab initio similis purulen-
tis. Intus circa arterias, & fauces subfibrillabat stridula asperitate. Facies boni co-
loris, in maxillis rubor, non abunde coloratus, sed leniter floridus. Progressu
vero temporis & vox raucofa, & corporis colligatio, & circa lumbos eruptio-
nes, & alvus circa postremum tempus liquidior. Septuagesima die febris extrin-
secus valde friguit, in temporibus autem quies, spiritus vero frequentior
fiebat. Vtrum post hanc quietem spiritus densior, adeo ut sedens perseveraret,
donec mortua est. In arteria strepitus multus inerat, & sudores pravi, & intui-
tus valde modesti, usque ad extremum tempus. Dies accesserunt ipsi perfrigerata
phires, quam quinque. Post primos autem purulentum exferere persevera-
bat. Mulieri supra portas habitanti jam seniori febricula oborta est, quæ
quum jam desueret, colli dolor usque ad spinam, & lumbos, & harum partium
non valde potens erat. Maxillæ erant compactæ, et dentes in se ipsos, plus quam
ut specillum admitterent, et vox basiliens, eo quod resolutum, et immobile,
ac debile esset corpus, prudens tamen erat. Calesfactoris, et aqua multa tepida,
tertia fere die hæc laxavit, et postea succis, et jusculis sana evasit, id quod ad finem
autumnalis temporis contigit. * Apud Herpalidem unctor, erurum,
ac manuum impotentior circa autumnum factus, bibit temere medicamentum sur-
sum, ac deorsum purgans. Ex purgatione febris, et ad arteriam desuebat flu-
or, qui loquentem impediret, et ficeret, ut inter loquendum anhelaret, simi-
liter ut anginosus raucosus. Strangulatio deglutienti, et alia, quæ in angina. Verum
tumor non erat. Febris autem, et tussis augebatur, et excreatio liquidæ,
ac multa pituitæ. Progressu temporis et dolor circa pectus, ac mammam fini-
stram. Quum autem exurgeret, aut commoveretur, anhelatio multa, et sudor
a fronte, et capite, et faucium affectio mollior erat, dolore ad pectus descen-
dente. Ab initio igitur fabis melle ammixto utebatur. Postquam autem febres
derinebant, magis aceto melleo calido, et melle delinctu multo. Ubi præteritis-
sent dies quatuordecim, omnia desierunt, et manuum, ac erurum non longe
postea potens factus est. * Chartadi febris ardens, vomitus bilis multus, et
infra alvi egestio, vigilie, et iuxta splenem tumor rotundus. Tertia die mane
surrexit, strepitu circa ventrem citra dolorem percepit. Ubi vero alvum exonerat-
ret, sanguinis recentis plus, quam congi mensura subiret, et tibi iterum atque ite-
rum cohibuisset, grani concreti, anxietas circa cor, et os ventriculi, et sudor per
totum fere corpus, et febricula frigscente videbatur, et primum prudens erat,
progrediens vero die et inquietudo major, et anxietas, et spiritus paulo den-
sior, et confidentius, ac benignius, quam pro tempore homines compellebat, ac
excipiebat, et quædam animi deliquia accedere videbantur. Quum autem exhi-
beret aliqui succos, et aquam de farina crassa in ipsa macerata, non cessavit, sed
spiritus ad vespervam valde multus erat, et jactatio multa, et ad dexteram, et ad si-
nistram transmovens se ipsum, nullo tempore quiescere poterat. Pedes frigidi. In
temporibus, et capite calor magis propinqua jam morte, et sudores multi, et bi-

- beni strepitus audiebatur circa pectus, & ventrem descendens potus. Quod
 185 vero pessimum erat, ubi dixisset sibi aliquid infra subire velle, & oculis intente
 intuitus esset, non diu se cohibens mortuus est. * Heimoptolem uxori hye-
 mis tempore febris, & capitis dolores, & quum bibisset, ut quæ difficulte de-
 glutiret, surrexit, & cor se sanasse dixit. Lingua livida ab initio. Ocasio vide-
 batur ex horrore post balneum facta esse. Vigilabat & nocte, & die. Post primos
 190 dies interrogata, non adhuc solum caput, sed & totum corpus se dolere dixit.
 Sitis quandoque vehementis, quandoque moderata. Quinta, & sexta, & usque ad no-
 nam semper delirium, & rursus ad se ipsam loquebatur semperfecta cum sopore,
 & aliquando manum ad dealbatum parietem protendebat, & pulvinum quem-
 195 dam frigidum ad caput situm, etiam pectoribus adhibebat, & stragula quando-
 que rejiciebat, & in oculo dextro subercentium quid erat, & lachrymabatur.
 Urina autem erat, quæ in pueris semper pessima est. Ex alvo egebat cum fopore,
 200 quidem quidem subfulva, postea vero aquosa valde, & lususmodi coloris. Undeci-
 ma moderatius calida esse videbatur, & quandoque sitis exors fiebat, adeo ut ni-
 si quis dedisset, non peteret. Somni post primum tempus contingebant modera-
 205 te interdum; ad noctem vigil erat, & ad noctem magis dolebat. Nona venter
 exturbatus est aquosis excrementis. Similiter etiam undecima. Sequentibus ve-
 ro moderate multum ad egerendum surgebat, & talis egestio erat. Erant autem
 in prioribus diebus indignationes, & exaltationes, velut pueri, & vociferatio, &
 timores, & circumspeditiones, ubi sopore excitata esset. Verum decima quarta
 210 operosum erat ipsam continere exilentem, ac clamantem derepere, & per-
 tinaciter, velut ex plaga, & vehementi dolore, ac timore, velut si quis ipsam ap-
 prehensam modico tempore detineret. Deinde rursus quietem habebat, & fopore
 prefla dormiens perseverabat omnino non videns, quandoque neque audiens,
 & totam hanc diem ad utrumque, modo ad tumultum, modo ad quietem trans-
 215 mutabat. Sequenti nocte per alvum subijt quid cruenti, velut mucosum, &
 rursus velut limosum, postea prasina valde, ac nigra. L'ecima quinta repentinæ
 iactationes, & timores, & vociferatio lenis fiebat. Sequebatur autem effusio,
 & indignatio, & exultatio, nisi ipsi cito quod vellet, porrectum esset, & cognosce-
 220 bat quidem omnes, & omnia statim iam post primos dies, & oculi subercentium
 illud sedatum est. Verum infania iuxta temporis occasionem, & vociferatio, &
 mutatio prædicta sequebatur ad soporem. Audiebatur inæqualiter, aliqua valde,
 et si submisit quis loqueretur, aliqua vero clarius eloqui oportebat. Pedes sem-
 per æqualiter cum reliquo corpore calidi usque ad extremos dies. Verum decima
 225 sexta minus. Decima septima moderatius quam alius diebus habens, ad noctem
 horrore ipsi oborto, se contraheus magis febricitabat, & sitis multa erat:
 reliqua similia sequebantur. Tremores autem circa manus fiebant, & aliquan-
 tum concutiebatur caput, & oculorum intuitus pravi, & sitis vehemens: ubi bi-
 bisset, rursus postulabat, & rapiebat, ac large hibeat, neque avellere ipsi poterant.
 230 Lingua sicca, valde rubicunda, & os totum, ac labia ulcerata erant, ac sicca,
 & ambas manus ad os admoveus manducabat, quum tremula esset, & si quis
 aliquid ad manducandum, aut sorbendum obtulisset, large, ac furiose deglutiebat,
 ac sorbebat, & signa circa oculos mala. Diebus autem tribus, aut quatuor
 ante obitum, horrores quandoque incidebant ipsi, adeo ut contraheret corpus,
 & congeberetur, & anhelaret. Crura distendebantur, & pedes frigidi erant. Si-
 235 tis similis, & mentis affectiones similes, & surrectiones ad egerendum, aut inanes,
 aut paucis, & tenuibus prodeuntibus, cum modica quadam tensione. Postrema
 tertia & vigesima, oculis magnus mane erat, & circumspectio brevis, & quietem agebat,
 quandoque etiam absque contentione, ac fopore. Ad vespertam vero dextri oculi
 240 motus, qualis videntis, aut aliquid volentis, ab externo angulo,
 ad nasum, cognoscebatque, & interroganti respondebat. Vox post multa suble-
 sa, & præ vociferatione fracta, ac raucosa, * Amphiphradis filio ætate lateris
 sinistri dolor, & tussis, & alvi egestionis multæ, aquosæ, & subbiliosæ; & febri
 cessasse videbatur circa septimam. Tussis aderat. Color subalbidus, ac subpallidus.
 245 Circa duodecimam cum virore subpallidum spebat. Spiritus progressu
 morbi semper densior, & anhelatio, & stridula asperitas circa pectus, & arteriam.
 Sorbitionibus utebatur. Prudens per omne tempus. Circa vigesimam octavam
 mortuus est. Sudores quandoque fiebant foras. Campo peripneumonicus:
 alvus statim subibat. Circa quartam sudor multus, febricula cessasse videbatur,
 250 tussicula nulla, ut ita dicam. Quinta, sexta, & septima detinebat febris,
 sudor octava. Nona exsereavit pallidum. Decima subibat alvus æcervatim non
 sæpe. Circa undecimam mitius habebat. Decima quarta sanus. Heimoptolem
 post plejadis occasum febris accessit. Tussis non valde, lingua peripneumonia.
 255 Nona exudavit, totus frigidatus est, velut videbatur. Obtulerunt ipsi succum:
 circa meridiem calefcebat. Undecima sudor, & alvus erupit biliosis egestionibus.
 Tussicula accessit. Decima quarta pallidum excreavit, & stertebat.
 Decima quinta quum per totum tempus prudens mansisset, mortuus est. * Alius quidam in palato stertens: lingua sicca, peripneumonia: 17
 prudens

- prudens mortuus est. Et Posidonius adhuc æstate instantē, juxta pectus, & præcordia, & latus multo tempore dolebat citra febres. Multis autem annis antea suppuratus fuerat. Hyeme vero quum inhorruisset, dolor augetur, & febricula tenuis, & excreatio purulenta, tussis cum stidula asperitate circa fauces; & stertens, quum prudens esset, mortuus est. Balis filius quum ex monte penitus aberrasset, sexta lingua prava, subtrubra, & vocem læterat inter aberrandum. Oculi colorati, nanantes velut dormitantium; color reliqui corporis non valde velur in morbo regio, sed subpallidum, lividum, vox prava, lingua obscura, peripneumonica, non prudens. Spiritus ad manum malus, non densius, neque magnus, frigidi pedes lapidosi. Circa nonam mortuus est.
- 13 * Quædam apud Metronem anginosa, dexteram manum, ac crus doluit. Febricula tenebat debilis, suffocatio die tertia remisit. Septima convulsa: vox intercepta. Stertor, dentium collisio, ac confectio, maxillarum rubor. Hæc non longe vitam protraxit: quinta, aut sexta mortua est. Signum circa manum sublividum. Bion ex hydropico diuturno cibum averfabatur ad multos dies, & urinae filicidio vexabatur. In sinistro genu abscessus fiebat, suppuratus est, mortuus est. Ctesiphon hydropicus ex febre ardente multa, & prius hydropticus, ac splenicus, valde repletus est & scortum, & crura, & peritonæum membrum, alvum, ac intestina ambientem. Ad finem tussis, & suffocationes fiebant adnoctem, magis a pulmone, velut pulmonicis, ac tabescentibus. Tribus, aut quatuor diebus ante diem obitus, rigor, febris, circa semur dextrum itus ad venam mediam ab inguine collectio velut ignis feri, sublividum habens ruborem. Ad noctem cordis, ac oris ventriculi dolor, & non longe postea vocis interceptio. Strangulatio cum stertore, & mortuus est. Et in Olyntho hydropicus, de repente voce privatus, noctem, & diem desiciens, mortuus est. Prodro-
- 14 mi filius, æstate sublevis, æstuosus. Lingua ipsi subarida, obscura, egestio alvi deorsum multa. Superstes evasit. * Leophorbidæ febris acuta post solitium hybernum, præcordiorum, & ventris dolor, alvi egestiones liquidæ, biliose, multæ, & interdum soporosis, lingua peripneumonica, tussis non inerat. Duodecima nigra pauca, & præstina egestio. Decimaquarta febricula cessasse videbatur. Postea vero sorbitionibus utebatur. Decima sexta os valde sanguinosum siccam fiebat; ad summam vespeream horror, febris. Vigesima prima circa meridiem rigor, & sudor, febris desit, verum calor adhuc suberat tenuis, ad noctem rursus sudor, & vigesima secunda ad noctem sudor, & calor remisit. At prioribus diebus omnibus sine sudore erat. Alvus autem humecta fuit etiam in putata postea recidiva. Quæ superne habitabat Theoclis cognata: sub pleiadas sebris acuta, sexta videbatur cessasse; hinc velut febre sedata, septima mane maxilla valde rubicunda, utra non memini. In vespere febris venit multa, & animi deliquium, & vocis interceptio erat, non longe vero postea sudor, & quies cessante morbo septima die. * Theodori uxori in febre vehementi sanguinis eruptio facta est hyeme. Ubi febris desisset circa nonam, non longe postea, lateris dextri velut ab utero gravitas. Sed & primum, & sequentibus diebus obortus est dolor vehemens juxta pectus, & somento ad latus dextrum adhibito, remiserunt dolores quarta die, spiritus densior, arteria vix respirans subsilabatur, & supina difficulter se vertere poterat. Ad noctem febris acutior, & delirium breve fiebat. Quinta mane mitior esse videbatur: sudor de facie diffundebatur primum modicus, deinde multo tempore per totum corpus, ac pedes. Postea vero videbatur ipsi febris remisisse. Erat autem ad manum frigidius corpus artetiarum. Quæ vero in temporibus sunt etiam, magis saliebant, & spiritus densior, & alias atque alias delirabat, & omnia ad deterius. Lingua perpetuo alba valde, & tussis non inerat, nisi tertia, ac quinta die ad breve tempus. Sitis non erat. Sputatio erat. Præcordium dexterum valde elevabatur circa quintam, verum postea mollius. Egestio tertia die a balneo stercoris modici. Quinta rursus liquidi modici. Venter autem mollis. Urinae ætæ, cineris speciem referentes, oculi velut delasati: difficulter suspiciebat, ac circumferebat oculos. Quinta ad noctem ægre affecta fuit, & delirium sequebatur. Sexta rursus eadem hora, qua plenam solet esse forem, multus sudor diffundebatur: incipiebat a fronte ad totum corpus. Ad multum tempus prudenter res suas disponebat, ad meridiem vero valde delirabat, & perfrigeratio similis erat, omnia vero circa corpus graviora. Ad vespeream tibia ipsius ex cubili decidit, & puero præter rationem minahatur, & rursus silebat, & ad quietem convertebatur. Circa primum somnum sitis multa, & infania, & erecta sedebat, & præsentibus conviciabatur, & rursus concituit, ac in quiete erat, & videbatur reliquum noctis sopore pressa esse. Vetum oculos non clausit. Ad diem indicabat pleraque turbis, corpore quiescens, & moderate intelligens. Sudor rursus eadem hora, similiter oculi demissi, ad infernam palpebram magis incubentes, rigide, ac stupide inuentes, albæ oculorum partes pallidæ, & mortisæ, & totum corpus pallidum, ac nigrum. Manum plerumque ad parietem, aut ad stragula habebat, strepitus autem bibenti magni fiebant, respuebat, & sursum ad nulum absorbebat, &

- Voccos legebat, & faciem obvelabat. Post sudorem manus velut in glaciem congelatæ, iudor sequebatur frigidus, corpus ad manum frigidam, exsilebat, vociferabatur, infaniebat, spiritus multus, inanus tremulus fiebant, sub mortem progressæ jam etiam convulsæ. Septima die mortua est. Sexta die in nocte stratum modice permixxit, quod innoxerat de sellis detraxebatur; viscosum, genituræ simile. Vigilabat per omnes dies; post sextam urina subcruenta.
- 335 * Anriphanis filio hyeme lateris dexteri dolor, tussis, febris; edebat, deambulabat etiam febriens. Videbatur ruptio facta esse, nona remisit, febris non relinquitur, tussis multa, & crassa, ac spumosa spuebat, latus dolebat. Circa decimam quartam, & rursus vigesimam febres desinere videbantur, & nullus corripiebatur, erat autem calor tenuis, & parum quid relinquebat. Tussis quandoque deficiebat, quandoque abundabat, cum multa suffocatione. Tunc vero remittebat, & excreatio post hos dies multa cum strangulatoria tussis, & purulenta supra vas essentia, ac spumantia prodibant, & in faucibus plerumque stridula asperitas sublebat, anhelato semper detinebat, & spiritus densior; raro bene spirabat. Ultra quadragessimam diem, prope sexagesimum opinor, oculus sinister excacatus est, cum dolore, sine dolore: nec longe postea etiam dexter, & pupillæ valde albae, ac siccae fiebant, & mortuus est post excacationem, non progressus ultra septem dies, cum stertore, ac multa dehydratione. Similia & ex similibus eodem tempore contigerunt etiam Thassalon, servenia, & spumantia, & purulenta, & tussis, & stridula asperitates.
- 340 * Polemarchi uxori hyeme angustæ tumor sub gutture, febris multa; vena secta est, cessavit strangulatio ex faucibus, febres comitabatur. Circa quintam genu dolor, & tumor sinister, & circa cor dixit sibi videri aliquid colligi, & respicebat, velut respirant hi, qui sub aquammersi fuerunt, & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore loquuntur, engastrimythi, quasi ex ventro loquentes, appellari. Tale quid contingebat. Circa octavam, aut nonam ad noctem alvus prorupit, ac liquida multa, acervata, & graveolentia egressa, vox interceptabatur. Mortua est.
- 350 Aristippus in supernum ventrem violententer, ac graviter sagittæ ictu percussus est. Ventris dolor vehementis, & brevi ardebat, deorsum vero nihil egerebat, anxius erat, biliosa abunde colorata quam vomisset, melius habere videbatur. Paulo post dolores tussis vehementes, & venter similiter ardebat, velut in volvulis, calores, & sitis. In septem diebus mortuus est. Neapolis percussus similiter, eadem passus est: acri insuso per clysterem immisso, alvus deorsum erupit, color per corpus diffusus est tenuis, pallidus, niger, oculi squallidi, stupore rigidi, mentis conversi, intente intentes.
- 360 * Ei, qui in hepate percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum, per corpus diffusus est, oculi cavi, anxietas, molestia. Mortuus est prius, quam concio solveretur, in qua die percussus est. Qui caput percussus est lapide a Macedone supra tempus dextrum, ita ut fissura falcem facta, dissectio contigisset, vertigine affectus est, & cecidit. Tertia die voce destitutus erat, anxietas, febris non valde vehemens, pulsus in temporibus, velut tenuis calor, nihil audiebat, neque sapiebat, neque quiescebat, humiditas circa frontem, & sub nasum, usque ad mentem. Quinta mortuus est.
- 365 Enates in Delo iaculo percussus est retrorsum in latus iuxta sinistram partem. Ulcus quidem sine dolore, verum tertia die ventris dolor parvus, non egerebat, insuso per clysterem immisso, stercus prodibat, & dolor deficiebat, sedes extra ad scortum extrahat, quarta die etiam ad pubem, & totum ventrem dolor vehementer irruerat, quiescere non poterat, biliosa vomuit abunde colorata, oculi cum virore pallidi, qualis in animi deliquiis. Post quintam mortuus est.
- 370 Erat autem calor quidam tenuis in ipso. Billo percussio in dorsum, spiritus multus per vulnus cum strepitu prodibat, & sanguinem fundebat. Verum deligatus emplastro, cunctis vulneribus commodo, sanis evasit.
- 375 * Contigit & infelicissimo Philes filio, denudatione in fronte facta, nona die febris. Deinde livescit os, mortuus est. Et Phanix, & Evergetæ filio, livescit ossibus, & febricitantibus, curis ab osse discessit, & pus subtus depascebatur. His, dum perforarentur, ex ipso osse egressa est sanies tenuis, serosa, subpallida, graveolens, lethalis. Contingit autem talibus etiam vomitus accedere, & ad finem convulsionem: & ut clangorosam vocem edant, ac impotentes fiant, & si in dextris fuerit vulnus, in sinistra parte, si vero in sinistris, in dextra.
- 380 Theodori filio nona die in sole versato, febris accessit decima die, ex denudatione iuxta os nullus momenti. In febre vero denudatum est, discessit curis, multum clangorosus erat. Vigesima secunda venter elevatus est maxime circa præcordia. Vigesima tertia mortuus est. Quibus ossa fracta fuerint, his septima die febres. Si vero castidius fuerit tempus, etiam citius.
- 385 Ar si magis fracta fuerint, etiam e vestigio. Et Exarmod, famulus similiter dolorem habebat ad semur, non e directo vulneris, & factus est clangorosus, & colli erat dolor. Et Posidocreon tertia convulsio, calor non relinquebat; mortuus est die decima octavo.
- 390 * Magoræ filius percussus est retro in caput, contuso osse, ac nigresceto: quinta die superstes evasit, os autem non discessit. Magnæ navis gubernatori anchora digram

- gitum medium, & os dextræ manus confregit. Inflammatio successit, & marcor, & febris. Subpurgatus est. Quinta calores moderate remiserunt, itemque dolores. De digito quid decidit. Post septimum diem sanies exibat leniter. Postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictio facta est opisthoronum advenare. Ad hoc conferebant maxillæ confectæ, cum ad collum rigide. Tertia die totus convellebatur in posteriorem partem, cum sudore. Sed a prædictione mortuus est. Harpali filius ex liberta Telephane luxuriamem infra in pede magni digiti accepit. Inflammatus est, & valde dolorosus erat, & ubi repositus est, & dolor remisit, proficisciebatur ad agrum. Rediens, limbos doluit, lavit, maxillæ ad noctem conferebantur, & opisthoronus aderat, saliva spumosa vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Tithi non Damonis filius habebat circa tibiam, aut malleolum ulcus juxta nervum humi purum. Huic a pharmaco corrosio contigit, ut opisthorono moreretur.
- 21 * Menoni sub arcturum, & prius, ex febre æstiva, & alvi profusio ægre afflicto, & ex itinere delassato, dolor lateris sinistri, & tussis, quæ ex destillatione ne quidem etiam prius aderat, verum tunc valde intenta erat, & vigilabat, & febrem statim ab initio ægre ferebat, & erectus sedens tertia die spebat pallidum: arteria ex stertore subfistilabat. Circa quintam spiritus moderate densus, pedes, tibie, extremæ partes plerumque frigide, & extra stragula. Alvi egestio ab initio fiebat biliosa, neque valde modica, neque multa. Septima, octava, & nona levius ferre videbatur, & somni aliqui contingebant, & quæ excrecabat crudiora erant. Decima, & usque ad decimam tertiam, alba, & pura, & præcordium mollius fiebat, sinistram tamen distentum, & melius spirabat. Subdita glande moderate alvus subit. Decima tertia rursus pallidum spebat. Decima quarta magis. Decima quinta prasinum. Alvus autem maleolentia, biliosa, liquida, multa demisit. Sinistram præcordium elevabatur. Decima sexta autem etiam valde intumuit, & spiritus jam stertorosus, sudor circa frontem, & cervicem, raro ad pectus, extremæ partes, & frons leniter permanebant frigide. Saliatio vero venarum circa tempora derinebat. Somni soporosi noctem, ac diem postremo tempore. Urina ab initio cruda, cineris speciem referens. Circa decimam, & usque ad decimam tertiam tenues, & non decolores. Verum a decima tertia, quales ab initio. Cleocho lateris dolor, & febris. Remisit febris, sudavit per totum corpus. In urina multa erant, quæ ferebantur, ac innatabant, postea turbata est.

S E C T I O I I.

- 22 * Circa pleiadum occasum Olympiadæ uxorem, sortum octimesiorem gestantem, 1. ex casu febris acuta corripuit. Lingua æstiosa, sicca, aspera, pallida, oculi pallidi, & corpus mortiferum. Fortem corripuit quinta die, facile liberata est, & somnus ut videbatur soporosus, vesperi excitantes non sensit, stertuatorum adhibuit perceptit, potionem suscepit, & succum, deglutiens potionem aliquantum tussivit, vox non solvebatur, neque ipsa quicquam allevabatur ex morbo. Oculi tristes, ac submissi, spiritus sublimis per nasum trahebatur, color prævus, sudor circa pedes, & crura, ubi jam morti propinqua esset, mortua est.
- 23 * Nicolai concubina ex febre ardenti abscessus juxta autem fiebat ab utraque parte, paulo posterius alter, quam jam febris remittere videretur, velut tumor laxus. Circa decimum quartum magni citra signa sedati sunt, recidiva facta est. Color qualis mortuorum. Lingua aspera, valde densa, subalbida. Siticulosa, alvi egestio deorsum multa, liquida, male olens per omne tempus. Ante finem corruptum est corpus præ multitudine egestionis. Mortua est circa viginti diem. Andream ante pleiadem horror, febris, vomitus. Ab initio semitertiana apparebat. Verum tertiana erat. Quam rursus in foro versaretur, inhorruit: febris acuta, vomitus bilis mærae, delirium ad noctem. Quarta rursus melius habebat. Quinta difficulter. Sexta a mercuriali probe egestit alvus. Septima difficilis, & sequentibus jam diebus febris magis continenter affligebat, & sine sudore ab initio, & siticulosus. Maxime vero os resiccabatur, & potionem nullam libenter admittebat, quam multa inaciditas circa os esset. Lingua sicca, inarticulata, asperitas efflorescebat, cum pillore albicans. Vigilans, anxius, exolutus, fractus. Lingua præ siccitate quandoque subblata, donec madesecisset, succum maxime admittebat. Noxia, aut decima circa aurem sinistram, atque etiam alteram tumores parvi citra signa apparuerunt. Urinæ semper non decolores, verum sine subsidentia. Decima quarta sudor circa superas partes non multus, sed moderatus. Calor circa decimam septimam evanuit. Alvus post decimam sicca, circa glandem subditam non egerens. Circa vigesimam quintam pustula per totum corpus pruriginosa calida, velut igne ambusta. Dolor autem erat circa locos sub alis, & latera, transiit ad crura citra signa, & desivit. Balneum proderat, & unguenti illicio cum aceto. Mense vero secundo, aut tertio fortassis, ad rhenes dolor, qui etiam antea quandoque fuerat, sedatus est. * Arist.
- Hipp. Opera. Z 3 stocrati

- stocrati circa solstitium hybernium lassitudo, & horror, & calor. Postea tertia die incepit lateris dolor, itemque lumborum, & tumor sub alis initum sumens, per totum dextrum latus durus, rubicundus, lividus, velut ab igne calefactus, & iustus, anxius, omnia moleste ferens, valde siccilofus, lingua subalbida. Urine non procedebant, crura subfrigida, alvi egestio a mercurialis modica, liquida, subalbida, spumosa, ad noctem spiritus elevabatur, sudor circa frontem, partes inferne frigidae, collum inflabatur, tussis non inerat, mortuus est prudens. Onesiafacti circa autumnum lippitudo, postea vero febris quartana. Incipiente quartana cibos valde averfabatur, in progressu vero libenter accipiebat. Sed & Polychatti in quartana similia circa cibum accidebant. * Mnesiafacti alvi egestio ante febrem, & postea, ad multum tempus sequebatur, multis albis mucosis prodeuntibus: & quandoque panco sanguine, citra dolorem. Strepitus autem in ventre. Post febrem abscessit circa sedem tuberculum durum, quod multo tempore inconcoctum comitabatur, erupit ad intestinum, & foris fistulosum fiebat. Deambulante vero ipso in foro, splendores prae oculis observabantur, & solem non valde videbat. Quum autem parum discessisset, extra se ipsum erat, & collum convulsus est. Postquam autem domum deportatus est, vix suspexit, & ipse vix sui ipsius erat. Primum autem collustrabat circumstantes, & corpus perfrigeratum est, vix vero recalefactus est utriculis, & fomentis adhibitis. Postquam autem ipse inera se ipsum esset, & exurgeret, non volebat exire, sed timere dixit. Si vero quis de gravibus morbis differeret, subducebat se prae timore. Quandoque etiam caliditatem sibi ad praecordia allabi dixit, & oculorum splendores comitati, & alvi egestio multa, & saepe, & similis hyeme contigit. Facta est venae sectio, datum est veratrum, bibit lac bubulum, prius autem asinum contulit, & alvi egestionem sedavit. Aque potus ab initio, deambulationes quoque, & capitis purgationes. * Anecheti filio haec contigerunt, hyeme in balneo dum ungeretur ad ignem: calefactus est, & statim in comitales convulsiones incidit. Postquam vero multae factae essent convulsiones, circumspexit, non apud se se erat, quum autem inera se ipsum esset, rursus postmodum mane corpeus est, ac convulsus, spuma non valde. Tertia, lingua inarticulata. Quarta per linguam significabat. Quinta loqui non poterat, sed in principis nominum haerebat lingua valde, & convulsio fiebat, & extra se se erat. Quum vero haec remitterent, lingua vix in suum statum restituebatur. Sexta abstinebat ab omnibus, & sorbitione, & potu, & a nulla amplius affectione corripiebatur. Cleocho ex lassitudinibus, ac exercitiis melle per dies aliquot utentis, tumor ad genu dextrum obortus est. Immo parvis ad infernam partem circa tendines sub genu, circumibat subeludicans, & fura intumescerebat, ac dura erat, & ad pedem, & ad malleolum dexteram, & tubercula ad gingivas circa dentes magna, velut iuxta acinis, livida, nigrescens, doloris exortia, ubi cibum non caperet. Sed & crura doloris exortia erant, si non exurgeret. Venit enim & ad finistrum tumor, verum minus livefcebat. In tumoribus circa genua, ac pedes velut suppuraciones erant. Tandem vero fieri non poterat, ut staret, aut calcareis insisteret, sed in lecto decumbebat. Calores manifesti quandoque cibum averfabatur, non valde siccilofus, neque ad sedem surgebat, anxius, & quandoque etiam pusillanimitas tenebat. Veratrum exhibitum est, & capitis purgationes. Ad os pharimacum ex magna thuris cum alius ammixtis profuit. Ad ulcera in ore, sorbitio lenticulae commodi erat. Circa sexagesimam sedati sunt tumores a secundo vetatro, dolores tantum ad genua decumbenti venetunt. Humor autem, & bilis abscessit ad genua, etiam pluribus diebus ante veratrum. * Pistrato humeri dolor, & gravitas diuturna deambulanti, & alius sano, hyeme vero incidit multus lateris dolor, & calor, & tussis, & excreatio sanguinis spumosi, & in saniebus stertebat. Verum facile ferebat, & apud se ipsum erat, & calor remisit, simulque excreatio, & stridula asperitas, & circa quartam, aut quintam diem sanis. Simonis uxori in partu concussae dolor circa pectus, & latus, tussis, febres, excreationes purulentae: tabes, ad sex menses febres, & alvi prostrivia semper. Ad finem febres cessaverunt, post cessationem substitit alvus, & post septem dies mortua est. Euxeni uxorem ex fomentis vi videbatur, calores nullo tempore relinquebant, magis tamen ad vespem augebant, sudores fiebant per totum corpus. Febre ad augmentum tendente, frigidas pedum, quandoque etiam tibiarum, & genuum fiebat, tussicula sicca ad modicum tempus, febre exacerbari incipiente, deinde cessabat, per multum autem tempus etiam torius corporis rigor fiebat. Sine exors semper. Ubi medicamentum bibisset, & serum, magis laesa est. Ab initio omnino sine dolore erat, & bene spirabat. Medio vero tempore lateris dextri dolor fiebat, & tussis commota est, & anhelatio, & excreationes parvae albae, ac subrenes, & horror non amplius ex pedibus, sed de collo, & dorso, & alvus liquidior, remisit febrem cum multo sudore, & perfrigerata est. Anhelatio vero erat varia, mortua est post remissionem septima die, quum esset mente prudens. * Polemarchi uxor aestate incepit febre, dimisit autem ipsam febrem sexta die, citans obambulabat, ad noctem calores.

calores. Rursus interposito tempore contripuit febris, & non dimisit tribus se-
re mensibus. Tussis multa, excreatio pueritæ. Postquam vero viginti durasset
diebus, spiritus semper densus, in pectore strepitus, plerumque sudor, mane fe-
bris mitior, & horrores quandoque contripiebant, somni fiebant, & alvus aliquan-
do humectabatur, & rursus restiebat. Moderate cibum gustabat; at medio tem-
pore ad genua, & tibias dolor, & ad flectendum, ac extendendum alio opus habe-
bat. Perseverabant crurum affectiones usque ad finem iam propinquum, & intumue-
runt pedes usque ad tibias, & ad contactum dolebat, & sudores, ac rigores defe-
runt. Febris autem semper intendebatur. Ante obitum alvus erupit; prudens
permanebat, tribus ante obitum diebus in faucibus stertebat, & spiritus rever-
tebatur. Mortua est, Hegesipolis filiolus quatuor fere mensibus dolorem circa
umbilicem corrodentem habebat. Progressu temporis augebatur dolor.
Percutiebatur ventrem, vellicabatur, calores contripiebant, contabescibat, of-
sa reliqua erant, pedes tumebant. Testes, venter, partes circa umbilicum infla-
ta. Num & quibus futurum est, ut alvus exturbetur? cibum aversebatur, lac so-
lum admittebat recens, & alvus liquida erat, & subercentia sanies subibat, ma-
le olens, alvus ardebat. Mortuus est, ubi vomisset modicum pinuicofum, adeo ut
quis genituram putasset. * Plarex filio, ubi mortuus esset, futura capitis val-
de cavata est. Quum autem ægrotaret, semper manu sinequit contigebat, ma-
xime morti propinquus. Non dolebat autem caput, & in femore sinistro sub in-
guen partes inferiores livide. Testes autem graciles erant. Similia etiam
Hegotoridæ filio. Mortuus est. Præterquam quod vomitus plures sub obitum
contigerunt. Hippæ soror hyeme Phrenitica, mente aberrans, manibus
negotium exhibens, lacinians se ipsam. Quinta, & sexta ad noctem voce desti-
tuta, soporosa, insans in maxilla, & labia, velut dormientes. Septima mor-
tua est. Ofander ubi inhorruit, lateris dolor, & ad genua dolor, itemque ad
femur. Ubi comedisset, delyrabat. Brevis mortuus est. * Cleotimo furori, al-
vus liquefacta multo tempore, & calore oborto, juxta hepar rumor tuberculo-
sus ad innum ventrem descendit, & alvus liquida fiebat, & aliud ipsi tubercu-
lum juxta hepar sursum ad præcordium. Mortuus est. Quibusdam capitis
dolor vehemens cum calore: quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem, &
secundum nares humor quidam decedit tenuis, aut maturus, aut ad aures, aut
ad fauces ex capite securius. Quibusdam vero hæc siccæ. At marcor vehemens
periculosus est. Si vero affuerit anxiosus, aut biliosus vomitus, aut stupor oculo-
rum, aut vocis interceptio, & raro quid loquitur, aut delyrium, lethalia hæc sunt,
& convulsoria. Quæcumque vero ex destillatione dimidiam capitis partem dolent,
& humore secundum nares decedente insuper febricitant leniter, in quinta, aut
sexta perfrigerantur. Echecrati cæco capitis dolor vehemens magis ad po-
steriorem partem, & colli quo loco connexio est, & ad verticem procedebat. Pro-
grediente tempore, & ad aurem sinistram, & dimidia capitis pars dolorosa erat.
Mucosa semper procedebat leniter combusta, & calor contrabatur tenuis, &
cibum aversebatur. In die melius habebat, ad noctem vero dolebat. * Postquam
autem pus per autem erupit, cessaverunt omnia, etupit autem circa hyemem.
Num & omnibus suppurationibus, & affectionibus circa oculum dolores ad
noctem? * Quibus tussis hyeme maxime austro spirante crassa, & multa ex-
screantibus, febres accedunt, leniter autem quinta die sedantur. Tussis vero cir-
ca quadragesimam, velut Hegesipoli. Quibus calores multi quandoque se-
dantur, hi non per totum corpus, sed aut circa cervicem, aut sub alis, aut ca-
pite sudantes, liberantur. Chariti hyeme ex tussis populariter grassante fe-
bris adventans, acuta contripuit. Stragula rejiciebat, sopor cum dolore. Urinæ
erant rubræ velut erui lotura, subsidentia statim ab initio multa, alba, postea et-
iam subrubra. Septima, a glande subdita pauca prodierunt, sopor detinuit sine
dolor, humiditas in fronte, somnus ad noctem, & calor mitior. Octava succum
admisit, soporosis permansit usque ad undecimam. Hac autem die etiam calor ma-
xime cessavit. Postquam vero tussis erat, excreatio perseverabat semper multa,
facilis, primum viscosa, alba, crassa, postquam autem concocta esset, similis puru-
lenti. Urinæ ab undecima die puriores, subsidentia aspera. Decima tertia dolor
ad dexteram usque ad lateris mollitudinem, ad innum ventrem. Urina supprimeba-
tur. * Potus callyphylli contulit. Decima quinta rursus dolor. Decima sexta ad no-
ctem magis dolor præcordii incipiebat ad ventrem. Mercurialis aqua subduxit.
Calor intra vigesimum evanuit, & excreationes sequuta sunt crassæ. Melius ha-
buit ad quadragesimum. Subpurgandi sunt ventres in morbis, ubi purgan-
da matura fuerint. Inferni quidem, ubi confidisse videris: signum habes, si non
anxii fuerint, neque capite gravati, & quum calores mitissimi, & quum post ex-
acerbationes cessant. Superni vero, in ipsis exacerbationibus. Tunc enim &
hi elewantur, quum anxii, & gravati supernis partibus fuerint. Propterea vero in
principiis purgandum non est, quoniam sua sponte in his temporibus expurgan-
tur. In cubiti processu ex calu fauciato, cubitus marcore corruptus suppur-
ratur; maturatione vero fiente, viscosa sanies, ac glutinosa exprimitur, & brevi

- supprimitur; velut & Cleogenisco, & Demarecho Aglaotelis filio. Similiter autem, et valde ex iisdem ipis nullum, velut Aethyli filio contigit. At ubi suppuratur, plurimus horrores, & febres accedunt. * Alcmæni ex rheum affectionibus se recolligenti, & sanguine deorsum detracto, sursum ad hepar conversus
 175 est morbus, & ad eor dolor vehemens, & spiritus præ dolore derinebatur, & alvus difficulter egerebat parva caprini stercoreis pilulis similia. Anxietas non inerat; verum rigor quandoque, & febris corripiebat, et sudor, et vomitus, et in dolore non conferebat aqua marina per clysterem infusa. Verum sursum decoctum infusum contulit. A cibo abstinuit ad dies septem, aquam mulsam meraciorē bibit, postea lentis succum, quandoque vero ex leniscula fresa decoctum.
 180 Inde bibit aquam, postea catulum coctum, et mazæ parum, quæ potissimum diu antea confecta esset; progressu vero temporis aut cervices bubulas, aut extremas partes fuillas costas una cum priore aquæ potu. Quies, tærgmen, ad rheum affectionem infusum per clysterem ex cucumere sylvestri, * Parmenicii filio surditas; contulit clysterem auricularium non adhibere; verum lana expurgare, et solum oleum, aut netopum infundere, scambularæ, mane surgere, vinum album bibere, oleribus abstinere, panem, et piscibus petrosos nutriti. Aspasii uxori dentis, et maxillæ dolor vehemens. Castorium, et piper colluens, ac in ore tenens, remisit. Et stillicidii urinae affectionem ipsi sedavit farina cum rosaceo.
 190 * Capitis dolores ex utero sedat castorium. Plurimas uteri affectiones status faciunt. Signum sunt ructus, et strepitus circa ventrem, et lumborum tumores, et dolores circa renes; ac coxas. Ad hos autem confert, aromatum tertiam partem, farinæ duas, in vino odorato albo coquere, et linteolo illita cataplasmas modo imponere, qua parte ventris dolores ab utero assignant. Cal-
 195 lymedontis filio contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, et magnum, et crudum, ac dolorosum, venæ brachii sectio; et seminis lini correfacti cataplasma, vino albo, ac oleo subactum, ac imbutum, ita ut neque calidum, neque valde coctum deligatur. Aut cum aqua mulsa coquatur sceni græci, aut hordei, aut tritici farina. * Melissandro, quum gingiva dolore corriperebatur, et vehementer intumescebat, sectio venæ brachii, et alumen Egyptium in principio sedabat.
 200 Eutychedi ex cholericis affectionibus, ad nervorum in cruribus distensionem desivit, una cum secessu deorsum. Bilem multam abunde coloratam vomuit ad tres dies, ac noctes valde subrubram. Sub vomitum bibit, et impotens erat, et anxius. Nihil autem continere poterat neque ex potibus, neque ex cibis; et urinae, ac transitus deorsum suppressio. Per vomitus sex mollis prodiit, et deorsum quoque erupit. Regio morbo correpto prodest laborare, sudare, panem edere, bibere non multum, lavare caput calida multa, sed potius tepida, vinum album, somno non multo uti. * Calligeni circa vigesimum quintum ætatis annum destrilatio, tussis multa: quod desuebat, per vim educerat, nihil infra persestebat, annos quatuor perseverabat. Ab initio calores tenues fiebant. Vetatrum non profuit, sed modicus cibus, et comprimi corpus, edere panem, bibere vinum nigrum, obsoniorum quorumcumque eius, abstinencia ab acerbis, salis, pinguis, succo silphii, oleribus crudis, multa deambulatione. Lactis potus non contulit, sed sesamum purum, crudum, acetabuli mensura bibere, cum vino molli. Timothei hyeme destillatio, maxime in nares. Quum Venere usus esset, relicta sunt omnia. Lassitudo, calor successit, caput grave, sudor a capite multus, desuebat autem et per totum corpus. Erat autem etiam sanus sudare aduersus. Tertia die sanatus est. Cleomenis filius hyeme initio facto cibum averfabatur, et eius fastidio citra febrem vexabatur, et vomebat cibos, ac piniut. Duobus autem mensibus cibi fastidium durabat. * Coco in spina gibbositus facta est ex phrenitide. Huic nulla medicamenti potio contulit. Verum vinum nigrum, et pinis cibus, et balneotum abstinencia, et unctio, et frictio ab unctione, et fovere non valde, neque multo fomento, sed leni. Quibus fluxiones in oculis tenues, ac diuturnæ, si maturæ in nares procefferint profunt. Quibus prægnantibus
 215 ex casu, aut convulsione, aut plaga dolores leniter sunt, his in tribus diebus manifestum sit, an sortum corrumpet. Cuiusdam, quæ circa vigesimum ætatis annum biberat ultro pharmacum ad sortem perdendum, accidit dolor, vomitus biliosorum, multorum, pallidorum, prasinorum, nigrorum. Quum bibisset, tertia die convulsio corripiebat, linguam commandebat. Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum: lingua nigra, magna, oculorum albe partes erant rubræ; vigilabat. Quarta mortua est ad noctem. * Pythocles ægrotantibus aquam, & lac multa aqua
 220 ammixta dabat, & renutriebat. Perniones pertundere oportet, & calefacere, ita ut quammaxime excalefacias igne, & aqua. Oculis incommoda sunt lenticula, fructus pomorum dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, aut coxam, aut crura, ex laboribus abortis, aquæ marinæ, æteticæ calidum fomentum confert, ita ut vel aspergas, vel spongiam his imbutam adhibeas. Deligare vero lanis oportet. Origani potum, oculis, & dentibus malum est. Puella, quæ de rupe cecidit, voce destituta: iactatio ipsam tenebat; vomuit ad noctem sanguinem; Quum ad sinistram aurem impegisset, amplius inde suebat, & aquam mulsam

- multam difficulter deglutiebat. Stertor habebat, spiritus densus velut morien-
 rium, vena circa frontem intentæ, decubitus supinus, pedes tepidi, febris mul-
 ra, aliquando acuta. Maxime expaveſcebat, ſeptima vocem rupit, calores tenuio-
 res erant, ſuperſites evaſit. Niſtantes humeri dolore habebat, in æſta-
 te obortus ex abſceſſu proſiit ipſi corpus, & humerum in aqua marina mæde-
 facere ad multum tempus, & per tres dies vinum album aquoſum bibere, ſimil
 39 ut in aqua marina decumberet, ita ut & in ipſa urinum eijceret. * Fulſo in Sy-
 ro phreniticus: quum moveretur cruribus tremulis, corpus velut a culicibus com-
 punctum. Oculis magnus, motus brevis, vox ſracta, ſed clara tamen, urina pu-
 ra ſubſidentiam non habens. Num propter alvi ex thapſia egeſtionem, decima
 octava die morbus remiſit, evaneſcens citra ſudorem? Nicoxenus in Olyn-
 tido ſimiliter ſeptima die videbatur a morbo liber eſſe cum ſudore. Sorbitiones
 aſſumebat, vinum, botrum ex ſole. Decima ſeptima die ingreſſus ſim ad ipſum.
 Lingua ardebat, calor forinſecus non valde fortis, exolutio corporis vehemens,
 vox ſracta, ut operoſum eſſet exaudire, clara tamen, ſempota collapſa, oculi ca-
 vi, pedes molles, ac tepidi, juxta ſplenem diſtenſio. Inſuſum per clyſterem non val-
 de ſuſcipiebat, ſed reſiſtebat, prodiit ſtercus compactum modicum, & aliquid ſan-
 guinis, arbor ab inſuſo. Urina clara, pura, decubitus ſupinus, crura diducta,
 ac diſparata ob exolutionem, penitus vigil. Intra viginti dies calor evanuit. Po-
 tus erat aqua de farina craſſa in ipſa macerata. Sed & de pomis ſimulque mali pu-
 nici ſuccus, & lentis torrefactæ, & farinæ lotura cocta, frigida, tenuis ſorbitione.
 40 Superſites evaſit. * Fullonum inguina extuberant dura, & ſine dolore, & cir-
 ca pubem, ac collum ſimilia erant tubercula magna. Febris ante diem decimum.
 Tuſſi vexabantur a ruptionibus. Tercio menſe, aut quarto venter colliquivit.
 Calores ſucceſſerunt. Lingua ſicca, ſitis, egeſtiones deorſum malignæ. Mortui
 ſunt. Cholericæ bilis ſurſum, ac deorſum eruptiones ex carnis elu, maxime
 ſuſille crudioris, & ex eſtate, & ebrietate vini odorati veteris, & inſolatione, &
 ex ſepis, & locutis, & gammaris, & ex olerum eſu, maxime porri, & cepurum.
 Inſuper & a lactucis coctis, & braſſica, & runcibus crudioribus, & a placentis,
 ac dulciatis, & mellitis libis, & a fructibus pomorum, & cucumere pepone, &
 vino lactei teporis, & ervo, & polenta tenei. Cholericæ affectiones magis in
 æſtate ſunt, & febres intermittentes, & quibus horrores accedunt. Hæ quando-
 que malignæ ſunt, & ad morbos acutos perveniunt. Verum cavere oportet.
 Judicat autem tales morbos maxime quinta, & ſeptima, & nona dies. Melius ta-
 men eſt cavere utique ad decimam quartam. * Pherecyde poſt ſolſtitium hyper-
 41 noctu lateris dextri dolor etiam praus fieri ſolius. Ceſſavit; prauſ eſt, &
 egreſſus horruit. Febris ad noctem, doloris exors, tuſſicula quedam ſicca. Uri-
 na non multa, ſubſidentia multa. Ab initio tamentofa, glabra, diuſſa, poſt dies
 quatuor turbulenta ſubſidebant, & urina non decolor, ſubſidentiam habens, &
 collectio non apparebat in matula, ubi perfriguſſet. Tertia die alvus ſua ſponte
 egeſſit. Quarta ſubdita glande, ſtercoracea, & bilioſa prodierunt: fluxus erat liqui-
 dus. Somnus ad noctem non valde, verum interdum aliquantum dormiebat.
 Sitis non vehemens. Quarta ad noctem maxime cutis circa frontem, & reliquum
 corpus mollis, ſemper ſupetexcedens. Febris vincebatur ad manum, & ſub ea hu-
 meſcebat. Pulſus in fronte valde obſcurus, venarum gravitas in converſionibus,
 & in omnibus egeſtionibus ad modicum tempus, ſemper doloris exors, ab ini-
 tio anxius, & paulatim vomiebat. Septima a glande ſubdita egeſſit ter bilioſum,
 ac ſtercoraceum, liquidum valde, ac pallidum, & jam aliquantum delyrabat, & hu-
 miditas modice quandoque circa frontem. Seragula in faciem ducebat, oculos fru-
 ſtra velut ſi quis videret, contrahebat, & rurius niſtabat, & ſtragula rejiciebat.
 Nona die ſudor mane obortus ad pectus, perſeverabat, donec moreretur, & fe-
 bris, & delyratio auſceſcebat. Circa frontem ſudor plurimus graveolens, color
 valde albus, cutis ſub pilis interpuncta, præcordium dextrum elevatum, demit
 42 a ſe ipſo bilioſa. * Octava apparebant velut culicum morſus. Ante mortem tuſſien-
 do rejecit velut ex muco fungos, compacta quedam, alba pituita circumdata. Ex-
 ſerearat autem & antea patva, alba, lactea. Poſt coenam in ſomno horruit, mane
 ſurrexit, capite gravatus horruit, vomuit, capite gravabatur, ad noctem remiſit.
 Uſque ad meridiem leniter horruit, rurius noctem graviter tulit. Sequenti die fe-
 bris acuta, capitis torpor, vomitus multæ bilis, quæ plrima praſina erat. Ceſſave-
 runt omnia, ſomnus ad noctem. Mane perfrigerabatur; ſudor, & humiditas per
 plurimam corporis partem. Juxta ſplenem manu indicabatur ad modicum tempus
 300 collectionem doloris exorrem. Statim evanuit, ad noctem vigil. Circa ſori tempus
 exacerbabatur febris, anxietas, vetrico, tormen, capitis dolor, vomitus praſinus,
 levis, viſcoſus velut pituita. Circa ſolis occaſum ceſſaverunt omnia. Sudor capi-
 tis, colli. Poſt vomitum egeſſit per alvum ſtercoracea, liquida, bilioſa, neque nigra,
 neque inconvenientia. Noctem moderate habebat, itemque ſequentem diem. Ad no-
 305 ctem rurius vigil. Vomitus mane ſimiliter, & ſequenti die, citra anxietatem. Dolo-
 res capitis poſt ſudorem ceſſarunt; ad velperam omnia remiſerunt. Nona non am-
 plius vomuit, magis calefactus eſt. Reliquis non videbatur febrire. Venæ in tem-
 poribus

- poribus saliebant; doloris omnino exors; sitis semper erat. Nona quum ad sel-
 310 lam surrexisset, valde animo linquebatur. A glande subdita egressa ramenta nigra,
 & biliosa colore, quantum stercorea destillabat. Vox fracta, in conversionibus gra-
 vis, oculi cavi, cutis frontis circumtensa. Alioqui bene spirabat, moderatus erat,
 ad parietem plenumque conversus, flexibilis in decubitu, incurvatus quiescens. Lin-
 315 gua alba, levis. Circa decimam & postea, urinae rubrae in circuitu, in medio exi-
 gum quid album. Duodecima ad glandem subditam, similia destillabant biliosa, &
 ramentosa. Post glandem animi deliquim, postea os resiccabatur. Colluebat sem-
 per, & si non valde frigida esset aqua, calidam esse dicebat. Nivem leniter gustabat,
 sitis non inerat, stragula semper de pectore repellebat. Clamydem caleheri non
 320 sinebat. Ignis procul, isque parvus, utriusque maxillae rubor. Postea lingua inarticu-
 lulara. Recalescebat nnum, aut duos dies. Cessavit. * Androphani vocis inter-
 ceptio, ignorantia, delyrium. His sedatis supererat multis annis, & recidivae fie-
 bant. Lingua permanebat per totum tempus sicca, & si collutione non interetur,
 loqui non poterat, & plerumque erat valde amara. Aliquando etiam dolor ad cor.
 Venae sectio solvit haec, aquae potus, aqua multa. Veratrum quoque bibit nigrum.
 325 Biliosum non prodibat, sed modicum. Tandem hyeme decubuit, & extra se positus
 mente motus est, & linguae affectiones similes, calor tenuis, lingua decolor. Vox
 peripneumonica, de pectore stragula rejiciebat, & se educti jubebat velut mictu-
 rum. Quum nihil clare loqui posset, neque apud seipsum esset, educebant ipsum. Ad
 noctem mortuus est; duobus, aut tribus diebus decubuit. Nicanoris affectio e-
 330 rat, quum ad convivium progredereetur rumor tibicinae: quum sub initium vocis tibi-
 cae in convivio tibia canere audiret, praeter timoribus turbationes. Vox se fuisse
 posse dixit, quum nox esset, interdum vero audiens nihil commovebatur, & haec
 multo tempore ipsum comitabantur. * Damocles, qui cum illo erat, cecidit, &
 335 & corpore exoluto esse sibi videbatur, & sane praeruptum locum non accessisset,
 neque trans pontem, aut minime altitudinis scrobem ausus fuisset transgredi, praeter
 timore ne caderet, sed per ipsum scrobem ibat. Hoc ad tempus quoddam ipsi ad-
 erat. Phoenicis affectio erat. Ex oculo dextero plerumque velut fulgur elucere
 340 putabat. Ubi vero non diu ipsum clausisset, dolor ad tempus dextrum vehemens
 oriebatur, postea etiam ad totum caput, & collum. Caput intumescerebatur retro ad
 verticula, & distentio, ac duritia erat circum tendens. Si itaque conaretur commo-
 vere caput, aut aperire dentes, non poterat, ictuque valde distentus. Vomitus si
 quando oborti essent, relatos dolores avertebant, ac mitiores faciebant, & vo-
 345 nae sectio profuit, & veratrum duxit omni-gena, & non minime psalina. * Parme-
 nisco etiam prius inciderebat tristitia, & desiderium excedens e vita, quan-
 doque vero rursus laetus erat. At in Olyntho aliquando autumnii tempore voce
 privatus decumbebat, quietem agens, ita ut parvipi saltem loqui conaretur, ac in-
 350 ciperet. Immo etiam si quid loquutus esset, rursus voce destituebatur. Sonus ad-
 erant, quandoque vero vigilae, & iactatio cum silentio, & anxietas, & manus ad praecor-
 dia velut dolenti. Aliquando averfus jacebat quietem agens. Febris perpetua,
 & facile spirabat. Postea dixit se cognoscere interitus. Bibere quandoque tota die,
 355 ac nocte, etiam si potus exhiberetur, non volebat; quandoque vero urina derepente
 correpta, omnem aquam edibebat. Urina crassa velut jumenti. Circa decimam quar-
 tam remisit. Cononis serva ex dolore capitis incipiente, extra se mente mota
 erat. Et clamor, & querelae multae, raro autem quies. Circa quadragesimum diem
 360 mortua est. Decem vero diebus ante mortem, voce destituta, & convulsa fuit.
 Timocharis servus ex atrabilariis esse quum putaretur a tor, ac talibus vi-
 ris, mortuus est similiter circa eosdem dies. * Nicolai filius circa solstitium hy-
 365 bernum ex positionibus horruit. Ad noctem febres, postredie vomitus biliosus,
 mernis, modicus. Tertia die, quum concio adhuc fori plena esset, sudor totius cor-
 poris cessavit, & statim rursus calefactus est. Vomitus similis. Quarta ab aqua
 mercurialis egressit stercoreacea, & liquida. Urina cineris specie, qualis est aqua
 370 mercurialis, non dissimilis; subsidientia non erat, neque urina multa; pauca quan-
 doque in medio vehantur inquantia. Dolores praecordii sinistri, & lumborum. Pu-
 tabat se ex vomitu insuper respirare, & insuper respirabat, quandoque dupla respi-
 375 ratione. Lingua alba, habens ex dextra parte concretionem adnatam ipsi hipi-
 ni. Parum sicciosus erat, vigil, prudens. Sexta dexter oculus major dim videret.
 Septima mortuus est. Verum alvi ante mortem elevata fuit, & mortuo pos-
 teriores partes rubefactae sunt. * Metoni circa pleiadum occasum febris, late-
 380 ris sinistri dolor usque ad claviculam, atque is adeo vehemens ut quiescere non pos-
 set, & inflammatio tenebat. Alvi egestio multa, biliosa. In tribus fere diebus ces-
 savit dolor. Alvi autem circa septimum, aut nonum. Tussis inerat, exsiccationes
 neque biliosae, neque multae fiebant, verum pituitosae, tussis comitabantur, cibos gi-
 385 stabat, quandoque velut sanus exibat. Corripiebant autem aliquando calores tenuis
 modico tempore, sudores fiebant ad noctem. Spiritus in calore densior, maxilla-
 rum rubor, circa larva gravitas, & sub alas, & ad humerum, tussis tenebant; me-
 dicamentum per superna eduxit biliosa. Tertia a medicamento erupit pus, verum ab in-
 390 tito morbi quadragesima. Repurgabatur circa triginta quinque alios dies, & sanus
 evasit.

- evasis. Uxori Theotimi in semitertiana anxietas, & vomitus, & simul hor-
ror incipiente febre, & sitis, progrediente tempore incipiente febre calor ingens.
Ubi aquam mulsam bibisset, & vomisset, & horror, & anxietas sedata sunt, &
mali punici succum postea accepit. Diopithis sorori in semitertiana, cordis do-
lor gravis circa accessiorem, & comitabatur is totam diem, & huiusmodi corporis,
five oris ventriculi dolor etiam alius similiter aderat. Verumtamen sub plejadis oc-
casum viris talia rariora fiebant. * Uxori Apomoti in semitertiana circa arcturum
vehemens cordis dolor circa accessiorem, & vomitus, & strangulationes ab utero
simul inflabant, & ad dorsum dolores iuxta spinam. Quum autem huc ipsi perve-
nient, cordis dolores cessabant. Terpidæ matri a Dorisco, quum abortus fa-
ctus esset mense quinto gemellorum, ex casu, ab altero quidem statim, velut in tu-
nica quadam liberata est, ab altero vero prius, aut posterus quadraginta diebus.
Postea autem concepit in ventre. At anno nono dolores vehementes circa ven-
trem ad multum tempus, quandoque incipiebant ex collo, ac spina, considebant au-
tem ad anum ventrem, & inguina; quandoque ex genu dextro, considebant autem
ad eundem locum. Et quum quidem iuxta ventrem dolores essent, alvus elucebatur;
quum vero sedarentur, cordis dolor coincidebat. Verum strangulationes non ade-
rant. Sed frigiditas corporis, velut in aqua jacentis. Tempore quo dolor fiebat,
per totum corpus dolores spargebantur mitiores his, qui ab initio erant: allium,
silphium, acria omnia non conserebant, neque dulcia, neque acida, neque vina alba.
Verum nigra, & balnea rara. Ab initio quoque vomitus vehementes fiebant, et cibo-
rum exclusiones, et circa dolores menses non apparebant. * Cleomenis uxori
circa favonii status, ex nausea, et lassitudine, lateris sinistri dolor, ex collo,
ac humero auspicatus, febris, et horror, et sudor. Inccepit autem febris, et non de-
siit, sed augebat, et dolor vehemens, tussis, excreatio subruentia, pallida, mul-
ta. Lingua alba, alvi egestionis moderata, liquida, urinae biliosa. Quarta ad noctem
menses prodierunt multi, cessavit et tussis, et excreatio, et dolor, calor autem
tenuis. Epicharmi uxori ante partum dysenteria, dolor, alvi egestionis sub-
cruentæ, mucosæ. Ubi peperisset, statim sana erat. Polemarchi uxori in mor-
bo articuli coxæ dolor deterente, mensibus non prodentibus. Ubi betæ
cum bibisset, vox supprimebatur per noctem, et usque ad meridiem, attamen au-
diebat, et sapiebat, et manu significabat, dolorem esse circa coxam. * Clinia
sorori seniori vomitus, quicquid accepisset per quatuordecim dies, citra febrim.
Cruciorum vomitionum reiectiones, et contracta strangulatio ad cor procedebat.
Castorium, fœli, mali punici succus sedaverunt omnia, abscessit autem dolor mo-
deratus ad lateris mollitudinem, bulbi succus et vinum lactei teporis, austerum, et pa-
nes quampancissimi cum oleo. Pausaniæ filiam ex fungi crudi esu anxietas tene-
bat, strangulatio, dolor ventris. Aquam mulsam calidam bibere, ac vomere profuit,
et balneum. In balneo singum evomuit, et ubi illa cessatura essent, exsudavit.
* Epicharmo circa plejadum occasum, humeri dolor, et gravitas vehemens ad
brachium, anxietas, vomitus multi, aquæ potus. Euphranoris filio pustula
velut a culicum morfu. Post favonium siccitates fiebant usque ad æquino-
ctium autumnale. Sub canem, æstus vehementes, et venti calidi, et febres sudori-
ficæ, et statim aliquantum recalescebant. Tubercula vero iuxta aurem multis fie-
bant. Anicula a tussi vexata circa nonam diem. Adolescenti splenicæ ancillæ filio,
alvo liquefacta, circa idem tempus. Cresiphonti sub arcturum, fere circa sepi-
mam. Adolescenti solum suppurata sunt. Eratylis filio evanuerunt. Circa utraque
tempora, nullæ exudationes. Lingua præ siccitate blæsi. Recti venti spiraverunt
multi, ac frigidi, et nives ex clementi celo quandoque fiebant, et post æquinoctium,
austrina aquilonaribus permixta, aquæ multa, populariter grassatæ sunt cusses
multæ, magis autem in pueros. Circa aures multis talia, qualia Satyri habent. Quan-
doque vero ante hoc tempus hyems valde hyberna erat, cum nive, et pluviis aqi-
lonaribus. * Timonactis filio ferine bimæstri pustula in cruribus, et in coxis,
et lumbis, ac imo ventre, et tumores valde rubicundi. His autem sedatis, convul-
siones, et comitiales fiebant, sine febribus, multis diebus, et mortuus est. Po-
lemarchi filio contigit quidem, ut priore tempore suppuratus esset, et excrearet,
postea veto calores ipsi erant, et hydropicus erat, et splenicus, et anhelosus ad
locum adclivem, si quando accederet, impotens, et sticiculosus, quandoque etiam
cibum leniter avertebatur, et sicca tussiculæ ad multum tempus ita fiebant, titu-
lans obambulabat, et si non facile solubilis esset alvus deorsum, plena reddeba-
tur, et anhelatio, ac strangulatio magis fiebant. Tandem autem defluxus, et ex-
creatio supervenit, ac tussis. Excreatio crassa, pallida, purulenta, et febris vehe-
mens cessasse videbatur, et tussis mitior, et excreatio pura. Rediit rursus fe-
bris acuta, spiritus densius, mortuus est. Verum antea riguerunt pedes, et postea
perfrigeratus est. Spiritus magis interclusus est. Urina subtilis, extrema par-
tes perfrigeratæ sunt, prudens mortuus est tertia diæ a recidiva. * Thyoi fi-
lio in febre ardente inedia macerato, alvi egestio multa. Verum cum bile, et ani-
mi deliquio, et sudore multo fiebat, perfrigeratus est valde, et voce destitutus
erat totam diem, ac noctem. Instillatum perisanæ succum continuit, sapiebat, be-
ne spiravit.

- ne spirabat. Epileptici filio accidit ex via, et potu cruditas. Postridie mane anxietate oborta, ubi aquam, acetum, salem bibisset, evomuit piruitum, postea rigor apprehendit. Lavit febricitans. Pectus dolebat. Tertia mane statim sopor modico tempore tenebat, & delirabat, & febris acuta. Graviter morbum tulit. Quarta vigil, mortuus est. Aristoni, ulcerato pedis digito, cum febre loquelæ obscuritas. Carcinoma ascendit usque ad genu. Perit. Erat autem nigrum, subaridum, graveolens. * Cui carcinoma in faucibus usum est, sanis evasit a nobis. Polyphantus in Abderis caput dolebat in febre vehementi. Urinæ tenues, multæ. Subsidentia densæ, & conturbatæ. Quum autem non cessaret dolor capitis, sternutatoria decima die adhibita sunt. Postea ad collum dolor vehementis. Utina prodit rubicunda, conturbata velut iumentum, mente motus est phrenitico modo. Mortuus est in vehementibus convulsionibus. Confimiliter etiam Evalcidæ famula, quum multo tempore densæ urinæ prodissent, & capitis dolores adessent, phrenitica facta, mortuus est eodem modo ex vehementibus doloribus. Nam urinæ densæ, ac conturbatæ certum signum sunt doloris capitis, & convulsionis, ac mortis. Halicarnassensis, qui in domo Xanthippi diversabatur, autem hyeme dolebat, & caput non mediocriter. Erat autem annorum circiter quinquaginta. Vena secta est iuxta Mesimachum. Læsum est caput evacuatum, ac perfrigeratum. Non enim facta est suppuratio. Phreniticus factus est, & mortuus. Urinæ erant & huic densæ. * In Cardia Metrodori filio ex dentium dolore corruptio maxillæ, & gingivarum vehemens carnis excrescentia. Mediocriter suppuratio facta est, exciderunt dentes molares, & maxilla. Anaxenor in Abderis erat quidem splenicus, & vitiatu coloris. Contigit autem ipsi ut tumor circa femur, sinistram obortus derepente evanesceret. Non multis vero postea diebus oborta est ipsi circa splenem velut pulsula nocturna ab initio, insuperque tumor, ac rubor durus. Post diem quartum febris ardens oborta est, & livescit sunt omnia circumcirca, & purrida videbantur. Mortuus est. Verum prius subpurgatus est, & irrelligentiam habebat. Clonigus in Abderis erat quidem nephriticus, mingebat autem sanguinem paulatim plerumque difficulter. Vexabat etiam alvus dysenterica. Huic mane quidem dabatur lac caprinum, & aquæ quinta pars, ita ut ex ambobus compositum totum essent heminae tres. Ad vespertam autem panis valde assatus, obsonia, beta, aut cucumis. Vinum nigrum tenue. Dabatur etiam cucumis pepo. Hac vero victus ratione quum ureteretur, & alvus substitit, & urinæ puræ prodibant. Bibit autem lac, donec urinæ restituta sine. * Mulieri in Abderis carcinoma factum est circa pectus, erat autem tale: per papillam sanies subruenta fluebat, intercepta autem fluxione, mortua est. Dinii filio in Abderis umbilicum mediocriter sauciato, fistula parva relicta est, & quandoque etiam lumbricus per se ipsum satis crassus penetravit, & quum feberet, vomebat biliosa, quandoque vero & hæc ipsa per fistulam prodibant. Allapsum est, & intestinum ipsi ad fistulam, & velut fistula corrodebatur, & rursus refringebatur, & tussis permanere prohibebat. Pythion filio in Pella febris statim inccepit multa, & in somnum lapsio, & cum vocis interceptione sonni fiebat, & alvus dura per onne tempus. At glande ex felle subdita, multa egerebat, & statim remittebat. Verum brevi alvus rursus elevabatur, & febris exacerbabatur, & lapsio in somnum per eadem. Quum autem idem ductus esset, datum est emdicamentum quoddam ex his, quæ cnico, & cucumere sylvestri, & peplo constant, & biliosa egestio erupit, & statim sopor sedatus est, & febris mitigabatur, & omnia leviora facta sunt, & iudicatus est die decima quarta. * Eudemus splenem vehementer dolebat: imperarunt ipsi medici, ut multum ederet, & vinum biberet modicum, tenue, & multum deambulet, non mutatum est quicquam. Vena secta est, cibos, ac potus præce sumpti, deambulationes fecit sensim augmento facto. Vinum bibit nigrum, tenue, sanatus est. Philistidi Heraclide uxori cepit febris acuta, rubor faciei ex nulla manifesta causa, paulo post in die rigorem habuit, quum non recalesceret, convulsio facta est in digitis manuum, ac pedum. Paulo post recalescens, minxit urinas compactis quibusdam innatantibus, nubesculosas, divulas, noctem dormivit. Secunda die rursus riguit, paulo magis calefacta est, & rubor minor, & convulsionem fiebant moderatiores. Urinæ consimiles, noctem dormivit, parum vigilavit, quum nulla molestia premeretur. Tertia die minxit coloratiora, modicam subsidentiam habentia. Eadem hora rigor apprehendit, febris acuta, sudor ad noctem per totum corpus. Verum vespere color ad morbi regii modum permutatus est. Noctu dormivit, ac per totum corpus sudavit. Quarta sanguis ex sinistra nate probe fluxit, & menses pauci comparuerunt ordinate. Rursus autem eadem hora febris exacerbata est. Urinæ compactis quibusdam innatantibus pauca. Alvus natura quidem dura, verum multo magis substitit, neque quicquam prodibat, si non glandem subdidisset, noctem dormivit. Quinta febris mitior, & ad vespertam per totum corpus sudabat, & menses prodierunt, & noctem dormivit. Sexta minxit acervatam multam urinam, compactis quibusdam innatantibus, modicam subsidentiam habentem, concolorem. Circa meridiem

ridiem vero parum rigore tenebatur, aliquantulum incaluit, sudavit per totum, noctem dormivit. Supina parum calefacta est, facile tulit, sudavit per totum. Urinæ
 58 boni coloris. Judicata sunt omnia. * Tychon in obliuione circa Datum. Vetus
 est catapulta in pectus, & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus. Vide-
 batur autem mihi medicus eximens lignum, reliquille ferrum in septo transver-
 so, & quum ipsi ita videretur, ad vesperam infusum per clysterem adhibuit, & phar-
 macum deorum purgans dedit. Noctem primam transegit. Statim vero ubi di-
 es illuxisset, & medico, & aliis melius habere videbatur, erat enim quietus. Prae-
 dictio facta est, quod ubi convulsio feret, non tarde moriturus esset. Sequentem
 noctem moleste ferens, insonnis, plenumque in ventrem decumbens; tertia mane
 520 convellebatur. Circa meridiem mortuus est. Eunuchus ex venatione, & di-
 scursu hydropicus factus est. Quidam circa Elealeis fontem ad sex annos
 habuit ex equitatione inguinum tumorem, varices, & coxendicum dolores.
 Qui lateris mollitudine tabuit, septima die mortuus est. Præpotent crudi
 salsa cum melle. Scottatio turpis, dysenteriae medela est. Leonidæ filiae
 natura concitata, averfa est; averfa, in iram excaudit; ubi ira excaudit, re-
 conciliata est. Medicus non intellexit, puella mortua est. Philotimi filius puber
 venit ad me in lechina, calvariae os habens medicina destitutum, in
 quo videbam occultas rationationes non esse constantes.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE VICTUS RATIONE.

IN MORBIS ACUTIS:

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 *Præfatio. Agrotantium historia, & affectio-
net a quoribus etiam, qui medicus non sit,
conscribi posse.*
- 2 *De victus ratione veterum nihil memorabile
existere. Singulorum morborum numeros enu-
merare cur difficile. Morborum acutorum
cognitio præ aliis insigniter laudatur in me-
dico.*
- 3 *Acuti morbi qui. A morbis sparsis, & non
similibus plures mori, quam ab aliis om-
nibus.*
- 4 *Ab imperitis medicis scitu commodissima suis-
se ignorata.*
- 5 *Medicina rationationi cur similis. Præsa-
giorum præstantia. Pitisanam merito omni-
bus frumentaceis in morbis acutis esse
preferendam. Pitiana quatenus utendum.*
- 6 *Potius, seu sorbitionis pitiana quantitas.
Judicationis celeritas inde.*
- 7 *Pleuriticorum indicatio, & purgatio. Pit-
isana quod bordeum aptum, & cur deglu-
tientes non ledat. Pitiana sorbitio quate-
nus, & qua ratione ledat.*
- 8 *Cui a veteribus fiderati vocati sint. Pleuri-
tici aëreli.*
- 9 *Pitiana sorbitio quibus inibenda, & quate-
nus.*
- 10 *Pitiana sorbitionis exhibenda tempus, & ut-
tendi modus. Peder frigidi.*
- 11 *Pleuritici a principio calida conferunt. Fo-
mentum in pleuritide humida, vel sicca.*
- 12 *Clavicularum dolores solvuntur. Vena sessio
quatenus pleuritidem solvat, & qua vena
secunda. Pleuriticorum alvus quatenus,
& quibus mollienda.*
- 13 *Petræ nigri facultas. Peplii facultas. Pit-*

- sana in media purgatione non danda, & a
purgatione etiam non assè exigua copia.
Pitiana sorbitio ab initio statim exhiben-
da.*
- 14 *Medicorum circa pitiana potum error. Ad-
tationum incommodum in pitiana, &
succo utentibus, mala. Pitiana ratio in sa-
nis exploranda.*
- 15 *Pitius cibi, & potus sibi ipsi semper similis,
semper est securus. Pitiana mutationes rep-
entina, noxia, ac morbi fera. Bis in
die cibum assumentes, nec affecti, qua
ratione ledantur, & quomodo curandi.*
- 16 *Bis in die cibum assumere affecti, nec præ-
si, quibus affectionibus obnoxii.*
- 17 *Vasa derepente evacuat, quomodo replenda.
Bileos superius partibus sanem minus to-
lerant, piuliosi contra. Astagna circa ha-
bitus, ac naturas nostras mutationes, ma-
xime morbos faciunt.*
- 18 *Cibus ferile qui ferant. Maxe paucis con-
suetudinem ingesse incommoda. Panis ca-
lidus sitim, & repletionem repentinam in-
ducit. Aqua, & vini potus permutati in-
commoda.*
- 19 *Vini albi, & nigri permutatio. Additio ro-
xia magis, detractio noxia minus.*
- 20 *Sorbitiones quatenus primis diebus in morbis
acutis danda. Vasa in morborum principiis
non vacuanda.*
- 21 *Medicorum ignorantia.*
- 22 *Labi inferioris concussio. Cibi, aut potus
perperam oblatus, medici argunt ignoran-
tiam. Vasa rationem vaccinationem cognoscere,
ridiculum, ac damnosum.*
- 23 *Adtationes repentinæ, quæ circa corpus
sunt, iis quæ circa diatam non esse abso-
lutes. Otis nimii, ac laborum repentinorum
incom-*

- incommoda, Lethus durior, ac mollior.
Ulcus in tibia.
- 24 Multiplex in ventre lesio. Mutationes repentinae ex multa quere ad ampliorum laborem magis laedant, quam contrā. Sorbitionibus quando attendit. Vigilia fortis. Vini differentiae, aqua malsa, & aceti malsi quomodo constituenda.
- 25 Vini dulcis facultas, & quibus commodum. Vinum dulce magis educit sputum, quam vinosum. Album vinosum. Nota de vini utilitate, ac detrimento, ante Hippocratem ignorata. Vinum saluum, ac nigrum, Vinum aquosum. Vinum meracius.
- 26 Aqua malsa quibus in morbis acutis conveniat. Aqua malsa facultates. Aqua malsa aquosa facultates. Aqua malsa merata facultates. Aqua malsa comoda.
- 27 Aqua malsa cur putetur debilitare, & morsem accelerari. Aql symptom, duplo vino merato fortius. Pristana sorbitio, & aqua malsa potus status excitat. Aqua malsa cruda, & colla differentia.
- 28 Acerum malsum, valde acre, & parum acre. Aceti malsi exhibendi tempus, ac modus.
- 29 Incessum exasperatio quibus ab aeto malsa. Aceti acrimonia quibus potissimum conveniat. Acetum cur malitribus magis ad versatur.
- 30 Aqua potus in morbis acutis. Aqua potus quatenus sputum educat, & quibus potissimum roxiis, & qua ratione. Item quibus morbis conveniat.
- 31 Balneorum in morbis acutis usus, & eorum usus de modis.
- 32 Cur ut quomodo in balneis haberi debeat. Comestudinis balneo utentibus habenda ratio. Balneum cur peripneumonici a tiffimum. Balneum quibus incommodum. Lavare quibus incommodum.
- 33 Lavandi smel, & qui his, Balneis quos magis debeat uti.
- 34 Febris ardens causa, & generatio. Signa. Lingua, Alvi egressiones. Vigilia. Atractio motiones. Febrium ardentium purgationes. Signa quibus solvitur.
- 35 Febris ardens aliud genus. Iudicationis signa. Pena sectio quando in morbis acutis conveniat. Anus curatio. Ex sanguinis detractione drbiliores per cisternis reficiendi.
- 36 Praecordia inflammata. Astricamenta purgantia quando bis noxia.
- 37 Potis repentina privatio, curatio, signa.
- 38 Astorbi cymitiales, & semisiderati. Pena sectio quando purgationibus praesentenda.
- 39 Amina generatio, & curatio.
- 40 Fluxio calida, ac nitrosa astiva, vel autumnali tempore. Arteria ulceratio, & pulmonis ardor.
- 41 Febris a stercore non subeunte, aut a cibarenti, cum lateris dolore &c. Lumborum gravitas. Flatus graveolentes.
- 42 Febris ventre molli, ac vacuo. Pedes frigidus quid significet. Pedes febre desistente calent. Sorbitiones in febribus quando danda.
- 43 Alvus in febribus perpetua liquida, & mens perturbata in febribus.
- 44 Peritimes, & capitis pulsus a febrium initio. Urine nebula, & crassa ab initio. Tenax. Urina concalcationem que impediunt. Sorbitiones prope iudicationes quotiens danda.
- 45 Febrium iudicationes. Febres qualunga. Febres anxiosae, & praecordia ingenta. Urina curationem indicant.
- 46 Urine crassiores, pallidiores, tenuiores, nigriores. Febres inconsistentes. Nuncius impar in agrotis cur videntur. Astorborum prima principia diligenter observanda.
- 47 In agrotum compressa que observanda. Praecordia afflicta.
- 48 Alvi egressio nigra, sani hominis egressioni similis. Delirii signa. Manus tremula. Convulsio in febre hyberna, lingua aspera, & animi deliquium.
- 49 In febribus horridum quid quinta die, alvi repente liquida. Singultus. Vocis privatio, animi deliquium. Convulsio. Crura in febribus tuberculosa.
- 50 Nullus plus, quam dies delirii significacionem praebent. Vocis in febre decimaquarta die interceptio. Lingua in febre conturbata loquens.
- 51 Sanguis destillatio repentina astiva, ac autumnali tempore. Febris singultuosa.
- 52 Peripneumonica, ac pleuritica afflicta, & eorum curationes.
- 53 Sputa matura, & urina matura. Peripneumonia in vigore auxilium non admittit, & eius curatio.
- 54 Dysenteria. Astorbus regius quando febres biliosas solvit.
- 55 Tetanus, & eius curatio.
- 56 Astorbi per que solvantur. Peritrum quibus dandum. Abscessu, aut tene ruptura laboranti, veratrum noxiis. Peritrum quibus dandum.
- 57 Dolores ex intere contrahit. Astorbi ex villis ratione. Penitis tumor a cibo copiosiore.
- 58 Potus aquosi. Potus merociiores, & asperiores. Ieiunium capitis dolori, & capula malum. Semel in die cibum sumentes.
- 59 De alimentorum facultatibus. Allium. Capseu. Legumina. Cicer. Lens. Lapius. Silphium. Cholera sicca generatio.
- 60 Carnes bubula, caprina, porcina, foilla.
- 61 Cholera sicca curatio.
- 62 Hydropticorum dura natura. Quando bis sanguis detrahendus. Venter inferius calidus, & egressiones acres, ac inaequales.
- 63 Tormina sine febre in hydrope. Circa vultus rationem morborum intentionis, ac remissiones febrium observanda.
- 64 Medicamentis qui non sunt purgandi.
- 65 Sanguis alvus fluida non detrahendus. Per veratrum solum purgari tutius. Afflicto supra septum transversum, & infra.
- 66 Hydropticus patio. Sanguinem solum medicamentum. Sefomolis potius de/crispio. Trichistis quid, eiusque remedia.
- 67 Hemorrhoidarum curatio.
- 68 Suppuratorum curatio. Ad orulos.
- 69 Ad oculorum dolores. Hydropticus. Stercora per alvum expellenda. Puerorum excrementum primum.

S E C T I O I.



UI Cnidias appellatas lententias conscripserunt, recte qui-
dem scripserunt ea, quæ patiuntur ægroti in singulis morbis,
& quomodo quædam ipsorum evenerunt: & hæcenus qui-
dem etiam, qui medicus non sit, recte conscribere possit, si pro-
be ex singulis ægrotis, quæ patiuntur, didicisset. Quæ vero
medicum ante discere oportet, ægroti non referente, horum
pleraque omissa sunt, alia in aliis, & quædam valde commoda
ad conjecturam. Quum autem ad conjecturam dicatur, quo modo singula cura-
re oporteat, in his multa aliter sentio, quam velut illi prodiderunt. Et non so-
lum ob hoc non laudo, verum quod etiam paucis numero usi sunt medicamen-
tis. Nam exceptis morbis acutis, plurima ab ipsis relata sunt pharmaca alvum
deorsum purgantia exhibenda, & serum, ac lac pro tempore. Si quidem igitur
hæc bona essent, & morbis convenientia, in quibus exhibenda esse monue-
runt; longe magis laudanda essent, eo quod quum pauca sint, sufficiunt. Nunc
vero res non ita habet. Qui ramen postea eam tractationem repetiverunt, magis
sane medico modo de his, quæ singulis exhibenda sunt, transegerunt.
At neque veteres quicquam memorabile de vitiis ratione conscripserunt,
& quamquam magna hæc res sit, eam omiserunt: attamen inuisus in singulis
morbis modos, multiplicemque ipsorum divisionem non ignorarunt aliqui.
Cæterum numeros singulorum morborum clare pronuciare volentes, non
recte scripserunt. Non enim facile sit enumerare, si ex eo quis ægrotanti-
um morbum æstimet, quod alter ab alio aliqua re differt, & ideo non puet
eundem morbum esse, si non idem nomen habeat. Mihi vero placet, ut in u-
niversa arte mentem adhibeamus. Nam quæcumque opera bene, ac recte tra-
ctat, ea singula bene, ac recte facere oportet; & quæ cito, cito; & quæ dure, dure;
& quæ citra dolorem tractare oportet, ita facere, ut quamminimus dolor
sentiat: & alia omnia ejusmodi insigniter præ aliis ad meliorem modum transi-
gere oportet. Maxime vero laudaverim medicum, qui in acutis morbis, qui
plurimos homines occidunt, præ aliis insigniter ad meliorem partem excellat.
Sint autem hi acuti, quos veteres nominaverunt plenitidem, peripneumo-
niam, phrenitidem, & febrem ardentem, & alii morbi, qui ex his hærent, quo-
rum febres omnino continuæ sunt, & occidunt. Quum enim non pesti-
lentis morbi modus qui communis grassatus fuerit, sed sparsi fuerint mor-
bi, & non similes, ab his morbis plures moriuntur, quam ab aliis omnibus.
Idiotæ igitur non valde cognoscunt eos, qui in his, aliis præstant, aliarumque
curationum magis aut laudatores, aut viuperatores existunt. Et profecto ma-
gnum signum hoc est, quod populares minime de his morbis intelligentiam ha-
beant, veluti quos studio consequi oportet. Nam qui medici non sunt, medi-
ci esse videntur, maxime propter hos morbos. Facile est enim nomi-
na edificere, quæ proferri solent apud ægros his morbis affectos. Si enim quis
psisana succum nominarit, & vinum tale, aut tale, aut etiam aquam mulsam,
omnia hæc eadem plebeis hominibus, & meliores, & deteriores medici dicere
videntur. At res hæc non ita se habet, sed in his sane vel maxime alii ab aliis differ-
runt. Videntur autem mihi digna esse quæ scribantur maxime hæc, quæ igno-
rantur a medicis, maxime scitu commoda, & quæ magnas utilitates, aut magna
detrimenta afferunt. Quæ itaque ignorantur, hæc sunt. Cur nam in acutis morbis,
aliqui medici omne ævum terunt, psisanas non colatas exhibentes, & recte se
medicari putant. Aliqui vero plurimi faciunt, ut nullum hordeum æger devoret.
Magnum enim detrimentum asserre arbitrantur. Verum per luteum excolan-
tes succum exhibent. Quidam vero ipsorum neque psisanam crassam dederint,
neque succum, atque hi partim donec ad septimum diem æger perveniat, partim ve-
ro perpetuo, donec indicatus fuerit morbus. Sane hujusmodi quæstiones ne pro-
ponere quidem medici consueverunt, fortassis autem neque si proponantur,
comperiantur. Proinde calumniam incurrit tota ars apud vulgus adeo magnam,
ut neque omnino medicinam esse putent. Nam in acutis morbis intantum inter
se differunt artifices, ut quæ alter exhibet optima esse putans, ea alter iam mala
esse existimet. * Et sere ob id artem vaticinationis similem esse dixerint. Quia va-
tes eandem avem, si sinistra appareat, bonam esse ducunt, si dextera, malam. Et
in aruspicina talia sunt, alia in aliis. Verum aliqui vates contraria his dicunt. Af-
fero autem hanc speculationem pulcherrimam esse, & cognatam plurimis, ac ma-
xime commodis in arte. Nam ægrotantibus omnibus plurimum ad sanitatem con-
sere, & sanis ad securitatem, & his qui se exercent ad bonum habitum, & ad
quod quisque voluerit. Psisana igitur recte omnibus frumentaceis edulis præla-
ta esse videtur in morbis acutis, & laudo sane eos, qui ipsam prætulerunt.
Nam viscositas ipsius levis est, & continua, & jucunda, & lubrica, & modera-
te humi-

- te humida, & sitim eximit, & facile eluitur, si forte & hoc opus sit, & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neque in ventre intumescit. Intumuit enim in coctura, quam maxime tumescere solet. Quicumque igitur perisana in hisce morbis uritur, nulla die vasa vacua fieri permittant, ut ita dicam, sed urantur, & non intermittant, si non aut ob medicamenri, aut insuli per clysterem uisum intermittere oporteat. Et qui quidem his in die cibum capere soliti sunt, eis his danda est, qui vero semel edere consueverunt, his semel primo die danda est. Verum sensim progressu facto, si fieri poterit, etiam his bis detur, si sane opus habere visum fuerit. At vero copia sufficit ab initio dare non multa, neque minus
- 75 crassam, sed ut consuetudinis gratia quid ingeratur, & ut ne multa valorum vacuatio fiat. * Ceterum quod ad augmentum copiae sorbitionis attinet, si quidem si-cior fuerit morbus, quam quis putarit, non ita magna copia dare oportet, sed ante sorbitionem, aut aquam mulsam, aut vinum praeibendum exhibere, utrum ex his convenientius fuerit. Utrum vero conueniat, in singulis modis refere-
- 80 tur. Si vero os humectetur, & a pulmone prodeuntia qualia oportet, fuerint, sorbitionis copiam, ut in summa dicam, augere oportet. Quae enim citius, & magis humectantur, celeritatem iudicationis significant. Quae vero tardius, & minus, tardiorum iudicationem significant. Et haec quidem per se talia omnino existunt. Verum multa quoque alia commoda omittuntur, ex quibus conie-
- 85 cturas facere oportet, quae postea referentur, & quanto copiosior purgatio fue-rit, tanto plus dare oportet, usque ad iudicationem, maxime duobus a iudicatione diebus, quibus sane quinta, aut septima, aut nona iudicare videtur, ita ut eriam parium, ac imparium dierum rationem habeas. Postea vero sorbitione quidem mane utendum est. Vespere vero ad cibos transendum. Conueniunt autem
- 90 talia plurimum his, qui statim tota perisana utuntur. * Nam & dolores in pleuriticis statim sua sponte cessant, ubi memorabile quid sperare, ac expurgari coeperint: & purgationes longe perfectiores sunt, & minus suppurati fiunt, quam si quis aliter victum suppeditet: & iudicationes simpliciores, & melius iudican-tes, & minus reuertentes. Perisanam porto ex optimo hordeis factam esse oportet, & quam optime coctam, & praesertim si non solo succo uti velis. Nim una enim reliqua perisanae virtute lubricitas facit, ut hordeum dum deglutitur, non laedat. Nusquam enim adharet, neque secundum thoracis rectitudinem moram trahit. Lubricissima autem est, & maxime sitim eximit, & facillime concoquitur, & debilissima est, quae optime cocta est, quibus omnibus opus est. Si quidem igitur
- 100 non opem tulerit quis, quantum opus est, ut sufficiens sit eiusmodi perisanae sorbitionis modus multis modis laedatur. Frenum verbi causa, quibus cibis intus conclusus est, si quis non facta deorsum evacuatione, sorbitionem dederit, dolorem si adeit, amplius exacerbaverit, & si non adeit, statim induxerint, & spiritus densior fiet. Hoc vero malum est. Pulmonem enim refecit, & praecordi-
- 105 um, & pectinem, ac septum transversum dolore affigit. Quin etiam si lateris dolor assiduus est, & ad calefactoria non remittit, & sputum non prodit, sed citra putrefactionem, ac concoctionem valde viscosum sit, si non soluerit quis dolorem, aut ventre mollito, aut vena secta, utrum tandem horum conduceret, perisanam autem ita habentibus dederit, cito mors talium continget. Propter has igitur causas,
- 110 fas, & alias huiusmodi adhuc magis, qui tota perisana utuntur, septima die, & citius moriuntur, partim mente lesi, partim ab erectae cervicis spiratione, & stertore suffocati. * Tales vero veteres sydere ictos esse putaverunt, ob hoc quidem maxime, non minus autem quod & mortuis ipsis lateris lividum reperitur, ut simile quid plagae appareat. Causa vero huius est, quod prius quam dolor solva-
- 115 tur, moriuntur. Cito enim anhelosi fiunt. Prae multo autem, ac densio spiritu, velut iam dictum est, valde viscosum circa concoctionem sit sputum, & egressum fieri prohibet. Immo stertorem inducit, chondrilagiosis pulmonis arteriarum patribus bronchiis appellatis impactum, & ibi ad hoc devenit, lethale iam periculumque existit. Nam & ipsum spiritum impactum prohibet quidem spiritum intro ferri, cogit autem cito extra ferri. Arque sic mutuam opem ad malum inter se conferunt, dum & sputum impactum, densum spiritum facit, & hic quum densus sit, sputum insuper viscosum facit, & lubricum fieri, ac elabi impedit. Occupant autem haec, non solum si perisana intempestive utantur, verum multo magis, si quid aliud ederint, aut biberint, quod minus quam perisana idoneum sit, proinde plerumque consimilia sunt auxilia & his qui tota perisana utuntur, & his qui succo ipsius: his vero qui neutro horum, sed solo potu, quandoque etiam diversimode auxiliari oportet. * At vero hoc modo omnino facere oportet. Si cui
- 120 a cibo recens accepto, & alvo nondum subevacuata, febris incipit sive cum dolore, sive sine dolore, inhibenda est sorbitionis exhibitio, donec putarit cibum ad infernam intestini partem secessisse. Utendum autem est potu aceti mulli, si dolor assuerit, hyeme quidem calidi, aestate vero frigidi. Si vero multa fuerit sitis, etiam aqua mulla, & aqua. Postea vero si dolor aliquis affuerit, aut pectinosis aliquid apparuerit, danda est sorbitio neque multa, neque crassa, atque haec post septimum, aut nonum diem, si validus aeger fuerit. Si vero non subit vetustior

or cibis ei, qui recens cibum accepit, si quidem validus sit, & ætate vigeat, infu-
sum per clysterem adhibendum est. Si vero debilius fuerit, glande utendum est, si
10 non sua sponte probe proderit. * Tempus porro exhibendæ forbitionis hoc maxi-
me observare ab initio, & per omnem morbum oportet. Quum quidem pedes
frigidi fuerint, inhibere oportet forbitionis exhibitionem. Maxime vero & a po-
tu abstinendum est. Ubi vero calor descenderit ad pedes, tunc exhibere conve-
nit, & purare in omnibus morbis, & non minime in acutis, & maxime in his, qui
140 magis febriles, ac periculosissimi sunt, tempus hoc magnam vim habere. Uten-
dum est autem primum quidem maxime succo; deinde vero prisana, juxta prædi-
ctas conjecturas diligenti facta consideratione.

S E C T I O I I.

11 * Cæterum pleuritis, hoc est dolor lateris, sive ab initio fiat, sive postea, calefa-
ctoris quidem primum non alienum est tentare dissolvere. Ex calefactoris vero o-
prima est aqua calida in utro, aut in vesica, aut in vase aëneo, aut testaceo admota. Verum
molle quid ante ad latus supponere oportet, lenitatis ergo. Commode etiam sponsia mol-
lis, magna, ex aqua calida expressa apponitur. Contegere vero stragulis ipsum fomentum
oportet. Nam & ampliore tempore sic sufficiet, & durabit, & simul ut ne vapor ad æ-
grotantis spiritum afferatur, nisi fortassis & hoc ad aliquid commodum esse vi-
sum fuerit. Aliquando enim ad aliquid commodat. Insuper autem & hordenum, &
eruvum, in aceto diluto, ita ut paulo acidius sit, quam ut quis bibere possit, dissoluta,
ac servata, & in marsupia conjecta, apponere oportet; & sursum eodem modo.
Siccum autem fomentum præbent sal, & milium torrefactum, in laneis sacculis
convenientissimum. Nam & leve, & lene est milium. * Solvit autem huiusmodi mol-
lurorum fomentum etiam dolores ad claviculam pertinentes. Sectio autem venæ
næ non similiter solvit dolorem, si non ad claviculam pertingat dolor. Quod si
15 ad calefactoria dolor non solvatur, non multo tempore calefacere oportet. Resic-
cat enim hoc pulmonem, & suppuracionem facit. At si quidem dolor ad clavicu-
lam de se significationem præbeat, aut gravitas ad brachium, aut circa mammam,
aut supra septum transversum; venam secare prodest in cubiti flexura internam, &
non cunctari copiosum sanguinem detrachere, donec multo rubicundior fluxe-
rit, aut pro puro, & rubicundo lividus. Utrumque enim contingit. Si vero sub septo
transverso fuerit dolor, ad claviculam autem de se significationem non præbeat, al-
vum mollire oportet aut veratro nigro, aut peplio, ita ut veratro quidem dau-
cum, aut fesele, aut cuminum, aut anisum, aut aliud quid ex odoratis ammicæas,
peplio vero silphii succum. Sed hæc inter se si misceantur, consimilis modi exi-
25 stunt. * Ducit autem nigrum veratrum melius, & ad judicationem commodius quam
peplium. Peplium vero status magis erumpere facit. Ambo autem hæc dolorem
sedant. Sedant item alia multa alvum subducentia medicamenta. Verum hæc in-
ter ea, quæ ego novi, optima sunt. Alioqui & ea, quæ in forbitionibus exhiben-
tur, alvum subducentia medicamenta opitulantur, quæcumque non valde iniucunda
sunt aut ob amaritudinem, at propter aliam quamdam injucunditatem, aut ob co-
piam aut colorem, aut aliquam suspicionem. Prisana tamen statim insuper sor-
bendam dare oportet, postquam medicamentum bibit, non memorabili copia pau-
ciorem, quam quanquam sumere adfectus est. Nam & rationi consentaneum est, in me-
dia purgatione sorbendam non dare. Quum autem cessaverit purgatio, tunc minus
35 sorbeat de ea, quam adfectus est. Postea vero reducat semper ad majorem copiam, si
& dolor sedatus fuerit, & nihil aliud adversetur. Idem mihi sermo est, si etiam pri-
sanæ succo uti opus fuerit. Melius enim esse assero, statim omnino incipere sor-
bere, quam prævacuatis jam vasīs sorbere aspicari aut tertia, aut quarta, aut quin-
ta, aut sexta, aut septima die, si sane non judicatus fuerit morbus ante hoc tempus.
40 Præparationes autem & his consimiles faciendæ sunt, quales dictæ sunt. De sorbi-
tionis igitur exhibitione ita sentio. Sed & de potu, qualemcumque tandem quis
ex describendis sumpturus est, eadem mihi penitus sermonis ratio est. * Novi au-
tem etiam medicos maxime contraria facere his, quæ fieri oportebat. Omnes enim
volunt, ubi sub morborum initia homines fame pramacerant duobus, aut tribus
45 sorbitiones exhibere, sic forbitiones exhibere, itaque potus, & fortas-
sis etiam par ipsis esse videtur, ut magna corpori mutatione fiente, etiam magnum
quid valde contra obijciatur. Verum mutare quidem non parum, bene habet.
Recte tamen mutatio transferenda est, & ex mutatione adhuc magis exhibitio
eorum, quæ per os sumuntur. Maxime igitur lædi poterint, si non recte muta-
50 tionem fecerint hi, qui tota prisana utuntur. Poterint etiam lædi, qui solo succo ut-
untur, lædi quoque possunt, qui solo potu utuntur. Minime vero hi. Oportet au-
tem & in sanorum adhuc hominum victu addiscere, quæ conferunt. Si enim sanis
rales, aut tales victus multum differre videntur tum in aliis quibusdam, tum in mu-
tationibus, quomodo non etiam in morbis multum differant, & maxime in acutis?
55 * Atqui facile est hoc addiscere, quod simplex victus cibi, & potus, ipse sibi ipsis
semper similis, securior omnino est ad sanitatem, quam si quis derepente ad alium
meliorem, magnam mutationem faciat. Nam & his, qui bis in die cibum sumunt,
& his, qui semel, repentinæ mutationes noxas, ac ægitudines inducunt, & eos sa-

- 60 ne, qui prandere non adfuerint, si pransi sunt, statim infirmos facit hoc, & toto corpore graves, & debiles, & pigros, si vero etiam insuper cœnaverint, acutum ructantes. Quibusdam vero etiam alvi liquida egestio oboritur, quum præter consuetudinem ventriculus gravetur, solitus resicari, & non his intrinsecere, neque his cibos coquere. Auxiliatur igitur his, mutationem rursus adæquare. Dormire enim oportet, velut nocte reducta post cœnam, hyeme quidem absque frigore, æstate vero absque calore. Si vero dormire non queat, ubi multam lentam deambulationem non stando oberravit, nihil cœnet, aut pauca, eaque vinosia. Insuperque minus bibat, & potum non aquosum. Talis autem adhuc magis affligitur, si ter in die ad satietatem cibum acceperit, & adhuc magis si sæpius. Quamquam sane multi sunt, qui facile ferunt, si ter in die cibum copiose accipiant, qui ita sunt adfuerint. * Quin & hi, qui bis in die cibum capere soliti sunt, si pransi non fuerint, debiles, & infirmi sunt, & ad omne opus timidi, & ventriculi osculum dolent. Viscera enim pendere, ipsis videntur, & calidam, ac cum virore pallidam urinam minguunt, & alvi egestio comburitur. Quibusdam etiam os amarefcit, & oculi cavi sunt, & tempora palpitant, & extrema partes perfrigerantur. Et plerique ex his, qui pransi non sunt, cœnam edere non possunt. Si vero cœnam sumperint, ventriculus gravant, & multo magis agre in lecto degunt, quam si etiam pransi fuissent. Quum igitur talia hæc sanis fiant ob victus dimidiæ diei mutationem præter consuetudinem; apparet neque apponere, neque detrahente commodum esse. Si igitur hic, qui præter consuetudinem semel in die cibum acceperit, ubi tota die vasa vacua fecit, quantum consuevit cœnaverit, verisimile est ipsum, si tunc quum impransus esset, doluit, ac egrotavit, & ubi cœnavit, gravis fuit, multo magis gravari. Si vero etiam longiore tempore evacuatis yasis, postea derepente cœnaverit, adhuc magis gravabitur. * Qui igitur præter consuetudinem vasa vacua fecit, ei hanc diem rursus adæquare sic conducit absque frigore, & calore, atque labore. Hæc enim omnia graviter sulerit, & cœna multo minor exhibenda est, quam consuevit, eaque non sicca, sed modi humectioris, & postea bibat potum non aquosum, neque pauciorum, quam pro cibi ratione. Sed & postea de pauca superant, quo sensum progressu fiente ad consuetudinem revertatur. Qui tamen præter supernas partes amara bile infestantur, talia molestius ferunt. Pituitosi autem supernis partibus, cibi præter morem abstinentiam omnino facilius ferunt. Quare etiam semel in die cibum præter morem capere, facilius utique idem tulerint. Sufficiens igitur & hoc signum est, quod maximæ mutationes eorum, quæ circa nautas nostras, ac habitus contingunt, maxime morbos faciunt. Non igitur licet intempestive, neque vehementissimas valorum vacuationes facere, neque vigentibus morbis, & in inflammatione consistentibus cibos exhibere, neque licet derepente in tota re quicquam, aut hinc, aut illuc mutare. * Multa vero his cognata ex his, quæ ventriculo contingunt, itemque alia referre quis possit, quod facile quidem ferunt cibos, quibus adfuerint sunt, etiam si natura non sint boni. Similiter etiam potus. Agre aptem ferunt cibos, quibus adfuerint non sunt, etiam si non sint mali. Similiter etiam potus. Et quæ quidem multus carnis esus præter consuetudinem assumptus facit, aut allium, aut siliptum, aut succus ipsius, aut canis, aut alia huiusmodi, magnas quidam peculiares vires habentia, minus admiretur quis, ubi talia dolores ventriculis magis, quam alia inducunt. At iusta fuerit admiratio, si didiceris, quantam maza turbationem, & inoleam, & flatum, & tormem ventriculo inducat, si præter morem ingesta fuerit ab eo, qui mazam edere non est solitus, aut qualem situm panis ipse calidus ingestus indicat, & repentinam repletionem ob siccandi vim, & quod tarde transiit, & quam diversas inter se affectiones faciant & panes valde puri, & qui ex toto sunt collati, præter consuetudinem in cibo accepti, itemque maza sicca præter consuetudinem in inferno. Hoc vero venarum palpitationem, & capitis gravitatem, ac sitim. * Quin & album vinum, & nigrum, si quis præter consuetudinem permutet, etiam si ambo vinosi fuerint, tamen multa in corpore alterant, ut minus mirum esse quis dixerit, dulce, & vinosum vinum non idem posse, si derepente permutata fuerint. Porro huiusmodi aliquam partem sermoni contrario parricidari oportet, quod mutatio victus his facta est, corpore non mutato, neque ad robur, ut cibos apponere opus sit, neque ad debilitatem, ut detrahere oporteat. Insuper autem & robur coniectandum est, & morbi inuicemque modos, & hominis natura, & consuetudo victus agri, non ciborum solum, sed etiam potum. Multo autem minus ad additionem procedendum est. Nam detractionem omnino tollere sæpe conducit, ubi suscecturus est æger, donec morbi vigor maturefcat. In quibus autem hoc faciendum sit, scribitur. Multa vero etiam alia relatus cognata scribere quis possit. Hoc tamen melius testimonium est. Non enim cognatum est rei illi, de qua plurimus a me sermo habitus est, sed ipsa res opportunissimum est documentum. * Nam ab acutiorum morborum initio aliqui quandoque eadem die, qua morbus incœpit, cibos compederunt, aliqui posttridie, quidam etiam subuecutum quocumque oblatum

- oblatum esset, quidam etiam cyceonem. Omnia autem hæc deteriora quidem sunt, 130
quam si quis alio modo victum instruisset, multo tamen minus detrimentum afferunt
in hoc tempore peccata, quam si quis primis duobus, aut tribus diebus penitus va-
sa vacua fecisset, & quarta, aut quinta die tali victu usus esset. Deterius tamen est,
si omnibus his diebus vasis evacuatis, in posterioribus diebus hoc modo victum
instruit, proutquam concoctus, ac maturus sit morbus. Etenim hoc modo mortem 135
plurimis manifeste affert, si non omnino facilis fuerit morbus. Quæ vero ab ini-
tio committuntur peccata, non similiter ut illa medelam omnem reperiunt, sed mul-
to facilius correctionem admittunt. Hoc igitur maximum documentum esse arbi-
tror, quod primi dies sorbitione tali, vel tali non sint privandi in his, qui paulo
postea talibus, aut talibus sorbitionibus usuri sunt. * Funditus igitur igno- 140
rant tunc hi, qui granola peisana utuntur, quod ab ipsa læduntur, quum sorbere
inceperint, si duobus, aut tribus, aut pluribus diebus antea vasa evacuerint,
tunc hi, qui succo utuntur, quod sorbentes læduntur, ubi non recte sorbitionem in-
ceperint. Tunc tamen cavent, & magnam noxam afferre cognoscunt, si proutquam
maturus factus fuerit morbus, granolam peisanam sorbuerit æger, succo uti ad- 145
suerit. Omnia igitur hæc magna testimonia sunt, quod medici agros non recte
ad victum perducunt. Sed in quibus morbis vasa vacua facere non oportet, his
qui sorbitionibus uti debent, vasa vacua faciunt. In quibus vero ex vasorum vacua-
tione ad sorbitiones mutationem facere non oportet, in his mutationem faciunt, &
hoc plerumque absolute. Aliquando vero in his temporibus mutationem ad sorbitiones 150
faciunt ex vasorum vacuatione, in quibus sæpe ex sorbitionibus ad vasorum va-
cuationem accedere expediebat, si ita morbum exacerbari contingat. Aliquando au-
tem & cruda aterantur de capite, & a thoracis regione, biliosa, & vigilæ ipsis co-
incidunt, ob quas non coquitur morbus, & tristes, ac amarulenti fiunt, & delirant,
& splendores ipsis ob oculos obversantur, & aures sonitus plenæ sunt, & extre- 155
mæ partes perfrigeratæ, & urina incocta, & sputa tenuia, & falsa, & nigræ co-
lore tincta, ac panica, & sudores circa collum, & anxietudines, & spiritus in latio-
re solum versus offensus, densus, aut etiam valde magnus, supercilia disten-
ta, ac gravata, deliquia animi prava, & stragulum de pectore rejections, & mo-
nustremulæ. * Quandoque vero labium infernum concutitur. Hæc autem in principiis 160
compentia, vehementis delirii significationem præbent, & plerumque ægri moriun-
tur. Qui vero effugiunt, aut cum abcessu, aut cum sanguinis & naribus fluxione,
aut ex crassi puris spatio effugiunt, alias vero minime. Neque enim talium rerum pe-
ritos medicos esse video, quomodo debilitates in morbis dinoscere oporteat, &
quæ ex vasorum vacuatione efficiuntur, & quæ propter aliam aliquam irritationem, 165
& quæ propter dolorem, & præ acuminem morbi, itemque quot affectiones, &
omnigenas species, natura nostra, & habitus singulis pariat, & quidem quum ta-
lium cognito, aut ignorantia salutem, aut mortem afferant. Majus enim malum
est, si ob dolorem, & morbi acumen debilitato exhibet quis potum, aut sorbitionem
copiosiorum, aut cibum, ob vasorum vacuationem debilem esse existimans. In- 170
decorum etiam est ob vasorum vacuationem debilitatum non cognoscere, & victum
premere. Afferit equidem periculum aliquod & hoc peccatum, verum multo mi-
nus quam alterum. Multo autem magis risu dignum hoc peccatum est, quam illud al-
terum. Si enim alius medicus, aut etiam idiota ingressus cognoverit ea, quæ contige-
runt, & edenda, ac bibenda dederit ea, quæ alter prohibuit, palam auxilium tulisse 175
putabitur. Talia vero faciunt, ut artifices maxime ab hominibus vituperentur.
Videtur enim ipsis ille, qui ingressus est medicus, aut idiota velut mortuum susci-
tasse. Scribuntur autem de his quoque signa, ex quibus singula dinoscere oportet.
- 32 * Confusio tamen illis, quæ circa ventrem contingunt, & hæc sunt. Nam si to-
tum corpus præter consuetudinem multum quiescat, non statim magis robustum 180
fit. Si vero etiam ubi multo tempore quievit, derepente ad labores prodierit, vi-
riosum quiddam palam operabitur. Ad eundem modum etiam singule corporis
partes. Nam & pedes tale quiddam operabuntur, & alii articuli labore non
adfecti, si interposito tempore derepente ad laborandum prodierint. Eadem etiam o-
culi, & dentes perpetientur, & quæcumque tandem pars. Nam & lectus præter 185
morem mollis dolore inducit, itemque præter consuetudinem durus. Sed & si
sub dio lectus præter morem sternatur, corpus induratur. Quin & talium o-
mnium exempla scribere satius fuerit. Si quis enim accepto ulcere in tibia, neque
valde periculoso, neque adeo contemnendo, ita ut neque ipsi ita difficulter, aut
adeo facile ulcera sanescant, statim prima ab initio die decumbens fuerit, & ne- 190
quaquam crus elevet, hic sane hoc modo circa inflammationem fuerit, & sanus
multo citius fiet, quam si obambulans curret. Attamen si quinta, aut sexta
die, aut etiam prius surrexerit, & progredi voluerit, magis utique affligetur, ac do-
lebit, quam si statim ab initio obambulans curatus esset. Si vero etiam multum
derepente se fatigaverit, multo magis dolebit, quam si illo modo curatus, in il-
lis diebus ita se fatigasset. Perpetuo igitur hæc omnia inter se testimonium præ- 195
bent, quod omnia, quæ derepente multum supra modum huc, & illic muan-
tur, lædunt. * Multiplex igitur in ventre hæc est, si ex multa vasorum vacuatio-
ne, plus

ne, plus moderato derepente ingeratur. Quin & in reliquo corpore, si ex multa
 500 quiete ad amplius laborem derepente deveniat, multo magis lædetur, quam si ex
 multo cibo ad vasorum vacationem tranfmittetur, & si ex multo labore derepen-
 te ad otium, ac segnitiam exciderit. Oportet tamen & his, corpus quiescere. O-
 portet item illis ventrem a ciborum copia quiescere. Sin minus, & dolorem in cor-
 pore inducet, & totius corporis gravitatem. Plurimus itaque sermo de mutatione
 205 huc atque illuc a me habitus est, eo quod hæc nosse ad omnia commodum sit, & ad
 hoc præsertim, de quo nobis sermo erat, quod in acutis morbis ad sortitiones
 mutationem faciunt ex vasorum vacatione. Facienda enim est mutatio velut ego
 jam iubeo. Deinde non est utendum sortitionibus, priusquam morbus maturus
 factus fuerit, aut aliud quoddam signum apparuerit vel vacuatum, vel irritato-
 210 rum circa intestinum, aut circa præcordia, qualia scribuntur signa. Vigilia fortis,
 potus, & cibos crudos, & inconcoctiores facit. Et rursus in contrariam partem mu-
 tatio dissolvit corpus, & excoctionem, ac capitis gravitatem inducit.

S E C T I O I I I.

- 1 * Vinum porro dulce, & vinosum, & album, ac nigrum, & aquam mulsam, & aquam, 25
 & acetum multum his notis distinguere oportet in morbis acutis. Vinum dulce
 minus caput gravat, quam vinosum, & minus mentem ferit, & magis quam alterum per al-
 vum, & intestinum subit. Viscera vero magna facit, splenem, & hepar. Quare neque
 5 his, qui amara bile abundant, commodum est. Nam & siticulosum in talibus est, &
 flatuosum in supremo intestino; non tamen inferno intestino inimicum pro flatu
 ratione, & quidem quum non valde penetret status a vino dulci, sed circa præcor-
 dia moretur. Certe per urinam hoc minus exit omnino, quam vinosum album. Spu-
 rum vero magis educit dulce, quam alterum; & quibus quidem siticulosum est dum bi-
 10 bitur, his minus, quam alterum vinum educit. Quibus vero siticulosum non est, his magis,
 quam alterum educit. At vero album vinosum vinum plurima ac maxima ex
 parte jam & laudatum, & vituperatum est in dulcis vini enatatione. Ad vesicam
 autem magis penetrat, quam alterum, & quum utinam ciet, ac semper peritumpat,
 multum in his morbis profuerit. Nam & si ad alia incommodius sit altero, attra-
 15 men quæ in vesica sit ab ipso purgatio, liberat, si quale oportet, propellatur. Bonæ
 vero hæ notæ sunt de vini utilitate, ac detrimento, quas seniores me non no-
 verunt. Fulvo vero vino, & nigro austero in his morbis ad hæc uti poteris, si
 capitis gravitas non affuerit, neque mentis percussio, neque sputum ab ascensu prohi-
 beatur, neque urina suppressa sit, alvi autem egestiones humectiores, ac ramentosio-
 20 res fuerint. In talibus sane vel maxime convenit ex albo traimitationem fac-
 cere, & si qua his similia existunt. Hoc vero insuper intelligere oportet, quod
 si aquosum fuerit vinum, supernas partes omnes, & eas, quæ circa vesicam sunt, mi-
 nus lædet. Verum puribus circa intestinum magis proderit, si meracius fue-
 rit. * Aqua veto mulla, si bibatur per totum morbum in acutis morbis, in totum 26
 25 quidem his, qui amara bile abundant, ac magna viscera habent, minus commoda est,
 quam his, qui tales non sunt. Siticulosa tamen minus est dulci vino. Pulmonem enim
 mollit, & sputum moderate educit, & tussim lenit. Habet enim vim quamdam exter-
 sotiam, quæ magis moderato sputum viscosum facit. Urinas etiam sufficienter ciet
 aqua mulla, si non aliqua ex visceribus affectio prohibeat. Sed & biliosa per alvum
 30 magis egerit, quandoque bonæ, quandoque magis quam convenit, colore saturata, ac
 spumosiora; atque hoc biliosis, & magna viscera habentibus magis contingit. Spu-
 rit igitur educationem, & pulmonis mollitionem aquosior aqua mulla magis facit.
 At spumosa alvi egestiones, & biliosa magis quam convenit colorata, ac magis ca-
 35 lida, meraca aqua mulla magis ducit, quam aquosa. Talis autem egestio habet quidem
 & alia magna nocumenta. Neque enim ex præcordiis ardorem extinguit, sed concit-
 at, & anxiam molestiam, ac membrorum iritationem facit. Verum & intestina, &
 sedem exulcerat. Horum autem auxilia scribentur. Qui igitur aqua mulla utitur
 absque sortitionibus, pro alio potu, in his morbis, hic multum successum percep-
 40 plet, & non in multis successu destituetur. Quibus autem danda sit, & quibus non, &
 ob quas causas non danda, maxima ex parte dictum est. * Damna vero est aqua 27
 45 mulla ab hominibus, velati quæ bibentes ipsam extreme debilitet, & propterea
 mortem accelerare putari. Vetum hoc propter eos, qui se ipsos sane conficere con-
 stituerunt, dictum est. Aliqui enim aqua mulla sola in potu utuntur, nimirum velut
 talis existat. At hoc non omnino hoc modo se habet. Sed si sola bibatur, multo
 50 quidem fortior est, quam aqua, si non alvum exturbet. Sed & vino albo, ac tenui,
 & parum aque terente, & modico, aliquatenus fortior est, aliquatenus debilior.
 Multum tamen differt & vini, & mellis meracitas ad utriusque vires. Nam etiam si du-
 plam mensuram vini meraci quis bibat respectu mellis, quod delingat, multo ta-
 55 men fortior fuerit ex melle solo, si alvum non turbat. Nam & multo plus stercoris
 ipsi prohibet. Si tamen peissanæ sortitione utatur, insuper autem aquam mulsam bibat,
 valde ipsum replebit, ac status excitabit, & visceribus circa præcordia incommo-
 da erit.

da erit. At ſi ante ſorbtionem aqua muſſa bibatur, non ita lædit, velut ſi inſuper bi-
 batur, ſed etiam aliquo modo proderit. Cæterum cocta aqua muſſa aſpectu quidem
 multo melior eſt, quam cruda. Splendida enim, & tenuis, albaque, ac pellucida ſit. Sed
 quam ipſi virtutem attribuum, qua crudam præcellat, non habeo. Neque enim iucundior 55
 eſt, quam cruda, ſi mel bonum eſſe contigerit, debilior tamen, & minus ſtercoris ducens,
 quorum neutro, ut caſtigetur, aqua muſſa opus habet. Proxime vero utendum tali
 cocta, ſi mel pravam fuerit, & impurum, & nigrum, & non boni odoris. Coctura enim
 28 maiorem partem turpitudinis pravitatis ipſius detrachere poterit. * At vero acetum
 muſſum appellatum, ſi bibatur, ſæpe quidem commodum eſſe in his morbis comperies.
 Nam & ſputum educit, & facilem ſpirationem facit. Tempora vero huiusmodi ha-
 bet. Etenim quod valde acre eſt, nihil moderati fecerit ad ſputa, quæ non facile pro-
 deunt. Si enim educeret ea, quæ ſtridulam aſperitatem faciunt, & lubricitatem in-
 duceret, & guttur velut dilataret, pulmonem utique leniret. Ipſum enim mollit, & ſi
 quidem hæc contingerent, magnam ſane utilitatem aſſerret. Aliquando vero id, quod
 60 valde acre eſt, educationem ſputi non obtinet, ſed inſuper viſcoſum id facit, & lædit.
 Maxime autem hoc perpetiuntur hi, qui etiam alias pernicioſe habent, & qui neque ruſ-
 fire, neque exſecrare inſolentia poſſunt. Ad hoc igitur vires ægroti inſuper conſecta-
 re oportet, & ſi ſpem de ipſo habeas, exhibere. Exhibere autem oportet, ſi dederis,
 ſumme tepidum, atque tale paulatim, & non large. Quod vero parum acre eſt, hu-
 meſcat quidem os, & fauces, ſputum item educit, & ſitum ſedat, & præcordio, & viſce-
 ribus, quæ ſunt, hæc parte lenè eſt, & detrimenta ex melle hæc parte prohibet. Quod
 enim biſoſum in melle, caſtigat. Flatus etiam erumpere facit, & ad miſtionem prohi-
 tet. Ineſtini tamen infernam partem humectiorem facit, & ramenta inducit. Quan-
 doque vero etiam malum hoc ſit in acutis morbis, maxime quidem quod ſtatim pene-
 75 trare, imo recurrere facit. Inſuper autem & alias debilitat, & extremas partes frigefacit.
 Atque hanc ſolam læſionem ex ætero muſſo contingere novi, quæ ſane digna ſit, ut ſcri-
 batur. Parum autem de huiusmodi potu, nocte, & jejuno ante ſorbtionem præbiden-
 dum dare commodum eſt. Sed & ubi multum temporis poſt ſorbtionem interceſſit, bi-
 39 bere nihil prohibet. * His vero, qui ſolo potu degunt abſque ſorbtionibus, propter ea 80
 non eſt commodum ſemper, & perpetuo hoc uti, maxime propter raſuram, aut ex-
 aſperationem inteſtini. Quum enim ſtercore vacuum ſit, magis utique hæc induxerit,
 & quum vaſorum vacuum adſit, poſtea etiam aqua muſſa vires detraxerit. Si tamen o-
 piculari apparuerit ad totum morbum multus huius potus uſus, parum aceri aſſande-
 re oportet, ut ſaltem cognosci poſſit. Ita enim & ea, quæ lædere ſolet, minime læ-
 85 ſerit, & his, quæ auxilio opus habent, opem tulerit. Cæterum ut in ſumma dicatur,
 a credines, ſive aciditates ex aceto, amara bile abundantiſſimis magis conferunt, quam a
 trabiliariis. Amara enim diſſolvuntur, & in pituitam tranſeunt, dum ab ipſo atollun-
 tur. Nigra vero fermentantur, & atolluntur, ac multiplican-
 tur. Acetum enim ni-
 30 gra ſurſum ducit. Mulieribus autem omnino magis adverſatur acetum, quam viſis. Do-
 lores enim uteri inducit. * Aquæ porro potui in acutis morbis nullum aliud opus
 habeo, quod attribuum. Neque enim lenit iuſſum in peripneumoniciſ, neque ſputum
 educit, ſed minus quam alia, ſi quis ſemper aquæ potu utatur. Si tamen inter acetum
 muſſum, & aquam muſſam parum aquæ abſorbeatur, ſputum educit propter quali-
 tatis potuum tranſmutationem. Inundationem enim quandam inducit, alias autem neque
 95 ſitum ſedat, ſed exacerbat. Eſt enim naturæ biſioſæ biſioſa, & præcordia mala, imo
 peſſima ſit, ac biſioſiſſima, & vires maxime proſternit, ubi in vacuitatem ingreſſa fue-
 rit. Sed & ſplenem auget, & hepar, ubi inflammatum fuerit, & fluctuat, ac ſuperin-
 natat. Nam & tardi tranſitus eſt, eo quod frigida eſt, & cruda, ac incoctilis, & neque per
 alvum ſecedit, neque per urinas tranſit. Inſuper autem & propterea læſionem inducit, quod
 100 a natura ſtercus non ſubducit. Si vero etiam dum adhuc frigidi ſunt pedes, aliquando
 bibita fuerit, hæc omnia multo plus lædit, ad quodcumque tandem ipſorum pervene-
 rit. Ubi tamen in his morbis ſuſpicatus fueris, aut capitis gravitatem vehementem,
 aut mentis percuſſionem, penitus a vino abſtinendum eſt, & aqua in tali utendum, aut
 vinum aquoſum, & album penitus dandum, & penitus inodorum, & poſt ipſius potum
 aqua modica inſuper bibenda. Ita enim robur vini caput, & mentem minus petcel-
 105 let. In quibus autem potu ipſius maxime utendum ſit, & quando valde multa, & quan-
 do moderata, & quando frigida, & quando calida, partim prius dictum eſt, partim
 pro temporis occasione dicitur. Cæterum de reliquis potibus, qualis eſt hordeaceus,
 & qui ex herbis ſunt, & quæ ex uva paſſa, & uvarum expreſſarum reſtitutis, & ex tri-
 tico, & cnico, & myrti baccis, & malo punico, et de aliis, ubi aliquis ipſorum u-
 ſus contigerit, ſcribetur circa ipſum morbum, quemadmodum etiam de aliis compoſitis
 31 medicamentis. * Balneum vero in multis morbis opem tulerit eo utentibus, ad alie-
 quos quidem aſſidue, ad aliquos non item. Quandoque vero minus eo utendum eſt, pro-
 pterea quod homines ad hoc ſint imparati. In paucis enim domibus præparata ſunt
 115 neceſſaria instrumenta, et nec miniſtri, velut opus eſt, parati habentur. Si vero non
 omnino bene quis lavetur, non modicam læſionem incurrit. Nam et rugario ſumum
 non habente opus eſt, et aqua larga, et balneo multo, et non valde large aſuſo, ſi ſane
 non ita opus fuerit. Et deſtrictio quidem potius utendum non eſt. Si vero deſtrice-
 tur, calido utendum eſt ipſo deſtrictorio medicamento, eoque multiplici magis, quam
 120

- alias receptum est, & insuper non parca aqua perfundendum, & cito perfundendum. Brevi quoque via ad solum opus est, & ut facilis sit incensus, & facilis item exitus. Oportet autem eum, qui lavatur, esse moderatum, ac taciturnum, & nihil ipsum operari, sed alios & perfundere, & desiccare. Debet etiam postea multa aquae mixtura parata esse, & celeres perfusiones fieri, & spongiis utendum est pro strigili, & non valde sic-
 125 cum inungendum esse corpus. * Caput tamen refectum esse oportet, quantum eius fieri potest maxime, ita ut spongia extergeatur, & neque perfrigerari caput oportet, neque extremas partes, neque reliquum corpus, & neque eum, qui recens forbitionem ac-
 130 cepit, neque eum, qui recens potum sumptis, lavare oportet, & neque sorbere, neque hibe- re cito post balneum. Magnam tamen partem aegro tribuere convenit, si sanus balnei valde amans fuit, & lavari adluetus. Tales enim magis appetunt, & loci utilitatem sentiunt, & non loci laeduntur. Convenit autem in totum magis peripneumonitis, quam febribus ardentibus. Nam dolorem lateris, & pectoris, ac dorsi balneum lenit, & spiritum maturum facit, ac educit, & facilem spirationem reddit, & lassitudinem exi-
 135 mit; articulos enim, & cutis superficiem molliat. Sed & urinam ciet, & capitis gra- vitatem solvit, & nares humectat. Tot igitur bona balneo adfunt, quibus omni- bus opus est. Si vero apparatus penuria aliqua fuerit in una re, vel pluribus, pericu- lum est, ne magis laedat balneum, quam prosit. Singula enim ex ipsis magnum detri-
 140 mentum afferunt, si non a ministris, velut convenit, preparata fuerint. Minime vero tempestivum est eos lavare, quibus alvus in morbis liquidior iusto est, itemque eos, quibus plus iusto adstricta est, & non prius subiit. Sed neque debilitatos lavare oportet, neque ex ciborum fastidio nauseantes, aut vomentes, neque eos, qui biliosum eru-
 145 ctant, neque eos, quibus sanguis ex naribus erumpit, nisi minus, quam pro occasione convenit, sinat. Occasiones autem nosti. Si vero minus, quam pro occasione sinat, la- vare expedir, sive totum corpus ad reliqua inde opem sentiat, sive caput solum. * Si igitur preparationes commodae fuerint, & aeger bene susceperit eis balneum, quo-
 150 tidie lavare convenit. Eos vero, qui balneo delectantur, etiam si bis in die laveris, nihil peccaveris. Ceterum balneis uti multo magis licet his, qui tota perisana urin- tur, quam his, qui solo utuntur succo. Licet autem & his aliquando. Minime vero his, qui potu solvantur. Sunt tamen ex his quoque, quibus licet. Coniectare vero ex pra-
 scriptis oportet, & quibus balneum in singulis victus modis profuturum est, & qui- bus non. Quibus enim aliquid horum deest commodatum, quae balneum facit, & quae balneo commendant, lavare non oportet. Quibus vero nihil horum deest, & adfunt ipsi signa, in quibus lavari conducit, lavare oportet.

S E C T I O I V,

- 1 * **F**ebri autem ardens fit, quum refectae venulae hora aestiva acres, ac bilio-
 34 sos ferolos humores in se ipsas attraxerint, & febris multa detinet, & cor- pus, velut ex ossium lassitudine detentum, delassatur, ac dolet. Fit autem ple-
 rumque & ex longo itinere, & longa siti, quum refectae venulae acres, ac ca-
 5 lidas fluxiones in se ipsas attraxerint. Fit autem lingua aspera, ac sicca, & val- de nigra, & dum circa ventrem mordetur, dolet, & alvi egestionis valde liqui-
 dae, ac pallidae sunt, & sitis vehemens inest, itemque vigilat. Aliquando etiam mentis emoriones. Huic & aquam, & aquam multam aquosam coctam, quantum volue-
 rit, bibendam dato, & si amarum fuerit os, vomere conducit, & ventrem per clyste-
 10 rem subluere. Si vero ad haec non solvatur, lacte asinino cocto purgato. Salsum autem nihil, neque acre exhibeto. Non enim sufficeret. Sorbitionem vero, donec extra ju-
 dicationes fuerit, ne dato. Et si sanguis ex naribus fluxerit, solvitur affectio, itemque si sudores accedant indicatoris, genuini, cum urinis albis, & crassis, ac subsidentis le-
 15 vibus, & si abscessus aliquis fiat. Si vero absque his soluta fuerit, recidiva rursus agritudinis continget. Aux coxae, aut crurum dolor emerget, & crassa expuet, si sa-
 nus futurus est. * Febris ardentis genus aliud. Alvus subit, siti plena est lin-
 35 gua, aspera, sicca, sanguinolenta. Urinae interceptio, vigilia, extremitates frigidae. Tali fit non sanguis ex naribus fluxerit, aut abscessus circa collum fiat, aut crurum do-
 lor, & sputa crassa spuerit (haec autem suppressa alvo sunt) aut coxae dolor, aut pin-
 20 dendii livor non judicatur, & testis intensus iudicatorium signum est. Sorbitiones attractorias dato. Verum in acutis morbis venam secabis, si vehemens appareat morbus, & qui ipsum habeant, in vigoris aetate fuerint, & robur ipsis affuerit. Si quidem igitur angina fuerit, sive aliquis alius ex pleuriticis morbus, elegemaris delinctu repurgato. Si vero debiliores appareant, si plus de sanguine detraxeris,
 25 infuso alvi per clysterem tertio quoque die utere, donec in tuto fuerit aeger, aut et-
 iam fame opus habeat. * Praecordia inflammata non ex flatuum interceptio, se-
 36 pti transversi intensionis, aut spirituum protensionis, in rectae cervicis spiratione sicca, quibus pus non subest. Verum ex flatuum interceptio affectiones haec accedunt. Maxime autem & hepatis dolores, et splenis gravitates, et aliae inflamma-
 30 tionis, et supra septum transversum dolores, ac morborum collectiones sol- vi non possunt, si quis prius medicamentis purgare aggrediat. Nam venae

sectio in talibus principalis est. Deinde infusa per clysteres, si non magnus, et
vehemens fuerit morbus; sin minus, etiam postea medicamento purgante opus
est. Sed et post venæ sectionem, purgans medicamentum securitate, ac moderatio-
ne opus habet. Quicumque vero ea, quæ inflammata sunt, statim in principio mor-
borum medicamento solvere aggrediuntur, hi de intento quidem, ac inflammato
nihil auferunt, non enim remittit affectio, quæ adhuc cruda est; quæ vero mor-
bo resistunt, ac sana sunt, colliquescunt. Debili vero fiente corpore, morbus in-
ualefcit. Quum autem morbus corpori prævaluerit, tale jam incurabiliter affectum
est. * Ut aliquis derepente voce privatus fiat, venarum interceptiones faciunt,
si sano hoc contingat agere manifesta, aut alia fori causa. Venam igitur secare o-
portet in brachio dextero interuam, et sanguinem detrudere juxta habitum, ac æ-
tatem rationem ineundo, an plus, aut minus oporteat. Coincidunt autem plurimis
ipsorum hæc, rubores faciei, oculorum stabilitates, digitorum in manibus distentio-
nes, dentium stridores, pulsationes, maxillarum contractiones, extremitatum perfri-
geratio, spirituum per venas interceptiones. Quum dolores accesserint, atræ bilis,
et atrium fluxionum affluxus sunt. Dolent autem partes internæ dum mordentur.
Conversæ vero, et valde sicæ fientes venæ intenduntur, et inflammatae affluentia
attrahunt. Unde corrupto sanguine, et spiritibus non potentibus naturales in ip-
so vias permeare, perfrigerationes sunt ex statione, et vertigines, et vocis inter-
ceptio, et capitis gravitas, et convulsiones, si jam ad cor, aut hepar, aut ad venam
devenierint. * Hinc morbi comitiales sunt, aut semifyderati, si in ambientes locos
fluxiones inciderint, et a spiritibus pertransire non potentibus resiccare fuerint.
Quare talibus, fomentis prius adhibitis, venam secare oportet statim ab initio, dum
adhuc elevati sunt omnes affligentes spiritus, ac fluxiones. Facilis enim auxi-
lium admittunt, et refectus viribus, et consideratis iudicationibus, medicamentum
exhibere sursum purgans, si non allevetur, ad infernam vero alvum, si non subeat,
infusum per clysterem adhibere. Postea vero lac asinum coctum dato, et non mi-
nus quam duodecim heminas bibat. Si vero virum robur adsit, plures faciedecim.
* Angina fit, quum fluxio ex capite multa, ac glutinosa tempore hyemæ, aut ver-
no ad venas jugulares influxerit, & hæ fluxionem ampliore propter ampli-
tudinem attraxerint. Quum autem frigida, & glutinosa sit, spiritus transitus obturabit,
& sanguinis transitus obturans, propinquas sanguinis partes congelat, ipsumque
immobilem, ac stabilem facit, quum natura frigida sit, & obturandi vim habeat, &
propterea suffocantur, lingua livescit, & rotunda fiens, ac reflexa propter ve-
nas, quæ sunt sub lingua. Præcisæ enim uva, quam aliqui columellam vocant, ve-
na crassa ab utraque parte est. Quum igitur hæ plene sint, & in linguam imitantur,
quæ rara est, ac spongiosa propter siccitatem, contingit ut ipsa præ violentia hu-
morem ex venis suscipiens, ex lata fiat rotunda, ex bene colorata, livida, ex molli,
dura, ex facile flexibili inflexibilis, adeo ut æger cito suffocetur, si non quis cito
auxilium ferat, venæ sectionem a brachiis faciens, & venas sub lingua secans, &
eclegmatum delinchi curans, & calidos gargarismos exhibens, & caput radens.
Debet autem & ceratum collo, ac capiti circumponere, & lanas obvolvere, & spon-
giis mollibus ex aqua calida expressis fovere. Bibat autem æger aquam, & aquam
mulsam, non frigidam. Succum vero pisinæ tunc sumet, quum jam ex iudicio-
ne in tuto fuerit. * Quum vero æstivo, vel autumnali tempore fluxio calida,
& nigrosa de capite defluerit, utpote ex tempore acris, ac calida facta, talis ubi est,
mordet, & ulcerat, & spiritu implet, & cervicis spiratio accedit, & siccitas mul-
ta, & quæ videtur gracilia, apparet, & tendines posteriores in collo distendun-
tur, & velut in tetano distenti esse videntur, & vox abrupta est, & spiritus par-
vus est, & retractio spiritus densa, ac violenta accedit. Talibus arteria ulceratur,
& pulmo ardet, quum non possint extrinsecum spiritum inducere. Est si hæc af-
fectio non ultronea ad externas colli partes deferatur, gravior, ac inevitabilior est,
& propter tempus, & quod a calidis, & acris sit humoribus. * Si febris cor-
ripit, veteri fletore non subeunte, aut a cibo recens accepto, five cum dolore
lateris, five absque eo, quietem agere oportet, donec elibi descenderint prius ad in-
fernam alvum; poti vero utri aceto mulso. Quum autem ad lumbos gravitas de-
venerit, misulo per clysterem eluere, aut medicamento purgare oportet. Ubi ve-
ro purgatus fuerit, vitium præscribere ex sorbitione primum, & aquæ mulsæ
potu. Deinde ex cibis, ac piscibus coctis, & vino aquoso, modico, ad noctem. In-
terdum autem ex aqua mulsæ aquosa. Quum vero status gravescentes prodierint,
glandula subdititia, aut infuso per clysterem utendum erit. Sin minus, in aceti mul-
si potu cohibere oportet, donec ad infernam alvum descenderint cibi, deinde sic
per infusum clysteris subducere. * At si mollem, ac vacuum ventrem habent
febris ardens accedat, si tibi commodum esse vitum fuerit medicamentis purga-
re, intra tres dies id ne feceris, sed quarto. Postquam vero medicamentum exhi-
bueris, sorbitionibus utere, observans febrium exacerbationes, ut nunquam ex-
hibeas, quum sunt, aut futura expectantur, sed ubi desinunt, aut quiescunt, & quam
longissime a principio. Quum vero frigidi sunt pedes, neque potum, neque sorbi-
tionem, neque aliud quicquam ejusmodi dato, venam maximam hoc esse ducto.

- ut expectes, donec valde fuerint calefacti. Deinde sic id, quod conducit, exhibe. Plerumque enim futura exacerbationis febris signum est pedum frigiditas. Si vero in tali tempore exhibueris, maxime per omnia peccaveris. Morbum enim non parum augebis. Quum autem febris desinit, vice versa pedes reliquo corpore calidiores hñnt. Augetur enim frigefaciens pedes, accensa ex thorace, ad caput flammam remittens. Universo autem calore acervarum sursum concurrente, & ad caput exhalante, merito pedes frigidi fiunt, ut qui ex carnes, & nervos natura existant. Insuper autem etiam quum longe a calidissimis locis abint, perfrigerantur, calore ad thoracem coacervato. Et rursus juxta proportionem, quum febris solvitur, & in tennes partes dirimitur, ad pedes calor descendit. Hoc igitur tempore, & caput, & thorax ipsorum perfrigeratur, qua de causa sortitio exhibenda est. Nam ubi pedes frigidi fuerint, necesse est ventriculum calidum esse, & multo fastidio plenum, & præcordium intentum, & corporis iactationem propter internam turbationem, & mentis abalienationem, & dolores; & 115 æger distrahitur, ac vomere cupit, & si praya vomuerit, dolet. Postquam vero calor ad pedes descendit, & urina progressa est, etiam si non sudarit, omnia desinunt. Hoc igitur tempore sortitionem dare oportet, alioqui perniciosa est. * Quibus vero perpetuo alvus in febris liquida est, his præcipue pedes calefaciens, & ceratis integens, & fasciis obvolvens, animam adverte, ut ne sint 120 reliquo corpore frigidiores. Si vero calidi sunt, calefactorum nullum adhibe, sed conserva, ut ne perfrigerentur; potu autem utendum est quam paucissimum, aqua frigida, aut aqua multa. Quibus autem in febris alvus liquida est, & mens perturbata, & multi ex talibus stercos auferunt, & nares scalpint, & paulatim quidem respondeant, si interrogentur, ipsi vero a se ipsis nihil apertum dicunt, talia atrabiliaria esse mihi videntur. Talibus igitur ita se habentibus, si alvus liquida fuerit, ac colliguerit, videtur mihi locutiones frigidiores, ac crassiores exhibere oportere, & portiones alviu fistentes, & vinosiores magis quam adstringentes. * At quibus in febris verrigines ab initio, & capitis pulsus fiunt, & urinae tenues, in his expectare oportet, ut ad indicationes febris exacerbetur. 130 Nec vero admitratur, si delirarent, Quibus in principio urinae nebulosæ, aut etiam crassæ sunt, tales depurgare oportet, si etiam alia contulerint. Quibus vero in principio urinae tenues, tales ne purgato, sed si visum fuerit, insulam per clysterem adhibeto. Hos sic curare conducit. Æger corpore quietem agat, ungarurque, ac æqualiter contegatur. Potu utatur aqua multa aquosa, & sortitione succi pitheæ ad vesperam. Alvum vero ab initio per clysteris insulam subducito. Medicamenta autem his ne exhibeto. Si enim quid circa ventrem commoveris, utina non concoquitur, sed absque sudore, ac indicatione febris ad multum tempus durabit. Sortitiones autem, ubi prope indicationem fuerit, ne datus, si turbetur, verum quum remiserit turbatio, & ad melius procedat. * Observare vero etiam 140 omnium febrium indicationes oportet, & in hoc tempore sortitiones detrahere. Solent autem longæ fieri hæc febres, & impervolos humorum de loco ad locum illapsus habere, si quidem internæ partes frigida fuerint, circa aures, & collum, Si vero non fuerint frigida, alias mutationes habent. Fluit autem sanguis ex naribus, & alvi his exuriantur. Quibuscumque vero febres anxiosæ sunt, & quæ præcordia intendunt, & decumbentes in eodem loco decubim non sistent, & 145 extremitates partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia, ac custodia opus habent. Degant autem hi, ut nihil ipsis exhibeas aliud, quam acetum multum aquosum. Sortitionem vero ne exhibe, donec febris desierit, & urina concocta fuerit. Decumbere autem debet æger in domo obscura, & in stratis quam molissimis reclinatus esse, ita ut multo tempore decubim in eodem loco toleret, & quamminum se jactet. Hoc enim talibus maxime prodest. Super præcordium vero lini semen luteo illitum imponito, observando, ut ne horrescat æger, dum apponitur. Sit autem summe tepidum, aqua, & oleo coctum. * Conjectare vero ex urinis oportet id, quod futurum est. Si enim crassiores, ac pallidiores fuerint, meliores sunt. Si vero tenuiores, ac nigriores, deteriores. Si autem mutationes habent, temporis diuturnitatem significant, & necesse est, ut morbus & ad deterius, & ad melius inæqualitatem permueat. Cæterum inconstantes febres finire oportet, donec confluerint. Quum vero confluerint, & victu, & curatione convenienti occurrere, speculatione secundum naturam facta. Sunt autem aspectus agrotorum multi. Quare animadvertendum est medico, ut ne aliqua manifesta causa ipsum lateat neque ex his, quæ ratiocinatione cognoscuntur, nequo ex his, quæ ad numerum parum, aut imparem apparere oportet. Maxime igitur numerum imparem vereri oportet. Nam hi dies in alterutram partem agrotos inclinare faciunt. Primum itaque diem observare oportet, quomodo debilis esse accipiet, 165 cognito principio ex quo, & quando. Præcipuum enim hoc est, ut sciatur. * Quum vero agrum interrogaveris, etiam hæc omnia considerabis. Primum quidem quomodo caput habet, an doloris exors sit, nec gravitatem in se ipso habeat. Deinde præcordia, & latera an doloris exortia sunt. Si enim præcordium dolorosum fuerit, aut elevatum, aut obliquitatem aliquam habuerit, aut latera dolorosum fuerit,

fuerit, & una cum dolore tussicula, aut tormen, aut ventris dolor. Quum horum
 quid affuerit in præcordio, alvum maxime infusus per clysterem solvere oportet.
 Biber autem aquam nullam calidam coctam. Considerandum vero est, ad dum
 exurgit, animi deliquium incidat, an bona spiritus tolerantia ipsum habeat, & inspi-
 cienda alvi egestio, num vehementer nigro colore prodierit, aut purg, quales
 sani hominis sunt egestiones, & an febris ad tertium diem exacerbetur. Ubi vero
 valde probe tales consideraveris in his morbis tertia die, ad hæc jam etiam alia
 contemplare, & si quarta simile quid tertie habuerit esse iisdem illis, æger in pe-
 riculo versatur. * Ex signis autem nigra alvi egestio mortem significat. Quæ vero sani
 hominis egestioni similis est, si per omnes dies apparuerit, salutare signum est.
 At si glande subdita non obdierit, & spiritus bona tolerantia affuerit, si ubi ad se-
 dem exfurrexit, aut isthic in lecto animi deliquium incidit; hæc ubi ægroto,
 aut ægroto ab initio affuerint, delirium futurum expecta. Intentus autem his quo-
 que ad manus. Si enim tremula fuerint, tali sanguinis de naribus destillationem futu-
 ram expecta. Inspicere vero ipsas nases oportet, an spiritus aequaliter per utraque
 feratur, & si nullus feratur e naribus, convulsio fieri solet. Si vero convulsio fiat,
 tali mors expectanda est: & bene habet, si quis hoc prædicat. Si vero in fe-
 bre hyberna lingua aspera fiat, & animi deliquia adsint, tali remissione febris con-
 tingere solet; atramentum fame talem macerare oportet, & aquæ, & aquæ mulæ po-
 tu, ac pisanæ succo conservare, ita ut fidem ne habeas febrium remissioni. Nam
 qui talia signa habent, de vita periclitantur. Ubi vero hæc cognoveris, ac pro-
 be contemplaris fueris, ita fore prædicere potes, si placuerit. * Quum vero in
 febribus horrendum quid acciderit quinta die, aut alvus derepente liquida deje-
 cerit, & animi deliquium incidat, aut vocis privatio contingat, aut convulsio, aut
 singultus fiat; ex his anxiosus fieri æger solet, & sudores sub naso, & circa fron-
 tem, ac cervicem a posteriore capitis parte oboriri. Qui vero hæc patiuntur, spiri-
 tuosi facti non longe postea moriuntur. Quibus autem in febribus crura sunt
 tuberculosa, atque hæc tubercula moram trahentia non maturantur, febribus per-
 severantibus, & strangulatio acciderit in faucibus, ita ut partes circa fauces gra-
 viles existant, & tubercula non matura facta, sed extincta fuerint, talibus sangui-
 s e naribus fluere solet. Et si quidem multus fluxerit, solutionem morbi significat.
 Sin minus, morbum longum. Quanto autem minus fluxerit, tanto deterius est, &
 longitudo major. Si vero reliqua facillima fiant, tali dolores ad pedes expectare
 oportet. Si autem contigerint pedem, & dolorosus esse perseveret æger, & calore
 affligatur, ac non solvatur, paulatim & ad cervicem dolores pervenient, & ad cla-
 viculam, & humerum, & pectus, & auriculum. Nam & hunc tuberculosum fieri
 oportebit. His autem extinctis, si manus contrahantur, aut tremula fiant, convul-
 sio talem corripit, & delirium. Sed & pustule in supercilio oriuntur, & rubores ha-
 bet, & palpebra altera ad alteram progeminat, & inflammatio dura detinet, & o-
 culus vehementer intumescit, & delirium valde augebit. * Noctes autem plusquam
 dies delirii significationem præbent. Multa vero signa ad imparem numerum magis
 sunt, quam ad parem. Utro autem horum numerorum fiat, lethalia existunt. Tales
 vero si quidem ab initio medicamentis purgare volueris, ante quantum diem id facito,
 si venter murmurat. Sin minus, impurgatos sinito. Si vero murmurat, & alvi
 egestiones biliosæ fuerint, scammonio dato moderate purgato. In reliquo vero
 victu potus, ac surbariones parcissime exhibeto, quo melius æger habeat, si non
 remissione facta decimum quartum diem transgressus fuerit. Quum febrici-
 tanti decima quarta die vocis interceptio accesserit, non cito solutio contingere so-
 let, neque liberatio a morbo fieri, sed temporis diuturnitatem tali significat. Quum
 itaque apparuerit in hac die, longus protrahetur morbus. Quum febricenti qua-
 rta die lingua conturbata loquitur, & alvus biliosa liquida egerit, talis deliria
 fore solet. Sed observare, ac assequi eventus oportet. * Æstivo, ac autumnali tem-
 pore in morbis acutis, sanguinis destillatio repentina firmitatem, ac multam in-
 flammationem circa venas significat, & in posterum diem tenuium urinarum appa-
 ritiones, & si ætate vigerit, et corpus in exercitio, aut bene carnosum habue-
 rit, aut atrobiliarius fuerit, aut ex potu minus tremulas habuerit, bene habet, ut
 delirium, aut convulsionem prædicat. Et si quidem in diebus paribus accedat,
 melius est. In iudicatione vero perniciosum, si non nullus acervatum concita-
 tus sanguis, redundantia exitus faciat per nases, aut per sedem, aut abscissus
 aut præcordiorum dolores, aut ad testes, aut ad crura dolores indicat. His autem
 concoctis, exitus sunt spurorum, crassarum urinarum, levium, albarum. Febri sin-
 gultuosa, siphis succum, acetum nullum, dactylum eritum bibenda dato, et galbanum
 in molle, et cumino in eclegmate delingendum, et pisanæ succum post hæc for-
 bendum. Talis autem effigere non potest, si non sudores judicatorij, et somniqui-
 les accesserint, et urine crassæ, et acres decurrerint, aut ad abscissum morbum
 decubuerit. Nux pinæ, et myrrha in eclegmate dentur. Bibendum autem talibus
 acetum nullum quatinus dato. Si vero valde sitiginosi fuerint, aquam hor-
 deaceam. * Peripneumonicas, ac pleuriticæ affectiones sic considerare oportet,
 et acuta sit febris, et dolores lateris alterius, aut utriusque, et dum spiritus sur-
 sum fer-

- sum fertur; an doleat, & an tussis adfint, & sputa prodeant fulva, aut livida, aut
 340 etiam tenuia, & spumosa, & florida, & si quid aliud diversum habeat ab his, quæ
 illis fieri solent. Hunc sic degere oportet. Si quidem dolor sursum tendat ad cla-
 viculam, aut circa mammam, & brachium, venam in brachio fecare oportet internam,
 utra tandem fuerit parte, in ea ipsa; deahere vero sanguinem iuxta corporis ha-
 bitum, & tempus, & ætatem, & colorem, plus, & confidenter, & si acutus fuerit do-
 345 lor, ducere usque ad animi deliquium. Postea vero insusum per clysterem adhi-
 bere. Si vero sub thorace fuerit dolor, & valde distendat, pleuritico medicamento
 alvum subpurgato, & iterum dum purgatur, nihil dato. Post purgationem vero
 acetum mulsim. Medicamentum autem purgans exhibeto quarta die. Verum per tres
 ab initio insusum per clysterem adhibeto; & si hinc non allevetur, sic subpurgato.
 350 Custodia autem fiat usque ad febris quietem, ac septimum diem. Deinde si in tuto esse
 videatur, succum modicum, ac tenuem primum melle ammixto exhibeto. Si vero sa-
 cile educat sputum, & bene spiret, ac doloris exors sit circa latera, etiam paulo cras-
 siorem, ac ampliorem, & his in die dabis. Si vero non facile liberetur, potionem pau-
 ciorem, & modicam sorbitionem, succum tenuem, eumque semel, & in quo tempore
 355 melius degit, exhibeto. Cognosces autem hoc ex urinis. Sorbitionem enim exhibe-
 re in his morbis non prius oportet, quam urinas concoctas, aut sputa maturna sa-
 cta esse videris. Si vero is, qui medicamentum accepit, frequenter, & multum pur-
 gatus fuerit, necesse est dare, verum pauciorum, ac tenuiorum. Non enim poterit dor-
 mire præ vasorum vacatione, neque similiter coquere, neque iudicationes sustinere,
 360 ac expectare. At ubi crudorum colliquationes factæ fuerint, & ea, quæ remittuntur,
 abiecerit, nihil obstat. * Matura vero sunt sputa quidem, quum similia fuerint pu-
 ri. Urinæ autem subsidentias habentes subrubras, velut est erym. Nihil autem pro-
 hibet, & ad alios laterum dolores tepeschoria apponere, & cerata. Inaugere autem
 crura, ac lumbos oleo calido, & pinguedinem illinere; præcordia vero ex lini semi-
 365 nere integere usque ad mammam. At ubi in vigore est peripneumonia, auxilium non
 admittit, si non expurgetur, & malum est, si æger difficulter spiraverit, & urinæ te-
 nues, & acres, & sudores circa collum, ac caput fiant. Tales enim sudores pravi
 sunt, præ suffocatione, & impetu, ac violentia superantibus morbis, si non urinæ
 multæ, ac crassæ prodierint, & sputa matura exierint. Utrum autem horum sua spon-
 370 te venerit, morbum solvit. Ad peripneumoniam medicamentum, quod desingitur.
 Nux pinea, & galbanum, in melle Attico. Abroborum in aceto mullo. Piper, ve-
 ratrum nigrum servescit, & pleuritico in principis, dum color vexat, bibenda da-
 to. Bonum est, & panacem in aceto mulso servescere, & excolare, ac bibendum
 dare cum hepaticis, tum in doloribus septi transversi. Et quæcumque ad ventrem,
 375 aut ad mictionem impellere oportet, hæc in vino, & melle dabis, illa ad ventrem,
 cum aqua multa aquosa copiosiore bibenda dato. * Dysenteria sedata abscessum, 54
 aut tumorem aliquem faciet, si non ad febres, aut sudores, & urinæ crassas, et al-
 bas, ac valde perspicuas, aut ad tertianas, aut ad varices, aut ad testem, aut ad cru-
 ra, aut ad coxam dolor decubuerit. In febre biliosa aut septimum diem cum
 380 rigore morbus regius accedens solvit febrem. Verum si cum rigore sit accedat ex-
 tra temporis occasiones, perniciosus est. * Tetanus lumborum in anteriorem, 55
 ac posteriorem partem distentio, et in atrabiliaris, ubi spirituum per venas in-
 tercepciones fuerint, venæ sectione solvuntur. Quum autem a tendinibus vehem-
 enter in anteriorem partem revelluntur, et circa collum, ac faciem sudores fiunt,
 385 dum præ dolore moriuntur, ac resiccantur tendines usque ad sacri ossis finem ex-
 pectati, qui crassiores spinam continent, qua parte maxima ligamenta extorta,
 deorsum ad pedes usque desinunt. Tali si non febris, et somnus accesserint, et sequen-
 tes urinæ concoctionem habentes prodierint, et sudores iudicatorii, vinum creti-
 cum vinofum bibendum dato, et farinam coctam edendam. Et cerato ungito, et
 390 illinito, et integro crura usque ad pedes, ubi calida aqua prius in scapha perfudi-
 sti, brachia quoque ad digitos usque integato, et lumbos, ac spinam a collo usque ad co-
 xas, pinguedine incerata molli pelli illita circumdato, ita ut etiam anteriores partes
 complectantur, et interposito tempore, per utriculos calida aqua infusa foveret, et
 circumcincto linteo ipsum reclinato. Alvum vero ne valde solvas, nisi glandula subdi-
 395 ticia, si multum tempus fuerit, quo absque egestionem permansit, et si quidem in me-
 lius res tibi processerit, satis est, sin minus, mei radicem in vino odorato tritam,
 et daucum bibenda dato, mane ubi jejunos est ante calidæ perfusionem, et post
 hæc brevi farinam coctam, tepidam, plurimam edat, et vinum ubi voluerit, bene tem-
 peratum insuper bibat, et si quidem in melius res tibi processerit, satis est, sin mi-
 300 nus, prædicere oportet. * Morbi porro omnes solvuntur aut per os, aut per 56
 alvum, aut per vesicam, aut alium aliquem ejusmodi articulum. Verum sudoris species om-
 nibus communis est. Verarum dare his oportet, quibus a capite fluxio fertur.
 Quicumque vero ex abscessibus, aut venæ ruptura, aut propter interperantiam,
 aut ob aliam quamdam sortem causam suppurati sunt, talibus verarum ne dato.
 305 Nihil enim profuerit, et quid perpetuet æger, verarum in causa esse videbi-
 tur. Si vero corpus dissolvatur, aut dolor in capite sit, aut aures obstruatæ sint,
 aut nares, aut sputatio, aut genutum gravitas sit, aut corporis humida moles præ-
 ter con-

- ter consuetudinem, dato quicquid tandem horum contigerit, si non ex potibus, neque ex rebus venereis, neque ex tristitia, neque excuris, neque vigilis hæsiant, & si quidem horum quid in causa fuerit, ad hoc ipsum curationem instituto. * Do-
lores ex itinere, laterum, dorsi, lumborum, coxarum, & quicumque respirantes dolent, 310
causam manifestam habentes. Sæpe enim ex crapulis, & cibis flatuosis dolores
procedere solent & ad lumbos, & ad coxam. Quibus vero ipsorum talia fuerint,
urinae difficultas ipsis accedit. Horum autem causa iter est, & gravedinum, ac rau-
cedinum. Quæcumque ex vitiis ratione contingunt; pleraque unusquisque, prout
315
præter consuetudinem victu usus fuerit, maxime annotat. Nam qui non soliti sunt
prandere, si pransi fuerint, mulsus ventris tumor ipsis accedit, & dormitatio, ac
repletio. Si vero insuper comaverint, alvus exurbatur. His, ubi balneo usi sunt,
dormire conducit. Ubi vero dormiverunt, deambulare lenta, ac multa circumto-
ne, & si quidem alvus evacuata fuerit, cœnare, & bibere vinum paucum, meracius.
320
Si vero evacuata non fuerit, corpus oleo calido illinere, & si sitierit, vinum aquo-
sum album, aut dulce bibere, ac quiescere. Si vero non obdormierit, amplius qui-
escere. Reliquis vitiis similiter ut his, qui crapula gravantur, consueatur. * Quod
325
vero ad potus attinet, qui quidem aquosi sunt, tardioris transitus sunt, & inris ob-
volvunt, & circa præcordia redeunt, & ad mictionem non decurrunt. Tali vero
potui repletus, nullum opus celeriter perficere poterit ex his, quæ intento corpore
per violentiam, aut celeritatem perfici solent. Quiescat autem quammaxime, donec
una cum cibis concoctus fuerit. Quicumque vero potus meracioris sunt, aut austeriores, pal-
pitationem in corpore, & pulsationem in capite inducunt. His commodum est, ut in-
super dormiant, & calidum quid forbeant, ad quod maxime æneunde affecti sunt. At
330
vero penium ad capitis dolorem, ac crapulam malum est. Cæterum qui semel
in die cibum capiunt, hi & impotentes sunt, & calidam urinam mingunt præter con-
suetudinem, vala vacua habentes; sit autem & os salum, ac amarum, & in omni po-
te tremunt, & reimpota ipsis distenduntur, & cœnam concoquere non possunt, velut
si pransi essent. Hos autem minus bibere oportet, quam soliti fuerint, & mazam liquidi-
orem pro pane sumere, & exoleribus rumicem, aut malvam, aut pessum, aut betas.
335
Bibere vero vinum inter cibum moderatum, & aquosius, & a cœna modice deambu-
lare, donec urina descendat, ac minxerint. Utantur autem & piscibus coctis. * Edu-
lia porro maxime de se significationem præbent. Allium flatum, & calorem circa
thoracem facit, & capitis gravitatem, & anxietatem, & si quis alius dolor antea fie-
ri consuevit, cum exacerbaverit. Urinam autem ciet, & hoc bonum habet. Optimum
vero est, ut quis ipsum edat, si aut ebrius est, aut ad porationem ire velit. Ca-
seus flatum, & adstrictionem, & ciborum accensionem facit, quum crudum, & incocti-
le sit edulum. Pessimum autem est repletos ipsum inter potum edere. Legumina omnia fla-
tuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta, & macerata, & viridia. His autem utendum
non est, nisi cum cibis. Unumquodque vero ex ipsis sua peculiaria vicia habet. Cicer
345
flatum, tum crudum, tum frictum, & dolorem inducit. Lens adstringit, & turbatio-
nem inducit, si cum cortice sumatur. Lupinus minime inter hæc mala habet.
Silphii caulis, & succus, quibudam quidem maxime, inexpertis autem non transiit
per ventrem. Verum vocatur hoc malum cholera sicca. Fit autem maxime, ubi cum mul-
350
to caseo mixtus fuerit, aut cum carnis bubulæ esu. * Nam & atrabiliaria affectiones a
bubularum carnis esu exacerbantur. Est enim insuperabilis ipsarum natura, & non cu-
jusvis ventriculi est ipsis concoquere. Optime tamen ipsas concoxerint, ac summo-
verint, qui percoctis, & quamvetsissimis utantur. At caprinae carnes quæcumque in
bubulis insunt mala, omnia habent, itemque a concoctione alienitatem, & flatuosio-
res sunt, ac ructus ampliores faciunt, & choleram generant. Sunt autem odoratissimæ, so-
355
lidæ, ac jucundissimæ, optimæ, & percoctæ, & frigide. Verum injucundissimæ, & gra-
veolentes, ac duræ, pessimæ; imo etiam recentes. Optimæ vero sunt æstatis tempore,
pessimæ autumnop. Porcina vero carnes pravae sunt, quum fuerint crudiores, aut
annuistæ. Magis autem choleram generant, & turbationem faciunt. Suillæ autem opti-
mæ sunt omnium carnisum. Sed præstant etiam ex his, quæ non vehementer pingues
sunt, neque tenues, neque veteris victimæ ætatem habent. Edere vero ipsas oportet
360
absque pelle, & subfrigidas. * In cholera sicca venter inflatus est, & streptus insunt,
& dolor laterum, ac lumborum. Secedit autem nihil deorsum, sed alvus adstricta est. Ta-
lentia adservato, ut ne vomat, sed alvus subeat. Infusum itaque calidum, ac pinguis-
simum m quamvis sine per clysterem immixto, et oleo illitum in aquam plurimam calidam
demitto, in solum reclinans, et calidam paulatim infundens. Et si calefcenti ipsi alvus sub-
365
ierit, morbus solutus est. Dormire quoque tali conducit, et bibere vinum tenue, et ve-
tus, ac meracius. Et oleum dato, ut et quiescat, et alvus subeat, et solvatur mor-
bus. A cibus vero, et aliis abstinere. Si vero non remiserit dolor, asinum lac bi-
bendum dato, donec purgatus fuerit. At si liquida fuerit alvus, et bilis subeat, et tor-
370
mina sint, et vomitus, ac suffocationes, his optimum fuerit quiescere. Bibere vero
aquam mulsam, et non vomere. * Hydropum duæ naturæ sunt, quorum alet sub
carne si fieri aggreditur, inevitabilis est. Qui vero cum inflationibus sit, multa bo-
na fortuna opus habet, maxime autem ærumnis, et fomentis, ac temperantia. Edat
375
autem sicca, et æria. Sic enim vel maxime urinam eiecit, et plurimum viribus polleat.
rit. Si

- rit. Si vero difficile spiraverit, et tempus vetum fuerit, et simul atas viguerit, et virium robur adsit, de brachio sanguinem detrahare oportet. Deinde panes calidos ex vino nigro, et oleo tinctos edat, et quaminimum bibens, quamplurimum laboret, et carnes suillas carnosas edat cum aceto coctas, ut adversus acclives deambulationes veniri possit. Quicumque infernum ventrem calidum habent, et alvi egestionem acres, et inaequales ipsis prodeunt prae colliquatione his, si quidem potentes fuerint, veratro albo revellere oportet; sin minus, succus tritici hori crassus, frigidus dandus est, et lenticiulae fressae decoctum, et panes subcineritii, et pisces febricenti quidem cocti, non vero febricenti afflati, et vinum nigrum non febricitanti sin minus, aquam a mespilis, aut myrti baccis, aut malis, aut forbis, aut palmulis, aut vitium cenanthe. * Si vero febris non habeat, et tormina adsint, lae asinum calidum modicum primum, deinde sensim siente progressu amplius, et lini semen, et triticam polentam, et fabas Aegyptias, excepto eo, quod in ipsis amarum est, molita, ac trita haec inspergens bibat, aut ova semiconcreta allata edat, et similitudinem, et milium, et alicam coctam in lacte; haec cocta frigida edat, et quae his similia existunt, tum pocula, tum edulia in cibo assumat. Maximi momenti circa victus rationem est observare, ac cavere tum in acutis, tum in longis morbis et intentiones februm, et remissiones, quo temporum occasiones scias, quando cibos exhibere non oportet, et quando tuto exhiberi possunt. Insuperque quando plurimum ab intentione absumt. * Nolle porro oportet eos, quibus caput dolet ab excitationibus, aut curibus, aut profusionibus, aut venationibus, aut ex alio quopiam intempestivo labore, aut ex re venerea decolores item, raucosos, splenicos, exangues, spirituosos, et siccam tussim habentes, ac siticulosos, et flatuosos, et venarum interceptiones, et eos, qui intenta habent praecordia, et latera, et dorsum, et torpescitos, et obscure videntes, et quibus aurium sonitus incidit, et qui urinariam fistulam urinam non continentem habent, et morbo regi laborantes, et quorum alvici cruda eiciunt, et quibus ex naribus, aut per sedem sanguis vehementer erumpit, et qui tubercula habent, et quibus vehemens dolor incurrit, et non superaverint, ex talibus nullum medicamentum purgandum esse. Periculum enim habebis, et nihil opis afferes, et spontaneas liberationes, ac iudicationes tolles. * At si sanguinem alicui detrahare conducit, solidam alvum facere oportet, atque sic detrahare, et fame macerare, ac vinum auferre. Postea victum conveniente, et sementis humidis reliquam curationem perage. Si vero alvus densa, ac adstricta esse videatur, molle insilium per clysterem immitte. Si vero medicamentum dare visum fuerit, per veratrum tuto sursum purga. Deorsum vero nullum talium. Optimum autem est ad mictionem, et ad sudores, et ad deambulationes perducere, et leni frictione uti, ut ne habitum densum efficias. Si vero in lecto decumbat, alii ipsum fricent. Et si quidem in thorace supra septum transversum affectio ipsum infestavit, plurimum resideat, et minime ipsum reclinent, quamdiu vires tolerant, et sedentem multo tempore multo oleo calido defricent. Si vero in inferna alvo sub sepeo transverso dolores habeat, decumbere conducit, et nullo motu moveri tali corpori consert, extra defricionem. Qui vero ex inferna alvo solvantur dolores per urinas, et sudores, si moderate delabuntur, sua sponte solvantur, qui parvi sunt, vehementes autem pravi sume. Tales enim aut pereunt, aut absque aliis morbis sani non sunt. Verum qui huiusmodi sunt, incumbunt, ac firmantur. Potio hydropico. * Cantharidis tres, detracto capite uniuscuiusque, et pedibus, et alis, corpora videlicet ipsarum in tribus aquae cyathis terito. Quam autem is, qui bibit, doluerit, calida aqua perfundatur. Bibat autem prius illius, jejunos, et edat panes calidos ex oleo. Medicamentum sanguinem sistens. Fici succum lana exceptum intus ad venam appone. Aut coagulo intorto nares obturato. Aut chalcitidem digito prius efformatam apprime, et cartilagine extrinsecus utramque comprime, et alvum lacte asinino cocto solve, et caput rade, et perfrigerantia adhibe, si calidum tempus fuerit. Selamoides sursum purgat: potio ejus est drachma dimidia in aceto multo trita. Commiscetur etiam vetatris tertii portio pars, et minus suffocatur. Ad trichiasin, id est pilos pungentes in palpebris nascentes. Immisum in acium foramen habentem filum, in summa superae palpebrae margine deorsum versus perpunctione facta transmittit, et aliud itidem sub hoc inferne trajice, et extrema fila confusae, ac deliga, donec decidant, et si quidem satis habuerit, bene est, sin minus, et quid desecerit, rursus eadem facito. * Sed et haemorrhoidas eodem modo transmittis, filo lanae succiduae crassissimo, ac maximo in acium immisso, ac deligato. Securius enim fit curatio. Deinde compressione facta, medicamento erodente utere, et ne proleat, donec deciderint, et semper unam relinque. Postea vero resectis viribus, veratrum dato. Deinde exerceatur, et exudet, et ante excitationem mane frictio multa fiat. Verum a cursu abstinere, et ebrietate, et ab aeribus, origano excepto. Vomare autem per interpositos dies septem, aut ter in mense. Sic enim quamoptime habuerit corpus. Vinum vero sulvum, asnerum, aquosum, ac modicum bibat. * At vero ad suppuratos scillae frusta rotunda secta in aqua coquito, et ubi valde bene efferverit, diffundito, et alia assida coquito, donec ad contractum percocta, ac mollia apparuerint. Deinde leviter tritis cininum frictum amittisse, et

scilicet

sefamā alba, & amygdalas recentes tritas, & hæc melle excepta delingenda præbe, & postea vinum dulce bibendum. Sorbitiones vero sumat, pepulum, appellatam meconium album, tritum acetabuli parvi mensura, in aqua loturæ farinæ recentis dilutum, ac coctum, melle assufo tepidum absorbens. Atque sic degat per diem. Deinde supputans ea, quæ eveniunt, cenam dato. Fabarum item depuratarum quadrantem, & rubræ farinenta duodecim terito, misceto, coquito, & pingui addito delingenda præbeto. Ad oculos. Spodium lotum probe velut farinæ massam subactum, non liquidum, uvæ immaturæ acetbæ succo humidatam leviter terito, in sole reflecto, & ut ad illitionem commodum sit humidatæ, quinque vero siccinum factum fuerit, leviter trito sicco oculis sublinito, & angulos conspergito. Ad eosdem. Ebe-
ni drachmam, æris usti obolos novem, croci obolos tres. Hæc trita in corticula teri-
to, & vini dulcis heminam Atticam affundito. Deinde ad solem obvelata exponito, & ubi coctæ exaruerint, ipsis utere. Ad dolores oculorum. Chalcidus drachmam, uvæ expressæ ut duæ partes sint reliquæ, myrrham, & crocum terito, & multum ad-
misceto, & ad solem coquito, ac illinito. Sine autem in vase æneo. Earum, quæ ab-
uso stranguantur, cognito. Digitis duobus comprimito, & si senserit, usque stranguatio
est. Sinon, convulso. Ad hydropicos. Peplii, meconii appellari, acetabulum parvum
Atticum rotundum, potius una, squamæ æris spicilla lata tria. Hæc leviter trita, & cum sa-
rina recenti agglutinata, ac in catapotia efformata, deglutienda dato. Purgant aquam
deorsum. Aliud, quod stercorea per alvum expellit. In caricæ succum urthymalli instilla,
in singulas septies. Deinde in novum vas compositas reconde, ac exhibeant eoribus.
Aliud. Peplum, quod & meconium appellatur, aqua assufo terito, ac excolato, & fasti-
nam placentarum torrefactorum ammiscens, & mel coctum affundens, hydropicis edendum
dato, & vinum dulce aquosum, aut aquam mulsam aquosam insuper bibendam. At
meconium, quod primum excrementum a pueris prodit, collectum recondito, ac curato.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE JUDICATIONIBUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Judicationis, quæ cito ad melius tendit, signa. Alvi quando in morbis deservida. Lumbrici ad indicationem exוותes. Urina optima. Urina salsæ, albam subsidentiam habens. Signa magna quid denotent.
- 2 Capitis dolor in febri non lethali. Doloris primis diebus interpretatio. Febrim indicatio. Febris placidissima, lethalissima.
- 3 Signa bona in febribus ardentibus. Asthorus regius in febribus ardentibus.
- 4 Indicationes, & remissiones febrium ardentium. Lipuria. Asthorus regius, febri deserviente. Testione septem circuitibus indicatur. Asthorus regius in febribus intolerabilibus septima, aut nona, aut decima quarta die. Sudores qui febres judicant.
- 5 Urinarum lente concensiones. Ulcrum indicatio. Capitis dolor ante febrem. Præcordiorum molles tumores.
- 6 Urina pura, subsidentia alba, levis, Urina saburra, subsidentia saburra, levis. Podagricorum morborum indicatio. Asthorum lethalium indicatio. Sudores pessimi qui.
- 7 Alvi egressiones varia. Urina pura, salsæ, tenuis. Urinarum in febribus mutationes. Urina ab inguita non similes.

- 8 Sudores frigidi etiam acuta febri, lethales. Asthoris longuindinem significanti signa. Sudor in febre permanente. Sudor multus in senis. Alvi egressiones in idem concedentes. Bilis, æva in egressione subsident. Pena pulsantes sana facie. Manuum palpitatio-nes.
- 9 Signa letalia. Febris continua indicatio. Dissensio æstusum, & reversum. Asthorus regius, & singulus in febribus quanta letalis. Recidiva in quibus. Febris ardentis recidiva.
- 10 Recidivantes morbi. Abscessus ad aures circa indicationem non suppurati. Hemorrhoides in æstebulariis cum phrenitide. Insania solutio. Suppurati ex lingua, & labiorum impotentia. Doloris in locis infernis solutio.
- 11 Cæcorum dolor in febribus ardentibus. Rigor in febre ardenti. Tremores in febribus ardentibus. Aurium sorditas in febri ardenti. Rigor in febribus. Dolores repentini. Febris vehementer &c. Hydropsis solutio. Alvi profluvium a pituita alba. Dolores vehementes in pedibus.
- 12 Alvi diuturnum profluvium solventia. Pueris per aures, et nates fluxio. Capitis repentini dolores. Caput circumcirca dolens. Alvi profluvium lippitibus commodum. Nervorum dissensio a convulsione. Convulsio, febri superveniens.



- E iudicationibus, quæ cito ad melius tendunt, plerumque eadem signa sunt, quæ etiam sanitatis. Sudores enim optimi sunt, & celerissime febrem sedant, qui in iudicatoriis diebus fiunt, & febrem perfecte summovent. Boni quoque sunt, qui per totum corpus fientes, morbum facilius ferre faciunt. Qui vero nihil horum faciunt, incommodi sunt. Densari vero oportet alvi egestionem, morbo ad iudicationem tendente. Sit autem subsilva, & non valde graveolens. Commodum est & lumbricos exire ad iudicationem: Urina autem optima est, quæ habet albidissimam subsidentiam, & levem, ac æqualem per totum tempus, donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim secutum, ac brevem fore morbum. Si sudore oborto morbus deficiat, & urina silva albam subsidentiam habens conspiciatur, his eadem die recidiva febris fiet, atque hæc quinta die eitra periculum iudicatur. His, qui in brevissimo tempore sani evadunt, omnia maxima signa sunt. Nam magis sine dolore degunt, & extra periculum, & noctu dormiunt, & alia signa secuta præ se ferunt. * Quibus in febre non lethali capitis dolor, & alia signa circumstant, in his bilis dominatur. Quibus inieperit dolor primis diebus, & quarta, ac quinta magis premuntur, hi septima a febre liberantur. Febres iudicantur in tisdem numero diebus, ex quibus & superstites evadunt homines, & ex quibus perirent. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis fientes, quarto die desinunt, aut prius. Lethalissimæ vero, & signis horrendissimis fientes, quarto die, aut prius occidunt. Primus igitur ipsarum insultus sic definit. Alter ad septimum deducit. Tertius ad undecimum. Quartus ad decimum quartum. Quintus ad decimum septimum. Sextus ad vigesimum. Atque hæc in acutissimis morbis per quatuor ad viginti appositiones fiunt. Non potest autem quicquam horum integris diebus exacte numerari. Neque enim anni, ac menses totis diebus constant. * In febris ardentibus bona signa apparentia, qualia in sanis scripta sunt, si quidem minora fuerint, ad tertium diem remissionem indicant; crassiora vero in crassum, & crassa autem eadem die. In febris ardentibus, si postieris septimo die morbus regius accedat, iudicium est sudoris. Nam morbus non solet exardere, neque usquam alibi abscessum facere, sed sanus fit. Necesse autem est, ubi calor febris discessit, & humorem in seipsum attraxit, febris contingere iudicationem per urinas prodeuntes, aut etiam alvi egestionem, aut sanguinis ex naribus fluxum, aut mictionem multam, aut per multam humiditatem sudorem, aut vomitum. Mulieri vero etiam per mensem viam. Maxime igitur hæc iudicationem faciunt, & quicquid his propinquum contingit. Facit autem & alias iudicationes, sed minus quam has. Si veto septimo die morbus regius accedat, aut posterius in febre ardente, & difficilis multi spui sceculus tum in ardentibus, tum in alijs febris, si nullo talium signorum fientia dimiserit febris, necesse est tales iudicationes pro illis fieri, aut magnorum tuberculorum abscessum, aut dolores ex abscessu vehementes, aut colliquationes humorum ex calore. * Iudicationes, & remissiones eorum, quæ febrem ardentem significant, longiorum morbum faciunt. Si vero fortia fuerint, mors plerumque sequitur. Reliquæ vero ardentes secure desinunt septimo, aut decimo quarto die. Solet autem & ad lipyriam devenire, & detinet maxime xl dies, & in Epilium transit, & lipyria eadem quoque die corripit, ac dimittit. Fit autem & capitis dolor. Si vero lipyria non dimiserit in xl diebus, sep producta fuerit, & dolor habuerit caput, & deliriet æger, ipsum purgato. Desinente vero febre ardente, si accedat morbus regius, non solet amplius exardere, neque usquam alibi abscessum facere, sed sanus fit. Terciana in septem circumscribus plerumque iudicatur. Quicumque in febris intolerabilibus septima, aut nona, aut decima quarta morbus regius accedit, bonum; si non dextrum præcordium durum fiat. Sin minus, ambiguum. Acuti morbi in quatuordecim diebus plerumque iudicantur. Sudores febricitanti si fiant tertia die, & v. & vii. & ix. & xi. & xiii. & xxi. & xxxi, hi sudores morbos iudicant. Qui vero non sic fiunt, dolores significant. * Concoctiones urinarum paulatim maturescentes, si in iudicatoriis diebus concocta fuerint, morbum solvunt. Exemplum urinarum ulcera facere oportet. Nam ulcera si repurgantur pure albo, celerem curationem indicant, si vero in saniosos humores transmutentur, maligna fiunt. Eodem modo & urinae significant. Si ex dolore tennes fiunt, ex occasione ratiocinari oportet, ex qua morbus accessit, & hanc inspicere ubi sedatur. Nam hac deficiente, alijs signis qualia conveniunt, accedentibus, non putandum est morbo liberationem contingere. Si doluerit caput, & ex hoc febris accedat, & hinc non sedetur, dolore non cessante, febris non iudicatur: & plurima talia iudicationis longæ sunt ad melius, etiam in his, quæ ad sanitatem tendunt. In præcordiis tumores molles, & doloris exortes, & ad contactum cedentes, diuturniores quidem iudicationes faciunt, minus autem horrendas tuberculis his contrariis. Eodem modo habet & de tuberculis in reliquo ventre. * Ex urinis si quidem id, quod midium est, purum fuerit, subsidentiam vero albam, ac levem habuerit, diuturnior fit morbus, & minus, quam optima, secuta est hæc urina. Si veto & urina subrubra fuerit, & subsidentia subrubra, ac levis, diuturniorem quidem hæc morbum, quam prior significat, sed valde salutare. Quicumque podagrici morbi fiunt, hi in quadraginta diebus ab inflammatione liberi sedantur. Sed in his pleraque longæ iudica-

- tionis ad melius sunt. Quæ ad mortem tendunt, in die, ac nocte judicantur, quæ 70
videlicet debilitationis signa sunt, velut epoti medicamenti, exturbationis alvi
& fursum, & deorsum, anxietatis, & aliorum hujusmodi. Si igitur horum signa
in die, ac nocte submoveantur, bene est; sin minus, lethalia esse putanda sunt. Sudores
7 pessimi sunt frigidi, & circa cervicem fientes. Hi enim mortes, & morborum
longitudinem præstant. * Alvi egestiones variae, diuturniores quidem sunt nigri, 75
& alius lethalibus egestionibus, nihilo vero minus perniciosæ. Sunt autem tales, ra-
mentosæ, biliosæ, cruentæ, prælinæ, nigrae, & aliquando simul omnes prodeunt, ali-
quando singulae particulatim. Urina si quandoque pura mixta fuerit, quando-
que subduriat albam, ac levem habens, diuturnæ tales sunt, & minus securæ
quam opima urina. Si vero fulva, ac tenuis fuerit urina multo tempore, periculum 80
est, ne sufficere homo possit, donec concocta fuerit urina, & si alias superstitis futuri
signa fuerint, his abscessum affore expecta ad locos infra septum transversum. In
febris si mutationes habeat urina, diuturnitatem temporis significat, & neces-
se est agrotum mutari & ad deteriora, & ad alteram partem. Si urina ab initio non si-
miles fuerint, sed ex tenuibus crassæ fiant, & penitus tenues, tales ægre judicant, 85
ac inconstantes sunt. * Frigidi sudores cum acuta quidem febre lethales sunt, cum mi-
nore vero longitudinem morbi significant. Et ubi in corpore caliditas, aut frigiditas
hic morbus est, & ubi in toto corpore mutationes repentinæ fiunt, & si corpus
perfrigeretur, aut nris calefiat, aut color alius ex alio transigaretur, morbi lon-
gitudinem significat. Si febricitanti sudor accedat, febre non deficiente, malum; pro- 90
longatur enim morbus, & humiditatem significat. Febricitanti frigidi sudores ac-
cedentes, longam febrem significat. Sudor multus intemperatè fians sano, morbum si-
gnificat, æstare minorem, hyeme majorem. Alvi egestiones, si in idem concedere, ac con-
sistere permiseris, velut ramenta subsident, si pauca, modicus est morbus, si multa,
multus. His infusum per clysterem adhibere conducit. Quibus vero in egestione in-
ferne bilis atra subsidet, si copiosior, major est morbus. Si paucior, minor. Si ve-
næ pulsant, & facies sana fuerit, & præcordia non mollia, sed intumorem elevata,
diuturnus est morbus, & absque convulsione non solvitur, aut multa sanguinis ex
naribus fluxione, aut vehementi dolore. Et palpitaciones in manibus, diuturnæ
febris signum sunt, aut brevis judicationis in deterius, & in his pleraque, quæ ad 100
mortem tendunt. * His, qui brevissimo tempore perituri sunt, maxima signa
ab initio sunt. Nam & difficulter spirant, & nocti non dormiunt, & signa pericu-
losa præ se ferunt. In febre continua si quis quarta die, et septima affligatur,
et undecima non judicatus fuerit, plerumque perit. Quicumque a distentione an-
troscum, ac retrorsum corripantur, in quatuor diebus pereunt. Si vero hos effu-
gerint, sani sunt. In febribus ardentibus si accedat morbus regius, & singu-
lurus quinto die, lethale est. Recidivæ fiunt in his, quibus desinentibus vigilæ
fortes accedunt, aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut dolores uniuscuius-
que membri, et quibus febres sedantur neque signis solutoris fientibus, neque
in judicatoris diebus, et si deficiente febre, et sudore accedente, urinam fulvam min-
xerint, albam subsidentiam habentem, his febres recidivam eadem die expecta. Hæ
urina recidivæ quinto die judicantur extra periculum, et si ex judicatione facta
urinam rubicundam, rubram subsidentiam habentem minxerint, etiam his recidiva fe-
bris sit eadem die, et pauci ex hæc servantur. Quum recidit febris ardens,
plerumque etiam exudat. Et si revertens tot diebus detineat, quot prius, etiam tertio 115
recidivat, si non impari die dimiserit, reversa. * Plerumque si cruda sint urinae, et
alia signa non secundum rationem eveniant, morbus in die judicatoria recidivat.
Quandoque vero etiam revertitur in die judicatoria, his talibus relictis. Absces-
sus circa aurem, quibus circa judicationem fientes non suppurantur, his submotis
recidiva sit juxta recidivarum rationem, similis circuitui: in his spes est ad attricu-
los abscessum fieri, aut urina crassa, qualis est alba in quartanis delassatoris, li-
berat ab abscessu. Quibusdam vero horum etiam sanguinis et naribus eruptiones
fiunt. Hæc autem sanguinis eruptio quartanas non solvit, neque morbos, qui per al-
vi egestiones sanari solent. Attrabilarius cum phrenitide occupatus, si hæ-
morrhoides oboriantur, bonum est. Quicumque infantes sua sponte liberati
ex morbis, his infaniam solvit dolor ad pedes progressus, aut ad pectus, aut tu-
lis vehemens oborta. Si vero horum nihil fiat, infania soluta, oculi privatio conti-
nit. Qui lingua offendunt, et laborum non sunt potentes, si hæc sedata fue-
rint, suppurati sunt. Dolorem in locis inferni sortem solvit aut furiditas, 125
aut sanguis multus et naribus erumpens. * Infania magni morbi ex more fien-
tis solutio. Quibus in febribus ardentibus coxarum dolor, oculorum disten-
tio, aut cæcitas, aut testium tumores, aut mammarum elevatio, febrem ardentem
solvit, aut etiam sanguinis ex naribus fluxio. Ipse febre ardenti si insuper
conripit rigor, exudare solet. A febre ardente occupato, rigore accedente, solu-
tio fit. Quibus in febribus ardentibus tremores oboriuntur, mentis emotio 135
solvit. Quibus in febribus aures obsiderunt, his, non soluta febre, infaniam
neceffe est. Solvit autem sanguis ex naribus erumpens, aut alvus biliosa egerens, aut
dysenteria accedens, aut coxarum, aut genuum dolor. Quibus febribus rigor ac-
cedit,

cedit, febris solvitur. Quibus dolores sunt repente, prae cordium elevatum est
 superne, et si circa spariam costam graves dolores sunt, his solutio fit venae sectio,
 et purgatio deorsum. Non enim corripit febris vehemens locis impotentibus. In
 his, qui ab hydropse detinentur, si aquositas per ventrem ad vesicam, aut ventrem fluat,
 solutio fit. Si a pituita alba occupato, alvi profluvium vehemens accedat,
 solutio fit. Qui ab alvi profluvio multo tempore detinentur una cum tuf-
 145 si, non liberantur, si non dolores vehementes in pedibus inciderint. Si vero
 vult commutatio, ac correctio naturae fieri, postquam non amplius alvus profluit,
 aut inanem omnem egestionem habuerit, status foras prodeuntes accidunt. Nullum
 itaque humorem manifestum habent. Quare ei, qui ita habet, secure exhibere scies
 ea, quae conveniunt, et si volutus accedat, vinum frigidum multum meracum pau-
 150 latim bibendum dato, donec somnus, aut crurum dolor fiat. Solvit autem et febris, aut
 dysenteria. Caput circume circa dolenti, ac aegrotanti, si pus per aures, aut per na-
 res fluxerit, solvit morbum. Quibuscumque sanis repente dolores oboriuntur
 in capite, et statim voce privantur, ac stertunt, hi in septem diebus pereunt, si
 non febris corripuerit. Caput circume circa dolenti, quicumque ex supernis locus
 155 doluerit, cucurbitam affige. Solvit dolor ad coxas, et genua, et anhelatio, quic-
 quid horum factum fuerit. Lippienti ab alvi profluvio corripit, bonum est. A
 convulsione, aut distentione nervorum vexato, febris accedens solvit morbum. Si
 a febre detentum convulsio corripuit, sedatur febris eadem die, aut posttridie,
 aut tertia die.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE DIEBUS JUDICATORIIS.

Argumentum in Librum sequentem.

Obtuse videntur.

- 1 *Artis magna pars est iudicium vestium deitis, quae recte scripta sunt. Addeco quae cognoscenda. Ex morbis vestiri signa. Quae secundum naturam non barrenda. Tempus cum morbo pugnant.*
- 2 *Partes circa faciem graciles, & tenerum tranquillitas. Lingua bifida.*
- 3 *Oculorum alba partes quando denigrentur. Oculorum morbum bilis causa est. Oculorum pupilla unde spargantur, &*

- 4 *Delirantes. Vocis privatio. Causa huius morbi.*
- 5 *Tetani tres species. Tetanus ex vomitu. Cibi, potusque per nares redeuntes. Opisthotoni. Alius tetanus, prioribus minus letalis.*
- 6 *Coxendicam morbum. Causa.*
- 7 *Astutus regius. Eorum effectio.*
- 8 *Peripneumonia.*
- 9 *Et quibus ea potissimum accidat. Dies iudicatorii.*

1 **M**AGNAM artis partem esse arbitror de his, quae recte scripta
 sunt, posse considerationem facere, ac judicare. Qui enim hoc
 novit, & his utitur, non videtur mihi in arte multum falli pos-
 se. Oportet autem exacte perdiscere unamquamque temporum
 constitutionem, et quemque morbum; et qui morbus sit bonus;
 5 et qui periculosus aut in constitutione, aut in morbo; et qui
 morbus longus sit, et letalis; et qui longus, et non pernicio-
 sus ad vitam; et qui acutus, ac letalis; et qui acutus, et superesse sinens. Ex his
 enim ordinem dierum iudicatoriorum considerandi, ac praedicendi facultas da-
 10 tur, et ex his cognoscere datur quibus, et quando, et quomodo victum praescribere
 oportet. Maximum itaque signum in aegrotis, qui victuri sunt, si non
 praeter naturam fuerit febris ardens, et alii morbi eodem modo. Nihil enim horren-
 dum, neque letalis fit in his, quae secundum naturam sunt. Secundum est, si
 non etiam ipsum tempus simul cum morbo impugnet. Plerumque enim homi-
 15 nis natura, universi potestatem non superat. Postea vero si partes circa fa-
 ciem gracilescent, et venae in manibus, et in oculorum angulis, et supercilis
 quietem habeant, quum prius non quievisset; huic, si vox fuerit debiliior, et
 sit levior, et spiritus rariior, ac tenuior, sequenti die remissio morbi contingit.
 Haec igitur considerare oportet ad iudicationes, et an bifida linguae pars ve-
 lut saliva alba obducitur, et an in summa lingua hoc idem factum sit, verum mi-
 nus. Si quidem igitur parva haec fuerint, ad tertium diem remissio fit mor-
 bi. Si vero aliquanto crassior sit saliva, in crassimum. Si vero adhuc crassior, ead-
 20 dem die. Quin et albas oculorum partes in principio morbi denigrari
 necesse est, si invaluerit morbus. Haec igitur si pura fiant, perfectam sanitatem in-
 dicant, leniter quidem, tardius, vehementer autem, citius. Ceterum acuti
 25 morbi sunt a bilis, ubi in hepar influxerit, et ad caput constitit. Haec igitur po-
 titur

titur hepar. Intumescit, & expanditur ad septum transversum præ tumore, & statim ad caput dolor irruit, maxime vero ad tempora. Et æger auribus non acue audit, sæpe etiam oculis non videt, & horror, & febris corripit. Atque hæc quidem ab initio morbi ipsi sunt ex intervallo quandoque vehementer, quandoque minus. Quanto autem morbi tempus magis progressum fecerit, tanto maior fit dolor in corpore, & pupillæ oculorum sparguntur, & obtuse vident, & si digitum ad-moveris ad oculos, non sentit, eo quod non videt. Quod autem non videat, inde cognoveris. Non enim nictat, dum digitus admovetur, & floecos aufert de stragulis, si quidem viderit, pediculos esse putans. * Et quum hepar magis expansum fuerit ad septum transversum delirat, & ob oculos sibi obversari putat repella, & alia omnigena animantia fera, & milites armatos pugnantes, & ipse ad-versus ipsos pugnare sibi videtur, & talia dicit, velut qui videat, & egreditur, & mi-natur, si quis ipsum egredi non permittat. Et ubi surrexerit, crura elevare non po-est, sed cadit. Pedes autem semper sunt frigidi. Et quum dormierit, exiliat a so-mno, & insomnia hærenda videt. Hoc autem cognoscimus, quod ab insomnia exilit, ac perterretur, postquam ad sanam mentem rediit. Exponit eum insomnia hæc, qualiaque & corpore fecit, & lingua loquutus est. Atque hæc quidem sic pati-tur. Quandoque vero etiam voce privatur per totam diem, ac noctem, multum acervatum spiritum respirans. Postquam vero delirare cessavit, statim ad sanam mentem redit. Et si quis ipsum interroget, recte respondet, & intelligit omnia, quæ dicuntur. Deinde rursus paulo post in iisdem afflictionibus jacet. Hic mor-bus accidit maxime in peregrinatione, & si alicubi desertam viam inierit, & ti-mor ipsum ex spectro corripuerit. Corripit etiam aliis modis. * Tetani res.

5 Si quidem ex vulnere tetanus, sive distentio nervorum antrosum, ac retror-sum fiat, æger hæc patitur. Maxillæ congelantur, ac rigent velut lingua, & os ape-rire non potest, & oculi frequenter lachrymantur, ac distrahuntur, & dorsum ri-ger, & enura scotere non potest, neque manus, neque spinam. Quum vero lethali-s fuerit, potus, & cibi, quos prius accepit, per nares quandoque redeunt. At o-pisthotonos, retrorsum fiens distentio, reliqua quidem eadem ægro inducit implu-rium: fit autem, quum in cervice tendines retrorsum ægrotarit. Ægro-
eat autem ab angina, aut ab uva, aut locis circa consillas suppuratis. Aliquando etiam a capite febrilibus accedentibus convulsio succedit. Jam vero etiam a vulneri-bus. Hic trahitur in posteriorem partem, & præ dolore dorsum, ac pecto-ra rigent, & ejulat. Hic convellitur vehementer, ut vix detineatur a præsentib-
us, ne e lecto excidat. Alius tetanus est minus lethalis prioribus. Fit autem ab iisdem, & totum corpus similiter convellitur. Febris ardens prædicta non similiter fit. Urn enim, semel ut necesse sit febricitare. Sitis igitur multa ho-minem tenet, & febris vehemens. Lingua vero rumpitur exasperata, & sicca fit, & color ipsius primum quidem pallidus est, velut solet, progressu vero tempo-
ris nigrescit. Et si quidem in principis nigrescat, citiores iudicationes sunt. Si vero posterius, diuturniores. * Coxendicium morbus ex his maxime causi-s fit in plerisque: si quis datus in sole versetur, & coxendices fuerint calefacti, & humor, qui est in articulis, a calore fuerit resiccatus. Quod autem id, quod resic-catur, condensatur, ac compingitur, hoc magnum signum est. Æger enim artien-
los vertere, ac movere non potest præ dolore articulorum, & eo quod verticula sunt compacta. Dolet autem magis lumbos, & verticula ea, quæ sunt ex obliquo coxatum, & genua. Consistit autem dolor plurimo tempore in inguinibus, sinulque coxendicibus acutus, ac æstuosus, & si quis ipsum erigat, aut transmoveat, eju-lat præ dolore quammaxime potest. Quandoque vero etiam convulsio accedit, & ri-
gor, ac febris. Fit autem a bile, & pituita. Fit etiam a sanguine, & dolores consimi-les ab omnibus morbis, & rigor, & febris aliquando corripit debilis. * Morbus re-gius acutus est, & celeriter occidens. Color rotus malicorii speciem refert, & est ve-hementer cum virore pallidus, quemadmodum lacerti cum virore pallidiores, consi-milis autem est cutis. Et in urina subsidet velut erum fulvum, & febris, & hor-
ror debilis habet. Quandoque etiam stragula habere non sustinet, sed mordetur, ac raditur matutino tempore, ubi nondum cibum accepit internis partibus. Deinde viscera plerumque sugunt. Et si quis erigat ipsum, aut alloquatur, non sustinet. Hic ut plurimum moritur intra quatuordecim dies. Has autem ubi effugerit, sanus fit. * Peripneumonia italia facit. Febris vehemens tenet, & spiritum densum, ac
2 calidum respirat, & anxietas adest, & impotentia, & iactatio, & dolores circa sca-pulas, & claviculas, & mammam, & gravitas in pectoribus, & delirium. Quan-doque vero doloris exors æger est, donec tussire inceperit. Verum hic morbus diu-turnior, ac difficilior illo est. Salivam autem albam, & spumofam primum spuit. Lingua flava est, verum progressu temporis nigrescit. Si quidem igitur in princi-pio nigrescat, citius morbus finitur. Si vero posterius, tardius. Tandem vero etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas, inhaeret. At liberationem a morbo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Hæc autem patitur æger minimum diebus quatuordecim, ad summum una & viginti, & tussit hoc tempore vehemen-ter, & una cum tussi purgat, primum quidem saliva multa, ac spumosa. Septima
Hipp. Opera. B b vero &

vero, & octava die, ubi febris in vigore fuerit, & humida sit peripneumonia, crassior, sin minus, non. Nona vero, & decima, cum virore pallida, ac suberuenta. Duodecima autem usque ad decimam quartam, multa, & purulenta. * Atque hoc in his contingit, quorum naturæ, & corporis affectiones humide sunt, & morbus fortis est. Quorum vero & natura, & morbi constitutio sicca est, in his minus. Cæterum de indicatoriis diebus etiam jam ante a me dictum est. Judicantur autem febres quarta die, septima, undecima, decima quarta, decima septima, vigesima prima. Ex his autem acutis quadam etiam trigesima. Deinde de quadragesima, postea hexagesima. Quum vero hos numeros excesserint, diuturna jam febrim constitutio sit.

HIPPOCRATIS COI

LIBER APHORISMORUM.

Argumentum in Librum sequentem.

1 Nulla Aphorismorum libri argumenta adjecti-

mus, propterea quod hac tractatio vulgo omnibus nota sit, aut certe esse debeat, & illam in Indice copiosissime persequuti sumus.

S E C T I O I.

- ITA brevis, ars longa, tempus præcepis, experimentum periculosum, indicium difficile. Oportet autem non solum se ipsum exhibere, quæ decent facientem, sed etiam agrotum, & præsentis, & quæ externa sunt. II. In perturbationibus alvi, & vomitibus sponte fieribus, si quidem qualia purgari oportet, purgentur, confert, & leniter serunt. Sin minus, vice versa. Sic & vasorum vacuatio, si quidem talis fuit, qualis fieri debet, confert, & bene serunt. Sin minus, vice versa. Inspicere itaque oportet regionem, & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus convenit, aut non.
- III. In exercitantibus boni habitus ad summum progressu periculosi sunt, si in extremo fuerint. Non enim manere possunt in eodem, neque quiescere. Quum vero non quiescant, non amplius in melius angescere possunt. Reliquum est igitur, ut in deterius. Ob has igitur causas bonam habitudinem non tarde solvere confert, quo corpus rursus renutritionis principium sumat. Neque vero collapsiones ad extremum ducere oportet, periculolum enim est. Sed quis natura est eius, qui perferre debet, ad hoc ducere convenit. Similiter autem & evacuationes ad extremum ducentes, periculose sunt, & rursus renutritiones in extremo existentes, periculose sunt. IV. Tenuis, & exacti victus & in longis semper affectionibus, & in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt, & rursus victus ad extremam tenuitatem progressi, difficiles sunt. Et repletiones ad extremum progressæ difficiles sunt. V. In tenui victu delinquentes agrotantes, magis læduntur. Omne enim delictum, quod committi poterit, magis magnum committitur in tenui, quam in paulo plenioris victu. Quapropter etiam in sanis periculosus est valde tenuis, & constitutus, ac exactus victus. Quoniam delicta gravius ferunt. Ob hoc igitur tenuis, & exactus victus periculosus est magis, quam paulo plenior.
- VI. Ad extremos morbos, exacte extremæ curationes, optimæ sunt.
- VII. Ubi igitur peracutus est morbus, statim etiam extremos labores habet, & extreme tenuissimo victu uti necesse est. Ubi non, sed pleniori victu uti licet, intantum subdescendendum est, in quantum morbus extremis mollior fuerit.
- VIII. Quum in vigore fuerit morbus, tunc tenuissimo victu uti necesse est.
- IX. Simul autem conjectare oportet, an æger ex victu durare possit ad morbi vigorem, & utrum ille prius deficiat, & ex victu durare non possit, aut morbus prius deficiat, ac obtrahatur. X. Quibus igitur statim vigor est, his statim tenuis victus exhibendus est. Quibus vero vigor posterius, his ad illud, & paulo ante illud tempus subtrahendus est. Antea vero mitius æger victu tractandus est, quo durare possit. XI. In exacerbationibus subtrahere victum oportet. Nam apponere noxa est. Ex quibus per circuitus exacerbationes sunt, in exacerbationibus subtrahere oportet. XII. Exacerbationes, & constitutiones indicabunt morbi, & tempora anni, & circuituum inter se collata incrementa, sive quotidie, sive alternis diebus, sive per amplius temporis intervallum fiant. Sed & ex apparentibus indicia sunt, velut in pleuritiis si spiritum statim appareat incipiente morbo, ipsum abbreviat; si vero posterius appareat, producit. Et urinae, & alvi ejectiones, & sudores apparentes indicant & ægre, & facile ju-

cile judicandos, & breves, & longos morbos. XIII. Senes facillime lejanum ferunt. Deinde ætate consistentes. Minime dolentes, omnium vero minime pueri, & inter hos ipsos, qui ipsi se ipsis alacri fuerint.

XIV. Qui cresunt, plurimum habent innatum calorem. Plurimo igitur opus habent alimento; sin minus, corpus consumitur. Senibus autem modicus est calor; quapropter paucis fomitibus opus habent; a multis enim exstinguuntur. Ob hanc etiam causam febres senibus non similes acutæ fiunt. Frigidum est enim ipsorum corpus. XV. Ventres hyeme, & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi. Quapropter in his temporibus alimenta plura exhibenda sunt. Nam innatum calorem amplioem tunc habent, alimento igitur ampliore opus habent. Signum sunt ætates, & athletæ.

XVI. Victus humidi omnibus febricitantibus conferunt. Maxime vero pueris, & aliis ita ali aduets. XVII. Et quibus semel, aut bis, & plus, aut minus, & ex parte exhibere oportet, considerandum est. Dandum vero etiam aliquid est temporis, & regionis, & ætati, & consuetudini. XVIII. Æstate, & autumno cibos difficillime ferunt, hyeme facillime, deinde vere.

XIX. His, qui in circuitibus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere, sed auferre de appositionibus ante iudicationes. XX. Quæ judicantur, & iudicata sunt integre, neque movere oportet, neque novare, neque medicamentis, neque aliis irritamentis, sed finire. XXI. Quæ ducere oportet, quo maxime repunt, eo ducere oportet per convenientes locos.

XXII. Coneocta medicamentis aggredi oportet, & movere non cruda, neque in principijs, si non turgant. Plurima vero non turgent.

XXIII. Quæ prodeunt, non multitudine æstimare oportet, sed quamdiu prodeant, qualia oportet, & facile æger ferat. Et ubi opus est, usque ad animi deliquium dicere oportet, & hoc facere, si sufficiat æger. XXIV. In acutis affectionibus raro etiam in principijs medicamentis uti oportet, atque hoc facere, diligenti prius æstimatione facta.

XXV. Si qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferunt. Contraria vero difficulter.

S E C T I O II.

I. IN quo morbo somnus laborem facit, mortale. Si vero somnus proficit, non lethale. II. Ubi somnus delirium sedat, bonum est. III. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum. IV. Non satietas, non fames, neque aliud quicquam bonum est, quod naturæ modum excedat.

V. Lassitudines spontaneæ denunciant morbos. VI. Quicumque aliqua corporis parte dolentes, plerumque dolores non sentiunt, his mens ægrotat.

VII. Quæ multo tempore attenuantur corpora, lente rescire oportet. Quæ vero brevi, brevi. VIII. Si ex morbo cibum capiens quis non fiat validus, significat, quod corpus uberiore alimento utitur; Si vero cibum non accipiente hoc contingat, nosse oportet, quod evacuatione opus habet.

IX. Corpora quocumque quis purgare voluerit, fluida facere oportet.

X. Non pura corpora quanto plus nutries, tanto magis lades. XI. Facilius est repleri potu, quam cibo. XII. Quæ relinquuntur in morbis post iudicationem, recidivam faciunt. XIII. Quibuscumque iudicatio fit, his novæ gravis ante exacerbationem. Quæ vero sequitur, plerumque tolerabilior est.

XIV. In alvi fluxionibus mutationes egestionum profunt, si non ad pravas mutantur. XV. Ubi fauces ægrotant, aut tubercula in corpore nascuntur, excretionem considerare oportet. Si enim biliosa fuerint, corpus simul ægrotat. Si vero similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire. XVI. Ubi fames, non oportet laborare. XVII. Ubi cibis præter naturam copiosior ingressus fuerit, morbum facit. Ostendit autem sanatio. XVIII. Eorum, quæ acervatim, & velociter nutriunt, veloces etiam egestionem fiunt.

XIX. Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones neque mortis, neque sanitaris. XX. Quibus dum juvenes sunt, ventres humidi sunt, his senescentibus resciantur. Quibus vero dum juvenes sunt, ventres siccæ sunt, his senescentibus humectantur. XXI. Famem vini potus solvit. XXII. Quicumque morbi ex repletionem fiunt, evacuatio sanat. Et quicumque ex evacuatione, repletio. Et aliorum contrarietas. XXIII. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. XXIV. Septimæ quarta index est. Alterius hebdomadæ octava principium est. Consideranda vero est undecima. Hæc enim quarta est secundæ hebdomadæ. Consideranda rursus decima septima. Ipsa enim est quarta quidem a decima quarta, septima vero ab undecima. XXV. Æstivæ quartanæ plerumque sunt breves. Autumnales vero longæ, & maxime quæ ad hyemem pertingunt. XXVI. Febrem in convulsione fieri melius est, quam convulsionem in febre. XXVII. His quæ non secundum rationem levant, non oportet credere, neque valde timere ea, quæ prava sunt præter rationem. Plerumque enim ex talibus inconstantia sunt, & non valde permanere, neque morari

- solent. XXVIII. Febreſcitantium non omnino leviter, permanere, & nihil mi-
nui corpus, aut etiam magis quam pro ratione colligari, malum eſt. Illud e-
nim morbi longitudinem, hoc vero debilitatem ſignificat. XXIX. Incipienti-
bus morbis ſi quid movendum videtur, move, vigentibus vero, quietem age-
re melius eſt. XXX. Circa principia, & fines omnia debiliſſima ſunt. Cir-
ca vires vero fortiſſima. XXXI. Ex aſtutudine bene cibum accipienti, ni-
hil augetur corpus, malum eſt. XXXII. Plerumque omnes male habenti-
45 tes, ab initio cibum bene capientes, & nihil augetur corpus, ad finem rursus cibos
faſtidium. At ab initio quidem valde cibum averſantes, poſtea vero bene cibum
capientes, melius liberantur. XXXIII. In omni morbo valere mentem, & be-
ne ſe habere ad ea, quæ exhibentur, bonum, contrarium vero, malum.
- XXXIV. In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, & ætatis, & habi-
tut, & tempori morbus magis aſſinis fuerit, quam hi, quibus non aſſinis in aliquo
50 horum exiſtit. XXXV. In omni morbo partes circa umbilicum, & pectus
nem craſſitudinem habere, melius eſt. At vehemens tenuitas, & eliquatio, præ-
va eſt. Periculofa vero talis eſt etiam ad infernas purgationes. XXXVI. Sana
habentes corpora, dum medicamentis purgantur, cito exolvuntur. Itemque qui præ-
55 vo cibo utuntur. XXXVII. Qui bene habent corpore, eos operoſum eſt me-
dicamentis purgare. XXXVIII. Paulo deterior eſt potus, & cibus, verum ju-
cundior, melioribus quidem, ſed injucundioribus præferendus eſt.
- XXXIX. Senes juvenibus plerumque minus agrotant. Quicumque vero iſtis
ſunt morbi diuturni, ut plurimum commoriuntur. XL. Rauceſcences, & gra-
60 vedines in valde ſenibus non conſequentur. XLI. Qui exolvuntur ſæpe,
& fortiter, abſque maniſeſta cauſa, derepente moriuntur. XLII. Sydera-
tionem fortem quidem ſolvere, impoſſibile eſt; debilem vero, non facile.
- XLIII. Ex his, qui ſtrangulantur, & ſubmerguntur, nondum autem mor-
tui ſunt, non reconvaleſcunt, quibus ſpuma, circa os fuerit. XLIV. Craſ-
65 ſi admodum ſecundum naturam magis cito moriuntur, quam graciles.
- XLV. Juvenibus comitialibus liberationem faciunt mutationes, maxime ætatis,
& regionum, & victum. XLVI. Duobus doloribus ſimili ſentibus, non ſe-
cundum eundem locum, vehementior obſcurat alterum. XLVII. Circa genera-
tionem puris, dolores, & febres magis contingunt, quam factis jam iſtis.
- 70 XLVIII. In corporis motu, quum incorporit dolore, quiete ſtatim laſſi-
tudinem exiit. XLIX. Adſueti conſuetos labores ferre, etiamſi fuerint debi-
les, aut ſenes, non adhiſcit fortibus, ac juvenibus faciliſſime ſerunt. L. Ex mul-
to tempore conſueti, etiamſi deteriora fuerint, inconſuetis minus moleſtare ſo-
lent. Oportet igitur etiam ad inconſuetam tranſmutationem facere.
- 75 LI. Multum, & repente evacuari, aut reple, aut caleſcere, aut frigeſcere,
aut omnino quomodocumque corpus movere periculofum eſt. Et omnis multitudo
naturæ contraria eſt. Quod vero paulatim fit, tutum eſt tum alias, tum ſi ex
altero ad alterum tranſitus fit. LII. Omnia ſecundum rationem facienti, ſi non
ſecundum rationem ſiant, non tranſire oportet ad aliud, manente eo, quod vi-
80 deſt ab initio. LIII. Quicumque ventres humidos habent, dum quidem ju-
venes ſunt, melius degunt, quam hi, qui ſiccōs habent. Verum ad ſenectutem de-
terius degunt. Reficiantur enim plerumque ſenectutibus. LIV. In corporis
magnitudine juventutem quidem degere, liberale eſt, & non indecorum. Sen-
ctutem vero degere, inutile, & deterius parvitate.

S E C T I O I I I.

1. I. Mutationes temporum maxime pariunt morbos, & in temporibus ma-
xime mutationes frigoris, aut caloris, & reliqua juxta rationem hoc mo-
do. II. Naturarum aliz quidem ad æſtatem, aliz vero ad hyemem bene,
aut male ſe habent. III. Morborum alii ad alia tempora bene, aut male ſe
5 habent; & ætates quædam ad tempora, & regiones, & victus. IV. In tem-
poribus, quum eadem die modo calor, modo frigus fit, autumnales morbos ex-
pectare oportet. V. Auſtri auditum gravantes, caliginofi, caput gravantes, tor-
pidi, diſſolventes. Quum hic prævaluerit, talia in morbis pariuntur. Si vero A-
quilo fuerit, tuſſes, ſauces, alvi duræ, urinæ difficultates, horrores, dolores co-
10 ſtarum, pectoris. Quum hic dominatur, talia in morbis expectare oportet.
- VI. Quum æſtas fit veri ſimilis, ſudores in febribus multos expectare opor-
tet. VII. In ſiccitatibus febres acutæ ſunt, & ſi quidem annus amplius ta-
lis fuerit, qualem conſtitutionem fecerit, plerumque tales etiam morbos expecta-
re oportet. VIII. In conſtantibus temporibus, ſi tempeſtive tempeſtiva reddan-
15 tur, morbi conſtantes, & judicatu faciliſſimi ſunt. In inconſtantibus autem,
inconſtantes, & qui difficilius judicantur. IX. In autumno morbi acutiſſimi, &
omnino mortiferi. Ver autem ſaluberrimum, & minime lethale.
- X. Autumnus tabidis malus. XI. De temporibus, ſi quidem hyems ſic-
ca, &

ca, & aëquilonaris fuerit, ver autem pluviosum, & australe, necesse est, æstate febres acutas, & lippitudines, & dysenterias fieri, maxime mulieribus, & viris natura humidioribus. XII. Si vero hyems australis, & pluviosa, ac clemens fiat, ver autem siccum, & aëquilonate, mulieres quidem, quibus partus ad ver inflat, ex omni occasione abortiunt. Quæ vero pariant, impotentes, ac morbosos pueros pariunt, ita ut aut statim pereant, aut tenues, ac morboſi vivant. Aliis autem dysenteriaz, & lippitudines siccæ sunt. Seniores vero defluxiones brevi perimentes. XIII. Si vero æstas sicca fiat, & aëquilonaris, autumnus autem pluviosus, & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tussis, & raucedines, ac gravedines, quibusdam etiam tabes.

XIV. Si vero aëquilonaris, & aquarum exors autumnus fuerit, his quidem, qui humidas naturas habent, & mulieribus commodus erit. Reliquis vero sient lippitudines siccæ, & febres acutæ, & gravedines. Quibusdam vero etiam atræ bilis.

XV. Ex anni vero constitutionibus, in summa siccitate pluviosus salubrior est, & minus lethales. XVI. Morbi in pluviosis quidem plerumque fiunt, febres longæ, & alvi fluxiones, & putredines, & comitiales, & syderationes, & anginæ. In siccitatibus vero tabes, lippitudines, athridides, urinæ stillicidia, & dysenteriaz.

XVII. Quotidianæ vero constitutiones, aëquilonares quidem corpora compingunt, & robusta, & ad motum idonea, & bene colorata, & melius audientia faciunt, & ventres resiccant, & oculos mordent, & si circa thoracem aliquis dolor prius est, magis affligunt. Australes autem corpora dissolvunt, & humectant, & gravem auditum, ac capitis gravitatem, & vertigines faciunt. In oculis autem, & corporibus ægrum motum, & ventres humectant. XVIII. Secundum tempora vere quidem, & prima æstate, pueri, & qui his ætate cohererent, optime degunt, & maxime sani sunt. Æstate vero, & autumno aliquamdiu, senes. Reliquo autumno, & hyeme, mediam ætatem habentes.

XIX. Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt. Quidam tamen magis in quibusdam ipsorum & fiunt, & exacerbantur. XX. Vere infanz, & atræ bilis, & comitiales, & sanguinis fluxiones, & anginæ, & gravedines, & tussis, & lepræ, & impetigines, & vitiligines, & pustulæ ulcerosæ plurimæ, & tubercula, & morbus articularis.

XXI. Æstate vero, & quidam ex his, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, & quartanæ, & vomitus, & alvi profluvia, & lippitudines, & aurium dolores, & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & papulæ sudorosæ.

XXII. Autumno autem & ex æstivis multi, & febres quartanæ, & ætonæ, & splenes, & hydropes, & tabes, & urinæ stillicidia, & intestinorum levitates, & dysenteriaz, & coxendices, et anginæ, et anhelationes, et volvuli, et comitiales, et infanz, et atræ bilis.

XXIII. Hyeme vero pleuritides, peripneumoniz, gravedines, raucedines, tussis, dolores pectorum, laterum, ac lumborum, capitis dolores, vertigines, syderationes.

XXIV. In ætatibus autem talia contingunt. Parvis, ac recens natis pueris fervida oris ulcera, vomitus, tussis, vigiliz, timores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

XXV. Ad dentitionem vero accedentibus gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, et maxime ubi dentes caninos producant, tum crassissimis pueris, tum his, qui diros ventres habent.

XXVI. Senioribus autem sientibus consiliz, verticuli in occipicio inro luxationes, anhelationes, calculorum generationes, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ, tumores glandularum circa aures oblongi, satyriasmæ appellati, strumæ, et alia tubercula, maxime vero prædicta.

XXVII. Adhuc vero senioribus, et ad pubertatem accedentibus pleraque ex his, et febres diuturnæ magis, et ex natibus sanguinis fluxiones.

XXVIII. Plurimæ vero affectiones pueris judicantur partim in quadraginta diebus, partim in septem mensibus, partim in septem annis, partim ad pubertatem accedentibus. Quæ vero permanserint pueris affectiones, et non exolutæ fuerint circa pubertatem, aut semellis circa mensium eruptiones, diuturnæ fieri solent.

XXIX. Juvenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, comitiales, et alii morbi, maxime vern prædicti.

XXX. His vero, qui hanc ætatem exceſſerint, anhelationes, pleuritides, peripneumoniz, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alvi profluvia diuturna, bilis sursum, ac deorsum effusiones, dysenteriaz, intestinorum levitates, hæmorrhoides.

XXXI. Senibus autem spirandi difficultates, & defusiones cum tussi, urinæ stillicidia, urinæ difficultates, articulorum dolores, nephritides, verrigines, syderationes, mali habitus, pruritus totius corporis, vigiliz, alvi, oculorum, & narium humiditates, visus hebetudines, glaucudines, auditus gravitates.

S E C T I O I V.

- 1 **P** Ragnantes medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & usque ad septimum. Minus vero has. Juniores autem, & seniores fortius vereri oportet. II. In medicamentorum usu, talia ex corpore ducere oportet, qualia etiam sponte prodeuntia commoda sunt. Contrario autem modo prodeuntia, sedare. III. Si qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile serunt. Contraria vero difficult. IV. Medicamentis purgare oportet astate quidem, superiores magis; hyeme vero inferiores. V. Sub canem, & ante canem, operosae sunt medicamentorum purgationes. VI. Graeciles, & facile vomentes, sursum purgare oportet, vitantes hyemen. VII. Difficiliter vomentes, & moderate carnosos, deorsum, vitantes astatem.
- 10 VIII. Tabescentes autem, vitantes superiores. IX. Atrabiliarios vero plenius inferiores. Eadem ratione contraria apponens. X. Purgare oportet in valde acutis, si humor turget, eadem die. Morari enim in talibus malum est.
- 15 XI. Quibus tormina, & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque a medicamento, neque alias solvitur, in hydropem sicum firmatur. XII. Quibus alvi intestinorum levitate affecti, eos hyeme sursum purgare malum est.
- XIII. Ad veratrum, his, qui non facile sursum purgantur, ante potionem corpora humectare oportet ampliore cibo, ac quiete. XIV. Ubi biberit quis veratrum, ad motus quidem corporum magis ducere oportet, ad somnos autem, & quietem minus. Declarat autem navigatio, quod motus corpora turbat.
- 20 XV. Ubi volueris magis ducere veratrum, corpus moveto. Ubi vero sistere, somnum facito, & ne moveto. XVI. Veratrum periculosum est sanas carnes habentibus. Convulsionem enim inducit. XVII. Sine febre existenti cibi fastidium, & oris ventriculi morbus, & vertigo, & os amarefcens, medicamento sursum purgante opus habere significat.
- 25 XVIII. Dolores supra septem transversum, qui purgatione opus habent, sursum versus purgatione indigere significant, qui vero infra, deorsum. XIX. Qui in medicamentorum potionibus, dum purgantur, non siccant, non cessant praus, quam fuerint. XX. Non febricitantibus si fiat tormen, & genum gravitas, & lumborum dolor, deorsum medicamento purgante opus habere significat.
- 30 XXI. Egestionibus alvi nigrae, velut sanguis niger, sua sponte prodeunt, & cum febre, & sine febre, pessima sunt, & quanto plures fuerint peiores colores, tanto magis malum est. Cum medicamento vero melius, & quanto plures fuerint colores, non malum est.
- 35 XXII. Quibuscumque, morbis incipientibus, si atra bilis, aut sursum, aut deorsum prodierit, lethale est. XXIII. Quibuscumque ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut alias attenuatis, atra bilis, sive qualis sanguis niger subierit, postridie moriuntur. XXIV. Dysenteria, si ab atra bile inceperit, lethalis est. XXV. Sanguis sursum quidem quascumque fuerit, malus est, deorsum vero bona sunt nigra subeuntia. XXVI. Si a dysenteria occupato, veluti carnes subierint, lethale est. XXVII. Quibus in febribus sanguinis multitudo erumpit undecumque, his in refectionibus alvi humectantur.
- 40 XXVIII. Quibus biliosa sunt egestionibus, sordiditate sente cessant. Et quibus sorditas, biliosis egestionibus sentibus cessat. XXIX. Quibus in febribus sexta die rigores sunt, difficulter judicant. XXX. Quibus exacerbationes sunt, quacumque tandem hora febris dimiserit, si postridie eadem, qua antea bora corripuerit, difficulter judicant. XXXI. Delascati in febribus ad articulos, & circa maxillas maxime, abscessus sunt.
- 45 XXXII. Quibuscumque resurgantibus ex morbis, si quid doluerit, isthic abscessus sunt. XXXIII. Sed & si ante morbum quid doluerit, isthic morbus incumbit.
- 50 XXXIV. Si a febre occupato, tumore non existente in faucibus, suffocatio de repente contingat, lethale est. XXXV. Si a febre occupato, collum repente obversum fuerit, & vix deglutire poterit, tumore non existente, lethale est.
- 55 XXXVI. Sudores febricitanti si inceperint, boni sunt sexta die, & quinta, & septima, & nona, & undecima, & decima quarta, & decima septima, & vigesima prima, & vigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos judicant. Qui vero non sic sunt, dolorem significant, & longitudinem morbi, & recidivas. XXXVII. Frigidi sudores cum acuta quidem febre sententes, mortem significant, cum mitiore vero, morbi longitudinem.
- 60 XXXVIII. Et ubi in corpore sudor est, illic morbum esse declarat. XXXIX. Et ubi in corpore frigiditas, aut caliditas, isthic morbus est. XL. Et ubi in toto corpore mutationes, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio fiat, longitudinem morbi significat. XLI. Sudor multus ex somno, citra manifestam causam sensus, corpus multo alimento uti significat. Si vero eibum non capienti hoc fiat, significat, quod evacuatione opus habet. XLII. Sudor multus frigidus, aut calidus semper fluens; frigidus majorem, calidus minorem morbum significat. XLIII. Febris quacumque non intermitte
- per ser-

per tertiam fortiores fiunt, magis periculose sunt. Quocumque vero modo intermiserint, quod sine periculo sint, significant. XLIV. Quibus febres longæ, his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. XLV. Quibus tubercula ad articulos, aut dolores ex febribus longis fiunt, hi pluribus cibis utuntur. XLVI. Si rigor incidat febre non intermittente, agroto jam debili, lethale est. XLVII. Excretaiones in febribus non intermittentibus, livide, & cruentæ, & graveolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probe fecedentes, bonæ, & per alvi egestiones, & per urinas. Si vero non aliquid ex conducentibus excreatur per hos locos, malum est. XLVIII. In non intermittentibus febribus, si externæ quidem partes frigide fuerint, internæ vero ardeant, ac sitim habeant, lethale est. XLIX. In febre non intermittente, si labium, aut palpebra, aut supercilium, aut oculus, aut nasus distorqueatur, aut non videat, aut non audiat, æger jam debilis existens, quicquid horum fiat, propinqua mors est. L. Ubi in febre non intermittente difficultas spirandi, & delirium fit, lethale est. LI. In febribus abscessus, qui non solvuntur ad primas judicationes, longitudinem morbi significant.

LII. Quicumque in febribus, aut aliis ægritudinibus ex voluntate lachrymantur, nihil absurdum est. Qui vero non ex voluntate, absurdum.

LIII. Quibus circa dentes in febribus viscosa adherent, his fortiores febres fiunt. LIV. Quibus plerumque tussis sicca, parum irritantes, in febribus ardentibus, hi non ita valde firculosi sunt. LV. Ex glandularum tumoribus febres omnes malæ sunt, exceptis diariis. LVI. Febricitanti sudor oboriens, febre non remittente, malum. Moram enim trahit morbus, & multam humiditatem significat. LVII. A convulsione, aut distensione nervorum vexato, febris accedens morbum solvit. LVIII. A febre ardente occupata, rigore accedente, solutio fit. LIX. Tertiaria exacta in septem circuitibus ad summum judicatur. LX. Quibus in febribus aures obstruuntur, his sanguis e naribus effusus, aut alvus exturbata, morbum solvit.

LXI. Febrilem si non in diebus imparibus febris dimiserit, recidivare solet. LXII. Quibus in febribus morbus regius fit ante septimum diem, malum. LXIII. Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur. LXIV. Quibus in febribus morbus regius septima, aut nona, aut decima quarta accedit, bonum; si non præcordium dextrum durum fiat, sin minus, non bonum. LXV. In febribus circa ventrem æstus vehemens, & cordis, sive oris ventriculi morbus, malum. LXVI. In febribus acutis convulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum. LXVII. In febribus, ex somnis timores, aut convulsiones, malum. LXVIII. In febribus spiritus offendens, malum. Convulsionem enim significat.

LXIX. Quibus urina crassæ, grumosæ, pauca, non sine febribus, ubi copia ex his successit, tenuis prodest. Tales autem maxime prodeunt his, quibus ab initio, aut brevi subidentiam habent. LXX. Quibus in febribus urina conturbata, velut jumentæ, his capitis dolores aut adsunt, aut aderunt.

LXXI. Quibus septima die morbi judicantur, his nabeculam habet urina, quarta die rubram, & alia secundum rationem. LXXII. Quibus urina pellucida, alba, malæ. Maxime autem in phreniticis comparent. LXXIII. Quibus præcordia elevata, permutantia, lumborum dolore accedente, his alvi humectantur, si non status erumpant, aut urina copia prodeat. In febribus autem hæc. LXXIV. Quibus spes est abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa, & crassa, & alba prodians, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. Si vero etiam ex naribus sanguis eruperit, brevi admodum solvitur. LXXV. Si quis sanguinem, aut pus mingat, rhenum, aut vesicæ ulcerationem significat. LXXVI. Quibus in urina crassa existente, caruncula parvæ, aut veluti pili simul exeunt, his de rhenibus excernuntur. LXXVII. Quibus in urina crassa existente, surfuracea quadam simul minguntur, his vesica scabie affecta est. LXXVIII. Qui sua sponte sanguinem mingunt, his in rhenibus venæ ruptionem significat.

LXXIX. Quibus in urina arenosa subsident, his vesica calculo laborat.

LXXX. Si quis sanguinem mingat, & grumos, & urina stitidum habeat, & dolor incidat in immum ventrem, & ani, ac scorti intercapedinem, partes circa vesicam affectæ sunt. LXXXI. Si quis sanguinem, & pus mingat, & squamas, & odor gravis sit, vesicæ exulcerationem significat.

LXXXII. Quibus in urinaria fistula tuberculum nascitur, his suppuratione facta, & eruptione, solutio fit. LXXXIII. Mictio noctu multa siens, medicam alvi egestionem, significat.

S E C T I O . V .

- 1 I. **C**onvulsio ex veratro lethalis est. II. Ex vulnere convulsio lethalis est.
 III. Sanguine multo effuso, convulsio; aut singultus accedens, malum.
 IV. Ex superflua purgatione convulsio, aut singultus accedens, malum.
 V. Si quis ebrius derepente voce priveatur, convulsus moritur, si non febris corri-
 5 puerit, aut tibi ad horam, qua crapula solvuntur, pervenit, loquatur.
 VI. Quicumque a distentione antrosum, ac retrosum corripuntur, in qua-
 tuor diebus pereunt. Si vero has effugerint, sani sunt. VII. Quibuscumque
 morbi comitiales ante pubertatem, sunt, transmutationem habent. Quibuscumque
 vero viginti quique annos nati sunt, his plerumque commoruntur.
 10 VIII. Quicumque pleuritici sentes, in quatuordecim diebus non repurgantur, his
 ad suppurationem transitio fit. IX. Tabes maxime fit aetatibus ab anno
 decimo octavo usque ad trigésimum quintum. X. Quicumque anginam ef-
 fugiunt, his ad pulmonem vertitur, & in septem diebus moriuntur. Si vero has
 effugerint, suppurati sunt. XI. Qui tabe infestantur, si sputum quodcumque
 15 tussiendo rejecerint, grave olet, dum prunis inicitur, & capilli de capite deslu-
 xerint, lethale est. XII. Quibuscumque tabe laborantibus capilli de capite deslu-
 xerint, hi alvi profusivo accedente moriuntur. XIII. Quicumque sanguinem
 spumofum spuiunt, his ex pulmoneeductio fit. XIV. A tabe occupato,
 20 alvi profusivum accedens, lethale est. XV. Quicumque ex pleuritide sup-
 putati sunt, si in quadraginta diebus repurgati fuerint ab ea die, qua ruptio
 facta fuerit, liberantur. Si vero non, ad talem transeunt. XVI. Calida
 frequenter ea utentibus, has noxas inducit, catnium effecminationem, nervo-
 rum impotentiam, mentis torporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia.
 Hæc quibus mors. XVII. Frigida vero convulsiones, antrosum, ac retror-
 25 sum distentiones, nigrores, rigores febriles. XVIII. Frigida nimica ossi-
 bus, dentibus, nervis, cerebro, spinali medulla. Calida vero grata.
 XIX. Quicumque petrificata sunt, excalescere oportet, præterquam a
 quibus sanguis erumpit, aut erupturus est. XX. Ulceribus frigida mori-
 dax, cutem obdurat, dolorem non suppurantem facit, nigrescat, rigores febrili-
 30 bus inducit, convulsiones, distentiones. XXI. Quandoque vero in distentio-
 ne sine ulcere, juveni carnosio, ætate media, frigida mulla affuso, calor re-
 vocationem facit. Calor autem hæc solvit. XXII. Calida suppuratoria est,
 non in omni ulcere, maximum signum ad securitatem, cutim molliat, attenuat,
 dolores eximit, rigores, convulsiones, distentiones mitigat, capitis gravitatem
 35 solvit. Plurimum autem confert ad ossium fracturas maxime denudatas. Ex his
 autem maxime his, qui in capite ulcera habent, & his, quæ a frigidityte moriun-
 tur, aut ulcerantur, & herpetibus exedentibus, sedi, pundo, utero, vesicæ.
 His calida grata est, & judicans. Frigida vero inimica, & occidens.
 XXIII. In his frigida uti oportet, unde sanguis erumpit, aut erupturus est, non su-
 40 per ipsas partes, sed circa ipsas, unde sunt. Et quicumque inflammationes, aut
 flammæ ardores ad ruborem, & suberuentum colorem ex novo sanguine ten-
 quant, ad eas ipsas, nam veteres nigrefacit, & ad sacrum ignem non exule-
 rantur, nam exulceratum lædit. XXIV. Frigida, velut nix, glacies, pecto-
 ri inimica sunt, tusses movent, & sanguinis eruptiones, ac desfluxiones indu-
 45 cunt. XXV. Tumores in articulis, & dolores absque ulcere, & podagricas
 affectiones, & convulsiones: horum plurima, frigida multa affusa levar, & atten-
 nuat, & dolorem solvit. Torpor enim dolorem solvit. XXVI. Aqua, quæ
 cito calefit, & cito petrificatur, levissima est. XXVII. Quibus bibendi
 appetentia noctu valde sitientibus, si obdormierint, bonum est.
 50 XXVIII. Menses dicit aromatatum suffitus. Multis autem modis etiam ad
 alia commodus esset, si non capitis gravitatem induceret.
 XXIX. Pregnantes medicamentis purgare oportet, si turgent humor, quarto mense,
 & usque ad septimum. Minus vero has. Juniores vero, & seniores foetus vere-
 ri oportet. XXX. Mulierem uterum gerentem ab aliquo acuto mor-
 55 bo corripit, lethale est. XXXI. Mulier uterum gerens sceta vena abortit,
 & magis, si major fuerit foetus. XXXII. Mulieri sanguinem vomenti,
 mensibus erumpentibus, solutio fit. XXXIII. Mulieri mensibus deficientibus,
 sanguinem ex naribus fluere, bonum est. XXXIV. Mulieri uterum gestan-
 ti, si alvus multum fluxerit, periculum est, ut abortiat.
 60 XXX. Mulieri, quæ ab uteri strangulationibus vexatur, aut difficulter parit,
 sternutatio accedens, bonum. XXXVI. Mulieri menses decolores, & non
 eodem tempore semper sentes, purgatione opus esse, significant.
 XXXVII. Mulieri uterum gestanti, si mammae repente graciles fiant, ab-
 ortit. XXXVIII. Mulieri uterum gestanti, si altera mamma gracilis fiat,
 65 ut, gemellos gestans alterum abortit. Et si quidem dextera gracilis fiat, mascu-
 lum; si vero sinistra, foemellam. XXXIX. Si mulier, quæ neque præ-
 gnans est,

gnans est, neque peperit, lac habet, menses ipsius defecerunt. XL. Mulie-
ribus quibuscumque ad mammas sanguis colligatur, infantiam significat.

XLi. Mulierem si velis cognoscere, an pręgnans sit, ubi dormire volet, a-
quam mulsam bibendam dato. Et si quidem tormen habuerit circa ventrem, prę-
gnans est; si vero non, pręgnans non est. XLiI. Mulier pręgnans si qui-
dem masculum gestat, bece colorata est. Si vero foemellam, male colorata.

XLiii. Si mulieri pręgnanti ignis facer in utero fiat, lethale est.

XLiv. Quęcumque pręter naturam tenues existentes, uterum gestant, ab-
ortunt, pręcisquam crassescant. XLv. Quęcumque vero moderate corpus ha-
beutes, abortiunt bimenses, & trimestres sine causa manifesta, his uteri

acetabula mucro plena sunt, & non possunt foetum continere prę gravitate,
sed absumpuitur. XLvi. Quęcumque pręter naturam crassę existentes, non

conciunt in utero, his omeorum osculum uteri comptimit, & pręcisquam
attenuentur, non concipiunt. XLvii. Si uterus in coxam incumbens, sup-
puratus fuerit, necesse est curationem ex medicamentis per linamenta ipsi adhi-
bere. XLviii. Foetus masculi quidem in dextris, foemine vero in fini-

stris magis. XLix. Ut secundę excidant, sternutatorio indito, nares, &
os apprehendito. L. Mulieri menses si cohibere voles, cucurbitam quamma-
ximam ad mammas appone. Li. Quęcumque uterum gestant, his oscu-
lum uterorum clausum est. Lii. Mulieri uterum gestanti, si multum lac ex

mammis suat, debilem foetum significat. Si vero solidę fuerint mammae, sanio-
rem foetum significant. Liii. Quę corruptę sunt foetus, his mammae
graciles fiunt. Si vero rursus durę fiant, dolor erit aut in mammis, aut in coxis,
aut in oculis, aut in genibus, & non corrumpunt. Liv. Quibus os ute-
rorum durum est, his necesse est osculum uterorum clausum esse. Lv. Quę-
cumque in utero habentes, a febris corripuntur, & fortiter attenuantur sine

manifesta occasione, difficultate pariunt, & periculose, aut abortum facientes pe-
riclitantur. Lvi. In fluxu muliebri convulsio, & animi deliquium si acce-
dat, malum est. Lvii. Mensibus pluribus progrediuntur morbi fiunt, & 95
non prodeuntibus, ab utero morbi contingunt. Lviii. Ex intestino recto,
& utero inflammato, urinae stillicidium accedit, & ex rheumbus suppuratis urinae
stillicidium accedit. Verum ex hepate inflammato singultus accedit.

Lix. Si mulier in ventre non concipit, velis autem scire, an conceptura
sit, vestimentis circumtectam ex infernis suffito. Et si quidem odor per corpus
tibi procedere videatur ad nares, & ad os, scito, quod ipsa non propter se ip-
sam infecunda est. Lx. Si mulieri uterum gestanti purgationes prodeunt,
impossibile est foetum sanum esse. Lxi. Si mulieri purgationes non pro-
deunt, neque horrore, neque febre accedente, verum cibi fastidia ipsi accidunt;
hanc in ventre habere, existimato. Lxii. Quęcumque frigidis, ac densis

uteris habent, non concipiunt, & quęcumque humidis habent uteros, non concipi-
unt. Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quęcumque siccis magis, & adu-
stos. Prę inopia enim alimentum corruopitur semen. Quęcumque vero ex utrisque tem-
peramentum habent moderatum, tales fecundę fiunt. Lxiii. Similiter au-
tem in masculis. Aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, ut
semen non deducat, aut propter densitatem humor non procedit foras, aut pro-
pter frigiditatem non concalescit, ut ad hunc locum congregetur, aut propter
tarditatem hoc idem contingit. Lxiv. Lac dare capiti dolentibus, malum. Malum
etiam febricitantibus, & quibus pręcordia elevata permurmurantia, & siticulo-
sis. Malum, & quibus biliose alvi egestionis in febris acutis sunt, & qui-
bus sanguinis multi egestio facta est. Convenit autem exhibere tabescentibus,
non valde multum febricitantibus, & in febris longis, debilibus, nullo ex prę-
dictis signis presente, sed pręter rationem consumptis. Lxv. Quibus tu-
mores in ulceribus apparent, non valde convelluntur, neque infaniunt. His autem
derepente dissipatis, retrorsum quidem convulsiones, & dissectiones fiunt, antrore-
sum vero infanie, lateris dolores acuti, aut suppuratio, aut dysenteria, si ru-
bicundi magis fuerint tumores. Lxvi. Si in vulneribus fortibus, ac pravis
timor non appareat, magnum malum. Lxvii. Tumores laxi, boni; crudi,
duri, mali. Lxviii. Dolenti posteriorem capitis partem, vena recta in
fronē secta prodest. Lxix. Rigores incipiunt, mulieribus quidem ex lum-
bis magis, & per dorsum ad caput; verum & viris magis posteriore corpo-
ris parte quam anteriore, velut ex cubitis, ac femoribus. Sed & cutis rasa est. Indi-
cat autem pilus. Lxx. Qui a quartanis corripuntur, non ita valde a convul-
sionibus corripuntur. Si vero prius corripiantur, & quartana insuper accedat,
cessant. Lxxi. Quibus cutis circumteaditur arida, ac dura, hi sine sudore
moriuntur. Quibus vero laxa, ac rara, cum sudore moriuntur.

Lxxii. Morbo regio laborantes, non ita valde flatuosi sunt,

S E C T I O VI

- I.** IN diuturnis intestinorum leuitatibus, rursus accidens accedens, qui prius non erat, signum bonum. **II.** Quibus nares natura humidiores, & genitura humidior, morbosus fani sunt; quibus vero vice versa, salubrius.
- III.** In longis intestinorum leuitatibus, cibi fastidium, malum, & cum febre, **peius.** **IV.** Ulcera circumglabra maligna sunt. **V.** Dolores in lateribus, & in pectoribus, & in aliis partibus an multum differunt, considerandum est.
- VI.** Rhenum affectiones, & quæ circa vesicam consistunt, operose sanantur in senibus. **VII.** Dolores circa ventrem fieres, sublimis quidem leves sunt, non autem sublimes, fortiores. **VIII.** Hydropicis fientia ulcera in corpore, **non facile sanantur.** **IX.** Latæ pustulæ non valde pruritiginosæ sunt.
- X.** Caput dolenti, & circumdolenti, pus, aut aqua, aut sanguis fluens per nares, aut os, aut aures, solvit morbum. **XI.** Arrabiliaris, & Phititica, hæmorrhoides accedentes, bonum. **XII.** Hæmorrhoides sananti diuturnas, si non una servata fuerit, periculum est hydropem, aut tabem accedere.
- XIII.** A singulu detento sternutationes accedentes, solvunt singulum.
- XIV.** Ab hydropo detento, ubi aqua in venis ad ventrem confluit, solutio fit. **XV.** A profluvio alvi longo correpto, vomitus sponte accedens, solvit alvi profluvium. **XVI.** A pleuritide, aut peripneumonia occupato, alvi profluvium accedens, malum. **XVII.** Lippientem alvi profluvio corripit, bonum. **XVIII.** Vesicam dissectam habenti, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut tenue aliquod intestinum, aut ventriculum, aut hepatis, lethale est. **XIX.** Ubi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ pars tenuis, aut præputium, neque angelicit, neque coalescit.
- XX.** Si in ventrem sanguis effusus fuerit præter naturam, necesse est suppurari. **XXI.** In infantibus, vaticibus, aut hæmorrhoidibus accedentibus, infantis solutio fit. **XXII.** Quicumque dolores ex dorso ad cubitos descendunt, venæ sectio solvit. **XXIII.** Si timor, & tristitia multo tempore perseveret, arrabiliarum hoc signum est. **XXIV.** Si ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, non coalescit. **XXV.** Ignem sacrum ab externis intro converti, non bonum; ab internis vero extra, bonum. **XXVI.** Quibus in sebetibus adtentibus tremores facti fuerint, mentis emotio solvit.
- XXVII.** Quicumque suppurati, aut hydropici secantur, aut uruntur, hi pure aut aqua acervata effluente, omnino moriuntur. **XXVIII.** Eunuhi non laborant podagra, neque calvi fiunt. **XXIX.** Mulier non laborat podagra, si non menses ipsi defecerint. **XXX.** Puer non laborat podagra ante venetis usum. **XXXI.** Oculorum dolores meri potus, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamenti potio solvit. **XXXII.** Balbi ab alvi profluvio longo maxime coripiuntur. **XXXIII.** Acidum ructum habentes, non ita valde pleuritici fiunt. **XXXIV.** Quicumque calvi fiunt, his varices magnæ non fiunt. Quibuscumque vero calvis varices accedunt, hi rursus hirsuti fiunt. **XXXV.** Hydropicis tussis accedens, malum.
- XXXVI.** Urinæ difficultatem solvit venæ sectio. Secare vero oportet internas. **XXXVII.** Ab angina detento tumorem fieri foris in collo, bonum est. **XXXVIII.** Quibuscumque oculi canci fiunt, eos non curare melius est. Si enim curantur, citius moriuntur. Si vero non curentur, multum tempus perdurant. **XXXIX.** Convulsio fit aut a repletione, aut evacuatione. Sic autem & singultus. **XL.** Quibuscumque citra præcordium dolores fiunt absque inflammatione, his febris accedens, dolorem solvit. **XLI.** Quibuscumque suppuratum quid in corpore existens, significationem de se non probet, his propter puris, aut loci crassitudinem, sui significationem non exhibet. **XLII.** Morbo regio laborantibus, hepar durum fieri malum est. **XLIII.** Quicumque splenici a dysenteria coripiuntur, his longa accedente dysenteria, aut hydrops accedit, aut intestinorum leuitas, & pereunt. **XLIV.** Quibuscumque ex urinæ stillicidio volvulus accedit, hi in septem diebus pereunt, si non febre accedentes, urina satis fluxerit. **XLV.** Ulcera quæcumque annua fiunt, aut diutius tempore durant, necesse est, os abscedere, & cicatrices cavas fieri. **XLVI.** Quicumque gibbosi ex anhelatione, aut tussi fiunt, ante pubertatem pereunt.
- XLVII.** Quibuscumque venæ sectio, aut medicamentum conducit, his vete venam scare, aut medicamentum purgans exhibere convenit. **XLVIII.** Splenicis dysenteria accedens, bonum. **XLIX.** Quicumque podagrici morbi fiunt, hi sedata inflammatione, in quadraginta diebus restituntur. **L.** Quibus ceterum dissectum fuerit, his necesse est febrem, & bilis vomitum accedere.
- LI.** Quibuscumque sanis decerpente dolores fiunt in capite, & statim voce intercepta jacent, ac sternunt, in septem diebus pereunt, si non febris apprehendat.
- LII.** Considerate vero oportet etiam sub oculis apparitiones in formis. Si enim albæ partis quid subapparuit, non commissis palpebris, si id non ex alvi proflu-

profluvio, aut medicamenti potione fuerit, malum signum, & valde lethale est. LIH. Delipiente cum risu quidem fientes, securiores sunt, cum studio vero serio, periculosiores. LIV. In acutis affectionibus, quæ cum febre sunt, iuctuosa respiratio, malum. LV. Podagrica affectiones vere, & autumnopurplurimum moventur. LVI. Attribiliarius morbis periculosi humorum a loco ad locum decubitus, aut syderationem corporis, aut convulsionem, aut insaniam, aut cecitatem significant. LVII. Syderationes vero maxime sunt arate a quadragesimo anno usque ad sexagesimum. LVIII. Si omentum exciderit, necesse est putrefieri. LIX. Quibuscumque a coxendicium morbo vexatis, coxa excidit, & tursus incidit, his muci accedunt. LX. Quibuscumque a coxendicium morbo diuturno vexatis, coxa excidit, his crura tabescit, & claudicant, si non ulti fuerint.

S E C T I O VII.

I. IN acutis morbis frigiditas extremarum partium, malum. II. Ex offe agrotante caro livida, malum. III. Ex vomitu singultus, & oculi rubicundi, malum. IV. Ex sudore horror, non bonum. V. Ex infania dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum. VI. In morbo diuturno cibi fastidium, & meracæ alvi egestiones, malum. VII. Ex multo poru rigor, & delirium, malum. VIII. Ex tuberculi intus raptione exolutio, vomitus, & animi deliquium fit. IX. Ex sanguinis fluxu delirium, aut etiam convulsio, malum. X. Ex vultu vomitus, aut singultus, aut convulsio, aut delirium, malum. XI. Ex pleuritide peripneumonia, malum. XII. Ex peripneumonia phrenitis malum. XIII. Ex ardoribus vehementibus convulsio, aut distentio, malum. XIV. Ex plaga in capite stupor, aut delirium, malum. XV. Ex sanguinis sputo puris sputum, malum. XVI. Ex puris sputo tabes, & fluxus, malum. Postquam vero sputum supprimitur, moriuntur. XVII. Ex hepatis inflammatione singultus, malum. XVIII. Ex vigilia convulsio, aut delirium, malum. XIX. Et ossis denudatione ignis facit. XX. Ex igne sacro putrefactio, aut suppuratio. XXI. Ex forti pulsui in ulceribus sanguinis eruptio. XXII. Ex dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio. XXIII. Ex meracæ alvi egestione dysenteria. XXIV. Ex ossis dissectione delirium, si ad vacuum usque processerit. XXV. Ex medicamenti potione convulsio, lethale. XXVI. Ex dolore forti partium circa ventrem, frigiditas extremarum partium, malum. XXVII. Mulieri uterum gerenti tenetismus accedens abortire facit. XXVIII. Quodcumque os presectum fuerit, aut necvus in corpore, neque augetur, neque coalescit. XXIX. Si a pituita alba detento vehemens alvi profluvium accedat, solvit morbum. XXX. Quibuscumque spumose alvi egestiones sunt in alui profluvio, his de capite pituita defluit. XXXI. Quibuscumque febricitantibus, in urinis subsidentie crassiores potentæ partes referentes sunt, longum morbum significant. XXXII. Quibus vero biliose subsidentie, ab initio tenues, acutum morbum significant. XXXIII. Quibuscumque disperatæ urinæ sunt, 30 his vehemens turbatio in corpore est. XXXIV. Quibus in urinis bullæ supersunt, rhenum affectiones significant, & morbum fore longum. XXXV. Quibus pingue est id quod superstat, & acervatum, his rhenum affectiones, easque acutas significant. XXXVI. Quibus vero iam nephriticis ex rhenibus affectis prædicta signa accidunt, doloresque circa musculos spinales sunt, si quidem circa externos locos fiant, etiam abscessus extrinsecus futuros expecta. Si vero dolores magis circa internos locos fiant, etiam abscessus magis intus fore expecta. XXXVII. Quicumque sanguinem vomunt, sine febre quidem, salutare est: verum cum febre, malum. Refrigerantibus autem & adstringentibus curare oportet. XXXVIII. Defluxiones in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur. XXXIX. Si quis sanguinem mingat, & grumæ, & urinæ stillicidium habeat, & dolor incidat in ani ac scotti intercapedinem, & inum ventrem ac pectinem, partes circa velsam agrotare significat. XL. Si lingua derepente impotens fiat, aut aliqua corporis pars syderata, attribiliarium tale existit. XLI. Si senioribus nimium purgatis singultus accedat, non bonum est. XLII. Si febris non a bile habeat, aqua multa calida in caput affusa, febris solutio fit. XLIII. Mulier ambidextera non est. XLIV. Quicumque suppurati uruntur, si quidem pus purum fluat & album, evadunt. Si vero subercentum, & carnosum, ac graveolens, pereunt. XLV. Quicumque hepatis suppuratum uruntur, si quidem pus purum fluat, & 50 album, superfures evadunt. In tunica enim pus his inest. Si vero velut amurca fluat, pereunt. XLVI. In doloribus oculorum, ubi merum bibendum destitit, & multa calida lavisti, venam secato. XLVII. Hydopicum si tussis vexet, desperatus est. XLVIII. Urinæ stillicidium, & urinæ difficultatem

39 vini potus, & venæ sectio solvit. Secare vero oportet internas.

XLIX. Ab angina detento tumor, & rubor in pectore accedens, bonum. Foras enim vertitur morbus. L. Quibuscumque corruptum fuerit cerebrum, in

tribus diebus pereunt. Si vero has effugerint, sani sunt. LI. Sternutatio fit ex capite, percalescente cerebro, aut vacuo, quod est in capite perhumescen-

te. Aer enim, qui intus est, foras erumpit. Strepitus vero edit, quia transi-

sius est ipsi per angustum. LII. Quibuscumque hepar circumscita dolet, si fe-

bris accedens solvit dolorem. LIII. Quibuscumque sanguinem de venis auferre

conducit, his venam secare convenit. LIV. Quibus inter ventrem, & septum

transversum pituita conclusa est, & dolorem exhibet, non habens exitum

ad neutrum ventrem, his per venas ad vesicam conversa pituita, morbi so-

lutio fit. LV. Quibus hepar aqua repletum, ad omentum eniperit, his ven-

ter aqua impletur, & moriuntur. LVI. Anxietatem, oscitationem, horro-

rem, vinum aequali mensura aquæ ammixta potum solvit, & lac. LVII. Quibus

in urinaria fistula tubercula sunt, his suppuratione facta, & eruptione, solvi-

tur dolor. LVIII. Quibus cerebrum concussum fuerit ex aliqua causa, eos sta-

tim voce privati necesse est. LIX. Corporibus humidis carnes habentibus,

famem inducere oportet, fames enim corpora siccant. LX. Ubi in toto corpo-

re mutationes, & corpus perfrigeratur, & rursus calefit, aut color alius

ex alio mutatur, longitudo morbi significat. LXI. Sudor multus, cali-

dus, aut frigidus semper fluens, humorem abducere oportere significat, fort-

quidem superne, debili vero inferne. LXII. Febres non intermittentes, si per

tertiam sortiores fiant, periculosæ sunt. Quocumque vero modo intermiserint,

sine periculo esse significant. LXIII. Quibus febres longæ sunt, his aut tuber-

cula, aut ad articulos dolores sunt. LXIV. Quibus tubercula diutina,

aut ad articulos dolores ex febris sunt, hi cibis plurimis utuntur.

LXV. Si quis febricitanti cibum det, quem sano exhibet, sano quidem ro-

dur, aegroto vero morbus est. LXVI. Quæ per vesicam procedunt, inspicere

oportet, an qualia sanis procedunt. Quæ igitur minime similia his sunt, ea

morbosiora sunt. Quæ vero similia sanis, ea minime morbosa. LXVII. Et

quibus alvi egestionem, si stare permiseris, & non moveris, subsistunt veluti ra-

menta, si paucæ fuerint, modicus morbus est, si multæ, multus. His confert sub-

purgare alvum. Si vero non purgata alvo, sortitiones dederis, lades, & quan-

to plures dederis, magis lades. LXVIII. Quibuscumque cauda deorsum secedens,

ex atra bile sunt; si plura, copiosiora; si pauciora, pauciora.

LXIX. Excretionem in febribus non intermittibus livida, & cruen-

ta, & graveolentes, & biliosa, omnes mala sunt. At probe secedentes, bonæ, &

per alvum, & per vesicam; & ubi sane quid secedens constituit non purgatum,

malum. LXX. Corpora quocumque quis purgare voluerit, fluida facere opor-

tet. Et si quidem sursum, sistere alvum. Si vero deorsum, humectare.

LXXI. Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, morbus.

LXXII. In non intermittibus febribus, si externæ quidem partes frigida fue-

rint, internæ vero ardeant, & febris habeat, lethale est. LXXIII. In

febri non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium in-

flor-squeatur, aut non videat, aut non audiat æger jam debilis existens, quicquid ho-

rum fiat, propinqua mors est. LXXIV. Ex patuit alba hydrops acced-

it. LXXV. Ab alvi profluvio dysenteria. LXXVI. A dysenteria in-

testinorum levitas accedit. LXXVII. Ex corruptione, abscessus ossis.

LXXVIII. Ex sanguinis vomitu tabes, & puris purgatio sursum. Ex tæbe flu-

xus ex capite. Ex fluxu alvi profluvium, ex alvi profluvio suppressio purga-

tionis sursum versus; ex suppressione, mors. LXXIX. Qualia etiam sunt

in vesicæ, ac alvi egestionibus, inspicere oportet, & in his, quæ per carnes ex-

cernuntur, & scibi alibi a natura recedat corpus: si parum, parvus est morbus;

si multum, multus. Si vero valde multus sit recessus, lethale hoc est.

LXXX. Quicumque supra quadraginta annos phrenitici sunt, non ita val-

de sani sunt. Minus enim periclitantur, quorum natura, & ætati morbus af-

finis fuerit. LXXXI. Quibuscumque in agnitudinibus oculi ex voluntate lachry-

mantur, bonum. Quibus vero citra voluntatem, malum.

LXXXII. Quibus in febribus quartana sanguis ex naribus fluxerit, ma-

lum est. LXXXIII. Sudores in diebus judicatorii fierent, vehementes, &

veloces, periculosi sunt, qui expelluntur ex fronte velut gutta, & aquæ salien-

tes, & frigidi valde, ac multi. Necesse est enim talem sudorem prodire cum vio-

lencia, & doloris excessu, ac expressione diuturna. LXXXIV. Ex morbo diu-

turno etiam alvi defluxus, malum. LXXXV. Quæcumque non sanant medi-

camenta, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat.

Quæ ignis non sanat, ea incurabilia putare oportet.

HIPPOCRATIS COI LIBER PRÆNOTIONUM.

327

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 *Præfatiendi duplex utilitas. Morbos omnes sanari non posse. Affectionum natura quantum corporum vires excedant, Si quid divini in morbis insit.*
- 2 *Fæci nota in morbis acutis.*
- 3 *Oculorum subapparitiones. A decubitu nota, seu quomodo cubare ægrum oporteat.*
- 4 *In ventrem decumbere quomodo malum. A dentium fridore in febribus nota. Ab ulcere prænotiones, seu nota, A manuum gestulatione. A spiratione.*
- 5 *A sudore. Sudorem causa. Causa. A præcordiis.*
- 6 *A tumoribus in hypocondriis, Tumores in ventre.*
- 7 *A suppuratione. Puris optimi signa.*
- 8 *De aqua inter cutem.*
- 9 *De sono. Alvi excrementa.*
- 10 *Lumbri rotundi cum egressionem, Flatu sine strepitu.*
- 11 *De urinis, Urina subrobra. Subsidentia, crassiores potentia partes referentes. Nubecula in urinis. Urina salva, & tenuis. Urina fetida, aquosa, nigra, crassa, tepens, & cruda.*
- 12 *In urinis pinguedinis superne inflantes, De vomitu.*
- 13 *De spato. De gravedine, & sternutamento.*
- 14 *De suppuratione. Signa in ægrotis bona.*
- 15 *Signa in ægrotis mala. De suppurationibus.*

- 16 *Suppuratorum cognitio.*
- 17 *Suppurationum diuturnarum serena. Ex suppuratis qui potissimum superfluit manant, aut intersant.*
- 18 *Abcessus circa aures ex inflammatis pulmonis morbu. Abcessus ad crura in pulmonis inflammationibus foribus. Abcessus evanescentes, & recurrentes.*
- 19 *Suppurati ex pulmonis inflammatione. Dolores cum febre. Suppurati illi. Pestica inflammata nota.*
- 20 *De febrium indicationibus. De morborum circuitionibus, & quo passo integris numerari nequeant.*
- 21 *Morbi qui cogniti faciliores. Quo passo in mulieribus a die, qua pepererint, indicationes existant.*
- 22 *Capitis dolores cum febre continua. Sanguinis e naribus fluxus cui atati magis similis. Auris dolor acutus.*
- 23 *Fauces exulcerata in febre. De angina.*
- 24 *De gurgulione, Febres desinentes, neque signis solutorii apparentibus, neque in diebus indicatorii. Abcessus ex febribus quibus magis fiant. Abcessus quibus potissimum, & quo tempore magis fiant.*
- 25 *De vomitione spontanea.*
- 26 *De convulsione. Prænotare volentem, qua discere oporteat.*
- 27 *Morborum populariter prænotandum impetu, & temporis constitutiones. Aedico prænotionem adhibitorum qua cognoscenda.*



MEDICUM prænotionem adhibere, optimum esse mihi videtur. Prænotens enim, & prædicens apud ægrotos & præsentia, & præterita, & futura, & quæ ipsi ægroti relinquunt exponens, fidem utique fecerit, quod ægrotorum res magis cognoscat, quare audebunt homines se ipsos medico committere. At vero curationem optime fecerit, ubi prænotaverit futuras affectiones. Sanos equidem facere omnes ægrotos futuris affectionibus. Simul vero & si quid divini in morbis insit, etiam huius prænotionem ediscere. Ita enim merito admirationi fuerit, & medicus bonus extiterit. Nam quos superfluitas manere possibile est, eos adhuc magis recte conservare poterit, ex multo tempore antea consilium adhibens ad singula; & tum morituros, tum servandos prænotens, ac prædicens, a culpa exors fuerit. * Considerare potro hoc modo convenit in morbis acutis, primum quidem faciem ægroti, an similis sit his, quæ in sanis sunt; maxime vero an ipsa sibi ipsi. Ita enim optima fuerit. Si vero maxime contraria similitudo fuerit, horrendissima est. Talis autem fuerit nasus acutus, oculi cavi, temporaria collapsa, aures frigida, ac contractæ, & extremitates aurium averse, & cutis circa frontem dura, & circumtenta, ac arida, & color totius faciei pallidus, aut etiam niger, & lividus, aut plumbeus. Si quidem igitur in principio morbi facies talis fuerit, & nondum ex aliis conjecturam facere licuerit, interrogare oportet, num vigilaverit homo, aut alvi excrementa valde liquida sint, aut fames, aliqua ipsum teneat. Et si quidem horum aliquid confiteatur, minus grave esse putandum est. Judicantur autem, & cognoscuntur talia in die, ac nocte, si ob

has caus-

- has causas faciet talis fuerit. Si vero nihil horum esse dicat, neque in praedicto tempore confidat, nosse convenit mortem proximum esse. At si venustiore existente morbo, aut triduo, aut quadriduo, talis fuerit facies, de his interrogare oportet, de quibus etiam prius iussi, nemque alia signa considerare & in universa facie, & in corpore, & in oculis. Si enim lucem fugiant, aut involuntarie lachrymentur, aut disflorquantur, aut alter altero minor fiat, aut albas partes rubentes habeant, aut venulas lividas, aut nigras in ipsis habeant, aut lemae, ac sordes circa oculos appareant, aut etiam instabiles, aut eminentes, aut cavi vehementer facti, aut squallentes, & obscuri fuerint, aut color totius faciei alteratus fuerit, haec omnia mala, & perniciofa esse putandum est. * Considerare vero convenit etiam oculorum subapparitiones in somnis. Si enim albae quid partis subapparuerit, palpebris non commissis, si id non ex alvi profluvio, aut medicamenti potione fuerit, aut agrotus non ita dormire consueverit, malum signum & valde lethale est. Si vero retorta, aut contracta fiat, aut livida, aut pallida palpebra, aut labium, aut nasus cum aliquo ex aliis signis, mortis proximum esse sciendum est. Lethale est etiam habere labia resoluta, & pendentia, & frigida, & albicantia facta. Decumbentem agrotum a medico deprehendi convenit in latus dextrum, aut sinistrum, & manus, & collum, & crura modice inflexa habentem, & totum corpus flexibile situm. Ita enim plurimi ex fanis decumbunt. Optimi autem sunt decubitus, qui sanorum decubitus similes existunt. At vero supinum jacere, & manus, & collum, & crura extensa habere, minus bonum est. Si vero etiam pronus fiat, & de lecto ad pedes delabatur, magis horrendum est. Si vero nudos quoque pedes habere conperiat, nec admodum calidos, & manus, & collum, ac crura inaequaliter disiecta, ac nuda, malum est. Anxietatem enim significat. Lethale est, & hiantem semper dormire, & crura supini jacentis valde incurvata esse, ac complicata. * At in ventrem decumbere, si quis non sit adsuetus, dum sanus fuit ita dormire, delirium significat, aut dolorem locorum circa ventrem. Caterum erectum sedere velle agrum in motu vigore, in omnibus morbis acutis malum est, pessimum autem in peripneumoniis, pulmone inflammato. Dentibus stridere in febribus, quibus non familiare id est a pueris, furiosum, ac lethale est. Verum praedicere oportet ab utriusque periculum futurum. Si vero etiam delirius hoc faciat, perniciosum valde jam existit. Ulcus autem sive prius factum fuerit, sive in morbo accesserit, considerare oportet. Si enim periturus est homo, ante mortem lividum, ac siccum erit, aut etiam pallidum, & siccum. At de manuum latione ita sentio. Quae in febribus acutis, aut peripneumoniis, aut in phrenitide, aut capitis dolore ante faciem feruntur, & frustra veniunt, & festucas legunt, & floccos de vestibus evellunt, & de pariete paleas detrahunt, eas omnes malas, & lethales esse. Spiritus densius dolorem significat, aut inflammationem in locis supra sepeum transversum. Qui vero magnus expiratur, & per multum temporis intervallum, delirium indicat. Si vero frigidus e naso, & ore expiret, valde jam perniciosus est. Bonam autem inspirationem valde magnam vim habere ad salutem in omnibus acutis morbis, putare convenit, qui cum febribus sunt, & in quadraginta diebus indicantur. * Sudores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in diebus judicatoris sunt, & febrem perfecte submovent. Boni vero sunt, qui per totum corpus fiunt, hominem facilius morbum ferre faciunt. Qui vero tale quid non effecerint, incommodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & tantum circa caput, & faciem fiunt, & circa cervicem. Hi enim cum acuta quidem febre mortem praesignificant, cum mitiore vero longitudinem morbi. Et qui per totum corpus fiunt, similiter significant his, qui circa caput. At vero milioformes, & solum circa collum fientes, mali sunt. Qui vero cum guttis fiunt, & evaporant, boni sunt. Considerare porro convenit sudores in summa, fiunt enim aliqui propter corporum exolutionem, aliqui propter inflammationis vigorem. Praecordium optimum est doloris exors, & molle, & aequale tum in dextris, tum in sinistra parte. At inflammatum, aut dolorem exhibens, aut dextra partes inaequaliter affectae ad sinistras, haec omnia observare oportet. Si vero etiam pulsus inerat in praecordio, turbationem significat, aut delirium. Verum oculos talium insuper intueri oportet. Si enim oculi frequenter moveantur, furiosos hos fore timor est. * Tumor in praecordio durus existens, & dolorosus, pessimus quidem est, si per totum fuerit praecordium. Si vero fuerit in altera parte, minus periculosus est in sinistra. Significant autem ejusmodi tumores, in principio quidem mortem brevi affirmam. Si vero viginti dies transgrediatur tum febris detinens, tum tumor non confidens, ad suppurationem convertitur. Contingit autem his in primo circuitu etiam sanguinis erupio enaribus, & valde prodest. Verum interrogare convenit, an caput doleant, aut hebetem vitium habeant. Si enim horum quid fuerit, ad eum locum repit. Magis tamen in junioribus quinque ac triginta annis, sanguinis erupcionem expectare convenit. At vero molles tumores, & doloris exortes, & qui digito cedunt, diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. Si vero transgrediatur sexaginta dies febris detinens,

detinens, & tumor non confidat, suppuratum fore significat & hunc, & eum, qui in reliquo ventre est eodem modo. Quicumque igitur tumores dolorosi sunt, & duri, & magni, periculum mortis brevi affore significant. Qui vero molles, & doloris exortes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt. Cæterum tumores in ventre minus faciunt abscessus, quam hi, qui sunt in præcordiis. Minime vero hi, qui sub umbilico consistunt, ad suppurationem convertuntur. Sanguinis vero eruptionem ex supernis locis maxime expectare oportet.

* Omnium autem tumorum diuturnorum circa hos locos suppuraciones consideranda convenit. Sunt autem suppuraciones hinc senties hoc modo consideranda. Quæcumque extra vertuntur, optimæ sunt, quæ parvæ sunt, & quammaxime foras eminentes, & in acutum fastigiata. Quæ vero magnæ sunt, & latæ, & minime in acutum fastigiata, pessimæ sunt. Quæcumque vero intro rumpuntur, optimæ sunt, quæ nihil cum externo loco communicant, sed sunt contractæ, & doloris exortes, & torus externus locus concolor apparet. At vero pus optimum est, si est album, & æquale, & leve, & quamminime graveolens. Quod vero huic contrarium est, pessimum est. * Aquæ porro inter cutem, ex acutis morbis obortæ, omnes malæ sunt. Neque enim a febre liberant, & valde dolorosæ sunt, ac lethales. Incipiunt autem pleraque a laterum mollitudine, & a lumbis, aliquæ vero etiam ab hepate. Quibus igitur a laterum mollitudine, & lumbis principia sunt, his & pedes inurumescunt, & alvi profusiva diuturna ipsos tenent, quæ neque dolores ex laterum mollitudine, ac lumbis solvunt, neque ventrem molliunt. Quibuscumque vero ab hepate aquæ inter cutem oriuntur, his tussis, tossiendique promptitudo accedit, & nihil memorabile expiunt, & pedes rument, & venter non egerit nisi dura, & coactus, & circa alvum sunt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte tum consistentes, rum confidentes. Caput autem, & manus, & pedes, si frigida sunt, malum est, ubi & venter, & latera calida sunt. Optimum vero est, & totum corpus calidum esse, ac molle. Converti autem convenit facile ægrotum, & in attollendo se levem esse. Si vero gravis esse appareat & reliquo corpore, & manibus, & pedibus, magis periculosum est. Si vero supra gravitatem ungues, & digiti lividi fiant, mors & vestigio expectanda est. At si digiti, ac pedes penitus nigrescunt, manus perniciosi sunt, quam lividi. Verum & alia signa considerare oportet. Si enim facile ferre videatur malum, & aliud quoddam ex salutaribus ad hæc signa subindicet, morbum ad abscessum verti spes est, ita ut æger quidem superflus mansurus sit, corporis vero partes nigrescunt casuræ. Testes, & pudenda revulsa, dolores fortes significant, & periculum lethale.

* Quod vero ad somnos attinet, quemadmodum secundum naturam consueverit nobis est, interdum vigilare oportet, noctu dormire. Si vero hoc fuerit transmutatum, peius est. Minime vero lædi æger poterit, si dormiat mane ad tertiam partem diei. Qui vero ab hoc tempore sunt somni, deteriores sunt. Pessimum autem est non dormire, neque noctu, neque in interdum. Aut enim præ dolore, ac afflictionibus vigiliæ adhaerent, aut delirium aderit ab hoc signo. Egestio alvi optima est, mollis, & coherens, & secundum horam, in qua etiam a sano egeretur. Juxta copiam vero pro ratione ciborum ingestorum. Tali enim contingente exitu, venter infernus sanus fuerit. Si vero liquida fuerit egestio, conducit neque stridere, neque frequentem esse, & paulatim secedere. Delasatur enim homo ex frequenti defessu, & vigilas utique contraxerit. Si vero sæpe accervatum egerit, periculum est, ne in animi deliquium incedat. Quin & juxta copiam ingestorum egerere oportet bis, aut ter in die, & noctu semel. Plura vero mane, quemadmodum in consuetudine est homini. Inspissati autem oportet egestionem, morbo ad judicationem tendente. Sit autem subfulva, & non valde graveolens. * Conmodum est, & lumbricos rotundos cum egestionem prodire, morbo ad judicationem tendente. Oportet autem in omni morbo mollem esse ventrem, & iusta mole prædium. At vero aquosum valde, aut album, aut pallidum, aut viride, aut vehementer rufum, aut spumofum stercus egerere; hæc omnia mala sunt. Malum insuper est, & quod exiguum est, & viscosum, ac album, & quod subpallidum, aut subviride, ac leve. His vero magis lethalia fuerint stercora nigra, aut pingua, aut livida, aut æruginosa, & male oleria. Quæ vero varia sunt, diuturniora quidem his sunt, nihilo minus autem perniciosa. Sunt autem talia, ramentosa, & buliosa, & cruenta, & prasina, & nigra, aliquando simul inter se exepuria; aliquando particularum. Flatum porro siue strepitum, ac crepitu prodire optimum est. Melius autem est & cum strepitu exire, quam istius revolvii: & qui sic progressus est status, aut dolere quid hominem significat, aut delirare; nisi sua sponte homo ita statum emittat. Cæterum præcordiorum dolores, ac tumores, si fuerint recentes, & non cum inflammatione solvi murmur in præcordiis obortum, & maxime quidem si pertransierit cum stercore, & urina, ac statu. Sin minus, etiam ipsum per se si transierit, prodest. Prodest item, si subdescenderit ad inferos locos. * Optima vero est urina, quum fuerit alba subdientia, & levis, & æqualis, per totum tempus donec judicatus fuerit morbus. Significat enim & securitatem, & morbum fore brevem. Si intermiserit, & aliquando quidem pura miogatur; aliquando vero sub-

- vero subfidet album, ac leve, diuturnior fir morbus, & minus securus. Si vero fuerit & urina subnigra, & subidientia ipsius similis, & levis, diuturnior quidem hæc morbum, quam prior significat, sed valde salutarem. At subidientia in urinis crassiores potentia partes referentes, pravæ sunt. His autem peiores sunt laminosæ. Albæ vero, & tenues valde malæ sunt. Verum his deteriores sunt fursuracæ. Nubeculæ, quæ feruntur in urinis, albæ quidem bonæ sunt; nigrae vero malæ. Quamdiu vero fulva fuerit urina, & tenuis, morbum inconcoctum esse significat. Si vero & diuturna fuerit talis existens, periculum est, ne sufficere homo possit, donec urina fuerit concocta. Lethaliores autem sunt urinæ & fortidæ, & aquosæ, & nigrae, & crassæ. At tum in viris, tum in mulieribus nigrae urinæ pessimæ sunt. In pueris autem aquosæ. Quicumque urinas tenues, & crudas mingunt multo tempore, si alia veluti superfluitibus sicutis signa fuerint, his abcessum expectare oportet ad locos infra seipsum transversum. * Sed & pinguedines superne instantes, araneorum telis similes, damnare oportet. Sunt enim coeliquationis signa. * Considerare vero convenit in urinis, in quibus nubeculæ sunt, an superne, aut inferne sint, & quales habeant colores. Et quæ quidem dorsum scruntur, cum coloribus relatis, eas bonas esse putare, ac laudare. Quæ vero sursum feruntur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare. Nec vero decipiat te, si vesica inorbum aliquem habens, enisiodi urinas reddiderit. Non enim torvis corporis signum est, sed ipsius per se vesicæ. Vomitus coninuosissimus est ex piruita, ac bile quammaxime pernixtus, & non crassus valde, neque multus. Nam meraciores deteriores sunt. Si vero id, quod vomitur rejectum est, prasinum fuerit coloris, aut lividum, aut nigrum, quicumque horum fuerit colorum, malum esse putandum est. Si vero omnes colores idem homo vomit, valde perniciosum hoc est. Celerrimam autem mortem significat lividus vomitus, si graveolens fuerit. Omnes vero subputridi, ac foetidi odores, in omnibus vomitibus mali sunt. * Sputum vero in omnibus doloribus, qui circa pulmonem, & costas sunt, cito, ac facile expui convenit, & flavum sputo valde permixtum apparere. Si enim longe postea, post principium doloris expuerit, quod flavum est, aut fulvum, aut quod multum tiffum inducit, & non valde permixtum est, deterius est. Nam & flavum meracum periculosum est, & album, ac viscosum, & rotundum inutile est. Malum est, & quod viride est valde, itemque pallidum, & quod spumofum. Si vero ita fuerit meracum, ut etiam nigrum appareat, hoc ipsum deterius est, quam illa. Malum etiam est, si nihil repurgetur, neque emitat pulmo, sed plenus ferveat in gutture. Gravidines, & sternutationes in omnibus circa pulmonem morbis et antecessisse, et succedere malum est. At in aliis morbis lethalissimis sternutationes profunt. Sputum autem flavum, sanguine permixtum non multo, si in pulmonis inflammatione, in principio morbi rejiciatur, salutare est, et valde prodest. Si vero septimo die, aut posterius, minus securum est. Omnia sputa mala sunt, quæ dolorem non sedant. Pessima vero sunt nigra, velut descriptum est. Quæ vero dolorem sedant, omnium optima existunt. * Quicumque dolores ex his locis non sedantur, neque ad sputorum purgationes, neque ad sterconum alvi subductionem, neque ad venæ sectiones, et victus rationem, ac medicamentis, eos ad suppurationem verti sciendum est. Ex suppurationibus quæcumque, dum sputum adhuc biliosum est, suppurantur, perniciosæ valde sunt, siue biliosum illud in parte, siue simul cum pure expuat, et hoc potissimum si morbo ad septimum diem progresso, suppuriatio ab hoc sputo procedere incipiat. Timor autem est eum, qui talia expuit, inorturum esse decimaquarta die, si non aliquid bonum signum ipsi acciderit. Sunt autem bona hæc: facile ferre morbum, bene spirare, a dolore liberatum esse, sputum facile ruffiendo rejicere, corpus æqualiter calidum, ac molle apparere, sitim non habere, urinas, et alvi egestionem, et somnos, et sudores, velut descriptum est; hæc singula nosse convenit accidere, ut quæ bona sint. Nam omnibus his sic contingentibus, homo non morietur. Si vero aliqua ex his accesserint, aliqua non, non ampliore tempore vita producta, decima quarta die homo peribit. * Porro mala signa his contraria sunt: agre ferre morbum, spiritum magnum, et densum esse, dolorem non sedari, sputum vix tuffiendo rejicere, valde sitire, corpus inæqualiter a febris teneri, ventrem quidem, ac costas fortiter calidas esse, frontem vero, et manus, ac pedes frigidos, urinas autem, et alvi egestionem, et somnos, et sudores, velut descriptum est; hæc singula nosse oportet mala esse. Si enim ita accesserit homini aliquid ad sputum, peribit utique homo, proutquam ad decimum quartum diem pervenerit, aut nono die, aut undecimo. Sic igitur conjecturam facere oportet, quod hoc sputum lethale sit valde, et non perducit ad decimum quartum diem. Proinde et malæ, et bona signa expendentem ex his prædictiones facere oportet. Ita enim potissimum veritatem consequi quis poterit. At vero aliæ suppurationes rumpuntur, plurimæ quidem vigesimo die, aliæ vero trigesimo, aliæ quadagesimo, aliæ vero ad sexaginta dies perveniunt. * Considerare vero futura suppurationis principium oportet, suppuratione facta ab ea die, qua primum homo febricitavit, aut si forte ipsum primum rigor apprehendit, et si pro dolore gravitatem fieri factam

bi fustam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat. Hæc enim in principis suppurationum sunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationum fore expectare oportet ad prædicta tempora. Si vero suppuratio fuerit in altero latere solum, vertere, & considerare oportet in his, num aliquem habeat dolorem in altero latere, & an alterum altero sit calidius, & reclinato ægro in latus sanum, interrogare ipsum, an videatur ipsi grave quid ex superno latere incumbere. Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo gravitas affuerit. Cæterum omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris non dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu vero amplior, & sudores multi oboriuntur, tussisque, ac tussiendo promptitudo ipsi adest, & nihil memorabile expuunt, & oculi cavi sunt, & maxillæ ruborem contrahunt, & ungues quidem manuum curvantur, digiti vero calefunt, & potissimum summi, & in pedibus tumores fiunt, & cibos non appetunt, & pustule per corpus enascuntur.

17 * Quæcumque igitur suppurationes daturæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsi valde habere oportet. Quæ vero breves sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex his, qualia in principis sunt. Simul autem & si aliquando difficiliter spiraverit homo. At vero quæ ex ipsis citius, & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet. Si quidem enim dolor in principis fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseverans ad vigelim diem pertingat, eruptionem tunc expectare oportet, aut etiam prius. Si vero quætor fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necessæ vero est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & sputationem, ante puris eruptionem. Ex his autem maxime superflites manent hi, quos febris eodem post eruptionem die dimiserit, & qui cibos cito appetiverint, & a siti liberati fuerint, & si venter parva, & compacta egerit, & pus album, & leve, & ejusdem coloris fuerit, & a pituita liberum, & citra dolorem, ac tussim fortem perurgeat. Ac optime quidem sic, ac celerrime liberantur, sin minus, hi quibus proxima his contigerint. At vero intereunt hi, quos febris non dimiserit, aut ubi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalcens apparuerit, & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetiverint, & si venter liquidus fuerit, & pus pallidum sive viride, & lividum expuerint, aut pituitosum, & spumofum. Si hæc omnia contigerint, pereunt. Quibus vero ex his quedam accesserint, quedam non, horum aliqui intereunt, aliqui in multo tempore superflites evadunt. Verum ex omnibus signis, quæ ad sunt tum in his, tum in aliis omnibus coniecturam facere oportet.

18 * Quibuscumque ex inflammari pulmonis morbis abscessus circa aures fiunt, & suppurantur aut ad infernas partes, ac fistulantur, hi superflites evadunt. Verum huiusmodi sic considerare oportet. Si & febris detinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputum pro ratione non prodierit, neque biliosæ, neque soluti faciles, & meracæ alvi egestionis fuerint, neque urina valde multa, & multam subsidentiam habens, indicatur autem superflites futurus ab omnibus reliquis salutari-
bus signis, tunc abscessus huiusmodi fore sperandum est. Fiunt autem partim ad infernas partes, quibus videlicet inflammatio aliqua circa præcordia affuerit, partim in supernis, quibus præcordium molle, & doloris exors permanferit, & ubi spirandi difficultas, quæ per tempus aliquod affuit, desierit citra aliam manifestam causam. Cæterum abscessus ad crura, in pulmonis inflammationibus sortibus, ac periculosis, omnes quidem utiles sunt, optimi vero sunt, qui dum sputum jam in mutatione est, fiunt. Si enim tumor, & dolor fiat, sputo pro flavo purulento sentia, & foras procedente, ita securissime homo superflites evaserit, & abscessus absque dolore celerrime sedabitur. Si vero sputum non bene processerit, neque urina subsidentiam bonam habens apparuerit, periculum est claudum fore articulum, aut multum molestiarum exhibiturum. At si evanescent, & recurrant abscessus, sputo non prodeunte, febreque permanente, horrendum est. Periculum enim est, ne deliret homo, & moriatur.

19 * Ex suppuratis a pulmonis inflammatione, seniores magis intereunt. Ex aliis autem suppurationibus, juniores magis moriuntur. Dolores cum febre sentientes, circa lumbos, & infernas partes, si septum transversum attigerint, infernas partes relinquentes, perniciosi valde sunt. Proinde aliis quoque signis animum advertere oportet. Nam si quod etiam ex aliis signis malum apparuerit, desperatus est homo. Si vero assiliente ad septum transversum morbo, alia signa non mala accesserint, hunc suppuratum fore multa spes est. Quicumque vero suppurati urinentur, quibus quidem purum pus fuerit, & album, & non foetidum, hi servantur, quibus autem subcrenatum, & coenofum, hi pereunt. Porro vesicæ duræ, & dolentes, penitus quidem horrendæ, ac perniciosæ sunt, perniciosissimæ vero, quæ cum febre continua fiunt. Etenim dolores ab ipsis vesicæ ad occidendum sufficient, & alvi non egerint hoc tempore, nisi durum quiddam, & hoc coactæ. Solvit autem urina purulenta micta, quæ albam, ac levem subsidentiam habet. Si vero neque ab urina quicquam remiserit dolor, neque vesica molliatur, & febris continua fuerit, in primis circuitibus morbi ægrum moriturum esse, timor est. Atque hic modus potissimum pueros corripit septennæ, donec ad quinquem decimum annum pervenerint. * Febres judicantur in iisdem numero diebus, ex

- 305 quibus & superstites evadunt homines, & ex quibus pereunt. Etiam placidissimae febres, & signis securissimis rigentes, quarto die desinunt, aut prius. Maxime vero, & signis horridissimis rigentes, quarto die, aut prius occidunt. Primus igitur ipsarum insultus sic desinit. Secundus autem ad septimum producit. Tertius ad undecimum. Quartus ad decimum quartum. Quintus ad decimum sextum. Sextus ad vigesimum. Hi igitur impetus ex acutissimis morbis, per quatuor
310 ad viginti, & ex additione desinunt. Non potest autem quicquam horum integris diebus exacte numerari. Neque enim annus, & menses, integris diebus, numerari possunt. Postea vero eodem modo, juxta eandem additionem, primus circuitus quatuor, & triginta dierum est, secundus quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum. At in horum principis difficilimum est cognoscere eos, qui in plurimo tempore judicabuntur. Similima enim sunt ipsorum principia. Verum a primo die animadversionem facere oportet, & prout singuli quaternarii adduntur considerare, & non larebit te, quo vertetur morbus. Fit autem & quartanarum febrium constitutio ex huiusmodi ordine. * Qui porro morbi in brevissimo tempo-
320 re judicabuntur, faciliores cogniti sunt. Maxime enim differentia ab initio ipsis sunt. Qui enim superstites ab ipsis evasunt, facile spirantes, & doloris exortes sunt, & noctu dormiunt, aliaque signa securissima habent. Qui vero morituri, agere spirantes sunt, delirantes, vigilantes, aliaque signa pessima habentes. Ut igitur his ita contingentibus, conjectare oportet, & juxta hoc tempus, & juxta
325 unamquamque additionem, tendentibus ad judicationem morbis. Juxta eandem rationem mulieribus quoque judicationes fiunt ex partu. * Capitis dolores fortes, & continui cum febre, si quidem lethalius signorum quid accesserit, periculosi valde sunt. Si vero absque talibus signis dolor viginti dies transierit, & febris tenuerit, sanguinis a naribus eruptionem, aut abscessum quemdam ad infernas partes expectare oportet. Sed & quamdiu dolor recens fuerit, similiter sanguinis e naribus eruptionem, aut puris eruptionem sperare convenit cum alias, tum si do-
330 lor circa tempora, & frontem fuerit. Verum sanguinis eruptio magis expectanda est junioribus triginta quinque annis, senioribus vero puris eruptio. Auris dolor acutus cum febre continua, ac fortis, horrendus est. Periculum est enim deliratorum esse hominem, ac perituum. Proinde quum hic modus nimis tutus sit, cito mentem advertere oportet etiam aliis signis a primo statim die. Pereunt autem juniores homines septimo die, & adhuc citius ex hoc morbo. Senes vero longe tardius. Nam & febres, & deliria minus ipsis accidunt, & hac de causa aures antea suppurantur. Verum his quidem aetatibus recidiva morbi contingentes, plurimos occidunt. At vero juniores, priusquam suppurent aures, pereunt. Nam
340 si pur album effluxerit ex aures, spes est juvenem superstitem evasurum esse, si sane & aliud quoddam bonum signum ipsi accedat. * Fauces exulceratae cum febre, horrendae sunt. Verum si quod aliud item signum accedat ex his, quae antea mala esse judicata sunt, in periculo hominem versari praedicandum est. Angina horridissima sunt, & citissime occidunt, quae neque in faucibus quicquam conspicuum faciunt, neque in cervice, verum plurimum dolorem exhibent, & erecta cervice spirationem inducunt. Haec enim eodem die suffocant, secundo item, ac tertio, & quarto. Quae vero aliqui similiter dolorem exhibent, attolluntur autem, & in faucibus rubores faciunt, periculosae quidem valde sunt, verum prioribus magis diuturnae, si rubor fuerit magnus. Quibuscumque vero fauces, & cervix simul rubuerint, haec anginae diuturniores sunt, & ex ipsis maxime evadunt, si & cervix, & pectus ruborem habuerit, & erysipelas ignis sacri non intus regreuerit. Si vero neque in diebus judicatoriis dissipetur erysipelas, neque tuberculum ad externam partem convertatur, neque pus tussiendo rejiciatur, facileque, ac sine dolore degere videatur, mortem significat, aut ruboris recidivam. Securus est autem tumor, & ruborem quammaxime foras verti. Si vero ad pulmonem vertatur, & delirium inducit, & quidam ex ipsis suppurati plerumque fiunt. * Gurguliones periculosi sunt ut & recescentur, & scarificentur, quamdiu rubicundi fuerint, & magni. Nam inflammationes ad hos succedunt, & sanguinis eruptiones. Quare tales aliis machina-
360 mentis attenuare conari oportet hoc tempore. Quum vero totum jam fuerit seuerum, quod sane uvam appellat, & hac extrema gurgulionis pars major, & rotunda, superior autem tenuior, in hoc tempore tutum est rem aggredi. Praestat tamen & alio subducta, chirurgica haec utri, si & tempus permittat, & homo non stranguletur. Quibus febres cessant, neque signis solutoriis apparentibus, neque in diebus judicatoriis, his reverentia esse expectandum est. Quaecumque febris longiorem moram traxerit, homine aliquo ad salutem disposito, ita ut neque dolor teneat ad inflammationem, aut ob aliquam aliam manifestam causam, huic abscessum expectare oportet cum tumore, ac dolore ad aliquem articulum, vel maxime inferiorem. Finit autem huiusmodi abscessus magis, & in breviore tempore his, qui juniores sunt triginta annis. Expectare vero statim oportet abscessum, si febris detinens viginti dies transierit. Senioribus autem minus sunt, diuturniore etiam existente febre. At vero huiusmodi abscessum expectare oportet, febre continua existente. Verum ad quartanam deducitur, si intermiserit, & erro-

- & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens, ad autumnum appropinquarit. Quemadmodum autem junioribus triginta annis abscessus fiunt, ita quatuordecim magis his, qui triginta sunt annorum, & senioribus. Cæterum hæc nosse ex-
 25 pedit, abscessus magis hyeme fieri, tardiusque cessare, & minus recurrere. * Qui-
 cumque vero in febre non lethali dixerit sibi caput dolere, aut etiam præ oculis ob-
 scurum quiddam apparere, si & oculi ventris morbus huic accesserit, ei biliosus
 vomitus aderit. Si vero etiam rigor accesserit, & partes infra præcordium frigi-
 das habuerit, citius adhuc vomitus aderit. At si quid bibet, aut edere sub
 hoc tempore, valde cito vomet. Porro quibus horum dolor fieri inceperit primo
 die, hi quarto magis, quam quinto premuntur, septimo vero liberantur. Plerique
 tamen ipsorum tertio die dolere incipiunt, vexantur autem maxime quinto, libe-
 rantur nono, aut undecimo. Qui vero inceperint quinto die dolere, aliaque juxta ra-
 tionem priorum ipsis fiant, his ad decimum quartum morbus judicatur. Fiunt autem
 hæc & viris, & mulieribus, maxime in tertianis. Junioribus vero fiunt quidem
 & in his, verum magis in continuis febribus, & in sinceris tertianis. Quibus-
 cumque vero in hujusmodi febre caput dolentibus, pro eo, quod obscurum quid-
 dam præ oculis appareat, visus hebetudo contingit, aut splendor ob oculos ob-
 390 versantur, & pro oculi ventris morbi in præcordiorum dextra, aut sinistra
 parte aliquid tenditur, neque cum dolore, neque cum inflammatione, sanguinem
 de naribus his pro vomitu fluxurum esse, expectandum est. Magis tamen & hic in
 juvenibus sanguinis eruptionem expectare oportet, his autem, qui triginta sunt
 annorum, & seniores adhuc, minus: verum vomitus in his expectari debent.
 395 * At vero pueris convulsiones fiunt, si febris fuerit acuta, & venter non egesse-
 rit, & vigilarint, & terreantur, & ejularint, & colorem mutarint, & viridem,
 sive pallidum, aut lividum, aut rubrum contraxerint. Fiunt autem hæc promptissime
 quidem pueris nuperrime editis, usque ad septimum annum. Seniores autem pueri, &
 viri non amplius in febribus corripiuntur convulsionibus, si non quid ex signis
 fortissimis, ac pessimis accesserit, qualia sane in phrenitide fieri solent. Periculosos
 400 porro, & superstitiosos futuros tum pueros, tum alios, ex omnibus signis conjecta-
 re oportet, pro ut singula de singulis perscripserim. Atque hæc & de acutis mor-
 bis, & de his, qui ex ipsis fiunt, dico. Qui vero recte prænoscere volet, & su-
 perstitiosos futuros, & morituros, & quibus per plures dies, & quibus ad paucio-
 405 res morbus duraturus est, cum signa omnia edicere, & judicare posse convenit,
 ita ut vires ipsorum inter se conferendo expendat, quemadmodum perscriptum est,
 & de aliis, & de urinis, & de sputis, ubi simul & pus, & bilem agrotos tullen-
 do rejecerit. * Quin & impetus morborum semper populariter grassantium cito anim-
 410 advertere oportet, & temporis constitutionem non ignorare. Probe tamen id
 nosse expedit de conjecturis certis, & aliis signis, & non ignorare, quod in om-
 ni anno, & omni tempore mala malum, bona bonum significant. Nam & in
 Lybia, & Delo, & Scythia præscripta signa vera comperiuntur. Proinde scien-
 dum est, minime difficile esse, in iisdem regionibus posse aliquem pleraque ex ipsis
 415 assequi, si memoria tenens ipsa, indicare, ac recte expendere sciat. Cæterum
 nullius morbi nomen desiderare oportet, quod hic non est adscriptum. Omnes enim,
 qui in prædictis temporibus judicantur, ex iisdem signis cognoscere.

HIPPOCRATIS COI PRÆDICTIONUM LIBER I.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Phrenitici, Nasus desillans, Alvi profu-
 vum rubicundum. Lingua aspera. Uri-
 nae phreneticorum, Insomnia phreneticorum.
 Scretio frequens. Ardore in præcordio re-
 licti. Desipentia prædilatatorum pesti-
 ma. Phrenetica effluvia.
- 2 Vomitus aruginosi, Facium affectiones.
 Assuetudo in phrenitidis. Sputatio fre-
 quens. Alvi alba exillio. Rigores. Tre-
 mores qui pessimi, Insania signa.
- 3 Aurium sonitus in febribus. Alentis percal-
 siones cum voce clausura. Lingua tremu-
 Hipp. Opera.

- la. Excrementa spuriosa. Excrementa flo-
 rida. Circa latus vari dolores. Pocis in-
 terceptiones. Alentis motiones modice forees.
 4 Atoribus molle ferre. Phrenitidis nota. In
 phrenitidis permutationes. Urina quæ min-
 guntur a non recordantibus. Palpitationes
 per totum. Spatiationes in phrenitide. Sur-
 disas, & urina non considerens. Fatuitas
 ex morbo regio. Sarditas in morbis acutis.
 Alentis emotiones. Turpores ex rigore.
 5 Dolores circa umbilicum. Urina imstantia.
 Alentis morvandorum signa. Sudores circa
 caput. Impotentia præter vasorum vacua-
 tionem rationem. Alvi interceptio.

- 6 Lumborum dolor. Extremitates cito intrinsecus peritum transmutata. Responsio serena in moderato. Oculi bebes, & fixi. Dentium frigidus. Tarditas urinae.
- 7 Egestiones alvi spumosa. Excrementa spumosa. Urinarius interceptiones. Egestiones spumosa alba. Vacis interceptiones in febribus. Febres ex praecordiorum doloribus. Sitis in morbis acutis praeter rationem soluta. Urina mala.
- 8 Vomitus mali. Sopor. Ignorantia. Perfrigerationes ex rigore. Ardore. Rigore affusio. Dolor in pectore firmatus.
- 9 Vomitus nigricans. Qui medicamentis non sunt purgandi. Oris ventriculi dolor. Urina fermentata. Colli dolor.
- 10 Febres malignae. Horripores per dorsum delatantes. Anxie se insistantes. Perfrigeratio cum dysuria. Excrementa prodeuntia non sentire. Vomitiones biliosa. Alborum ex parte detentio. Excrementa biliosa aquosa. Syderationes repentinæ.
- 11 Lumborum doloris. & ad os ventriculi reclusiones. Oculi contrahitio in morbo acuto. Fauces dolorosa. Opisthotonus rigor. Praecordiorum dolor. Corarum doloris.
- 12 Vacis defluxio. Fatuitas ex aestuibus ardentibus. Singultus indicans. Sopor spumosis prodeuntibus. Vacis interceptiones capitis doloribus. Nigra quibusque vacis Vacis interceptiones cum exsultatione. Lateris dolor ex spiritus biliosis.
- 13 Alvus inflata. Alvi circumscriptio. Lumborum dolores diuturni. Affectus insuper rigentes.
- 14 Sudors in principio, vixit concolis. Capitis dolor uterum gerentium. Dolores strangulatorii in faucibus. Tremor convulsorii. Lumborum dolor. Excrementa subtrita.
- 15 Fauces exasperata. Sensus malus. Purgationes mirae. Excitationes a somno. Dorsi, & colli perfrigerationes. Cubiti
- & colli dolores. Sinitus in faucibus. Dolores ad inferas partes.
- 16 Caput exardens. Egestiones subfrabiles, liquida. Alvi egestiones alba. Lumborum dolores ad collum, & caput progressi.
- 17 Convulsiones in ateri strangulamentibus. Vessicae interceptio. Opium circa tempora distillatio. Sputa in sudore febricitanti defluantia. Abscessus, modice emoretis. Vacis interceptiones cum sapore.
- 18 Convulsiones oculi. Sanguis ex contrario erumpens, malum. Excrementa nigra post sanguinis eruptionem. Vulnere sanguinem fundentia, exardentia. Sorditas post sanguinis eruptionem. Lumborum, & os ventriculi dolor, aut hamorrhoides.
- 19 Sanguinis eruptiones. Ateri status turbulenti. Urina aquosa. Sanguinis eruptiones plures. Sanguinis eruptiones in iudicatoriis perfrigerationibus. Sanguinem fundentes.
- 20 Recursus ex lumbis ad caput. Egestio nigra ex sanguinis lora eruptione. Parva & raribus distillatio. Febres ex rigore cum lassitudine. Sanguinem effluentia.
- 21 Sanguis & raribus fluxum solvit vena fessio. Sanguinis eruptionis signa. Sanguinis stillicidia. Sopor in horribus. Sanguinis stillicidia. Rigor quibus fluxionem sistat. Sanguinis eruptiones quae morbus solvant. Sanguinis erumpentis bona. Abscessus iuxta aures.
- 22 Suboparati morbo regio affecti. Abscessum iuxta aures futurorum notio. Anxiosa vigilie. Ex volubus praevolentibus. Ex sorditate. Leviter fridat.
- 23 Convulsio modo exacerbata. Urina aquosa alba imitantia habentes. Spiritum magnum, & frequentem habentes. Soporosa, anxiosa, praecordia dolentia.
- 24 Alvi nigra steruata egeris. Testicula cum sputatione. Sopor, & sorditas in capite dolore. Praecordii distentio.



SOPOROSI in principiis evadentes, cum capitis, lumborum, & praecordii, colli dolore, vigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus tum alias, tum quarto ab initio die. Alvi proluvium valde rubicundum, malum quidem est in omnibus morbis, non minime vero in praedictis. Linguae asperae, & reliquae phreniticae. In turbatis vigilantibus, urinae decolores, nigrae, innatantes in sudoribus, phrenitici. Phrenitice vehementer affectiones, tremulae desinunt. Vomitus in capitis doloribus ruginosi cum sorditate, & vigilis, cito insaniam affore, denunciant. Loci circa fauces in acutis morbis dolorosi, graciles, parvi, suffocatorii, quando hiarit ager, ut os claudere, & aperire non facile possit, mentis emotionem portendunt. Ex talibus phrenitici fiunt, & pernicioso affecti. In phreniticis in principio mansuetudo. Verum frequenter transmutari, malum id est, & sputatio mala est. In phreniticis alba alvi egestio malum, quemadmodum & Archetati. Num & in his torpor sit? Rigor in his pessimus. Quibus melancholico modo mente motis tremores accedunt, malignum hoc est.

Mente moti acutae, ubi insuper febricitant, cum sudore phrenitici fiunt. Phrenitici paucibus, stuporem valde percipientes, tremuli. Ex vomitu nauseabundo oborta clangorosa vox, oculi pulvillum incumbens habentes, insaniam portendunt, quemadmodum etiam Hermozogae uxor, insaniam a-

3 eute correpta, voce destituta, mortua est. * In febre ardenti sonitibus aurium
 accedentibus, cum visus hebetudine, & gravitate in naribus accedente, melan-
 cholio modo mente moventur. Mentis percussiones cum voce clangoro-
 sa, linguæ convulsiones tremulæ, & voces tremulæ sientes, mortem alienant:
 durities in his perniciofa est. Linguæ tremulæ signum sunt mentis non
 firmæ. In biliosis meracis alvi egestionibus, spumola florulentia mala tum
 alias, tum si cui lumbi antea doluerint, & mente motus fuerit. Rari circa la-
 tus in his dolores, desipientiam significant. Vocis interceptiones cum singul-
 tu pessimæ. Vocis interceptiones cum exolutione pessimæ. In vocis in-
 terceptione, spiritus veluti his, qui strangulantur præ manibus expositus, ma-
 lus est. Num & talis mentem emovet? Modice feroces mentis emotiones
 4 ferinæ sunt. * Molestæ ferre morbum cum perfrigeratione, si non sine febre exis-
 dent partes supernæ, phrenitum portendit, quemadmodum etiam Aristago-
 ræ. Sed & perniciosum hoc est. Frequentes in phreniticis permutationes,
 convulsoriæ. Urinæ, quæ minguntur a non recordantibus, n-æ commune-
 factis, perniciose. Num his minguntur, velut si subsidentiam conturbasset? 40
 Palpitantes per totum, num voce destituti moriuntur? Sputations in
 phreniticis cum perfrigeratione nigre revolvuntur. Surditas, & urinæ non
 confidentes, valde rubicundæ, immitantes, mentis emotionem portendunt. His
 morbo regio corripit malum est. Mala est & ex morbo regio fatuitas. Hos voce
 quidem destitui, verum sentientes esse contingit. Arbitror autem, & alvos his
 perumpere, velut contigit Hermippo, & mortuus est. Surditas in morbis
 acutis, & turbulentis consequens, mala. Mentis emotiones tremulæ, obscu-
 ræ, palpitoria, valde phreniticæ sunt. Velut & Didymarcho in Co. Tor-
 5 piores ex rigore, non valde apud se ipsos sunt. * Dolores cireum umbilicum
 palpitantes, habent quidem aliquid, quod mentem emovet. Verum circa iudica-
 tionem his spiritus acervatus cum prompta tensione penetrat. Et dolores cir-
 ca suram, in his mentis emotionem faciunt. Si innatarit quid in urina, do-
 lore circa femur dissipato, mentis emotionem portendit. & qualia circa aurium so-
 nitus contingunt, talia existant. In alvo liquida lassata, caput dolenti, siti-
 culoso, vigilant, obscure loquenti, impotenti, quibus talia sunt, his timor est,
 ut mente moveantur. Exundantes, & maxime circa caput, in morbis acutis sub-
 moleste ferentes, malum tum alias, tum in urinis nigris, & turbidis spiritus
 in his malus. Impotentia præter vacuatorum vasorum rationem contingen-
 tes, non existente vasorum variatione, malum. Alvi interceptæ, sed parva,
 nigra, velut capraturæ stercore ad necessitatem coacte emittentes, natus in his e-
 6 rumpens, malum. * Quibus lumborum dolor diutinus, cum ardore fastidio-
 so, ac nauseabundo, hi si exudent, malum est. Num his tremores sunt? Sed
 & vox velut in rigore conspicua? Extremitates si in utramque partem cito transmi-
 tentur, malum est. Et sitis huiusmodi mala est. Ex moderato serox responso, ma-
 lum. Vox acuta, his præcordia intro trahuntur. Oculis hebes, malus; 65
 & fixus, ac caliginosus, malus. Vox acuta, clangorosa, mala. Dentium
 stridor perniciosus est, quibus non & sanis familiaris est. Suffocatio in his val-
 de mala. Faciei bonus color, & vehemens torvitas, malum. Egestio-
 nes alvi. desinentes in spumosas metacas, exacerbatoriæ sunt. Urinarum
 in morbis acutis ex perfrigeratione interceptiones, pessimæ. Perniciofa si
 7 citra signa, levia facta fuerint, mortem significant. * In morbis acutis biliosis
 valde albæ, spumosæ, circumbiliosæ egestionibus, malæ. Malæ item & urinæ evis-
 modi. Num his hepar dolorosum est? Vocis interceptiones in febribus con-
 vullorio modo sientes, ad mentis emotionem cum silentio deveniunt, pernicio-
 sum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortem inducunt. Fe-
 75 bres ex præcordiorum doloribus malignæ. Sitis præter rationem soluta in acutis
 morbis, mala est. Sudor multus cum febribus acutis siens, malus est. Et ri-
 rinæ dolorosæ malæ sunt. Et rubicundæ ex his florulentia decetæ, itemque
 æruginosæ malæ sunt, & parvas apparere veluti stillas. Et vomitus cum va-
 rietate mali sunt tum alias, tum si propius inter se prodeant. Quæcumque in
 80 diebus iudicatoriis, cum anxietudine, abique sudore perfrigerantur, malum est.
 Et quæ ex his insuper riguerint, mala sunt. * Vomitus meraci, anxiosi, mali.
 Sopor nimis ubique malus est? Ignorantia cum rigore malum. Malum item
 oblivio. Perfrigerationes ex rigore non recalescentes, malæ sunt. Sudan-
 tes ex perfrigeratione recalescentes, malum. In his ardor dolorosus in lateribus,
 & insuper rigore, malum est. Æstuosi rigores aliquatenus perniciosi, & sum-
 mea facies cum sudore in his mala est. In his posteriorum partium frigidi-
 tas convulsionem accersit. Exundantes vigiles recalescentes, malum. Ex lumbo-
 rum recuris, oculi distortio malum. Dolor in pectus firmatus cum torpore
 9 malus. Hi si insuper febriant, acute ardentes, moriuntur. * Qui nigra revolvunt,
 cibos averlantur, deliri sunt, juxta pubem parum dolorosi, oculum ferocem, aut
 clausum habent, eos medicamentis purgare non oportet. Perniciosum enim est.
 Neque inermescentes, vertiginosus, in leviter vagando deficientes, cibos aver-
 lantes,

- fantes, decolores, neque in febre fractos, si soporosi fuerint. Perniciosum enim
 95 est. Oris ventriculi dolor cum præcordio distento, & capitis dolor, malignum,
 & quidpiam anhelosum. Num hi repente moriuntur? velut in Dysode. Hinc et-
 iam urinae vehementer fermentatae, erant valde rubicundae. Colli dolor ma-
 lum quidem in omni febre, pessimum autem his, quibus timor est, ut infaniant.
 100 * Febres soporosae, lassatoriae, caliginosae, vigilas inducentes, exudantes, ma-
 lignae. Horrores frequentes ex dorso celeriter translabentes, molesti, urinae in-
 terceptionem dolorosam significant. Qui anxie se iactantes citra vomitum
 exacerbantur, male habent. Petrifrigeratio cum duricia signum malum. A
 ventre tenuia non sentienti prodire, ei qui est apud se ipsum, perniciosum, vel-
 105 ut Hepatico. Vomitiones exiguae biliosae, malae tum alias, tum si insuper vigila-
 verint agri. Nafus in his destillans, perniciosum est. Quibus ex partu alba deri-
 ventur cum febre, surditasque adest, & in latere dolor acutus, hæ perniciose men-
 te moventur. In febris ardentibus subperfrigerantibus, egestionibusque alvi bi-
 liosis, aqiosis, frequentibus, oculorum distortio signum malum est tum alias, tum
 si stupore prehensi detineantur. Siderationes tepentiae ei, qui exolvit, ae-
 110 diutine insuper scribit, perniciosae sunt: quale quiddam passus est Numenii fi-
 lius. * Ex lumborum dolore ad os ventriculi recursiones, febriculosae, horri-
 dae, revomentes aquosa tenuia multa, mente motae, voce defactae, nigrorum
 vomitu fracto, moriuntur. Oculi contractio in morbo acuto, mala. Num
 anxie se iactantibus citra vomitum, lumbos dolentibus, si setocet mente mo-
 115 ti fuerint, spes est, ut nigra per alvum prodeant? Facies dolorosae, graci-
 les, cum acre tolerabili molestia, strangulatoriae, perniciosae acutae. Quibus spi-
 ritus retrahitur, vox autem strangulatoria est, & ventera intro confidet,
 his in fine velut contrahente quodam spiritu fit. Caput dolentes, &
 stupore detenti delirantes, alvo intercepta, oculum ferocem præ se ferentes,
 120 florescentes, opisthothono posteriorum partium convulsoria distentione cortipiun-
 tur. In oculorum distortionem, febriculosam, lassatam, rigor perniciosus. Et
 soporosi in his, malum. In febris ad præcordium dolores, sine voce,
 si sudore non solvantur, maligni sunt. His dolores ad coxas, una cum fe-
 bre ardente, & si alvus acervatim eruperit, perniciosum. * Quibus voces
 125 cum febris deficientes post iudicationem, hi trementes, ac soporosi moriun-
 tur. Quibus affectiones ardentes, fatuitatem inducentes, stuporis detentio-
 nem inferentes, præcordia variantia, & ventris tumor, cibis interceptis, in
 sudoribus, num his turbidus spiritus, & geniturae simile quid superveniens,
 singuleum indicat? Sed & alvus spumosa, biliosa, insuper egera? Splendi-
 130 dum in his mihi prodest. Venter autem his insuper turbatur. Qui-
 bus sopor fit, spumosis prodeuntibus, his febris exacerbatur acuta. Ex capi-
 tis dolore vocis interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxantur in
 se ipsos, huiusque morbi revertentes diutius durantes. His insuper rige-
 re, non malum est. Manus tremulae, caput dolentes, collum dolentes,
 135 subfundi, mingentes nigra densata: quibus hæc sunt, his nigra ventura esse
 expectare oportet, perniciosum. Vocis interceptiones cum exolutione, stu-
 pore detinente, perniciosae. Lateris dolor, ex spuris biliosis, citra rati-
 onem si evanuerit, mente moventur. * Ex colli dolore, soporoso, sudan-
 ti, alvus inflata, si sane ad necessitatem liquida demiserit, infuso immisso sub-
 140 luta; ex his ea, quae biliosa non sunt, supprimuntur. Talia vero si servantur re-
 tentia, longius agrotat. Num itaque proluvia, quae biliosa non sunt, melliora
 sunt? & statuo tumori profuerint? Alvi circummensio, ad necessitatem li-
 quida demittens, cito intumescens, habet quid convulsorium, velut etiam A-
 psalii filio. Superrigere his perniciosum. Ex his convulsus factus, ac infla-
 145 tus, ubi diutius agrotasset, ori putrefactio viridis supervenit. Quibus cir-
 ca lumbos tenues diuturni dolores, ad præcordium se revolventes, & cibo-
 rum fastidium inducentes una cum febre, his ad caput dolor intentus pro-
 gressus, repente convulsorio modo occidit. Affectiones insuper rigentes, &
 quae ad noctem aliquanto magis exacerbantur, cum vigilis, & delirio
 150 in somnis, aliquando urinas involuntarie emittentes, in convulsiones sopo-
 rosas delinunt. * A principio exudantes urinas concoctis, ardentes qui citra
 iudicationem perfrigerantur, brevi circum circa ardentes. Torpidi item,
 soporosi, convulsi, perniciose affecti sunt. Utenum gerentibus capitis dolo-
 res, soporosi, cum gravitate senties, mali sunt. Fortassis autem his etiam
 155 convulsorium quid pati contingit. In faucibus gracilibus dolores strangulatorii
 habent quid convulsorium tum alias, tum a capite aborti. Velut et-
 iam Thersynontis consobrina. Tremores convulsorii senties in sudoribus,
 reverti solent. Iudicatio his fit, ubi superriguerint. Superrigere hi ar-
 dore circa ventrem provocati. Lumborum dolor, & capitis dolor, &
 160 ris ventriculi dolor, cum excreatione violenta, convulsorium quid habet.

* A ventre sublivida, turbulenta, & lotia tenuia, ac aquosa, suspecta.
 Fauces exasperatae parum, & venter murmurans inanibus ad egerendum
 surrectio-

infectionibus, & stontis dolores, & palpanes, delassati, in stragulis, ac vestimentis dolorosi. Quæ ex his augentur, difficilia sunt. Somnus multus in his convulsivior, & dolores in frontem graves, & mixtio difficilis.

Urinæ suppressio quibus rigores, & in convulsivioris affectionibus, velut & ipsa, ubi inhorruit, sudavit. Meracæ desinentes purgationes, omnibus quidem exacerbatorie sunt. His vero etiam valde. Ex talibus etiam circa

aurem abscessus exurgunt. Turbulentæ ferocissimæ & somno excitatio- nes, convulsivioræ sunt tum alias, tum cum sudore. Et colli, & dorsi

perfrigerationes apparentes, sed & per totum corpus. In his etiam spumose mictiones, una cum animi deliquio, & oculorum obscuratio, convulsio- nem prope adesse significant. Cubiri, ac colli dolores convulsivior. A facie autem hi. In faucibus sonitus frequentes, cum salivæ sputatione. In

his in somnis sudores, boni. Num & sudore levati, plurimis non malum est. Dolores ad infernas partes, his toleratu faciles. In febribus exudan-

tes, caput dolentes, alvo intercepta, convulsi sunt. Subfrigibiles liquide alvi egestionis, perfrigerantes non sine febre, malæ sunt. Rigores ex

his vesicam, & ventrem occupantes, dolorosi. Proinde soporem his habere aliquid convulsivior, non sane mirum apud me fuerit. Quæ in ac-

cutis vomitorio modo trahuntur, mala sunt. Et albæ alvi egestionis, diffici- les. Non viscosa ex his progressa, cum multo ardore ad mentis emotionem perveniunt. Num ex his soporosi torpidi sunt? Morbi ex talibus diutius du- rant. Num circa iudicacionem hi arescentes difficulter spirantes?

Quæ ex lumbis ad collum, ac caput progressa sunt, & levis syderationis modo resolverunt, convulsoria sunt, & mentem emoveant. Num & solvuntur talia convulsione? Ex talibus varie agrotant, & per eadem progressi.

Convulsiones in his, quæ ab utero strangulantur sine febre, faciles sunt, velut etiam Dorcadæ. Vesica intercepta tum alias, tum cum capitis dolore, habet quid convulsivior. Quæ in his cum corpore exolvuntur, difficilia sunt, non tamen perniciofa. Num id, quod tale est, etiam mentem emoveat?

Num & osium circa tempora dissectiones, convulsionem accipiunt? aut si quis ebrius verberetur, aut sanguis multus effluat in principis, num hoc facit convulsionem? In sudore spura desluentia febricitant, levia sunt? Num ad dies aliquot alvi humectantur? arbitror. Num his ad articulos

abscessus fieri? Quæ modice levociter mentem emoveant, arrabilaria sunt. Si vero a muliebrum purgationum retentione fuerint, ferua. Hæc vero sæpius accidunt. Num & convulsæ sunt hæ? Num & vocis interceptiones cum so-

pore convulsivioræ sunt? Velut cotiarum filia, quæ muliebrum purgationibus præsentibus affecti coepit. Quibus convulsis oculi intente relu-

cent, neque apud se ipsos sunt, & diutius agrotant. Sanguinis eruptiones ex contrario malæ sunt, velut in splene magno, si ex dextra nare fluat. Er circa præcordia eodem modo res se habet. Verum cum sudore hoc peius est.

Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus, perfrige- scencia maligna, ac prava. Post sanguinis eruptionem, nigrosum per

alvum transit, malus. Prava sunt etiam valde rubra. Num vero quar- to die hæc sanguinis eruptio contingit? Soporosi ex his convulsione mori- untur. Num nigris prægressis, & ventre tumefacto? Vulnera san-

guinem fundentia, exudantia, maligna. Sic affecti, loquentes latenter mori- untur. Post modicam sanguinis eruptionem, & nigrosum egestio-

nem, in acutis surditas, malum. Sanguinis egestio in his perniciofa. Verum sudorem solvit. Lumbis dolentibus oris ventriculi dolores ac- cedentes, signa hæmorrhoidum fluxionis suræ sunt. Arbitror autem &

hos prægressæ hæmorrhoidum eruptionis signum esse. Sanguinis e- ruptiones statim temporibus fientes, sicciosæ, difficiles, ac exolventes, si san-

guinem non effuderint, in comitalem morbum finiunt. Morbi, qui statim turbulenti sunt, insomnes, sanguinem de naribus stillan-

tes, sexta die allevati, noctu affluerunt, postredie exudarunt, in somnumque delati mentem emoverunt, hi large sanguinem fundunt. Num & aquo- sa urina rale quid significat? Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis

progressi alvi male afficiuntur, si non urinæ concoectæ fuerint. In iudicatoriis perfrigerationibus, sanguinis eruptiones fortes pessimæ sunt. Capite gravati iuxta sineput dolentes, insomnes, sanguinem profun-

dunt tum alias, tum si quid ad collum contendant. Vigilii infestati, derepente cum inquietâ jactatione, sanguinem fundunt tum

alias, tum si quid antea perfluxerit. Num ubi inhorruerint? Colli do- lores, oculi valde rubicundi, sanguinis eruptionem significant. Quibus al-

vo suppressa sanguinis eruptio fit, & insuper rigent, num alvus intestinorum levitate corripitur, & obdura fit, aut ascrides insunt, aut utrumque?

Quibus ex lumbis recursus fit ad caput, & manus, hi stupidi, os ventricu- li dolentes, saniosis, ac serosis humoribus pleni, large sanguinem profun-

- dunt. Sed & alvus his turbulentis erumpit. Quibus ex sanguinis eruptione larga, ac frequenter, nigrorum multorum fit egestio, hi suppressa alvo dolorosi sanguinem profundunt. Cum quadam vero fluxione, facile serunt.
- 335 Num hi multos frigidos sudores excludunt? Conturbata in his urna, non mala, neque id, quod genitura simile in ipsa residet. Verum frequenter hi aquosa mingunt. Quibus in surditate, & torpore parva est a naribus destillatio, ea habet quid difficultatis. Vomitus his confert, & alvi perturbatio. Quibus ex rigore febres cum lassitudine, his mensis muliebres decurrunt.
- 340 At collum in his dolorosum, sanguinis eruptionis e naribus signum est. Et per nares sanguinem effundere spes est, ea quæ caput concutunt. Et quæ aurium sonitum faciunt, sanguinem profundunt, aut menses deducunt tum alias, tum si juxta spinam ardor consequetur. Fortassis autem & dysenteriam facient. Er circa ventrem palpitaciones cum præcordii intensione sublonga,
- 345 ac tumente, sanguinis eruptionem significant. Inhorrescunt autem hi. * Quæ larga, violenta, multa ex naribus fluxerint, aliquando ad convulsiones adducunt. Venæ sectio solvit. Frequentes & paulatim fientes ad egerendum surrectiones, sufflavæ, viscosæ, modica stercoreacea habentes, cum præcordii, ac lateris dolore, morbo regio participant. Num autem
- 350 hi suppressis aures exolvuntur? Arbitror sane. Et sanguinem profundunt? His tensio lumborum, & dolores in his, sanguinis eruptionem significant. Præcordii tensio cum capitis gravitate, ac surditate, & quæ ad hæc consequenter divexant, sanguinis eruptionem indicant. Undecimo die sanguinis sufflicidia difficilia tum alias, tum si superstillaverint. Qui in horribus simul judicatorie exudarunt, postmodum vero postquam inhorruerunt, præter rationem vigilant, eos sanguinem effusuros esse, arbitror. Quibus ab initio largæ sanguinis eruptiones, rigor fluxionem sistit. Ex sanguinis eruptione, rigores longi. Quibus capitis dolores, ac colli dolores, & totius corporis impotentia quadam, sanguinis eruptiones solvunt. Sed e
- 360 tempore sic solvuntur. Urinæ, quæ in his, qui juxta aures abscessus habent, cito, & modice concoquuntur, malæ sunt. Et perfrigerari hoc modo malum est. * Suboporati, morbo regio affecti, non valde sentientes, quibus singultus, his alvus erumpit, fortassis & suppressa est. Hi exolvuntur. Num his etiam abscessus juxta aures fiunt? Suppressæ cum rigore urinæ malæ tum alias, tum si antea sopor apprehenderit. Num juxta aures abscessus, parotides dictos, in his fore spes est? Ex torminoso subsidencia limosa sublivida, mala est. Num ex præcordiis dolet puro dexterum? & exolvitur? Num abscessus juxta aures talibus parum dolorosi? Alvus erumpens his in omnibus perniciofa est. In anxiosis quibusdam vigiliis abscessus circa aures
- 370 maxime. Ex volvulis graveolentibus, in febre acuta, præcordiis sublimibus diutius permanentibus, abscessus circa aures oborti occidunt. Ex surditate leniter abscessus circa aures fiunt tum alias, tum si anxiosum quippiam succedat, & soporosis inter hos adhuc magis. Abscessus juxta aures leviter syderatis mali sunt. * Quæ convulsorio modo exacerbantur, cum
- 375 stuporis detentione, abscessus juxta aures producant. Convulsio, tremor, anxietas, cum stuporis detentione, parvos circa aures abscessus exacerbant. Num quibus abscessus sunt juxta aures, capitis dolore affecti sunt? Num & supernis partibus exudant, num insuper rigent quoque aliquo modo? Deinde & alvus erumpit, & soporolum quippiam habent? Num & aquosa urinæ alba innatantia habentes, & quæ varie exalbidæ sunt, ac foetide, abscessus juxta aures faciunt? Num quibus tales urinæ, frequentes sanguinem e naribus stille proficiunt, num & lingua his levis est? Quibus magnum, & frequentem spiritum habentibus, morbus regius, & febres acutæ cum præcordiis duris perfrigeratæ sunt, num his abscessus magni ad aures consiliunt?
- 385 Soporosa, anxiosa, præcordia dolentia, vomitoria parva symptomata. In his abscessus juxta aures oboriuntur. Antea vero & ea, quæ circa faciem sunt. * Alvo nigra stercoreacea egerent, sopor insuper apparet, abscessum juxta aures producit. Tussientia, quæ sunt cum sputatione, abscessum circa aures submovent. In capitis dolore sopor, & surditas circa aurem abscessum aliquem eructat. Præcordii dissentio cum sopore anxioso, ac capitis dolore, abscessus circa aures attollit. Dolorosi aurium abscessus, citra judicationem dissipati, mali sunt.

HIPPOCRATIS COI

PRÆDICTIONUM

LIBER II.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Veterum medicorum prædicendi modi varii.
- 2 Hippocratis prædictiones quales, quantumque a prioribus illis differant. Delirii cognitio ante indicationem ex antea visa. Ex hæmorrhoidibus prædictiones.
- 3 In prædictionibus præsentia adhibenda.
- 4 De exercitatis nihil certi prædici posse. Precata in morbis cognita difficilia, tamen si acri decumbant.
- 5 Potus uberior spirandi difficultatem inducit. In febrientibus nares multa significant.
- 6 Aëtorum, ac ægratorum mores cogniti, non tamen certam prædictionem permittunt.
- 7 Ægrorum inobedientia quomodo cognoscatur, Quam prædictionem Hippocrates approbet, aut damnet, Levior ægrorum delicta cognita difficilia, majorum vero ab Hippocrate hic cognoscendi ratio proponitur. Ægri matutinis horis considerandi, & inspicendi. Aëus, mores, & corporis vires in ægris consideranda. Rallum, ac flatuum consideratio.
- 8 Cœna liberior absque exercitio, Osiotum excrementa, Ebrui magis sudant, Cœtus modicus, aut frequens.
- 9 Excrementorum ægredientes. Excrementa tarde producta. Egredientes liquidiores. Excrementa osiotum. Egredientes liquidiores, & sine febribus fœnes.
- 10 Urina potum quantitati debet respondere. Urina aquosior, Urina stridens. Sanguinem mingere, raro quidem, & sine febre, ut dolore, Urina crassa cum subsidentia alba. Hippocratis de medicorum sui temporis prædictionibus iudicium.
- 11 Morbi congeniti curationem vix admittunt. Hydropici ut sint superflui, quomodo debeant esse affligi. Tumores hydropici. Tussis, hydropici sitis, lingua resicata, Ciborum appetentia. Alvus. Hydropicorum urina. Labor. Hydropici qui desperati. Atedii. Sanguinis multa sorsum, ac deorsum erupio in hydropice. Tumores magni emarcescentes, ac rufus sublati.
- 12 Tabidi qui superflui. Sputum tabidarum.
- 13 A capite fluentia. Venter. Flabium corporis. Pestis.
- 14 Qui interituri. Pessore suppurati. Qui possimum suppuratione, aut tunc moriantur. Pessore suppurati ex sanguinis eruptione. Abscessus sanguinolentissimi.
- 15 Podagrie. Senes a podagra non liberari. Dysenterie podagras inveteratas sanant. Iuvænam podagra curabilis.
- 16 Morbo sacro qui difficulter liberatur. Atque
- bi sacri differentia. Qui curari debeant, ac possint. Atrophia metus emationes incommoda. Abscessus ad inferna conversi.
- 17 Ulcerum cognitio quomodo fieri debeat. Species ulceribus curandis bona.
- 18 Quibus atavibus tubercula suppurata potissimum fiant. Caria ulcera. Cancro oculi. Herpes. Ulcerum curatio secundum loca facili, aut difficili. Ex articulis qui maxime periculo obnoxii. Ulcus in obliqua lingua parte.
- 19 Vulnere magis lethalia. Corporum structuras in effusionibus multum inter se differre. Qua ratione in vulneribus mors sequatur.
- 20 Vulnere in locis vilibus sæpe molesta. Delirium, & mors ex vulnere non parvi. Anima, & corpora hominum differant. Quorum vulnere curatio non tentanda.
- 21 Noma lethalissima. Putredines albe, ac nigres. Herpes. Febrem quibus ulceribus supervenire commodum. Nervus, aut ossis, aut ambrum corruptio.
- 22 Capitis vulnera quæ lethalissima. Os nudum, os infractum, & disfractum. Osculum ulceris parvum, ossis fissura aliquandiu permanente. Qua circa capitis vulnera consideranda. Viceribus capitis quæ symptomata inimica.
- 23 Inflammationes ex ulceribus in dolariis confusæ. Qua febres in capitis vulneribus lethales. Delirium in febrium principis.
- 24 Vulnere in articulis magna t. cornu signa. Nervus clausi cognitio.
- 25 Diffractiones in cubiti gibbi.
- 26 Medulla spina ægrorum.
- 27 Fœces sanguine impleta.
- 28 Oculi lippitantes. Sordes succæ. Tumor magnus, dolorisque exorsus, & sicus. Lachryma calida, ac salsa. Lachryma multo tempore effusa. Oculi vultus prominentes. Ulcerum citarices. Oculi lesioni maxime obnoxii. Papilla rufescentes, aut argenti speciem referentes. Caligines, & nebulæ.
- 29 Lippitudinem prædictiones.
- 30 Dysenteria. Ex dysenteria qui moriantur.
- 31 Anchylosorum lèbia as.
- 32 Profluvium alvi, consideratio. Sedis a-versio.
- 33 Quæ mulieri magis, aut minus in utero concipiant. Atulentes parvæ. Atulentes venas conspicuas habentes. Atulentes manuum tumida, ac magne. Atulentes optimi. Uterus qualis ad concipiendum satum esse debeat. Non concipiendum signa.
- 34 Ulcus in utero. Conceptus impediens va-

- ria tassa. Ulcus solum in sinistra uteri parte factum. Sexus, pro ulcero in utero sita, differre. Febres in concipiente nequante. Febria soluta a sanguinis eruptione.
- 35 Conceptus falsi signa. Mulieres, quae conceperant, de quibus interroganda. Subbiliosorum vomitus in mulieribus gravidis, dum jeiuna sunt. Lumbicorum vomitus.
- 36 Dolores sine febribus. Dolores circa caput, ac frontem ex magnis venis. Grauedines quos morbos solvant. Grauedines quando perfectae fiant. Dolores sine manifestis causis, & diuturni, & in toto capite &c.
- 37 Torporis, & punctura pruriginosa per caput differrentis.
- 38 Perirrigines cum capitis doloribus. Mulieribus in capitis doloribus alia omnia sunt, quae & viris.
- 39 Colores pravi ad multum tempus, dum iuvenes sunt. Pallidi cum vitore colores. Pallidi cum tumore.
- 40 Nistalopes. Verticis, & temporum dolor sine febre.
- 41 Sanguis ex naribus fluens.
- 42 Gingivae vitatae, & ora graecolentia. Tibia ulcera perua habentia. Partes sub oculis elevatae. Tumores in pedibus. Faciei distorta consideratio. Ad mutum inepti, & parte corporis morbofa attenuata, &c.
- 43 Temporum anni differentia in morbis consideranda.
- 44 Dolores in humeris. Bilem nigram vomentes.
- 45 Coxendicam morbus.
- 46 Lumborum, ac crurum dolor.
- 47 Quibus hic morbus fiat circa articulos.
- 48 Impetigines, & lepra.

S E C T I O I.

- 1 **M**EDICORUM praedictiones narrantur multae, & variae, & admirandae, quales ego quidem neque ipse praedixi, neque alium aliquem praedicere audivi. Sunt autem aliquae ex ipsis huiusmodi, Hominem perniciose affectum esse, & medico ipsum curanti, & alius videri. Verum medicum alterum supervenisse, ac dixisse. Non peribit hic homo, verum caecus evadet. Item ad alium, qui omnino male habere videbatur, in praesens praedixisse, hominem quidem evasurum esse, verum manum claudam habiturum, & ad alium quendam, qui similiter perisertes fore non putabatur, dixisse, ipsum quidem sanum fore, verum pedum digitos nigrescentes putrefactione eorumpendos esse. Et aliae huiusmodi praedictiones in tali praedictionis specie dicuntur. Alius autem praedictionis modus est, ementibus, ac negotiationibus tractantibus praedicere, aliis mortem, aliis infaniam, aliis alios morbos, & ad haec omnia, etiam ea, quae prioribus temporibus facta sunt, praedicere, ac omnia vera narrare. Alia porro adhuc forma praedictionum est, athletas, & eos, qui morborum causa exerceant, ac se fatigant, cognoscere, si quid aut circa eibum deliquerint, aut alteratum quippiam ederint, aut potu uberiore usi fuerint, aut deambulationem intermiserint, aut res venereas quasdam exerceant. Horum omnium nihil illos latet, adeo ut etiam minima quaeque, in quibus non pariter homo, exacte cognoscant. Hi omnes praedictionum modi esse feruntur. Ego vero talia quidem non varicior. Verum signa scribam, ex quibus & sanos futuros homines, & morituros conjectare oportet, & tum brevi tempore tum longiore sanos futuros, aut perituros. Scriptum est autem a me & de abscessibus, quomodo singulos considerare conveniat. Arbitror autem & eos, qui de claudicationibus praedixerunt, aliosque eiusmodi, confirmato jam morbo praedixisse, & quum jam manifestum esset, quod abscessus non esset recursurus, si modo intelligentiam habuerunt, multo sane magis, quam priusquam abscessus fieri inciperet. Spero item & alia praedixisse, magis humano more quam refertur, quae videlicet ementibus, & negotiationibus tractantibus praedixisse dicuntur, mortes, & morbos, & infanias. Atque haec mihi videntur talia facta esse, & nulla mihi videtur esse difficultas praedicendi, si quis circa talia studium, ac curam adhibere velit. Primum etenim aqua inter cutem laborantes, & tabidos quis non cognoverit? Deinde delirant non diu latere possunt, si quis noverit, quibus hic morbus cognatus est, aut prius aliquando insuernerint. Si enim hi homines ebriosi fuerint, aut carnes voraverint, aut vigilaerint, aut in frigore, aut calore inconsiderate versati fuerint, multus timor est ex tali victus ratione, ipsos deliranturos esse. Et eos, qui haemorrhoides habent, si quis hyeme multo potu uti viderit, & bono colore praeditus, de his praedicere licet, quod ad ver multa spes sit sanguinis eruptionis, ut & decolores, & aquozier sub aetatem fiant. Verum omnia haec addicere, ac praedicere oportet, si quis in talibus studiis palmam ferre expetat. Licet enim ex scriptis praedicere & mortem, & infaniam, & bonam habitudinem. Possem autem referre & alia multa huiusmodi, sed quae facillima cognitum sunt, visum est mihi scribere. Consulo autem, ut quamprudenissime agant tum in reliqua arte, tum in huiusmodi praedictionibus, illius probe memores, quod si cui successerit praedictio, is apud agrotum intelligentia praeditum in admiratione fuerit. Si vero quis aberrarit, su-

rit, supra hoc, quod odio habetur, fortasse etiam insanire videbitur. Quapropter
jubeo, ut tum alias omnes, tum has prædictiones prudenter faciant: quamquam
sane & audiam, & videam, neque judicare recte homines ea, quæ dicuntur, ac hunc
4 in arte, neque narrare. * Cæterum de his, qui exercentur, ac laboribus se fatigant, 50
eas asseverationes, quas afferunt hi, qui ipsas asserunt, neque esse puto, neque si quis pa-
eat, prohibeo. A nullo enim signo, neque bono, neque malo, laeduntur suspiciones, cui
signo fide habita quis ferat, an recte pronunciatum sit, aut secus, alioqui per me
lucet, ut si quis velit, credat. Non enim ego impedimento sum. Arbitror autem siquid
veritab ipsi dicitur, aut his, qui de his, qui exercentur, asseverant, aut illis, qui prius 55
scripsi hunc: primum quidem huic, qui cognovit, ex lignis conjectasse. Deinde ve-
ro ambiguo, & humano more prædixisse, & simul eos, qui id narrant, monstro-
sius quam factum fuit, recensere. Nam neque in morbis facile est peccata cognosce-
re, etiamsi decumbant homines, & victu parum nutriente utantur, ut non adeo
multa intueri opus sit eum, qui hæc considerandi curam suscepit. Alii enim bi- 60
bunt solum. Alii ad hoc, quod bibunt, aut forbitionem, aut cibum paucissimum as-
sumunt. * Necessæ igitur est eos, qui uberiore potu uti sunt, magis difficulter spira-
re, & plus urina ejicere. Eos vero, qui forbitionem, aut cibum auferunt, magis
& sitire, & febrere. Si vero quis utrisque & potu, & cibo immodice usus fuerit,
ad hoc, quod febricit, & difficulter spirat, etiam ventrem circumcinctum, & maio- 65
rem habebit. Licet porro & hæc, & alia omnia experimentis optime explora-
re, quæ & habemus, & omnibus recte utimur. Primum equidem & intelligenti-
a, & oculis cognoscere facile est, hominem in eodem loco decumbentem, &
exacta victus ratione utentem, si non paruerit, aut obambulando, aut multa e-
dendo, Deinde qui manibus contrectavit ventrem, ac venas, minus falli potest, 70
qui non contrectavit. Et nares in febricitantibus quidem & multa, & bene si-
gnificant. Odores enim multum inter se differunt. At vero in sanis, & recto
victu utentibus, haud scio, quare vel in hæc experimento facilius uti possim.
Postea audiendo vocem, & spiritum auribus cognoscere datur, quæ in sanis
6 non similiter sunt manifesta, sed qualiter etiam antea. * Quod si etiam mores 75
morborum, ac agnosciturum didicerit medicus, non tamen quicquam prædicere o-
portet. Non enim difficiliter spirabit homo, morbo adhuc errante, & febricit a-
cutiore febre, & venter intentus fuerit. Quare propter hæc non tutum est prædi-
cere, priusquam statum accipiat morbus. Verum post hoc tempus, quicquid præ-
ter rationem acciderit, dicere oportet. Manifesta vero sunt mala, quæ propter 80
agri inobedientiam fiunt. Nam & spirandi difficilest, & alia hujusmodi postri-
dia sedabuntur, si ob peccatum fiant. Si igitur quis hanc judicationem conside-
rans dixerit, non delinquet. Acque ego quidem hunc considerandi modum
nunc consilio tum de his, qui domi manent, tum de his, qui exercentur, item-
que de aliis omnibus, qualia peccata committant. At exactam illam narrantes 85
rationem & audio, & derideo. Quum enim parum inobedientes fuerint homines,
haud scio, quomodo id deprehendere possim. Si vero majora fuerint peccata,
7 quem in modum considerare oporteat, scribam. * Oportet autem primum 90
hominem, in quo quis per inobedientiam admissa cognoscere volet, per totum
diem intueri, & in eodem loco, & eadem hora, sole præsertim recens osto,
hoc enim tempore subevacuatus fuerit, & adhuc jejunus est, & nullo labore fa-
tigatus est, præterquam matutinis deambulationibus, in quibus minime in-
obediens est, si sane, ubi de somno surrexit homo, ad deambulandum prodie-
rit. Quare necesse est eum, qui iusta victus ratione utitur, hac hora maxime æ-
qualiter habere & coloris, & totius corporis constitutionem. Quapropter & is, 95
qui hujus considerationis curam gerit, acutissimus fuerit & mente, & ocu-
lis, eo tempore. Contemplari præterea oportet hominis mentem, & mo-
res, & corporis vires. Alii enim alia facilius, aut difficiliter imperata faciunt. Pri-
mum igitur is, cui inedia imperata est, si plura comederit, & biberit, per hæc ma-
nifestius fiet, & tumidus corpus ipsius apparebit, & plenius, ac coloratus erit, si 100
non excrementa alvi male ipsi processerint. Erit item animosior ad iterandum labo-
rem. Considerandum etiam, an ructum edat, aut a flatibus urgeatur. Hæc eni-
m fieri solent his, qui ita affecti sunt propter hoc peccatum. * Si vero dum
edere multa cogitur, & fortiter laborare, aut cibum imperatum non edierit, aut
ebrius factus fuerit, aut a cœna larga non obambulaverit, hoc modo explorare 105
oportet. Si quidem cœnam non edierit, solito autem more deambulaverit, junc-
torem aspectum præ se feret, & vegetior, ac operosior in exercitiis erit. Verum
nisi egestio modica, & compacta maxime in hoc fuerit. Si vero cœna sumpta
non deambulaverit, ructum utique edet, & flatuosus fuerit, & plenuro non mi-
nor apparebit, & inter laborandum magis quam antea sudabit, & difficulter spira- 110
bit, ac gravis erit, & transitus alvi majores, ac minus viscosi huius fuerint. Quod si
neque cibum consumpserit, neque deambulaverit, pigrior utique fuerit, ac rumi-
dior. Si vero ebrius factus fuerit, sudabit magis, quam antea, & difficulter spirabit,
& ipse se ipso gravior erit, ac humidior. Sed & latior erit, si non capiet ipsi assigna-
tur. Quod si uxore semel usus fuerit, vegetior utique erit, & magis solutus. Si ve- 115
ro se-

- ro sæpius rem petegerit, durior evadat, & squallorem quemdam habebit, & deco-
rator, ac magis lassatus erit. * Porro egestiones alvi procedere oportet his, qui
laboribus exercentur, quamdiu parum ederint, ac parum potaverint, inodicas, & duras,
atque hoc quotidie. Si vero tertio quoque die, aut quarto, aut ex longiore in-
tervallo prodierint, periculum est aut febris, aut alvi profluvio corripiendos esse.
Quæcumque vero egestiones liquidiore sunt, quam ut in transitu conformentur, hæc
sane omnes pejores sunt. At vero his, qui multum edunt, & multum labo-
rant, egestionis transitum mollem, oportet esse siccum, & copiam ciborum in-
gestorum pro ratione laboris. Procedunt autem ab æquali ciborum copia, his qui-
dem, qui minimum laborant, plurimæ egestiones, his vero, qui plurimum la-
borant, modicæ, si sani fuerint, & iusta victus ratione utantur. Nam ad hæc con-
jecturam facere oportet. Liquidiore autem egestiones, et sine febribus fientes, et
quæ septima die, aut citius judicantur, commode sunt, si semel una vice om-
nes fiant, et non revertantur. Si vero insuper febrerint homines, aut alvi pro-
fluvia redierint, si longa fuerint, penitus mala sunt, sive biliosa fuerint, sive piru-
rosa, sive cruda, et victus ratione propria, singula opus habent, itemque medica-
mentiis alia aliis. * Cæterum urinam juxta portionis copiam mingere oportet, et
semper æqualem, et quammaxime accervatam, et momento paulo crassiores, quam id,
quod in potu acceptum fuit. Si vero fuerit aquosa, et copiosior, quam pro eo, quod
bibere imperatum est, significat hominem non obedire, sed copiosiore potu uti. Aut
non posse renutriri, quamdiu talia urinam faciunt. Si vero paulatim frigidat urina,
aut medicamenti hominem opus habere significat, aut morbum aliquem circa
vesicam habere. At sanguinem mingere, raro quidem, et sine febre, ac dolo-
re, nihil mali significat, sed lassitudinum solutio fit. Si vero sæpius mingat, et ali-
quid ex his accesserit, malum est. Verum prædicere oportet, sive cum dolore min-
gatur, sive cum febre, fore ut insuper pus mingat, atque ita dolores, ac afflictiones
quiescant. Crassa vero urina albam subfiditiam habens, aut circa articulos dolo-
rem aliquem, aut tumorem significat. Aliæ vero omnes subfiditæ in urinis eorum,
qui exercentur, a morbis circa vesicam sunt, id quod ipsi manifestum faci-
ent. Cum doloribus enim erunt, et tales, ut difficulter quis ab ipsis liberari pos-
sit. Atque hæc quidem de his scribo, et huiusmodi alia dico. Cæterum
ex his, qui exactam, ac certam prædictionum rationem prædicant, cum aliqui-
bus ipse conversatus sum, cum aliquorum vero filiis, ac discipulis rem contuli,
quorundam vero scripta accepi. Quare quum probe sciam, qualiter quisque ipso-
rum sentiat, et exactas certitudines nunquam comperim, hæc scribere aggressus
sum. * At vero de aqua inter cutem, et tabidis, et podagricis, et his, qui
a morbo facro appellato corripuntur, hæc dico, ex aliqua quidem parte de omni-
bus idem. Nam qui hos morbos congenitos habet, is ægre ab ipsis liberari pos-
est. Reliqua vero singulatim scribam de singulis. Eum, qui ab hydropo, sive a
qua inter cutem correptus est, et superstes esse volet, bonis visceribus præditum
esse oportet, ita ut natura se exerat, simulque facile concoquat, et bene spiret, sique
sine dolore, et totum corpus æqualiter tepidum habeat, et non circa extremas
partes colligatum. Melius est autem, ut tumores potius habeat in extremis par-
tibus. Optimum vero est neutrum horum habere. Nam molles, ac graciles esse
convenit extremas partes, itemque ventrem ad contactum mollem. Tussim vero
adesse non oportet, neque sitim, neque linguam resiccare tum reliquo tempore, rum
post somnos, quando hæc valde fieri solent. At cibos libenter accipere oportet,
& ubi multum satis comedit, non assigi. Alvum vero ad medicamenta quidem
celerem habere, reliquo autem tempore exetere recreationem molle effortatum.
Urinam autem apparere convenit, pro studiorum ratione, & vinorum mutatione
transfente. Laborem vero ferre oportet facile, & lassitudinis exortem esse. Ac
optimum quidem est hominem ita per omnia dispositum esse, & sic securissime sa-
nus fieri poterit, sin minus, plurima ex his habeat. Nam spes erit, ne superstes
evadat. Qui vero nihil horum habuerit, sed contraria, eum desperatum esse scito.
Qui autem pauca horum habuerit, quæ bona esse dixi, si hydropo laboranti ad-
fuit, huic exigua spes restant. Cui vero multum sanguinis sursum, ac deorsum
eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa aqua repletum iri timor est, at-
que hic hydropes brevissimi temporis est, & ex quo paucissimi evadunt. Verum de
hoc alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores facti emarcescunt,
ac rursus atolluntur, hi magis convalescunt, quam illi, qui ex sanguinis eruptione im-
plentur. Verum fallunt hi hydropes ipsos ægrotos, faciuntque, ut ipsi a medicis
discedant, ac pereant. * De tabescentibus quod ad sputum, ac tussim atinet, ita
eadem dico, quæ de pectore suppuratis scripsi. Oportet enim eum, qui probe li-
berari volet, facile sputum per tussim rejicere, & id esse album, & æquale, & ejus-
dem coloris, & ab inflammatione alienum. Quod vero a capite desit, ad nares
converti, febrem autem non invadere, ut ne a coenis prohibeatur, neque sitiat. Ven-
ter autem egerat quotidie, & id, quod egerit, sit durum, copia pro ratione cibo-
rum ingestorum. Hominem vero quamminime tenuem esse oportet. Pectus autem
laudare convenit quadrangulum, & hirsutum, & os ipsius parvum sit, & robu-
re car-

- ste carnosum. Quicumque enim hæc omnia habuerit, maxime superstes erit. Qui vero nihil horum habet, interitui proximus. * Quicumque vero pectore suppurari facti fuerint, dum iuvenes sunt, ex humorum illapso, aut fistula, aut alio quopiam humorem, aut ex abscessu recurrit, hi non evadunt, nisi valde multa bona signa ipsis accesserint. Pereunt autem homines hi ad autumnum. Sed & ex aliis morbis longis plerique ad hoc tempus maxime moriuntur. * Cæterum ex aliis minime superstities manent & virgines, & mulieres, quibus ex suppressis mensibus tabes oborta est. Si vero aliqua virgo, aut mulier evasura est, & aliorum signorum bonorum multa accedere oportet, & menses splendide, ac pure apparere, aut nulla spes est. Qui vero ex sanguinis eruptione pectore suppurari fiunt, & viri, & mulieres, & virgines, non minus evadunt. Verum signis omnibus tum suppuratorum, tum tabescentium collectis, & superstitem futurum, & peritum prædicere oportet. Maxime vero evadunt ex sanguinis eruptione hi, quibus dolores sunt atrabiliarii & in dorso, & in pectore, & qui post eruptionem minus dolent. Nam & tussis non valde insuper accendit, & febres pleræque perseverant, sitim facile ferentes. At reversiones eruptionis sanguinis maxime fuit his, si non abscessus succedant. Optimi vero sunt abscessus sanguinolentissimi. Quibus autem in pectoribus dolores insunt, & per tempus attenuantur, & tussunt, ac difficultat spirant, neque febribus insuper corripientibus, neque suppurantibus succedentibus, eos interrogare oportet, quum tussiant, & difficultat spirant, an & compæctum quiddam, & modicum odorem habens, tussiendo rejiciant. * De podagricis hæc dico. Quicumque aut senes sunt, aut circa articulos callos tofæcos concretos habent, aut ætumnose vivunt, ac siccam alvum habent, hi omnes sani fieri non possunt humana arte, quantum ego novi. Sanant quidem hos optime dysesteriæ, si successerint. Sed & aliæ eliquationes valde profunt, quæ ad infernos locos repunt. Qui vero juvenis est, & circa articulos nondum tofæcos callos concretos habet, & accurate vivit, & laboris amans est, & alvum bonam habet ad obediendum pro studiorum ratione, hic sane medicum intelligentiam habentem nactus, sanus fieri poterit. * Ex his porro, qui a sacro morbo corripuntur, difficillime quidem liberantur hi, quibus a puero contigit morbus, & simul ad virilem ætatem pervenit. Deinde hi, quibus corpore in vigore ætatis constituto factus est, & fuerit a viginti quinque annis usque ad annum quadragessimum quintum. Post hos autem, quibus factus fuerit morbus, nullam significationem præbens, ex qua corporis parte initium sumat. At quibus ex capite initium capere videtur aut a lacerare, aut a manu, aut pede, facilius curatur. Verum differunt etiam hæc morbi genera. Qui enim a capite initium sumunt, ex his gravissimi sunt. Deinde qui a lacerare. Qui vero a manibus, ac pedibus, maxime sanari possunt. Cæterum horum curam aggredi oportet medicum, qui medendi modum novit, si homines fuerint juvenes, & laboris amantes, nisi mens mali aliquid habuerit, aut quis stupore attonito liberatus fuerit. Nam hæc atrabiliariæ mentis emotiones non sunt conducibiles. Alii vero, qui ad infernas partes convertuntur abscessus, boni sunt. Longe vero optimi & hic sunt, qui sunt sanguinolentissimi. Quicumque vero senes apprehendi incipiunt, maxime moriuntur. Et si non pereant, statim, celerrimeque perse liberantur, a medicis autem minime opem ferunt. At quibus pueris oculi repente distorri fuerint, aut majus quoddam malum perpessi sunt, aut tubercula sub cervicem oborta sunt, aut vocem graciliorem adepti sunt, aut tussis sicæ diuturnæ adherent, aut majoribus factis dolor procedit ad venterem, & non extirbatur, aut in lateribus distorsiones habent, aut venas crassas circa ventrem varicosas, aut omentum descendit, aut testis magnus factus est, aut manus tenuis, & impotens, aut pes, aut tibia tota clauda facta est circa aliam causam; his omnibus morbum antea factum fuisse, scire oportet præ his universis. Et plurimi, qui pueros educant, si interrogentur, confitebuntur; quoddam vero etiam res later, negantque se scire quicquam tale factum esse. * Qui porro de ulceribus cognoscere volet, quomodo lingula finient, cum primum hominum species perscrutari oportet tum eas, quæ meliores sunt ad ulcera, tum quæ deteriores. Deinde ætates nosse, in quibus suscula ulcera curari difficilia existunt. Locos item in corporibus perspicuos habere, quantum alii ab aliis differunt. Sed & alia qualia in singulis accedunt tum bona, tum mala nosse oportet. Si quis enim omnia hæc noverit, is sane sciet etiam, quomodo singulorum eventus contingeret. Qui vero non noverit hæc, non nosse poterit, quales fines ulcerum erunt. Species equidem bonæ sunt hæc. Leves, & commoderate, & bonis visceribus præditæ, & neque valde carnosæ, neque duræ. Juxta colorem vero fit species alba, aut nigra, aut rubens. Hæc enim omnes bonæ sunt, si puræ sunt. Si vero pallidus color ammixtus fuerit, aut color ipse pallidus, aut lividus fuerit, pejus est. Species vero, quæ præscriptis contrariæ sunt, eas deteriores esse scio. * At vero quod ad ætates attinet, tubercula quidem suppurata sunt, & strumosa hæc plurimos pueros occupant, & facillime ex ipsis liberantur. Senioribus vero pueris, & adolescentibus minus quidem oriuntur, verum difficilior ab ipsis liberantur. Viris autem talia quidem tubercula non valde sunt, verum cæria græcis dicta, ad modum favi concreta, horrenda, & cancri oculi submersi, & ex

- 255 & ex pustulis nocturnis herpes, donec sexaginta annos transierint. Senibus autem nihil talium tuberculorum accedit, verum cancri & occulti, & summas partes occupantes, & commoriantur. Cæterum ex locis subalares difficiliores curatu sunt, & laterum mollitudines, ac femora. Nam & moræ in ipsis sunt, & recidivæ. Ex articulis periculo maxime obnoxii sunt magni digitus, & præsertim pedum. Quibus autem in obliqua linguæ parte ulcus sit diuturnum, in his dentes considerare oportet, an quis juxta illam ulceris partem acurior sit. * Vulnera magis 260 lethalia sunt, quæ in venas crassas in collo, ac inguinibus insiguntur. Deinde quæ in cerebrum, & in hepar. Postea quæ in intestinum, & vesicam. Sunt autem hæc omnia perniciose valde, non tamen ita ut nemo ex his evadat, velut putatur. Nam & loci, qui hæc nomina habent, multum inter se differunt, & eodem modi. Multum etiam 265 differt corporis ipsius hominis structura. Aliquando enim neque febricitat, neque inflammatur facieciatus. Aliquando etiam citra febrem febricitat, & aliqua corporis pars omnino inflammatur. At quando is, qui ulcus habet, delirat, & facie fert vulnus, tunc vulnus aggredi oportet, velut juxta medicinæ, & accedentium rationem, eventum habitum. Moritur enim homines ab omni generis vulneribus. 270 Mulæ enim venæ sunt & tenues, & crassæ, quæ sanguinem ludentes occidunt, si gliscere, ac eo ferri ipsas contigerit, quas alia temporis occasione si quis petundat, corporibus prodesse sentiat. * Multa verò vulnera in locis visibus, ac non malis esse, & nulla re gravia videntur, & tamen sic dolore assigunt plagam, ut respirare non possit. Alii vero præ vulneris dolore, quod sane grave nulla re erat, spiritum 275 quidem duxerunt, verum delirant, & febrientes moriuntur. Quicumque enim aut corpus febricitans habent, aut mentem turbatam, talia patiuntur, sed neque hæc admirari oportet, neque formidare, illud expendendo, quod & animæ, & corpora hominum plurimum differunt, & vim maximam habent. Quæcumque igitur vulnera tempus nanciscuntur, aut corpus, & mentem hujusmodi, aut ita gliscentem sanguinem, aut magnitudine tanta fuerint, ut homo adurationem adduci ab eis contemptu non possit, ab his quidem discedere oportet, qualiacumque tandem fuerint, diariis animi deliquis exceptis; alia vero omnia aggredi, quæ recens sunt incussa, quo & febres effugiant homines, & sanguinis eruptiones, & nomas ulcerum proferpentes hi, qui evadent. Exactissime vero, & ad plurimum tempus eorum, 280 quæ gravissima sunt, custodiam facere oportet. Nam ita facere iustum est. * At verò nomæ lethalissimæ sunt, quarum putredines profundissimæ, & nigrissimæ, ac fæcissimæ existunt. Præter etiam sunt, ac periculosæ, quæ nigram saniem remittunt. Albæ vero, ac mucosæ putredines minus quidem occidunt, magis autem revertuntur, & diuturniores sunt. Herpes autem minime omnium ulcerum, quæ depascendo proferpunt, periculosi sunt, verum maxime difficeret submoveri possunt, quemadmodum cancri occulti. In omnibus autem talibus febrem supervenire tina die confert, & pus quamalissimum, ac crassissimum. Commodat & corruptio nervi, aut etiam ossis, aut etiam amborum tum in profundis, tum in nigris putredinibus. Nam in corruptionibus pus multum fluit, & putredines solvit.

S E C T I O I I.

- 1 * Porro ex capitis vulneribus lethalissima sunt, quæ ad cerebrum pertingunt, 21 velut etiam antea scriptum est. Gravia sunt & hujusmodi omnia, os nudum magnum, os infactum, os diffractum. Si vero etiam osculum ulceris parvum fuerit, fistula vero ossis aliquandiu permanferit, periculosus est. Hæc autem 2 omnia graviora sunt, si & juxta futuram sunt, & ex locis semper periculosiores summi in capite existunt. Cæterum in omnibus memorabilibus vulneribus interrogare oportet, si adhuc recentes fuerint plagæ, aut etiam factus fuerint, an conciderit homo, aut an in sopore altiore collapsus sit. Si enim horum quippiam factum fuerit, ampliore custodia opus habet, nimirum 10 quum cerebrum visum tunc perceperit. Si vero non recens facieciatus fuerit, ad alia signa respicere oportet, ac consilium capere. Optimum quidem igitur est, neque febrile eum, qui ulcus in capite habet, neque sanguinem insuper ipsi enripisse, neque inflammationem, neque simul ullum alicuius dolorem accessisse. Si vero quid horum apparuerit, securissimum est, ut in principio fiat, & modico tempore permaneat. * Conducit autem in doloribus, etiam inflammationes ex ulceribus accedere. In sanguinis autem eruptionibus, pus in venis apparere. Quæ vero in acutis morbis conferre febribus scripti, ea etiam in his feri conducit, & eadem his quoque bona esse assero, contraria vero mala. At incipere febrem in capitis vulnere quarta die, aut septima, aut undecima, valde lethale est. Judicatur 20 autem plerisque, si quidem quarta vulnere die febris inceperit, ad undecimam. Si vero septima die febris inchoarit, ad decimam quartam, aut decimam septimam. Si vero undecimo febris inceperit, ad vigesimam, quemadmodum in febribus descriptum est, quæ absque manifestis causis sunt. Cæterum in principis febrium sive delirium accesserit, sive alicujus membri sideratio, peritium hominem

- minem sciendum est, si non omnino, aut ex optimis signis aliquid accedat, aut
 corporis vires adsint. Verum considerabis modum. Nam homini adhuc spes salu-
 ris est, sed claudum fieri articulum, in quem incubuit, necesse est, etiamsi superflus ma-
 neat homo. Porro vulnera in articulis, quæ quidem magna sunt, & nervos
 conjungentes penitus præsecant, clarum est, quod claudos efficiant. Si vero ambi-
 gum fuerit de nervis, quomodo se habeant, si quidem fuerit acutum telum, quod
 rectum vulnus fecit, melius est obliquo. Si vero grave, & obliquum fuerit id, quod
 vulneravit, nihil refert. Sed plagæ profunditatem, & alia signa considerare lice-
 bit. Sunt autem hæc. Pus si insuper accedat ad articulum, duriores fieri necesse est.
 Si vero etiam tumores simul permanserint, hunc locum ad multum tempus durum
 esse necesse est, & quum sanum jam est ulcus, tumorem permanere necessarium est,
 simulque flecti, ac extendi, quæcumque dum articulus incurvus est, curantur. Qui-
 bus vero etiam nervus elapsus esse videtur, securius de claudicatione prædica-
 re licet tum alias, tum si inferiorum nervorum aliquis fuerit morbus. Ex his au-
 tem cognosces nervum, qui excidet. Pus album, & crassum multo tempore des-
 fluit, doloresque, ac inflammationes circa articulum in principis sunt. Eadem sunt
 etiam, si os elabatur. At vero dissectiones in cubiti gibbis, præsertim quæ sunt
 cum inflammatione, ad suppurationem perveniunt, sectionisque, ac ulsiones.
- * Medulla vero spinæ si ægrotarit sive ex lapsu, sive ex alia aliqua causa, sive sua
 sponte, homo & erubris impotens fit, ut neque, si tangatur, percipiat & ven-
 tre, ac vesica, ut circa prima tempora neque sterqus, neque urinam egerat, nisi ad ne-
 cessitatem. Quum autem vetustior factus fuerit morbus, non urgente homine, &
 sterqus prodit, & urina. Moritur autem postea, non multo interposito tempore.
- * Quod si vero cuiuspiam fauces implentur sanguine sæpe singulis diebus, ac
 noctibus, cui neque caput antea doluit, & qui neque tussim habuit, neque vomuit,
 neque febre correptus fuit, neque dolorem habuit, nec pectoris, nec dorsi, huius con-
 sideranda sunt næres, & fauces, an ulcus aliquod habere compareat in hoc lo-
 co, aut hirsutinem. Oculi porro lippientes optime permittuntur, si & lachry-
 ma, & sordes, & tumor simul fieri inceperint. Si vero lachryma sordi fuerit per-
 mixta, & non valde calida. Sordes autem alba fuerit, & mollis, & tumor levis fo-
 lutus. Si ita hæc se habuerint, oculus conglutinabitur ad noctes, ut doloris exors
 sit, atque hoc modo res minime periculosa fuerit, ac minime diuturna. Si vero la-
 chryma procedit multa, & calida cum paucissima sorde, ac parvo tumore, atque
 hoc ex altero oculo tantum, tunc diuturnum valde sit malum, verum non periculo-
 sum, & doloris exors est hic modus. Et judicationem in his maxime expectare o-
 portet, primam quidem ad vigesimam diem. Si vero hoc tempus transmittat, ad
 quadragesimam expectanda est. Si vero neque in his diebus sedetur, in sexagesima
 judicatur. Per totum autem tempus hoc sordem considerare oportet, an in di-
 gito miscetur, & alba, ac mollis fiat, maxime sub judicationis tempus. Si enim
 desinet, hæc faciet. At si utrique oculi hæc perpetuantur, in majori periculo sunt,
 ne ulcerentur. Verum judicatio brevioris temporis erit. Sordes autem sicæ val-
 de dolorosæ sunt, sed cito judicantur, si non vulnus acceperit oculus. Si
 vero tumor magnus fuerit, dolorisque exors, & siccus, periculo vacat. Si vero cum
 dolore fuerit, malus est, si siccus sit, & periculum est, ne ulceretur oculus, ac con-
 crescat. Sed & gravis est tumor, si lachrymam conjunctam habeat, itemque dolorem.
 Si enim lachryma procedit calida, ac salia, periculum est & pupillam exulcerari, &
 palpebras. Si vero tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effun-
 datur, & sordes fuerint, viris quidem palpebrarum eversionem prædicere o-
 portet, mulieribus autem, & pueris exulcerationem, ac eversionem palpebrarum.
 At si sordes pallidæ, aut lividæ fuerint, & lachryma multa, ac calida, & in capite
 ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum decubuerint, & vagilæ his acce-
 serint, necesse est ulcus in oculo factum esse, & timor est quoque, ut talis rumpatur.
 Prodest autem febris accedens, aut dolor ad lumbos innixus. Prædicere
 vero his futura oportet, ita ut respectus & ad tempus habeatur, & ad ea, quæ ex
 oculo fluunt, & ad dolores, itemque vigilias. Postquam vero & oculum contueri
 datum fuerit, si quidem compertus fuerit ruptus, & per fissuram prominuerit oculi
 humor, malum est, & difficile, ut sedetur. Si vero & putredo tali fuerit, penitus
 inutilis oculus redditur. At vero alios ulcerum modos prædicere oportet, locos
 considerando, & putredines, & profunditates. Necessarium enim est juxta ulce-
 rum vehementiam cicatrices fieri. Quibus igitur rumpuntur oculi, & postea
 prominent, ut extra locum oculi sit, his et tempore, et arte opem ferre non datur,
 ad hoc ut videant. Parvæ vero oculorum transformationes sedari possunt, si nihil
 mali accesserit, et homo juvenis fuerit. At ulcerum creatrices, quibus nihil aliud
 mali affuerit, omnes et a temporibus, et ab arte opem ferre posse putandum est,
 maxime recentissimas, et in juvenum corporibus. Cæterum ex locis maxime
 oculi læduntur, si exulcerantur. Deinde pars, quæ est supra supercilia, postea quæ
 quid vicinissimum his locis fuerit. Pupillæ vero flavescences, aut argenti spe-
 ciem referentes, aut cæruleæ, non bonæ sunt. His autem paulo meliores sunt,
 quæ aut minores apparent, aut ampliores, aut angulos habentes, sive ex causis
 tales

- tales factæ fuerint, siue sua sponte. Caligines, & nubeculae, & cicatrices sub-
- 95 albicantes, levigantur, ac delentur, si non vulnus aliquod in eo loco accesserit, aut prius cicatricem habuerit in hoc loco, aut unguem pterygium dictum. Si vero splendicans cicatrix in nigra oculorum parte fiat, partem aliquam nigredinis deal-
- bat, adeo ut si multo tempore permaneat & aspera, & crassa, etiam memoriam sui relinquat. * Porro iudicationes, quemadmodum in febribus scripti, ita & 29
- 100 hic se habent. Verum signa edoctum, iuxta differentias lippitudinum prædictionem facere oportet, quum pessima signa accesserint, duntaxat lippitudinum, velut de singulis perscriptum est, quum vero apparuerint optima signa, brevium. Tunc enim septima die delituras esse prædicandum est, aut prope hoc tempus, & alioqui secun-
- das esse putandum est. Recidivas autem expectare oportet his, quibus melius ha-
- 105 bete contingit, neque in diebus iudicatoriis, neque signis bonis conspectis. Omnium vero maxime urinae statum in oculorum affectionibus considerare oportet. Nam temporum occasiones repentinæ sunt. * Dysenteria si quidem cum febre invaserit, aut variis alvi egestionibus, aut cum hepatis inflammatione, aut præcordii, aut ventris, aut quæ dolorose fuerint, aut cibos interceptum, sitimque inducant, hæc omnes male sunt. Et qui sane plurima horum malorum habuerit, citissime peribit. Cui vero paucissima talium affuerint, huic plurimæ spes sunt. Morantur autem ex hoc morbo maxime pueri quinquennes, & seniores adhuc, decennes. Reliquæ vero ætates minus. At quæ dysenteria comoda sunt, hæc mala hæc non inducunt. Verum sanguine, & ramentis egestis, deliverunt septima die, aut decima quarta, aut vigesima, aut quadragesima, aut intra hæc tempora. Huiusmodi enim egestionem etiam eos, qui prius sunt in corporibus, morbos sanant, antiquiores quidem diutior tempore, recentiores autem in paucis diebus subnovere possunt. Nam & quæ uterum gestant, etiam ipsæ evadunt superstites magis ad partum, & ex partu, & foetus conservant, sanguine, & ramentis egestis, etiam per multos menses, nisi dolor ipsis affuerit, aut aliud quoddam malum signum ex his, quæ in dysenteria fieri scripti, accesserit. Si vero aliquod illorum apparuerit, & foetus perniciem significat, & prægnanti periculum, si non post foetus effugium, & secundæ exolutionem, ipsa dysenteria eadem die, aut post modicum tempus desinat. * Levitates porro intestinorum, 31
- 115 sientia græcis appellatur, quæ quidem sunt continuæ, & diurnæ, & per omnem horam, & cum strepitibus, & sine strepitibus exoriantur, & similiter noctu, ac interdiu incumbentes, & egestionem subeunte aut valde cruda, aut nigra, & levis, ac gravolente, hæc omnes male sunt. Nam & sitim inducunt, & potum non ad vesicam promovent, ut per urinam ejiciatur, & os exulcerant, & ruborem elevatum in facie efficiunt, & maculas solates varios colores habentes. Simul autem & ventres emollosos, & sordidos, ac rugulos reddunt. Ex talibus autem homines impotentes sunt ad cibum capiendum, ad deambulandum, ad faciendum alia, quæ facere debent. Estque morbus hic gravissimus senioribus. Vehemens est etiam viris. Reliquis autem ætatibus multo minor. Quisquis autem neque in ætatibus his est, quas maletrahari ab hoc morbo dixi, & paucissima ex signis habet, quæ mala esse scripti, hic securissimè disposuit. Indiget autem curatione hic morbus, donec & urina pro ratione ejus, quod in potu acceptum est, procedat, & corpus ab ingessis cibis augmentum capiat, & a malis coloribus liberatum fuerit. * At vero alia profus-
- 120 via alvi, quæ sine febre sunt, & brevi tempore durant, & mitia existunt. Aut enim elicta sedabuntur, aut sua sponte. Prædicere autem oportet excretionem subitus erumpentem desiccam esse, quum tangenti ventrem manu nullus motus occurrerit, & in fine egestionis flatus penetrarit. Sedes autem evertuntur, ac prociidunt, vicis quidem, quos ubi hæmorrhoidas habent, alvi profluxum corripit, pueris autem calculo laborantibus, & in dysenteria longis, ac meracis. Senibus vero, quibus mucii agglutinari infunt. * Porro ex mulieribus, quæ magis, aut minus in utero concipere solent, ita considerationem facere convenit, primum quidem specierum. Parvæ enim ad conceptionem præstantiores sunt majoribus, tenues crassæ, albæ rubicundis, nigrae lividis. Quæ item venas conspicuas habent, meliores sunt, quam quibus non apparent. Carnem autem uberiorem habere, anicula malum est, mammas autem tumidas, ac magnas, bonum. Atque hæc quidem ad visum exposita sunt. Verum interrogare oportet etiam de mensibus purgationibus, an omnibus mensibus compareant, & an copia satis magna, & an boni coloris sint, & æquales in singulis temporibus, & in iisdem mensium diebus. Sic enim has fieri optimum est. Locum vero, in quo conceptio fit, quem sane uterum nominamus, sanum esse oportet, & siccum, ac mollem. Sit item neque retractus, neque pronus, neque os ipsius straversum, neque conclusum, neque eversum. Fieri enim non potest, ut conceptio fiat, quodcumque tandem talium impedimentorum affuerit. Quæcumque igitur mulieres in utero concipere non possunt, verum pallidæ apparent, neque febre, neque visceribus in causa existentibus, hæc capite de dolore dicent, & menses sibi male, ac meracos prodire. Si ve autem brevi, siue longo tempore ipsis sic affecta menses non compaeruerint, utri in his purgatione opus habent. Quæcumque vero bene coloratæ sunt, & carnem multam, ac pinguem habent, & venulas occultatas, & dolore carent, & menses his aut omnino non apparent, aut modici, & meraci prodeunt, Hic modus difficillimus est ad

cogen-

- cogendum ut concipiant. Si vero mensibus comparentibus inculpate, & mulier sic corpore disposita fuerit, & non conceperit, locus, in quo est uterus, in causa est, ut secunda foetu fieri non possit. Aut enim revulsus est, aut everfus. Nam & alia, quæ 165
- 34 isthic sunt, cum doloribus, decolorationeque, ac colliquatione fiunt. * Quibus porro ulcus factum fuerit in utero sive ex partu, sive ex tuberculo, sive ex alia quadam causa, his febres, & inguinum tumores succedere necesse est, & dolores in his locis. Si vero & puerperij purgamenta simul fuerint intercepta, hæc mala si fuerint, omnino mercatoriæ sunt, & diuturniora. Et ad hæc præcordiotum, ac capitis dolores, 170
- Ulcere autem facto & sanato, locum hunc leviorem, ac duriorum fieri necesse est, & nimis concipere posse. Si vero solum in sinistra parte fiat ulcus, & inuliet in utero concipiat, sive dum adhuc habet ulcus, sive ubi jam sana est, masculum magis enituram esse spes est. Si vero in dextra parte ulcus fiat, & mulier concipiat, foetum magis fore scærum expectandum est. At si febres corripiant concipere non 175
- poterunt, & attenuata sit muliercula, interrogare oportet, an uteri ulcus aliquod habeat, aut aliud quippiam ex malis, de quibus scripsi. Si enim in hoc loco nihil mali subesse apparuerit, quod causa sit attenuationis, & quod concipere non possit, sanguinem vomituram esse mulierem expectandum est, menses autem tali necessario evanuerunt. Si vero febris soluta fuerit a sanguinis eruptione, & menses compa- 180
- 35 ruerint, in utero concipiet. Si vero prorsus sanguis erumpat, alvi excrementa liquida facta fuerint pravo modo, periculum est perituram esse mulierem antea quam sanguinem vomat. * Quæcumque in utero se concepit putant, & non conceperunt, & per multos menses hæluntur, mensibus purgationibus non apparentibus, & ventres 185
- angusti, ac moveri vident; hæ & caput dolent, & collum, & præcordia, & in mamma, nisi hac ipsis non est, nisi modicum quiddam, atque idæquum. Postquam vero ventris humiditas exoluta fuerit, ac molles factæ fuerint, in utero concipiet, si non aliud quoddam impedimentum ipsis fiat. Nam hæc affectio bona est ad mutationem in utero faciendam, ut post hoc tempus in utero concipiant. At his, quæ conceperunt, do- 190
- lores hi non fiunt, nisi familiares his fuerint capitis dolores, & hæc in mamma gignitur. At vero eas, quæ a diuturnis fluxionibus vexantur, interrogare oportet, an caput dolent, & lumbos, & infernam ventris partem. Interrogandæ sunt etiam de dentium stupore, & visus hebetudine, & aurium sonitu. Quæcumque autem dum jejunæ sunt, subbiliosa vomunt per multos dies, quum neque uterum ge- 195
- stent, neque febricitent, eas interrogare oportet, an lumbros rotundos simul vomant. Si enim hoc constiterit, prædicendum est ipsis futurum esse. Fit autem hic morbus maxime quidem mulieribus, deinde vero etiam virginibus, aliis autem hominibus minus. * Quibuscumque vero sine febribus dolores fiunt, mortem quidem non in- 200
- 36 ductive, verum plerique diuturni sunt, & multas mutationes, ac recidivas habent. Modi autem hi sunt. Primum quidem ex capitis doloribus aliqui sunt leves, aliqui multo graviores. Utroque vero hoc modo considerare oportet. Quicumque hebetem visum habent, & rubor quidam ipsis fit in oculis, & pruritus frontem vexat, his sanguis sua sponte manans opitulatur. Atque hic modus necessario simplex est.
- Quibus vero dolores circa caput, & frontem ex magnis ventis fiunt, & ex frigori- 205
- bis, quum vehementer calefacti fuerint, eos gravedines quidem maxime perfecte liberant, proinde autem & sternutationes, & muci in natibus sientes, magis quidem sua sponte, sin minus, coacte. Gravedines autem sunt perfecte, adeo ut & tussis succedant, & sternutationes succedentes si dolores non sedaverint, necesse est tubercula, & decolorationes his succedere. Quibus autem dolores sine manifestis causis fiunt & diuturni, & in toto capite, suntque ipsi & graciles, & debiles, 210
- his prædicendum est, morbum longe graviores priore esse. Si vero etiam ad collum, & ad dorsum dolor descendat, caput relinquens, & rursus ad caput recur- rat, adhuc gravior fit. Verum omnium horum gravissimus est, si ex capite ad collum ac dorsum tendat. Utilitates autem his ex abscessibus fore expectandum est, aut ubi pus per tussim rejecerint, aut hæmorrhoidas habent, aut pustulas in corpo- 215
- 37 ribus enatas. Consert etiam caput furfures habens. * Torporis, & puncturæ pruriginosæ velut ab urtica quibus per caput discurrunt, aliquando per totum, aliquando per aliquam partem; (sæpe vero & frigiditas aliqua ab ipsis sentiri putant velut per caput, discurrere) hos interrogare oportet, an etiam ad summam linguam punctura illa procedat. Si enim hoc fecerit, perfectus morbus fit, & qui 220
- difficilius submoveri possit. Verum absque hoc facilius est. Modi vero utilitatum consequendarum ex abscessibus contingent, veluti antea scriptum est. Sed tamen
- 38 abscessus iniinus in his succedunt, quam in illis. * Quoscumque vero una cum doloribus vertigines corripunt, malum egre exolubile, ac iustiosum existit. Senibus autem maxime hic modus fit. At alii morbi circa caput, & viris, & mulieribus, 225
- cum securitate vehementissimi sunt, & diuturniores. Fiunt autem & adolescentibus, & virginibus in ea puertatis ætate, & maxime circa incensum prægre- sum. Mulieribus vero in capitis doloribus alia quidem omnia sunt, & viris. Verum puncturæ illæ pruriginosæ, & affectiones attabiliæ, hæc mi- 230
- 39 nus, quam viris, si non menses penitus aboliti fuerint. * Quibus colores, cum juvenes sunt, pravi sunt ad multum tempus, & continentes, non tamen morbi

- regii modo; hi, siue viri sint, siue feminae, caput dolent, & lapides, ac terram comedunt, & hæmorrhoidas habent. Pallidi vero cum virore colores, qui diuturni sunt, & morbus regius vehemens non est, alia quidem eadem facere solent, verum pro lapidum, ac terræ esu præcordia hos magis affligunt, quam alteros.
- Quicumque vero multo tempore pallidi appareat, & facies in tumore elevatas habens, eos caput dolere sciendum est, aut circa viscera dolorem habere, aut in sede malum aliquod in seipis. Ex his autem apparentibus, plerisque non inuim aliquod horum malorum apparet, sed plerumque multa, aut etiam omnia. * Qui nocte vident, quos sane nyctalopos vocamus, hi morbo corripiuntur iuvenes, aut pueri, aut etiam adolescentes, & liberantur sua sponte, aliqui in quadraginta diebus, aliqui septimo mense, quibusdam vero & per totum annum permanit. Quapropter de tempore coniectare oportet, ita ut & ad morbi robur, & ad ægri ætatem respicias. Abscessus autem his profunt insuper apparentes, & ad infernas partes fluentes. Verum non valde accedunt propter iuuenitiam. At mulieres non corripiuntur ab hoc morbo, neque virgines, quibus menses comparent. Quibus autem lachrymarum fluxiones diuturnæ fuerint, & hi nyctalopos sunt, eos interrogare oportet, an caput doluerint antea, quam hæc revelarint. Quicumque dum neque febriant, neque decolores sunt, sæpe & verticem, & tempora dolent, si non alium manifestum habuerint abscessum in facie, aut graviter loquantur, aut dentes doleant, his sanguinem per nares erupturum esse expectandum est. * Quibus vere ex naribus sanguis fluit, hi aliqui sani esse videntur, hos autem vel splenem in tumore elevatum habere comperies, vel caput dolere, & splendens quiddam ipsis ob oculos obversatur. Plerisque vero horum simul & caput, & splen hoc modo se habere apparent. * Gingivæ vitiatæ, & ora graveolentia his sunt, quibus splenes magni. Quicumque vero habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis contingunt, neque oris graveolentia, horum tibiæ ulcera prava habent, & eieciatres nigras. Quibus partes sub oculis vehementer attolluntur, eos magnos habere lienes comperies. Si vero etiam in pedibus tumores accesserint, aquam etiam habere videbuntur. Verum & venirem, & lumbos inspicere oportet. At vero distortionem in facie, si nulli alii corporis parti communiunt, cito sedantur aut sua sponte, aut ad necessitatem coactæ. Reliqui vero syderati sunt. Quibus una eum hoc quod movere non possunt, morbosa corporis pars attenuatur, hi in sanitatem restitui non possunt. Quibus autem colligationes non accesserint, hi sani evadent. * Ceterum de tempore quando sani erunt prædicandum est, respectu habito ad vim morbi, & ad tempus, & ad ætatem hominis, & ad anni tempus, ita ut cui rei memor sis, quod vetustissimi morbi, & pessimi, & qui revolvuntur, gravissime obediunt; itemque hi qui sunt in vetustissimis corporibus. Sed & autumnus, & hyems ad tales morbos submovendos minorem commoditatem exhibent, quam ver, & æstas. * Dolores præterea in humeris fi-
- entes, qui quidem ad manus descendunt, rorporeque ac dolores inducunt, his abscessus non succedunt, verum nigram bilem vomentes sanantur. Qui vero isthæ in humeris manent, aut etiam ad dorsum progrediuntur, eos puris, aut atræ bilis vomitu effugiant. Verum de his ita considerationem facere oportet.
- Si quidem enim facile spiraverint, ac graciles fuerint, atram bilem ipsos vomituros esse spes est. Si vero difficilius spiraverint, & in faciem ipsis color incurrit, qui prius non erat, siue rubicundus, siue niger, eos magis pus sputuros esse sperandum est. Ad hæc vero considerandum est etiam, an in pedibus tumores sint. Nam & hoc signum in his consentit. Atque hic morbus viris vehementissimus esse solet a quadragesimo anno usque ad sexagesimum. Quæ ætate etiam coxendicum morbus maxime affligit. * Porro de coxendicum morbo sic considerationem facere oportet. Quibuscumque senioribus & torpores vehementissimi sunt, & perfrigerationes tum lumborum, tum crurum: & qui pudendum arrigere non possunt, & quibus alvus non egerit, nisi ad necessitatem coacta, & prodit ipsis multus stercoreaceus mucus, his maxime diuturnus morbus erit, prædicandumque est annum ut minimum duraturum esse morbum, ab eo tempore quo incepit, & opem ad ver, & æstatem expectandam esse. At vero juvenibus non quidem minus doloris inducit coxendicum morbus, verum brevior est. Nam quadragesimo die liberantur. Sed neque torpores vehementes accedunt, neque perfrigerationes crurum, ac lumborum. * Quibus autem hic morbus est quidem in lumbis, ac cruribus, non autem affligit adeo ut decumbant, considerare oportet, an alieubi sint collectiones in coxa, & interrogare, an ad inguen dolor progrediatur. Si enim ambo hæc habet, diuturnus fit morbus. Interrogandum insuper est, an in femore torpores insint, & ad popliteum progrediuntur, & sic hoc confiteatur, rursus interrogandum, an & per tibiæ ad summum pedem procedant. Quicumque enim pleraque horum confecti fuerint, his dicendum est, quod crura ipsis aliquando calida, aliquando frigida fiant. Quod si morbus hic lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes veretur, eos considerantes esse iube, quibuscumque vero coxas, & lumbos non relinquens, ad supernas partes confertur, malum id esse prædicandum est. * At quibus circa articulos dolores sunt, & tumores, & sedantur, non podagrico modo; in his comperies

peries viscera magna, & in urina subsidentiam albam. Et talis si tempora elevarit, dicit se sæpe dolere, dicit etiam sudores sibi nocturnos orbori. Si vero neque in urina subidet talis subsidentia, neque sudores fiunt, periculum est, ne aut claudi fiant articuli, aut affectio abscessus humore melli similis, quem melicerida vocant, sub ipsis nascatur. Fit autem hic morbus his, quibus in pueritia, & iuventute sanguis ex naribus fluere solitus desit. Proinde interrogandum est de sanguinis eruptione, an in iuventute facta fuerit, & an pruriginose velut ab urtica puncturæ, & in pectore, & in dorso insint, & quibus alvi dolores fortes inducant, citra exturbationes, & quibus hæmorrhoides fiant. Hoc enim horum morborum principium est. Si vero etiam malo colore præditi sint hi homines, interrogandum est an caput doleant. Hoc enim fatebuntur. * Quibus vero ex his alvi dolores in dextris fuerint, dolores his vehementiores fiunt, & præsertim quum ad præcordium iuxta hepar reliquæ doloris fuerint. His autem doloribus prodest strepitus statim in alvo obortus. Postquam autem dolor quieverit, urinam crassam ac cum virore pallidam mingunt. Atque hic modus nequaquam lethalis est, verum valde diuturnus. Quum autem jam vetustus fuerit morbus, homines ab ipso cœcitant. At de sanguine interrogare oportet, an in iuventute fluxerit, & de visus hebetudine, & de urinæ evacuationis pallore, itemque de strepitibus, an insint, & succedentes proficiunt. Hæc enim omnia fatebuntur. * Impetigines, & lepræ, & virilignes albæ, leucæ appellatæ, quibus quidem juvenibus aut pueris aliquid horum factum est, aut paulatim conspectum in multo tempore augetur, his non putare oportet abscessum esse eam papularum eruptionem, sed morbum. Quibus vero horum aliquid factum est multum & derrepente, hoc sane fuerit abscessus. Fiant autem leucæ quidem ex lethalissimis morbis, qualis est & morbus tabidus appellatus. Lepræ vero & impetigines, ex morbis ab atra bile factis. Ex his autem facilius sanantur eæ, quæ in maxime juvenibus fiunt, & quæ recentissima sunt, & in mollissimis ac carnosissimis corporis partibus producuntur.

HIPPOCRATIS COI COACÆ PRÆNOTIONES.

Argumentum in Librum sequentem.

In sequentem librum, cum propter Indiciem per se copiosum, tum quod facilius sit has Prænotiones ex ipso contextu petere quam argumentis legendis sibi conduplicare laborem: consilium fuit commostrare tantam generaliora.

- 1 Prænotiones de rigoribus.
- 2 De capitis doloribus.
- 3 De lumborum doloribus.
- 4 De vomitibus.
- 5 De urinis.
- 6 De alvi egressionibus prænotiones.

S E C T I O I.



UI ex rigore perfrigerantur, caput, ac collum dolentes, voce destituti, insuper exudantes, postquam se recollecterint, moriuntur. Molestie ferre morbum cum perfrigeratione, pessimum est. Perfrigeratio cum diturie, perniciofa est. Ex perfrigeratione timor, & tristitia præter rationem in convulsionem finit. Ex perfrigeratione urinas intercepti pessimum est. Ignorantia cum rigore, malum. Malum item obvio.

Soporosi rigores, aliquatenus perniciosi, & flammeus in facie color, cum sudore, in his malignus est. In his frigiditas posteriorum partium convulsionem accersit. Et in summa, posteriorum partium frigiditas, convulsoria est. Ex dorso horrores frequentes, & cito transeuntes, ægre tolerari possunt. Urinæ enim interceptionem dolorosam significant. Insuper exudare, his pessimum est. Rigor continenter vexans, corpore jam debili existente, lethalis est. Qui frequenter exudant, ac insuper rigent, perniciosum hoc est, & in fine suppurationem habere comperiuntur, ventresque perturbatos. Rigores ex dorso molestiores sunt. Qui vero decimaseptima die rigorem habuit, & quarta ac vicesima insuper riguerit, malignum hoc est. Horrore affecti, caput dolentes, exudantes, malignum id est. Horrore affecti, multum insuper exudantes, difficili malo implicantur.

Rigores multi torpidi, maligni sunt. Quibus sexta die rigores fiunt, hi ægre indicantur. Quibus sanis horrores frequentes fiunt, hi ex sanguinis fluxione suppurantur. Horrore, & spirandi difficultas in doloribus, signa tabis sunt.

Ex pulmonis suppuratione, & circa ventrem aliquando ac elaviculam dolores, & anxie stertere, spuri copiam in pulmone significat. Horrore affecti, anxii, delassari, lumbos dolentes, alvos humectas habent.

Hipp. Opera.

Dd 2

nes in-

- 35 des insuper rigentes, & quæ ad noctem aliquanto magis exacerbantur, cum vigilis ac delirio in somnis, aliquando urinas involuntarie emittentes, in convulsionem desinunt. Continui rigores in acutis, pravi sunt. Ex rigore, cum capitis dolore exolutiones, perniciosæ. Cruentæ in his urinae, pravae. Rigor cum distentione nervorum in posteriora occidit. Qui inhorruerunt & exudarunt
- 36 iudicatorio modo, & postdie præter rationem horruerunt, si quis non vigilis infestetur, neque concocet, ei sanguinem erupturum esse, puto. Urinae cum rigore suppressæ, malæ & convulsivæ tum alias, tum si quis antea gravi sopore pressus fuit. Spes autem in his est abscessus recto aures fore. Rigores velut in febre tertiana, si in media inordinata febre exacerbentur, valde maligni sunt. Si vero contrasio convellentibus modo exacerbentur cum rigore, & febre, perniciosum est. Vocis interceptiones ex rigore, solvuntur tremore. Et insuper rigentes tremores succedentes iudicant. Qui ex rigore cum capitis dolore exolvuntur, in periculo versantur. Cruenta urina his mala est. Quibus rigor, his urinae suppressio. Convulsio in febre, manuum ac pedum dolores, maligni sunt. Malignus
- 40 est & doloris ex femore progressus. Neque genuum dolor bonus est. Sed & furarum dolores maligni sunt, mentemque emovet, tum alias, tum si urinae subsidentia in medio innatet. Febres ex præcordiorum dolore malignæ sunt: sopor in his pessimus est. Qui frequenter exidare cum præcordii intensione non cessant, plerumque maligne habent, & dolores, in summum humerum, ac clavicularum incumbentes, in his pravi sunt. Febres, tertianæ naturam referentes, cum anxietudine, malignæ sunt. Vocis interceptiones in febre malæ sunt. Lassati, caligantes, vigilantes, soporosi, exudantes, recalescentes, male habent. Lassati cum horrore si exudarunt iudicatorio modo, recalescenti in morbo acuto, male habent, tum alias, tum si circa hæc sanguis de naribus stillarit. E regio morbo abunde colorati, moriuntur, alba vero alvi egestio in his præcedit. Febres, tertianæ naturam referentes, erronæ, in pares dies translapse, difficiles sunt. Anxietudines in diebus iudicatoriis, si in his sine fide
- 50 re perfrigerant, & omnes qui sine sidere perfrigerantur citra iudicationem, male habent. Et qui insuper riguerunt ex his, ubi vomuerunt meraca, anxii, tremuli in febre, malum. Qui ex rigoribus, parvis sudoribus perfrigerantur, malum. Exudantes, vigilantes, recalescentes, malum. Qui insuper exudant in febre, maligne habent. Quibus biliosa est alvi egestio, his circa pectus morsus, & amaritudo, malum est. In febribus inflata alvo, status non crumpere malum. Lassati, singultientes, stupore detenti, mali.
- 60 Præter consuetudinem quid facere, velut est proponere sibi aliquid, & expectare aliquid præsens non consuetum, aut contrarium, malum est, & mentis emotioni proximum. Qui morbi in malis signis levantur, & qui in bonis non remittunt, difficiles sunt. Qui exudant, & maxime capite, in morbis acutis submolestie ferentes, malum, tum alias, tum si urinae sunt nigrae, & turbidis spiritibus in his malus. Extremæ partes si in utramque partem cito transmutentur, malum est. Sed & sitis huiusmodi mala est. Ex moderato ferrox responso, malum. Vox acuta, malum. Præcordia his intro trahuntur. Qui ex perfrigeratione sudorosa cito recalescent, malum. Qui in aestis exidant submolestie ferentes, malum. Qui præter tinnem, nulla existente valorem evacuatione, impotentes sunt, malum. In febre tractus velut a vomitu, in secretionem desinunt, malum. Torpor in utramque partem cito translabens, malum. Sanguinis stillæ pusillæ, malæ. In acuto morbo sitis præter rationem soluta, malum. Qui ad manum exiliunt, male habent. Quibus cum febre ardente, tumores somnolenti, torpidi sunt, his dolor in latus superveniens levis siderationis, ac resolutionis modo occidit. Suffocatio in acutis, agris attentis, perniciofa. In perniciosis jam parvi tremores, & vomitus eruginosus, Qui in poribus subsistunt, & submurmurant in siccis, & qui difficulter deglutiunt spiritu rufescente, perniciosæ habent in acutis perfrigeratis.
- 80 Rubores in manibus, ac pedibus, perniciosi. Efflantes & retracti, in somnis leviter suspicientes, morbo regio abunde colorati moriuntur; alba alvi egestio in his præcedit. In febribus mentis emotiones taciturnæ, in eo qui voce privatus non est, perniciosæ sunt. Livores sientes in febre, brevi mortem affore significant. Quibus in febre dolore lateris sientes, alvus multa aquosa ac biliosa egerit, hi allevantur. Quibus vero medice consequenter accedunt, ac sudores, cum bono faciei colore, & alvo liquida, ita ut adsit etiam aliquis cordis, seu potius oris ventris dolor, hi ubi longius agrotaverunt, peripneumonicorum modo moriuntur. Febrienti si atra bilis in principio sursum, aut deorsum prodierit, lethale est. Qui cum perfrigerationibus, non sine febre, superne exudant, molestie ferentes, & phrenetici, in acuto morbo perniciosæ habent.
- 90 Dolores modice acuti, ad clavicularum ac sursum transientes, perniciosi. In longis perniciosus morbus, sedus dolor lethalis est. Si debilius iam affecti, non videant, aut non audiant, aut labium, aut oculus, aut nasus ipsis distorteretur, lethale est. In febribus inguinis dolor morbum disruptum significat. In febribus

bribus iudicationes impediunt, ac sublatæ, temporis quidem diuturnitatem inducunt, non autem perniciose sunt. Febres ex doloribus vehementibus diuturnæ. Mentis emotiones tremulæ, palpatorie, phrenitice sunt, & dolores citæ furæ, in his mentem emouent. Quicumque in febre continua, voce destituti iacentes, oculis conniuentes nectant, hi si postquam sanguis ipsis ex naribus fluxit, & ubi vomuerunt loquantur, & ad seipsos redeant, seruantur. Si vero hæc non fiant, difficulter spirantes facti brevi moriuntur. Qui melius habuerunt, si postmodum exacerbentur, malum est. Si tertia die cohibiti, quarta exacerbentur, malum est. Num & tales exacerbationes phrenitice sunt. Quibuscumque desinunt febres, non in diebus iudicatoriis, his recidivæ sunt. Qui in principio tenues, cum capitis pulsus, & urina tenui, ad iudicationem accedant, his nihil miri est, si & mentis emotio insuperque vigilie accedant. In morbis acutis, motus, iactatio, somnus turbulentus quibusdam convulsionem significat. Turbulentæ cum ferocia excitationes mentem emouentes, malæ sunt, itemque convulsoriæ, tum alias, tum cum sudoribus. Convulsoriæ etiam videntur colli ac dorsi perfrigerationes, immo etiam totius corporis. In his mictiones sunt pelliculose. Deliria cum sopore, convulsoria. Mentis emotiones modice feroces, serinæ sunt, sed & convulsiones significant. In morbis longis, ventris præter rationem tumores, convulsorii. Affectiones statim turbulentæ, vigilias indidentes, sanguinem de naribus stillantes, sexta die allevantes per noctem, verum postmodum rutilus assigentes, exidentes in somnum delatæ, mentem emouentes, large sanguinem fundunt, & morbos solvunt. Aquosa urina talia significat. Qui cum relatis, ab atra bile mente moti, tremuli sunt, maligne habent. Delirium in spiritu & sudore, lethale est. Lethale est, & in spiritu ac singultu. Insomnia in phrenitide evidentiæ, bona sunt. In phrenitide egestionis alvi alba, & corporis, malum, Rigor his pessimus est. In phrenitici in principis affectiones manifestæ, ac frequenter transmutationem habentes, malæ sunt. Quibus ab atra bile mente motis, tremores sunt, malum est. Qui ab atra bile mente moti, tremuli sunt, ac salivam fundunt, num sane phrenitici sunt? Mente moti, acutè insuper febrientes, phrenitici sunt. Phrenitici parum bibentes, strepitum valde percipientes, tremuli, aut convulsi. In vehementer phrenitici tremores lethales sunt. Deliria circa necessaria, pessima. Quæ ex his exacerbantur, lethalia sunt. Mentis percussiones, voce clangorose, lingue convulsiones tremulæ, & voces tremulæ fientes, mentem alienant. Durities in his perniciose est. Prædebilitatorum deliria pessima. Affectiones in phrenitici cum perfrigeratione salivam fundentes, vomitum nigrum indicant. Qui varie ægrotant, & frequenter soporosi mente moventur, his nigrum vomitum expectandum esse, dicito. Quæ convulsorio modo exacerbantur, stupefactione sunt. Tumores iuxta aurem, in morbis longis parvi sunt; sanguinis fluxiones, ac vertigines insuper apparentes, perniciose. Febres vertiginosæ & cum volvulis, & sine volvulis, perniciose. Anhelosis febris postea acuta. Cum præcordio intento perfrigeratis, magnus circa aurem tumor. Quibus in febre dolores circa lumbos, & infernas partes fientes, sepius transversum contingunt, infernas partes relinquentes, perniciosi sunt tum alias, tum si aliud quoddam signum prævum accedat. Si vero alia signa non fuerint prava, suppuratum forte timor est. Pueris febris acuta, & alvus suppressa, cum vigilis, & caliditate, & colorem mutare, & ruborem habere, convulsorium est. Affectiones statim turbulentæ, vigilias inducentes, & nigra compacta egerentes, partim sanguinem fundunt. Affectiones cum vigilis, & anxietudine repentina, sanguinem fundunt tum alias, tum si quid etiam antea profuixerit. Num & qui modice perfrigerati postea horruerunt? At qui circa exacerbationes tussunt, & parum exsunt, maligne habent. Ad latus dolore, ac suffocatione accedente, hi suppurantur. Quibus in febribus continuis pulsus per totum corpus erumpunt, lethale, si non purulentus abscessus fiat, maxime autem circa aurem hi fieri solet. In morbo acuto externas partes perfrigerari, internas autem ardere, & sicire, malum est. Febres continuæ per tertiam diem augescentes, periculose. Quibus febris aliquando intermittit, periculo vacat. In febribus longis aut tubercula, aut dolores in articulis sunt, & si facti fuerint, non sunt inutiles. Capitis dolor in morbo acuto, præcordium revulsim, non profusum ex naribus sanguine, ad phrenitidem devenit. Febres lypitice, bilis sunt, ac deorsum effusione non accedente, non solvuntur. Morbus regius ante septimum diem accedens, malum. Septimo veto, ac nono, & undecimo, ac decimoquarto, iudicatorius est, si non præcordia indures, sin minus, ambigua res est. Frequentes per eadem recidivæ, circa iudicationem sanguinolentæ, nigrorum vomitum faciunt, sunt autem & tremulæ. Dolores, qui in tertianis febribus exacerbantur, tertianarum generis morbum faciunt, & grumulosum sanguinem egerunt. In febribus, secundum venam quæ est in collo, pulsus ac doctus, dyenteriam definit. Color qui sæpe in calore transmutatur, utilis est.

- In biliosis spiritus magnus, & febris acuta, cum præcordii intensione, juxta
aurem abcessum facit. Qui ex morbis longis se resocillantibus, bene cibum acci-
piunt, & nihil proficiunt, hi maligne recidivam incidunt. Quibus in febribus
165 venæ in temporibus pulsant, & facies sana est, & præcordium non molle, dæturum
morbum significat, non desinentem citra multi sanguinis ex naribus fluxum, aut sin-
gultum, aut convulsionem, aut coxendicium dolorem. In febre ardente si alvus e-
rumpit, mortale est. Ex alvi dolore laborioso, febris ardens, perniciosa. In
170 febribus ardentibus, si aurium sonitus accedant, cum visus hebetudine, & gra-
vitate secundum nares, melancholico modo ab atra bile mente moventur, fangui-
ne ipsi non erumpente. Tremores in febribus ardentibus, mentis percussio
solvit. In febre ardente fluxio sanguinis ex naribus, quarta die, mala est, si
non aliud quid boni coinciderit. Verum quinta minus periculosa est. Qui ex
175 febribus ardentibus aliquantulum perfrigerantibus, cum egestionibus alvi aquosis
ac biliosis laborant, oculis malum est, tum alias, tum si stupidi fiant. Febris
ardens rigore superaccedente solvit. Febres ardentes recidivæ solent, & ubi
per dies quatuor significationem de se præbuerunt, postea exsunt, si mi-
nus, septima die. Febres ardentes quatuordecim dies judicant, aut allevan-
tes, aut perimentes. Ex febre ardente, abcessu purulento circa aurem non
fiens, non valde fervantur. Lethargici, tremuli ex manibus, somnolenti, discor-
diores, tumidi, pulsibus tardi sunt, & partes sub oculis elevatas habent, & su-
dores insuper accedunt, & alvos biliosas, & intemperatas subtymidas habent. Si vero
obarias habuerint, urinæ & egestionis alvi latenter ipsi progrediuntur, nitina velut
185 jumentorum est, potum non expetunt, neque aliud quicquam. Postquam vero re-
suerint, collum dolorosum se habere dicunt, & sonitus per aures tranfire. Qui
vero ex lethargicis fervantur, plerumque pectore suppurati sunt, Quibuscumque
in febribus tremores circa judicationem cessant, his temporis progressu abcessus
dolorosus suppuratus in articulos fit, & vesica dolorosa. Febrientibus qui-
190 bus rubores sunt in facie, & dolor capitis fortis, & venarum pulsus, his sanguinis
fluxio plerumque contingit. Quibus autem cibi fastidia sunt, & oris ventriculi morbus,
& multum salivæ, his vomitus fit. Quibus vero ructus adijunt, & flatus, stre-
pitus ac elevationes ventris, his fit alvi exturbatio. Qui diutius secure ex febre
continua laborant, citra dolorem aut inflammationem, aut aliam causam, si abs-
195 cessus expectandus est cum dolore ac tumore, & magis in infernis partibus. Expecta-
re autem oportet abcessus, his magis qui trigessimum annum egressi sunt, & tunc ex-
pectare abcessus oportet, ubi viginti dies febris transierint. Senioribus autem mi-
nus sunt, & ibi multo tempore febres durant. At intermittentes & erroneo modo
invadentes, autumno maxime in quartanam leniter transeunt, & hoc magis his qui
200 triginta annos exceßerint. Abcessus autem hyeme magis sunt, & tardius desin-
unt, & minus recuperant. Quibus vero sæpe recidiva contingit, his si semel
tempus transierint, tabes coxendicium leniter accedit. Quæcumque signa febrile
se opponunt, & non abcessus significationem habent, maligna sunt. Febres quæ
neque in diebus judicatoriis, neque post solutorium signum decesserint, recidivant.
- 205 Acri morbi in diebus quatuordecim judicantur. Tertiæ exquisita in quin-
que, aut septem circutibus, aut ad summum in novem judicatur. Quibus febre
incipientibus, sanguis de naribus sternutatione fiens destillat, & urinæ subsidentiam
albam in quarta die habet, his in septima die solutionem significat.
- Morbi acuti judicantur, sanguine de naribus fluente, in die judicatorio, & su-
210 dore multo citre, & urinæ purulenta, ac vitri formam referente, prodeunte, & bo-
nam subsidentiam habente, & acervatim exeunte, abcessu item memorabili fiens,
& alvo mucosa & cruenta decerpente egerente, & vomitus non pravis febribus circa
judicationem. Somni profundi, non turbulenti, firmam judicationem signi-
ficant. Turbulenti vero cum dolore corporis, inconstantes sunt. Septima die,
215 aut nona, aut decimaquarta, fluxiones sanguinis a naribus fientes, plerumque fe-
bres solvunt. Similiter & alvi fluxio biliosa, & qualis in dysenteria fieri solet, &
genium ac coxendicium dolor, & urinæ concocta ad judicationem. In muliere vero
etiam menstruæ purgationis fluxus. Quibus in febribus sanguis abunde un-
decumque profluit, his in refectionibus a morbo alij humectantur. Qui in
220 febribus exsunt, caput dolentes, alvo suppressa, convulsi sunt. Mentis
emotiones modice fæcrosæ, & serinum, & convulsionem significant. Convul-
sio in febre fiens, & eadem die desinens, bona est. Convulsio in febre fiens,
sedat febre in eadem die, aut postera, aut tertia. Si vero tempus in quo incepit transi-
grediatur, & non desinat, malum est. Febres intermittentes, verum inæqualiter
225 talescentes, alvo inflata, pauca egerente, in his post judicationem lumborum dolore
sequuto, alvi erumpunt. At amburentes ad manum, sordide, fistulosæ, anxiosæ,
in his alvo suppressa gravari exolvuntur. Quandoque vero & rubicunda in pedi-
bus ambustiones eadem significant. Hybernæ febres quartanæ leniter in
actos morbos transeunt. Capitis dolor pertinax cum febre acuta, & alio si-
230 gno maligno, lethale est. Cæterum sine signo malo, transgrediens vigesimum
diem, sanguinis, aut puris fluxum ex naribus, aut abcessus ad infernas partes si-
gnificat;

gnificat, fluxiones quidem Junioribus triginta quinque annis, senioribus vero ab-
 scellus. Si vero circa frontem, ac tempora fuerit dolor ille pertinax fluxiones.
 Quibus capitis sunt dolores, & sonitus aurium, circa febrem, & vertigo, & vo-
 cis tarditas, & manuum torpor, eos aut syderatos, aut comitiales, aut obliuiofos
 fore expecta. Qui caput dolent, stupore correpti, delirantes, alvo suppressa
 oculo ferociente, florulenti, hi in posteriorem partem conuelluntur. Capitis
 succussiones, oculi rubicundi, mente manifeste emoves, perniciose sunt. Non
 commoruntur hæc, sed circa aurem timorem faciunt. Capitis dolor, cum sedis
 & pudendorum dolore, & torpore, & impotentiam inducit, & vocem resolvit.
 Hæc horrenda non sunt, verum somnolenti ac singultientes sunt nono men-
 se, ex quibus soluta voce, in idem restituntur. Qui in capitis dolore ascari-
 das habent, his surditas & sopor consequens, abscessus circa aurem exulscat.
 Qui caput dolent, stupore detenti, dolorosi, oculum rubicundum habentes,
 sanguinem effundunt. Capitis concussiones, & aurium sonitus sanguinem ef-
 fundunt, aut mulieri menses deducunt tum alias, tum si iuxta spinam ardor con-
 sequatur; fortassis autem dysentericis fluxiones. Capite gravati, iuxta sinei-
 put dolentes, vigiliis infestati, sanguinem effundunt tum alias, tum si quid ad col-
 lum se extendat. Vomitus in capitis doloribus æruginosi, cum surditate,
 vigilantibus, cito insaniam excitant. Quibus capitis ac colli dolor est, sed &
 totius corporis tremula quedam impotentia, sanguinis eruptio solvit. Quin, &
 tempore hæc solvuntur. Verum vesicæ in hoc supplicantur. In acutis capi-
 tis doloribus, & in torpidis eam gravitate, convulsiones fieri solent. Capitis
 dolorem solvit pus per nares, aut spura crassa, & non olentia. Solvit item ulcerum
 eruptio. Quandoque & somnus, & alvi fluxus. Capitis dolor moderatus, cum
 siti cibum capiente, aut cum sudore non solvenne febrem, abscessus in gingivis, aut cir-
 ca aurem significat, alvo non exutubata. Capitis dolor soporulosus cum gravita-
 te, convulsorium quid facit. Caput dolentes, siticulosi, aliquatenus vigilan-
 tes, obscuro cogniti, impotentes, ex alvo liquida delassati, num mente moventur?
 Caput dolentes, sudastri, manibus tremuli, collum dolentes, mingenies nigra
 condensata, vomentes nigra, perniciose habent. Caput dolentes, exudantes,
 alvum suppressam habentes, convulsioni obnoxii sunt. Sopor ubique malus
 est. Soporosi in principis fientes, cum capitis, lumborum, colli, præcordii dolo-
 re, vigilantes, num phrenitici sunt? Nalus in his destillans perniciosus tum
 alias, tum quarto ab initio die. Malum est etiam alvi proluvium valde rubicun-
 dum. Soporosi ab initio exudantes, urinis concoctis ardentes, verum circa ju-
 dicationem petrifigentes, & brevi rursus ardentes, torpidi, soporosi, convulli,
 perniciose habent. Somni soporosi, & perfrigerationes, perniciose sunt.

Soporosis delassatis, sordis factis, alvo erumpente si rubicunda egesta fue-
 rint circa iudicationem, profunt. Soporosi, anxiosi, præcordium dolentes, parum
 vomentes, abscessus iuxta aurem habent. Antea vero circa faciem tumores cum so-
 pore. Morbi derepente mentem percellentes cum anxietudine, sanguinem profun-
 dunt. Soporosa, anxiosa, dolorosa præcordia, frequenter parum spuentia,
 tumores circa aurem habent. Soporosi, num aliquid convulsorii habent?

Affectiones soporose, fatiuitatem inducentes, stuporis detentionem inferentes,
 præcordia variata, & ventrem tumidum habentes, cibum fastidientes, alvo sup-
 pressa exudantes, num his turbidus spiritus, & genituræ simile quid pertransiens
 singulum significat? Num & alvus bihiola insuper egerit? Splendidum in his
 mictum prodest. Venter quoque his insuper turbatur. Cerebro corrupto,
 alii in tribus diebus, alii in septem moriuntur. Has vero si effugerint, servantur;
 Quibus autem ex his relictis, os disparatum repetitum fuerit, hi pereunt. Caput
 dolentibus, ex posteriore parte ossa rupea habentibus, fluxio e nare larga, crassa,
 mala est. Hi ubi oculum antea doluerint, rigent, Num & iuxta tempora ossum di-
 ruptiones convulsoræ sunt? Auris dolor pertinax, cum febre acuta, & alio
 quodam signo aliquantum maligno, juvenes quidem septima die occidit, & citius
 delirio correptos, si non multum pus effluerit ex aures, aut sanguis e naribus,
 neque aliud quoddam bonum signum compareat; seniores autem tardius, & minus tol-
 lit. Nam & aures fupurationem præveniunt, & minus delirant. Verum multi
 ex his recidunt, atque sic pereunt. Surditas in acutis, ac turbulentes conse-
 quens, malum. Malum etiam in longis. In his autem dolores etiam ad coxas dedu-
 cit. In febribus surditas alvum sistit. Aures frigidae, & pellucidae, & con-
 tractæ, perniciose. Tinnitus in acutis, & sonitus in auribus, lethale. Soni-
 tus aurium, cum visus hebetudine, & narium gravedine, mentem emovet, & san-
 guinem profundit. Quibus surditas cum capitis gravitate, & præcordii intensio-
 ne, & ad splendorem turbatio, sanguinem profundit. In febre acuta aures ob-
 surdescente, furiosum est. Valde surdi, in accipiendo tremuli, linguam resoluti,
 torpidi, malum. Accedente ægritudine, surditas, & urina subrubicunda, subsiden-
 tiam non habens, sed id, quod in medio innatat, mentem emovet. Morbo regio
 corpi, in his malum est. Mala est & ex morbo regio satuitas. Hos voce priva-
 ti, sentientes tamen esse, contingit. Fortassis autem & alvus male his afficitur. Quæ

- circa aurem dolorose excitantur, pernicioſa ſunt. Rubores circa aurem ex prægreſſo dolore, in febris ſientes, ſignum quidem ſunt eryſipelatis in facie futuri. Sed & convulſiones ex talibus ſiunt cum vocis interreptione, ac exolutione. Tumores circa aurem ex plurimis graveolentibus, cum febre acuta, & præcordio intentò, tardius excitari, occidunt. Tumores circa aurem leviter ſyderatis, mali. Tumores circa aurem in longis morbis non ſuppurantes, lethales. Alvi vero hiſ deorſum ſeruntur. Num quibus abſceſſus ſunt iuxta aures, caput dolent? Num & ſuperiſ partibus exadant? Num & inſuper rigent? Num & alvi erumpunt, & quid ſoporofum habent? Num & aquoſa eſt urina, alba innataura habens, & aliquantum varia, exalbida, graveolentia? Abſceſſus iuxta aurem ſubmovent tuſſiculæ cum ſputationibus ſientes. Urinæ in abſceſſibus retro aures cito, & modice matureſcentes, malæ ſunt, & perfrigerari, malum eſt. Abſceſſus circa aurem in morbis diuturnis ſuppurati, non valde albo, & inodoro putre, occidunt, & maxime mulieres. Abſceſſus iuxta aurem, ex acutis morbis maxime in febris ardentibus ſiunt, & ſi non iudicationem fecerint, & matureſcant, aut ex naribus ſanguis fluxerit, aut urinæ ſubſidentiam craſſam habuerit, ægri pereunt. Plerique vero talium tumorum antea propuſcitant. Verum conſiderare oportet inſuper etiam ipſas febres, ſive auſceſcant, ſive remittant, atque ſic pronunciare. Ex ſurditate, ac torpore, de naribus aliquid deſtillare, diſcultatis aliquid habet. Vomitus hiſ convenit, & alvi turbatio. Ex ſurditate leniter abſceſſus iuxta aures ſiunt tum alias, tum ſi quid naufæ accedat. Sed & ſoporofus ex hiſ etiam magis abſceſſus ad aures ſiunt. Sorditatem ex febris, ſanguinis & naribus fluxio ſolvit, itemque alvi turbatio. Facies, quæ ex tumida humilitate, & vox levior, ac debiliſ ſiunt, & ſpiritus rariſ, ac levior, remiſſionem in ſequentem diem ſignificat. Facies corruptio lethaliſ. Verum minus, ſi propter vigiliæ, aut famem, aut alvi exturbationem fiat. Et ſi id, quod propter hæc corruptum eſt, ſedetur per diem, ac noctem. Talis aurem fuerit oculi cavi, naſus acutus, tempora collapſa, aures frigide, ac contractæ, cutis dura, color pallidus, aut niger. Liveſcens vero ex hiſ palpebra, aut labium, aut naſus, brevi lethaliſ eſt. Faciei bonus color & torvitas, in morbo acuto, malum eſt. Frontis ex hiſ contractio, phreniticiſ ſignum eſt. Circa faciem color bonus, & ſudores non febricitantibus, ſtercora veſtiſ ſubefſe ſignificat, aut victus rationem inordinatam. Rubores circa naſum, alvi humeſcentiſ ſigna ſiunt. Dolores circa præcordia, aut pulmonem, ſi ſuppurentur, malum eſt. Oculorum puritas, & albas ipſorum partem ex nigris, aut lividis puras fieri, iudicatorium eſt. Si igitur cito purgentur, celerem iudicationem ſignificat; ſi tarde, tardioſam. Caligo oculorum, aut ſi alba ipſorum pars rubefcat, aut liveſcat, aut veniſ nigris impleatur, bonum non eſt. Malum eſt etiam lucas ſplendorem fugere, aut lachrymari, aut diſtorqueri. Et aliter immorem fieri malum eſt, & oculos frequenter agitare, ac iſtare, aut parvas lemas, ac ſordes circa ipſos, aut concretione tenuem albicantem habere, aut albam partem maiorem fieri, nigram vero minorem, aut nigram ſub palpebram ſupernam occultari. Mala eſt etiam oculorum cavitas, & expreſſio valde foras, & ſplendoris exteriſ, ut pupilla extendi non poſſit. Et extremitatum palpebrarum curvitas, & oculi fixi, & aſſidue viſtare, & colores permutare, & palpebras inter dormiendum non committere, pernicioſum eſt. Malus eſt, & oculus perverſus. Oculorum rubor in febre ſiens, alvi diuturnam malignam affectionem ſignificat. Circa oculos puſtularum eruptiones in virum reſectioſibus, alvum promovere faciunt. In oculorum diſtortione febrientiſ, laſſato, rigor pernicioſus, & ſoporofus in hiſ male habent. Viro lippienti, febre ſuperveniente, ſolutio; ſi minus, periculum eſt, ne cæcus fiat, aut pereat, aut utrumque. Quibus lippientibus capitis dolor accedit, & ad multum tempus concomitatur, periculum eſt ne cæci ſiant. Lippienti alvi proſſuvium ſua ſponte prodens, utile eſt. Oculorum obſcuratio, & oculus fixus caliginofus, malum. Oculorum obſcuratio, cum animi deliquio, brevi convulſionem inducit. Oculorum rectitudo in morbo acuto, & motus velox, & ſomnus turbulentiſ, & vigiliæ, & quandoque ſanguinis e naribus ſtillationes, niſil boni. Qui febres ad tactum non adurentes habent, phrenitici ſiunt, & magis ſi ſanguis fluxerit. Lingua, quæ in quidem inſorruit, in colore vero permanet, progreſſu autem temporis exaſperatur, & liveſcit, & rumpitur, lethaliſ eſt. Si vero valde nigreſcat, in quarta decima die iudicationem fore ſignificat. Periculoſiſſima autem eſt nigra, & cum virore pallida. Lingua circa bafim ſui partem velut ſaliva alba obduci, febris remiſſionis ſignum eſt, ſi quidem id, quod ſuperinductum eſt, craſſum fuerit, eadem die. Si vero tenuis, poſtridie. Si vero adhuc tenuiſ, tertia die. Eadem ſignificant etiam huiusmodi, ſi circa ſummam linguam ſiant, verum minus. Lingua tremula cum rubore iuxta naſum, & alvo liquida, ſi reliqua ſine ſignis ſint circa pulmonem, malum eſt, & celeres purgationes pernicioſas ſignificat. Lingua circa rationem tenera ſiens, & cum cibi ſaltuſio naſcebunda, cum frigido ſudore, ex alvo liquida, uigrorum vomituum ſignum eſt, laſſidum in hiſ malæ eſt. Lingua tremula quibuſdam etiam alvum liquidum quandoque faciunt. Denigra vero in hiſ celerem mortem ſignificant. Num lingua tremula mentem non firmam ſignificat? Lingua æſpera, & reſecata, phrenitica ſunt. Dentes colla-

dere;

dere, aut stridere, quibus non familiare id est a pueris, furiosum, ac lethale est. Jam
 vero delirant, si hoc faciat, penitus lethale est. Perniciosum autem est & rescitari den- 370
 tes. Dentis corruptio abscessum circa gingivam factum solvit. Ex dentis corru-
 ptione vehemens febris superaddens, & delirium lethale est. Si vero serventur, ulce-
 ra suppurant, & ossa discedunt. Quibus circa palatum humoris collectio fit, ple-
 numque suppuratur. Dolores vehementes circa maxillas, periculum est, ne ad ossis 375
 educationem deveniant. Labium contractum, alvi biliosa eruptionem significat. San-
 guis de gingivis, ex alio liquida, perniciosus. Sputi excretaiones in febre livida,
 nigrae, biliosae, si quidem supprimantur, male sunt, secedentes vero pro ratio-
 ne, utiles. Quibus sanguinolenta spata, ac tussis supprimuntur, his corpus velut a pu-
 stulis rubescit. Verum ante obitum exasperatur. Stratio frequens, si sane & aliud 380
 quoddam signum affuerit, phrenitidem indicat. Vocis interceptiones cum exolu-
 tione pessimae. Modice feroces mentis emotiones malae, & ferinae sunt. Quibus vox
 cum febre deficit, & cum iudicatione intercepta, tremuli moriuntur. Vocis in-
 terceptiones in febre convulsorio modo fientes, ad mentis emotionem cum silentio de-
 veniunt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones dolorosam mortem indu- 385
 cunt. Vocis interceptiones cum exolutione stupefactorio modo, perniciose sunt.
 Voces contractae post medicamenti sumptionem num pravae sunt? Plerique horum ex-
 dant, & ventres humectos habent. In vocis interceptione spiritus, velut his, qui
 strangulantur, praeter manibus expositus, malus est. Num & mentem emovet? Ex ca-
 pitis dolore vocis interceptiones si sunt, febricitantes cum sudore laxantur in se ipsos, 390
 finitque morbi revertentes, diutius durantes; his insuper rigere, malum non est. Mentis
 emotiones cum vocis interceptione, perniciose. Vocis interceptiones insuper
 rigentibus, lethales. Tales autem leniter caput dolent. Vocis interceptiones cum
 exolutione, in febre acuta, sine sudore sunt quidem lethales, minus vero quam cum sudo-
 re. Verum diuturnitatem temporis significant, fortassis autem & qui ex recidiva tale 395
 quid patiuntur, tutissimi sunt. Perniciosissime autem ex talibus habent, quibus san-
 guis ex naribus fluit, & quibus alvi humectantur. Vox acuta, plandum refe-
 rentis, & oculorum obscuratio, convulsorium est. Dolores his ad infernas partes, to-
 lerati faciles sunt. Cum voce tremula, solutio alvi praeter rationem, in his
 moram trahentibus diuturnis, perniciosus est. Frequentes suboporate vocis 400
 interceptiones consistentes, tabem praesignant.

S E C T I O I I.

Spiritus, qui densus quidem, & parvus est, inflammationem, & dolorem i
 in locis principalibus significat. Magnus autem & per multum tempus, deli-
 rium, ac convulsionem. Et frigidus quidem lethalis est, ilethalis autem est
 & febricitulosus, & fuliginosus. Verum minus quam frigidus, & qui magnus
 foras exspiratur, parvus vero intro, & parvus foras, magnus vero intro, pes- 5
 simus sane est, & morti propinquus. Itemque extendens, & argens, & obscu-
 rus, & dupla intro revocatio, veluti superinspirantibus. Bona autem spiratio,
 in omnibus morbis, qui cum febre acuta sunt, & in quadraginta diebus
 iudicantur, magnum momentum ad salutem habet. Collum durum, &
 dolorosum, & maxillarum colligatio, & venarum jugularium palpitatio fortis, &
 incendium dissentio, perniciosum. Dolores in faucibus gracilibus strangulatorii, 10
 a capitis dolore originem trahentes, convulsorii sunt. Frigiditates colli, ac dorsi
 apparentes, sed & totius corporis convulsoria, in his mictiones sunt cras-
 siorem farinam referentes. Quibus circa fauces irritamenta sunt, his tumo-
 res circa aures leniter erumpunt. Fauces dolorosae, graciles, cum acre tole- 15
 rabili molestia, perniciose acutae sunt. Quibus spiritus retrahitur, & vox stran-
 gulatoria est, & vertebra intro cohaeret, his in fine velut contrahente quodam spi-
 ritus fit. Fauces modice exasperatae, & alvus vanis conatibus nitens, frontis do-
 lores, acri palpiando contractantes, dolorosi, quae ex his auferunt, diffici-
 lia sunt. Dolores fortes circa fauces, tumores circa aures, & convulsionem effi- 20
 ciunt. Colli item, ac dorsi dolores. Cum febre acuta convulsionem perniciose.
 Colli, & cubitorum dolores, convulsorii. A facie autem hi, & secundum
 fauces. Pallidi, graciles, salivam spurantes. In his in somnis sudores boni sunt.
 Num & sudore levati, plurimis non malum est? Dolores ad infernas partes his
 tolerati faciles sunt. In dorsi, ac pectoris dolore, mictio cruenta suppressa, 25
 perniciose est dolorose. Colli dolor malum quidem in omni febre, pessimum
 autem his, quibus timor est, ut etiam infantum. In pectoris dolore febriuloso,
 alvus turbata, torpida, nigrarum egestionum signa sunt. Dolores parvi in acutis
 iuxta fauces graciles, in gracili ubi hiarit, non facile os contrahente, mentem
 emovent. Ex his phrenitici perniciose habent. Fauces exulceratae in febre, 30
 cum alio signo ex his, quae difficilia sunt, periculose sunt. In febrilibus derepen-
 te suffocari, & deglutire non posse, citra tumorem, malum est. Collum converte-
 re non posse, neque deglutire, ut plurimum lethale est. Praecordium molle esse
 convenit, & doloris exori, & aequale. At inflammatum, aut inaequaliter se habens,
 aut do-

- 35 aut dolens, signum est aggritudinis non levis. Tumor vero in præcordiis durus, & dolorosus, pessimum quidem est, si iuxta omnes partes fuerit. Ex his autem, qui ab una parte sunt, minus periculosus est, qui a sinistris est. Significant autem in principio quidem tales mortem citam. Si vero viginti dies transmittant, febre manente, suppurationem. Contingit autem his in primo circui, etiam sanguinis eruptio e naribus, & 40 prodest. Plerumque enim hic caput dolent, & visus obducitur, & magis in his sanguinis eruptionem affore expecta. In ataribus autem annorum triginta quinque. Senioribus vero minus. At vero molles, & doloris exortes tumores, diuturniores iudicationes faciunt, & minus periculosi sunt. Sed & hi sexaginta dies transgredientes, febre manente, suppurantur. Confimilia vero significant & tumores circa ventrem, his qui sunt in præcordiis. Verum minus suppurantur hi, quam illi. Minime vero qui sub umbilico consistunt: & sunt etiam hi quidem in tunica, illi vero sursum diffusi. Lethales autem sunt ex ipsis, quicumque intro rupei fuerint. Ex reliquis autem suppurationibus, quæ quidem foras rumpuntur, optimum est, ut in brevissimam, & acutissimam molem colligantur; quæ vero intro, ut neque mole, neque dolore, neque colore foris se manifestas faciant. Contrarium autem pessimum est. Quædam vero ex his propter puris crassitudinem, nullam de se significationem præbent. Porro recentes in præcordiis tumores, si non cum inflammatione fuerint, & dolores ab ipsis solvit murnur in præcordio obortum, & maxime quidem si pertransierit per 50 urinas, & alvi egestionem. Sin minus, si etiam ipsum prætransierit. Prodest autem, & si subdescenderit ad infernos locos. Pulsus in præcordio cum tumultu, mentis emotorius est, & magis si oculi frequenter moveantur. Oris ventriculi dolor, & pulsus præcordiorum, febre perfrigerata, malum tum alias, tum si insuper exardant. Dolores ad præcordium irruentes tum alias mali sunt, tum si alvos humectent. Peiores autem sunt, si brevi fiant; & tumores circa aurem ex his emergentes, maligni sunt, & alia suppurationes. Oris ventriculi dolores cum tormine, ventris animalcula erumpere faciunt. Oris ventriculi dolor senioem frequenter impetens, mortem repentinam significat. Quibus præcordia eleuantur, alvo suppressa, malum est, maxime autem in morbis tabidis longis; & quibus alvi humectantur, in præcordio inflammatio suppurationis est, quibus ante mortem nigra per alvum 60 subeunt. Præcordiorum distentio cum sopore anxioso, in caput dolente, abscessus circa aurem attollit. Post præcordiorum tumorem, biliosus spiritus magnus, & febris acuta, abscessus circa aurem attollit. In dolore præcordiorum submurmuranti, lumborum dolor superaddens in febribus, ventres ut plurimum humectat, si non status eruperit, aut urina copia prodierit. Ex præcordio diutine afflicto, & alvo graveolenti, abscessus circa aurem occidit. Quibus a præcordiorum doloribus, alvus paulatim subviscosa egerens, & pauca stercoracea effundit, num etiam sanguinem effundit? Quibus derepente dum sine febre sunt, præcordii, & oris ventriculi dolor, & circa crura, ac infernas partes, & alvi in tumorem elevata est, solvit venæ sectio, & alvi fluxio. His febrile noxium est. Longæ enim, & vehementes febres sunt, & tussis, & spiritus, & singulus sunt. His autem ad solutionem tendentibus, dolor sortis coxarum, aut erurum, aut puris spiritum, aut oculorum privatio succedit. Quibus dolores præcordiorum, oris ventriculi, hepatis, partium circa umbilicum, hi sanguine per alvum egesto, servantur, non autem egesto, moriuntur. Quibus præcordia non mollia, facies sana, non liberantur 80 circa multi sanguinis ex naribus fluxum, aut convulsionem, aut coxendicium dolorem. Dolores ad præcordia in febre, voce intercepta, sine sudore soluti, malum est. His ad coxendices dolores sunt. Iuxta ventrem in febre palpitationes, mentis emotiones inducunt. Sanguinis autem fluxus horrorem efficit. Dolores in febre ad præcordia exilientes, sine sudore soluti, maligni sunt. His ad coxendices dolores sunt, & ipsi una cum febre ardente, alvus deorsum erumpens, perniciosum est. Dolores circa umbilicum palpitatorii, habent quidem & aliquid mentis emotorium, verum circa iudicationem pituita his acervatim copiosa cum dolore penetrat. Post alvum suppressam, præcordia sublevata in tumorem mala sunt, maxime tabescentibus iam diu, & quibus alvi humectantur. 90 Anxietatem in præcordio sentientibus, tumores circa aurem oborti, ipsos occidunt. Durities circa ventrem cum dolore, in febrientibus cum horrore, cibum averfantibus, si alvo insuper parum humectata, purgatione non faciant, ad suppurationem perveniunt. Dolor supra umbilicum, & lumborum dolor, si medicamentis non solvantur, in hydropem siccam desinunt. * Dolores ex lumbis diuturniores, qui febre tertianæ generis modo exacerbantur, grumulosum sanguinem egerere faciunt. Dolores in lumbis, sanguinis fluxionem inducunt. Ex lumborum dolore sanguinis fluxiones largæ sunt. Quibus ex lumborum dolore, recursus ad caput, & manus torpidæ, & oris ventriculi dolores, & aurium sonitus, his sanguis large profluet. Sed & alvi his deorsum erumpunt, 100 & mens turbata est ut plurimum. Ex dorsi dolore aggritudinis principia difficilia sunt. In lumborum dolore pertinaci, & ampliore alvi subductione, a vomito vomere spumosa multa prodest. Spinæ distortionem, ac spirandi difficultatem, sanguinis fluxio solvit. In lumbis dolentibus oris ventriculi dolores in-

res insuper accedentes, signa sanguinis fluxionis sunt, etiam prægressæ. Affec-
tiones ex lumbis ad collum, & caput transeuntes, levis siderationis modo retol-
ventes, convulsoriæ, mentis emotivæ sunt. Num tales etiam solvuntur convulsioni-
bus? Aut talium alvi agrotant per eadem prodeuntia. Ex lumborum dolo-
ris recursum, oculorum distortio, malum. Dolor in pectus firmatus corpore,
malus in febre est. Hi repente pereunt. Ex lumborum dolore recursiones ad
os ventriculi febriculosæ, horrorem inducentes. Sic affecti revomentes tenuia a-
quosa, mentis moti, voce destituti, nigrorem vomitu facto moriuntur. Diu-
tius circa lumbos, & renue intestinum dolores, & ad præcordia dolores, si ægri
cibos averferentur una enim febre, his dolor intentus ad caput progressus, repen-
te ipsos occidit convulsorio modo. Quibus lumborum dolor est, hi male
habent. Num his tremores fiunt, & circuli rubicundi in tribus in rigore? Num
lumbos dolentibus, cibos fastidientibus, non vomentibus, modice ferociter men-
te motis, spes est nigra putiura esse? Lumborum dolor in ventriculi os do-
lente, cum excretionem violenta, habet quid convulsorium. Rigor una cum
judicatione aliquatenus horrendus est. Lumborum dolor sine causa manifesta
saepe imperens, maligni morbi signum est. Lumborum dolor cum sopore
auxilio, malus est. Lumborum distentio ex muliebrium mensium multitudine
ne, ad suppurationem tendit, & varie prodeuntes viscosi, graveolentes, strangula-
torii menses ex prædictis, ad suppurationem tendunt. Arduum autem tales etiam
aliquantum delirare. Quibus lumborum dolor, & lateris, sine causa manifesta,
hi regium morbum incurunt. Perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus in
diebus judicatoriis vehementes, pessimæ fiunt. Vice versa sanguinem erum-
pere, malum est, velut in splene magno ex dextris, & circa præcordia eodem modo
se res habet. Vulnere sanguinem fundentia, insuper rigeoria, maligna. Sic affec-
ti loquentes latenter moriuntur. Affectiones quæ quinta die sanguinem large
fundunt, sexta insuper riguerunt, septima perfrigerata fuerunt, & repente recer-
lesactæ, in his alvi male afficiuntur. Post sanguinis eruptionem, nigrorem
per alvum egestio, mala. Mala autem fiunt & rubicunda valde & atroxiosa. Quar-
ta die tales fiunt sanguinis eruptiones. Soporosi ex talibus convulsi moriuntur,
nigris prægressis, & ventre tumefacto. Post sanguinis eruptiones, & nigro-
rem egestionem, in acuro furidus, malum. Sanguinis egestio his perniciofa. Sur-
ditas autem solvit. Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis pro-
gressu alvi male afficiuntur, si non urina concocta prodierit. Num & aquosa u-
rina tale quid significat? Quibus ex sanguinis eruptione larga frequenti, mul-
ta sit alvi cum nigris egestio, ea autem suppressa, sanguinis fluxiones, hi alvum
dolent, una vero cum quibusdam flaribus facile tolerant. Num tales multis frigi-
dis sudoribus exundant? Conrurbari in his urina, mala non est, neque id quod genita-
ria simile in ipsa residet, verum plerumque hi aquosa miagunt. Quibus de na-
ribus in furiditate, ac corpore paucæ destillant, habent quid difficultatis. Vomit-
us his conducit, & alvi perturbatio. Magnæ in principis sanguinis eruptio-
nes circa refectionem alvos humectant. Fluxiones ex naribus largæ per vim sup-
pressæ, quandoque convulsionem provocant. Venæ sectio solvit. Unde-
cima die fientes sanguinis stillationes, difficiles sunt tum alias, tum si bis super-
stillaverint, & rursum stillaverint. In sanguinis fluxione multa, aut singula,
aut convulsio, mala est. In his qui decolores usque ad septem annos vires recol-
ligunt, & spiritus in viis acervatus, & terræ concupiscentia, sanguinis corruptio-
nem ac exolutionem significat. In morbis longis parvæ comparentes san-
guinis fluxiones, perniciosæ sunt. Vertigines ab initio sanguinis narium
fluxio solvit. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus per-
frigerentia, maligna sunt. Sanguinis detractio in perfrigeratione torpida,
mala est. Qui alvo suppressa sanguinem effundunt, & una cum sanguinis ef-
fusionem insuper rigent, his alvum velut ex intestinorum levore lubricam hæc fa-
ciunt, iremque durant, & ascaridas, aut ambo. Sanguinis fluxiones stasis rem-
poribus fientes, sirculose, si sanguinem non effuderint, comitalis morbi mor-
tem inducunt. Ex hæmorrhoidæ parum apparente vertigines obortæ, par-
vam ac modicam siderationem significant. Solvit venæ sectio. Et quicquid hoc
modo apparuerit, mali aliquid significat. Palpitantes per totum, num etiam
voce interceptæ moriuntur. Tremores convulsorii fientes in sudoribus, reverti
solent. Judicatio his fit, ubi superriguerint. Superrigent autem hi ardore circa
venrem provocati. Somnus multus in his convulsorius, & ad frontem gravita-
tes, & midio difficilis. Convulsionem antea non cognita in strangularis ab
uretro, faciles sunt. Convulsoria sine sudore spurta defluentia in febrent, le-
via sunt. His insuper alvi aliquantum humectantur, fortassis aurem & ad arriolos
aliquid abscedit. Quibus convulsus oculi intente relucunt, neque apud seiplos sunt,
& diutius agrotant. Quæ convulsorio modo exacerbantur, cum stuporis detentio-
ne, abscessus iuxta aurem excitant. Tremulis, anxiosis, parvi iuxta aurem
tumores convulsionem significant, alvo male affecta. Convulsionem & te-
tanicas distentiones febris accedens solvit. Convulsio ex vulnere lethali
lis est.

lis est.

- Convulsio in febre fiens, pernicioſa eſt. Minime vero pueris. Seniores ſeptem annis in febre non corrumpuntur convuſione. Sin minus, pernicioſum eſt. 175 Convuſionem ſolvit febris ſuperveniens acuta, quæ prius non fuit. Si vero fuit prius, jam exacerbata. Prodeſt & urinae tranſitus vitri ſpeciem referens, copioſus, & alvi fluxus, & ſomni. At repentinæ convuſiones ſolvit febris, alvi fluxus. In convuſionibus vocis interceptio diu durans, mala eſt; parva autem, aut lingua ſiderationem, aut brachii; aut dextrarum partium ſignificat.
- 180 Solvitur autem urinis multis acervatis derepente prodeuntibus. Sudores autem paullatim fientes proſunt; acervati vero, itemque ſanguinis detractiones acervatæ lædunt. In diſtentionibus & anre & reſtro ſientibus, & in tertium ſolum contingentibus, ſi maxilla ſolvantur, lethale eſt. Lethale eſt etiam ſudare in diſtentione in dorſum ſiente, & corpus diſſolvi, & in eadem affectione revomere
- 185 per nares, aut clamare, aut nigrari, ſi ab initio vox intercepta fuit. In poſteram enim diem mortem ſignificat. Febriles in dorſum diſtentiones, urinae genitura ſimiles ſolvunt. Angina, quæ neque in collo, neque in faucibus quicquam conſpicuum faciunt, verita ſuffocationem vehementem ac ſpirandi difficultatem inducunt, eadem die & tertio occidunt. Quæ vero tumores & ruborem in collo
- 190 accipiunt, in cæteris quidem conſimiles ſunt, verum diuturniores. Quibuſcumque vero & fauces, & cervix, & pectus ſimul rubuerint, diuturniores ſunt, & ex iſtis maxime ſervantur, ſi non recurrerint rubores. Si vero diſſipentur, neque tuberculo ſoras converſo ac collecto, neque pulte leniter ac ſine dolore emacato, neque in diebus iudicatoriis, pernicioſæ ſunt. Num etiam ſuppurati ſunt? Securiſſimum autem eſt ruborem & abſceſſus quamaxime ſoras verti. Eryſipelas vero ſoris quidem accedere, commodum eſt, intro autem converti, lethale. Convertitur autem intro, quum diſparente rubore pectus gravatur, & difficilem ſpirationem
- 195 habet. Quibus vero anginae ad pulmonem vertuntur, partim in ſeptem diebus pereunt, partim evadentes ſuppurati ſunt, ſi non educio pueriſſima ſurſum iſtis fiat.
- 200 Quibus per pulſationis venarum vehementiam ſtercus derepente per alvum ſecedit, lethale eſt. In anginis ſputa gracilium ſubarida, mala. Anginoſi ſi in linguis tumores, circa ſigna diſparentes, pernicioſi; & dolores diſparentes circa manifeſtam caſſam, pernicioſi ſunt. In anginis qui non brevi concocta exſpuunt, pernicioſe habent. In angina dolores ad caput, circa nares, cum
- 205 febre, pernicioſi. In angina dolores ad crura, circa nares, cum febre, pernicioſi. Ex anginis circa iudicationem præcordii dolor, cum impotentia ac corpore fiens, occidit occulte, etiamſi valde manſueſce ſe habere putent. Ex anginoſis circa nares attenuatis, dolor ad pectus & ad alvum progreſſus concitatus, pus egreſſe facit, alias autem qui exolvitur tale eſt. In anginis omnia pernicioſa ſunt, quæ non manifeſtum dolorem faciunt. Sed & ad crura dolores diuturni procedunt, & difficileſt ſuppurantur. Ex angina ſputa viſcoſa, craſſa, valde alba, quæ violenter educuntur, mala ſunt. Et omnis ejuſmodi inſaturatio, mala. Purgatio multa deorſum, tales levis ſiderationis modo perimit. Ex angina, ſubarida frequenter ſputa, cum tuſſi, lateris dolorem inducentia, pernicioſa; itemque ea quæ inter potandum per tuſſim ſubmergunt; & deglutitæ violenta, mala. 215 Pleuritici, quibus in principio ſputationes penitus purulente ſunt, tertia die moriuntur, aut quinta. Si vero has effuſerint, non multo melius habentes, ſeptima, aut nona, aut undecima ſuppurari incipiunt. Quibus ſupra autem rubor, & ſimiliter veluti pleuritici caleſcunt, & alvus bilioſa ac graveolentibus exturbatur, hi viſciſſima, ac quadrageſima die periclitantur. Ubi vero has effuſerint, ſervantur. Pleuritides ſiccæ, ac ſine ſputo difficiliſſimæ ſunt. Horrendæ quoque hæ in quibus dolores ſuperne ſunt. Pleuritides ſine convuſionibus, gravioreſ ſunt hiſ, quæ cum convuſionibus ſunt. Quibus pleuritidis in principio lingua bilioſa fit, hi ſeptima die iudicantur. Quibus autem tertia, aut
- 225 quarta die, circa nonam. Bulla ſublivida ſiente in lingua, in principio, qualis eſt ferri tincti in oleum, difficiliſſor ſolutio contingit; & iudicatio quidem ad decimumquartum diem pervenit, ſanguinem autem plerumque ſpuunt. Sputum in pleuritidis tertia die maturari, ac exſpu iocipiens, citiores ſolutiones facit, verum poſteriori, tardiores. In doloribus pleuriticorum commodum eſt alvum moliri, ſputa colorari, ſtrepitum in pectore non fieri, urinam bene procedere. Hiſ autem contraria, difficiliſſa ſunt; itemque ſputum dulce fieri. Bilioſa ſimul, & ſanguineæ pleuritides, plerumque nona, aut undecima die iudicantur, & maxime ſanantur. Quibus autem pleuritidis in principio quidem dolores molles ſunt, quinta vero aut ſexta die exacerbantur, hi magis ad duodecimam perveniunt, & non
- 235 valde ſervantur, periclitantur autem maxime ſeptima die, ac duodecima. Ubi vero hiſ ſeptem dies effuſerint, ſervantur. Quibus pleuritidis ſtrepitus ſputi multum in pectore eſt, & facies triſtis, & oculus morbi regii colore inſectus, ac caliginofus, hi pereunt. Qui ex pleuritide ſuppurati ſunt, in quadrageſima a ruptione diebus expuunt. Sputum in omnibus pleuritidis, ac peripneumonia
- 240 cis facile, ac cito expui convergit, & flavum ſputo ammiſtum eſſe. Quod vero longe poſt dolorem educitur flavum, aut non mixtum, & multum tuſſim inducens,

ducens, malum est. Prævum autem penitus est flavum meracum, & viscosum, & album, & rotundum, & cum virore pallidum valde, & spumofum, & lividum, & æruginofum. Peius autem aliquanto est id, quod ita meracum est, ut nigrum appareat. At sanguine non multo permixtum flavum, in principio quidem salutare est, septima vero die, aut posterius, minus tutum. Sanguineum vero valde, aut lividum, statim in principio periculofum est. Præva sunt etiam sputa spumofa, & flavæ, & nigra, & æruginofa, ac viscosa, & quæcumque cito colorantur. At mucosa, ac fuliginofa & cito colorantur, & securiora sunt. Quæ vero intra quintum diem ad coctionem colorantur, meliora sunt. Omne porro sputum non solvens dolorem, malum est; solvens autem, bonum. Quicumque vero cum bilioso purulentum educunt, aut seorsim, aut permixtum, plerumque decimaquarta die moriuntur, si non mali aut boni quippiam ex præscriptis superveniat. Sin minus, pro ratione, maxime autem his quibus ejusmodi pus septima diei incipit. Bonum vero est & in his, & in omnibus circa pulmonem morbis, facile ferre morbum, a dolore liberatum esse, sputum facile educere, bene spirare, & sine siti esse, & totum corpus æqualiter calefcere, ac molle esse. Et ad hæc somnos, sudores, urinas, alvi egestiones, bonas esse. Mala autem sunt his contraria. Si quidem igitur omnia bona ad hoc sputum accesserint, servari homo poterit. Si vero partim affuerint, partim non, non ultra decimumquartum vita producta peribit. Quod si contraria signa accedant, citius etiam. Quicumque vero dolores in his locis non sedantur, neque ad exspuitiones, neque ad venarum sectiones, ac victus rationes, suppurantur. Quibuscumque autem ex peripneumonia abfcessus circa aurem, aut ad infernas partes fiunt, & suppurantur ac fistulantur, hi supersites evadunt. Fiant autem his, quibus & febris, & dolor affuerit, & sputum pro ratione non prodierit, neque biliofa alvi egestiones, & solutæ faciles ac meracæ fiunt, neque urina crassa valde, & multam subsidientiam habens: & alia salutaria habuerint. Fiunt autem ad infernas quidem partes his, quibus circa præcordia inflammatio fit; ad fupernas vero, quibus præcordium molle & doloris exors fuerit, & ubi per tempus aliquod difficulter spiraverint, ac citra manifestam causam cessaverint. At abfcessus ad crura in periculosis inflammacionibus pulmonis omnes quidem commodi sunt, optimi autem, sputo purulento pro flavo fiente. Non procedente vero sputo secundum rationem, neque urina bonam subsidientiam habente, periculum est claudum fore hominem, aut multum molestiarum exhibituram res est. Si vero recurrerint abfcessus, febre consequente, & sputo non procedente, periculum est, ne moriatur, ac deliret. Quicumque vero peripneumonici non purgati sunt judicatoris debus, sed mente moti quatuordecim dies effugerunt, eos periculum est suppuratos fieri. Peripneumonia ex pleuritide transmutata, securiora sunt his, quæ ab initio fiunt. Corpora exercitata, ac densa citius a pleuronicis ac peripneumonicis morbis pereunt, quam inexercitata. Gravedines & sternutationes in morbis circa pulmonem & antecessisse, & succedere, malum est. Reliquis autem sternutationi non incommoda est. Peripneumonicis, quibus lingua tota alba, ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflammatae sunt. Quibus vero dimidium, una, juxta quam apparet. Et quibus ad unam claviculam dolor fit, his suprema pulmonis ala una ægrotat. Quibus autem ad ambas clavículas dolor fit, ambæ superne pulmonis alæ ægrotant. Quibus juxta mediam costam, media. Quibus ad discriminationem, inferna. At totam unam partem dolentibus, omnia juxta hanc partem dolent. Si quidem igitur aortæ appellatæ, utrimque appendentes pulmonis partes, valde inflammatae sunt, ut ad latera affideant, hac corporis parte resolvuntur, et livores foris circa costam habent. Hos autem veteres ictos, sive syderatos vocabant. Si vero non valde inflammatae sunt, ut non affideant; dolor quidem fit per totum, non ramen resolvuntur, neque livores habent. Quibus vero totus pulmo inflammatus fuerit una cum corde, ut ad latera allabatur, hi toti resolvuntur, & jacet æger frigidus, sensus exors. Moriturque secunda aut tertia die. Si vero etiam sine corde conegerit, minus diu vivunt. Quidam autem etiam servantur. Qui suppurati fiunt, maxime ex pleuritide, ac peripneumonia, eos calores comitantur, interdum tenues, noctu vehementiores, & nihil memoratu dignum sputum, & circa collum ac claviculam sudant, & oculi cavi fiunt, maxillæ vero rubent, digiti summi deterius calefcunt ac asperantur. Ungues curvantur, ac perfrigerantur, & circa pedes tumores habent, & circa corpus pustulas, & abstinent a cibis. Diuturnæ igitur suppurationes signa hæc habent. Quæ vero brevi rumpuntur, ex notis ad eas consequentibus cognoscere oportet, & ex doloribus in principio. Simil autem & si aliquanto difficulter spiraverit homo. Rumpuntur autem plurimæ suppurationes partim vigesima die, partim quadagesima, partim sexagesima. Quibus igitur dolor in principio incumbit inentus, & spirandi difficulas, & tussis cum sputatione, ad vigesimum diem, aut citius eruptionem expecta. Quibus autem leviora hæc sunt, juxta rationem. Suppurare autem oportet tempus, a quo primum doluit, aut gravatus fuit, aut febris, aut si quando rigor corripuit. Necesse est autem præcedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & sputationem, ante ruptionem. Quibus igitur & febris statim post ruptionem decedit, & cibum appetunt, & pus facile educitur album, inodorum, leve, ejusdem coloris, &

- ris, & a pituita liberum, & alvus parva compacta egerit, plerumque brevi servantur. Quos vero & febres sequuntur, & siris, & cibi fastidium, & pus lividum, aut cum virore pallidum, aut pruitiosum, aut spumosum, & alvus insuper liquida fit, moriuntur. At quibus aliqua ex prædictis accesserint, aliqua non, horum aliqui
- 315 peteunt, aliqui multo tempore servantur. Qui suppurati sunt, primum falsuginosum spunt, deinde dulcius. Quibus in pulmone tubercula fiunt, pus educunt ad dies quadraginta post ruptionem. Has vero transgredientes, plerumque tabidi fiunt. In lateris dolore stillatio sanguinis de naribus mala est.
- 320 Quos suppuratos mitius habentes, sputorum graveolentia sequuntur, eos res cida occidit. Qui ex pleuritice exspunt purulenta, subfiliola, totunda, aut purulenta subcruenta progressu tempore, perniciose habent. Perniciose item qui nigra fuliginosa spunt, aut quibus velut a vino nigro sputa fiunt. Quicumque sanguinem spumofum spunt, dextrum præcordium dolentes, de hepate spunt, & multi pereunt. Quibus dum concutiuntur pus cœnosum, & graveolens
- 325 prodit, plerumque pereunt. Quibus a pure specillum coloratur, velut ab igne, plerumque peteunt. Cum lateris dolore, non tamen pleuritico, & turbulenti tenuibus lenibus, hi phrenitici evadunt. In morbis pulmonis valde rubicundæ sanguinis stillæ, malæ sunt. Cum raucedine, sputa viscosa, falsuginosa, mala. Si vero etiam quid attollatur juxta pectus, in his malum est. Dolores
- 330 ad collum his attenuati perniciosi. Raucedo cum tussi, & alvo liquida, pus educit. Quibus in peripneumonia urinæ crassæ in principio, deinde ante quartum diem attenuantur, lethale est. Qui in peripneumonis siccis pauca cœnocta educunt, horrenda res est. Rubores in pectoribus sublati, talibus perniciosi sunt. Lateris dolor in spuro bilioso, præter rationem evanescens, mentem emovet. Febres intermittentes ob suppurationem, pleræque sudorificæ sunt. Suppuratis surditas oborta, cruentam egestionem significat. His ad finem nigra prodeunt. Lateris dolor cum febre diuturna, puris educationem fore significat. Horrore affecti frequentes ad suppurationem deveniunt. Sed & febris tales ad suppurationem perducit. Quos ex lateris dolore cibi fastidia se-
- 340 quuntur, oris ventriculi dolore, ac sudore aliquantulum vexantur. Faciæ flores habente, & alvo liquidote, suppirationes circa pulmonem habent. Erectæ cervicis spirationes facit hydrops siccus. Convulsiones omnes quidem molestæ sunt, & dolores in principio intentos inducunt, & postea quique aliquos commonefaciunt. Verum difficilissimæ sunt circa thoracem, & maxime periculosæ.
- 345 Quibus est vomitus sanguinis, febris multa, & dolor circa mammam, thoracem, & dorsum: quibus hæc omnia fiunt, brevi moriuntur. Quibus autem non omnia, neque valde, tardius. Inflammati autem sunt diebus quatuordecim ad summum. Sanguinem spuentibus confert, ut sint sine febre, & tussiant, ac doleant levitet, & ut sputum tenue fiat ad dies his septem. Febrile veto & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinem recentem semper spuete, incommodum est.
- 350 Quibus latus sublevatum in timorem ac calidius est, & inclinatis in alterum, gravitas aliqua impendere videtur, his pus ex una parte est. Suppuratis pulmonem per alvum pus secedere, lethale est. Quicumque vulnerati in thoracem, externa vulneris parte sanati sunt, interna non, periclitantur ne suppurati fiant. Quibus autem debilis inducta est intus cicatrix, facile refringitur. Ex peripneumoniacis sup-
- 355 putationibus seniores magis peteunt, ex reliquis juniores. Quibus suppurationis, dum concutiuntur, multus strepitus de humeris fit, minus pus habent hi, quam quibus pœnis, si difficiliter spirent, & meliorem colorem habeant. Quibus autem strepitus quidem nullus fit, verum difficultas spirandi fortis, & unguis lividi, hi pleni sunt pure, & perniciose habent. Qui spumofum sanguinem vomunt, dolore infra septum transversum non existente, de pulmone vomunt. Et quibus quidem magna in ipso vena rumpitur, multum vomunt, & in periculo versantur. Quibus vero minor, minus educunt, & securiores sunt. Quibus tabidis sputum in igne
- 360 gravem nidorem olet, & capilli de capite fluunt, peteunt. Quibus tabidis in matre expuentibus, pus ad fundum sidit, brevi peteunt. Sit autem mare in aëneo vase. Quibus tabidis capilli ex capite desluunt, a profluvio alvi moriuntur. Et quibus tabidis alvi profluvia accedunt, moriuntur. In tabescentibus spura suppressa, mentem ad nugas garrendas emovent. His spes est hæmorrhoidem apparere posse. Tabes periculosissimæ sunt, a ruptione venarum crassarum, & a desluu de capite. Etates periculosissimæ sunt ad tabem, ab anno decimo octavo usque ad trigessimumquintum. Prutiginosa corpora, post alvum suppressam, in tabidis mala sunt. In habitibus tabescentibus cum febre, tumores ad gingivas & dentes comparentes, malæ sunt. In omnibus in tumorem elevata præcordia, mala sunt, in tabidis autem pessima. Ex his, qui diutina
- 375 tabe perniciose consumpti sunt, aliqui ante finem rigore apprehenduntur. Pusillarum eruptiones velut ferro lancinatæ, habitus tabem significant. Difficiliter spirantes ex putredine, multa cruda educentes in tabe, perniciose habent.

S E C T I O III.

Quibus hepaticis multum est sputum cruentum, sive subputridum, sive bilio-
sum meracum, statim perniciosum est. In hepatico colliquo cum raucedine,
malum tum alias, cum si aliquantum tussiat. Hepar dolentes, os venter-
li dolentes, soporosi, rigorem habentes, & alvum turbatam, renues, cibum aver-
santes, multum exsudantes, purulenta per alvum egerunt. Hepar derepente circum-
circa dolentibus febris accedens, dolorem solvit. Qui sanguinem spumofum
spuunt, præcordium dextrum dolentes, de hepate spunt, & moriuntur. Quibus
hepar ultis velut amara prodit, lethale est. Hydropes ex morbis acutis do-
lorosi sunt, ac perniciosi. Incipiunt autem plicque a laterum mollitudine, aliqui
etiam ab hepate. His igitur, quibus a laterum mollitudine initium sumunt, pedes tu-
munt, & alvi profluvium diuturna sequuntur, alvum non mollicitia, neque dolores ex
lumbis, & laterum mollitudine solventia. Quibus vero ab hepate, tussis adhuc prom-
pte oboritur, & pedes tumunt, & alvus dura egerit, eaque ad necessitatem coacta, &
tumores circa ipsam sunt, partim in dextera, partim in sinistra, & rursum sedan-
tur. In hydropicis siccis, urinæ stillicidia mala. Malæ etiam urinæ parvas sub-
sidentias habentes. Hydropicis comitialis morbi affectiones accedentes, per-
niciose sunt, & inter se signa prava sunt, & alvos hincant. In biliosis al-
vus turbata, egerens parva genituræ similia, mucosa, & dolorem circa pubem indu-
cens, & urinæ non facile solubiles prodeuntes, ex talibus in hydropem desinunt.
Hydropico febrent, urina parva, & turbata, perniciose est. In aqua in-
ter cætem incipiente, alvi profluvium aquosum fiens, citra cruditatem, morbum solvit.
In hydropico siccio sui significacionem præmittente, termina circa intestinum te-
nue incidentia, mala sunt. Ex hydropicis comitiales perniciosi. Hydrops,
qui ad curationem remisit, recurrens, desperatus est. Hydropicis circa venas
aqua in alvum prolapsa, solutio fit. Dysenteria intempestive suppressa, abscis-
sum in costis, aut visceribus, aut in articulis facit. Num igitur biliosis abscessus
in articulis, sanguineus in costis aut visceribus sit? Dysentericis vomitus
biliosus in principio, malus est. Quibus ex dysenteria acuta humor ad pu-
rulentiam devenit, his id, quod superstat, valde album, ac multum erit. Dyse-
ntericæ, subrubræ, limosæ, largæ egestionis alvi, in flammis valde rubicundis colori-
bus solutæ, infanti risorem inducunt. Dysenteria non longa splenicis commo-
da est, longa vero mala; desinente enim, si hydropes aut intestinorum levitates
sunt, lethale est. In intestinorum levitatibus, cum animalculis, dolores tormine
soluti, partes circa articulos tumefaciunt, ex talibus squamulæ rubicundæ pustulo-
sæ, hi ubi exudarunt, velut flagris cæsi rubescunt. Qui in longis intestinorum le-
vitatibus, una cum animalculis, tormina patiuntur, & doloribus afficiuntur, his fo-
lities inimescunt. Insuper rigere his malum est. Intestinorum levitates cum spiran-
di difficultate, & lateris punctura, in tabem desinunt. Volvulosis vomitus, & fur-
ditas, malum. Vesicæ duræ, & dolentes omnino quidem malæ sunt; pessimæ vero
cum febre continua. Nam dolores ab ipsis vesicis ad occidendum sufficiunt, & alvi
his non valde egerunt. Solvit autem hos urina purulenta prodens, albam ac levem
subsidentiam habens. His vero non solutis, neque vesica mollescente, in primis circui-
tibus agrum moriturum esse, timor est. Fit autem hoc maxime a septem annis usque
decimumquintum. Calclosi ita figurati, ut lapis ad urinarium meatum non illa-
batur, facile mingunt. Quibus tuberculum est circa vesicam, quod mingendi dif-
ficultatem inducit, ad omnis generis figuras vexantur; hujus autem solutio fit, pure
erumpente. Quibus urina clandestine affabitur ad pudendum, exolvuntur desperati.
In urinæ stillicidio volvulus accedens, septima die perimit, si non febre ac-
cedente, urina acervatim prodeat. Torpores, & sensus stupiditates, præter
morem fientes, futuræ syderationis signum sunt. Qui ex vulnere impotentes sunt
corpore, febre quidem accedente citra rigorem, sanantur; non autem accedente, sy-
derati sunt dextra, aut sinistra parte. Syderatis si hæmorrhoides accedant, utile
est; si vero frigiditates, & torpores, malum. In syderatis ex spiritus ægra latio-
ne sudor accedens, lethale. Rursum autem in his ipsis si febris accedat, solutio fit.
Syderationes derepente exolutorio modo fientes, febre insuper temporis pro-
gressu accedente, perniciose sunt. Quibus ex aliqua ægritudine ad aquam
inter cutem res devenit, his alvi sicæ excrementa, caprii stercoreis pilulis similia
egerunt, cum eliquatione mucosa, & urina non bona, & distentiones circa præcor-
dia, & dolores, ac tumores circa ventrem, & dolores circa laterum mollitudinem,
& juxta spinæ musculos accidunt; febres item, & siris, & tussis sicæ sequuntur, &
circa motus spirandi difficultas, & crurum gravitas, & a cibis abstinent, & paucis in-
gestis explentur. Hydropas leucophlegmatias appellatos, alvi profluvium se-
dat. At tristitie cum silentio, & hominum averfationes, leniter eo modo affectos
occidunt. Qui ex timore cum perfrigeratione mente moventur, febres cum sudo-
ribus, & somni vocem aliquantum intercipientes, hæc solvunt. Ex infania ad
raucedinem cum tussi sic dæccellus. In furiosis convulsio accedens, dissipatio-
nem

- nem facit. Mentis emotiones taciturnæ, non quiescentes, oculis circumspicientes, spiritum extra effluentes, perniciose sunt. Faciunt autem & leves syderationes diuturnas. Sed & ita affecti ad insaniam deveniunt. Qui vero in ventris turbatione ita exacerbantur, his nigra circa judicationem prodeunt. Quibus sanis hyeme circa lumbos frigiditas, & gravitas ex levi causa, & alvus suppressa, superno ventriculo probe officium suum præstante; his contendingum morbus, aut rhenum dolor, aut urinæ stillicidium fortassis contigerit. Quibus infernæ partes affliguntur, pruritibus antea sortibus obortis, his arenosa urina fit, & supprimitur. Qui vero ex his perniciose habent, his mens obtorpescit. Qui circa articulos rubicundas in superficie pustulas habent, insuperque rigorem, hi circa ventrem, & inguina ruhiunt velut ex plaga dolorosis, & moriuntur. Morbo regio affecti, non ita subtili sensu præditi, quibus singulus sunt, his alvi erumpunt. Fortassis autem & suppressor fit, hi viridanti pallore inficiuntur. Dolores juxta latus, in febris tenuiter consistentes, citra notas, venæ sectio læserit, sive cibum aversetur ager, sive præcordium sublime habuerit: & in perfrigeratione, non sine febre torpidus, sanguinis detractio lædit: & putantes le melius habere, hi moriuntur. Caput, & pedes, & manus, perfrigerari, alvo, & lateribus calidis, malum est. Optimum est, totum corpus similiter calidum, ac molle esse. Converti autem convenit facile ægrotum, & in attollendo se levem esse. At gravitas totius corporis, & manuum, ac pedum, mala est. Si vero etiam ad gravitatem lividi fiant digiti, ac ungues, mors propinqua est. Si vero penitus nigrescant, minus perniciosi sunt lividi. Verum etiam alia considerare oportet. Si enim facile fert morbum, & aliud quoddam ex bonis signis subindicat, morbus ad abscessum vertitur, & partes corporis nigrescunt decidunt. Testes, & pudenda revulsa malum significant. Flatum sine strepitu, ac crepitu prodite, optimum est. Melius autem est & cum strepitu exire, quam isthic revolvit, etiam si tali modo progressus, dolorem & desipientiam significet: si non volens homo ultro flatum ita emittat. Ulcus lividum, & siccum, aut cum virore pallidum, lethale est. Decubitus optimus est, velut quis sanus solitus fuit. At supinum jacere, erubris extensis, bonum non est. Si vero etiam delabatur pronus ad pedes, deterius est. Lethale autem est, & luare, & dormire semper, & crura supine iacentis valde incurvata esse, ac complicata. In ventrem autem decumbere, si quis non sit adjuvatus, delirium significat, & dolores circa ventrem. At pedes nudos habere, & manus, si quis non vehementer calidus sit, & crura disiecta, malum est. Anxietatem enim significat. Cæterum ætærum federe velle, malum est in acutis, pessimum autem peripneumonici, ac pleuriticis. Dormire veto oportet noctu, interdum vigilare. Contrarium autem malum est. Minime vero lædi æger poterit, si dormiat mane ad tertiam diei partem. Verum postea somni mali sunt. Pessimum autem est non dormire, neque die, neque nocte; aut enim præ dolore & afflictione vigilarit, aut ab hoc signo delirabit. Quibus tempora fecantur, convulsio ex contrariis sectioni partibus oboritur. Quibus cerebrum concussum fuerit, & doluerit, percussus, aut alias lapsus, hi statim voce privantur, & neque vident, neque audiunt, & plerumque moriuntur. Quibus cerebrum vulneratur, febris plerumque, ac bilis vomitus accedit, & corporis syderatio, atque tales perniciose habent. Ex ruptis capitis ossibus difficilissima cognitio sunt ea, quæ circa futuras rumpuntur. Rumpuntur autem maxime a gravibus, ac rotundis telis, & ex his quæ ex subcontrario asseruntur, & non ex plano loco. At vero de quibus ambiguum est, rupe ne sint, an non, judicare oportet, exhibito ad manducandum in utramque maxillam asphodeli caule, aut ferula, ita ut animadvertere jubeas, an os aliquod ipsi strepere videre videatur. Nam fracta strepere videntur. Progressu veto temporis, fracta partim seprima, partim decimaquarta, partim etiam aliter significationem de se præbent. Nam & carnis ab osse discessus fit, & os lividum, & dolores, sanie effluente. Hæc autem æge jam auxilium admittunt. Quibus omentum excidit, necesse est putrescere. Si intestinum quoddam ex gracilibus dissectum fuerit, non coalescit. Nervus dissectus, aut genæ tenuis pars, aut præputium, non coalescit. Quodcumque os in corpore resectum fuerit, aut cartilago, non augetur. Ex vulnere convulsio accedens, mala est. Ex vulnere bilis vomitus accedens, malum, & maxime in capitis vulneribus. Nervi crassi si vulnerantur, plerumque claudi fiunt, & si obliqui vulnerantur præsertim, & si muscularum capita, maxime in sensoribus. Moriuntur maxime ex vulneribus, si quis cerebrum fauciatum fuerit, aut spinalem medullam, aut hepaticam, aut septum transversum, aut cor, aut vesicam, aut venam crassam. Moritur autem etiam, si in arteriam, & pulmonem valde magnæ plagæ fiant, ita ut pulmone percussio, paucior spiritus per os procedat, quam is est, qui ex vulnere elabitur. Moritur autem qui in intestina vulnerati sunt, sive ex tenuibus aliquid, sive ex crassis vulneratum fuerit, si per transversum fiat plaga, & magna. Si vero parva, & recta, quidam evadunt. Minime vero moriuntur vulnerati in partibus corporis, ubi hæc non sunt, aut ab his quamlongissime abunt. At vero vilis obscuratur in vulneribus sientibus in supercilium, & paulo altius. Prout autem vulnus recentius est, maxime vident, cicatrice vero diutius tardante, ac senescente, magis obscurari contingit.

Fistulæ difficillimæ sunt, quæ in cartilaginosis & excarnibus locis sunt, & cavæ sunt, & procedunt, ac sanie manant semper, & caruncula in osculo ipsis inest. Curatur autem faciliore sunt, quæ in mollibus, & carnosis, & non nervosis existunt. Morbi hi ante pubertatem non sunt, peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, varix circa tibiam, fluxus sanguineus, cancer non congenitus, viriligo leu-
ce dicta non a natura infecta, defluxus medullæ spinalis, hæmorrhoids, volvulus chor-
dæ apellatus non cognatus. Horum morborum nullum ante pubertatem fore ex-
pectandum est. Verum ab anno decimo quarto usque ad quadragesimum secundum
naturæ corporis morborum omnis generis ferax sit. Rursus ab hac ætate usque ad æ-
nos sexaginta tres non sunt strumæ, neque lapis in vesica, nisi prius existat, neque de-
fluxus medullæ spinalis, neque nephritis, nisi ex alia ætate comitentur, neque hæ-
morrhoides, neque fluxus sanguineus, nisi prius fuerit. Hi usque ad senectutem ab-
sunt morbi. In mensibus muliebribus qui aquosi ante partum prodeunt, mali
sunt. Ora fervido aphthæ ulcere affecta, uterum gestantibus, non sunt
bona. Num & alvi humectantur? Dolores ex laterum molliitudine, ad in-
testinum tenue transeunt, in morbis longis, ex corruptione foetus non val-
de purgati, perniciosis sunt. Quæ ex partu, ac foetus corruptione multa
repente concitata, supprimuntur, difficilia sunt. Rigor his infestus est, & alvi tur-
batio, tum alias, tum si præcordium doleant. Uterum gestantibus dolores ca-
pitis soporosi, cum gravitate senties, ac convulsione, plerumque mali sunt.

Quibus dolores pertinaces ex mensibus, circa supernam partem, & intestinum
tenue, alvos humectant, aliquantum cibos averrantur. His circa judicationem de-
clationes in somnum sunt, & impotentes ex capitis dolore exsulant, ac perfrigeran-
tur. Tales recidivæ plerique senties post remissionem, cito occidunt. Spiritus
qui cum suspiriis extra feruntur, & colliquatio præter rationem, in uterum gestan-
tis abortum facit. Dolor ventris post partum, in his purulenta purgat. Tor-
pidæ, & præsertim in motibus, cum impotentia fractæ, circa judicationem vexatæ,
anxiosæ, multum exsulant. Alvi his humectæ, malum. Menfes non supprimi com-
modum est: ex talibus comitiales morbi sunt, ut arbitror, quibusdam vero ventris
subductions duntaxat, quibusdam hæmorrhoides. Prægnantibus præcordij dor-
lor, malum, & alvi his subtenes, malum, & insuper rigere, his malum. Dolor ven-
tris in talibus minus malum, si limosa purgentur. Quæ ex talibus facile pariunt,
post partum vehementer molestantur. Prægnantibus tabescentibus, quibus rubor in
facie sit, stillationes de naribus senties hunc avertunt. Quibus ex partu pro-
deunt alba, his vero suppressis cum febre furdicæ, & dolor acutus ad latus sit,
mente moventur, & perniciosa habent. In gestantibus uterum falsuginosa signifi-
cant post partum molestias ex albis mordacibus. Tales purgationes indurant: singul-
tus in his, malum. Ad pedes & ad lumbos distentiones ex mensibus, suppuratio-
nem inducit, itemque ea quæ de alvo viscosa graveolentia cum dolore prodeunt. Stran-
gulationes quoque ex præscriptis suppurationem faciunt. Uterinæ in ventricu-
lis durities dolorosæ acutæ, perniciosa. Uterum jam gestantibus ex fervido
ulcere fluxiones dolorosæ, malum. Hæmorrhoids his pessimum. Quibus alvo ru-
me facta, ad pudendum rubor devenit, mensibus albis humidis derepente progres-
sis, in longis febribus moriuntur. Convulsiones, si menses in principio apparue-
runt, febre non accedente, solutio sit. Urinæ tenues cum aliquantula nubecula
in medio consistente, rigorem significant. Si a quarta die sanguinis fluxus fiat, diutur-
nitatem significat, & alvus erumpit, & crurum tumores. Uterum gerentibus ca-
pitis dolores, soporosi, cum gravitate senties, mali sunt; fortassis autem his etiam con-
vulsorium quid pari contingit. Quæ ante partum, iuxta modum bilis sursum, ac
deorsum erumpentis, doluerunt, facile quidem pariunt, verum si febricitent, maligne
habent tum alias, tum si circa fauces quid vexet, aut aliquod signum in febre mali-
gnum appareat. Aquosa ante partum erumpentia, mala. Uterum gestantibus
falsuginosa iuxta fauces fluxiones, malum. Ante partum rigorem habere, & par-
tus circa dolorem, periculosi. Uterum gerentibus ex fervido ulcere fluxiones, ma-
lum: convulsæ, exolutæ, & postea perfrigeratæ excalescent acutæ. Sed & difficiles
sunt prægnantibus tumores circa tenue intestinum, quales circa eminentias osculi
uteri sunt, erectæ cervicis spirationem inducentes. Num tales tumores gemellorum
parium significant? Num & convulsionem tales tumores faciunt? Quæ suspi-
riolum efferunt spiritum in febribus, abortiunt. Horrorem habentibus, lassitu-
dine affectis, capite gravatis, mensēs erumpunt. Ad manum torpidæ, obar-
dæ, sitis exortes, mensēs multos emittentes, suppuratæ sunt. Alba derepen-
te ex abortu decurrentia, si aliquantum riguerit, & ad femur impetus, in his tre-
mor difficilis est. Ora fervido, aphthæ appellato, ulcere affecta, uterum gestan-
tibus alvos humectant. Prægnantes prænotantes ante partum insuper rigent.

Torrefactoriæ exolutiones difficiles quidem ex partibus contingunt, & mentem
emoveantes, non tamen perniciosa. Sed & mensium copiam præsignificant. Quæ
in partu os ventriculi prædolere, paulo post eiciunt. Horrores, lassitu-
dines, capitis gravitates, colli dolores, mensēs extrudunt. Circa judicationem tale
sens cum tristitia rigorem insuper inducit. Quibus puellis erectæ cervicis

- 205 spiratio contingit uterum gestantibus, his mammae suppurantur, & menses apparere in principio, malum est. Infantiae febres acutae turbulentes non bilioso usque ventriculi dolenti solvunt. In sterilibus, & non parientibus sanguinis vomitus ad conceptionem prodest. Caliginis mensibus multis comparantibus solvuntur. Quibus mulieribus ex febribus dolor mammarum fit, spiratio cruenta non secunda oboritur, solvit dolores.
- 210 Convulsionem ex utero affecto sine febre faciles sunt, vel etiam Dorcadi. Quibus ex rigore febris histatoria, menses decurrunt: collum in his dolorosum sanguinis eruptionem inducit. Vomitus minime molestus est ex pituita, ac bile permixtus, verum ne valde multus vomatur. At meraciores vomitiones deteriores sunt. Præfusus autem vomitus, & niger, & lividus, malus est. Si vero etiam omnes colores idem vomuerit, perniciosum est. Celerrimam autem mortem significat lividus, & male olens. Est etiam lethalis ruber vomitus, & maxime si cum necessitate dolorosa vomatur. Qui anxie se jactantes, citra vomitum exacerbantur, male habent, itemque qui lancinantur citra vomitum. Parvi vomitus biliosi sunt tum alius, tum si vigilaverint. In nigris vomitibus surditas non nocet. Pauci sientes, celeres, biliosi, meraci vomitus, mali sunt in alvi subductione uberiore, & pertinaci lumborum dolore. Ex vomitibus anxietates, clangores, oculi concretione sanguinosam habentes, furiosa. Acute infania correpti, voce intercepta, ita affecti moriuntur. In vomitu si quis siticulosus sit, & sitis exors fiat, malum est anxiosis vigilantibus. Ab fecibus juxta autem maxime sunt anxiosi. Alvo turbata suppressa, brevi velut culicum punctura erumpunt, & ad oculos lachrymosi abscessus deveniunt. In meracis vomitibus singulus, malus; mala etiam convulsio. Similiter etiam in nimis purgationibus ex medicamentis. Qui vomituri sunt, antea spirationes faciunt. Ex veraturo convulsio, perniciofa. In omni purgatione redundante frigiditas cum sudore perniciofa est; & qui insuper vomunt situlosi in his, malum. Anxiosi, lumbos dolentes, alvo humectantur. Purgationes valde rubicundorum, nigrorum, a veraturo, malæ sunt; & cum talibus exolutio, mala.
- 230 A veraturo vomere rubicunda, spumosa, pauca prodit, facit tamen duritias, & suppuraciones magnas abducit. Sunt autem hi, qui talia vomunt, alias & pectus dolorosi, & in rigoribus exudantes, & testes intumescunt, quod si conegerit, insuper rigent & gracilescent. Frequentes per eadem recidivæ vomitoria, circa judicationem nigrorum vomitum faciunt: sunt item tremulae. Sudor optimus quidem est, qui febrem in die judicatorio solvit, commodus autem est & qui levat; frigidus vero, & circa caput solum, ac collum fiens, malus est. Nam & temporis diuturnitatem, & periculum significat. At frigidus, in febre quidem acuta, lethalis est. In initio vero, diuturnitatem significat. Sudor una cum febre fiens in acuto morbo malus est. Urina in febre, albam habens & levem subsidentiam firmatam, celerem dissolutionem significat. Celerem etiam ea, quæ ex indiffereta pinguedinem quandam habens, exagrescit. At subrubra, & subsidentiam subrubram habens & levem, si quidem ante septimum diem prodeat, se prima die liberat. Post septimum vero, tardus, aut omnino post tempus aliquod diuturnus; & quæ in quarto die nubeculam subrubram habet, septimo liberat, si reliqua juxta rationem habeant. Cæterum tenuis, & biliosa, & vix tenuem, ac exiguam subsidentiam habens, & quæ ad melius, ac deterius mutatur, diuturna est. Hæc autem diuturnitas consequens, aut temporis diuturnitate circa judicationem fiens, periculo non vacat. Aquosa vero & alba perpetua, in diuturnis morbis difficulter judicat, & secuta non est. Nubecula in urinis alba quidem & inferne, commode sunt; rubicunda vero, & nigra, ac livida, difficiles sunt. Periculosa urina est biliosa, non subrubra, in acutis, & quæ grassiores farinæ partes refert, albas habens subsidentias, & quæ varia est colore ac subsidentia, & maxime in fluxionibus de capite. Periculosa est & quæ ex nigra in tenuem biliosam transmutatur, & quæ ex subsidentia divellitur, & quæ ex compactis quibusdam innatantibus subsidentiam habet sublividam, limosam. Num ex talibus præcordium dolent? dextrum arbitror, aut etiam cum virore pallidi sunt: & abscessus circa aurem dolentes? His paululum erumpens alvus, perniciofa est.
- 260 * Urina, quæ derepente citra rationem paulatim concoquuntur, malæ sunt; & in summa quæ citra rationem matura est in morbo acuto, mala est. Mala est etiam valde rubicunda ex his, florulentiam arguinofam continens. Alba vero & diffusæ pellucida urina, mala est, maxime si in parenticis comparet. Mala est quoque quæ post potum cito mingitur, & præsertim pleuriticis, ac peripneumoniacis. Mala est & quæ ante rigorem oleosa mingitur. Malæ sunt & in acutis viridantis pallores, non existentes in colore. Perniciofa est urina nigram subsidentiam habens, & nigra. In pueris vero tenuis magis, quam crassa. Verum in tenuibus vice versa quam in crassis. Et grandinosa genituræ similis diffusa, eademque dolorosa. Perniciofa etiam est omnis, quæ latenter mingitur. At peripneumoniacis perniciofa est, quæ in principio quidem coacta est, post quartum vero diem attenuatur. Pleuriticis urina cruenta, caliginosa, cum subsidentia varia, indiffereta, lethalis est plerumque in quatuordecim diebus. Lethalis est item in pleuriticis brevi præfusa, nigram subsidentiam habens, aut fursuraceam. Verum in febre ardenti, stupeficatorio modo detentis pessima est urina.

est urina valde alba. Urina cruda multo tempore manens, aliis signis salutaribus, abscessum & dolorem significat, & magis in partibus sub septo tranverſis. Si vero 275 dolores in lumbis oberrant, ad coxam, & in febre, & sine febre. At quæ emittitur urina pinguedinem habens in subsidientia, febrem significat. Cruenta vero in principio micta, diuturnam; turbata, cum sudore, recidivam. Alba velut jumentorum, capitis dolorem; pellicula, convulsionem. Quæ sputo similes subsidientia, aut limosas habet, rigorem indicat; quæ aranei telis similes, colligationem. At in febribus erroneis nigra nubecula quartanam indicant. Decolores autem, nigra innatantia in medio habentes, cum vigilis & turbatione, phrenitidem; pulverulentæ, cum spirandi difficultate, aquam inter cutem. Urina aquosa, aut turbata friabili asperitate, alvum, liquidam fore, significat. Verum tenuis valde urina si densa fiat, nunc sudorem futurum indicat; jam vero factum, spumosa in seipsam confidens. In tertianis 285 cum horrore velut nubecula nigra, horrores inconstantis indicia sunt. Et pelliculosa urina, & cum horrore subsidentes, convulsoriae sunt. Urina bonam habens subsidientiam, derepente non habens, dolorem & mutitudinem significat. At subsidientiam habens turbata desinens, rigorem circa judicationem. Fortassis autem & in tertianam, aut quartanam transitionem. In pleuritis urina subrubram habens levem subsidientiam, securam judicationem significat. Cum levi virore, ac pallore floruleuta, albam subsidientiam habens, eriam ecletem. At rubicunda valde & floruleuta, subsidientiam cum virore pallidam, levem, sinecram habens, dominum valde turbulentum morbum, qui in alvum transmutatur, non tamen periculum. Alba vero aquosa, subsidientiam crassas polentæ partes referentem, 295 fulviam habens, dolorem & periculum significat; & quæ cum virore pallida est, fulvam, crassas polentæ partes referentem subsidientiam habens, & tempus & periculum significat. Urina, quæ in his, qui juxta aures abscessus habent, cito & modice concoquuntur, male sunt; & perfrigerari hoc modo, malum est. Vesica intercepta tum alias, tum cum capitis dolore, habet quid convulsorium. Quæ in his cum torpore evolvuntur, diffisilia sunt, non tamen pernicioſa. Num & aliquantum mente moventur? Rhenum dolor repentinus, cum urinae suppressione, calculorum, aut urinarum crassarum mictionem significat. Tremores seniotibus in febre sunt, acque sic comparentes, fortassis calculos per urinam agri eiciunt.

Urinae suppressio, & gravitas in imo ventris, plerumque stillicidium urinae significat futurum. Sin minus, alvum morbum ex quo agrotare solet. In biliosis urinae interceptio brevi occidit. Urina in febre densitatem habens divulsam, recidivam aut sudorem significat. In febribus longis, tenuibus, erroneis, urinarum tenuium mictiones, splenicæ sunt. In febre alias aliarum urinarum mictiones morbum produciunt. Urina, quæ minguntur a non recordantibus, nec commonefactis, pernicioſa sunt. Nam his minguntur, velut si subsidientiam conturbasset. Quibus urinae pauca, grumosa, non sine febre, copia ex his progressa tenuis prodest. Prodit autem talibus ab initio, aut brevi subsidientiam habet. Quibus urina cito subsidientiam habent, hi cito judicantur. Comitiali morbo laborantibus urinae tenues & crude, præter morem, sine repletionem, morbi invasionem significant, tum alias, tum si quis dolor, aut convulsio in summum humerum, aut collum, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulentum insaniam viderit. Parva comparere, veluti sanguinis stillas, & urinam, & vomitum, & alvi egestionem, penitus quidem malum est. Pessimum vero, si propinque inter se prodeant. * Alvi egestio optima est mollis, coherens, ac compacta, subfulva, non valde graveolens, prodiens hora consueta, copia pro ratione ciborum ingestorum. Spissum autem fiat ad judicationem. Commodum est & lumbricos rotundos exire simul, ubi ad judicationem tendit. In acutis spumosa, circumbiliosa alvi egestio, mala est. Mala item valde alba. Adhuc vero pejor est, quæ farinæ, ac sterquilini speciem refert. Sopor in his malus est, & eruenta egestio, & vasorum vacuatio præter rationem. Alvi interceptio, parva, nigra, velut caprarum stercorea, ad necessitatem enecta emittens, natus his erumpens, malum. Viscosa metacea, aut alba alvi egestio, mala est. Mala est & abunde multum fermentata, subputrida. Prava item ex compactis quibusdam innatantibus, subsidientia subvida, purulenta, cum biliosa. Sanguinem splendidum egerere, malum est tum alias, tum si quis dolor assuerit. Spumosa, circumbiliosa alvi egestio, mala est. Sed & morbum regium ex talibus incidunt. In biliosis alvi egestionibus spumosa floruleuta, mala est maxime ei, cui lumbi doluerint, & mente motus fuerit. Num autem his dolores? Tenuis spumosa alvi egestio, aquosam enim virore pallidam habens subsidientiam, mala est. Mala etiam purulenta; & nigra cruenta mala, cum febre, & alias, & varia abunde bile colorata egestio, mala est, tantoque deterior quantum colore magis horrenda est, præterquam in medicamentorum usus. In hoc enim periculo vacat, si non copia excedat; & tenuis, mollis egestio, in febre mala est. Mala quoque sicca, friabilis, decolor tum alias, tum si alvum humectet. Nigris vero antea egestio occidit. Liquida alvi egestio, & acervatim, & paulatim fiens, mala est, altera enim vigilas, altera evolutionem facere potest. Liquida subtenuis alvi egestio perfrigeſcens, non sine febre, mala est. Rigores in his vesicam, & ventrem.

- corripiunt. Aquaſa vero valde non definens in acutis, mala; & magis, ſi etiam ſitim non habuerit. Valde rubicunda egeſtio in alvi profluſio mala eſt. Mala quoque valde cum virore pallida, aut alba, aut ſpumofa, aut aquoſa, & parua, & viſcoſa, & levis, & cum virore ſubpallida, mala eſt. Et ſoporofis torpentiſque liquida egeſtio peſſima eſt. Lethale autem & alvum ſanguine manare, multa grumofa egeſtione, itemque alba, ac liquida, cum ventre in tumorem elevato. Egeſtio alvi nigra velut ſanguis, & cum febre, & ſine febre, mala eſt. Male item omnes variz, abunde ex bile colorata. Egeſtiones definientes in ſpumofas, meracæ, omnes quidem exacerbant, convuſos autem etiam valde. Ex talibus abſceſſus juxta autem emergunt. At quæ valde liquida ſunt, & ruriſ compactæ, meracæ, ſtercoracæ egeſtiones, longitudinem morbi ſignificant. Valde rubicunda, in febre, delirium. Alba ſtercoracæ morbo regio difficilis eſt, itemque liquida, quæ ſe-
- 355 poſita ruborem capit. In ſanguinis eruptionibus viſcoſa egeſtio nigriſ variopigata, maligna eſt, maxime autem valde albidis. Valde alba egeſtio in febre, non bene judicatur. Alvus turbulenta parvis frequentibus ad egerendum progreſſibus, maxillas intendit. Solvit etiam rubores in facie ſientes. Stercoracæ cum contentione egeſtio, alvi aſſictionem ſignificat. Pinguicula vero acute cum oris ventriculi dolore, dyſenteriam; fortaliſ autem & lumborum dolorem. Talibus alvi circumtenſio ad neceſſitatem liquida demittens, citius reſtitans, habet quid convuſionum. Inſuper rigere hiſ pernicioſum eſt. Quibus nigra per alvum prodeunt, frigidum ſudorem excludunt. Quibus alvus ab initio turbatur, urinz vero pauca ſunt, & progreſſu temporis alvus quidem ſiccatur, urina vero tenuis redundat, hiſ abſceſſus ad articulos ſunt. Progreſſus ad egerendum paulatim ſientes, horrorem, ac rigorem inducunt; & quibus larga ſit egeſtio, diſſiliſſimum eſt quartanis incipientibus. Frequentes ad egerendum progreſſus paulatim ſientes, pauca ſtercoracæ ſubviſcoſa habentes, cum præcordii, & lateris dolore morbum regium denotant. Nam hiſ ſuppreſſis hi cum virore pallidi ſunt. Arbitror autem & hoc ſanguinem effundere. At dolores in lumbis, in hiſ ſanguinem fundentibus, ſanguinem egerunt ſplendendum. Cum ſopore, & capitis dolore caleſcere inſuper, pernicioſum eſt. Viſcoſæ, biliſcæ, magis abſceſſus juxta autem faciunt. Quicumque tumores alvo humecta elewantur cum doloribus, malum. Alvo vero ſuppreſſa, & nulla alia re novata, cito ruſpuntur, & malignus eſt. Vomitiones in hiſ male & ſerina. Quibus & ſtammæis & valde rubicundis ſolutis, graveolens, larga, ſubrubra ſit, hi ne inſaniant timor eſt. Corpus ſqualidum alvum male affectum ſignificat. In hiſ valde rubicunda, inſtar purulentæ caruncule, egeſtiones maxime produnt.
- Ad alvum biliſcam mollem ſtercoracæ egerentem, ardores comparantes, tumorem juxta autem faciunt. Biliſcæ egeſtiones ſurditas ſedat, & ſurditatem ſedat biliſca alvi egeſtio. Puſtule ſerpiginofæ ſupra inguina, ad laterum molliſſitudinem, ac pubem ſientes, alvum male affectum ſignificant. Exolatio dolorum ſolvens, alvum maxime humectat. Juxta ſedem doloroſe ſupurationis alvum turbant. Lethales egeſtiones ſunt, pinguis, nigra, livida cum gravolentia, & biliſca habens in ſe ſimile quiddam eieci aut fabis freſſis, aut veluti ſordidus ſanguinis grumofus, & quæ odore ſimilis eſt egeſtioni infantium, & varia eademque diuturna. Taliſ autem fuerit cruenta, ramentofa, biliſca, nigra, præſina, & ſimul, & permutatis vicibus. Lethaliſ quoque omnis eſt, quæ ſecum ægrè fugiens exit. Qui potum difficile deſtinent ſpiritu tuſſiente, eructatio ſubtracta intro revoluta dolorem ventris ſignificat. Male ſunt etiam egeſtiones valde rubre æruginofæ in quartanis. Et tales ſanguinis fluxiones ſoporofæ ſunt; ex hiſ convuſione moriuntur, nigriſ antea egreſſi. Exolutiones alvi repentine præter rationem, in diuturnitate temporis conſumptis, una cum vocis tremula interceptione, pernicioſe habent. Tenuis nigroſum egeſtiones horriſcæ, meliores talibus ſunt. Tales proſunt maxime in ætate ante vigorem. Pruriginofæ affectiones omoiſus nigroſum egeſtioneſ ſignificant, et vomitum grumofum. Et tremula affectiones cum morſu, ac capitis dolore, nigriſ egeſtiones ſignificant. Ante tales, vomitus prodit; et ubi vomuerunt, multæ tales inſuper deſtrahuntur. Quibus io alvi turbatione exacerbatur morbus, circa judicationem nigra inferne produnt. Ex alvo diutine affecta, vomitentibus, biliſcis, cibum ſtidentibus, ſudor multus cum impotentia reſpenſina, occidit. In medicamentorum uſu, in deſluxione, tenuis abunde ſanguis eliqueſcens, malum eſt. Durities circa ventrem cum dolore, in febris cum horrore cibos averſantibus, alvo parum ad purgationem humectata, non ſuppurantur. Una cum febre alvus turbata ſalſuginoloſo modo, ſoporofa, torpidos, non valde comitatur. Ex alvo liquida laxos, caput dolentes, ſiticoſos, vigilantes, valde rubicunda egeſtione ſolutos, timor eſt ad inſaniam deveniſſuros eſſe, ſi diſculter ſpiraverint. Ad hoc ubi quis cum virore paſſerit, bene ſpirare noxiū non eſt, alvo inſuper probe egerente. Ad-
- 410 ſta egeſtiones contentioneſ habentes, alvum male affectum ſignificant. Biliſcæ alvus turbata, parva, frequenter egerens diſſidentia cum paucis mucosif, do-

sis, dolorem circa tenue intestinum hæc faciunt, & urinam non facile prodeuntem, ex talibus ad hydropem desinunt. Linguae tremulæ quibusdam alvi eruptionis futuræ signum sunt. Quibus ardor fit, & ad egressas egestiones alvi insuper exiudant, his febris exacerbat. Ex alvis liquidis perfrigeratio cum sudore, mala. Ex alvis liquidis, sanguis de gingivis defluens, lethalis est. Alvi egestio pura superveniens, solvit febrem acutam cum sudore.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE CAPITIS VULNERIBUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Capitis levissima etiam vulnere non contemnenda. Capitis cutis confusa. Calvaria & cerebri membrana rupta.
- 2 In capite vulnerati, quid Medicus interrogare debeat. Capita humana dissimilia. Capitis prominentia quid. Sutura quando similes T in capite. Prominentia ex utraque capitis parte duplex. Quæ sutura H litera respondeat. Quibus sutura X similes sint. Deductio, & mollitia, ac cavitate ossis capitis.
- 3 Capitis, os iuxta medium duplex. Ossis utrinque color. Lamina duplicata. Capitis os spongiosum simile. Puncta in capitis ossis tenuiora.
- 4 De crassitudine, & tenuitate ossis capitis. Os circa finem. Cur ex vulneribus sinuosis cerebrum effusum, & maxime mala sentiat.
- 5 Os temporum ex reliquis cur debilissimum. Os verticis omnino robustissimum. Capitis posteriori parte vulnerati, cur serius moriantur.
- 6 Capite vulnerati hyeme, diutius vivunt. Sedes telorum ipsa in seipso sentiat. Sutura, esse denudata, in ulcere comparent.
- 7 Os capitis quot modis vulneretur. Confusiones capitis vulnera consequuntur. Fissuræ species omniæ. Os sine fissura contusum.
- 8 Contusionis species plures. Os intro cedens.
- 9 Teli sedes in osse. Sedes teli in osse quid sit.
- 10 Alia parte capitis vulnerati, ulcus, & os carne denudatum habentes. Teli sedes in osse cum fissura, ac confusione. Os ex sua natura intro cedens, Sedes, & diffusio, idem.
- 11 Capillorum circa alens consideratio. Osse conspicuo quid agendum, & interrogandum.
- 12 Osse non conspicuo quomodo interrogandi. Confusiones, & fissura in osse ex vulnerati responsione cognoscenda. Spicillum confusions, & fissuras non explorat.

- 13 Ossium ruptura varia.
- 14 Quæ ossa a quibus telis potissimum rumpantur, ac lacerant, & quæ non.
- 15 Tela obliqua, Rotunda, oblonga. Multum tenuia, acuta, levia.
- 16 Vulnerati de omnibus apparentibus interrogandi. Societatem magis, aut minus signa. Telorum sedes in futuris capitis difficilis.
- 17 Ruptio in futuris deprehensa difficilis: & cur hac parte ossa promptius rumpantur. Ruptio circa suturam etiam futura dissoluta est. Fissura, ex confusione deprehensum difficile. In vulneribus iuxta suturas quid considerandum.
- 18 De ulceris in capite curatione. Partium in capite affectorum inflammatio. Quatenus in frontis ulceribus cataplasmatibus utendum.
- 19 Capitis ulcera quæ parte secunda.
- 20 Ulcera temporum non secunda. Quæ post ulcerum scellum adhærenti conveniat.
- 21 Raso. Perforatio quæ tempore tenenda. Ossis rupti, aut confusi curatio.
- 22 Ossium rupturæ quomodo medicamento nigro explorentur.
- 23 Caro os ambigus negligenter curata. Carnes vulneratas suppuratas ferri, ac consumi oportet.
- 24 Membrane circa cerebrum curatio. Ossis unius ab altero diffusio.
- 25 Ossium intro compulsum, ac diffusum curatio.
- 26 Ossa puerorum capitis tenuiora, ac molliora. Ossis carne denudati curatio. Mortuorum ex capitis vulneribus signa.
- 27 Ossis rupturæ neglecta mala. Fissura in lingua capite vulnerati. Convulsio ex ulcere capitis. Syderati ex capitis ulcere.
- 28 Febre invadente ex capitis ulcere, quid faciendum. Tumor rubicundus, capitis osse denudato.
- 29 De capitis ossium perforationibus, ac terbrationibus usum. Ossa suppurata facilius perforari.



NULLUM capitis vulnus leviter contemni debet. Sepe enim i cutis sola confusa ferro, aut alia aliqua re, si non diligenter, & cum quadam cautione curetur: veluti si sanguis concretus non expurgetur, aut aliud quiddam negligatur: ulcus in crudescentes non parum molestiæ exhibet, & aliquando etiam febrem inducit: & medico quidem negotia, ægroto vero periculum non minus affert. Verum hoc multo magis contingit, si calvaria, & cerebri membranae rumpuntur. Quare si non singula hæc diligenter curaveris, sepe mortis causa exitit. Et de his quidem omnibus etiam alibi diximus, sed & nunc

Hipp. Opera.

Ee 3 dicen-

- 10 dicendum est. * Primum igitur capite vulnerato interrogare oportet, per quid vulneratum sit. Deinde quid homo fecerit, quomodo vulneratus fuit. Postea qua parte vulneris inflicti sunt. Nam hominum capita nihil inter se similiter habent, neque futurae capitis in omnibus eodem loco consistunt. Verum quisquis ex priore capitis parte prominentiam habet: est autem prominentia, rotunda ossis pars eminens praeter alia:
- 15 huius futurae consistunt in capite, velut littera graeca tau T pingitur. Breviorem enim lineam ad prominentiam transversam constitutam habet; alteram vero lineam per medium caput, sed secundum longitudinem ad collum semper habet. Qui vero ex posteriore capitis parte prominentiam habet, huius futurae etiam contrario priori modo consistunt. Brevior enim linea ad prominentiam transversa consistit; longior autem per medium caput, secundum longitudinem ad frontem semper constituta est.
- 20 Quisquis autem ex utraque capitis parte, & anteriore, & posteriore, prominentiam habet, huic futurae sunt similiter constitutae, velut littera graeca H scribitur. Consistunt autem longae quidem lineae ad utramque prominentiam transversae. Brevis autem per medium caput, secundum longitudinem ad utramque longam lineam definens. At qui neutra parte ullam prominentiam habet, hic futuras habet, velut littera graeca x pingitur. Consistunt autem hae lineae, altera quidem transversa ad tempora pertingens, altera vero secundum longitudinem per medium caput. * Duplex autem est os iuxta medium caput, durissima vero ac densissima suprema ipsius pars exiit, & infima quae est ad membranam. Confimilis est color ossis sub carne, confimilis est color ossis inferne. Secedit autem a supremo, ac infimo osse, a durissimis, ac densissimis, ad mollius, ac minus densum, & communius, ad duplicatam laminam. Est autem duplicata lamina cavissima, ac mollissima, & maxime antrophi. Est autem & totum os capitis, excepta valde modica suprema, ac infima parte, spongiae simile, & habet os in seipso carunculas similes multas humiditas, & si quis ipsas digitis conterat, sanguis utriusque ex ipsis prodierit. Sunt etiam in osse venulae tenuiores, ac caviore, sanguine plene. Quod igitur ad duritiam, & molliem, & cavitatem attinet, sic habet. Quod vero ad crassitudinem ac tenuitatem, hoc modo. * Universi capitis os tenuissimum est ac debilissimum, quod est circa sinciput, & carnem paucissimam, ac tenuissimam hac parte os in se ipso habet, & cerebrum hac capitis parte plurimum subest. Et quia
- 40 haec ita se habent, ut & vulnera, & tela aequalia sint magnitudine, & minora, & similiter vulneratus quis sit, & minus, os hac capitis parte & magis contunditur, & rumpitur, & magis intro contulium cedit, & lethaliore, ac ad curandum, & effugiendam mortem difficiliore sunt vulnera hac parte, quam alibi in capite. Et ut sint aequalia vulnera, & similiter vulneratus quis sit, & minus, homo ubi etiam alias ex vulnere moriturus est, breviori tempore moritur, qui hac parte capitis vulnus habet, quam qui alia. Cerebrum enim & citissime & maxime iuxta sinciput sentit mala, quae in carne, & in osse sunt. Sub tenuissimo enim osse, ac modica carne cerebrum est hac parte; & plurimum cerebrum sub sincipite jacet.
- * Ceterum ex reliquis ossibus id, quod circa tempora est, debilissimum est. Commisura enim est infernae maxillae ad calvariam, & motus in temporibus sursum, ac deorsum, velut articuli; & auditus prope ipsum est; & vena per tempora extensa est, cava, ac fortis. Omni vero capitis osse robustius est os verticis; & quod est retro aures, robustius est, quam totum quod in anteriore parte est; & carnem amplioriorem ac profundiori in seipso hoc os habet. Et sane hic ita se habentibus, si
- 55 quis & vulneribus, & telis, omnibus aequalibus, ac similibus, & maioribus, ac minoribus, similiter sit vulneratus, & magis, hac capitis parte os minus rumpitur, & contunditur, & si homo alias morientus est ex vulnere, si in posteriore capitis parte vulnus habet, diutius durans tempore morietur. In longiore enim tempore os suppuratur, & deorsum ad cerebrum transpiratur, propter ossis crassitudinem; & paucius etiam cerebrum hac parte subest, & plures mortem effugiunt plerumque ex his, qui posteriore capitis parte vulnerati sunt, quam qui anteriore. * Sed & in hyeme diutius tempore vivit homo quam in aestate, quisquis etiam alias mortuus est ex vulnere, quacumque capitis parte vulnus habeat. Ad vero sedes telorum acutorum ac leviorum, ipsae in seipsis fientes in osse, & cum fissura, & contusione, ac
- 65 intro cessione: sunt autem hae similiter & in anteriore & in posteriore capitis parte: ex his mors non contingit secundum iustitiam, etiam si contingat. Sutura vero in ulcere si compareat, osse denudato, quacumque capitis parte ulcere fiente, debilissimus aeger est ad resistendum vulnere ac telo, si in ipsam futuram telum incubuerit, & maxime omnium, si telum in sincipite, iuxta debilissimam capitis partem inciderit fuerit, & futurae circa uleus, si ita contingat, fuerint, & telum ipsas futuras contigerit.
- * Vulneratur porro os in capite totis modis. Singulorum autem modorum plures species fracturae in vulnere sunt. Os vulneratum rumpitur, & os fissuram continenti ac ambienti necesse est contusionem accedere, si ruptum fuerit. Nam telum quod os rumpit, idem hoc etiam os aut magis, aut minus contundit, id ipsum videlicet
- 75 os, in quo fissuram rumpit. Atque hic unus modus est. Species autem fissurarum omnigenae sunt. Nam & tenuiores, & valde tenues conspicuae sunt. Quaedam vero neque statim post vulnerationem, neque in diebus, in quibus dolorum utilitas mors homini contingere potest. Rursus autem aliquae fissurae crassiores, ac ampliores sunt,

unt; quædam vero etiam valde ample. Et alie quidem in longiorem modum rumpun-
 tur, alie vero in breviorum, & alie rectiores sunt, alie etiam valde rectæ, alie vero 80
 curviores, & curvæ, ac profundiores, alie autem ad infernam partem, & per totum os.
 Porerit autem & os in sua ipsius natura contundi, ita ut nulla fissura ad contusionem
 8 offi accedat. Atque hic secundus modus est. * Species autem contusionis plures sunt.
 Nam & magis, & minus contunditur, & æquius ac per totum os, & minus in alium
 ac per totum os, & in ampliorem et minorem tum longitudinem, tum latitudinem. 85
 Verum harum specierum nullam oculis intuenti cognoscere datur, qualinam specie exis-
 tat, et quanta magnitudine. Neque enim etiam si sint confusa, et malum factum sit,
 an confusa sint, oculis videre conspicuum fit statim post vulnerationem; quemadmo-
 dum neque aliquæ fissuræ videri possunt, quæ rupto offe procul absint. Intro
 etiam cedit os ex natura sua, una cum fissuris; alias enim non intro cesserit. 90
 Nam quod intro cedit, abrumpiturque ac frangitur, intro cedit ab alio offe, quod in
 sua ipsius natura manet: & sic sane fissura adest intro cessio. Atque hic tertius
 modus est. Intro autem cedit os per multas species. Nam et major offis pars,
 & minor intro cedit; et magis ac profundius deorsum, et minus ac magis in su-
 9 perficie. * Quin et sede teli in offe contingente, fissura utriusque ad sedem acced- 95
 serit, et ad fissuram etiam contusionem magis aut minus accedere, necesse est, si
 quidem et fissura accedat ea parte, qua et sedes facta est; et fissura fit in offe continen-
 te et sedem, et contusionem. Atque hic quartus modus est, in quo sedes teli fit in
 offe. Sedes autem vocatur, quum manente offe in sua ipsius natura, telum, quod in
 os incubuit, manifestum fecerit ubi incubuit. Verum in singulis modis plures species 100
 sunt. Et de contusione quidem, ac fissura, si ambo hæc ad sedem accedant, et si con-
 fusio sola fiat, jam dictum est, quod multæ species et contusionis, et fissuræ sunt.
 Hæc autem sedes ipsa in seipsa longior, ac brevior fit, et curvior, ac rectior, et
 orbiculatio: et multæ alie species talis modi sunt, prout etiam figura teli fuerit, et
 eadem etiam profundiores deorsum, et magis et minus, et angustiores, et ampli- 105
 ores, et valde amplæ, si dissectione interita fuerit. Quanta autem dissectio in lon-
 gitudinem, ac latitudinem fiat, in offe sedes est, si alia ossa dissectionem ambientia
 in sua ipsorum natura manserint, et non una cum dissectione intro cesserint ex sua
 10 natura. Nam si ita contingat, intro cessio fuerit, et non amplius ossis sedes. * Si
 vero alia capitis parte vulneratur, et ulcus habet homo, et os carne denudatum est, 110
 quintus hic modus est: et hanc calamitatem, ubi facta est, nulla re juvare queas.
 Nam si passus sit hoc malum, non est quod ex ipso exquirere possis, an passus
 sit hoc malum, neque qua capitis parte: ex his fracturæ modis ad perforationem
 devenit, tum si confusio ad visum inconspicua est, tum si aliquo modo manifesta
 fuerit, et fissura si inconspicua visui fuerit, et ad visum manifesta. Sed et si fede 115
 teli in offe fiente, fissura ac confusio ad sedem accedat, et si confusio sola accedat ad
 sedem, absque fissura; hæc quoque ad perforationem devenit. At vero os, quod ex
 sua natura intro cedit, parum perforatione opus habet: et quæ maxime intro ces-
 serunt, et maxime fracta sunt, et perforatione minime opus habent. Neque sedes
 ipsa in seipsa fiens, absque fissura ac contusione, perforatione indiget. Neque disse- 120
 ctio ipsa, si magna, ac ampla fuerit. Dissectio enim et sedes idem sunt. * Ce-
 terum primum spectare oportet in vulnerato, qua capitis parte, et num in debiliori-
 bus vulnus habeat: et capillos considerare circa ulcus, an dissecit sint a telo, et an
 intus sint in vulnere; quod si est, periculum est os carne nudum esse. Iraque dicere
 oportet, os aliquam hæcionem a telo habere. Aquæ hæc longe prius considerasse, ac
 dixisse oportet, antequam hominem contingas. Ubi vero jam contigeris, clare 125
 nosse conari, an nudum carne os sit, aut non, et si quidem oculis conspicuum
 fuerit os nudum, bene habet; sin minus, specillo considerato, et si quidem inve-
 neris os carne nudum esse, et non sanum a vulnere, eius quod in offe est, dino-
 tionem primum facere oportet, inspicendo et quantum sit malum, et quo opere
 opus habeat. Oportet etiam vulneratum interrogare ut passus sit, et quo modo. 130
 * Si vero non conspicuum fuerit os, multo adhuc magis interrogationem facere oportet,
 an habeat quid mali, aut non habeat: et si nudum est os, ut factum sit, et juxta
 quem modum. Nam contusiones et fissuras in offe non apparentes, et tamen præ-
 sentes, ex vulnerati responsione cognoscere primum conari oportet, an tale quid 135
 passum sit os, aut non passum, deinde ratione et opere exquirere, citra specilli ad-
 motionem. Specilli enim admotio non indicat, an tale quid mali os passum sit, et
 an habeat quid in seipso, aut non passum sit. Sed sedem teli indicat specillum, et
 an intro cesserit os ex natura sua, et an vehementer fractum sit os: quæ etiam ocu-
 13 lis conspicua videnti cognoscere datur. * Rumpitur autem os obscuris fissuris, et 140
 manifestis; et contunditur obscuris contusionibus; et intro ex sua natura maxime
 cedit, quum alter ab altero fauciatur, de industria fauciare volens; aut quum ex al-
 tiore loco sit jactus, aut plagæ ictus, uter tandem fuerit, magis quam ex plano loco;
 et si contineat manu telum, sive jaciatur, sive percutiatur; et si sortior debiliorem vul-
 nerat. Ex his vero qui cadentes vulnerantur ad os, aut in ipsum os, is qui ex altis-
 145 simo loco cadit, et in durissimum, ac obtusissimum; huic periculum est, ut os et rum-
 patur, et contundatur, et intro cedat ex sua natura. Ei vero, qui ex plano magis

- loco cadit, & in molliorem, os minus hæc patitur, aut etiam non patitur. * Quæ-
eumque vero illabentia in caput tela, ad os vulnerant, ex his id quod ex altissimo
150 loco illapsum est, & minime ex plano, & quod durissimum ac obrutissimum, &
gravissimum ac minime leve est, & quod immine acutum ac molle; hoc & ru-
perit os, & contunderit. Et maxime sane periculum est, ut os hæc patiatur, quum &
hæc fiant, & e directo adversus telum fauciarum contingat, sive ex manu pecu-
tiatur, sive jactum suscipiat, sive quid ipsi incidat, sive ipse collapsus faucietur, ita
155 ut quomodocumque faucibus, osse adversus telum occurrat. * Quæ vero tela ex o-
bliquo os fauciant, minus & os rumpunt, & intro ad caput contundunt, etiam si car-
ne fuerit os denudatum. Nam quædam vulnera ita inflicta, neque denudant os car-
ne. Profecto ex telis maxime os rumpunt & manselitis, & obscuris filutis, & con-
tundunt, & ex natura sua os intro cedere faciunt, quæ sunt rotunda, & orbiculata,
160 & undequaque plana, & obruta, & gravia, & dura; & carnem hæc contundunt, &
marum faciant, ac concidunt, & ulcera sunt a talibus telis in obliquum, sed & in
circulum: subcava & suppurata magis sunt, ac humida sunt, & diutius tempore
purgantur. Necessæ est enim carnes confusas, ac concisas pui fieri, ac consumi. At
tela oblonga, multum tenuia, & acuta, & levia carnem magis dissecant quam contun-
dunt, & os eodem modo. Et sedem quidem inducit id ipsum, quod etiam dissecavit.
165 Dissectio enim & sedes idem sunt. Verum non valde eos contundunt talia tela, neque
rumpunt, neque ex natura sua intro cedere faciunt. * Cæterum oportet supra consp-
ctum tuum, quicquid tandem apparuerit in osse, etiam de omnibus his interrogationem
facere. Nam magis & minus fauciarum signa hæc sunt, si vulneratus foporem altiorum
inciderit, & caligo offusa fuerit, & vertigo, & si ceciderit. Quum autem os carne
170 denudatum a telo fuerit, & circa ipsas futuras ulcus fieri contigerit, difficile est sedem
teli deprehendere, quæ in alio osse manifesta est, an insit in osse, aut non insit, &
an sedes facta sit in ipsis futuris. Occultat enim ipsa futura, aspersor existens reli-
quo osse, & non satis clarum est ubi in ipso futura est. & ubi ossis sedes, si non val-
de magna sedes fiat. Accedit etiam ruptio ad sedem, plerumque & ipsa in sinu sita, &
175 & sit etiam hæc ruptio ruptio osse deprehensu difficilior, eo quod circa ipsam futu-
ram ruptio fit, si rumpitur, ut plurimum. Proclive enim est hæc parte os rumpi, ac
dissolvi propter ossis hæc parte debilitatem, ac raritatem, & propterea quod parata
sit futura ut rumpatur, ac dissolvatur. Nam reliqua ossa futuram ambientia, ruptionis
extortia manere possunt, eo quod robustiora sunt, quam futura. * Verum ruptio circa
180 futura sita, etiam dissolutio futura est, & non facile est deprehendere, neque si a
reli sede fiat in futura, ubi rupea fuerit, ac dissoluta. Verum difficilis est deprehende-
re futuram ex contusione. Fallunt enim & mentem, & vium medici hæc futura, si-
futura speciem referentes, & reliquo osse asperiores existentes, nuli vehementer disse-
ctæ fuerint, ac dissolutæ. Dissectio autem & sedes idem sunt. Proinde si circa futuras
185 vulnus factum fuerit, & ad os telum incubuerit, animadversionem habere oportet, ac
invenire, quod os passum sit. Nam ab æqualibus magnitudine telis, & similibus,
ac multo minoribus, & similiter, & multo minus vulneratus, longe magis malum
accipit, qui in osse in futuras telum recepit, quam qui non in futuras id recepit. Eple-
raque horum perforare oportet. Verum ipsas futuras perforare non oportet, sed sece-
190 dendo in propinquo osse perforationem facere, si perfores. * Porro de curatio-
nem vulnerum in capite, & quo modo deprehendere oportet affectiones in capite
fientes non manifestas, ita mihi videtur. Ulcus in capite nullo humore humectare
convenit, ac ne vino quidem, neque cataplasmato integere, neque lineamento curatio-
nem facere. Neque vero comprimere oportet ulcus in capite, si non in fronte fuerit,
195 aut in loco pilis nudato, aut circa supercilium & oculum. Hic enim sentia ulcera,
cataplasmatas, ac deligatione magis opus habent, quam in aliis capitis partibus. Con-
tinet, ac ambit reliquum caput totam frontem, partes autem ulcus ambientes, in qua-
cumque tandem parte ulcera fuerint, inflammantur, ac intumeant, propter sangui-
nis influxionem. Oportet autem neque ea quæ in fronte sunt ulcera, per omni tempus
200 cataplasmatas integere, ac deligare, sed postquam inflammatio sedata est, & tumor se-
datus, a cataplasmatas, ac deligatione cessare. At in reliquo capite ulcus neque lin-
amentis, neque cataplasmatas, neque deligatione curare oportet, si non & sectione o-
pus habeat. * Secare autem oportet, ulceribus in capite, ac fronte fientibus, quap-
205 te os carne nudum fuerit, & lationem aliquam ex telo habere visum fuerit. Ulcera
vero, quæ non habent sufficientem magnitudinem longitudinis, ac latitudinis, ad ossis
inspectionem, an quid mali passum sit a telo, & quale id passum sit, & quantum ca-
ro confusa est, & quantum os lationem habet, & rursum an illatum sit os a telo, & ni-
hil mali passum sit, & ad curationem qualinam opus habet ulcus, & caro, & os-
sis affectio; talia sane ulcera sectione opus habent. Si vero etiam os quidem carne fuerit
210 denudatum, subcava vero fuerint ulcera in obliquum, cavitate quam plurimum refecare
oportet, ubi non facile est medicamento quocumque pervenire. Sed & orbiculatiora
ulcera, ac plurimum subcava, etiam ipsa refecare oportet. Circulo divinum incisio-
secundum longitudinem pro bonis natura, ut longius fiat ulcus. * At vero in capi-
tis sectione reliquæ quidem capitis partes securitatem habent, dum secantur. Verum
215 tempora, & adhuc supra tempora venam, quæ per tempora fertur, secare non oportet.

- Convulſio enim corripit ſectum. Et ſi quidem ſiniſtra tempora ſecta fuerint, dextera convulſio corripit. Si vero dextera ſecta fuerint, ſiniſtra convulſio apprehendit. Quam igitur ulcus in capite ſecus, oſſium gratia carniſe denudatorum ſcire cupiens, an habeat os quid mali a telo, aut non habeat, ſecare oportet vulnus tanta magnitudine, quanta ſuſcipi opus habere viſum fuerit. Secantem vero carnem ab oſſe diſcedere oportet, quæ ad membranam, & ad os exiſtit. Deinde lineamentum per totum ulcus adhibere oportet, quod ulcus quamampliſſimum in poſterum diem faciat, cum minimo dolore. Ubi vero lineamentum adhibuiſti, cataplaſmate utere, quanto tempore etiam linamento, ita ut mazam ex tenui polenta in aceto ſubigas, aut coquas, & quammaxime viſcoſam facias. * Poſteidie vero ubi linamentum exemeris, iſpecto oſſe quod paſſum eſt, ſi non conſpicuas tibi ſit vulneratio, qualiſnam ſit in oſſe, neque cognoſcas, an os aliquid mali in ſe habeat, aut non habeat, telum autem ados perveniſſe, ac laſiſſe videatur, radere oportet ſpecillo raſorio ſecundum longitudinem, ac profunditatem pro hominis natura, & rurius ſi etiam tranſverſum ſit os, ruptionum gratia ad viſum inconſpicuum, & contuſionis obſcure gratia, quæ non intro ceſſit ex natura alterius oſſis capitis. Indicat enim ipſa ratio magis, ſi non etiam alias conſpicue fuerint hæc affectiones, ex telo in oſſe exiſtentes. Et ſi ſedem teli in oſſe videris, tum ipſam teli ſedem radere oportet, tum ambientia ipſam oſſa, ne ſape ad ſedem ruptio accedat, & contuſio, aut ſola contuſio, & deinde lateant, quum non conſpicua exiſtant. Poſtquam autem os ſcalpro raſeris, ſi quid ad perforationem rendere oſſis faucatio videatur, perforare oportet, & circa perforationem triduum non excedere, ſed in hoc perforare, tum alias, tum tempore calido, ſi ab initio curationem ſuſceperis. Si vero ſuſciperis os ruptum, aut contuſum eſſe, aut ambo hæc, conjectura facta, quam velementer faucatus ſit, ex vulnerati verbis, & quod a forti id contigit, qui faucavit, ſi alius ab alio vulneratus fuerit, & quod telum quo vulneratus eſt, ex maleficiorum telorum ordine ſuit, deinde quod verſigio, & caligo ipſum corripuerit, & quod in ſoporem profundorem incidit, & quod ceciderit: his ita ſentibus, ſi non cognoſcas, an os ruptum ſit, aut contuſum, aut ambo hæc, neque alias videas: ſuper os aliquid maxime nigri coloris, nigro medicamento liquato ſubactum, imponere oportet, & ſubextento linteo oleo imbito ſuper ulcus, & deinde mazæ cataplaſmate apoſſito deligare, poſtridie vero exuloto, ac expurgato ulcere deradere. * Et ſi ſanum non fuerit, ſed ruptum, ac contuſum, reliquum quidem os ſalum album erit, filiſura vero & contuſio, quæ nigrum medicamenti eliquatum in ſeipſam ſuſcepit, in reliquo oſſe albo nigra erit. Cæterum hanc filiſuram conſpectam rurius ſecundum profunditatem radere oportet. Et ſi quidem radens filiſuram hanc conſpectam nigram exemeris, & deleveris e conſpectu ſublata, contuſio quidem oſſis aut magis aut minus facta ſit, quæ ſane etiam filiſuram a ſcalpro raſorio deletam rupit. Verum minus horrenda hæc eſt, & minus negotii exhibuerit, filiſura deleta. Si vero in profundo ſit, & dum raditur deſecti nolit, ad perforationem devenit hæc calamitas. Sed perforare oportet, ac de cætero ulcus curare. Cavere autem convenit ut ne aliquid mali os contrahat ex carne, ſi malecuerit. Nam & perforato oſſe, & alias denudato, ſed ſano; & ſi laſſum aliquam ex telo habeat, & ramen ſanum eſſe putetur, periculum magis imminet ut ſuppuratum fiat, etiamſi alias ſanum non eſſet. * Si et caro os ambiens male ciceretur, inflammetur, ac conſtringatur. Ignescit enim, et multa flamma impletur. Et ſane os ex ambientibus carnibus in ſeipſum calorem et flammam, et quæcunque mala in ſeipſa habet caro, trahit, et ex his ita ſuppuratum ſit. Malum eſt etiam humidum eſſe carnem in ulcere, et putreſcentem ad multum tempus purgari. Quare ſuppuratum quidem quamceleſtine ulcus facere oportet. Sic enim ambientibus ulcus partes quamminuſimum inflammabuntur, et ulcus citiſſime purum erit. Necceſſe eſt enim carnes conſciſas, ac contuſas a telo ſuppuratas fieri, ac conſumi. Poſtquam autem purgatum fuerit, ſiccius fieri ulcus oportet. Sic enim citiſſime ſanum fiet, ſicca carne germinante, et non humida. Et ſic quoque ulceri caro non ſuperincreſcet. * Eadem ratio membranae circum cerebrum eſt. Statim enim oſſe perforato, et exſecto, ac de membrana detracto, ipſam denudatam membranam puram quamcitiffime, ac ſiccam facere oportet, ut ne ubi ad multum tempus humida ſit, compureſcat, ac in tumorem attollatur. His enim ita ſentibus, periculum eſt ipſam putreſcere. At verum os quod diſcedere a quovis alio oſſe oportet, ulcere in capite ſiente, et ſede teli in oſſe exiſtente, aut alias oſſe plurimum denudato, diſcedit, ubi plurimum exanguie factum eſt. Reſiccatur enim ſanguis ex oſſe et a tempore, et a plurimis medicamentis. Citiſſime enim diſceſſerit, ſi quis ulcus quamcitiffime purgari, et de cætero et ulcus, et os rursus majus, tum minus reſiccaverit. Quod enim citiſſime reſiccatum, ac teſtaceum factum fuerit, ex hoc facto maxime dimittitur ab alio oſſe, quod ſanguinolentum, ac vivum exiſtit, et quum exanguie, ac ſecurum fiat, a ſanguinolento ac vivo valde diſcedit. * Quæcumque vero oſſa intro contuſa cedunt ex ſua ipſorum natura, rupta aut etiam diſſecta, valde ampla, talia minus periculosa ſunt, ubi membrana ſana fuerit, et quæ pluribus filiſuris, et amplioribus intro rupta ſunt, adhuc minus periculosa ſunt, et ad detractiorem faciliora ſunt, et nullum ex talibus perforare oportet, neque periclitari oſſa auferre conando, priuſquam ſponte ſua emergant, priore forma exoluta. Emergunt autem carne ſubſcacente. Subſcaciſcitur autem ex duplici eata

- cata ossis lamina, & ex sano osse, si superna ossis pars sola fuerit corrupta. Sic vero quameitissime, & caro subnata, ac germinare poterit, & ossa emetierint, si quis ulcus, quameitissime suppuratum redditum, purum faciat. Et si per totum os ambae partes intero contusae cesserint ad membranam, & superna ossis pars, & interna, si quis similiter medeatur, illic celerrime sanum erit, & ossa, quae intro cesserint, celerrime emergunt, ac revertuntur. * At vero puerorum ossa & tenuiora, & molliora sunt ea de causa, quod sanguinolentiora sunt, & cava, & neque anerosa, neque densa, neque solida; & a telis aequalibus, ac debilioribus si similiter, ac minus fuerint vulnerati, junioris pueri vulnus & magis, & citius suppuratur, & in breviori tempore quam senioris: & si alias ex vulnere moriturus est, junior seniore citius perit.
- Ceterum si os denudatum carne fugiat, animadversione habita cognoscere conari oportet, si oculis videre, ac noscere non datur, an ruptum sit os, & an contusum, aut solum contusum; & an sede telis facta, adsit contusio, aut fissura, aut ambo haec. Et si quid horum os passum fuerit, detracto sanguine, parvo terebello modice & cum cautione os terebrare oportet. Tenuius est enim os, & minus profundum juvenibus, quam senioribus. Quicumque vero ex vulneribus in capite moriturus est, & feri non potest ut sanus fiat, ac servetur, ex his signis dinotionem moriuri facere oportet, & quod futurum est praedicere. Patitur enim haec. * Quum quis os fractum, aut ruptum, aut contusum, aut quocumque modo fractum intelligens, per errorem deliquerit, & neque raserit, neque perforaverit, veluti os non opus habeat, & velut os sanum existat, ante decimumquartum diem febris corripit ut plurimum in hyeme. In aestate vero post septimum diem febris corripit, & postquam hoc factum fuerit, ulcus colorem emittit, & ex ipso sanies paucis fluit, & quod inflammatum est ex ipso emoritur, & viscosum fit, & apparet velut falsamentum, colore fulvum, sublividum, & os tunc corrumpi incipit, & fit valde nigrum, postro-mum pallidum, aut valde album evadens. Quum vero iam suppuratum fuerit, in lingua pustulae oboriuntur, & desipiens ager moritur, & convulsio pleurosq; corripit in altera corporis parte: Si quidem in sinistra parte capitis ulcus habeat, in dextra corporis parte convulsio corripit. Si vero in dextra capitis parte ulcus habeat, in sinistra corporis parte convulsio corripit. Sunt autem & qui syderati sunt, atque sic pereunt ante septimum diem in aestate, aut decimumquartum in hyeme. Similiter autem significant haec signa & in juniore, si vulnus existat, * Quapropter ubi intellexeris febrem invadere hominem, & ex aliis signis aliquid ipsi accedere, non cunctari oportet, sed os usque ad membranam perforare, aut scalpro rasorio deradere. Est enim & ad perforationem, & ad rationem facile, ac expeditum. Deinde reliqua sic curare, prout conducere visum fuerit, respectu ad id, quod fit, habito. Quum vero in vulnere in capite, homine terebello perforato, aut non perforato, osse autem denudato, tumor rubicundus, ignis sacri speciem referens, accesserit in facie, & in oculis utrique, aut altero: & si quis tumorem contingat, doceat: & febris corripit, ac rigor: & ulcus ipsum tum quod ad carnem attinet, tum quod ad os, bene habeat ad aspectum, & ambientes ulcus partes bene habeant, excepto tumore, qui in facie existit: & aliud peccatum nullum tumor habeat, quod ad reliquam victus rationem attinet, huius infernam alvum deorsum purgare oportet medicamento, quod bilem ducit, & ubi sic purgatus fuerit, & febris dimittit, & tumor sedatur, & sanus evadit. Medicamentum vero dare oportet, ad vires hominis respiciendo, prout robore validus fuerit. * Ceterum de perforationis, ac terebrationis usu, ubi ea necessitas ingruat, ut necesse sit hominem perforare, sic statutendum est. Si ab initio assumptam curationem administras, non oportet statim os ad membranam perforare, ac excindere. Non enim conducit membranam osse denudatam esse, ad multum tempus male afflicta; sed postremum, ubi madore cor-rumpi, ac putrescere ipsam periculum est. Est & aliud periculum, si statim osse ad membranam perforato, ipsum auferas, ne in ipso opere membranam per terebellum vulneres. Verum terebrantem oportet, ubi iam valde parum abest ut os sit perforatum, & os iam movetur, a terebratione desistere, & sinere ut os sua sponte discedat. Nam in osse perforato, & a perforatione relicto, nihil mali accedere poterit. Tenue enim iam id, quod restat, fit. Reliqua vero curare oportet, prout ulceri conducere visum fuerit. Terebrantem autem frequenter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquam immergere. Calefcens enim ex circumductione terebellum, etiam os excalefaciens, ac resiccans adurit, & magis os perforationem ambiens discedere facit, quam alias discessum fuisset. Si vero etiam statim volueris usque ad membranam perforare, & postea os auferre, eodem modo frequenter eximere terebellum oportet, & in frigidam aquam demergere. At si non ab initio curationem assumpseris, sed ex alio traditam susceperis, ita ut posterior tarde ad curationem devenias, terebello exscalpro statim os ad membranam perforare, ac excindere oportet, & exemplo saepe terebello speculati tum alias, tum per admodum specillum, circumcirca ipsius terebelli viam. Nam multo citius perforatur os, si suppuratum iam ac transpuratum perforaveris, & saepe contingit ut non profundum os sit tum alias, tum si ea capitis parte fuerit vulnus, qua tenuius magis quam crassum os ipsum existit. Quase cavere oportet, ut in terebelli admotione

ne fal-

ne fallaris, verum qua parte crassissimum os esse visum fuerit, in eam semper te-
rebellum admotum adigito, ita ut frequenter consideres, ac commoveas os, &
ejicere coneris. Postquam autem abstuleris, reliqua, velut ulceri conferte visum
fuerit, curato.

HIPPOCRATIS COI

CHIRURGIAE OFFICINA.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Sensibus exposita a quibusvis facile cognosci.
*Lueis species duae, ac utriusque usus du-
plex.*
- 2 Pedum, ac genuum situs, in curatione qua-
lis esse debeat. *Postitus, ungues.*
- 3 Affirmum instrumenta in chirurgia habilia esse
oportet. *Deligationis duae species: ci-
ta, expedita: bona, pulchra.*
- 4 Pulchra deligationis species. *Bona ligationis
species, compressio. Nexu & filum quo-
modo in deligationibus procedere debeat,
Deligatio omnis ad declivia, & acuminata
fugit.*
- 5 Deligatio quomodo fieri debeat.
- 6 Deligamenta qualia esse debeant, Obvolutio-

- nis capita. *Lintheorum preparatio.*
- 7 Deligationis initium.
- 8 Splendorum longitudo, latitudo, multitudo,
crassitudo. *Subligationes lintheorum duae.
Deligamentorum multitudo, longitudo, la-
titudo.*
- 9 Ferula quales esse debeant. *Ceratum.*
- 10 Positio qualis esse debeat. *Qua in aqua spe-
sentur.*
- 11 Dissensio circa quas partes maxime fiat. *De-
frictio, Deligationis modus.*
- 12 Figurarum deligationis summa. *Singillatio-
num, concussio, convulsio, tumor-
um, cum effusione sanguinis, deligatio.*
- 13 Luxationum, avulsionum, aut elapsionum deli-
gationes. *Summationum deligatio.*
- 14 Fulcimenta quibus partibus adhibenda.



UT similia, aut dissimilia, a principio, a maximis, a facillimis, I
ab his quae undiqueque penitus cognoscuntur: quae & videre,
& tangere, & audire licet: quae & visui, & tactui, & auditu,
& naribus, & lingua, & intelligentia sentire licet: quae & quibus
cognoscuntur, omnibus cognoscere licet. Quae vero ad chirurgiam
officinam: agrotans, agens, ministri, instrumenta, lumen: I
ubi, quomodo: quot, quomodo, quando: corpus, vasa commoda:

tempus, modus, locus: agens aut sedens, aut stans, moderate aut seipsum, ad id
quod tractatur, ad splendorem lucis. Lueis igitur species duae sunt, altera commu-
nis, altera artificialis. Communis, in nobis non est. Artificialis, etiam in nobis est. 10
Utriusque vero duplices usus sunt, aut ad lucem, aut sub lucem. Sub lucem & modici
us usus est, & moderato manifesta. Ad lucem vero, ex praesentibus, ex consuetudi-
bus luminibus ad splendorem convertere oportet id, quod tractatur, exceptis his quae
aut latere oportet, aut videre turpe est: ita ut id, quod tractatur, ex adverso sit lu-
ci, qui vero tractat, ex adverso eius quod tractatur, verumtamen ut ne tenebras in-
ducatur. Sic enim & qui agit videre poterit, & quod tractatur non videtur. 15
A seipsum vero, si quidem sedeat, pedes secundum rectitudinem sursum versus e directo ad
genua sine, distantia autem parva in consistendo intercedat. Genua autem superiora sunt
inguinibus modice distantia, pro commoda cubiti positione, ac appositione. Vesti-
tus expedite, distincte, aequaliter, similiter, cubitis, humeris. Ad id vero quod 20
tractatur, ultra & prope, & sursum ac deorsum, & hac aut illac, aut in medio. Ul-
tra quidem & prope termini sunt cubitorum gibbi, ita ut in anteriorem partem non ex-
cedant genua, in posteriorem costas. Sursum vero, ut non supra nuchas, summas
manus habeat. Deorsum, ut non inferius quam ut ibi pectus ad genua habet, sum-
mas manus angulares ad brachia figaret, & in medio quidem hoc modo se habet. 25
Hac vero aut illac, ut non extra sedem, sed pro ratione conversionis & corpus, & ope-
rantem corporis partem producat. Si vero stet, utriusque pedibus ex aequo insistere sa-
tis est. Agere vero oportet ita ut altero pede inscendat, non eo qui est ad manum agen-
tem, genu ad inguinem subleat, velut in sede, sed & alii termini eadem sunt. At qui tra-
ctatur, reliqua corporis parte tractanti inserviat, aut stans, aut sedens, aut decumbens, 30
quo quamfacillime ita velut figuram habens perseveret, servans subluxionem, subsiden-
tiam, eversionem, declivitatem. Sicque debet servatur & figura, & forma eius qui tra-
ctatur, in exhibitione, in tractatione, in habitu postea sequente. Ungues neque pra-
minere oportet, neque deficere. Digitorum vertices ad usum exercere, digitis qui-
dem seminis pleraque indice ad magnum, admoeto. Tota vero manu prona, amba- 35
bus autem adversis. Digtum extendere cogit magnum quiddam in medio digitorum posi-
tum, & oppositum facere magnum digitum indicis. Morbum autem esse manifestum est,
per quem etiam laeduntur hi quibus ex nativitate, & educatione, asinevit magnus digi-
tus ab aliis contineri. Opera omnia exercere oportet utrisque seorsim agendo, & am-
babus simul. Similes equum sunt, ambabus conjectando bene, pulchre, cito, non 40
labo-

- laboriose, concinne, expedite. * Instrumenta quidem, & quando, & qualiter dicitur. Ubi oportet, ut ne quid impediat opus, neque impedimento sit inter accipendum circa operantem corporis partem. Si vero alius det, paulo prius paratus sit, & faciat ubi iusseris. Qui vero circa agrotantem sunt, id quod tractatur, exhibeant
- 45 prout visum fuerit. Reliquum autem corpus detraheant, ut totum quiescat, tacentes, & praefecto obedientes. Deligationis species duae sunt, quae facta est, & quae adhuc fit. Quae adhuc fit, cito, non laboriose, expedite, concinna. Cito quidem, perficiendo opera. Non laboriose, facile agendo. Expeditio vero ad omnia parata est. Concinnitas autem iucunda aspectu est. Ex quibus vero exercitationibus
- 50 bus haec contingant, dictum est. Quae facta est, bene, pulchre. Pulchre quidem, simpliciter, distincte: aut similia ac aequalia, aequaliter, ac similiter; aut inaequalia, ac dissimilia, inaequaliter, ac dissimiliter. * Species vero haec sunt, simplex, rotunda in orbem, aesiā, sima, oculus, rhombus, & semisecta, ita ut species congrua sit speciei & affectioni eius, quod deligatur. Eius vero quod bene deligatur,
- 55 duae sunt species, roboris quidem, aut compressione, aut copia linteolorum, & partim quidem ipsa deligatio sanat, partim curantibus inferunt. Ad haec igitur lex haec est. In his autem maxima deligationis vis est. Compressio quidem, ut incumbencia non abscedant, neque penitus innituntur, sed sint quidem firmata, non autem coacta, & minus quidem extrema, minime vero media. Nexus & filum
- 60 procedant non deorsum, sed sursum, in exhibitione, & preparatione, & deligatione, & habitu postea sequente. Initia non super ulcus iniungere oportet, sed hinc aut illinc facere nexum. Nexum vero neque in semita, neque in opere, neque illic ubi inane est, ut ne in vanum jaceat. Nexum autem, & filum, mollia, non magna. Hoc tamen probe nosse convenit, quod omnis deligatio ad declivia, & acuminata fugit, velut in capite ad partem supernam, in tibia ad infernam. * Deligare oportet dexterarum partes in sinistras, & sinistras in dexterarum, excepto capite. Hoc vero securum rectitudinem. Verum contraria ex duobus initiis. Si vero ex uno, ad id quod simile est, ad subtilitatem, velut est media pars capitis, & si quid aliud huiusmodi, quae vero moventur, velut articuli, quae quidem parte inflectuntur, quamminimis
- 70 ac expeditissimis linteis obvolvare oportet, velut popliteum; quae vero circumduntur, expansis, ac latis, velut est patella. Circumdare quoque insuper oportet, comprehensionis quidem gratia eorum, quae circa haec sunt, appensionis vero universi deligenti, in quiescentibus & depressioribus corporis partibus, qualis est & supra, & infra genu. Convenit autem in humero quidem circumductio circum alteram alam;
- 75 in inguine vero circum alteram lateris molitudinem; in tibia supra saram; & quibuscumque sursum contingit fuga, his inferne appensio convenit, quibus autem deorsum, vice versa. Quibus vero non est, velut in capite, his in aequalissima parte comprehensiones facere oportet, & minime obliquo deligamento uri. Nam stabilissimum postremum circumdatum vel maxime vagabunda continet. Quibuscumque autem neque comprehensionis, neque appensio linteorum commode se habet, his per fila appensiones facere convenit, ex iniectione, aut consusione. * Deligamenta sint pura, levia, mollia, tenuia. Obvolvare vero oportet ambabus simul, aut utriusque scorum exercere. Conveniente autem deligatione uri, conjectura ad latitudinem, ac crassitudinem partium facta. Obluvionis capita dura, aequalia, distincta sint. In
- 85 quibus autem sursum est ut decidant, ea pejora sunt, quam si cito decident. Quaedam vero sunt ejusmodi, ut neque comprimere, neque decidere oporteat. Quae vero spectat deligatio, aut subligatio, aut ambo, haec sunt. Subligatio quidem in causa est, ut aut disparata attrahantur, aut expansa contrahantur, aut contracta deducantur, aut distorta dirigantur, aut vice versa. Preparare autem oportet
- 90 lintea levia, tenuia, mollia, pura, lata, non consueta, neque exuberantia habentia, & sana, ut extensionem ferant, & paulo praestantiora, non sicca, sed succo imbuta singulis affectionibus familiaria, ad ea quidem quae disparata abscesserunt, ita ut sublimia sedem quidem contingant, non tamen comprimant. * Initium autem sumere oportet ex sana parte, & ad ulcus desinere, quo id quidem, quod subest, excoleat aliud autem non amplius colligatur. Deligare autem oportet recta quidem in rectum, obliqua vero oblique; in figura doloris exorte, in qua neque restrictio, neque discessio contingat: ex qua ubi translatio fit ad apprehensionem, aut positionem, non transmutant, sed similia habeant haec, musculos, venas, nervos, ossa, & bene posita, & bene detenta. Appensa vero aut posita esse convenit in figura doloris exorte, quae est secundum naturam. In quibus vero discesserint, vice versa. At quibus
- 100 expansa sunt, contrahere oportet, quod ad alia quidem attinet eodem modo; ex multo vero temporis spatio interposito contractionem facere oportet, & sensim progressu facto compressionem, primum minime, deinde magis, ita ut terminus quod maxime facta sit, mutuus contactus fiat. Quibus vero contracta sunt, deducere;
- 105 cum inflammatione quidem vice versa, sine hac autem, preparatione quidem ejusmodi, deligatione vero contraria. Distorta vero dirigere oportet, quod ad alia quidem attinet, eodem modo. Verum quae quidem abierunt, ea reducere oportet subligatione, agglutinatione, appensione. Contraria vero contrario modo.
- 110 * Spleniorum longitudines, latitudines, crassitudines, multitudines. Longi- 8
tudo;

tudo, quanta est deligatio. Latitudo, quatuor aut trium digitorum. Crassitudo, 110
 aut triplices aut quadruplices sint. Multitudo, ut dum circumdantur, non excedant, neque deficient. Quibus vero ad directionem, in longitudinem circumdando, latitudinem ac crassitudinem defectum coniectare oportet, ita ut non accervatim expleamus. Ar vero luteorum sibiligationes duæ sunt: prima ex loco læso ad supernas partes desinit; altera ex loco læso ad infernas. Juxta locum 115
 affectum maxime comprimere oportet, minime extremas partes; reliqua vero pro ratione. Deligatio autem multam sani loci partem occupet. Deligamentorum multitudo, longitudo, latitudo. Multitudo quidem, ut ne superetur a loco læso, neque per ferulas illis fiat, neque pondus, neque circumcirca inclinatio, neque efforminatio deligamenti contingat. Longitudo vero & latitudo, trium aut quatuor, aut quinque, aut sex cubitorum quidem longitudo, digitorum autem latitudo. 120
 Ex assilemienti circumductiones tot sint, ut ne comprimant. Mollia vero, & non crassa sint hæc omnia, pro longitudine, & latitudine, ac crassitudine partis affectæ. * Ferulæ porro sint leves, æquales, juxta extremitates sinæ, hinc atque illinc paulo minores deligatione, crassissimæ autem ea parte qua extat fractura; Quæcumque vero partes incurvæ sunt, & exarnes, in his que præminent cavendæ sunt, velut circa digitos & malleolos, aut positione, aut brevitate. Affilemientis autem fuisse, ac firmare oportet, non comprimere primum. Cerarum molles, & leves, & purum sit. In aqua spectatur caliditas, multitudo. Caliditas, ut supra suam ipsius manum medicis affundat. Multitudo, ad laxandum quidem & attenuandum, plurima optima est. Verum ad incarnandum, ac mollegum, moderata. Moderatio autem in perfusione ea est, quod dum adhuc attollitur pars, priusquam concidat desilire oportet. Primum enim attollitur. Postea 10 vero attenuatur. * Positio sit mollis, æqualis, sursum vergens, in eminentibus corporis partibus, velut calcaneos, coxas, ut neque refrangatur, neque evertatur. Canalem totius cruri, quam dimidio adhibere oportet. Ad affectionem tamen respicere oportet: & reliqua que lædere solent manifesta sunt. Exhibitio vero, & dissentio, & restitutio, & reliqua secundum naturam fiant. Natura in operibus est. Operis actione quid illa velit, coniectandum est. Ad hæc autem ex quiescente, ex communi, ex consuetudine. Ex quiescente quidem ac remisso, reitridines considerare oportet, velut in manus figura. Ex communi vero, extensionem & inflexionem, veluti figura cubiti ad brachium, quæ prope ad angularem accedit. Ex consuetudine, quod non alias figuras magis ferre possunt, velut eruta extensionem. In hac enim figura plurimum tempus facillime durant, nulla facta immutatione. In immutatione vero ex dissentione, similia hæc habet, ad habitum aut positionem, musculos, venas, 115
 nervos, ossa, & bene posita, & bene detenta. * Dissentio sit maxime circa maximas, & crassissimas, ac æqualia, & ubi ambo ossa læsa sunt. Secundo loco ubi subiectum, minime ubi supernum. Si vero magis moderato fiat, detinendum affert, pueris exceptis. Oportet autem ipsa paululum acclivia habere. Directionis exemplum, æquivocum, conjugatum, simile, sanum. Desitridio potest solvere, ligare, incarnare, minuire, dura, ligare, mollis, solvere. Multa, minuire. Moderata, erascitacere. * Deligare vero oportet, primum ut is qui deligatur deat, maxime se compressum esse circa læsam partem, minime circa extremas; & firmatum se esse, non compressum, copia linteorum, non robore; & hac die, ac nocte paulo magis, posttridie minus, tertia laxa. Reperiat autem posttridie in extremis partibus tumor mollis. Tertia vero die deligatum solum gracilius sit, atque hoc per omnes deligationes. Secunda vero deligatione, an iuste deligatum apparuerit, discere oportet. Hinc autem magis & pluribus comprimatur. Tertia adhuc magis, itemque pluribus. Septima vero a prima deligatione soluta, inveniantur gracilia ossa, ac depressa. At vero in ferulas deligata, si gracilia, & pruritus exortia, & sine ulcere fuerint, sine oportet usque ad dies viginti a læsione. Si vero quid suspectum sit, solvere in medio tempore, & ferulas tertio quoque die firmare. Appensio, pos- 120
 tridio, deligatio ut in eodem statu sint, custodire oportet. * Figuratum summa hæc est, consuetudines, naturæ singulorum membrorum, species ex currendo, ambulando, stando, decumbendo, ex opere, ex remittendo: Nam usus corroborat, otium autem colligat; aut compressione, aut copia linteorum. Quæcumque vero effuso sanguine suffusiones, aut contusiones, aut vulsiones, aut tumores inflammationis exortes ex vulnere oboriuntur, ad supernam partem plurimum, ad infernam æquiam parum deligare oportet, ita ut manum, aut crus non habeat in declive, & initium supra vulnus ponat, ac maxime firmet, minime extremas partes, medio modo medias, ultimam partem ad supernas corporis partes distribuendo, deligatione, compressione. Sed & hæc, copia magis quam robore. Maxime autem his linea tenuia, levia, mollia, pura, lata, sana debentur, utpote sine ferulis; & ubiote perfusione uti oportet. * At vero elapsiones, aut luxationes, aut tortiones, aut distantie disparatæ, aut avulsiones, aut abruptiones, aut distortiones, veluti mutilationes ad alteram partem vergentes, unde quidem excesserunt, remittendo deligare oportet, quo vero excesserunt, intendendo deligamentum, ut ad contraria vergant deligata, etiam priusquam fuerint deligata, paulo magis quam ut ex æquo sint, & deliga- 175

- ligamentis, & splenis, & appensionibus, & figuris, extensione, destructione, directione: & hic etiam uberiore pertusione. Caterum imminutiones multam sanam partem occupando deligare oportet, ut ex influxione, qua colligata plusquam sua sponte imminuta sunt, alia deligatione permutata, ad augmentum declinent, & carniū efformationem faciant. Melius autem est ut & superna pars simul deligatur, velut tibiae, & femorum, & alterum erus cum sano erure, quo similis sit, & similiter quiescat, & similiter alimentum excludant, & suscipiant. Linteorum vero copia, non compressione utendum est, remittendo primum id quod maxime opus habet, & intendendo destructione incarnante, & pertusione absque ferulis. Fuleimenta porro, ac stabilimenta adhibere oportet, veluti pectori, costis, capiti, & aliis quae casum di sunt, partim pulsuum gratia, ut ne concutiantur, partim etiam distantiarum disparatarum gratia, circa juncturas in ossibus capitis, quo firmantur. Et in tussibus, aut sternutationibus, aut alio motu, qualia sunt circa thoracem & caput stabilimenta. Horum omnium eadem sunt deligationis commodiores. Qua enim parte laciones sunt, maxime comprimendum est. Supponere igitur oportet lanam mollem, affectioni convenientem; deligare vero non amplius comprimendo, ut ne pulsus concutiantur, neque amplius quam ut distantium juncturarum extremitates mucose contingant. Neque ut tussis & sternutationes fiant, sed ut prohibeantur, stabilimentum adhibeatur, quo neque cogatur quid, neque concutiat.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE FRACTURIS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 Luxationum, & fracturarum extensiones quam directissime faciendo. Manuum fracturam tractare, non multum esse studii.
- 2 Contra imperitos medicos, qui ex figuris in manus deligatione sapientes sibi videntur. Artes alia robore, alia auxillis operantur. Manuum figura ad omnes artes naturaliter.
- 3 Manus supina extensa deligatio incommoda. Manus fracta recta extensa, & deligatio. Sedendi modus in deligatione manus. Os cubiti majus fractum, cur minore curata facilius. Os cubiti utrumque fractum.
- 4 Extensione facta, quomodo deligandum.
- 5 Femur qualem esse in fractura partibus conveniat.
- 6 Villus eorum quibus ulcera ab initio non fiant. Manuum fracturam quomodo in secula gestare conveniat.
- 7 Brachii fracti infra extensa, & compressio.
- 8 Brachii os fractum quadraginta diebus corroboratur. Villus eorum ratio. Brachii ossis incurvatio quomodo praevenda.
- 10 Pes hominis ex multis & parvis ossibus constat. Pedis ossium loco motorum compositio eadem quae manuum. Pedis ossium fracturam curatio. Quot diebus sanetur.
- 11 Pedum fracturae propter neglectum decubium, perficere curari nequeunt. Tibia ossis cur diuturniorem ceteris pedis ossibus curationem requirant. Aqua calida in articulosum lationibus assus.
- 12 Calcanei ex salsa vehementer laesi curatio.
- 13 Signa recrudescentis calcanei vulneris. Quot diebus sanetur.
- 14 Tibia ossis duo. Luxatio eorundem, & curatio.
- 15 Ossium tibiae extensa.
- 16 Extensionum sanandi modi.
- 17 Corporis attenuatio in tibiae ossis fractis.
- Quot diebus curentur. Coxae, femoris, & tibiae extensio.
- 18 Tibia os utrumque fractum.
- 19 Intera circa cruvis deligationem qualia esse debeant. Canales cruribus impositi.
- 20 Cruvis fracti decubitas.
- 21 Femurum locutiones in quibus vitanda. Tibia ossis quadraginta diebus corroboratur. Ossis directione operante, quid faciendum. Tibia os alterum fractum. Tibia os internum, majorem in curando molestiam exhibet.
- 22 Tibia os extremum fractum.
- 23 Femoris brevius ossis dedecus. Quot diebus corroboretur.
- 24 Femur magis gibbosum ad partem externam.
- 25 Timores iuxta popitem, aut circa pedem, aut aliam quampiam partem ex compressione elevati, quomodo curentur.
- 26 Genus deligationibus in femore, ac tibia turbationem inducit. Calcanei summi in tibia, & femoris fracturis cura habenda.
- 27 De ossibus simpliciter modo fractis. Ulcerum curatio simplex, Splenis vino imbuta in alcerum deligatione.
- 28 Ulcera perfrigeratione sanantes, male agunt.
- 29 Ulcerum eorum eadem, quae eorum quibus os fractum est, curatio. Villus eorum ratio.
- 30 Ulcerum curatio quibus ossis quidem fracta fuerant, sed alius ab initio non fuit curatus. Fracturae haec quomodo cognoscantur.
- 31 Ossium valde tenuium distinctio.
- 32 Qui deligatione curari nequeant. Extensio iuxta per machinamenta.
- 33 Fracturas cum & sine ulceribus alia curationes. Vulnere ante tertium, aut quartum diem non muerenda.
- 34 Linteum in alceribus assus ad septimum diem. Ligatio ab initio cum linteis fient, omnium praesentissima. Ossis fracta, & extra eminentia quae in sua sede collocari non possunt.

- 35 *Instrumentorum omnium que fortissima. Quando visus instrumentum accedunt.*
 36 *Offium discessuorum cognitio. Offa que citissime discedant.*
 37 *Os extra emicans, cur praecedendum. Offium frigidis madefacturum primo tempore pericula.*
 38 *Os femoris, aut brachii extra emicans. Offis inferna pars emicans, minus superna periculosa.*
 39 *Venarum in interna brachii parte multa & periculosa: extensiones. Offium discessus diuturnus est.*

- 40 *Luxationes offium circa genus mitiores sunt his, que circa cubiti flexuram.*
 41 *Offium circa genu luxatio frequens, sed repositio facilis. Offium cubiti repositio molestior.*
 42 *Articulus supra cubiti transpressus.*
 43 *Brachium in anteriorem partem rarissime luxatur.*
 44 *In posteriorem partem luxatum.*
 45 *Os cubiti brachio subiectum fractum, Offium fractura, venarum, aut nervorum in his confusione, minus noxia.*
 46 *Epilogus.*

S E C T I O I.



PORTET medicum & luxationum, & fracturarum extensiones 1
 quamdirectissimas facere. Hac enim iustissima natura est. Si vero 2
 quid vel hac, vel illac inclinare, ad pronam partem vergere 3
 convenit. Minus enim hoc peccatum est quam ad supinam. Qui igitur 4
 nihil praemeditati sunt, plerumque nihil peccant. Ipse enim 5
 qui deligavit, manum porrigit, ut qui ita a iusta natura cogatur.
 Qui vero sapientes sibi videntur medici, hi sunt nimirum 6
 qui peccant. Stulti igitur non multi est manum fractam tractare, & 7
 quilibet, ut ita dicam, medicus hoc potest. Verum cogor plura de hoc scribere, quod 8
 sciam medicos esse, qui sibi sapientes esse videntur ex figuris manus in deligatione, ex 9
 quibus ipsos indoctos esse putare oportebat. Sed enim multa in hac arte hoc modo 10
 iudicantur. Quod enim peregrinum est, quum nondum intellexerint an bonum sit, magis 11
 laudant quam familiare, quod jam bonum esse sciunt, & alienum magis laudant quam 12
 probe notum. * Dicendum igitur, quamnam medicorum peccata de natura manus tum 13
 dedocere, tum docere velim. Nam & aliorum corporis offium doctrinam hic sermo affert. 14
 Manum itaque, de qua nobis sermo est, quidam pronam deligandam dedit; ille 15
 vero coquebat sic tenere velut sagittantes, quum humerum injiciunt, atque ita habentem 16
 deligabat, hoc ipsum illi secundum naturam esse existimans; & in testimonium adducebat 17
 tum omnia cubiti ossa, quod directionem inter se haberent, tum coloris concordiam, 18
 quod ipsa per seipsum rectitudinem haberet, idque hoc modo & externa & 19
 interna parte. Hoc modo etiam dicebat, & carnes, & nervos a natura productos 20
 esse, & artem sagittandi in testimonium citabat; & hac dicens, ac sciens, sapiens 21
 esse sibi videbatur. Verum aliarum artium obliquus erat, & eorum quae robore, & eorum 22
 quae artificis operantur ac efficiunt, non advertens aliam in alio figuram secundum 23
 naturam esse, & in eodem opere alias dextrae manus figuram secundum naturam esse, 24
 alias fuisse, si ita contigat. Alia enim figura in iucilatione secundum naturam est, 25
 alia in funde iactu, alia in lapidis iactu, alia in pugilatu, alia in quiescendo. Quot 26
 vero artes invenire quis possit, in quibus non eadem figura manuum naturalis est? 27
 & in unaquaque arte aliter ad instrumentum, quod quisque habet, & ad opus, quod 28
 perficere vult, manus figurantur. Et vero, qui sagittandi artem exerceat, hanc figuram 29
 alterius manus optinam esse, consentaneum est. Cardiniformis enim brachii pars, 30
 in cubiti sede in hac figura imitans, ossibus cubiti & brachii rectitudinem facit, veluti 31
 totum unum esset; & fractio articuli fracta est in hac figura. Verisimile est igitur 32
 hoc modo nimis flexibilem & rigidissimum esse hunc locum, & non superari, 33
 neque remittere, dum a dextra manu nervus trahitur; & sic nervum quidem quamplurimum 34
 trahet, a firmissimo vero, ac confertissimo emittit. Ex talibus enim sagittarum 35
 emissionibus celes et vehementer, & longinquitates fiunt. Deligationi vero cum 36
 arte sagittandi nihil commune est. Nam & ubi deligavit, si manum ita habiturus 37
 esset, multos utique dolores majores vulnere adderet; & si flectere juberet, neque 38
 ossa, neque nervi, neque carnes in eodem permanerent, sed superata deligatione alio 39
 transferrentur. Et quae tandem est figurae sagittarii utilitas? Et in hac parte fortasse 40
 non peccaret is, qui sibi sapiens esse videtur, si ipsum vulneratum sibi manum exhibere 41
 permitteret. * Alius porro medicus supinam manum praebens ita extendere jubebat, 42
 atque hoc modo habentem deligabat, hanc figuram naturalem esse putans, conjectura 43
 ex colore facta; & ossa hoc modo secundum naturam esse existimans, eo quod 44
 os eminens circa manus iuncturam, ubi parvus digitus est, e directo esse apparet 45
 ejus ossis, ex quo ulnam homines metiuntur, & hac testimonio adducebat, quod 46
 secundum naturam hoc modo figura se haberet; & recte dicere putabatur. At vero 47
 si quidem manus supina extendatur, vehementer utique doluerit. Cognoscere autem 48
 poterit hoc quisque sua manu ita extenta, quod dolorosa est hac figura. Nam & debili- 49
 or vir; fortiorem ita manibus suis comprehensum, ut cubiti flexura supina frangitur, 50
 quocumque voluerit duxerit. Neque enim si gladium in hac manu habeat, eo uti poterit, 51
 adeo violenta hac figura est. Deinde si ubi deligavit quis, in hac figura finit, 52
 major

- major quidem dolor ubi obambulat, magnus autem etiam ubi decubuerit, sentietur.
- 55 Quin & flectere manum si opus fuerit, omnino necesse est & musculos, & ossa aliam figuram habere. Sed & circa reliquam perniciem in hac figura hæc ignorabat. Os enim circa iuncturam manus eminens, iuxta parvum digitum, hoc quidem cubiti est. Quod vero in flexura est, a quo ulnam homines metiuntur, id brachii caput est. Ille vero idem os esse, & hoc & illud putabat, itemque multi alii. Est autem idem cum
- 60 illo, is qui cubitus sive cubiti gibbus vocatur, in quem innititur. Si quis igitur ita supinam manum habeat, tunc & os distortum apparet, & nervi a manus iunctura tendentes ex interna parte, & de digitis, distorti sunt. Tendunt enim hi nervi ad os brachii, unde ulna mensuratur. Tanra sane, ac talia sunt peccata, & ignorantie naturæ manus. * Si vero velut ego iubeo, manum fractam quis extendat, os quidem
- 65 quod est circa parvum digitum, ad cubiti flexuram tendens, in directum converteret, rectitudinem vero habebunt nervi a manus iunctura ad brachii summas partes tendentes; & manus dum appensa excipitur, in consimili figura erit, in quali etiam erat dum deligaretur, ita ut neque ambulanti, neque decumbenti ullus dolor aut fatigatio accedat. Desidero vero hominem ita oportet, ut ossis pars ad clarissimam præsentem lucem constitatur, ne is qui extensionem tractat, circa sufficientem directionem fallatur. Nam periti artifices manum adnotam, ne os quidem eminens in contactu latere poterit. Porro ex cubiti ossibus ubi non ambo fracta sunt, facilius curatio est, si superius os sanaium est, etiam si crassius id existat; partim quod sanum sustentum fundamenti loco ipsi est, partim quod facilius occulari potest, nisi iuxta
- 75 manus iuncturam fasciari contigerit. Crassa enim est caro, quæ superne innascitur. Infernum vero os ex carne est, & non facile occulari potest, & vehementiore extensione opus habet. Si vero hoc contritum non fuerit, sed alterum illud, vilior extensio sufficit. At si ambo fracta fuerint, fortissima extensio opus habent. In puero etenim vidi extensa magis quam oportebat. Verum plerique minus quam oportet, extenduntur.
- 80 * Convenit autem, facta extensione, volis admotis dirigere; deinde cerato illito non ita multo, ut ne deligamenta circumfluant, ita deligare, ut summam manum non inferius cubiti flexura habeat, sed etiam paullo superius, ne ad summam partem sanguis infuset, sed interceptiatur. Postea lineo deligare, initio eius supra fracturam injecto, ita ut firmet quidem, non tamen admodum preuiat. Postquam autem circumdedit eodem
- 85 loco bis aut ter, ad supernam partem deligans distribuat, quo sanguinis influxiones interceptantur, & illic desinat. Convenit autem prima lineæ non esse longa. Secundorum vero lineæ initium supra fracturam iniungere, ita ut semel circumdet eodem loco, deinde deorsum distribuat, & minus premeis, & magis traducens, quo lineæ ipsi sufficiens sit, ad recurrendum eo ubi alterum delivit. Hic igitur lineæ ad sinistram,
- 90 aut dextram deligatur, aut ad utram partem contulent ad fracturæ figuram; & in utram declinare expedierit. Postea vero splenia extendere oportet modico cerato illita. Nam sic & nitius & stabilis se habent. Deinde sic lineis deligare alternatim, modo in dextram, modo in sinistram; & plerumque inferne initio facto, sursum ducere; aliquando etiam superne deorsum. Extremitates autem subaridas, & in acutum abeuntes, splenis obvolutis curare oportet, ita ut copia operatorum non totum accervat, sed particulatim corrigat. Insuper autem circa manus iuncturam sive articulum laxè circumdare splenia oportet alias atque alias. Copia vero lineæ sufficiens primum, duæ partes sunt. Signa autem bene curati, & terminus recte deligati, hæc sunt: si interrogaveris ipsum an compressus sit, & si compressum quidem se esse dixerit, sed leniter, & maxime circa ipsam fracturam. Huiusmodi ita facta esse perpetuo dicere oportet eum, qui recte deligatur. Signa vero mediocritatis hæc sunt. Ea die ac nocte qua deligatus est, ipse sibi ipsi videatur non minus, sed magis compressus esse. Posttridie vero tumorem parvum, mollem ad summam manum abortum esse. Mediocritatis enim facta a te compressio signum hoc est. Desinente autem die
- 105 minus compressus esse sibi videatur. Tertia vero die deligamenta laxa esse ipsi videantur. Et si quid horum jam relatorum defecerit, noscere oportet deligationem moderata laxiorem esse. Si veto quid ex relatis abundaverit, nosse oportet ultra modum compressum esse. Et ex his conjectura facta, postea deligans aut laxabis, aut comprimēs magis. Resolvere autem oportet tertia die, ubi extenderit. Et si primum moderata
- 110 te deligasti, hanc deligationem paullo magis quam illam comprimere oportet, & initia supra fracturam impere, quemadmodum etiam antea. Si quidem enim hæc prius deligaveris, sanies ex hæc ad extremitates hinc atque illinc exhauritur. Si vero aliquam aliam partem prius compresseris, in illam ex compressa exhauritur, intelligentia autem ad multa utilis existit. Sic igitur semper incipere oportet & deligationem, &
- 115 compressionem ex hoc loco. Reliqua vero iuxta rationem, ita ut quanto longius a fractura digressus fueris, minus comprimās, nunquam quidem laxa omnia circumdando, sed adherentia. Postea vero pluribus lineis deligare oportet in singulis deligationibus. Et si interrogetur, deat se paullo magis compressum esse quam prius, &
- 120 præsertim circa fracturam. Sed & alia & circa tumorem, & circa dolorem, & circa allevationem pro prioris deligationis ratione fiant. Postquam vero tertius jam aderit dies, laxiora esse ipsi videantur deligamenta. Deinde resolvere oportet, & rursus paullo, magis comprimendo deligare, & hoc cum omnibus lineis, quibus deligandus

dus erat. Et postea omnia ea ipsum apprehendant, quæ etiam in primis deligati-
 onum circuitibus contingerant. Ubi vero tertius aderit dies, & septimus a prima
 deligatione, si quidem recte deligatus fuerit, tumor in summa manu, atque hic non
 valde magnus erit. Locus autem, qui deligatur, in omnibus deligationibus tenuior,
 ac gracilior comperietur, verum in septimo etiam valde tenuis; & ossa fracta ma-
 gis moventur, & facilius ad correctionem ducuntur. Et si hæc huiusmodi fuerint,
 facta coaptatione velut ad ferulas adhibendas deligare oportet, paullo magis compri-
 mendo quam antea, si non dolor aliquis maior fuerit ex tumore, qui est in summa
 manu. Postquam autem linteis deligaveris, ferulas circumponere oportet, &
 vinculis quam laxissimis circumdare, quietis saltem gratia, ut ferularum appositio
 ad compressionem manus nihil faciat. Postea vero & dolor, & allevatio eodem mo-
 do fiant, velut in primis deligationum circuitibus. * At vero ubi tertio die laxas esse
 dixerit, tunc postea ferulas firmare oportet, maxime quidem circa fracturam,
 sed & alia juxta rationem, si quidem & deligatio magis laxa fuerit, quam comprimat.
 Crassissimam autem ferulam esse oportet, qua parte extat fractura, non tamen
 multum. Et ad hoc studium vel maxime adhibendum est, ut ferula e directo magni
 digiti non ponatur, sed hæc vel illac: immo neque a directo parvi digiti, qua parte
 os supereminet in manus articulo, sed hæc vel illac. Quod si ad fracturam conser-
 rat hæc parte aliquas ferulas poni, breviores ipsas aliis esse oportet, ut ne perve-
 niant ad ossa præminentia, iuxta manus articulum. Periculum est enim ulceratio-
 nis, & denudationis nervorum. Oportet autem tertio quoque die ferulas valde leniter
 firmare, hoc cogitantes, quod ferulæ, deligationis conservandæ gratia, apponuntur, non
 autem compressionis gratia alligantur. Si quidem igitur probe noveris, quod in
 prioribus deligationibus ossa sufficienter sunt directæ, & neque prurius infestentur,
 neque ulla aliqua ulceratio suspecta sit: ita cum ferulis deligatum finire oportet, do-
 nec viginti dies transgressus fuerit. In triginta enim diebus universis maxime ex
 toto cubiti ossa corroborantur. Certum tamen nihil est. Nam & natura a natura,
 & ætas ab ætate valde differt. Postquam autem solveris, aquam calidam affundere
 oportet, & postea deligare, paullo minus comprimendo quam antea, & paucioribus
 linteis quam prius. Et postea tertio quoque die solvere, ac rursus deligare, ita ut mi-
 nus comprimas, & paucioribus linteis utaris. At vero si ubi ferulis deligatus est,
 ossa non recte posita esse suspiceris, aut aliud quid vulneratum vexet, in dimidio
 temporis spatio, aut paullo prius solvere, & rursus deligare oportet. * Viduus por-
 ro his, quibus ab initio ulcera non facta fuerint, neque ossa extra eminent, sufficit
 aliquanto simplicior. Verum parejore victu utendum est ipsis usque ad diem decimum,
 ut qui tum etiam quiescant, & obsonis tenellis utendum, quæ transiunt inediocrita-
 rem exhibent. A vino vero, & carnis esu abstinendum. Postea tamen sensim progressu
 facto resiliendi sunt. Hic sermo velut lex iusta posita est de fracturarum curatione,
 & quomodo tractare oporteat, & quomodo eventus sequi, ex iusta tractatione.
 Quicquid vero non ita eventum habuerit, scire oportet, quod in tractatione quid de-
 fectuose, aut redundanter factum est. Quin & hæc insuper in hoc simplici modo
 considerare oportet, quæ non ita valde curare solent medici, & quidem quum omnem
 curationem, & totam deligationem corrumpere possint, si non recte fiant. Si enim am-
 bo ossa fracta fuerint, aut infernum solum: is vero qui deligatus est, in fascia quadam
 manum exceptam ac appensam habeat, & plurima facie pars circa fracturam existit,
 ita ut manus hinc atque hinc pendat: hunc necesse est teperiri os ad supernam partem
 distortum habentem. Si vero sic fractis ossibus, & summam manum in fascia habet,
 & partem juxta cubiti flexuram, reliqua vero cubiti pars non sit elevata; hic ad infer-
 nam partem os distortum habere comperietur. Proinde in fascia molli latitudinem ha-
 bente maximam cubiti partem, & manus articulum æqualiter suspendere, ac elevata
 gestare oportet.

S E C T I O II

8 * **A**T vero si brachium fractum fuerit, si quidem quis extentam manum in hæc
 figura extendat, musculus brachii extensus deligabitur. Postquam autem deliga-
 tus cubiti flexuram iusserit, musculus brachii aliam figuram habebit. Justissima
 igitur brachii extensio hæc est. Lignum cubitale, aut paullo brevius, qualia sunt li-
 gna, quæ in foramina ligonum immittuntur, suspendere oportet, hinc atque illuc ca-
 tena deligatum. Hominem vero in alta quopiam sede collocatum, ita manu superin-
 cumbere oportet, ut lignum id sub ala sit moderate habens, ut homo vix sedere pos-
 sit, & fere sublevaris sit, supposito postea alio quopiam fulcimento, & coriaceo pul-
 vino uno aut pluribus subjectis, quo moderatam altitudinem habeat cubitus, ad rec-
 tum angulum obliquatus. Optimum quidem est corium latum ac molle, aut fasciam latam
 circumdare, & magnum aliquod pondus appendere, quod moderate incendere possit, sin
 minus, vir aliquis robustus in hæc figura cubiti, circa cubiti flexuram deorsum cog-
 gat. At vero medicus erectus stans, & alterum pedem in altiore quopiam habens, ag-
 gressionem faciat, ita ut volis os dirigat ac componat: facile autem dirigetur. Nam hæc
 extensio bona est, si quis ipsam recte præparet. Deinde deliget fasciarum princi-

Hipp. Opera.

Ff

piis

- piis supra fracturam injectis, & reliqua omnia, quemadmodum prius monuimus, tractet; & eadem interrogationes faciat; & iisdem lignis utatur, an moderate habeat, aut secus. Et per tertium diem deliget, & magis comprimat. Et septima, aut nona die cum ferulis deliget. Et si suspicionem habeat, os non bene positum esse, intermedium tempore solvat, & ubi probe collocavit, rursus deliget. * Corroboratur autem maxime os brachii in xl. diebus. Postquam vero hos excefferit, solvere oportet, & minus comprimere, & paucioribus quoque linteis deligare. Ceterum victum quemdam exquisitorem, quam prius constituere oportet, & ad longius tempus. Eius vero conjecturam facere oportet, ad timoris, qui in summa manu est, robur respiciendo. Insuper autem ad hæc animum advertere oportet, quod brachium a natura ad externam partem incurvatum est, & distorqueri solet, si non bene curetur. Sed & alia omnia ossa, quæ a natura ad hæc partem distorta sunt, etiam dum curantur ubi fracta sunt, distorqueri solent. Ubi igitur tale quippiam in suspicionem venerit, lata insuper fascia brachium circumcirca complecti oportet, & circum pectus deligare, & ubi quiescere volet, inter cubiti flexuram & collas, splenium quoddam multiplex convolutum ac complicatum supponere, aut aliud quid, quod huic simile existat. Hoc enim modo incurvario ossis recta evadit. Cavere tamen oportet, ut ne minus ad internam partem vergat. * Pes vero hominis ex multis, ac parvis ossibus compositus est, quemadmodum etiam summa manus. Franguntur quidem non ita valde hæc ossa, si non una cum corpore, ad acuto aliquo aut gravi vulnerato. Vulnerata igitur quomodo curare oporteat, in ulcerationum parte referetur. Si vero quid e loco suo motum fuerit, aut digitorum articulus, aut aliud quoddam ex ossibus summi pedis, unumquodque in suum locum cogere oportet, quemadmodum & ea, quæ in manu sunt. Curare vero oportet cerato, & spleniis, & linteis velut etiam fracturas, exceptis ferulis, eodem modo comprimendo, & per tertium diem deligando. Interrogetur item is, qui deligatur, similiter velut in fracturis, & de compressione facta, & an laxa sit deligatio. At vero sana fiunt in xx. diebus perfecte omnia, exceptis his quæ cum tibiæ ossibus communionem habent, & cum ipsa e directo. Conducit autem hoc tempore decumbere. At non tolerant contententes morbum. Verum priusquam sani fiant, obambulant. * Et propterea plurimum perfecte sanantur, sed dolor ipsos sæpe merito commonefacit. Totum enim corporis pondus pedes vehunt. Quum igitur nondum sani iter faciant, articuli moti male curantur, ideoque alias atque alias hi qui ad tibiæ sunt dolent. Quæ vero cum tibiæ ossibus communionem habent, & majora aliis sunt, & ubi hæc mota sunt, diuturniorem medelam requirunt. Curatio tamen eadem est. Verum linteis, & spleniis pluribus uti oportet, & in totum hinc atque illinc deligare. Comprimere item velut alia omnia, ea maxime parte quæ emota sunt, & primas quoque linteorum obvoluciones eodem modo facere. In unaquaque vero resolutione, multa calida aqua uti oportet. In omnibus enim circa articulos lationibus multa aqua calida affundenda est. Cæterum compressiones, & relaxationes in iisdem temporibus eadem signa ostendunt, quæ in superioribus, & relaxationes eodem fiant. Sani vero perfecte hi sunt in xl. maxime diebus, si decumbere sustinerint, sin minus, eadem pariter, quæ prius relata sunt, & adhuc amplius. * Porro quicumque saltu de alto quopiam loco facto, in calcaneum vehementer se fulciverunt, his ossa quidem disparantur, venulæ vero sanguinem effundunt, carne circa os contrita, timor autem accedit, & dolor multus. Os enim hoc parvum non est, & supereminet quidem sub tibiæ rectitudinem, communionem vero habet cum venis ac nervis principalibus. Tendo autem posterior huic ossi annectitur. Hos curare oportet cerato, & spleniis, & linteis, & aqua plurima calida, & linteis pluribus. Et ab his opus est etiam aliis quamoptimis, ac lenissimis, & si quidem mollis fuerit a natura cutis circum calcaneum, sic finire oportet. Si vero crassa, & dura, veluti quidam habent, incidere oportet æqualiter, & attenuare, ita tamen ut ne vulneretur. At vero talia bene deligare non cuiusvis est. Si enim deliget quis, quomodo alia circa malleolos deligantur, ita ut aliquando circum pedem, aliquando circum tendinem fasciæ circumdantur, hæc constrictiones calcaneum separant, qua parte contusio facta est. Aquæ ita periculum est, ne calcanei os corrumpatur, & sane si corruptum fuerit, per omne ævum morbus durare potest. Nam & alia quæ non ex tali modo sunt, ipsum corrumpunt, sed in decubitu denigrato calcaneo ex figuræ neglectu, aut in tibiæ vulnere siene periculoso, ac diuturno, & communionem cum calcaneo habente, aut in femore, aut ubi ex alio morbo diuturnus decubitus contingit. Attamen & talibus diuturnæ, ac molestæ affectiones fiunt, & quæ sæpe refringantur, si non bona diligentia, & multa quiete curentur. Quare etiam ea, quæ ex tali modo corrumpuntur, supra aliquam lationem, magna corpori pericula inducunt. Febres enim peracutæ oboriuntur, continuæ, tremulæ, singultuolæ, mentem contingentes, paucis diebus durantes, ac occidentes. Fieri etiam possunt venarum sanguinarum livores, venarum nansæ, & cancerationes ex compressione. Fieri autem possunt hæc absque alia corruptione. Atque hæc quidem relata sunt, ubi vehementissimæ contusiones fiunt. Plurima tamen leniter circumcirca contunduntur, neque ullum magnum curationis studium exigunt, sed recte tamen tractare oportet. Quum vero vehemens in fulciendo illisio facta esse visa fuerit, tunc sane relata facere convenit, & deligationem plurimam facere circum calcaneum obvolutam, ita ut aliquando ad summam pedis partes, aliquando

- quando ad medias, aliquando ad tibie partes, ex opposito lineae obvolvuntur: 85
 Deligare insuper oportet & vicina omnia, hinc atque illinc, velut etiam prius dictum est, & vehementer compressionem non facere, sed cum multis lineis. Præstat autem & veratrum bibendum dare eadem die, aut posttridie; & tertia die resolvère, 90
 33 ac rursus deligare. * Signa porro an recrudescant, aut non, hæc sunt. Quum sanguis & venis effusus, & denigrationes, & his vicina sunt subrubra, & subdura, 95
 periculum est ne recrudescant. At si quidem febre careat, sursum purgans medicamentum dandum est, velut dictum est, itemque si non continua febre laboret. Si vero continua fuerit febris, medicamentum dandum non est. Verum & a cibis, & a foributionibus abstinendum. Potui vero intendum aqua, non vino; sed savorum cremore decocto, aut aceto mulso dulci. Si vero non recrudescant, sanguis & venis effusus, 95
 & denigrationes, & vicinæ partes cum virore subpallidæ fiunt, & non duræ, & bonum est hoc testimonium in omnibus fugillatis, sanguine & venis subter cutem effuso, quod non recrudescant. Quæcumque vero cum duritia livefunt, ea ut denigrescant periculum est. Cæterum hoc studio habere oportet, ut pes plerumque paullo altius reliquo corpore habeatur. Sanus autem fieri poterit in sexaginta diebus, si 100
 34 quieverit. * At vero tibia duo ossa sunt, quorum alterum altero hæc parte multo tenuius est, illa vero parte non multo tenuius. Cohærent autem inter se iuxta pedem, & appendicem communem habent. Verum in rectitudine tibiæ non cohererent. Juxta femur autem cohærent, & appendicem habent, & appendix discrimina- 105
 tionem. Longius vero paullo alterum os est, quod secundum parvum digitum est. Et talis quidem est natura ossium in tibia. Luxantur autem aliquando juxta pedem ambo ossa, quandoque cum appendice, quandoque vero appendix tantum emovetur, quandoque alterum tantum os. Hæc autem minus molesta sunt, quam ea quæ in articulo manus existunt, si quiescere homines sustineant. Curatio vero consimilis est velut 110
 35 illorum. Nam & repositionem ex extensione, velut in illis, facere oportet. * Verum vehementiore extensione opus habent, quanto fortius est ea parte corpus. Plenumque tamen sufficiunt viri duo, alter hunc alter illinc extendentes. Si vero non satis robusti fuerint, facile est vehementiorem extensionem facere. Aut enim rotæ modiolum, aut aliud quid huic simile desodere oportet, & molle quiddam pedi circumdare, & postea latis bitulis loris pede deligatis, principia fororum aut ad pistillum, aut ad aliud lignum al- 115
 ligare, atque ita ligno in summum modiolum indito refringere, ita ut alii contra extendant humeris & poplite apprehensis. Potest etiam superna corporis pars necessitate hæc extensionis urgeri, partim quidem si ita voles, ligno rotundo levigate alte defosso, partem quamdam ipsius supereminentem intra citra juxta ani & scorti intercape- diem applicato, quo corpus sequi prohibeat ad eos qui a pedibus extendunt. 120
 Deinde ad cruris quod extenditur declinare non oportet, sed aliquem a latere assidere, qui nates retrudat, ne corpus circumtrahatur. Partim vero si etiam circa alas hinc atque illinc ligna affigantur, manus autem externæ servantur, apprehendant autem quis circa genu, atque ita contra extendat. Partim item si quis velit, aliis loris circa genu aut circa femur deligatis, & alio rotæ modio supra caput defosso, & loris ex li- 125
 gno quopiam alligatis, & ligno ita in rotæ modiolum defixio, ad contrariam partem huius, qui a pedibus extendunt, adtrahere potest. Quin & si voles, pro rotarum modiolis trabem mediocrem sub lectum extends, deinde ad trabis hinc atque illinc caput ligna fulcients ac refringens, lora ipsis alligata intendes. Si vero & hoc velis, 130
 36 alellis hinc atque illinc constitutis, in ipsis extensionem facies. * Sunt autem & alii multi extensionum modi. Optimum autem fuerit, si quis in magna civitate medicum agit, ut lignum habeat præparatum, in quo omnes necessitates insint, tum ad omnes fracturas, tum ad omnes articulorum repositiones, ex extensione, ac vectium usu. Satis autem est, si lignum fuerit & longitudine, & latitudine, & crassitudine tale, quales columnæ quæne quadrangulæ sunt. Postquam autem sufficienter extenderit, facile iam est articulum reponere. Elevatur enim in directum supra pristinam sedem. Dirigere itaque manuum volis oportet, ita ut his partim in id, quod eluxatum eminet, innitaris, partim ab altera parte infra malleolum renitaris. Ubi vero reposueris, si quidem fieri poterit, extenrum ita deligabis. Si vero præ loris impediaris, his exolutis distentionem facias, donec deligaveris. Deligare autem eodem modo oportet, & fasciarum miris similiter in id, quod luxatum eminet, injectis, & primis obvolutionibus plurimis supra id factis, imo etiam splenis plurimis supra id impositis, & compres- 140
 sione maxime isthic contingente. Sed & hinc atque illinc multum insuper deligare oportet. Magis autem hic articulus compressione opus habet in prima deligatione, quam is, qui in manu est. Postquam autem deligaveris, sublimius reliquo corpore deligatam partem habeat. Positum autem ipsius ita facere oportet, quo quamminime pes dependeat. 145
 37 * At vero attenuarionem corporis ita facere oportet, prout talem vel talem vim ipsa luxatio habet. Aliqua enim parum, aliqua multum luxantur. In totum vero magis, & longiore tempore in vulneribus circa crura, quam his, quæ circa manus sunt, attenuare potest. Nam & majora, & crassiora hæc, quam illa sunt; & sane etiam 150
 necessarium est quiescere corpus ac decumbere. Verum postea deligare articulum certia die, neque prohibet quicquam, neque urget; & alia omnia similiter, velut superius relata, curare oportet. Et si quidem quiete decumbet, sufficientes quadrages-

- ra dies, si solum in suum locum ossa rursus defecerint. Si vero quiescere nolet,
 155 non facile quidem crure uti poterit, & deligatione ad multum tempus uti co-
 getur. Quaecumque vero ossa non perfecte desident in suum locum, sed aliquid de-
 bit, progressu temporis attenuatur coxa, & femur, & tibia. Et si quidem intro
 luxata fuerint, externa pars attenuatur. Si vero extra, interna. Plurima autem
 ad internam partem luxantur. * Postquam vero ambo tibie ossa fracta fuerint 18
 160 extra exulcerationem, extensione vehementiore opus habent. Extendere autem
 oportet quibusdam modis ex praedictis, si magnae emotiones fuerint. Suffi-
 ciunt etiam a viris scientes extensiones. Plerumque enim successerint duo viri ro-
 busti, alter hinc, alter illinc distendentes. Intendere autem oportet in directum, se-
 cundum naturam, & secundum rectitudinem tibie, ac femoris, sive tibie fracte,
 165 sive femoris ossa extenderis. Sed & deligare sic oportet utrisque extensis, utrum ran-
 dem horum deligaveris. Non enim eadem cruri, & manui conferunt. Nam ubi cubi-
 ti & brachii ossa fracta fuerint deligata, manus appensa excipitur. At si extenta de-
 ligaveris, figurae carum alterantur inter flectendum in cubiti flexura. Fieri enim
 non potest, ut cubiti flexura ad multum tempus maneat expenta. Non enim saepe in
 170 hac figura, sed in flexione esse consuevit. Quin & quum homines obambulare pos-
 sint, ibi circa manum fasciati fuerint, opus habent flexione in cubiti flexura. At
 cruris quum & in ambulando, & in stando consueverit, aliquando quidem extensum esse,
 ut inflectant, ac exurgant; sed quiescunt in hac figura decumbentes. Propter has igitur
 causas, neque extensionis, neque deligationis figura eadem manui & cruri conuenit.
 175 Si quidem igitur successerit extensio, quae per viros fit, nihil aliud laboris frustra
 inferre oportet. Imperitiam enim arguit machinas adhibere, ubi ipsis non est opus.
 Si vero non sufficiens fuerit extensio per viros, etiam ex aliis necessariis quaedam ad-
 hibere oportet, si quae commoda fuerint. Quum autem satis iam extensa fuerint, fa-
 cile est dirigere ossa, & ad naturam reducere, manuum volis, ac palmas corrigendo,
 180 ac coaptando. Ubi vero direxeris, lineis deligare extensa sive ad dextram partem, si-
 ve ad sinistram, & circumducere prima lineae conducatur. Initia autem ipsorum supra fra-
 cturam injiciantur, & circum hanc primae quoque obvolutiones circumducantur, deinde
 deligando sursum ad tibiam distribuantur, velut in fracturis dictum est. * Ceterum 19
 185 lineae latiora esse oportet, & longiora, eaque multo plura circa cruris quam in manu.
 Ubi vero deligaveris, super planum quoddam & molle deponere convenit, ut neque haec,
 190 neque illac disorqueatur, neque repandum, neque gibbum fiat. Maxime autem confere
 pulvinar, aut linteum, aut laneum, durum, laxum, per medium secundum longitu-
 dinem subiectum, aut aliud quid, quod huic simile existit. Nam de canalibus,
 qui sub crura fracta subsiiciuntur, quid consulam ambigo, an supponere ipsos con-
 195 veniat, aut non; profut enim, non tamen quantum putant hi, qui ipsos supponunt.
 Non enim quiescere cogunt canales, velut illi putant. Nam neque dum reliquum cor-
 pus aut haec, aut illac vertitur, cogit canalus ut cruris ne sequatur, si non ipse homo
 huius rei curam habeat. Neque rursus absque corpore crure moveri canalis prohibet
 vel in hanc, vel in illam partem. Quin & crudelissimum est lignum subicere, si
 200 non simul molle quiddam in ipsum indatur. At utilissimum est in strato permu-
 tando, & in progressibus ad alvum exonerandam. Licet igitur & cum canali, &
 sine canali, & bene, & male rem moliri. Verum vulgo persuasum est, etiam medi-
 cum minus delinquere, si canalus subsiiciatur, etiamsi manus hoc artem fecerat. * O- 20
 205 portet enim super plano quopiam, ac molli cubare cruris ipsum, penitus in directum,
 alioqui necesse est deligationem superari a distortionem, quae in positu contingit,
 quocumque & quantuncumque tandem inclinavit. Respondeat autem deligatus ea-
 dem, quae etiam prius dicta sunt. Nam & deligationem talem esse oportet, & tu-
 morem ita attolli ad extremas partes, & laxationes ita, & peligationes per ter-
 tium diem; & quod deligatur, gracilius inveniri, & deligationes magis facere, &
 210 pluribus linteis, & circumducere pedem laxae, si non vulnus valde propinquum genu
 fuerit. Extendere autem moderate, & dirigere ossa in unaquaque deligatione oportet.
 Si enim recte curetur, & rumor secundum rationem procedat; tum locus, qui
 deligatur, tenuior, ac gracilior erit, rum ossa adductu faciliora, & extensioni magis
 obedientia. Postquam autem septimus, aut undecimus aderit dies, ferulas apponere o-
 215 portet, quemadmodum & in aliis fracturis dictum est. * Ceterum ferularum loca-
 tiones virare oportet & secundum malleorum rectitudinem, & supra tendinem, qui est
 in tibia pedis. At tibie ossa corroborantur in quadraginta diebus, si recte curentur.
 Si vero suspicionem habeas, ut aliquid directione opus habere, aut de ulceratione aliqua timeas,
 220 intermedio tempore solvere, & probe coaptata religare oportet. Porro si alterum tibie ossa fractum fuerit, extensione quidem debiliore opus habet,
 non tamen deficere, neque segnitius agere in extendendo convenit, & maxime
 quidem omnes fracturas in prima deligatione, quantum ejus fieri debet, extendere
 oportet.

oportet, si minus, quamceticissime. Quodcumque enim os non recto modo coaptatum
deligans quis compresserit, locus majori dolore vexabitur. Reliqua vero curatio
eadem est. At vero ex ossibus his internum, tibia & prima tibia appellatum, molestian
majorem in curando exhibet, & extensione magis opus habet; & si non recte coapta-
ta ossa fuerint, oculatari non possunt. Est enim totum conspiciendum, & carnis exors; &
hoc fracto, longe tardius progredi eo crure poterint. * Si vero externum os fractum
fuerit, & multo facilius feriat, & multo melius oculatari possunt, etiam si non bene
fuerit coaptatum. Est enim carnosum, & cito in pedes consistunt. Plurimum enim
oneris internum tibiae os vehit. Nam simul & una cum ipso crure, & oneris secun-
dum cruris rectitudinem, maiorem laboris partem internum os suffert. Femoris enim ca-
pit superiorem corporis partem sustinet. Hoc autem intra crus est, & non extra, sed se-
cundum tibiae rectitudinem; & simul reliqua dimidia corporis pars huic rectitudini
magis appropinquat, & non externae; & simul crassius est internum quam externum,
quemadmodum etiam id, quod in cubito est, secundum parvi digiti rectitudinem tenuius
est, & longius. In articulo tamen inferno non similis est ossis longioris constructio. Inae-
qualiter enim cubiti gibbus, sive flexura, & poples flectuntur. Propter has igitur
causas, externo quidem osse fracto, celeres progressus fiunt, internum vero fracto, tar-
di. * At vero si femoris os fractum fuerit, extensionem pra omnibus facere oportet,
ita ut ne defectuosius fiat. Amplius enim facta nihil laedit. Neque enim, si quis
distantia ex vehementia extensionis ossa deligaverit, fieri poterit ut deligatio ipsa re-
geat, ut ita distent; sed coeunt inter se ossa quamceticissime, ubi intendentes ipsa remi-
serunt. Crassissimae enim, & fortissimae quum sint hac parte carnes, deligationem super-
rabunt, non ab ipsa superabuntur. Magnum enim dedecus est ac detrimentum, femur
brevius efficere. Nam si quidem magis brevis fiat, & oculatari poterit, & non ma-
gnus est error. At cruris si brevius fiat, claudum hominem efficit. Sanum enim crur
longius est, & id redargunt. Quare utilis fuerit, ut si quis male curandus sit, ambo
potius crura fracta habeat, quam alterum tantum; equilibrium enim ipse sibi ipse fuerit
hoc modo. Postquam vero sufficienter extenderit, directione, ac coaptatione per ma-
num vel facta, eodem modo deligare oportet, velut etiam prius scriptum est, injectis
etiam fasciis initio velut deligatum est, & deligationis distributionem sursum versus fiet-
te, & deligatus eadem respondeat, velut etiam prius; & dolent eodem modo, & melius
habeat, & similiter rursus deligetur, & ferulorum appositio eadem sit. Corroboratur
autem femur in quinquaginta diebus. * Insuper vero & hoc considerare oportet, quod
femur gibbosius magis est ad externam partem, quam ad internam, & magis ad an-
teriorem, quam posteriorem. In has itaque partes etiam distorqueatur, si non probe cu-
retur, & sane istidem partibus etiam ipso semper magis exoritur est, ut neque oculatari
possit in distortionem. Si igitur huiusmodi quippiam suspectum habueris, machi-
nari ea oportet, quum in brachio distorto consuevimus. Pauca insuper linea circa
coxam, & locum inter coxas & lumbos circumdare oportet, quo & inguina, & ar-
ticulus circa intermedium crurum, ac inguinum partem, piechada appellatam, insu-
per deligetur. Nam & alias confert, & ut ne extremas ferularum partes laedant,
si ad non deligata adhibeantur. Deficere autem oportet semper ferulas, a nuda par-
te, & hinc atque illinc multum, & positionem ferularum semper ita providere conve-
nit, ut neque super os aliquod circa articulos natura prominens, neque super ner-
vum circa articulum fiat. * Tumores vero juxta poplitem, aut circa pedem, aut ju-
cta aliam quampiam partem, ex compressione elevatos, mulcis lanis succidis probe
carminatis, vino ac oleo respersis, cerato subtili, deligare oportet, & ubi presle-
runt ferulae, citius laxare. Graciles autem fieri poterint, si supra ferulas gracilibus lin-
teis tumores deligaris, ab infima parte initio facto, ad supernam procedendo. Sic
enim quamceticissime tumor gracilis fieri poterit, & rascenderit supra priores deli-
gationes. Verum hoc deligationis modo uti non oportet, si non periculum fuerit
in tumore, pustularum, aut denigrationis. Tale vero nihil sit, si non quis valde pre-
mat fracturam, aut suspensam habeat, aut manu scalpat, aut aliud quid, quod irri-
tet, corpori allabatur. At vero canalem si quis sub ipsum femur supponat, qui po-
plitem non excedat, laesit magis, quam profuerit. Neque enim prohibuerit, quo mi-
nus & corpus, & tibia sine dolore moveatur. Noxius enim erit ad poplitem per-
tingens, & quod minime oportet, id facere impulerit. * Minime vero oportet ge-
nu flectere. Omnium enim turbationum deligationibus inducit, & femore, & tibia
deligata, quisquis genu flecterit. Necessesse enim erit propter hoc, musculos alias
atque alias aliam figuram habere. Necessesse est item ossa fracta moveri. Pra omni-
bus itaque faciendum, ut poples sit extensus. Videtur igitur canalis similiter prodes-
se, qui a coxa ad pedem usque subiectus contineat, & alias circa poplitem fasciam
cum canali laxo circumdare oportet, quemadmodum infantes in cunis fascis obvolvun-
tur. Deinde si femur ad supernam partem distorqueatur, aut ad latum, melius ita con-
tineri poterit una cum canali. Ceterum calcanei summi valde magnam vim habere
convenit, ut & in tibia, & in femoris fracturis apte se habeat. Si enim dependeat
pes, reliqua tibia firmata, necesse est juxta anteriorem tibiae partem ossa incurva ef-
ficere. Si vero calcaneum quidem moderato altius fuerit firmatum, reliqua vero tibia al-
quantulum elevata, necesse est huic ossi, ut circa anteriorem tibiae partem moderato

eavius appareat; atque hoc adhuc magis, si calcaneum hominis natura fuerit magnum. Sed & omnia ossa tardius corroborantur, si non secundum naturam posita fuerint; itemque ea, quæ non in eadem figura quiescunt; & calli quoque debiliores ipsis obducuntur.

S E C T I O III.

- 1 **A**tque hæc quidem de his, quibus ossa quidem fracta sunt, non autem extra eminent, neque alias pilcus factum est. * Quibus vero ossa fracta sunt sum-
 2 pli modo, & non multiformi, ita ut eadem die repolita sint, aut posttride in sedem
 3 suam recepta, & nullus timor sit florum ossium discessionis; aut etiam quibus ulcus
 4 quidem factum est, ossa vero fracta non extra eminent, neque modus fracturæ talis est,
 5 ut sint segmenta a fissis ossibus separatata; tales spes est simplici modo curari pos-
 6 se. Et quidem sane neque magni quippiam boni, neque mali facientes, ulcera qui-
 7 dem curant aliquo purgatorio, aut picatum ceratum, ut emplastrum cruentis vulneri-
 8 bus idoneum, aut aliud quid ex his quæ facere solent, imponentes. Ego vero eorū lau-
 9 do, qui splenia vino imbuta, aut lanas succidas, aut aliud quid huiusmodi deli-
 10 gant. Ubi vero ulcera pura facta fuerint, & jam coalescunt, tunc multis linteis deli-
 11 gant, & serulis dirigere conantur. Hæc quidem curatio boni aliquid facit, nihil au-
 12 tem magni mali; ossa tamen non similiter in suam sedem firmari possunt, verum
 13 corpora aliquanto timidiora ea parte sunt, quam sit oportuna, sunt autem & bre-
 14 viora his, quibus utraque ossa aut cubiti, aut tibiæ fracta sunt. * Alii vero rursus sunt, 28
 15 qui talia statim linteis curant, & hinc atque illinc linteis deligant, ulcus vero ipsum
 16 relinquant, & perfrigerari sinunt; deinde super ulcus purgatorium aliquod impon-
 17 nunt, & spleniis vino imbutis, & lanis succidis curant. Hæc curatio mala est, &
 18 verisimile est eos, qui ita curant, tum in alijs fracturis, tum in huiusmodi maxime
 19 imprudenter se gerere. Maximum enim est cognoscere quomodo initium linteæ inji-
 20 cere oportet, & qua parte maxime comprimere; & quæ utilitas contingat, si quis
 21 injitium linteæ recte injiciat, & qua maxime oportet recte premat; & quæ detrimen-
 22 ta inducantur, si quis non recte injiciat, neque maxime oportet premat, sed hinc
 23 atque illinc id faciat, & dictum quidem est etiam in superioribus, quæ ex utroque eve-
 24 niant. Testatur autem & ipsa hæc medicina. Necessè est enim ei, qui ita deligatur, tu-
 25 morem ad ipsum pilcus elevari. Etenim si sanum corpus hinc atque illinc fuerit deli-
 26 gatum, in medio vero relictum, juxta relictum utique spatium maxime intumuerit, ac
 27 decoloratum reddetur, quo modo ulcus hæc non perpetuetur? Necessè igitur est, ut ul-
 28 cus quidem decoloratum sit, & labiis eversum ac protuberans, verum lachrymosum &
 29 non suppurans ossa vero, etiam quæ discessura non erant, discedant; sed & pulsans,
 30 & febrilis ulcus fuerit. Coguntur autem propter tumorem caraplastmata insuper im-
 31 ponere, quod & ipsum incommodum est his, qui hinc atque illinc deligantur. Pondus
 32 enim inutile ad reliquum pulsum accedit. Postremum vero deligamenta resolvunt,
 33 ubi jam malum ipsis recrudescit, & de cætero citra deligationem curant. Neque vero
 34 minus, etiam si aliud quoddam ejusmodi vulnus acceperint, eodem modo curant.
 35 Non enim deligationem hinc atque illinc factam, & ulceris perfrigerationem in causâ
 36 esse putant, sed aliud quoddam infortium. Attamen de hoc tam multa non scrip-
 37 sisse, si non certo scirem incommodam esse hanc deligationem, & multos esse
 38 qui ita eurent, & magni momenti esse hanc rem dediscere, & testimonio hæc esse,
 39 quod recte scripta sint ea quæ prius scripta sunt, sive maxime præmendæ sint,
 40 futuri discessus ossis expectatio, eandem curationem adhibere, veluti his quibus
 41 os fractum fuerit, ulcus autem non habent. Nam & extensiones, & directiones, ac
 42 coarctationes ossium eodem modo facere oportet, & consimilem deligationem. Super
 43 ipsum enim ulcus splenium tenue duplex, picato cerato illitum, deligandum est, & cir-
 44 cumscriptæ partes cerato albo illinendæ. Verum linteæ, & reliqua latiora aliquantum
 45 fissa sint magis, quam si non ulcus haberent; & id, quo primum deligamus, multo la-
 46 tius sit ipsa ulcere. Quæ enim angustiora sunt quam ulcus, circumdatus ulcus tenent, id
 47 quod fieri non convenit, sed prima circumductio totum ulcus comprehendat, & linteum
 48 hinc atque illinc præmineat. Itaque secundum ulceris rectitudinem linteum injicere oportet,
 49 & premere paullo minus, quam si ulcus non haberent. Distribuenda vero est deliga-
 50 tio, velut etiam prius dictum est. Linteæ autem semper quidem molles modi sint, magis
 51 tamen in talibus, quam si ulcus non esset. Copia vero linteorum non minor sit prius
 52 relatis, sed etiam aliquanto amplior. Si vero deligatus fuerit, videatur si sibi linteæ
 53 firmata quidem esse, non autem compressa, dicaturque super ulcus maxime firmata esse.
 54 Eadem autem tempora esse oportet, ad hoc ut magis firmata esse videantur, & ad hoc
 55 ut magis laxa videantur, quemadmodum etiam in superioribus dictum est. Deligatio
 56 etiam postea faciendâ per trientem diem, ita ut omnia postea sciamus consimili mo-
 57 do, velut prius dictum est, præterquam quod in totum minus aliquanto hæc, quam illa
 58 comprehendenda sunt. Quod si secundum rationem, quæ fieri par est, facta fuerint, gra-
 59 ciliior quidem semper comperietur ulceris pars, graciliores autem & reliquæ omnes, quæ
 60 a deligatione continentur; & suppurationes citiores erunt, quam in ulceribus aliter cu-
 61 ratis; & quæcumque caruncule in vulnere denigratæ sunt, & mortificatæ, citius ab-
 62 rum-

rumpuntur ac excidunt in hac curatione, quam in aliis; & ad cicatricem citius pervenit ulcus, si hoc modo, quam si alio curetur. At omnium horum causa est, quod & locus
 circa ulcus gracilis sit, & quæ circumfusa sunt, gracilia omnia sunt. In reliquis igitur om-
 nibus consimiliter curare oportet, velut ossa sine ulcerationibus fracta. Verum fe-
 rilas apponere non oportet. Er propterea lineæ his plura esse debent, quam alius, &
 quod minus comprimantur, & quod ferulæ tardius apponantur. Si tamen ferulas
 apposueris, non secundum rectitudinem ulceris appones, sed ita ut laxæ adhibean-
 tur, providendo ut nulla magna ab ipsis restrictio fiat. Dicitur autem hoc quoque est
 in his, quæ prius scripta sunt. Vicius autem rationes exquisitiores, & longiori tem-
 pore constituere oportet his, quibus ab initio ulcera sunt, & quibus ossa extra emi-
 nent; & ut in summa dicatur, in vehementissimis vulneribus exquisitiores, eoque diu-
 turniore victu uti convenit. * Eadem etiam curatio ulcerum est, in quibus ossa quidem
 fracta sunt, sed ulcus ab initio non fuit, verum inest medendum factum est, aut ulcere
 lineis magis compressis, aut a ferularum infessis, aut ab alia quapiam causa. Cognito-
 scuntur autem tales fracturæ, an ulcus subsit, & dolore, & pulsibus, & tumor qui in
 extremis partibus est, talibus durus efficitur, & si digitum admoventis, artollitur,
 sed & cito rursus subterfugit. Si igitur tale quid suspicatus fuerit, solvere oportet
 & si quidem prout circa subligationes fuerit, aut alia quapiam parte deligata,
 cerato picato pro altero uti. Si vero horum nihil fuerit, verum ipsum ulcus irritatum,
 reperitur nigrum valde aut impurum, & sursum est, ut & carnes suppurentur, & ner-
 vi misere excidant: hos omnino perfringere non oportet, neque quicquam has suppu-
 rationes vereri, sed curare in reliquis omnibus consimili modo, velut eos quibus
 ab initio ulcus factum est. Lineis vero deligare incipere oportet valde laxa a tu-
 more, qui in extremis partibus consistit, æque ira deligationem distribuere semper
 sursum versus, misquam quidem comprimendo, sed maxime super ulcus firmando, su-
 per alia vero minus: & prima quidem lineæ hæc munda sunt, & non angusta. Copia
 vero lineæ tantæ sit, quanta est si cum ferulis deligatio fiat, aut paullo minor. Super
 ipsum autem ulcus sufficiens est splenium cerato albo illitum. Sive enim caro, sive
 nervus denigratus fuerit, excidit. Talia enim acerbis curare non oportet, sed molli-
 bus, velut ambusta. Deligare vero postea per tertium diem convenit, ferulas autem
 non apponere. Quiescere vero magisquam prius, & modico cibo uti. Scire vero ex-
 pedit, sive caro, sive nervus sit, id quod excidit, quod hoc modo multo minus ultra
 depascitur, & multo citius excidit, & multo gravioribus circumfusa partes erunt, quam
 si quis exolutis lineis, aliquid medicamentorum purgationum super ulcus impos-
 nat. Quia & si exciderit id quod suppurasset, & citius carne replent, & citius ad
 cicatricem pervenit, quam si illo aut alio modo curetur. Omnia sane in hoc fita sunt,
 ut quis hæc recte & moderate deligare sciat. Conferunt insuper & figuræ, quales esse
 oportet, & reliqua vix raro, & lineæ aprudo. Si vero in recens vulneris
 decipiaris, ossum discessum non fore putans, quum tamen expectatio sit illa emer-
 ra esse, modum curationis timere non oportet. Nihil enim magni mali contigerit,
 si modo bonas, ac innoxias deligationes manu facere noveris. Signum autem hoc
 est, si ossum discessum in hoc curationis modo siturus est. Pus enim multum fuit
 ex ulcere, & gliscere, ac turgere affecta pars videtur. Frequenter igitur deligare o-
 portet ob nimiam humiditatem, & quod alias etiam febres sunt. Et si quidem valde
 premantur a deligatione, & ulcus, & circumfusa partes graciles sunt. * Quicumque
 itaque valde tenuium ossum discessum sunt, hi nulla magna mutatione opus habent,
 nisi ut laxius deligatio fiat, ut ne pus intercipiatur, sed facile effluere possit. Sed &
 frequenter deligare oportet, donec os discesserit, & ferulas non apponere. Qui-
 bus vero majoris ossis discessus expectatur, sive hoc a principio prænoveris, si-
 ve etiam postea cognoveris, non amplius eadem curatione opus habet. Sed extentiones,
 & directiones ita facere oportet, velut dictum est; splenia vero duplicata, lati-
 tudine quidem dimidio palmo non minora: quale tamen fuerit vulnus, iuxta hoc
 conjectura facienda est: longitudine vero paullo quidem breviora, quam ut his citum
 lauciatur corpus circumduci possint, multo vero longiora, quam ut semel. Copia vero
 tot sint, quot facere conducit. Hæc in vino nigro austero madefacta, ex medio initio
 facto, circumvolvare oportet, quemadmodum fasciæ ex duobus initiis deligantur, &
 deinde alicuius alteratione ipsorum facta, initia dimittere. Hæc & super ipsum
 ulcus adhibenda sunt, & ab utraque ulceris parte, & ne comprimantur, sed saltem sul-
 ciendi ulceris gratia incumbant. Supra ipsum vero ulcus ceratum picatum imponere
 oportet, aut aliquod ex emplastris cruentis vulneribus destinatis, aut aliud
 quoddam medicamentum, quod familiare, ac idoneum sit humectationi adhibende.
 Er si quidem assatis tempus fuerit, vino madefacere splenia frequenter oportet; si ve-
 ro hyenis, lanas fidecas multas vino & oleo imbutas adhibito. Oportet autem
 capræ pellem sustinere, & defluxiones observare, ut facile effluere possint, ita
 ut meminerimus quod hi loci in iisdem figuris multo tempore permanentes, intertri-
 gines curatu difficiles faciunt. * Qui vero deligatione sanari per aliquem ex relatis,
 aut referendis modis non possunt, eos magnam huc curam adhibere convenit, ut fra-
 ctam corporis partem commodè positam habeant secundum rectitudinem, animadver-
 sione ad hoc habita, ut sursum magis, quam deorsum vergat. Si vero quis bene ac faci-

- le opus perficere velit, operæ pretium est etiam machinamenta facere, quo iustam & non violentiam extensionem pars corporis fracta habeat. Maxime vero in tibia machinamenta adhibere expedit. Sunt igitur aliqui, qui in omnibus tibiæ fracturis, & quæ deligantur, & quæ non deligantur, pedem summum ad lectum alligant, aut ad aliud quoddam lignum iuxta lectum defossum. Hi itaque omnia mala faciunt, nihil autem boni. Neque enim ullam opem afferit extensioni hæc pedis alligatio. Nihil enim minus ad pedem concedet reliquum corpus, atque sic non amplius extenditur.
- 140 Neque rursus ad rectitudinem quicquam prodest, sed etiam obest. Dum enim vertitur reliquum corpus aut hac, aut illac, nihil prohibebit vinculum illud, quo minus & pes, & ossa pedi annexa reliquum corpus sequantur. Imo si pes alligatus non fuisset, minus distorqueretur. Si vero quis pilas duas ex corio *Ægyptico* consuat, tales quales gestant hi qui multo tempore in magnis compedibus vincti sunt; habeantur autem pilæ hinc atque illinc tunicas, ad vulneris quidem partes, profundiores, ad articulorum vero partes, breviores; sint item tumide, ac molles, & congruentes ad hoc, ut altera supra malleolos, altera infra genu coarctetur. Habeat insuper utraque duas utrinque appendices a latere aut ex simplici, aut ex duplici loro breviores velut ansas, ita ut altera sint ab utraque malleoli, altera ab utraque genu parte; & superna pila alteras habeat secundum eandem rectitudinem. Postea virgis corneis acceptis, æqualem inter se magnitudinem habentibus, crassitudinē quidem digitali, longitudine vero ut flexæ appendicibus congruant, huc diligentiam adhibeas, ut extreme virgarum partes non ad corpus, sed ad summas pilarum eminentias innitantur. Oportet autem tria esse virgarum paria, aut etiam plura, & alias aliis
- 145 aliquanto longiores, & aliquanto breviores ac minores, ut si velis magis distendere possis. Locentur autem virgæ utraque hinc atque illinc a malleorum utraque parte. Hæc itaque si bene machinatus fueris, & extensionem iustam exhibuerint, & secundum rectitudinem æqualem, & vulneri nullus dolor accesserit. Nam quæ expressa fuerint, si quid tamen exprimitur, partim ad pedem abducentur, partim ad femur; & virgæ
- 160 hinc atque illinc a malleolis accommodatiores erunt, ut tibiæ posito non impediatur, & vulnus probe impingat, ac sustentetur. Neque enim impedimento est, si quis velit duas virgas superiores ipsas inter se conjungere, & si quis leviter quid superimponere velit, ut id quod superimponitur, a vulnere elevatum sit. Si quidem igitur & pilæ lenes, & molles, & bonæ, & recenter consutæ fuerint, & virgarum intentio probe intenta fuerit, velut iam dictum est, commodum erit machinamentum. Si vero quid horum non recte habuerit, laesit magisquam profuerit. Convenit autem & alias machinas aut bene machinari, aut non machinari. Turpe enim est & minime artificiosum, in machinis struendis a machinis aberrare. * Plerique porro medici fracturas, & cum ulceribus, & sine ulceribus, primis diebus lanis fuceidis curant, & nihil ab
- 170 arte alienum ipsis hoc esse videtur, & qui quidem a recens vulneratis eoguntur, ex linctorum inopia lanis uti, his plurimum veniæ locus patet. Non enim habuerit qui in linctorum penuria aliud quid multo melius ad tales deligandas, quam est lana. Verum omnino multa lanæ esse debent, & valde bene carminatæ, & non asperæ. Nam paucarum & malarum vires etiam modice sunt. Qui vero ad unum, aut duos dies lanis deligare iustum esse sentit, tertia vero ac quarta lintheis deligantes premunt, ac extendunt tunc vel maxime, hi in re multi adeo, ac magni in medicina momenti se imprudenter gerunt. Minime enim tertia, ac quarta die omnia vulnera movere oportet, & ut in summa dicam, etiam omnes specillorum admotiones vitare convenit in his diebus, & alia quoque quibus vulnera irriantur. In totum enim tertia, ac quarta dies in plerisque vulneribus rectudescencias pariunt, & quæ ad inflammationem ac immunditiam procedunt, & quæ ad febres deveniunt. Et hæcres multi momenti est ut discatur, ut si qua alia. Cum qua enim ex utilissimis in medicina rebus non solum circa vulnera, verum etiam circa alios multos morbos communionem non habet? nisi quis etiam alios morbos ulcera esse dixerit. Habet enim & hic sermo aliquam verisimilitudinem. Multis enim modis alii aliis cognati sunt. * Quicumque tamen iustum esse putant lanis uti, donec septem præterierint dies, deinde vero extendere, ac dirigere, & lintheis deligare, hi non similiter imprudentes videri poterint. * Nam & maximum inflammationis periculum præterit, & ossa laxa, ac
- 180 apud post hos dies sunt. Longe tamen & hæc curatio superatur ab ea deligatione, quæ ab initio lintheis fit. Ille enim modus præparat, ac efficit ut septima die ferulis perfecte deligari possint. Hinc autem modus multo tardior est. Sed & alia quædam detrimenta habet. Verum longum esset omnia scribere. Quibus vero ossa fracta & extra eminentiam in suam sedem collocari non possunt, his hæc restitutio debetur. Ferramenta facere oportet ad eum modum, quem vestes habent illi quibus lapideam
- 190 utuntur, alia latiora, alia angustiora. Esse vero convenit etiam, aut plura etiam, quorum quis maxime congruus utatur. Postea cum his una cum extensione motionem aggredi oportet, ita ut ad inferiorem ossis partem subiciatis, ad superiorem vero partem ossis superiorem ferramenti partem innitendo firmes; in summa, quemadmodum si quis lapidem aut lignum vehementer veste commoveat. Sint autem valida ferramenta quantum eis fieri potest, ut ne flectantur. Hoc magnum auxilium est, si & ferramenta idonea fuerint, & si quis velut convenit commotionem faciat. Nam ex omnibus instrumentis

struementis, quæ homines machinati sunt, fortissima hæc tria existunt, aselli circumductio, per vectes commotio, & cuneorum usus. At sine horum uno aliquo, aut sine omnibus, nullum vehementissimum opus homines perficiunt. Non igitur spernenda est hæc per ferreos illos vectes commotio, aut enim hoc modo, aut nullo alio in sedem suam collabentur. Si vero superna ossis pars immutata fuerit, ac contracta, ut vecti adhibendus locus non sit commodus, sed acutum quid prominet, tunc osse scalpendo deraso, securam vecti sedem facere oportet. Hanc autem per vectes commotionem, & extensionem eadem die, aut secunda facere oportet. Non autem tertia. Minime vero quarta, aut quinta. Nam etiam si non reponas, sed alias molestiam exhibeas in his diebus, inflammationem induxeris: quanto magis si reponas? Convulsionem tamen multo magis induxeris si reponas, quam si reponere omittas. Atque hæc probe nosse convenit. Si enim reponenti convulsio accesserit, non multa salutis spes est. Commodum autem est rursus ejicere os a sua sede, si hoc fieri citra molestiam possit. Non enim in laxioribus, quam oportum est, convulsiones, ac distentiones accedunt, sed in his quæ magis extensa sunt. Cæterum de qua re nunc nobis sermo est, in prædictis illis diebus molestiam exhibere non oportet, & curam adhibere, ut ulcus minime inflammetur, & maxime suppuretur. Postquam vero septem præterierint dies, aut paulo plures, si sine febre fuerit, & ulcus non inflammatum sit, tunc minus vetat ut reponere tentes, si spes obtinendum te esse, sin minus, non oportet frustra molestiam suscipere, & inferre. Si igitur ossa reposueris in suam sedem, jam scripti sunt modi quomodo curare oportet, si ossa discessura esse, si non, expectatio sit; & si quidem ossium discessus expectatio sit, eo quem dixi modo cum linteis, in omnibus talibus deligationem facere oportet, ex medio linteo initio facto utplurimum, velut ex duobus initiis fascia deligatur. Conjecturam autem facere oportet juxta ulceris formam, quo sit quammimum hians, ac labii protuberans, & expansum. Aliis enim ad dextram deligare commodum est, aliis ad sinistram, aliis ex duobus initiis. Quæcumque vero ossa reposicionem effugerint, ea discessura esse, nosse oportet, itemque ea, quæ carnis penitus nudata sunt. Nudatur autem quorundam superna pars, quorundam vero carnes circumcirca mortificantur. Ex quibusdam quidem ex veteri vulnere aliqua ossa emarcuerunt, quibusdam vero non; & aliquibus magis, aliquibus minus, & partim parva, partim magna. Propter hæc igitur relata, uno verbo dici non potest, quando ossa sint discessura. Aliqua enim ob parvitatem, aliqua ex eo quod in summa parte existunt, citius discedunt: aliqua ex eo quod non discedunt, reficata & marida sentia desquamantur. Præterea differt curatio a curatione. In totum igitur ossa citissime his discedunt, quibus citissime sunt suppurationes, & citissime, ac optimæ carnis productiones. Subnascentes enim juxta læsam partem carnes plerumque ossa ipsa elevare. Totus tamen ossis circulus, si in quadraginta diebus discesserit, bene discedet. Quædam enim ad sexaginta dies perveniunt. Nam & rariora ossa citius discedunt, solidiora vero tardius. Alia autem minora; multo minore temporis spatio, alia alter. Cæterum os extra eminentis hie de causis præsecare oportet, si reponi non possit, & parum absit ut reponi posse videatur, & fieri poterit ut auferatur, & si noxium fuerit, & de carnis quid rumpat, & sensus molestiam exhibeat. Sed & si nudum fuerit, tale auferere oportet. Reliqua si præseces, si non præseces, non muleum refert. Hoc enim certo scire expedit, quod ossa, quæ carnis perfecte privantur, ac exarescunt, omnia penitus discedent. A quibus vero squamæ discessuræ sunt, ea præsecare non oportet. Conjecturam vero eorum, quæ discedent, ex constitutis signis facere oportet. Curare autem tales splenis & vinosa curatione, velut etiam splenis de discessuris ossibus scriptum est. Sed cavere decet, ne primo tempore frigidis madefiant. Rigorum enim febrilium periculum est. Periculum item convulsionum. Frigida enim semper convulsionem provocant, quandoque vero etiam ulcera. Nosse quoque id convenit, necesse esse ibi corpora breviora fieri, ubi ossa fracta ac immutata curantur, & quibus totus ossis circulus discessit. Ut vero quibus femoris aut brachii os extra eminet, hi non valde superstities evadunt. Nam & ossa magna sunt, & multum medullæ habent, & quæ simul vulnerantur, multa sunt & magni momenti, & nervi, & muscoli, & venæ. Et si quidem reposueris, convulsiones accedere solent. Si vero non reposita fuerint, febres acutæ, & biliosæ, & singulose oboriuntur, & demigrantur. Non minus autem superstities evadunt hi, quibus reposita non sunt, neque tentatum est, ut reponerentur. Adhuc vero magis evadunt, quibus inferna ossis pars eminet extra, quam quibus superna. Evadunt etiam quibus reposita fuerint, attamen raro. Nam & curationes a curationibus multum differunt, & naturæ corporum a naturis, ad facile tolerandum. Multum etiam differt an in interna brachii, ac femoris parte ossa extra promineant. Multæ enim & periculose venarum extensiones in interna parte sunt, quarum aliquæ si vulnerentur, lethales sunt. Sunt autem & in externa parte, verum minus. In talibus igitur vulneribus, qualia pericula immineant, ignorare non oportet, & ad temporum occasiones prædicere. Si vero reponere hæc ossa cogaris, & reponendi aliqua tibi spes sit, & non multo ossis immutatio fuerit, & musculi non concurrerint: solent enim concurrere iunctis molitio etiam his cum extensione opem bene ferre poterit. Ubi vero reponis, vitæ raturum molle bibendum dare oportet eadem die, si eadem die reposita fuerint, sin minus,

- nus, ne aggredi quidem oportet. Verum ulcus curare oportet velut in capitis ossibus fractis, & frigidis nihil adhibere, & cibos penitus auferre; & si quidem amara bile prædicta natura fuerit, favorem cremorem odoratum coctum, aut acetum multum dulce in aquam instillato, eoque pro victu utatur. Si vero amara bile prædicta non sit, aquæ porione utatur. Et si quidem continua febre laborarit, ad quatuordecim dies ut minimum hoc victu degat, Si vero sine febre sit, septem diebus. Postea sensim progressu fiente, secundum rationem ad vulgarem victum adducatur. Et quibus ossa non reposita fuerint, eandem item medicamentis purgationem facere oportet, & ulcerum curationem, eundem item exhibere victum, & dependentem de corpore partem non extendere, sed magis adducere, quo laxior sit pars circa ulcus. At ossium discessus diuturnus est, velut etiam prius dictum est; maxime vero talia fugere oportet, si modo quis honestam spem habeat. Nam & spes paucæ sunt, & pericula multa; & si quis non reponat, artis expers esse videri poterit; & si reponat, propinquius ad mortem, quod ad salutem perduxerit. * Cæterum luxationes, & emotiones ossium circa genua multo 40
 285 minores sunt emotionibus, ac luxationibus circa cubiti flexuram. Nam femoris articulus pro magnitudine expeditior est quam brachii, & iustam naturam solum habet, eamque rotundam. Brachii vero articulus & magnus est, & sinus plures habet. Ad hæc vero, tibie ossa longitudine inter se similia sunt, & externum os paululum ne memorabili quidem modo excedit, nullum magnum impedimentum asserens, a quo externum tendo circa popliteum nascitur. At cubiti ossa inæqualia sunt, & quod brevis est, multo crassius est, quod vero tenuius est, multum superat & excedit articulum. Dependet tamen & hoc ex nervis, juxta communem ossium connexionem. Majorem itaque partem connexionis nervorum in brachio os tenue habet, quam crassum. Horum itaque 41
 290 articulum, & ossium flexuræ cubiti natura hujusmodi est. * Et propter naturæ modum ossa circa genu sæpe quidem luxantur, facile autem rursus incidunt, ac reponuntur. Inflammatio vero non magna accedit, neque vinculum articuli. Luxantur autem plerumque in internam partem, aliquando etiam ad externam, quandoque etiam ad popliteum. Horum omnium repositiones non sunt difficiles. Verum si quidem foras, aut intro luxentur, hominem in humili aliquo sedili sedere oportet, ita ut crus altius, non tamen multo habeat. Extensio autem plerumque moderata sufficit, ita ut ab altera parte tibias, ab altera semur in diversum extendatur. At ossa circa cubiti flexuram molestiora sunt, quamque circa genu sunt, & difficilius reponi possunt, etiam ob inflammationem, si quis non statim reponat. Luxantur quidem manus quam illa, verum difficilius reponuntur ac coaptantur, insuperque inflammantur, ac calthum acquirunt. Sunt autem & horum plerumque parvæ inclinationes, aliquando ad partem ad costas, aliquando ad externam, non ut totus articulus sit 42
 300 motus, sed manet quid juxta ossis brachii cavitatem, qua parte cubiti os excedens habet. Talia igitur, si hæc, si illæ luxentur, facile est reponere; & sufficit extensio in directum fiens secundum brachii rectitudinem, ita ut alter juxta manus juncturam extendat, alter locum sub alis amplectatur. Medicus vero altera manu ad emoritur articulum admota, volis impellat; altera prope ad articulum injecta retrudat. Obediunt autem tales luxationes, & non tarde reponuntur, si quis antea quam inflammantur reponat. Luxantur autem plerumque magis ad internam partem, luxantur etiam ad externam. Innotescit id ex figura: & talia sæpe etiam absque vehementi tensione rursus incidunt. Oportet autem in his quæ intro luxantur, articulum quidem ad naturam suam repellere, cubitum vero magis in 43
 315 pronam partem vergentem circumducere. Et plerumque sane cubiti luxationes hujusmodi sunt. * Si vero transgressus fuerit articulus, aut hæc, aut illæ, supra cubiti os, quod ad brachii cavitatem excedit: sit quidem raro hoc: si vero fiat, non amplius similiter extensio in directum fiens, talibus luxationibus idonea est. In tali enim extensione, os a cubito excedens, brachii transgressionem prohibet. Oportet itaque sic emotis extensionem talem facere, qualis prius descripta est, ubique ossa brachii fracta deligat, ut ab alia quidem in supernam partem tensio fiat, ab ipsa vero cubiti flexura ad infernam cogatur. Sic enim brachium supra suum sinum maxime elevabitur. Si vero elevatum fuerit, facilis est restitutio cum volis manuum, ita ut emoritur quidem brachii partem apprehendentes impellamus, os vero cubiti juxta articulum retrudamus, utraque eodem modo, minus tamen. Aquæ talis extensio hujusmodi luxationis iustissima est. Poterit etiam reponi per extensionem in directum, verum minus quam hoc modo. * At si in anteriorem partem brachium luxetur: rarissime autem hoc contingit. Sed 44
 320 quid repentina eluctatio non eiecerit? Multa enim etiam præter naturam suam excidunt, etiam magnum quid sit quod prohibeat. Huic autem eluctationi magnum quoddam obstatulum est, & os crassius quod superexcedit, & multa nervorum extensio; at tamen quidam sane eluctantur. Signum autem his qui ita eluctati sunt. Nihil enim de cubito flectere possunt. Manifestus est etiam articulus ad contactum. Si quidem igitur non statim repositus fuerit, vehementes ac violentæ inflammationes, tremque febriles fiunt. Si vero statim quis occurrat, facile reponi potest. Oportet autem linteum durum 45
 325 convolutum (suffecerit non magnum) imponere obliquum in cubiti flexuram, & derepente cubitum inflectere, & manum quammaxime ad humerum adducere. Sufficiens igitur hæc repositio his, qui ita eluctati sunt. Sed & extensio in directum, hinc repositionis modum coaptare potest, volis tamen manus in eminentem brachii partem injectis, juxta flexuram retro impellere oportet, ita ut aliquis inferne videm in cu-

in cubiti gibbum injectis, ad cubiti rectitudinem retrudat. Efficax est etiam in hoc
luxationis modo illa extensio, quæ prius scripta est, quomodo ossa brachii fracta
extendere oportet, ubi sunt deliganda. Postquam vero extensa fuerint, sic cum manuum
volis injectis coarperationes facere, velut etiam prius scriptum est. * Caterum si in po-
steriorem partem brachium exciderit, raro autem hoc contingit, hæc luxatio omnium
maxime dolorosa existit, & febres continuas meracæ bilis paucorum dierum, ac ma-
ximè lethales inducit; & tales extendere brachium non possunt. Si igitur statim
attueris, extenso cubiti gibbo cogere oportet, & sponte incidit. Si vero febris præ-
venierit, non amplius reponere oportet; dolor enim in cogendo augetur. Ut autem
in summa dicam, neque aliam articulum febrienti reponere oportet, minime vero cu-
biti gibbum. Sunt autem & aliæ læsiones, ac molestiæ circa cubiti gibbum. Hoc enim
os crassius, si quando ab altero emotum est, neque flecti, neque extendi similiter po-
test. Manifestum autem sit ex contactu, iuxta cubiti flexuram, circa venæ discissio-
nem supra musculum tendentem. Quibus autem tale accidit, his non amplius facile est
ad suam naturam reducere. Neque enim aliam ullam communem duorum ossium con-
nexionem memoram ad pristinam naturam collocare, facile est; sed necesse est tumorem habe-
re ipsam disipationem. Quomodo vero deligare oportet in articulo, dictum est in deliga-
tione circa malleolum. * Quibusdam autem os cubiti brachio subiectum frangitur,
quandoque quidem chartilaginosa ipsius pars, ex qua tendo retro brachium enascitur,
& ubi hæc emotæ fuerit, sebrile est ac malignum. Articulus tamen manet in suo lo-
co; aequaliter enim basis ipsius hæc parte excedit. Quum autem abductus fuerit ex
parte qua caput brachii excidit, vagabundus magis sit articulus, quam si penitus sit
abruptus. Nam ut in summa dicam, omnia ossa quæ franguntur, minus noxia sunt,
quam si ossa quidem non frangantur, venæ autem & nervi alicuius momenti in his lo-
cis contendantur. Vicinius enim ad mortem accedunt hæc quam illa, si febris continua
accesserit. Paucæ tamen tales fracturæ sunt. Quandoque vero hoc brachii caput iux-
ta appendicem frangitur, atque hoc quum videatur multo magis noxium esse,
longe mitius noxis circa cubiti gibbum contingentibus existit. * Quomodo
igitur singulas luxationes reponere, & præsertim curare oportet, scriptum est;
& quod statim reponere articulum maxime confert, propter celeritatem inflam-
mationis nervorum. Nam etiamsi elapsa statim reposta fuerint, similiter ta-
men nervi distensionem facere solent, & ad tempus aliquod tum extensionem, quam
facere solent, tum inflexionem impedire. Confert autem omnia hæc similiter curare,
& quæ franguntur, & quæ disparentur, & quæ luxantur. Omnia enim multis lin-
teis, & splenis, & cerato curare oportet, velut etiam alias fracturas. At figuram cu-
biti gibbi in his etiam omnino talem facere oportet, qualem in his quibus brachium
fractum, & cubiti deligabatur. Communissima enim omnibus luxationibus, & e-
motionibus, & fracturis hæc figura est. Communissima item ad distensionem postea
faciendam, & ad singula extendenda, ac inflectenda. Hinc enim viæ sunt ad utrasque
partes consimiles. Commodissima est etiam hæc figura ipsi agroco, ut ipsum & ge-
ster, & appensum excipiat. His adde, si a callo apprehensus fuerit, si quidem extensa
manus apprehendatur, melius fuerit, si non adit, multis enim impedimento erit,
paucis adiumento. Si vero inflexa, magis quidem comoda fuerit. Verum longe com-
modior, si mediam figuram obtinens callo apprehendatur, & hæc quidem de figura.
Deligare vero oportet, primum lintei initio super ipsam læsam partem injecto, si-
ve fracta fuerit, sive emotæ, sive disparatæ, primas etiam obvolutiones super ipsam fa-
cere, ita ut maxime hac parte innitantur, minus vero hinc atque illinc. Deligatio-
nem autem communem facere oportet & cubiti, & brachii, utriusque multo plus
quam perique faciunt, quo quamtemotissime a læsa parte tumor hinc atque illinc expri-
marur. Circumdetur insuper etiam acuta cubiti pars, sive læsio in hac fuerit, sive non,
ut ne tumor ibi circa ipsam colligatur. Fugendum vero est in deligatione, quan-
tum eius fieri potest, ut ne circa flexuram multa lineæ coarctata sint. Compressio
autem quammaxime circa læsam partem faciendæ est. Sed & reliqua compressio, ac la-
xatio eadem adhibeatur, & iisdem temporibus singula, quemadmodum in ossium
fracturum curatione antea scriptum est. Et religationes postea per diem tertium fiant.
Videatur autem laxa esse deligatio tertia die, velut etiam tunc. Et serulæ conveniente
tempore adhibeantur. Neque enim alienum hoc est, & in his quibus ossa fracta, &
quibus non fracta sunt, si non feberant. Sint autem quam laxissimæ partim a brachio
extente, partim ad cubitum posite; & non sint crassæ. Necesse est etiam inaequales
ipsas esse inter se, ut vicissim permittentur qua parte conducit, coniectura iuxta inflexi-
onem facta. Quin & spleniorum appositionem eiusmodi facere oportet, velut de fe-
culis dictum est, ita tamen ut paulo tumidiora super læsam partem apponantur. Tem-
pora vero ab inflammatione, & ab his, quæ prius scripta sunt, coniectare oportet.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE ARTICULIS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 *Humeri articulus uno modo luxatur. Hippocratis sententia de humeri articulo contra ceteros medicos.*
- 2 *Humeri frequenter clausi repositio facilis, adeo ut quibus id accidit, plerumque ipsi sibi ipsos ad reponendum sint sufficientes.*
- 3 *Alius, atque alius humeri reponendi modus. Repositiones prescriptae in palaestris usitatae.*
- 4 *Repositionum omnium optima.*
- 5 *Luxationes recentiores citius reponuntur. Luxationes etiam inveteratas eo modo reponi possunt. Alius reponendi modus.*
- 6 *Etenim idem homini sit ab articulis, Luxationes, & repositiones quibus faciles, aut difficiles. Boves cur luxationi maxime obnoxii, Boves quo tempore sunt tenuissimi.*
- 7 *Boves cur brevem barbam depascere nequeant. Herbae brevescunt, meliores, ac solidiores sunt. Hoc quare potius magis, quam alia animalia, retrahat. Humeri quibus facile, aut difficile inflammantur.*
- 8 *Articuli ex carnis mollescentia, Atque cum inflammatione luxationes prohibet.*
- 9 *Nervorum inflammationum in articulis luxatio curatio. Medicis multarum rerum sit peritus. Frictio qualis huiusmodi humore conveniat.*
- 10 *Brachii luxati cognitio.*
- 11 *Humeri frequenter excidentis curatio. Humeri luxati alio.*
- 12 *Ustoria infirmorum. Glandula sub alis.*
- 13 *Figura iossa in omnibus artibus servanda. Ipsius nervus est inimicus.*
- 14 *Cautiones ex navitate, & casu.*
- 15 *Humeri summi avulsio, & eius curatio. Os cum altero comminutione habens, a naturali sede avulsum reponi nequit.*
- 16 *Clavicula duobus modis fracta. Ex clavicula fractura detrimentum nullum.*
- 17 *Delicatiore claviculae modus. Clavicula deligenda modi varii.*
- 18 *Claviculae quomodo plerumque frangatur.*
- 19 *Clavicula fracta quatuordecim diebus sanatur. Os quod a pectore est subdens, a summo autem humero superdensius. Clavicula in obliquum fracta, Ad pristinam naturam residens.*
- 20 *Luxationes brachium sursum coactione corrigit. Luxationes ex superius oblique ad latera, aut deorsum.*
- 21 *Cubiti gibbi luxati, aut emati.*
- 22 *Cubiti gibbi quibus recrescat. Disparationis osium signa.*
- 23 *Manus articulus luxatus. Manus tota luxata. Manus ex navitate sit brevior.*
- 24 *Digiti articulus luxatus, cognitio facilis. Maxilla luxatio. Atresendi manducatorii.*
- 25 *Maxilla superior motus experta, & cur non*

valde luxetur. Maxillam laxarivaro, laxari vero saepe.

- 26 *Maxilla luxata cognitio. Repositio.*
- 27 *Maxilla utriusque luxata curatio. Maxillam non repositam vix periculum sequitur. Maxilla inferna fracta, & eius curatio.*
- 28 *Maxilla os paulatim diffractum. Corium carthaginiense.*
- 29 *Maxilla confracta vixinti diebus corroboratur. Maxilla fracta deliquata ossa ad fracturam magis vergentia inclinat, quam ad naturam ducit.*
- 30 *Nasi fractura. Simi propter fracturam, eiusque curatio.*
- 31 *Nasus fractus, & deorsum & in sinum vergens. Deformitas omnibus detestabilis. Nasus ad infernam partem subsidens, decem diebus perferari possit.*
- 32 *Os in obliquum fractum quomodo curetur. Nasus inflammatus.*
- 33 *Ovillus pulmo naso iuxta cartilaginem fracto inditus quatenus serviat. Nasus in obliquum fractus.*
- 34 *Fractura cum ulceribus.*
- 35 *Auris fracta nullam admittit deliquationem.*
- 36 *Ganglia. Auris incisae curatio.*
- 37 *Verticula spinae in gibbum fracta. Varices quae gibbositates solvant. Gibbositas supra septum transversum. Spirandi difficultas interdum a gibbo. Pulmonis tubercula plerumque gibbosa.*
- 38 *Gibbositas infra septum transversum. Coxa gibbosorum infra septum transversum magis excarnes. Pubes, & harba tardior. Infundentes. Gibbositas aucta iam corpore. Verticula in latere obliqua.*
- 39 *Spina gibba ex casu. Atroci vulgo intervenientes. Extrinsecus gibbosorum in sculis, impostoribus patius, quam medicis sine in usu. Gibbositas prope cervicem.*
- 40 *Concessio per scalam in gibbis quomodo praeparanda.*
- 41 *Spinae dorsi cognitio in omnibus morbis multum, in gibbis vero plurimum momenti habet. Articularum verticula. Nervorum, & osium proventus. Costarum.*
- 42 *Pesice, genitura, & intestini rostri laxiora partu sunt.*
- 43 *Gibbositates iuxta verticulum non facile pelantur.*
- 44 *Reprehenduntur medici, qui putant verticula intro delapsa curari possunt. Penter homini omnium animalium agrestissimus.*
- 45 *Spinae obliquis multisaria. Gibbositates ex casibus.*
- 46 *Coarctati instrumenti fabrica.*
- 47 *Gibbi coactiones varia.*
- 48 *Experimentum coactionis gibbi per inflectum ac subiectum utrum. Experimenta, successum etiam coarctata, sunt cognoscenda. Verticula intro obliquis nullam haberi coactionem.*

- 49 Cucurbitas magnas in verticillorum intro obliquatorum attritione nullam vim habere.
- 50 Verticilla in repandum emota, esse lethalia; qua vero in gibbum, minime. Spine conculgio vehement.
- 51 Costarum fractura. Admodum ventris repletio, costarum sit directio. Costa viginti diebus corroboratur.
- 52 Carnis circa costas contusio. Eorum diata, & curatio.
- 53 Delitatio, ac curatio eorum quousque progressi debeat.
- 54 Carni circa costas contusa quando ulcio conveniat. Atrocitatis detrimentum.
- 55 Femoris articulus ex coxa elapsus.
- 56 Signa eorum, quibus femur intro excidit. Figura coram, quibus articulus elapsus, non fuerit repositus.
- 57 Femoris, & tibia, & pedis decurtatio ex articulo non reposito. Emendatio partium corporis unde contingat.
- 58 Scipione quare nonnulli atantur. Effeminatorem que partes magis patientur. Amazoni infantes musculos eluxant.
- 59 Luxatio extra, & intro. Luxatio ad mallosum, Officium coactio.
- 60 Luxationum circa coxas ratio. Galeonem.
- 61 Cur cubiti, & manus non eiusdem cum coxa luxata calamitatis sunt participes. Admemoramus carnositatis labor prodest.
- 62 Coxa ad internam partem eluxata a nativitate, aut adhuc infanti. Femoris caput in anteriorem partem elapsum.
- 63 Crus totum quando brevius appareat. Crus laesum luxationi minus obnoxium.
- 64 Cruris luxatio in ventre, vel aulione.
- 65 Crurum amorum articuli partem statim a nativitate, partem pro morbo elapsi. Femoris caput in posteriorem partem elapsum.
- 66 Articulus qui est ad popliteum, sine illo qui est ad inguen, in sanis etiam extendi neque. Femoris in posteriorem partem elapsi signa.
- 67 Femur non repositum.
- 68 Carum immutatiores iis, quibus femur non est repositum. Incorabilis etiam morborum tractationem esse necessariam.
- 69 Articulus femoris ex nativitate, aut dum corpus auferat, elapsus. Partes corporis exercitata auferunt & sane sunt, non exercitata, contra.
- 70 Femoris caput in anteriorem partem elapsum.
- 71 Articularum magna inter se differentia.
- 72 Atodi mutilationis plures.
- 73 Calcaneus plumbens. Arthra latigrida quid. Creticus calcamentorum modus.
- 74 Articuli circa pedem eminentes, tibia offibus luxatis, ac ulcere indulto. Curatio.
- 75 Betarum, ac beebii folia quibus ulceribus conveniant.
- 76 Cubiti ossa circa manus articulum cum ulcere. Os tibia circa genu cum ulcere emittens.
- 77 Os femoris ad genu cum ulcere. Articuli circa gibbum cubiti. Quorum articularum repositio sit lethalis.
- 78 Digitorum, aut pedis, aut manus articuli luxati cum ulcere repositio, asque ratio. Bupthalmi folia quibus ulceribus servantur. Quando reponendi articuli. Resecata penitus circa articulos digitorum.
- 79 Ossa iuxta digitos fracta. Offium reselliones plerumque innoxia.
- 80 Corruptiones carniarum, Denigrationes, offibus adhuc sanis.
- 81 Femoris ulcus abscessio. Tibia, Curatio.
- 82 Femoris circa coxam luxatio, Repositio.
- 83 Naturam in hominibus magna differentia.
- 84 Ligni ad offium luxationum repositionem descriptio.
- 85 Repositio per vellea commodissima.
- 86 Femoris caput ad externam partem luxatum.
- 87 Femur in posteriorem partem luxatum.
- 88 Articularum per atrum repositio. Femorum natura.
- 89 Utro quomodo utendum.
- 90 Alia femoris articuli repositio. Alius repositionis modus. Articuli ante repositionem premollendi. Attenuatio articularum repositionem precedat.
- 91 Digitorum articuli luxati, Repositionis modus.
- 92 Sassa, viminea textura ad repositionem. Articulus digiti quod diebus restituitur. Attenuatio circa articularum repositionem quousque progressi debeat.
- 93 Genu propter expeditam, ac facilem naturam minus est, quam cubiti gibbum.
- 94 Articularum circa mallosum luxatio. Pedum articuli quomodo reponendi. Calcanei contusio.
- 95 Calcaneum denigratum, & eius curatio.
- 96 Pedis luxatio.

S E C T I O I.



HUMERI vero articulum uno modo luxari novi, ad locum sub alis, & sursum autem nunquam, neque ad externam partem. Non tamen affirmaverim an lixeretur, aut non, etiam si habeam quod dicam de ipso. Sed neque in anteriorem partem nunquam vidi, neque videntur mihi unquam excidisse, Medicis tamen videtur valde in anteriorem partem luxari, & maxime decipiuntur in his, quorum carnes tabes circa articulum & brachium occupavit. Apparet enim in talibus caput brachii omnino in anteriorem partem eminens. Arque ego tale aliquando non excidisse asserens, ob hanc rem apud medicos & vulgus male audivi. Solus enim ipsis ignorare videbar, alii vero omnes cognoscere. Nec potui ipsis persuadere, nisi admodum difficile, rem ita se habere. Si quis in brachio supernam humeri partem carnis denudarit, denudarit autem qua parte musculus sursum tendit, nudarit item tendinem, qui sub alis, & iuxta claviculari ad pectus est; apparuerit utique caput brachii in anteriorem partem vehementer eminens, etiam si non sit elapsum. A natura enim ipsum est brachii caput in anteriorem partem, reliquum autem brachii os ad externam partem

- nam partem incurvum. Converteretur autem brachium cum scapulæ cavitate obliquum; quum iuxta costas fuerit porrectum. Quum vero ad anteriorem partem extensa fuerit tota manus, tunc brachii caput e directo est in scapulæ cavitate, & non amplius in anteriorem partem eminere conspicitur. Verum de quo nunc est sermo, nunquam vidi
 20 in anteriorem partem elapsum; non tamen affirmatum ne de hoc quidem, an ita excidat, nec ne. Quum igitur exciderit brachium ad locum sub alis, multi reponere novērunt, utpote quod multis elabatur. Eruditi autem est omnes modos nosse, quibus medici id reponunt, & quo modo quis his modis quamoptime utatur. Optimo vero horum inodorum uti oportet, si fortissimam necessitatem videris. Optimus autem est
 25 qui postremus describitur. * Quibuscumque igitur frequenter humerus excidit, hi plerumque ipsi sibi ipso ad reponendum sufficientes sunt. Inmissis enim alterius manus digitis ac nodis in locum subalarem, articulum sursum cogunt, cubiti vero gibbum ad pectus adducunt. Eodem etiam modo medicus reponet, si ipse quidem subalam, articulo magis intro elapso, subtenens digitis a costis diducat, ita ut capite
 30 suo in summum humerum injecto, renitendi gratia, genibus vero iuxta cubiti gibbum ad brachium admotis, ad costas retrudat. Conducit autem eum, qui reponit, fortes manus habere; aut ipse quidem manibus & capite ita faciat, alius vero quidam cubiti gibbum ad pectus adducat. Est autem & humeri repositio, ut cubitus retrorsum ad spinam subducatur, deinde altera manu in summam gibbi cubiti partem injecta re-
 35 tortio fiat, altera vero iuxta articulum retro innatur. Hæc repositio, & ea quæ prius dicta est, quum non sint secundum naturam, tamen articulum circumagitantem incidere cogunt. Qui vero calcaneo reponere conantur, propinquum quid ei, quod est secundum naturam, cogunt. Oportet autem hominem humi supinum reclinare; eum vero, qui reponit, humi sedere qua parte articulus excidit. Deinde apprehensam manum læsam, cum suis manibus extendere, calcaneo vero in subalarem locum injecto, dextro in dextrum, sinistro in sinistrum, retrudere. Oportet autem in
 40 cavitatem sub ala rotundum quid congruens indere, commodissimæ vero fuerint pilæ valde parvæ ac duræ, quales multæ ex coriis consueunt. Si enim non eiusmodi quid inditum fuerit, calcaneum ad brachii caput pervenire non potest. Dum enim manus extenditur, locus sub ala cavatur. Tendines enim, qui hinc atque illinc locum sub ala constringunt, contrarii sunt. Oportet autem aliquem ab altera parte eius, qui extenditur, confidentem, sanum humerum continere, ut ne corpus circumtrahatur, dum læsa manus in alteram partem extenditur. Postea ubi pila subalam subdita fuerit, molle lorum
 45 sufficienti latitudine præditum, circum pilam circumdare oportet, ita ut quidem eo lora ex utrisque iunctis apprehenso sursum retrahat, a capite ejus, qui extenditur, confidens, & pede ad summum humeri os intens. Pila vero quampenitissime, & maxime intrus ad costas sita sit, & non ad brachii caput. * Est & alia repositio, quum humerus
 50 alter subdit. Majorem tamen esse oportet eum, qui humerum supponit, ita ut apprehensa manus, humerus sum acuminatum sub illius luxat alam supponat, & deinde aliquantum verset, ut velit sedi insideat, ea conjectura facta, ut homo ille circa humerum suum ex ala pendeat, ipse vero seipsum in hunc humerum altiore faciat, quam in
 55 alterum, brachium autem pendens ad pectus suum quamcunctissime cogendo adducat. In hac vero figura insuper concutiat, ubi hominem sustulerit, quo reliquum corpus in adversam partem brachio, quod continetur, vergat. Si vero valde levis fuerit homo,
 60 puer aliquis levis insuper ex ipso retrorsum pendeat. Atque hæc omnes repositiones in palestra utitur sunt, eo quod non opus habent aliorum instrumentorum importatione. Poterit tamen quis etiam alibi his uti. Sed & qui circum pistillum cogunt, propemodum secundum naturam reponunt. Oportet autem pistillum molli quadam fascia esse involutum: minus enim ita labarit: & inter costas, ac brachii ca-
 65 put subter intrisum; & si quidem breve fuerit pistillum, collocare hominem in sedili aliquo oportet, quo vix brachium circum pistillum circumdare possit. Est autem potius longum pistillum, quo homo stans ferme circum pistillum pendeat. Postea brachium quidem & cubitus circa pistillum porrigantur, ab altera vero corporis parte quis manibus circa cervicem ad claviculam circumjectis deorsum cogat. Hæc repositio
 70 moderate secundum naturam est, & repositionem facere potest, si probe ipsam tractent. Quum & per scalam alia quædam huiusmodi repositio fieri possit, & adhuc melior, eo quod corpus hinc atque illinc elevatum, securus librando adequari potest. Nam circum pistillum etiam si humerus fixus maneat, periculum tamen est ac
 75 corpus hac aut illac circumagatur. Oportet tamen & super scalam superne fortissimum quid deligatum esse, quod ad loci sub ala cavitatem congruum sit, & quod brachii caput ad naturam redire insuper cogat. * Optima vero ex omnibus repositio-
 80 nibus talis est. Lignum esse oportet latitudine quidem quæque aut quatuor in totum digitorum, crassitudine vero duorum digitorum, aut etiam tenuius, longitudinem autem bicubitali, aut paulo brevius. Sit autem altera parte summa rotundum, & angustif-
 85 simum ac tenuissimum hac parte, habeatque cætipidinem paullulum supereminentem in extrema rotunditatis parte, sed non ea, quæ ad costas, verum ea, quæ ad brachii caput existit, quo sub alam congrua sit, iuxta costas sub brachii caput subdita. Lin-
 teo autem, vel fascia molli lignum summa parte obvolvatur, quo levius reddatur. De-
 inde subdito ligni capite quampenitissime sub alam, inter costas, ac brachii caput, to-
 tam

tam manum ad lignum porrectam alligare oportet, juxta brachium, juxta cubitum, 85
& juxta manus juncturam, quo quammaxime sit quies. Præ omnibus autem curandum
est, ut summa ligni pars quampenitissime intra subalarem locum recipiatur, brachii
caput transgressa. Postea inter duas columnas trabem transversam probe alliga-
re oportet, & deinde manum cum ligno supra trabem transmittere, quo manus ab
altera parte fir, corpus ab altera, trabs vero sub alâ, & postea ad alteram partem 90
manum deorsum cogere una cum ligno circum trabem, ad alteram vero reli-
quum corpus. Trabs autem ea altitudine alligetur, ut reliquum corpus elevatum
summis pedum digitis innitatur. Hic modus repositionis humeri longe opti-
mus est. Justissime enim commotionem facit, si solum penitus intus ad brachii
caput lignum fuerit. Justissimæ item sunt in utramque partem adæquationem fa- 95
cientes librationes, & ad hæc ossi brachii securæ. * Recentes itaque luxationes ci-
tius incidunt, quam quis putare possit, & priusquam extente esse videantur. Sed &
veteres sola hæc repositio reponere potest, si non jam ob vetustatem caro qui-
dem in acetabulum devenit, caput autem brachii in loco, ad quem declinavit, semitam
sibi ipsi jam fecit. Verumtamen etiam ita inveteratum brachii clapsim mihi posse 100
reponere videtur. Quid enim iusta molitio non noverit? manere tamen in loco
posse, non ita mihi videtur, sed prout consuevit, rursus luxabitur. Idem facit etiam, si
circum scalam, eodem modo velut dixi præparatam, coactio transmissi brachii fiat, A-
bunde item sufficit circum magnam sedem Thesalicam coactionem facere, si recens fue-
rit luxatio. Præparatum autem esse oportet lignum, velut dictum est; hominem vero 105
locare oportet in sede obliquam, deinde brachium una cum ligno supra fedis reclinato-
rium transmittere, & ad alteram partem corpus deorsum cogere, ad alteram brachi-
um cum ligno. Idem quoque facit coactio supra biforem januam. His autem,
quæ sorte præsentia fuerint, utendum est. Nolle igitur expedit, quod naturæ
a naturis multum differunt, ad hoc ut elabentia facile rursus incidat. Differt etiam ace- 110
tabulum ab acetabulo, quum aliud facile transcendendi possit, aliud minus. * Plurimum
item differt nervorum ligamentum, quum in quibusdam remissum sit, in quibusdam
intentum. Nam humiditas hominibus fit ex articulis propter nervorum connexio-
nem, si laxa fuerit, & intensiores facile ferat. Multos enim videas qui adeo humi-
di sunt, ut quando velint, articuli ipsi citra dolorem excident, & absque dolore resti- 115
tuantur. * Differt etiam habitus quidam corporis. Nam his, quibus bene se habet memo-
brum, & carnosus & minus excidit, & difficilior incidit. Ubi vero ipsi seipis te-
nuiores & magis excarnes fuerint, tunc & magis excidit, & facilior incidit. Ar-
gumentum autem quod hæc ita se habeant, hoc est. Bobus enim tunc magis femo-
ra excident ex acetabulo, quum tenuissimi existunt. Fiant autem tenuissimi boves ad 120
finem hyemis. Tunc igitur etiam maxime luxantur, si tamen & hujusmodi quid-
dam in medicina scribere convenit. Verum convenit utique. Bene enim Homerus
didicit, quod ex omnibus pecudibus boves quammaxime laborent hoc tempore, & ex
bobus potissimum aratores, eo quod hyeme operentur. His itaque maxime excidunt
articuli. Hi enim maxime attenuantur. Nam reliqua quidem pecora brevem herbam 125
depalci possunt, bos autem non ita valde, priusquam alta fiat. Reliqui enim tenuis
est labii prominentia, tenuis item superna maxilla. Bovi vero crassa est labii pro-
minientia, crassa item & obtusa superna maxilla. Quapropter in breves herbas
subjicere non potest. Rursus solipeda animalia, utpote utrinque dentata, & dentes
inter se committere possunt, & sub brevem herbam dentes subjicere queunt, dele- 130
stanturque tali herba magis, quam alta. Brevis enim herba in totum melior ac solidior
est, quam alta. Adde, quod alta etiam prius fructum effert. Ob hoc igitur ita cecidit.
Haud fecus ac bubus nigeris gratissima veris
Tempora proveniunt;
quia gratissima apparet ipsis alta herba. Sed & alias bos laxum habet hunc arti- 135
culum, magis quam alia animalia, & ob id etiam magis, quam alia pedem trahit, &
maxime quum macilentus est, & jam senex. Propter omnia hæc etiam maxime bovi
excidit. Plura autem de ipso a me scripta sunt, eo quod omnium antea relatorum te-
stimonia hæc sunt. * Verum de quo nunc sermo est, excarnibus magis excidit, sicut
etiam citius incidit, quam probe carnosus, & humidus, ac excarnibus minus inflammat- 140
ur, quam siccis, ac carnosus, & in postero tempore quoque minus vincitur. Sed & mu-
cus amplior moderato subest, si non adsit inflammatio, & sic sane lubricus fue-
rit. Mucosiores enim omnino sunt articuli excarnibus, quam carnosus. Nam & ipsæ
carnes eorum, qui non recte æ arte fame macerati sunt, in macilentis mucosiores
sunt, quam in crassis. Quibus tamen cum inflammatione mucus subest, his inflamma- 145
tio vinculo facto articulum continet, & ob id hi, qui submucosi sunt, articuli non
valde excidunt, & exciderent utique, si non plus aut minus inflammationis accessis-
set. Quibus igitur, quum articulis excidit, circumstitæ partes non inflammantur, &
statim citra dolorem humero uti possunt, hi putant quidem nihil opus esse ut sui i-
piorum curam gerant; medici tamen est, ut contra tales vaticinetur: talibus excidit 150
rursus magis, quam his, quibus nervi sunt inflammati. Acque hæc res in omnibus
in homine ita habet, & maxime circa humerum, & genu. Maxime igitur etiam hæc ex-
cidunt. * Quibus autem nervi inflammati sunt, hi humero uti non possunt. Prohibet
enim

- enim dolor, & inflammationis discentio. Tales igitur curare oportet cerato, & splenis, & lineis multis deligando. Sub alam vero sanam mollem puram convolutam subicere oportet, ad cavitatem explendam, quo sulcimentum quidem fir deligatori, articulum vero sustentet. At brachium plerumque sursum vergens tenere oportet. Sic enim procul fuerit humeri caput a loco, in quem excidit. Oportet autem, postquam humerum deligaveris, brachium ad costas adalligare, fascia quadam in orbem circum corpus obducta. Fricare quoque humerum oportet placide, & accurate. Multarum autem rerum peritum medicum esse expedit, & non minus frictionis. Ex eodem enim nomine non idem eventus subsequitur. Nam & vincere potest tractio articulum iusto laxiore, & solvere articulum iusto duriorum. Verum de frictione in alio opere a nobis tractabitur. Talem igitur humerum mollibus manibus fricare convenit, confert enim, & alias leniter. Articulum autem commovere non violenter, sed intantum ut citra dolorem commoveatur. Restitutum vero omnes articuli partem longiore, partim breviori tempore. * An autem brachium exciderit, his signis cognoscere oportet. Nam ubi iustum corpus habent homines, manus item ac crura, sano in exemplum uti oportet ad non sanum, & non sano ad sanum, non alienos articulos inspicendo, (alii enim aliis magis extantibus natura sunt articulis) sed ipsius ejus qui affectus est, an dissimilis sit sanus aegroto. Et hoc recte quidem dictum est, multam tamen erroneam intelligentiam talia habent, & non satis est solum sermonis doctrina artem hanc nosse, sed conversatione etiam versare oportet. Multi enim præ dolore, aut ex alia causa, quam non exciderint ipsis articuli, tamen non possunt in similes figuras restitui, in quales sanum corpus figuratur. Proinde & talem figuram insuper intelligere, ac considerare oportet. Sed & in loco sub ala caput brachii multo magis incumbere videtur in luxato, quam in sano. Quin & superne juxta supernam humeri partem cavus apparet locus & summi humeri os extans conspicitur, utpote articulo ad infernum locum digresso, & est etiam aliqua erronea in hoc intelligentia sed postea de ipso scribetur. Est enim dignum de quo scribatur. Præterea in luxato cubiti gibbus magis a costis distare videtur, quam in altero. Si tamen quis viam afferens cogat, adducitur quidem, sed cum dolore. Sed & sursum ad aurem manum attolletur, cubiti gibbo extento, non valde potest, velut sanam, neque hac & illac similiter diducere. Hæc igitur signa sunt humeri luxati, repositiones item præscriptæ & curationes hæc sunt. * Operæ pretium vero est discere, quomodo frequenter excidentes humeros curare oporteat. Multi enim a certaminibus jam prohibiti sunt ob hanc calamitatem, quoniam alias penitus fuerint inculpabiles. Multi etiam ad res bellicas inuites fuerunt, & ob hanc calamitatem perierunt. Sed & propterea res digna est quæ discatur, quod nullum noverim qui recte medeatur, sed alios ne aggredi quidem sciam, alios contra quam conducit, & sentire, & facere: Multi enim medici humeros luxatos afferunt & juxta supernam humeri partem, & juxta anteriorem, qua parte caput brachii extuberat, & juxta posteriorem paululum retro supernam partem. Hæc igitur uestiones, si quidem sursum brachium excidisset aut in anteriorem, aut posteriorem partem, rectæ iustæ essent. Nunc vero quam deorsum excidit, ejiciunt magis hæc uestiones, quam impediunt. A superna enim ipsius amplitudine caput brachii excludunt. Verum hæc ita urere oportet. Cutem sub ala digitis apprehensam attrahere oportet, secundum ipsam maxime rectitudinem, secundum quam brachii caput excidit. Deinde ita attractam cutem in ulteriorem partem perurere. Ferramentis autem talia urere oportet non crassis, neque valde calvis, sed oblongis. * Citius enim penetrant, & manu firmata transigi possunt. Pellucidis item his urere oportet, quo quamcelerrime pro viribus penetrent. Nam crassa tarde penetrantia latiores crustarum elapsiones faciunt, & periculum est, ne cicatrices rumpantur, & nihilo quidem deterius hoc esset, verum turpius & ab arte alienius. Postquam autem in ulteriorem partem perusseris, in plurimis satis est ut infernæ parti soli hæc crustas iniicias. Quod si periculum esse non videatur ne cicatrices rumpantur, sed multum spatii interpositum sit, tenue quoddam specillum per inula foramina trajicere oportet, eute-adhuc attracta. Neque enim alias trajicere possis. Ubi vero trajeceris, curam dimittere. Postea inter crustas aliam crustam tenui ferramento infigere ac inurere, donec specillum contingas. Quantum vero de cute sub ala apprehendere oportet, hinc conjectare licet. Glandulæ sub ala sunt, sicut etiam in aliis corporis partibus. Verum in alio libro de tota glandularum natura scribetur, quod sint, & qualia in quolibet significant ac possunt. Glandulas igitur simul apprehendere non oportet, neque ea quæ glandulis sunt interiora. Mignum enim afferunt periculum. Sunt enim nervis maximi momenti vicina. Quantum vero extra glandulas est, ejus quamplurimam partem apprehendere oportet. Nihil enim periculose. Nosse ramen hoc expedit, quod si foriter brachium eanderis, nihil cutis sub ala apprehendere poteris, quod sane attractu memorabile sit. Distrahitur enim in extensione. Nec vero nervos ulla machina vulnerare oportet. Hi enim prompti expositique sunt ac extenti in hac figura. Si vero parum brachium elevaveris, multum quidem curis apprehendes; nervi vero, quorum curam gerere oportet, intus ultra apprehensionem consistunt. * Nonne igitur in omni arte præ omnibus curandum est, ut in singulis figuræ iustæ inveniantur? Atque hæc quidem de loco sub ala. Et sufficiunt hæc apprehensiones,

siones, si cruste recte fuerint inuiste. Extra vero alam duo solum loci sunt, ubi quis crustas inungere queat huic affectioni auxiliantes. Unam in anteriore parte, inter brachii caput, & tendinem iuxta alam. Et hac quidem parte eutem penitus perurere oportet, sed non alius. Vena enim crassa propinqua est, & nervi, quorum neu-
 235
 ra igne calcificanda sunt. Retrorsum autem alteram crustam inungere licet multum supra tendinem, qui est iuxta alam, & paululum infra brachii caput. Et eutem quidem penitus perurere oportet. Verum neque hic valde altam crustam facere. Inimicus enim est ignis nervis. Curare igitur ulcera per omnem curationem oportet, ita ut
 240
 brachium nunquam vehementer extendas, sed moderate, ulcerum saltem curandorum gratia. Minus enim ira perfrigerantur. Conducit enim omnes ultiones regere, ut etiam leniter curentur, & minus disparentur, minusque sanguinis erumpat, & minus convulsio accedat. Ubi vero pura facta fuerint ulcera, & ad cicatrices deven-
 245
 rint, tunc sane penitus brachium semper die, ac nocte costis alligatum esse oportet. Sed & quum sana facta fuerint ulcera, similiter ad multum tempus brachium ad costas alligandum est. Sic enim maxime cicatrix induci poterit, & spatii amplitu-
 do interceptur, in quam maxime luxatur brachium. Quibuscumque vero humerus repositione fuerit destitutus, si quidem homines adhuc crescant, os brachii non similiter, ut sanum coalescit, sed augetur quidem, verum altero brevius ali-
 250
 quanto efficitur. Et qui costellæ cubito præditi sunt, parvumque, ac macilentum brachium ex nativitate habent, galeanones vocati, ob duplices hac calamitates sunt tales, tum si talis aliqua luxatio ipsos, dum in utero sunt, contriverit, tum ob
 14
 aliam calamitatem, de qua postea aliquando scribetur. * Quin & hi, quibus cum ad-
 huc infantes sunt, profundæ, ac submersæ suppurationes circa brachii caput sunt, 245
 omnes galeanones efficiuntur, & siue secti fuerint, siue ulti, siue sine sponte ipsis eruperint, hæc ita se habere nosse oportet. Qui tamen ex nativitate galeanones sunt, etiam si manu potentissime uti possint, tamen neque ipsi extento cubiti gibbo, brachium ad autem extendere, ac elevare possunt. Sed multo minus
 hanc, quam sanam manum. Quibus vero jam viris exciderit humerus, & repositus
 250
 non fuerit, his supra humeri pars magis excarnis efficitur, & habitus hac parte tenuis fit. Quin tamen dolor cessaverit, non omnia ea similiter operari possunt, quæ elevato cubiti gibbo a costis in obliquum operari oportet. Quæ vero transmo-
 ro brachio juxta costas, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem operari oportet, ea operari possunt. Nam & scobinam, & ferram trahere poterint, secu-
 255
 ri item findere, & fodere, si non valde sursum cubiti gibbum attollant, sed & alia
 15
 juxta tales figuras operantur. * At vero, quibus summus humerus fuerit avul-
 sus, his os avulsum extra eminens apparet. Est autem hoc velut vinculum claviculæ, & scapulæ. Alia enim est hominis natura hac parte, quam aliorum animalium. Medici igitur in hoc vulnere maxime falluntur. Nam quum os avulsum eminet, su-
 260
 perius humeri pars humilis, & cava apparet, ut etiam velut humeri elapsi curam adhibeant. Multos igitur novi medicos alias non malos, qui graviter afflixerunt, rales humeros reponere conantes, ita excidisse rati, & non prius destitisse ipsi ex-
 istimare se humerum reponere, quam vel desperarint, vel frustrati fuerint. His cura-
 rio quidem eadem, quæ etiam aliis hujusmodi, ceratum, splenia, & lintea, & deli-
 265
 gario ejusmodi; deorum tamen cogere os supereminens oportet, & splenia super hoc ponere plurima, & hac parte maxime premere; & brachium ad costas adalligatum ad supernam partem tenere. Sic enim os avulsum maxime appropinquatur. Hæc tamen probe nosse expedit, & velut certa prædicere, si alioqui voles, quod
 nullum detrimentum, neque parvum, neque magnum, huic contingit ex hoc vul-
 270
 nere. Sed locus turpius evadit. Neque enim hoc os in pristinam sedem similiter firmari poterit, velut natura exigit, sed necesse est plus, aut minus tumidum esse ad supernam partem. Neque enim aliud ullum os in eundem locum restituitur, quod cum
 alio osse communionem habet, & adhærens a veteri naturali sede avulsus fuerit.
 16
 Paucis autem diebus summus humerus doloris exors fit, si probe deligetur. * Clavi-
 cula porro fracta, si quidem paucis caulatis hoc contigerit, curari facilius est. Si vero oblonge, difficilius sanatur; & contraria in his contingunt, aliter quam quis
 putaverit. Nam quæ penitus caulatis fracta est, cogi magis poterit, ut ad natu-
 ram redeat. Et si diligens cura adhibeatur, partem, quæ superior est, inferiorem
 fecerit figuris idoneis, & deligatione conveniente. Si vero perfecte non firmata
 280
 fuerit, atramen supereminens ossis pars non valde acuta fit. At quorum os in longitudinem fractum fuerit, his similis ossibus avulsis calamitas contingit, de
 quibus antea scriptum est. Neque enim ipsum ad seipsum valde firmari solet, &
 summa ossis eminentis valde acuta fit. In universum igitur nosse expedit, quod
 17
 nullum detrimentum neque humero, neque reliquo corpori ob claviculæ fracturam
 285
 accedit, si non insuper corruptio aliqua contingat. Raro autem hoc fit. Deformitas tamen circa claviculæ fracturam accedit primum turpissima, deinde vero mi-
 nor fit. Coalescit autem clavícula cito, itemque alia ossa laxa. Celerem enim cal-
 li obductionem talia faciunt. Quum igitur recens fracta fuerit, vulnerati ad cura-
 tionem festinant, majus malum esse putantes quam est, & medici quoque prompti
 290
 sunt ad recte curandum. Progressu vero temporis & vulnerati, utpote qui neque
 Hipp. Opera. Gg dolent,

- dolent, neque iter facere, neque cibum capere prohibentur, negligunt, & medici, utpote qui suis sedibus restituere non possunt, aufugant, neque vulneratorum negligentiam agere serunt. In hoc autem calli obductio acceleratur. * Deligationis vero
 295 modus plerisque confimilis est, ut cerato, & splenis, & mollibus lineis curatio fiat. Insuper autem & hæc curatio, & hæc animadversio habenda est, & præter
 300 id in hac aggreffione, quod plurima splenia juxta eminentem partem imponere oportet, & plurimis deligationibus maxime circa hanc partem premere. Sunt autem aliqui, quibus complacuit plumbum grave insuper adalligare, ut supereminentem partem deorsum cogat. Fortassis autem neque intelligunt, qui simpliciter deligant. Sed neque hic modus ad claviculam fractam pertinet. Neque enim fieri potest, ut id, quod eminet memorabili modo, deprimatur. Alii vero quidam sunt, qui quum cognoverint, quod hæ deligationes erroneæ sunt, & non secundum naturam, supereminentia deorsum cogunt: deligunt quidem ipsos splenis, & linteis utentes, velut etiam alii, verum cincto homine fascia quadam, qua parte maxime cingi solet, postquam splenia supra eminentes fracturas imposuerunt, ita ut isthic magna mole extuberent, tunc initium linteæ ad cincturam ex anteriore parte alligant, atque ita deligant in directum claviculæ extendentes, ac retrorsum ducentes, & isthic cincturæ circumdatam in anteriorem partem reducunt, & rursus in posteriorem.
 310 Aliqui vero non cincturæ linteis circumdant, sed circum interfoemineum juxta sedem, & per spinam linteum circumdantes, hoc modo fracturam comprimunt. Hæc itaque si quis inexpertus audit, prope secundum naturam esse videtur; verum si quis itatur, inutilia existunt. Neque enim stabilia sunt, etiam si decumbat quis, quamvis ita vel maxime stabilis contingat; attamen si decubens aut crus influxerit, aut ipse
 315 se inclinet, omnia deligamenta movebuntur, & aliqui noxia est hæc deligatio. Nam & sedes intercluditur, & linteæ in hac angustia acervatæ sunt, & quæ rursus cingulo circumdantur, non ita valida cinctura circumdari possunt, ut non cingulum sursum ascendere cogant, neque ita necesse est omnia deligamenta laxari. Quamproxime vero quis rem conficere videri possit, etiam si non magna faciat, si quibusdam linteis cingulum circumdet, plurimis autem linteis priorem deligationem perficiat. Sic enim maxime stabiles fuerint deligationes, & mutuam inter se opem tolerant. Plurima igitur ex his, quæ contingunt his, quibus clavícula fracta est, relata sunt. * Insuper autem, & hoc adintelligere oportet, quod clavícula plerumque
 320 frangitur, ita ut os, quod a pectore est, ad supernam partem emineat; quod vero a summo humero est, in infernam partem subsidat. Causæ vero horum hæc sunt, quod pectus neque multo inferius, neque superius procedere potest. Nam articuli in pectore motus parvus est. Ipsum enim sibi ipsi, & spinæ ex continuitate commissum est. Proxime quidem clavícula ad humeri articulum fluctuat. Cogitur enim frequentem motum habere propter summi humeri connexionem; & aliqui ubi vulnerata est, ad supernam partem delugit ea pars, quæ pectori adhæret, & non valde ad infernam partem cogi potest. Nam & a natura levis est, & loci amplitudo ipsi superne major est, quam inferne. At humerus, & brachium, & quæ his annexa sunt, a costis, ac pectore facile exolvi possunt, & propterea multo superius, ac inferius abduci queunt. Quum igitur fracta fuerit clavícula, os quod ad humerum est, magis deorsum reipit. Hinc enim ipsum una cum humero, & brachio desuere proclivius est, quam sursum ferri. Quum igitur hæc ita se habeant, imprudenter se gerunt, qui supereminentem ossis partem deorsum cogere oportere putant. Nam infernani ad supernam adducendam esse manifestum est. Hæc enim motum habet, hæc est, quæ a natura discessit. Clarum itaque est, aliter nullo modo ipsam cogi posse: deligationes enim nihil magis appellant, quam repellunt. Si vero quis brachium quammaxime ad costas admotum sursum cogat, ut quamacutissimus esse humerus videatur, perpicuum est, quod sic adaptari poterit ad os, quod a pectore est, unde est divulsa. Si quis igitur legitima deligatione utatur celeris curationis gratia, & reliqua omnia frustra fieri poter præter figuram relatum, is & recte intellexerit, & celerrime, ac optime curaverit.
 345 * Decumbere tamen hominem multum refert, & sufficient dies xiii. si quieverit, aut ad summum viginti. Si tamen contrario modo clavícula fracta fuerit, quod non valde contingit, ut os quod a pectore est subsidat, quod vero a summo humero est supereminet, alterique superstet; nulla magna curatione in his opus fuerit. Ipse enim humerus, & brachium si domitatur, ossa inter se committere, ac firmare potest, & utilis quæpiam deligatio suffecerit, & pauci dies satis erunt ad callum obducendum. Quod si hoc modo fracta non fuerit, sed in obliquum hæc vel illuc luxata, ad naturam reducere oportebit, humero cum brachio sursum adducto, velut etiam ante dictum est. Quum autem ad pristinam naturam refederit, reliqua curatio velox erit. Pleraque igitur immutationes, ac luxationes brachium, si sursum cogatur, corrigit. * Quæcumque vero luxationes ex supernis oblique ad latus sunt, aut deorsum, his correctio præparatur, si homo supinus decubuerit, juxta medias autem scapulas aliquid altius suppositum fuerit, quo pectus maxime in utramque partem inflexum sit, & brachium adducat quis ad costas porrectum. Medicus autem altera manus vola in brachii caput injecta retrudat, altera ossa fracta componat. Sic enim quammaxime
 360 ad naturam reduxerit. Verum quod jam dictum est, superum os facile ad partem subsidere

dere solet. Plerisque igitur, ubi deligati fuerint, figura ipsa opitulatur, ita ut ad ipsas costas cubiti gibbum habentes, hoc modo humerum ad supernam partem cogant. Quibusdam vero humerum quidem sursum, velut dictum est, cogere oportet; cubiti autem gibbum ad pectus adducere; summam vero manum ad summum sanum humerum adhibere. Si quidem igitur decumbere sustinet, sulcimentum aliquod, quod obfirmet, apponere oportet, quo humerus quammaxime superne maneat. Si vero obambulare volet, fundam ex fascia factam, & acutæ gibbi cubiti parti circumdatam, de collo appensam gestare oportet.

S E C T I O II.

- 21 * **C**ubiti porro gibbi articulus ubi cinctus, aut laxatus est ad costas, t
aut foras, acuta ipsius parte in brachii cavitae manente; extensione
in directum facta, id, quod eminet retrosum & in obliquum repellere oportet. Ubi
vero perfecte excidit aut hac, aut illac, extensio, in qua brachium fractum deliga-
tur, requiritur. Ita enim incurva gibbi pars non impedit. Excidit autem maxime ad
partem versus costas. Correctiones vero facere oportet quamplurimum abducendo,
& ut ne brachii caput cornicem contingat, sublimem circumducere, ac insectare, &
non in directum cogere; simul autem contraria in utramque partem decludere, & in sedem
compellere. Contulerit etiam in bis gibbi cubiti inversio modo in supinam, modo in
pronam partem. Curatio vero ex figura est, ut summam manum paullo altiore
cubiti gibbo habeant, brachium vero ad costas. Sicut etiam appensi exceptio, & positio,
& gestandi facilitas, & natura, & usus in communi sunt, si modo non male callus
obducatur. Obducitur autem cito. Curatio fit linteis juxta legem articulare, ita ut
acuta ejus pars insuper deligatur. * Recrudescit autem maxime cubiti gibbus febris,
doloribus, nausea, & vomitu meracæ bilis, præsertim si retrosum luxatus
fuerit, ob torporem; deinde, si in anteriorem partem. Verum curatio eadem est. Re-
positio vero retrosum luxati, ut extensum distendamus: signum autem est, quod ex-
tendere ipsum non possunt, sicut in anteriorem partem luxati, quod insectare nequeunt.
Verum tunc durum quiddam involutum indere oportet, & circum hoc ab extensione dere-
pente insectare. Disparationis autem ossium signum est manifestum ex contactu juxta
venam, quæ in brachio finditur. At vero callus cito his obducitur. Ex nativitate autem
brevisora sunt ossa infra noxam, plurimum quæ proxima sunt, cubiti; deinde manus;
postea digitorum. Verum brachium, & humerus robustiora sunt propter inversionem.
At altera minus propter opera adhuc fortior est. Imminutio vero carnis fit, si foras
excidit, intrinsecus, si minus, in contrarium prope excidit. Cubiti vero gibbus si
intro, aut extra exciderit, extensio fit in communi figura cubiti ad brachium. Fascia
enim sub alam data, ipsam exceptam suspendere oportet; ad summum vero cubiti gib-
bum juxta aciculum pondus appendere, aut manibus deorsum cogere. Ubi vero articu-
lus infra elevatus est, coaptationes manuum volis sunt, velut etiam in manibus. Deli-
gatio quoque in hac figura, & exceptio appensi, & positio. At si in posteriorem excidit
partem, statim extensum palmis dirigere, ac coaptare oportet. Simul autem in directio-
ne etiam alius opus est. Si in anteriorem, circum linteum convolutum juxta molis in-
flectendo simul directionem facere oportet. Si vero in alteram partem inclinarit, in directio-
ne simul utraque facere oportet. Verum curationi communis est figura, & deligatio. Pos-
sunt autem & ex distentione omnia in communi contingere. At vero repositiones aliæ
ex superelevatione reponuntur, aliæ ex extensione, aliæ ex circumvolutione. Hæ ve-
ro ex figurarum excessibus aut hac, aut illac celeriter fiunt. * Manus articulus aut
intro, aut extra luxatur, plerumque vero intro. Signa autem facilia cognita sunt. Si enim
intro luxatus est, digitos insectare non possunt. Si extra, extendere nequeunt. Re-
positio fit digitis supra mensam positis, ut ab aliis atque aliis in diversum extensio
fiat, & id, quod eminet, aut vola, aut calcaneo retrudatur, & in anteriorem partem de-
orsum protrudatur. Inferne vero juxta alterum os moles aliqua convoluta mollis
supponatur, si supra eminet, manu prona locata; si infra, supina. Curatio vero
linteis fit. Tota porro manus aut intro, aut extra, aut hac, aut illac luxatur. Ma-
xime vero intro. Quandoque autem & appendix emora est. Quandoque vero alterum os
disparatum distat. His extensio fortis facienda est, & quod quidem eminet retrudatur,
alterum vero contra tridatur, duabus speciebus simul contingentibus, & retro-
sum, & in obliquum, aut manibus supra mensam, aut calcaneo. Quæ vero recru-
descunt ac deformia sunt, tempore ad usum corroborantur. Curatio fit linteis cum ma-
nu & cubito, & ferule nique ad digitos ponuntur. At ferulis hæc deligata frequen-
tius quam fracturas solvere oportet, & perfusionem amplius adhibere. Ex nativita-
te autem manus brevior fit, & carnes imminuuntur maxime in contraria parte ei, in
qua luxatio facta est. At adulto jam ossa manent. * Digiti vero articulus luxa-
tus facilis cognitus est. Repositio fit extendens in directum, ita ut quod eminet os
protrudatur, contrarium vero contra tridatur. Curatio fit fasciis, ac linteis. Si vero
non reponantur, forissecus callo obducitur. At si ex nativitate, aut dum adhuc
crescit homo, luxata fuerint ossa, breviora sunt infra luxationem, & carnes im-
minuuntur contraria maxime parte ei, in qua luxatio facta est. In adulto vero os

- sa manent. Maxilla vero paucis jam perfecte luxata est. Os enim, quod a superiore maxilla prodit, cum eo osse subiugatum est, quod sub aurem annexum est, quodque capita inferne maxillae concludit, ac dirigit, quum altero capite superius sit, altero inferius, & extremae infernae genae partes ita se habent, ut altera ob longitudinem non facile accessum admittat, altera vero cornix est, & supra jugale os excedit. Simul autem & ambarum harum extremitatum nervosi tendines existunt, ex quibus musculi dependent, qui temporales, ac manducatorii appellantur. * Propterea autem appellantur, & propterea moventur, eo quod hinc dependent. Nam in edendo, & in loquendo, & in reliquo oris usu superna quidem maxilla quiescit. Est enim capiti connexa, & non coarticulata. Inferna autem maxilla movetur. Coarticulata enim est a superiori maxilla, & a capite. Cur igitur in convulsionibus, ac distentionibus hic articulus distensus primus de se significationem praebet, & cur plagarum temporales periculose sint, ac soporem inducant, alio libro referetur. Quod verum non valde luxetur, causae hae sunt. Sed & haec quoque causa est, quod non valde tales ciborum necessitates hominem apprehendunt, ut magis quam potest hiet. Excidit autem a nulla alia figura, quam si quis valde hians maxillam in alteram partem diducat. Confert tamen ad hoc, ut excidat, hoc ipsum. Quiescunt enim nervi, & quicumque musculi. circa articulos sunt, aut ab articulis, ex quibus colligantur, horum quicumque in usu saepe moventur, hi etiam maxime ad extensiones remittunt, quemadmodum etiam pelles mollissimae multum remittunt. De quo igitur sermo est, luxatur quidem, & excedit maxilla raro; laxatur tamen saepe in hiatibus, velut etiam aliae musculorum, ac nervorum unmutationes hoc faciunt. * Manifestum vero ex his maxime fit, ubi excidit. Prominet enim inferna maxilla in anteriorem partem, & in contrariam luxationi partem abducitur, & ossis cornix circa supernam maxillam tumidior fit; & infernas maxillas difficile committunt. Quae vero repusio his conveniat, manifestum est. Oportet enim aliquem vulnerati caput detinere, & alterum infernam maxillam intrinsicis, ac extrinsicis ad mentum digitis apprehendere, & primum maxillam aliquamdiu haec atque illae manu abducere, & ipsum hominem iubere, ut maxillam laxam habeat, & simul adducat, ac quammaxime remittat. Deinde repente tribus figuris simul laxare oportet, diligenti in hoc inadaptatione habita. Nam & ex distorsione ad naturam deducere oportet, & infernam maxillam retrorsum protrudere, ita ut aeger haec sequatur, & maxillas committat, ac non hiet. Atque haec quidem repusio est, & neque aliis figuris fieri poterit. Curatio vero brevis sufficit. Splenium enim incratum apponitur, ac laxo deligamento deligatur. Secutius autem haec aggressio perficitur; homine supino reclinato, & coriaceo pulvinari plenissime sacro capiti supposito, ut in ipsum innitens, quamminimus cedat. Insuper autem & caput vulnerari aliquis detinere debet. * Si vero ambae maxillae luxatae fuerint, curatio quidem eadem est, verum hi os minus committere possunt. Nam his genae prominentiores sunt, sed indistorta. Quod vero distorta non sint, maxime cognoveris ex dentium tum superiorum, tum inferiorum terminis & directio inter se correspondentibus. His confert, ut quamcitissime reponantur. Repositionis autem modus prius dictus est. Si vero non reponantur, animae periculum imminet praeter febribus continuis, & torpido sopore. Soporiferi enim hi musculi sunt, & dum alterantur, & dum intenduntur praeter naturam. Solet etiam alvus hi biliosa, meraca, paucis egerere. Et si vomuerint, meraca vomunt. Hi igitur etiam moriuntur decima maxime die. At si fracta fuerit inferna maxilla, si quidem non omnino eaulatim hoc contigerit, sed cohaeret adhuc os, confractum tamen fuerit, dirigere quidem os oportet digitis circa linguam obliquam subiectis, forissecus vero contrahiti, prout contulerit. Et si distorti fuerint dentes iuxta vulnus commoti, postquam os directum fuerit, dentes inter se conjugare oportet, non duos solum, sed etiam plures, atque hoc maxime auro, sin minus, lineo filo, donec os corroboretur. Postea curato, & splenis paucis, & linteis modicis deligare, non nimium firmis, sed laxis. Nam hoc probe nosse expedit, quod deligatio per lineas maxillae fractae parum quidem contulerit, si recte fiat; magnopere vero laeserit, si prave deligetur. Frequenter autem circa linguam explorare oportet, & multo tempore reniti, ac digitis dirigere os confractum, optimumque esset, si hoc semper fieri posset, sed fieri nequit. * Si vero os penitus eaulatim diffRACTUM fuerit, raro autem hoc contingit, dirigere quidem os oportet, velut dictum est. Ubi vero direxeris, dentes conjugare, quemadmodum antea dictum est. Magnopere enim contulerit ad quietem, & adhuc magis si quis recte coniungat, & velut oportet furas consuat. At enim non facile est, omnem chirurgiam scripto exquisito prodere, sed ex his, quae scriptae sunt, formam & imaginem concipere oportet. Postea corio opus est Carthaginensi, & si quidem iniur fuerit vulneratus, satis est squama inde detracta uri. Si vero adultior, ipso corio, ita ut defecta inde partium digitorum latitudine, aut prout congrua fuerit, subiecta prius & tummi maxilla, ita enim mitius fuerit, glutine agglutinetur summa sui parte, ad diffRACTAM maxillae partem, digiti aut paulo ampliore distantia a vulnere. Et haec quidem partícula ad infernam partem agglutinanda est, & habeat fissuram & directio menti, quo acutem eius partem circumcirca complectatur. Alterum autem eiusmodi lorum, aut paulo latius ad supernam maxillae partem agglutinare oportet tanta a vulnere distantia, quanta illa altera

altera lori particula abfuit. Sit autem & hoc fifum, ut circumcincta aurem ambiat. Sinr autem hac lora acuta, qua parte committuntur, & ubi ipforum extremitates co-
nectere, ac colligare oportet. In agglutinatione vero caro corii ad cutem vergat. Sic
enim magis agglutinatum adhæreſcit. Poſtea extento hoc lora, magis autem eo, quod
circa mentum eſt, quammaxime, ne maxilla evacuetur, lora ipſa circa verticem conne-
ctere oportet, & deinde linteo frontem deligare, & ſuperinjeſtum quid eſſe oportet, vel
ut moris eſt, quo vincula quieti ſint, ac firma. Decubitus autem faciat in ſanam ma-
xillam, non maxillæ, ſed capiti innitens. Attenuandum vero eſt corpus uſque ad dies 135
cem, deinde renutriendum non tarde. * Si enim primis diebus inflammatione non acceſſerit,
in viginti diebus maxilla corroboratur; perfecte enim callo obducitur, quemad-
modum etiam alia oſſa rara, ſi non corruptio infeſtarit. Verum de corruptionibus
omnium oſſium alia longa tractatio reſtat. Hæc extenſio per agglutinamenta ſiens,
iutis eſt, & prompta ad moderationem faciendam, & ad multas, ac multis locis fa-
ciendas directiones accommodata. At medici non intelligentia aque, ac manibus
prompti, tum io aliis vulneribus, tum in maxillarum fracturis tales exiſtunt. Va-
riis enim modis & bene, & male maxillam fractam delignant. Omnis enim deliga-
tio maxillæ ſic fractæ, oſſa ad fracturam magis vergentia inclinat, quam ad naturam
ducit. Si vero inferora maxilla circa connexionem ad mentum diſſuſa fuerit. Sola au-
tem hæc connexio in inferna maxilla eſt. Verum in ſuperina inutilis. Sed non volo ſer-
mone longius aberrare. In aliis enim morborum ſpeciebus de hiſ dicendum eſt. Si igitur
connexio ad mentum diſparata fuerit, ipſam coaptare cuiuſlibet viri eſt. Os e-
nim, quod eminet, ad internam partem digitis admotis detrudere oportet. Quod ve-
ro intro vergit, ad externam partem digitis immiſſis reducere. Hæc tamen exten-
ſione diſtendendo ſacere oportet. Faciliſ enim ſic ad naturam redibunt, quam ſi
quis oſſa inter ſe complicans cogere conetur. Ubi vero coaptata fuerint, conjuga-
re oportet dentes inter ſe hinc atque illinc, velut prius dictum eſt. Curare vero cera-
to, & ſplenis paucis, ac linteis. Deligationem autem brevem potius, quam variam
hic locus maxime admittit. Nam ut æquilis non eſt, prope tamen ad æquilis
accedit. At linteæ obvolutionem ſacere oportet, ſi quidem dextra maxilla eminet, in
dexteram. In dexteram enim fieri putatur, ſi dextra manus deligationi prærit. Si vero
altera maxilla eminerit, aliter deligationem ducere oportet, & ſi quidem recte quis
coaptationem adeptus fuerit, & velut convenit quæverit, cito curatio continget, &
dentes illæſi manent. Sin minus, diuturnior fiet curatio, & diſtortionem habebit,
dentes autem læſi, & inutilis ſunt. * Porro ſi naſus fractus fuerit, fracturæ modus
non unus eſt. Verum qui pulchris deligationibus gaudet circa intelligentiani, tum
in aliis multis damnum incurrunt, tum in fracturis circa naſum vel maxime. Ex de-
legationibus enim hæc maxime varia eſt, & quæ plurimas aſcias habeat, & in-
terruptiones, ac interceptiones citis maxime varias rhombiformes. Sicut igitur
dictum eſt, qui nulla intelligentia præditi aggreſſionis ſtudio tenentur, ultro ſe offe-
runt ad naſum fractum deligandum. Una itaque alteraque die lætatur medicus, gau-
det quoque is, qui deligatur. Deinde cito quidem is, qui deligatur, fatiatur. Noxia e-
nim, & moleſta eſt geſtatio. fatis autem eſt, medico offenſale, quod naſum varie deli-
gare novit; facit autem talis deligatio omnia contra quam convenit. Partim enim, qui pro-
pter fracturam ſimi ſunt, ſi ſuperne quis magis premat, ſimiores nimirum ſient; partim
vero, quibus naſus hæc, aut illæc diſtorquetur, aut circa cartilaginem, aut ſuperius, pa-
lam eſt, quod neque ipſis ſuperne deligatio proderit, ſed etiam magis lædet. Non eoin
ita congruit ſplenis altera naſi pars, quamquam neque hoc faciunt deligantes. Proxi-
me vero deligatio reſiſtere mihi videtur, ſi juxta medium naſum circa acutam par-
tem conſula caro ad os fuerit, aut etiam os parum, & non multum contuſum ſit.
Talibus enim naſus callo obducitur, & aliquando aſperior evadit. Sed tamen neque
his deligatio multo negotio opus habet, ſi modo etiam deligare oportet. Suffi-
cit autem ſuper contuſionem ſplenium inœratum extendere. Poſtea velut ex
duobus initiis deligatio ſit, ita ſemel linteum circumdandum eſt. Optima ta-
men curatio eſt per ſarinam triticæam hornam, locam, viſcoſam, ſubactam, modi-
cam, ita ut talia ex illa velut cataplaſmate integantur. Si igitur triticæa ſarina
bona fuerit, & tractu facilis, ea ad omnia huiuſmodi uti oportet. Si vero non ſa-
cilis tractu ſit, modicam mannâ leviffime tritam, & aqua dilutam, cum ſarina
ſubigere oportet, aut gummi parum ſimiliter ammiſcere. * Quibuſcumque igitur
naſus fractus eſt, ut deorſum, & in ſinum vergat, ſi quidem ex anteriore parte ju-
xa cartilaginem ſubſidat, fieri poteſt, ut aliquid, quod ipſum dirigat, in nares in-
datur. Sin minus, omnia talia digitis in nares injectis dirigere oportet, ſi id fieri
datur. Sin minus, craſſum ſpecillum non in anteriorem narum partem digitis inde-
re oportet, ſed qua parte naſus ſubſidit; extrinſecus autem ab utraque parte na-
ſum apprehendere, ſimulque cogere, ac ſurſum ducere. Et ſi quidem valde io ante-
riore parte fuerit fractura, fieri poterit, ut aliquid infra nares indatur, velut jam
dictum eſt, nimirum linteæ raſura, aut aliud quid huiuſmodi, linteo involutum, aut
porius in corio Carthagenenſi conſutum, ea figura, quæ congruat loco, cui incumbet.
Si vero ulterius facta fuerit fractura, fieri non poteſt, ut aliquid indatur. Si
enim in anteriore parte moleſta eſt geſtatio, quomodo non ſit in inferiore? Primum

- igitur & intrinsecus conformando, & forinsecus non parcendo, ad pristinam naturam reducere, ac dirigere oportet. Valde enim conformatur nasus fractus, maxime quidem eadem die, si in unum, paulo postea. Verum sequenter agunt medici, & 200 levis quidam convenit primum contingunt. Injicere enim manus hinc atque illinc iuxta naturam nasi quamvis oportet, ex infernis sursum cogendo, & sic quammaxime erigere, una cum interna directione etiam extrinsecus dirigendo. Postea ad hanc nullus talis medicus est, si studium adhibere, ac tolerare vult, velut ipsius digiti indices. Hic enim maxime secundum naturam sunt. Utrumque enim digitum injicere, eoque totum nasum 205 firmare oportet, atque ita in quiete habere, si quidem fieri posset, semper donec corroboretur; sit minus, plurimo tempore, velut dictum est. Quod si fieri nequeat, aut puer, aut aliqua mulier hoc faciant. Molles enim manus esse oportet. Sic enim quamvis opeine nasus curari poterit, ubi non in obliquum, sed ad infernam partem aequaliter subsidat. Ego igitur nullum unquam nasum vidi, qui sic fractus dirigi non potuisset, si statim ita cogeretur proutquam callus obduceretur, si modo quis recte curare velit. 210 Verum homines ut ne deformes fiant, multo quidem pretio coemerint, studium autem adhibere non sciunt, simulque non tolerant, si non dolore vexentur, aut mortem timeant, quamquam brevi tempore nasus callo obducatur, decem enim diebus corroboratur, si non corruptio insuper accedat. * Quibuscumque veroos in obliquum frangitur, curatio quidem eadem est, Verum directionem non aequalem utrinque facere oportet, sed quod 215 inclinatum est, extrinsecus cogendo ad naturam compellere, & in nares facta contractione, ea qua intro repunt impigre dirigere, donec correctae fuerint, ita ut ejus probe memineris. Quod si non statim corrigantur, fieri non possit, ut nasus non distortus fiat. Postquam autem ad naturam reduceris, digitos plures, aut unum dignum ad locum 220 admovere oportet, qua parte eminebat, atque ita aut ipsum, aut alium quemdam sustentare, donec vulnus corroboratum fuerit. Sed & in nares parvum digitum unmittere oportet, & alias atque alias impellendo ea qua inclinata sunt dirigere. At si quid inflammationis his accedat, farina subacta uti oportet, & tamen incumbente etiam farina digitos similiter admovere opus est. Si vero iuxta cartilaginem in obliquum fractus sit, necesse est summum nasum distortu. Talibus igitur in summam nares aliquid, quod 225 dirigat ex relatis, aut quod his simile sit, indere oportet. Poterit autem quis multa idonea invenire, quae neque odorem habeant, neque alias lenia sint. * Ego vero quandoque pulmonis ovilli frustum defectum indidi. Hoc enim forte obtingebat. Nam spongiae inditae humiditates suscipiunt. Postea Carthagenensis corii suamam magni 230 digiti latitudine, aut prout contulerit relictam, extrinsecus ad nasum inclinatum agglutinare oportet, & deinde hoc corii lorum, prout contulerit, extendere. Paulo tamen amplius extendere convenit, quo erectus, & absolute directus sit nasus. Longum autem sit hoc lorum, ut postea infra autem abductum circum caput obducatur; & licet quidem lori extremitatem ad frontem agglutinare, licet etiam longius ducere, & deinde capiti obductum deligare. Hic inodus simul iustam directionem habet, & simul ad inoderationem faciendum promptus est, ut si quis magis, aut minus nasi inclinationem ad contrarium facere velit. Nam quibus in obliquum nasus 235 frangitur, eos in reliquis, velut relatum est, curare oportet. Plurimis tamen insuper opus est, ut inclinationis in contrarium gratia, lorum ad summum nasum agglutinetur. 240 * Quibuscumque vero cum fractura etiam ulcera adsint, eos ea propter turbari non oportet. Verum super ulcera ceratum picatum imponere, aut ex emplastris aliquod cruentis vulneribus idoneum. Facilia enim curari talia sunt. Similiter etiam, si ossa discessura sunt. Primam directionem impigre facere oportet nihil omitendo, & directionem per digitos etiam postero tempore, ita ut laxius quidem admoveas, admoveas tamen. Ex omnibus enim corporis partibus nasus facillime conformari potest. Caterum lororum agglutinatione, ac in contrarium inclinatione uti omnino nihil prohibet, siue ulcera affuerint, siue inflammatio. Nullam enim molestiam exhibent. * At vero si auris fracta fuerat, deligationes omnes inimicae 245 sunt. Neque enim ita laxam quis circumdare poterit. Si vero magis premat, majus malum operabitur. Nam & sana auri deligatione pressa, dolore, & pulsatione, & febre afficitur. Sed & cataplasmata pessima quidem omnino sunt, quae gravissima sunt. Vtrum & alia pleraque omnia mala sunt, & abscessus indicant, & nucum ampliorem suggerunt, & deinde suppurationes noxias. His autem fracta auris minime opus habet. Proximum tamen locum habet, si quid imponi debet, farina viscosa, quam neque ipsam gravem esse oportet. Contingere vero quamminime conduit. Bonum enim aliquando medicamentum est, etiam nullum adhibere medicamentum, & ad aures, & ad multa alia. Vellicationem insuper, ac scalpuram vitare oportet. Corpus autem attenuare, & magis in quo periculum est, ne auri suppurent. Melius est quoque aham mollire. Si vero quis facile vomat, ex inmodata aliqua purgatione vomitum faciat. At si ad suppurationem deveniat, cito quidem aperire non oportet; multa enim 260 ex his, quae suppurari videntur, quandoque refoventur, etiam non dum quis ullum cataplasma impoluit. Si vero quis aperire cogatur, celerrime quidem sana fit, si in ulteriorem partem perhar. Illud tamen certo scire expedit, quod mutila fiet auris, & minor altera, si perusta fuerit. Si vero non in ulteriorem partem peruratur, tumidam partem non 265 valde parva sectione incidere oportet. Sub crassiore enim cute pus reprimitur, quam quis puta-

putaverit. Verum ut in summa dicam, alia quoque omnia mucosa, & mucus facientia, utpote quæ sunt viscosa, ad contactum sub digitis hac atque illac cito dilabuntur; 36 & propterea sub crassiore cute medici talia inveniunt, quam putarint. * Nam & aliquas nervorum contortiones, ganglia appellatas, quæ sane laxæ, ac fluddæ sunt, mucosamque carnem habent, multi aperiunt, humorem in talibus se inventuros esse putantes. Medicus quidem igitur sententia sua fallitur, verum rei huiusmodi nullum ex aperture accedit detrimentum. Qui vero aquosi loci sint, aut mucosæ pleni, & in quibus locis singula si aperiantur mortem asserant, aut etiam alia detrimenta indicant, de his in alio opere scribetur. Quum igitur incidere quis autem, ab omnibus quidem cataplasmatibus, & ab omni linamentorum usu abstinere oportet. Curare autem vel emplastro 275 aliquo cruentis vulneribus idoneo, vel aliquo alio, quod neque gravitatem, neque dolorem inducat. Si enim catrilago denodari inceperit, & subsidens purulenta, aut mucosa habuerit, molestum est. Fit autem & hoc propter illas curationes. Ceterum omnium eorum, quæ recruduerunt, perustio in ulteriorem partem sufficientissima medela est.

S E C T I O III.

37 * V Erticula vero spinæ quibuscumque in gibbum trahuntur ex morbis, pleraque ut solvantur, fieri non potest. Insuperque & quæ supra septi transversæ juncturam, ac connexionem gibba sunt. Quæ vero infra, eorum aliqua solvunt varices in cruribus sientes. Magis autem hæ varices, quæ in vena juxta popitem sunt, quibuscumque gibbositas contigerit, eam solvunt. Funt autem & in vena circa inguina. Jam vero quibusdam etiam dysenteria diuturna solvit. Et quibus quidem gibba sit spina diu pueri sunt, priusquam corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus juxta spinam coaugeri non solet. Sed crura quidem, ac nianus perficiuntur, illæ vero partes defectuosiores sunt. Et quibus spina sepeum transversum gibbositas est, his & costæ in amplitudinem augeri non solent, sed in anteriorem partem; & pectus acutum fit, sed non latum, ipsique & difficulter spirant, & stridulam faucium asperitatem habent. Nam ventriculi, qui spiritum suscipiunt, ac emittunt, minorem amplitudinem habent. Sed & juxta magnum verticulum cervicem repandam habere coguntur, ut ne caput ipsi pronum sit. Multam igitur angustiam faucibus exhibet etiam hoc os intro vergens. Nam & his, qui natura recti sunt, spirandi difficultatem hoc os inducit, si intro vergat, donec repressum fuerit. Ob talem igitur figuram ejusmodi homines eminentis gutturis magis, quam sani apparent; & tuberculis circa pulmonem duris, ac erudis plerumque tales affecti sunt. Nam & gibbositas occasio, & discentio plerisque propter tales collectiones fit, cum quibus vicini nervi 15 communionem habent. * Quibus vero infra septum transversum gibbositas est, horum quibusdam morbi rheum, ac vesicæ accedunt. Sed & abscessus ad suppuracionem, & circa laterum mollitudines, & inguina diuturni, ac ægre curabiles; & nervi horum gibbositates solvunt. Coxæ vero his magis exearnes sunt, quam his quibus superne gibbositas contigit. Universa tamen spina his longior est, quam superne gibbosis. Pubes vero, & barba tardior, ac imperfectior. Sed & infœcundiores hi sunt 25 quam superne gibbosi. At vero quibus jam aucto corpore gibbositas facta fuerit, his palam præteritis tunc morbi indicationem gibbositas facit, per tempus tamen, aliquod ex isdem significationem de se plus, aut minus præbet, quemadmodum etiam in pueris. Minus autem maligne in totum talia se habent, & multi sane jam facile, ac sano modo gibbositatem sustinuerunt usque ad senectutem; & maxime hi, quibus ad 30 carnositatem, ac pinguitudinem promotum fuerit corpus, pauci tamen talium sexaginta annos transgressi sunt, plerique vero brevioris vitæ sunt. Quibusdam etiam in laras, aut hæc, aut illac, verticula obliqua sunt. Et omnia, aut pleraque talia propter collectiones intra spinam sunt. Quibusdam una cum morbo etiam figuræ insuper conferunt, ad quas reclinari consueverunt. Verum de his in diuturnis pulmonis morbis 35 dicitur. Illic enim de his, quæ futura sunt, pulcherrimæ prænotiones habentur. * Porro quibus ex casu spina gibba fit, horum sane pauca superantur, ita ut dirigi possint. Nam quæ in scala sunt extensiones, nihil direxerunt, quod ego sciam. Uruntur enim ipsa maxime hi medici, qui multitudine famam occupantur. Apud tales enim hæc in admiratione sunt, si aut pendentem, aut projecti aliquem, aut quæ his similia sunt videant, & hæc celebrant semper, neque ipsis curæ est, quale quid eveniat ex hac aggrèssione, sive bonum id sit, sive malum. Medici tamen, qui talia studio habent, quos sane ego novi, imperiti sunt. Inventum equidem verus est, & laudo sane vehementer eum qui prius excogitavit & hoc machinamentum, & quodvis aliud secundum naturam inventum. Nihil enim despero, si 45 quis recte constructum concitiat, fieri posse, ut quædam dirigantur. Ipse tamen omnia huiusmodi hoc modo curare erubet, propterea quod impostorum magis tales sunt modi. Quibus igitur prope cervicem gibbositas fuerit, his verissimile est, has in caput extensiones minus prodesse, parvum enim pondus habet caput, & summi humeri dorsum vergentes. Verum tales verissimile est magis dirigi posse, 50 si in pedes concutiantur. Ita enim major propensio ad huiusmodi fieret. Quibus

- autem magis inferius gibbositas est, hos par est ut magis in caput concutiantur,
 * Si quis igitur concutere volet, recte sane hoc modo preparare poterit. Scalam
 coriaceis, aut laneis pulvinaribus internerere oportet probe alligatis, paullo
 85 *85* plus & in longitudinem, & in utramque partem, quam quantum corpus hominis occu-
 parit. Deinde hominem supinum supra scalam reclinare, & postea pedes quidem
 alligare juxta malleolos ad scalam non disparatos, vinculo quidem satis valido, ve-
 rum molli. Alligare vero etiam oportet infra & supra utrumque genu, itemque circa co-
 xas. Circa laterum autem mollitudinem, & circa pectus laxas fascias circumdare, ita
 90 *90* ut ne impediant concussionem. Manu vero ad costas extensas, ad corpus appli-
 care, & non ad scalam. Ubi vero hæc præparaveris, scalam ita ad turrim aliquam
 altam, aut ad domus lacunar attrahere oportet. Locus autem, in quo concussionem
 facis, renitens sit. Eos vero, qui extendunt, probe doctos esse convenit, quo æquali-
 ter, & probe, & ex æquilibrio, ac repente demittant, ut neque scala in alteram par-
 95 *95* tem repens ad terram deveniat, neque ipsi proni sint. Quod si tamen a turri, aut
 malo defixo carchesium habente, quis demittat, adhuc melius preparabit, ita ut ex
 trochlea aut asella laxatis instrumentis ac funibus demissio fiat. Verum injunc-
 tum est de his longius verba facere, attamen ex his structuris maxime quis concuti
 poterit. Si vero valde superne fuerit gibbositas, & concutere sit opus, omnino
 100 *100* in pedes id faciepiendum est, velut dictum est. Ita enim major propensio ad hæc con-
 tingit. Et firmare quidem oportet juxta pectus ad scalam foris deligando, juxta
 cervicem vero fascia quam laxissima, directionis saltem gratia. Sed & ipsum caput ju-
 sta frontem ad scalam alligare oportet, manus autem porrectas ad corpus alligare,
 non ad scalam. Reliquum vero corpus indeligatum esse oportet, nisi quantum satis est
 105 *105* directionis gratia, alia atque alia laxa fascia circumdandum esse. Verum considerandum
 est ne concussionem impediant hæc vincula. Crura vero ad scalam quidem ne de-
 ligentur, sed inter se, ita ut secundum spinam in directum vergant. Atque hæc qui-
 dem hoc modo facienda sunt, si omnino opus fuerit in scala concussionem fieri. Tur-
 pe tamen est & in omni arte, & non minime in medicina, multam turbam, & mul-
 110 *110* tam offentionem, & multum rorem concitare, & deinde nullam utilitatem as-
 ferre. * Oportet autem primum spinæ naturam qualis est cognoscere, ad multos
 enim morbos ea opus fuerit. Nam qua parte ad ventrem vergit, verticula intus
 inter se paria sunt, & inter se ligata vinculo mucoso, ac nervolo, de cartilaginibus
 exortu usque ad medullam. Alii vero nervi nervosi perpetui annexi, hinc atque illinc
 115 *115* juxta ipsa porriguntur. Verum venarum & articularum communitates, in alio sermo-
 ne declarabuntur, quot & quales sint, & unde proficiantur, & in quibus qualia
 possint. Itemque quibus involuctis ipsa medulla interta sit, & unde profectis, &
 ubi desinentibus, & quibuscumque communione habentibus, & qualia potentibus. Ac
 in ulteriore parte in articulis verticula inter se cardinis in modum conferta sunt.
 120 *120* Nervi vero communes juxta omnia & in externis, & in internis partibus porri-
 guntur. Et processus ossis ad externam partem, ab omnibus verticulis unus de uno-
 quoque, tum a majoribus, tum a minoribus. In his autem processibus cartilaginum
 appendices, & ex illis nervorum progerminatio, cognata ac consimilis extremis ner-
 vis. Costæ vero annexæ sunt, ad internam partem magis, quam ad externam capitibus
 125 *125* vergentes, ad unumquodque autem verticulum adarticularæ sunt. Curvisimæ autem
 sunt hominis costæ oborto modo. Intermediæ vero partem costarum, & ossium, de ver-
 ticulis procedunt, explent utrinque muscoli, a cervice initio sumpto usque ad se-
 130 *130* pti transversæ annexionem. * Ipsa autem spina secundum longitudinem rectobliqua est,
 a sacro quidem osse usque ad magnum verticulum, juxta quod crurum annexio depen-
 det, gibbosa est. Nam & vesica, & genitura, & intestini recti laxa pars in hac par-
 te constituta sunt. Inde vero usque ad septi annexionem in directum repanda est, &
 musculus adnatus habet solus hic locus, ex internis partibus, quos lumbarios vocant.
 Ab hac autem parte usque ad magnum verticulum, quod supra supernas humeri partes
 135 *135* est, e directo gibbosa est, imo magis esse videtur quam est. Nam spina mediæ sui par-
 te altissimas ossium propagines habet, hinc autem atque illinc, minores. Ipse vero
 cervicis articulus repandus est. * Quibuscumque igitur gibbositates juxta verticu-
 la sunt, his expulsio magna a connexionē abrupta, unus aut plurium verticulorum,
 non ita multis, sed paucis contingit. Neque enim talia vulnera fieri facile est, neque
 ad externam partem expelli facile est, si non ex anteriore parte, fortī aliqua res per
 140 *140* ventrem quis vulneratus fuerit; sic autem neque perierit: aut nisi quis ex alto loco de-
 lapsus, coxis, aut humeris impigerit. Sed & hic utique morietur, etiam si statim non
 intreat. At ex posteriore parte ad internam, hujusmodi expulsionem fieri non est
 proclive, si non in immensum grave aliquid onus irruat. Nam ex ossibus, quæ for-
 nas enata sunt, unumquodque ejusmodi est, ut prins ipsum frangatur, quam magnam
 145 *145* intro inclinationem faciat, ita ut & ligamenta, & articulos inter se alternatos, ac ar-
 ticularos violet. Præterea & spinalis medulla affigeretur, si ex modico loco inflex-
 ionem haberet, ubi verticulum tali expulsionē exilisset; & verticulum, quod exilisset,
 & spinalem medullam utriusque premeret, si non etiam abrumperet. At ea pressa, ac in-
 terepta, multarum & magnarum & nobilium partium torporem induceret. Quare neque
 150 *150* curæ foret medico, quomodo verticulum dirigat, ac coarctet, quam multa, & violenta
 alia

ea alia mala adsint. Itaque si tale contingat, palam est, quod neque concutendo, neque alio quodam modo reponi possit, nisi quis dissecto homine, & manu in ventrem injecta inquisitionem faciat, & ex interna parte ad externam manu retrudat, atque hæc in mortuo quidem fieri possent, in vivo autem non ita. * Cur igitur hæc scribo? Quia sunt quidam, qui putant se curasse homines, quibus intro exciderint verticula articulos punctus transgressa; & sane facillimam hanc distortionem esse, ut quis inde convalescat, aliqui censent, eamque nulla repositione opus habere, sed sua sponte talia sanescere. Ignari autem multi sunt, & lucro hoc habent quod ignorant. Persuadent enim alios. Verum falluntur hi hac de causa. Spinam, quæ in spina ipsa eminet, verticula ipsa esse putant, quia unumquodque ex his ossibus ad contactum rotundum apparet, ignorantes, quod hæc ossa sunt ea, quæ a verticulis enata sunt, de quibus paullo ante dixi. At verticula longe magis in anteriorem partem absunt. Angustissimum enim ventrem ex omnibus animalibus homo habet, quantum ad magnitudinem arctinet, a posteriore ad anteriorem partem, insuperque etiam iuxta pectus. Quum igitur horum supereminens ossium aliquid vehementer fractum fuerit, sive unum, sive plura, ea parte humilior locus redditur, quam hinc atque illinc: & propterea decipiuntur, putantes verticula intro abisse. Decipiunt autem insuper ipsos etiam figuræ vulneratorum. Si enim inclinare se conantur, dolent, quum ea parte qua vulnerati sunt, citius circumtenta; & simul ossa fracta ita magis corpus affligunt. Si vero in repandum recurvantur, melius habent. Nam & cutis iuxta vulnus laxior sit, & ossa minus affligunt. Sed & si quis ipsos contingat, ea parte repandi cedunt, & locus vacuus, ac mollis hac parte ad contactum apparet. Hæc omnia relata insuper medicos decipiunt. Verum tales cito sani & illi si sua sponte sunt. Cito enim omnia ejusmodi ossa, quæ laxa sunt, callo obducuntur. * Obliquatur igitur spina etiam sanis iuxta multos modos, Nam & in natura, & in vi ita se habet. Sed & præ senectute, ac doloribus, Nam hæc colligandi vim habent. At gibbositates ex calibus contingentes plerumque sunt, si aut in costas innitatur, ac impingat, aut in humeros cadat. Necesse est enim foris apparere in gibbositate unum aliquid altissimum verticulum, minus vero ea, quæ sunt hinc atque illinc. Non igitur proficit multum ab aliis, sed parum, quum singula ægeratim concedant. Propter hoc igitur etiam spinalis medulla ejusmodi distortionem facile fert, eo quod circulari ipsi distortio contingit, non angularis. * Oportet autem fabricam instrumenti coactorii hujusmodi construere. Licet eundem lignum robustum & latum, incisuram oblongam habens, desodere. Licet etiam pro ligno, in pariete incisuram oblongam facere, quæ aut cubiti altitudine, aut proit congruum fuerit, a pavimento extet. Postea columnam quæneam, quadrangularem, obliquam ad parietem adiacere oportet, tanto spatio in medio telicto, ut aliquis pertransire possit, si forte opus sit. Et super columnam quidem, aut tunicas, aut aliud quid molle, quod tamen non multum cedat, insernere oportet, homini vero fomentum adhibere. Si vero admittat, ipsum etiam multa calida lavare. Deinde prorum extentum reclinare, & manus ipsius secundum naturam extentas ad corpus alligare. Postea vero loro molli satis lato, ac longo, ex duobus perpetuis inter se adversariis loris constanter, ex media ipsius parte, iuxta medium pectus quamproxime sub alas bis circumdare oportet; & quod superest de loris utrisque, iuxta alam circum humeros obvolvatur, & initia ipsorum ad lignum quoddam pistilloforme alligantur, ita ut congruat secundum longitudinem subiectæ columnæ, ad quam lignum illud pistilloforme apponere, & tenendo extensionem facere oportet. Tali vero quodam alio vinculo & supra genua, & supra calcanea alligato, initia item ad ejusmodi lignum alligare oportet. Postea autem alio loro lato, ac molli, & robusto, fasciæ formam habente, longitudinemque, ac latitudinem sufficientem, partem inter coxas & lumbos, quamproxime ad coxas, circumcirca fortiter deligare, atque ita tum hujus lori, tum aliorum duorum capita, ad lignum a pedibus extans alligare; & postea in hac figura hinc atque illinc, æqua simul inclinatione, simulque in directum extensionem facere. Nullum enim magnum malum talis extensio induxerit, si commode præparata fuerit, nisi quis de industria se extendendum exhibeat. At medicus, sive alius quicumque fortis & non impetuosus, imposita manus vola supra gibbum, & altera manu insuper alteri superimposita, deorsum cogat, animadvertione habita an in directum deorsum cogere oporteat, sive ad caput, sive ad coxas. Atque hæc coactio maxime innoxia est. * Sed & si quis infideat super gibbum, & attollendo se, dum ille distenditur, incuriat, innoxium est. Neque quicquam prohibet pede inscendere, ac gestari supra gibbum, atque ita sensim incutere. Ad hoc autem moderato faciendum idoneus quis fuerit ex his, qui in palestra adfueri sunt. Efficacissima tamen coactio est, si aut paries incisuram habeat, aut lignum defossum infra spinæ altitudinem incisum sit, quantum moderate habere videatur, ita ut tabula tiliacea, aut cujusdam alterius ligni, non tenuis, incisuræ induatur, & postea lineum quoddam multiplex, aut parvum quoddam coriaceum pulvinar super gibbum imponatur. Quam paucissima tamen imposita esse conducit, cavendi saltem gratia, ut ne tabula præ duritie dolorem aliquem importune inducat. Sit autem gibbositas & directio maxime incisuræ in pariete, quo quoque parte maxime extat, ea quam maxime tabula imposita premat. Ubi vero imposita fuerit, aliquis extremam tabulæ partem deprimat, aut duo hoc faciant, si unus non suffecerit; alii vero corpus secun-

- 190 secundum longitudinem, velut dictum est, extendant, partim hinc, partim illinc consti-
turi. Potest etiam alellis extensio fieri, aut iuxta lignum defossis, aut in ipso ligno
afellorum postibus constructis, sive erectos velis utrinque paululum supereminentes,
sive hinc atque illinc iuxta ligni verticem. Hæ coactiones moderationem admittunt,
ut & vehementissime, & moderate fieri possint. Talem autem vim habent, ut si quis
etiam ad perniciosas tales necessitates adhibere velit, & non ad curationem, tunc
quoque multum possint. Nam si quis secundum longitudinem hinc atque illinc saltem
sic extendat, & nullam aliam necessitatem addat, tamen sic etiam extensionem facere
poterit. Sed & si non extendat, & tabula solum ita quis utatur, etiam sic sufficienter
deorsum cogere poterit. Bonæ autem sunt huiusmodi violentiæ, quibus & vehe-
mentioribus & debilitioribus uti licet, usu ipsorum prout quisque vult moderato. Et
fane etiam secundum naturam coactionem faciunt. Nam ea, quæ extant, ad locum
suum redire cogit depressio. Quæ vero præter naturam coiverunt, ea extendunt ex-
tensiones secundum naturam. Proinde neque meliores his necessitates ego habeo,
neque iustiores. Rectitudo enim extensionis iuxta ipsam spinam, inferne & iuxta os
facrum appellatum, nullam ansam habet; superne vero iuxta cervicem & caput, ha-
bet quidem ansam, sed in speciem indecora est; & si hac parte extensio fiat redundans,
etiam alias læsiones inducere poterit. * Experimentum autem aliquando feci, ut ho-
mine supino extenso, utrem non inflatum sub gibbum subderem, & postea tolle ex
officina fabri in subjectum utrem immisso inflarem. Verum res mihi non successit.
180 Quam enim bene extenderem hominem, vincebatur uter, & non poterat status ali-
quam coactionem facere. Sed & alias hæc res prompta erat ad dilapsum, nimirum
quum in idem & hominis gibbositas, & utris pleni incurva turgiditas cogantur. Quum
autem rursus non valde extenderem hominem, uter quidem præ statu incurvus turge-
bat, homo vero omnino magis, quam conducebat, repandus fiebat. Scripsi autem hoc
de industria. Pulchrum enim est etiam ea discere, quæ in experimentum assumpta suc-
cessu caruerunt, & cur successum non habuerunt. Quibusculumque poro verticula in-
tro obliquantur aut ex casu, aut gravi aliqua re illapsa, his nullum quidem verticu-
lum extat plerumque ita multum ab aliis. Si vero extiterit multum, aut unum, aut
plura, mortem inducunt, velut etiam antea dictum est. Circularis etiam hæc, & non an-
gularis emotio existit. Urinæ igitur talibus magis supprimuntur, itaque alvi egestio,
quam his, qui extra gibbosi sunt; & pedes, ac tota crura magis perfrigerantur, & lethala
sunt hæc magis, quam illa quæ dixi. Sed & si superstites evadunt hi, magis proliam
urinam habent, & cruribus impotentiores, ac torpidiores fiunt. Si vero etiam in su-
perna parte magis repandi fiant, torus corporis impotentia, ac torpor accedit.
175 Atque ego sane nullam machinam habeo, per quam talia in idem restitui possint, si
non alicui concussio per scalam opem tulerit, aut etiam alia quedam eiusmodi cura-
tio, aut extensio, qualis est ea, quæ paullo antea telata est. * At coactionem una cum
extensione nullam habeo, quæ sane fieri ita posset, velut in gibbo tabula coactionem
faciebat. Quomodo enim quis ab anteriore parte per ventrem coactionem facere pos-
sit? Neque enim fieri hoc potest. Sed neque tussis, neque sternutationes uliam vim
habent, ut extensioni auxiliari possint. Nec vero status immissio in ventrem que-
quam efficere poterit. Quin & si magnæ cucurbitæ affigantur, attractionis nimirum
gratia verticulorum intro repentium, magno hoc mentis errore contingit. Propellunt
enim magis, quam attrahunt, & neque hoc animadvertunt hi, qui ipsas affigunt. Quan-
to enim magis ipsas quis adigit, tanto magis repandi sunt hi, quibus affiguntur, cute
simil fursum coacta. Possem autem, & alios concussuum modos, quam hi sunt quos
antea tetuli, exponere, quos sane affectioni magis convenire quis putare possit,
170 verum non valde ipsis fidem habeo, & propterea non scribo. * In summa igitur do-
his quæ relata sunt, ita acervatim constituere oportet, quod ea quidem, quæ in repan-
dum emota sunt, lethala sunt, ac noxia; quæ vero in gibbum, innoxia in totum,
quantum ad mortem, & urinæ suppressionem, ac torporem attinet. Non enim rivos, qui
sunt in ventre, gibbositas ad externam partem intendit, neque fluidos esse prohibet.
Repanditas vero ambo hæc facit, & ad alia multa hæc accedunt. Nam multo plu-
res & cruribus, & manibus impotentes fiunt, & corpore torpescent, & urinæ his
165 supprimuntur, quibus gibbositas quidem neque exta, neque intro extiterit, verum in re-
ctitudinem spinæ vehementer concussi fuerint. Quibus vero gibbositas extat, hi mi-
nus talia perpetiuntur. Multa vero etiam alia in medicina quis videre poterit, ex
quibus ea quidem, quæ sortia sunt, innoxia sunt per se totam morbi iudicationem in-
ducentia; quæ vero debiliora, noxia, ita ut & diuturnos morbos progenerent, &
160 cum reliquo corpore ampliore communionem habeant. * Nam & costarum fractu-
ra eiusmodi quid perpetiunt. Quibus enim fracta fuerit costa una, aut plures, ve-
lut plurimis frangitur, ita ut ossa ad internam partem non vergant, neque denudata
sint, ex his pauci jam febriunt. Sed neque sanguinem multi iam experient, ne-
que suppurati multi fiunt, neque curatione medicamentorum ex illis linamentis opus
155 habent, neque ossium corruptiones accedunt, & victus vulgaris sufficit. Si enim fe-
bris continua ipsos non corrumpit, etiam vasa per ineam hi vacua fieri deterius
est, quam si non vacua fiant. Maiorem item dolorum, ac febrem & trissem inducit. Mo-
derata enim ventris repletio, costarum sit directio, Verum vacuatio pendentes costas
facit,

facit, & hæc dependentia dolorem inducit. Extrinsecus autem vulgaris deligatio talibus sufficit, ita ut cerato, & splenius, & linteis plana deligatio placide firmetur, 160
aut etiam linteum quiddam insuper imponatur. Corroboratur autem colla diebus viginti. Celeriter enim his ossibus calli obducuntur. * At conrussa circa costas carne, aut ex plaga, aut ex casu, aut renisu, aut alio quopiam ejusmodi multi jam multum sanguinem spierunt. Rivi enim in molli ad unamquamque costam extenta parte, & nervi, a principalissimis in corpore partibus progressus habent. Multi itaque jam 165
tissiculosi, & tuberculosi, ac suppurati facti sunt, & linamentis opus habuerunt, & colla ipsi corruptionem sentit. Sed & quibus nihil tale accessit, carne circa costas conrussa: tardius tamen dolor in ipsis sedatur, quam in his, quibus colla fracta fuerit: & in talibus vulneribus locus dolorum recidivas magis habet. Proinde aliqui tales noxas magis contemnunt, si colla ipsis fracta fuerit. Quam 270
& curatione exactiore tales indigent, si modo sapiant. Viduum enim contrarium esse conducit, & corpore quammaxime quiescere, & a venere abstinere, eduliusque pinguibus, & fauces exasperantibus, ac fortibus omnibus, venamque in cubiti flexura secare, & quammaxime silere. Deligare vero locum contusum conducit splenius non multiplicibus, sed multis, & multo latioribus tota contusione, 275
& cerato sublinere, & linteis latis cum fasciis latis, ac mollibus deligare, & moderate firmare: ut deligatus non valde se compressum esse dicat, neque rursus laxum. Initium autem sumere debet, qui deligat, in ipsa contusione, atque isthic maxime firmare: facienda vero est deligatio velut a duobus initiis, deligandamque, ut ne circumfusa sit citis circa costas, sed æquilibris. Deligandum autem 280
aut singulis, aut alternis diebus. Præstat autem, & alvum mollire levi aliquo medicamento, cibi saltem evacuandi gratia, & ad decem quidem dies attentare. Postea vero corpus tenuitrire, ac tenerum facere. Quamdiu vero attenuas, deligatione magis firmata utendum est. Quum autem ad teneriudinem deducis, laxiore. * Et si quidem sanguinem ab initio expuerit, quadraginta dierum curationem, ac deligationem facere oportet. Si vero sanguinem non spuat, sufficit viginti diebus ut plurimum curatio. Verum ex robore vulneris tempora coniectare oportet. Qui porro tales contusiones neglexerint, etiam si aliud nihil majoris mali ipsis contingat, tamen locus contusus mucosiotem carnem habet, quam antea habebat. Ubi vero tale quippiam relinquitur, & curatione non probe 290
expugnatur, deterius quidem est, si juxta ipsum os mucositas relicta fuerit. Neque enim caro amplius similiter os contingit, & os ipsum morbosius redditur, & corruptione ossis diuturnæ multis jam ex hujusmodi occasionibus factæ sunt. Sed & si juxta os non fuerit, verum ipsa caro mucosa sit, attamen etiam sic recidivæ, ac dolores alias atque alias sunt, si quis forte corpore ægrotaverit. * Quapropter deligatione uti oportet bona, similique multum conveniente, quoad ea humoris effusio, quæ in contusione facta est, resiccat, ac resorbeat, locus autem carne sana augeatur, & ossis quoque caro augeatur. * At quibus ex neglectu venustatem contraxerit, ita ut locus sit dolorosus, & caro submucosa, his nullo medela optima est. Et si quidem ipsa caro mucosa fuerit, usque ad os urere oportet, non tamen ut os percalefcat. Si vero inter costas mucositas fuerit, ne sic quidem in superficie urere oportet, cavere tamen ne in ulteriorem partem peruras. Si vero ad os ipsum contusio esse videatur, & sit adhuc recens, & nondum os corruptionem sentiat, si quidem parva admodum fuerit, sic urere oportet, veluti dictum est. Si vero oblonga fuerit juxta os contusionis elevatio, plures cristas in cute oportet. Cæterum de corruptione costæ, una cum eorum, qui 305
linamentis opus habent, curatione dicitur. * Si vero femoris articulus ex coxa exciderit, Excidit autem juxta quatuor modos, intro quidem sæpe, foras autem præ aliis sæpe. Verum in posteriorem, ac anteriorem partem excidit quidem, sed raro. Quibus igitur intro excesserit, his longius apparet crus, si ad alterum comparetur, atque hoc merito propter duas causas. Nam os, quod a coxa procedit, & sursum ad pectinem fertur, fundamentum sit capitis femoris, & articuli cervix in acetabulo vehitur, & nates forinsecus cavæ apparent, utpote quum intro cesserit femoris caput. Et rursum summa femoris pars juxta genitum extra repere cogitur, Tibia item, & pes, eodem modo. Quum igitur foras 315
repat pes, medici ob imperitiam sanum pedem ad hunc adhibent, & non hunc ad sanum, & propterea multo longius læsum crus apparet, quam sanum. Multis autem etiam aliis locis talia sinistra intelligentiam habent. Nec vero scdere juxta inguen similiter, ut sanum possint. Sed & si femoris caput in intersemitæneo contingatur, palam extrubere competitur. * Signa igitur hæc sunt in his, quibus femur intro excidit. Quibus igitur articulus elapsus non fuerit repositus, sed aut frustra tentatus est, aut neglectus, his & ambulatio per cruris circumvolutionem, velut in bobus fit, & plurima vexatio ipsis in sano crure contingit, & coguntur, juxta lateris mollitudinem, aut juxta elapsum articulum, muti, ac obliqui esse. Juxta sanum vero crus, nates ad externam partem rotundæ esse coguntur. Si quis enim sani cruris pede extra ambularet, protruderet utique reliquum corpus, ut ad læsum crus veheretur. Læsum autem vehere hoc non

- non poterit, quomodo enim posset? Cogitur igitur sic fani cruris pede intro ambulare, & non extra. Ita enim maxime vehit sanum crus & suum ipsius, & lēsi cruris partem corporis, utriusque incumbentem. Quam autem juxta lateris mollitudinem, ac iuxta articulum cavetur, parvi apparent, & baculo inniti coguntur a latere juxta sanum crus. Hac enim parte sulcimento opus habent. Ad hanc enim & nates repunt, & in hac corporis pondus vehitur. Cognuntur item se inclinare. Manum enim, quae est a parte cruris lēsi, ad obliquum semur firmare coguntur. Non enim potest lēsum crus vehere corpus, in crurum permutatione, si non detineatur, dum ad terram premitur. In his igitur figuris esse coguntur hi, quibus intro elapsus, non fuerit repositus articulus, homine non praemeditante, ut quamfacillime sit figuratus. Sed ipsa haec calamitas ex praesentibus ea, quae facillima sunt, eligere docet. Nam & qui illeus habent in pede, aut tibia, non omnes crure valde ingredi possunt; & infantes sic iter faciunt, extra enim ingrediuntur lēso crure. Et duplex hicrum consequuntur. Duplici enim corpus habent. Nam & corpus non similiter vehitur in eo crure, quod extra ingreditur, sicut in eo, quod intro. Non enim secundum rectitudinem ipsi incumbit pondus, sed multo magis ei, quod subingreditur. Ipsi enim e dire-
- 345 cto incumbit pondus tum in ipsa ambulatione, tum in crurum permutatione. In hac enim figura sanum crus celerrime supponere poterit, si eo quod lēsum est, exterius; sano interius ingrediat. Verum de quo nunc sermo est, bonum est, ut corpus ipsum sibi ipsi facillimas figuras inveniat. * Quibus igitur non-
350 dum perfectis ad augmentum, elapsus articulus non fuerit repositus, hic semur decuratur, & tibia, & pes. Neque enim ossa similiter in longitudinem augescunt, sed breviora sunt. Maxime autem femoris, Excarnē item & emulculatum, ac effeminatum, & tenuius totum sit crus, simul quidem propter privationem loci articuli, simul autem, quod eo uti non possunt, eo quod secundum naturam sitis non est. Ufus enim aliquis liberat ab effeminatione, liberat etiam ali-
- 355 quantum ab intercepo in longitudinem augmento. Maxime igitur laeduntur hi, quibus, dum in ventre sunt, hic articulus fuerit luxatus. Secundo loco hi, quibus valde infansibilis idem contigit. Minime vero hi, qui perfecti sunt, Quas igitur ambulationis perfectis contingat, dictum est. Quibus veto, dum infantes sunt, calamitas haec incidit, plerique ad corporis directionem tardi sunt, immo male ad sanum crus devolvuntur, manu, quae est ad sanum crus, ad tetrum se succientes. Sed & ex perfectis aetatis hominibus quidam, quibus haec calamitas contigit, ad ambulationem rectam guntantur. * Quicumque vero infantes hac calamitate preffi, recte educati fuerint, sano quidem crure in rectum utuntur, verum sub alam secundum sanum crus scipionem ferunt, aliqui etiam sub utramque alam. Crus autem lēsum elevatum habent, & tanta-
- 365 melius habent, quanto brevius ipsius lēsum crus fuerit. Sanum autem crus nihilo minus ipsis robustum est, quam si ambo sana essent. Effeminantur tamen omnibus talibus carnes cruris, & plerumque hoc magis perpetuntur hae, quae sunt ab externa parte, quam quae ab interna. Ceterum quidam fabulantur Amazonides masculam suam sobolem statim, dum infantes, sunt luxare, alias circa genua, alias circa coxas, quo nimirum claudi fiant, & masculum genus foemineo invidias non struat. Utuntur itaque his pro opificibus, ad cotiaris, aut fabrilis, aut alia sedentaria opera. An equidem vera haec sint, ego non novi; quod autem tales fiant, scio, si quis ipso statim, dum infantes sunt, luxet. Juxta coxas igitur magna differentia est, an extra, aut intro fiat luxatio. Juxta genua vero differentia quidem aliqua est, sed minor.
- 375 Modus autem utriusque claudicationis proprius est. * Decurantur enim magis hi, quibus extra luxatio facta est. Recti autem minus sunt, quibus intro luxatio contigit. Eodem modo etiam si juxta malleolum luxatio fiat, si quidem ad externam partem id contingat, mutili quidem sunt, verum stare possunt. Si vero ad internam, valde hi quidem sunt, minus autem stare possunt. At vero coactio ossium talis sit.
- 380 Quibus quidem circa malleolum tibiae os excessit, his pedis quidem ossa minime coauescunt; haec enim proxime ad vulnus sunt. Verum tibiae ossa augentur quidem non multo defectuolius, carnes tamen minuantur. Quibus vero juxta malleolum maaserit articulus secundum naturam, juxta geni autem excesserit, his tibiae os similiter coauescere non solet, sed brevius fit. Hoc enim proxime ad vulnus est. Pedis autem ossa minuantur quidem, sed non similiter, velut paullo ante dictum est, quia articulus circa pedem salvus est. Si vero ipso etiam uti possent, velut multo, minus adhuc pedis ossa hi minuerentur. * At quibus circa coxam luxatio contingit, hic femoris os non similiter coauescere solet: hoc enim proxime ad vulnus est; sed brevius sano fit. Tibiae tamen ossa non similiter hic augmenta desinuntur, necque ossa pedis, atque hoc ea de causa, quod femoris articulus, qui ad tibiam est, & tibiae articulus, qui ad pedem est, in sua natura manet. Carnes tamen minuantur hi totius cruris. Si vero uti crure possent, adhuc magis ossa augerentur, velut etiam prius dictum est, excepto femore, & minus excarnes essent. Multo tamen minus carnosius, quam hi, qui sani sunt, essent. Argumento autem, quod talia ita se habent, hoc est.
- 385 Quicumque enim brachio elapsus, mustelle cubito praedicti sunt, parvumque, ac macilentum brachium habent aut ex nativitate, aut etiam dum augescunt, priusquam perfecti evadant, galeam-

galeancones appellati, hi os quidem brachii breve habent, cubitum autem, & summam
manum paullo defectuosiores quam sunt, propter relaxas causas, eo quod brachium vul-
nerato articulo proximum est, ut ideo brevius factum sit. * Rursus autem cubitus pro-
pterea non similiter calamitatem percipit, quia brachii articulus, qui est ad cubitum, 400
in veteri natura manet. Et rursus manus adhuc longius abest a calamitate, quam eu-
bitus. Propter has igitur causas contingit, ut & ossa, quæ non coarcentur, non coar-
cescant, & quæ coarcentur, coarcescant. Caterum ad carnositatem, & manui, & bra-
chio multum profuerit, si quis manu laborando se fatiger. Quæcumque enim manuum
opera sunt, plurima ex ipsis Galeancones hæc manu operari conantur, velut alte-
ra possunt, & nihilo defectuosius, quam cum illa efficiunt. Non enim supra manus,
velut supra pedes, corporis vehi necesse est. Verum levia sunt ipsis opera. Propter
usum autem non minuitur carnes galeanconibus neque circa manum, neque circa eu-
bitum. Sed & brachium propterea aliquam opem sentit ad carnositatem. * Quum au-
tem coxa eluxata fuerit ad internam partem a nativitate, aut adhuc infanti, carnes i- 410
deo magis minuuntur, quam in manu, quod crure uti non possunt. Quod autem hæc hoc
modo se habeant, testimonium unum quoddam in paullo posterius referendis habebitur.
At quibus in exteriorem partem femoris caput excesserit, his erus brevius appa-
ret, si ad alterum extendatur, atque id merito. Non enim super os fundamentum sit
capitis femoris, sicut quum intro exiidebat, sed juxta os, quod inclinatum naturam 415
habet, in carne humida, ac cedente firmatur. & propterea quidem brevius appa-
ret. Intrinsecus autem juxta plechada, intermediam enim, ac inguinum partem, fem-
ur magis mutilum & exearne fit. Nares autem extrinsecus incurviores, utpote quum
extra femoris caput elapsum sit. Sed & superius apparent nates, atpote quum caro,
quæ isthæ est, femoris capiti cesserit. Summa vero femoris pars circa genu intro 420
reperere videtur. tibia item, & pes. Sed neque insectere velut sanum crus possunt. Et
signa quidem femoris extra elapsi hæc sunt. * Quibus igitur perfectis iam elapsus
articulus non fuerit repositus, his totum crus brevius apparet. In ambulatione autem
calcaneo terram pertingere non possunt. Verum pectore pedis in terra consistunt, ac
progrediuntur, parum autem ad internam partem summis digitis vergunt. At erus 425
laxum in his, multo magis corpus vehere potest, quam quibus ad internam partem ex-
cidit, partim quod caput femoris, & cervix articuli, quum natura obliqua sit, sub
multam coxæ partem subsistit, partim quod summus pes non ad externam partem in-
clinatus esse cogitur, sed prope est ad rectitudinem corporis, & tendit etiam interior.
Quum igitur semitiam, ac callem acceperit articulus, in carne ad quam elapsus est, & 430
caro villositatem contraxerit, doloris exors progressu temporis fit. * Quum autem do-
loris exors factus fuerit, possunt quidem alique baculo iter facere, si alias voluerint,
possunt autem & vehere corpus supra crus laxum. Itaque propter usum carnes talibus
minus effeminantur, quam illis, de quibus paullo ante dictum est. Effeminantur
autem aut plus, aut minus. Magisquam adhuc effeminantur plerumque juxta internam 435
partem, quam juxta externam. Plerique tamen ex his calcamentum sibi inducere non
possunt propter cruris inflexibilitatem. Quidam vero etiam hoc possunt. At quibus, dum
adhuc in ventre sunt, hic articulus fuerit luxatus, aut dum adhuc augetur, vi elap-
sus, non fuerit repositus, aut etiam præ morbo hoc articulus excesserit, ac luxatus fue-
rit: multa enim huiusmodi sunt: talium quibusdam si corruptionem senserit semur, sup-
purationes diuturnæ, & linamentis indigentes sunt, & aliquibus ossium denudatio-
nes. Similiter autem, & quibus corruptionem femoris os sentit, & quibus non sentit,
multo brevius fit, & velut sanum coarcescere non solet. Tibiæ tamen ossa breviora
quidem sunt, quam alterius tibiæ, sed paululum, ob causas antea relatas. Ambulare
vero tales possunt, & quidam ex ipsis eo modo quo perfecti, quibus elapsus articulus
repositus non est; aliqui vero etiam toto pede consistentes progrediuntur, declinant
tamen inter ambulandum propter cruris brevitatem coacti. Hæc autem hoc modo fi-
unt, si diligenter educati fuerint in figuris, & recte in quibus oportet, priusquam ad
iter faciendum corroborati fuerint, diligenter item & recte, postquam corroborati fue-
rint. Plurimæ autem diligentis opus habent hi, quibus dum maxime infantes sunt, hæc 450
calamitas contigerit. Si enim neglecti fuerint dum infantes sunt, inutile penitus, &
omni augmento privatum totum crus evadit, & carnes totius cruris magis minuun-
tur, quam sani. Multo tamen minus his minuuntur, quam illis quibus intro exiit,
propter usum, & laborem; ita ut statim crure uti possint, velut etiam paullo ante in ga-
leaneonibus dictum est. * Sunt autem aliqui, quibus partim statim a nativitate, partim
præ morbo, amborum erurum articuli, exciderunt ad externam partem. His igitur os-
sa quidem easdem affectiones habent, ac perpetiuntur. Carnes tamen minime effemi-
nantur. Sed & satis carnosæ crura sunt, præterquam si quid sane circa internam par-
tem paulillum deficiat. Propterea vero satis carnosæ sunt, quia utrisque cruribus simi-
liter utuntur. Similiter enim fluctuant hæc atque illæ inter ambulandum, & vehi-
menter eminentibus artibus hi videntur propter articularum excessum. Si vero os-
sa ipsæ corruptionem non senserint, neque gibbosi supra coxas, sicut nonnulli
enim etiam talia corripunt: Si igitur tale quid non contigerit, satis sani de cætero
durant. Totum tamen corpus hi minus augete habent, capite excepto. At vero
quibus in posteriorem partem femoris caput exciderit, paucis autem excidit: hi crus, 465
exten-

extendere non possunt neque iuxta articulum elapsum, neque ita valde circa poplitem,
 & multo minus, quam hi, quibus jaunditum id contigit. Hi etiam magis & circa in-
 guen, & circa poplitem articulum extendunt. * Illud tamen insuper intelligere oportet: 66
 est enim commodum, & magni faciendum, & plerisque ignotum: quod nequeant
 470 articulum circa poplitem extendere possint, si non simul extendant etiam articulum circa
 inguen, præterquam si pedem valde lutum attollant. Sic enim poterint. Hi itaque ne-
 que inflectere articulum circa poplitem similiter possunt, sed multo difficilius, si non
 etiam articulum circa inguen inflecterint. Multa vero etiam alia circa corpus, huiusmo-
 di fraternitates, ac cognationes habent, & circa nervorum distentiones, & circa mu-
 475 sculorum figuras, plurima, & pluris facienda, ut cognoscantur, quam quispiam puta-
 verit. Item circa intestini naturam, & totius ventris, & circa uterorum errores, ac di-
 stentiones. Verum de his alibi nobis sermo erit cognatus his, quæ nunc dicuntur. Sed
 de quo nunc sermo est, neque extendere possunt, velut iam dictum est, & brevius crus
 apparet, atque hoc ob duas causas, & quod non extenditur, & quod ad natum carnem
 480 elapsus est. Natura enim ossis coxæ ea parte est, qua & caput, & cervix femoris exi-
 sit. Ubi vero luxatum fuerit, primum ad externam partem natum deferitur. Inflectere
 tamen possunt, si dolor non prohibeat, & tibiæ, & pes moderate recta apparent, & ne-
 que hæc, neque illac multum inclinata. Juxta inguen vero caro insuper aliquanto mol-
 lior esse videtur, præsertim ad contactum, utpote articulo ad alteram partem elapso.
 485 Ad ipsas autem nates si attrahatur femoris caput, aliquanto etiam magis extuberare
 videtur, atque hæc quidem signa sunt, si cui in posteriorem partem semur excidit. * Cut 67
 igitur jam perfectio elapsi, non fuerit repositum, hic ambulare quidem potest, ubi
 tempus intercesserit, & dolor sedatus fuerit, & articulus in carnem versari adheverit.
 Cogitur tamen vehementer se inflectere circa inguina, dum iter facit, atque hoc ob duas
 490 causas: tum quod multo brevius crus sit ob ea, quæ antea dicta sunt, tum quod mul-
 tum valde abest ab eo, ut calcaneo terram contingat. Si enim conatetur vel paululum
 pede illo vehi, ita ut nihil aliud habeat, quo se firmet, retro sane conuerit. Magna
 enim fuerit momenti inclinatio, & coxis multum in posteriorem partem supereminen-
 tibus super pedis gressum, & spina insuper ad coxas vergente. Vix autem pectore
 495 pedis terram attingit, & ne sic quidem, nisi ipse seipsum circa inguina inflectat, &
 altero crure circa poplitem insuper se inflectat. Ob hæc autem cogitur, ut manum,
 quæ est secundum latus crus, ad supernam femoris partem in singulis gressibus firmet.
 Cogit igitur aliquantum hoc ipsum, ut circa inguina inflectatur. Nam in permuta-
 tione crurum in ambulando, corpus supra latus crus vehi non potest, si non insu-
 500 per firmetur crus per manum ad terram, nimirum quum non sub corpore articulus
 subsistat, sed ad posteriorem partem iuxta coxam extet. Absque tamen baculo ta-
 les iter facere possunt, si alias adheverint, eo quod gressus pedis in uteri rectitudine
 maneat, & non ad extremam partem inclinatius est. Quapropter nihil opus habuit bacu-
 505 culi sulcimento. Quicumque tamen pro femoris per manum apprehensione, supposito
 sub alam, quæ ad sinistram crus est, scipione inniti volunt, hi siquidem longio-
 rem scipionem supposuerint, erectiores quidem iter facient, pede autem ad terram non
 innituntur. Si vero pede inniti volent, brevior ipsis baculus faciendus est, & ad
 inguina ut se inflectant necesse fuerit. * Cæterum carnum immixtiones etiam 68
 hi secundum rationem sunt, velut antea dictum est. Qui enim elevatum habent crus,
 & nihil laborant, his etiam maxime minuuntur. Si vero plurimum utantur ingressu,
 510 hi minime minuuntur. Sanum tamen crus nihil inde utilitatis consequitur, sed
 etiam deformius fit, si læso crure ad terram innitentes utantur. Illi enim simul infer-
 viens, & extra prominente coram esse cogitur, & circa poplitem se inflectere. Si ve-
 ro quis læso crure non ad terram utatur, sed elevatum habeat, & scipioni innitatur,
 515 sic sanum crus robustum fiet. Nam & in naturali statu degit, & exercitationes ipsum
 corroborant. Possit aliquis dicere, extra medicinam talia esse. Quid enim opus est,
 de his, quæ incurabilia iam facta sunt, amplius tractare? At hoc facere multum re-
 fert. Eiusdem enim professionis est & hæc cognoscere. Non enim fieri potest, ut
 inter se dirimantur. Oportet enim curabilia ita tractare, ut ne incurabilia fiat, ea
 520 intelligentia, ut quammaxime prohibeamus, ne ad hoc deveniant, ut incurabi-
 lia reddantur. Oportet autem, & incurabilia cognoscere, ut ne maxime lædant.
 Prædictiones autem splendide sunt, ac gloriose ex cognitione, quo, & qualiter,
 & quando singula desinent, sive eo veritatem, ut incurabilia fiant, sive curatio-
 nis spem exhibeant. * Quibusque vero ex nativitate, aut dum adhuc alias au- 69
 525 gescunt, ita elapsus fuerit articulus, & non repositus, sive ex violentia elapsus sit,
 sive præ morbo: multæ enim huiusmodi luxationes sunt in morbis, qui ve-
 rô sint hi morbi, in quibus articuli elabuntur, postea scribentur: Si itaque elapsus
 non fuerit repositus, femoris quidem os breve fit, affligitur autem totum crus,
 & augmento destituitur, & multo magis ex carne fit, eo quod ipso non utantur.
 530 Nam & articulus circa poplitem his affligitur. Nervi enim ob ea, quæ antea di-
 cta sunt, intenduntur. Quare articulum circa poplitem extendere non possunt hi,
 quibus hoc modo coxa excidit. Ut enim in summa dicam, omnia, quæ in cor-
 pore ad usum facta sunt, si quis moderate ipsis utatur, & in his laboribus exer-
 ceat, ad quos singula sunt adfecta, sic quidem sana sunt, & augescunt, & probe con-
 senescunt.

senescunt. Si vero quis non utatur, sed quiescat, morbosiora fiunt, & non auge- 535
scunt, & cito consenscunt. Inter hæc autem non minime perperitur hoc & articu-
lis, & nervi, si quis non ipsis utatur. Propter has igitur causas magis in hoc luxa-
tionis modo, quam in aliis affliguntur. Totum enim crus & in ossum, & in carnium
natura, augmento destituitur. Tales igitur ubi jam in viros evalesunt, elevatum,
ac inclinatum crus hoc habent, altero vero vehuntur baculo innitentes, aliqui uno, 540
aliqui duobus. * Quibus porro in anteriorem partem femoris caput elapsum
fuerit: paucis autem hoc contingit: hi extendere quidem erus perfecte pos-
sunt, inflectere autem se minime hi possunt circa inguen. Affliguntur autem etiam,
si circa popliteum se inflectere coguntur. Longitudo vero cruris consimilis apparet,
& circa calcaneum quidem valde. Verum summus pes aliquanto minus in antero- 545
rem partem prominere solet. Totam autem crus rectitudinem habet secundum natu-
ram, & neque hæc, neque illac vergit. Cæterum hi statim dolore corripuntur ma-
xime, & urina imprimis supprimitur aliquanto magis, quam in aliis luxationibus. Cap-
put enim femoris proxime his incumbit ad præcipuos nervos, & circa inguen
quidem extuberantes videntur, & locus extensus apparet. Verum circa nates ru- 550
gosior, & maxime excarnis. Atque hæc quidem, quæ relata sunt, signa sunt eorum,
quibus ita femur excidit. Quibuscumque igitur viris jam factis, hic articulus elap-
sus non fuerit repositus; hi, ubi dolor ipsis sedatus fuerit, & articulus in eo loco
in quem excidit, versari adjuverit, statim fere recti ambulare possunt absque bac-
culo, & valde quidem recti, utpote quam ad læsum erus, neque circa inguen, neque 555
circa popliteum facile se flectere possunt. Propter inguinis itaque inflexibilitatem re-
ctiore toto crure in ambulando utuntur, quam quum sani essent. Sed & aliquan-
do ad terram pedem trahunt, utpote quum supernos articulos non facile inflectant,
& toto pede ingreditur. Nihil enim minus hi calcaneo ingrediuntur, quam antero-
riore pedis parte. Si vero magnis gressibus progredi possent, etiam valde calca- 560
neo insistentes progredierentur. Nam & sani quanto minoribus gressibus iter faci-
unt, tanto magis calcaneo ingrediuntur, alterum pedem deponentes, contra-
rium elevantes. Quibuscumque itaque hoc modo excidit, adhuc etiam magis calcane-
o terram contingunt, quam anteriore pedis parte. Anterior enim pedis pars, ubi re-
liquum erus extensum fuerit, non similiter in anteriorem partem inflecti potest, sicut 565
ubi crus fuerit inflexum. Neque rursus sinuati pes potest crure inflexo, sicut ubi crus
fuerit extensum. Sane igitur natura hoc modo est, veluti dictum est. Quum vero
elapsus articulus repositus non fuerit, sic iter faciunt, veluti dictum est, ob prædi-
ctas has causas. Magis tamen excarne crus fit, quam alterum, & iuxta nates, & circa
suram, & iuxta posteriorem rectitudinem. At vero, quibus dum adhuc infantes 570
sunt, articulus sic elapsus non fuerit repositus, aut etiam a nativitate ita habuerint,
& his femoris os aliquanto magis minuitur, quam tibiæ, aut pedis ossa. Et minimum
quidem in hoc luxationis modo femur minuitur. Carnes tamen undique minuuntur,
maxime circa posteriorem rectitudinem, quemadmodum etiam prius dictum
est. Quicumque igitur recte educati fuerint, hi ubi augeferunt, crure uti possunt, bre- 575
vior aliquantum existente, quam altero, ita tamen, ut baculo innitantur ea parte,
qua læsum erus est. Non enim absque calcaneo, pedis pectore admodum uti possunt,
ut in id innitatur, quemadmodum in aliis elaudicationibus, aliqui possunt.
Causa vero cur non possint, ea est, quæ paullo ante relata est. Ob id igitur baculo in-
super opus habent. Qui vero neglecti fuerint, & crure ad terram non utuntur, sed e- 580
levatum id habent, his minuuntur quidem ossa, ubi augeferunt, magis quam his, qui
eo utuntur. Minuuntur autem & carnes magis multo, quam his, qui utuntur.

S E C T I O IV.

V Erum circa articulos in directum mutilatur his erus aliquanto magis, quam quibus
alio modo luxatio facta est. Quo igitur in summa dicatur, articuli excident, ac
qui luxantur, inæqualiter inter seipso excidunt, ac luxantur aliquando multo plus,
aliquando multo minus. Et quibusquidem multo plus luxati, aut elapsi fuerint, his om- 5
nino difficiliter reponuntur. Et si repositi non fuerint, majores & manifestiores mu-
tilationes, ac afflictiones tales habent & ossum, & carnium, & figurarum. Ubi ve-
ro minus exciderint, & luxati fuerint, tales facilius, quam alii reponi possunt. Si ve-
ro frustra tentati, aut neglecti fuerint, minores, ac minus noxiæ mutilationes his
71 sunt, quam illis, de quibus paullo ante dictum est. * Reliqui igitur articuli etiam val-
de multum differunt ad hoc, ut aliquando minor, aliquando major luxatio fiat. Verum
femoris, & brachii capita quamvisimile inter se utraque excidunt. Nam capita pro-
ut rotunda sunt, simplicem, & calvam rotunditatem habent. Orbiculatores autem si-
nus sunt, qui capita excipiunt, capitibus tamen ipsis congruentes. Quapropter fieri
non potest, ut dimidium articuli ex ipsis elaboratur. Nam ob rotunditatis circumferen-
tiam aut ad externam, aut ad internam partem luxari poterit. Sed de quo nunc sec- 15
mo est, perfecte excidunt, nam alioqui non excidunt. Attrahunt & hi aliquando plus,
aliquando minus a naturali statu profluunt, & femur aliquanto magis, quam brach-
chium

- chium patitur. Nam aliquæ etiam ex his luxationibus, quæ a nativitate fiunt, si parum elapsæ fuerint, ad naturalem statum reduci possunt, & maxime articuli circa pedem. Quicumque a nativitate muti fiunt, p[er]ique ex his curabiles sunt, si non valde magna emotio facta fuerit, aut etiam præactis jam pueris contingerit. Opium igitur est, ut talia quamcelerrime curentur, priusquam valde magnus ossium defectus fiat, & priusquam admodum magnus carniū defectus circa tibiam contingat. * Modus itaque mutilationis non unus est, sed plures. Plurima quidem eluxata non sunt penitus, sed per figuræ consuetudinem in quadam pedis interfectione mutilata. Animadvertendum autem in horum curatione est, ut tibiæ circa malleolum os, quod extrinsecus est, ad internam partem detrudatur, ac dirigatur, & calcanei os, quod e directo illi subjacet, ad externam partem retrudatur, quo ossa, quæ eminent, sibi ipsis occurrant juxta medium, ac obliquum pedem. Digni vero acervari una cum magno digito ad internam partem inclinentur, atque ita circumcirca cogantur. Probe autem deligare oportet cerato resinato, & splenis, & linteis mollibus non paucis, neque nimis compressis, atque ita deligationis circumductiones facere, velint etiam manibus directio pedis fiebat, quo pes paullo magis ad valgum vergere videatur. Soleam etiam quamdiu facere oportet aut ex pelle non nimis dura, aut e plumbo, eamque insuper alligare non ad corpus positam, sed ubi iam postremis linteis deligare volens. Quum vero jam deligatus fuerit, unius alicujus linteï ex his, quibus deligatur, initium ad deligamenta, quæ infra pedem sunt, assuere oportet e directo parvi digiti, & postea sursum extendere, ita ut moderate habere videatur, atque sic supra furam circumdare, quo sic extensus, ac collocatum stabile maneat. In summa, quasi quis ceram fingat, ad naturam justam addicere oportet, ita ut & inclinata, & distenta præter naturam, & manibus sic dirigamus, & similiter deligatione adducamus autem non violenter, sed leniter. Assuere vero ita oportet linteæ, ut conducatur ad reparationes, ac appensiones faciendas. Aliæ enim claudicationes alia reparatione, ac appensione opus habent. * Calceum insuper plumbeum facere oportet, extra deligationem adalligatum, qualem modulum crepidæ hinc habebunt. Verum nihil ipso opus est, si quis & manibus recte direxerit, & linteis recte deligaverit, & appensiones, ac reparationes per assuta linteæ recte fecerit. Atque hæc quidem est curatio, & neque sectione, neque unctione, neque alia varietate quicquam opus habet. Citius enim talia medicinæ obtemperant, quam quis putarit. Devincere tamen tempore oportet, donec in iustis figuris corpus auditum fuerit. Ubi vero calcei ratio habenda est, Arbylæ litigatæ, calceamentis ita appellati species, accommodatissimæ existunt. Hoc enim calceamentum minime a pede superatur, sed potius ipsum superat. Idoneus est etiam creticus calceamentorum modus. * At vero, quibus tibiæ ossibus luxatis, ac ulcere inducto, articuli circa pedem penitus eminent, sive intro vergant, sive extra, tales reponere non oportet, sed permitttere, ut quicumque velit medicis reponat. Illud enim clare scire oportet, quod homo morietur, si repositi permanferint. Sed & vix paucorum dierum his contingit. Pauci enim ex ipsis leprimum diem transgrediuntur. Convulsio enim est, quæ ipsos occidit. Sed & cancerari contingit tibiam, ac pedem. Hæc ita futura esse certo scire oportet. Ex neque veratrum mihi videtur profuturum esse, & eadem die datum, & rursus epotum, proxime autem si quicquam huiusmodi facit, non tamen mihi hoc videtur. Si vero repositi non fuerint, & ne tentati quidem ab initio, plerique ipsorum superstites evadunt. Sic autem & tibiam, & pedem coarperi oportet, prout ipse volet, modo non sint dependentiæ, aut commota. Curatio vero facienda est cerato picato, & splenis viuo imbutis, paucis, non valde frigidis. * Frigiditas enim in talibus convulsionem accersit. Idonea etiam sunt folia betarum, aut tussilaginis, bechii appellatæ, aut alicuius alterius huiusmodi, in vino nigro austero semicocta, ac imposita. Et faciendæ est curatio super ulcus, & super partes adjacentes. Ex cerato tepido ipsum ulcus illinendum. Si vero hyemis tempus fuerit, etiam lanæ succidæ viuo, ac oleo tepidis imbutæ superne ipsum inadeficiant. Deligatio vero nulla, neque ullum cataplasma adhibendum est. Probe enim nosse convenit, quod compressio, ac omnis oneri gestatio talibus onus malum afferit. Accommodata autem sunt ad talia & ex emplastris aliqua, quæ eruentis vulneribus destinata sunt, quibus videlicet ex ipsis consent, sicut lanæ superimpositæ viuo inadeficiant, & multo tempore sinantur. Quæ vero ex illis cruentis emplastris, paucissimis diebus incumbere debent, & quæ resina comprehenduntur forissecis adjecta, non similiter ut illa idonea sunt, diuturna enim sit horum ulcerum purgatio, quum multo tempore madore abundent. Quosdam tamen ex his deligare, bonum est. Verum illud clare nosse oportet, quod necesse est, hominem turpiter claudum fieri. Nam pes in talibus in supernam partem retractus est, & ossa luxata, extra eminentia apparent. Neque enim ullum ex talibus ossibus plerumque denudatur, nisi leviter aliquantum, neque abscedit, sed tenuibus, ac debilibus creaturibus circumducitur, atque hoc si multo tempore quieverint, sin minus, periculum est ne ulcusculum immedicabile relinquantur. Verum de quo sermo est, qui sic curantur, servantur. Si vero repositus fuerit articulus, ac permanferit, moriuntur. * Eadem ratio est, si etiam cubiti ossa circa manus articulum ulcere facto eminent sive ad internam manus partem, sive ad externam. Clare enim nosse id oportet, quod si morietur intra pau-

eos dies tali morte, qualis antea dicta est, cui reposita ossa permanferint. Quibus ve-
 ro reposita non fuerint, neque repositio tentata est, in multo plures superstites ma-
 nent. Curatio autem eiusmodi talibus commoda est, qualis iam dicta est. Fi-
 guram vero claudicationis turpem esse necesse est, & digitos manus debiles, ac
 mitiles. Si enim ad internam partem ossa luxata fuerint, digitos inflectere non po-
 test. Si vero ad externam, extendere nequit. Quibus vero tibiae os, facto ulcere,
 circa genu emiserint foras, sive ad externam partem sive ad internam, his si quis re-
 ponat, adhuc promprior mors adest, quam aliis, etiam si etiam illis prompta aderat.
 Si vero omnia repositione medecaris, spes quidem salutis hoc solo modo existit,
 Verum periculosa haec ossa sunt, quanto superiora, ac robustiora sunt, & a for-
 tioribus elapsa. At si os femoris, quod ad genu est, ulcere facto elapsum fuerit,
 & repositum permanferit, mortem adhuc violentiorem exitus induxerit, quam prius
 relata. Si vero repositum non fuerit, longe magis periculosum est, quam priora. Sola
 tamen haec salutis spes est. Eadem vero ratio est & de articulis circa gibbum cubiti,
 & de cubito ac brachio. Quaecumque enim ex his luxata, ulcere facto, emiserint, ea
 omnia si reposita fuerint, mortem inducunt, non reposita, spem salutis, claudicationem
 vero superstitibus. Lethaliores autem sunt superiores articuli, si reponantur. Sed &
 si non reponantur, periculosiores iidem sunt. Si vero alius superioris articuli luxa-
 ti, facto ulcere, emineant, hi, etsi reponantur, celerrimam mortem inducunt, & si
 non reponantur, periculosiores sunt. Curatio vero iam relata est, quae mihi aecom-
 modatissima esse videtur. * At vero quibus articuli digitorum aut pedis, aut ma-
 nus luxati, facto ulcere, emiserint, osse non fracto, sed circa ipsam connexionem
 avulso, his si repositi permanferint, adest quidem periculum convulsionis, si non be-
 ne curati fuerint, attamen operae pretium est, ut repositio fiat, cum praedictione quod
 multa custodia, ac cura opus habet. Reponere vero facillimum est, efficacissimumque
 ac artificiosissimum per vecticulum, velut etiam antea dictum est in fractis, ac emi-
 nentibus ossibus. Postea quiescere quammaxime convenit, & decumbere, ac panico ei-
 bo uti. Melius est & pharmaco sursum purgante levi aliquo uti. Ulcus vero curare
 oportet aut cruentis emplastris, quae madesunt, aut polyopthalmi sive buph-
 thalmi foliis impositis, aut quibus ossa in capite fracta curantur. Nihil autem valde
 frigidum adhibere. Minime igitur primi articuli periculosi sunt. Superiores autem
 periculosiores. Reponere vero oportet eadem die, aut postmodum, tertio, ac quarto
 minime. Quarto enim die maxime recrudescere solent. Quibus autem non sta-
 tim repositi fuerint, in his dictos dies transgredi oportet. Quicquid enim intra
 decem dies repositum fuerit, omne id continetur. Si vero reposito osse convulso ac-
 cedat, articulum statim ejicere oportet, & calida quamsepissime humectare, & totum
 corpus, & praesertim circa articulos, calide & leniter, ac molliter tractare. Verum in-
 clinatum magis, quam extensum totum corpus esse oportet. Expectandum tamen est
 articulos circa digitos, qui reponuntur, abscessuros esse. Plenumque enim ita contingit,
 si vel quavis inflammatio subit. Quare si non propter vulgi imperitiam medico ve-
 renda esset accusatio, nullum penitus reponere oportebat. Atque ad hunc modum pe-
 riculosa sunt ossa, circa articulos eminentia foras, si reponantur, quemadmodum di-
 ctum est. * Quaecumque vero circa articulos digitorum penitus resecantur, ea plenum-
 que innoxia sunt, si non quis in ipsa vulnere ex animi deliquio laedatur. Et circa
 vulgaris talibus ulceribus sufficit. Sed & quae non circa articulos, sed iuxta
 aliam quamdam ossium rectitudinem resecantur, & haec innoxia sunt, & adhuc
 aliis curatu faciliora. Et quae iuxta digitos ossa fracta extra eminent, non ad arti-
 culum, & haec si reponantur innoxia sunt. At resectione ossium perfectae circa
 articulos, & in pede, & in manu, & in tibia ad malleolos, & in cubito ad junctura
 ram manus, plerisque, quibus resecantur, innoxiae sunt, si non statim animi deliqui-
 um evertat, aut quarta die febris continua accedat. * Corruptiones tamen carnum
 contingunt, & in vulneribus sanguinis siccibus, & vehementibus constrictionibus,
 & in ossium fracturis magis, quam oportet compressis, & aliis vinculis violentis
 intercepta plerisque decidunt. Et plerique ex talibus superstites evadunt, & qui-
 bus femoris pars aliqua, & carnum, & ossis decidit, & quibus brachii pars (mi-
 nus autem si cubiti, aut tibiae pars deciderit) & amplius facile ferentes superstites
 evadunt. Quibus igitur fractis ossibus corruptiones statim fiunt, & denigra-
 tiones, his abruptiones corporis celeres circum circa fiunt, & decidentia cito decidunt,
 ut quum ossa iam antea remiserint emollita. Quibus vero dum ossa sana sunt,
 denigraationes fiunt, carnes quidem etiam his cito moriuntur, ossa vero tarde ab-
 scedunt, qua parte termini sunt denigraationis, & ossis nudatio extat. Oportet
 autem partes corporis quaecumque infra terminos denigraationis sunt, quum iam
 penitus mortuae fuerint & doloris exortes, iuxta articulum auferre, providendo
 ut ne vulneres. Si enim is, cui resectio fit, dolore affectus fuerit, & corpus nondum
 mortuum fuerit ea parte qua resecatur, magnum periculum est ne pro dolore ani-
 mi deliquium incidat. Talia vero animi deliquia multos jam et vestigio pereme-
 runt. * Femoris itaque os tali modo denudatum octogesimo die abscedere vidi. Ti-
 bia tamen huic homini circa genu vigesima die ablata fuerat, aut ut mihi videba-
 tur, etiam citius. Non enim simul, sed ad maiorem providentiam facere quid mi-

- hi visum fuit. At tibiæ ossa ex ejusmodi denigratione circa mediam tibiæ sexagesimo die mihi deciderunt, quæcumque ex ipsis fuerunt denudata. Differt equidem & curatio a curatione, ad hoc ut ossa denudata citius aut tardius decendant. Differt etiam compressio a compressione, prout vehementior aut debilior sit, ad hoc ut
- 160 citius aut tardius nervi denigrati emoriantur, carnes item & arteriæ ac venæ. Nam quæcumque non vehementer intercepta moriuntur, ex talibus quædam ad ossum denudationes non perveniunt, sed magis in superficie decidunt. Propter has igitur causas non unum numeri nomen temporis poni potest, in quanto singulas ex his judicantur. Assumere vero valde oportet tales curationes. Sunt enim
- 165 magis horrendi aspectus, quam curationis, & curatio lenis omnibus talibus sufficit. Ipsa enim seipsa solum judicant: & circa victum diligentiam adhibere oportet ut pro viribus febris exors sit, & in iustis figuris corpus collocare. Iustæ autem hæ sunt, ut neque sublimius elevatum sit, neque deorsum repat. Sed magis præterea sursum vergat, donec perfecte fuerit circumcirca abruptum. Nam in hoc tempore sanguinis eruptionum periculum imminet. Ob id igitur vulnera deorsum repentia facere non oportet, sed vice versa. Alioqui ubi tempus amplius accesserit, & ulcera pura facta fuerint, non amplius hæ figuræ commode sunt, sed positio recta, & aliquando deorsum repentes. Temporibus enim progressu quibusdam horum ossis dissectiones fiunt, & subligaminibus opus habent. Expectare tamen oportet,
- 175 ut tales per tempus a dysenteria corripiantur. Nam in plerisque denigrescentibus dysenteria accedit, & in sanguinis eruptionibus ex ulceribus. Accedit autem judicatis jam denigrationibus, ac sanguinis eruptione, & procedit quidem large, ac vehementi inperu, sed non ad multos dies durat, neque lethalis est. Neque enim valde eibum averlantur tales, neque alias vasa vacua facere conducit. * Fe- 82
- 180 moris porro luxationem circa coxam hoc modo reponere oportet, si ad internam partem elapsum fuerit. Bona quidem ac iusta & secundum naturam hæc positio est, & sane etiam aliquid ostentationis habens, si quis talium rerum jactatione superbiere velit. Ex pedibus hominem ad transversam mediz domus trabem suspendere oportet vinculo forti, sed molli ac lato, ita ut pedes quatuor digitorum spatio, aut minus,
- 185 inter se distantes habeat. Sed & supra genua latum, ac molle lorum circumdari esse oportet, quod item ad trabem illam extendat. Crus autem læsum duobus digitis amplius quam alterum extensum esse oportet. A terra vero absit caput ad duorum cubito- rum spatium, aut paulo plus, aut minus. Manus autem iuxta latera extente, alioqui molli sint alligatæ. Omnia vero hæc supino jacenti ipsi præparentur, ut quam brevissi-
- 190 mo tempore pendat. Postquam vero suspensus fuerit, virum peritum & non debilem immisso inter femora cubito ita agere oportet, ut cubitum inter caput femoris elapsum, & interfemineum locumque inter anum ac pudendum ponat, & postea altera manu ad illam interpositam conjuncta, rectus astans ad suspensi corpus, derepente se appendens sublimis, quamæquabilissime dependeat. Hæc positio omnia, quibus secundum natu-
- 195 turam opus est, exhibet. Nam & ipsum corpus suspensum sua ipsius gravitate extensionem facit, & is qui appendet, una cum extensione, femoris caput super acetabulum elevare cogit, simulque cum cubiti osse, velut cum vecte molitur ac cogit, ut ad pristinam naturam relabatur. Oportet autem vincula nimino bene constructa esse, & curare ut fortissimus sit is, qui se appendit. * Quemadmodum igitur etiam antea di-
- 200 cum est, magna est differentia naturarum in hominibus, ad hoc ut vel facile, vel difficulter positio fiat. Et cur magna sit differentia dictum est antea, ubi de humero egimus. Quibusdam enim semur rursus incidit nullo adhibito apparatu, sed ex modica extensione, quantum manibus directio fieri potest, & ex levi commotione. Multis autem quicrus juxta articulum inflexerunt, jam facta circummaginatione rursus incidit. At multo plura vulgari cuilibet apparatu non obtemperant. Quapropter scire quidem oportet de singulis optima in omni arte, uti vero his, quæ lingui-
- 205 lis vicibus idonea visa fuerint. Relati igitur sunt extensionum modi etiam in superioribus, ut quis uti possit ex his, qui forte assuerint. Oportet enim in contrarias partes fieri extensionem vehementer, in alteram, cruris; in alteram, corporis. Si enim probe extensis facta fuerit, femoris caput supra pristinam sedem elevabitur. Et si quidem ita superelatum fuerit, ne prohibere quidem facile sit, quo minus ipsum in suam sedem insideat. Quare omnis jam vectis molitio, ac directio sufficit. Sed enim in extensione deficiunt, & ob id majorem turbationem exhibet positio. Oportet igitur non solum iuxta pedem vincula alligata esse, sed etiam supra genu, quo
- 215 non magis circa articulum sit deligatio in extensione, quam circa coxæ articulum. Sic igitur extensionem ad pedis partem præparatam facere oportet. Sed & in alteram partem extensionem non solum ex deligatione circa pectus & alas in contrarium extendere oportet, sed etiam loro longo, duplicato, robusto, leni, circa interfemineum inserto, & a posteriore parte ad spinam porrecto, ab anteriore vero ad claviculam tendente,
- 220 ibique ad alterum initium alligato, ita coactionem facere oportet, ut alii hinc, alii illinc extensionem faciant, ita tamen ut lorum circa interfemineum, non super femoris caput porrectum sit, sed inter caput & interfemineum. Verum inter extendendum pugno ad femoris caput quasi innixus, id ad anteriorem partem propellat. Si vero is, qui trahitur, eleveatur, injecta manu, & cum altera manu conjuncta, simul deorsum tra-

hat,

- hat, simulque ad externam partem cogat. Alius vero quispiam partem femoris ad
84 genu placide ad internam partem dirigat. * Dicitur autem est etiam antea, opere
pretium esse, ut si quis in urbe populosa medicinam exerceat, lignum possideat
quadrangulare sex cubitorum, aut paullo minus, latitudine bicubitali: crassitudo
autem sufficit dodrantalis. Id secundum longitudinem hinc atque illinc sectionem inci-
sam habere oportet, ut ne altior, quam oportet, machinatio fiat. Deinde postes aselli
80 breves, robustos, utrinque inaptatos habere. Postea sufficit quidem in dimidia ligni
parte, nihil tamen vetat etiam per totum, velut fossas longas quovis vel sex, quatuor
digitorum spatio inter se distantes, incisus esse, & satis est, ut sint hæc & latitudine, &
& profunditate trium digitorum. Habere etiam in medio hoc lignum debet excavationem
profundiorum quadrangulam trium digitorum, quo in hanc excavationem, ubi opus
85 esse visum fuerit, lignum cavitati congruum infigatur, quod supeme sit rotundum. In-
figendum autem hoc est, si quando conducere visum fuerit, inter caput femoris, & lo-
cum inter anum, ac pudendum. Hoc lignum erectum stans prohibet, ne concedat cor-
pus, dum a pedibus extenditur. Quandoque enim hoc ipsum lignum sufficit pro extensio-
ne in contrarium superne facienda. Aliquando etiam, dum hinc atque illinc crura exten-
ditur, hoc ipsum lignum hac vel illac laxum incumbens, commodum ad hoc fuerit,
ut instat vetes caput femoris ad externam partem extrudat. Ob hoc enim etiam
fossæ incisæ sunt, quo in quibuscumque ex ipsis congruum ad facere fuerit, vetes lig-
80 neus immixtus molitionem faciat, aut circa articulorum capita, aut ad ipsa penitus
capita infixus, una cum extensione, sive ad externam partem, sive ad internam, mo-
litionem facere expedierit, sive etiam rotundum vetem esse conducatur, sive latum. Alius
enim alii articulo conducit. * Commodum autem est in omnium articulorum cruris repo-
sitione hac per vetes molitio una cum concussionem. Verum de quo nunc sermo est, tere-
tem, ac rotundum vetem esse convenit. Ex his machinis, ac coactionibus, non videtur
85 mihi fieri posse, ut ullius articuli repositio frustra contetur. Invenire tamen quis possit et-
iam alios modos repositionis huius articuli. Si enim lignum hoc magnum habeat in
medio a lateribus duos postes pedales, ejus altitudinis, quæ conferre videtur, al-
terum hinc, alterum illinc. Deinde lignum transversum, velut scæle gradus, post-
ibus impostum sit, atque ita sano crure inter postes transmissis, læsum crur supra gra-
dum adaptatum habeat. Verum ad altitudinem, & ad articulum qua parte excidit fa-
85 cile quiddam adaptare oportet. Gradum enim moderato altiore facere oportet, &
stragulum multiplex prout congruum fuerit, sub corpus subextendere. Deinde li-
gnum moderatam latitudinem, ac longitudinem habens, sub crur ad malleolum usque
extentum esse oportet, quod ultra femoris caput, quantum ejus fieri potest, porriga-
tur, & ad crur alligetur, quocircumque opus fuerit, ut moderate habeat. Postea dum
80 extenditur crur sive ligno pistilloformi, sive aliqua alia ex his extensionibus, crur
simul circum gradum una cum alligato ligno deorsum cogere oportet, ita ut aliquis
supra articulum juxta coxam hominem detineat. Hoc enim modo simul & extensio se-
moris caput super acetabulum attollet, simulque molitio femoris caput in pristinam
naturam detruhet. Hæc omnes relaxæ necessitates, ac coactiones fortes sunt, & o-
85 mnes calanitate superiores, si quis recte ac bene præparet. Quemadmodum autem
etiam antea dictum est, a longe debilioribus extensionibus, & viore apparatu ple-
risque rursus incidit. * At vero si ad externam partem femoris caput luxatum fuerit,
86 extensiones quidem hinc atque illinc facere oportet, eodem modo velut dictum est.
Verum molitionem cum veste lato, una cum extensione facere convenit, ab externa
parte ad internam cogendo, ita ut ad ipsas nates, & paullo superius vetem adhibeas.
Ad sanam vero coxam juxta nates aliquis manibus renitatur, ut ne cedat corpus,
aut alio quopiam hujusmodi veste submissis, & ex fossa conveniente filicito contra
obnitatur. Partem autem femoris luxati, quæ ad genu est, ab interna parte foras pla-
cide abducatur. Cæterum suspensio in hoc modo luxationis articuli non convenit.
87 Cubitus enim ejus, qui se appendit, caput femoris ab acetabulo propellit. Mol-
tionem tamen cum ligno subiecto ita quis adaptare possit, ut huic luxationis modo
conveniat, si forinsecus adhibeat. Sed quid opus est plura dicere? Si enim recte ex-
tensio fiat, & recte per vetes molitio contingat, qui articulus hoc modo elapsus
non reponi possit? * At si in posteriorem partem femur exciderit, extensiones & diver-
80 sum tensiones ita facere oportet, velut dictum est, ita tamen ut super lignum multi-
plex stragulum inferatur, quo molissimum sit, & homo pronus reclinatur, ac sic
extendatur. Verum una cum extensione, etiam tabula deorsum cogere oportet eodem
modo, veluti gibbositates, e directo narium tabula collocata, aut inagis ad infernam,
quam ad superiorem coxarum partem, & incisura in pariete ad tabulam excipiendam non
85 recta sit, sed paululum declivis ad pedum partem. Hæc repositio maxime secundum na-
turam est huic luxationis modo, & simul fortissima. Suffecerit autem fortassis pro tabu-
la, ut aliquis insideat, aut manibus innitatur, aut inscendat derespente, simulque cum
extensione incumbat. Nulla vero alia ex relaxis repositionibus secundum naturam est
huic luxationis modo. Si vero in anteriorem partem elapsus fuerit, idem quidem mo-
80 dus extensionum faciendus est. Verum virum & manibus validissimum, & alius peri-
rissimum, vola manus alterius circa inguina firmata, & altera manu iussuper injecta,
simul luxationem deorsum propellere, simulque femoris partem, quæ ad genu est ad
Hæp. Opera. Hh 2 ante-

- anteriorē partē compellere oportet. Hic enim modus repositionis huic luxationi
 295 maxime secundum naturam est. Sed & suspensio finitimum quid secundum naturam ha-
 bet. Oportet tamen eum qui se appendit pertum esse, ut ne cubito articulum excutiat,
 sed circa medium inter anum, ac pudendum locum, & iuxta os sacrum se appendat. * Lau- 88
 datur etiam is, qui per utrum hunc articulum reponere conatus est. Et jam sane aliquos
 vidi, qui prae imperitia, etiam extra & retro luxatos, per utrum reponere conabantur,
 non animadvertentes, quod magis ipsum ejicerent, quam reponerent articulum. Nam qui
 300 primus excogitavit, haud dubie ad intro elapsos articulos, per utrum repositionem ten-
 tavit. Nolle igitur oportet, quod alia multa utre sunt potiora. Oportet autem utrum
 non inflatum intra femora ponere, quantum fieri potest supreme ad locum inter anum,
 ac pudendum adductum; & factō a patellis gena initio, femora per fasciam usque ad
 305 medium femorum partem deligare, deinde in partem utris solam solle ex officina fabri
 immisso inflare, & utrum cogere ut distendatur. Hominem vero in latere decumbere opor-
 ret, & laevum crus superne habere. Arque hic quidem est apparatus, sed plerique pejus
 preparant, quam ego nunc dixi. Non enim deligant femora ad multam partem, sed solum
 genua, & non insuper extendunt: est autem insuper extensio quoque facienda. Attamen
 310 aliqui jam reposuerant, facile rem assequi. Non autem ita facile est coactionem hoc mo-
 do perficere. Nam & utrum inflatur, tumidissimas partes suas ad articuli caput non ha-
 bet, quod maxime emoliri oportet, sed inferius ipso, medius ipse locatus est circa me-
 dia femora, aut adhuc inferius; & rursus femora ipsa natura sunt curva. Superne e-
 nim carnosa sunt, & inter se fociata. Inferne vero sicca, ut etiam natura femorum u-
 315 trem ab opportunissimo loco repellat. Si vero quis parvum utrum imponat, fieri
 non potest, ut parvum robur articulum cogat. * Si itaque utre uti velis, femora inter
 se ad multam partem colligenda sunt, & una cum corporis extensione utrum inflandum
 est. Crura vero ambo deligenda sunt usque ad finem in hoc repositionis modo. At
 vero in universa arte hoc plurimum facere prae omnibus oportet, ut id, quod agro-
 320 rat, sanum facias. Si vero multis modis fieri possit sanatio, ut eum, qui minime mole-
 stus est, eligas, Nam & virum bonum, & artis peritum, hoc declarat, qui populo im-
 ponere non studeat. Verum de quo nunc sermo est, tales quaedam sunt familiares ex-
 tensiones corporis, ut ex his, quae adsumt expedita, ac facili reperiiri possit. Nam si
 325 vincula ex loris mollia, ac lenia non affuerint, sed aut ferrea, aut funes nautici, aut
 domestici, fascis aut pinniculis laneis ea maxime parte sumptus obvolvete opor-
 tet, quia vincula detentionem factura sunt, atque ita vinculis deligare. Deinde in le-
 cto robustissimo, & ex praesentibus maximis, hominem bene extendere opor-
 ret, hoc modo. Lecti pedes qui ad caput sunt, aut a pedibus, ad lumen innuē, intras
 330 ut foris prout commodum fuerit firmentur. Ad alteros autem lecti pedes lignum qua-
 drangulare transversum obiciatur, ita ut a pede ad pedem pertingat. Et si quidem te-
 nue fuerit lignum, ad pedes lecti deligetur. Si vero crassum, non est opus. Deinde
 initia vinculorum, & eorum quae a capite sunt, & eorum quae a pedibus, utraque al-
 ligentur ad pistillum, aut ad aliud huiusmodi lignum, ita ut et directio corporis fiat,
 335 aut paulo superius. Moderate vero extendantur ad pistilla erecta consistentia, quorum
 alterum ad lumen, alterum ad lignum obiectum firmentur, atque sic retracta pistillis ex-
 tensio fiat. Sufficit autem scala, quae tubulosos gradus habet, sub lectum extenta, pro
 limine ac ligno obiecto, quo pistillis ad convenientes gradus hinc atque illinc firma-
 tis, ita vinculorum extensio fiat. * Porro reponitur femoris articulus etiam hoc mo-
 340 do, si ad internam, & ad anteriorem partem luxatus fuerit. Supra scalam in terram
 defixam hominem collocare oportet, deinde sanum crus placide extentum deligare, ubi
 commodum fuerit; ex sinistro vero vas testaceum aqua plenum, aut sportulam lapi-
 dibus repletam appendere. Alius repositionis modus, si ad internam partem luxa-
 tus fuerit. Inter duas columnas trabem moderata altitudine deligare oportet. Præ-
 unineat autem una pars trabis pro magnitudine natum, & ubi stragula circum pectus
 345 hominis deligaveris, ipsum hominem supra praeventem trabis partem collocato,
 & deinde pectus ad columnam lato aliquo vinculo alligato. Postea sanum quidem
 crus detineat aliquis, ut ne circumagatur. Ex laevo vero appendatur pondus quan-
 tum congruit, velut etiam prius dictum est. Primum igitur scire expedit, quod omni-
 um osium commissurae plerumque sunt caput, & acetabulum. In quibusdam vero, &
 350 locus acetabuli formam refert, & oblongus est. Quidam vero loci leviter sinuosi
 sunt. Semper autem reponere oportet omnes articulos elapsos, maxime quidem sta-
 rim dum adhuc calidi sunt. Sin minus, quamcelerrime. Nam & ei, qui reponit faci-
 lius, ac citius reponere contingit, & aegroto multo minus doloris affert repositio pri-
 usquam intumuerit. Omnes etiam articulos ubi reponere voles, praemollire ac commo-
 355 vere oportet. Sic enim facilius reponi solet. Circa omnes autem articulos repositio-
 nes hominem attenuare oportet, maxime circa maximos articulos & repositu diffi-
 cillimos, minimum circa minimos & faciles. * At vero si digitorum articulus, sive
 360 primus, sive secundus, sive tertius in manu exciderit, idem ac aequalis repositio-
 nis modus est, difficilior tamen semper maximi articuli reponuntur. Excident autem
 quatuor modis, aut sursum, aut deorsum, aut in obliquum atrimque, maxime
 quidem superne, minime autem in obliquum, in vehementi motu. Utrumque autem in
 ea parte in quam exciderunt, velut crepido est. Si quidem igitur ad supernam, aut infer-
 nam

nam partem exciderit articulus, eo quod levior est hic locus, quam a lateribus, & simul parva facta est transgressio, facile est reponere. Modus autem repositionis sic habet. Digatum summum aut deligamento aliquo, aut alia quapiam huiusmodi re obvolvito, ut ne, ubi summum digitum apprehensum extendis, elabatur. Quum autem obvolvitis, alter quispian manum supra iuncturam apprehendat, alter digitum obvolutum, atque ita uterque ad seipsum probe extendat, simulque elapsum articulum ad sedem suam detradat. Si vero in obliquum excidit, extensionis quidem idem modus est. Ubi vero jam visus fuerit tibi articulus lineam transgressus esse, simul cum extensione statim ad locum suum detrudere oportet, ita ut alius quidam ex altera digiti parte observet, ac repellat, ut ne rursus illic elabatur. * Moderata quoque repositionem faciunt vimineae texturae, sauræ id est lacertæ appellatae, ex palmis contextæ; ita ut dum digitum huc atque illinc distendis, altera manu lacertam, altera manne iuncturam apprehendas. Postquam autem repositus, deligare oportet linteis quameitissime tenuissimis incertatis, cera neque valde molli, neque valde dura. Dura enim de digito abscedit. Mollis autem & liquefcens eliquatur, & digito calefcene depetit. Solvendus autem est digiti articulus tertia, aut quarta die. In summa, si inflammatus fuerit, frequentius solvendus est, sin minus, rarius. De omnibus articulis hac dico. Restituitur digiti articulus decimaquarta die. Idem vero est curationis modus digitorum manus, ac pedis. Circa omnes autem articulorum repositiones attenuare oportet, ac fame macerare usque ad septimum diem: & si inflammati sint, frequentius solvere; sin minus, rarius. Quietem vero semper habere oportet afflictum articulum, & quamoptime figuratum positum esse. * Geni porro propter expeditam, ac facilem nativam mitius est, quam cubiti gibbus. Quare etiam facile excidit. Excidit autem saepe intro. Sed & extra, & in posteriorem partem. Repositiones autem sunt ex repentina conflexione, aut ex calcitracione aut convolutam fasciæ molem in popliteum posito, & circum illam corpus ita ad flectendum genua in terram dimittito. Potest etiam, ubi in posteriorem partem excidit, moderata extensione reponi, veluti cubiti gibbus. Si vero hac aut illae excessit, ex conflexione, aut ex calcitracione reponitur. Cæterum directio ex moderata extensione omnibus communis est. Si vero non inciderit, hi, quibus in posteriorem partem excidit, flectere non possunt: sed neque alij ita valde: minuitur autem femoris, & tibiae anterior pars. Si vero intro, valiores sunt. Minuuntur autem externæ partes. Si vero extra, magis vati, ac detorti, minus claudi sunt, crassiores autem ossa veluntur, & inter-næ partes minuuntur. At si ex nativitate, aut in augmento hæc sunt, iuxta priorem rationem res se habet. * Cæterum articuli circa malleolos luxati extensione vehementi opus habent aut manibus, aut alijs huiusmodi, & simul directione utrumque præstante. Commune autem hoc est omnibus. At vero luxationes articulorum in pede, velut eas, quæ in manu sunt, sanabis. Qui vero cum tibia communionem habent, & ex nativitate elapsi sunt, aut etiam in augmento luxati, eandem cum manu repositionem expetiunt. Quicumque vero facto saltu ex superatis, calcaneo innitentes se firmarunt, sic ut ossa disparata sint, & venæ humores effuderint, & nervi contusi sint; si graviter hæc acciderint, periculum est, ne corruptione accedente, per omnem vitam affligantur, oborta enim sunt ossa, nervi autem inter se communionem habent. * Quin & quibus fractis aut ex vulnere vel in tibia, vel in femore, aut nervis exolutis, qui his communicant, aut ex negligentia decubitu calcaneum fuerit denigratum, etiam his maximæ recrudescentiæ ex talibus sunt. Quandoque etiam ad corruptionem accedunt febres acutæ, singultosæ, mentem percellentes, citam mortem inducentes, & insuper venarum sanguisularum livores. Signa recrudescentium sunt, si effuso sanguine fugillara, & denigrata, & vicina his, subdura ac subnubra fuerint. Si enim cum duritia livescant, periculum est, ne denigrescant. Si vero sublivida sint, aut etiam livida, mollia, & dissila, aut cum vitore subpalhida, ac mollia; hæc in omnibus talibus bona sunt. Curatio, si febris absit, vetaturo in potu dato sit, sin minus, non, sed potu si opus sit, favorum cremor decoctus, asæ acetum multum dulce detur. Deligatio convenit qualis in articulis. Ad contusiones autem magis, quam ad omnia, linteis pluribus, ac mollioribus utendum est, & minus comprimendum, & plurima insuper calcaneo obvolvenda. Figura sit velut deligatio postulat, ut ne ad calcaneum exprimitur. Ferulis utendum non est. * Quibus veto aut ipse pes solus excesserit, aut cum appendice, excidit quidem magis ad internam partem; his si non rursus incidat, attenuatur progressu temporis & coxa, & femur, & tibiae pars luxationi opposita. Repositio est velut iunctura ad manum. Extensio autem vehemens. Curatio pro lege articulorum. Recrudescit, sed minus quam manus articulus sive iunctura, si quæverint. Victus paucior quiescentibus expedit. Quæ vero ex nativitate, aut in augmento sunt, iuxta priorem rationem.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE ULCERIBUS.

Argumentum in Librum sequentem,

- 1 Ulcera non nisi vino humectare oportet, si non in articulo fuerit ulcus. Ulcus natura humidum. Ulcera quaedam neque cataplasma ferre queunt, Dieta.
- 2 Aetius cuiuscunque generis visceribus inimicas. Ulcerum inflammatio quomodo praecavenda, Ulcerum inflammatio, & suppuratio. Cataplasmate in ulceribus quatenus attendendum. Ulcerum acuto specillo incisuram eadem, quae valuerunt curatio.
- 3 Carnis ex telo confusa, ac dissecta curatio, Sanguinis frequens defluxus quibus ulceribus conveniat. Quae post sanguinis defluxum iis ulceribus conveniant.
- 4 Olei illis quibus ulceribus, & quae tempore adhibenda, Ventris purgatio quibus ulceribus, & vulneribus conveniat, Deligatio quando adhibenda.
- 5 Quae anni tempora quibus ulceribus magis conveniant, Ulcerum purgationis signa. Ulcerum coitionem quae impediant, Ulcerum cicatrices quae caviores. In ulceribus rotunda subcata exsidentia.
- 6 Ignis sacer ulcers superveniens. Tumor obortus circa ulcera. Ulcus ex inflammatio-

- ne tumidum, Ulcera ex casu, aut alio quovis modo dissecta.
- 7 Ulcus sub profunda carne. Ulcera ventris. Cataplasma tumorum, & inflammationis in circumscriptis partibus.
- 8 Ulceris puri inflammationis curatio. Uve alba immatura succus in ulcera.
- 9 Pharmacum ad ulcera inveterata, ac recentia, & ad pudendi, & capitis, & aurium ulcera.
- 10 Vulnera recentia avertens, ne putrescant. Ad cruenta vulnera. Pudendorum verrucis conferentia.
- 11 Cava ulcera replentia. Lepopyrum. Aliud liquidum.
- 12 Sicca, ad cruenta vulnera. Aliud siccum mordax. Ad tetra ulcera in tibiae sentia, Ad nervi dissoluti.
- 13 Medicamentum mollientia, & cicatrices pulchritudinem facientia.
- 14 De ambustis. Aliud non mordax.
- 15 Tumores in pedibus & sponte, & non sua sponte aborti, in quibus neque tumores, neque inflammatio, a cataplasmatibus fiunt.
- 16 Tumorum peritio. Varix in tibiae perspicua, aut in carne.
- 17 De vera scissura.



- 1 **U**LCERA thiverfa, nisi vino, humectare non oportet, si non in articulo fuerit ulcus. Nam sicum sano propius est, & humidum non sano. Est enim ulcus, humidum, quod vero sanum est, sicum. Praestat autem absque deligatione finire, praeterquam quod cataplasma imponitur, quamquam aliqua ulcera neque cataplasma ferre possint, magis autem recentia quam vetustiora, & quae sunt in articulis. Modicus cibus, & aqua quammaxime omnibus ulceribus conveniunt, & si quod alius ulcus inflammatum est, aut inflammationem minatur, & si periculum est corruptionis: & ulceribus ac inflammationibus in articulis: & ubi convulsionem fieri periculum est: & vulneribus in ventre. Maxime vero omnium, fracturis in capite, ac femore, & si cuiuslibet parti fractura contigerit. * Stare autem ulcers minime conducit, praesertim si quis in crure ulcus habeat, imo neque sedere, neque ambulare. Venum otium, & quies maxime conferunt. At vero recentia ulcera omnia, tum ipsa, tum circumscriptae partes, minime inflammationem incurrent, si quis quamcunque suppuret, & pus ab osculo ulceris non interceptum supprimatur, aut si quis avertat, ut omnino non suppurent, praeterquam necessario, eoque paucissimo pure, & sicca sint, quammaxime ex medicamento non molesto. Igneum enim fervorem hoc inducit, ubi horror, & pulsatio accellit. Inflammantur enim ulcera tunc, quum ad suppurationem tendunt. Suppurantur autem alterato sanguine ac calefacto, donec putrefactus talium ulcerum pus fiat. Quum vero cataplasmae opus esse visum fuerit, non ipsum ulcus cataplasmate integere oportet, sed circumscriptas partes, quo pus decedat, & quae indurata sunt mollescant. Ceterum ex ulceribus, si quod acuto specillo incisum, aut dissectum fuerit, eruentis vulneribus apertum medicamentum suscipit, & refectorium quoddam, 2 quod prohibet suppuracionem. * Si qua caro ex telo confusa, & dissecta est, eam 3 curare oportet, quo quamcelerrime suppuretur. Nam & minus inflammatur, & necesse est carnes confusas ac dissectas putrescere, ac pus fieri, & eliquari, ac consumi, & postea novas carnes nasci. Omni recenti ulcers, praeterquam in ventre, conducit frequentem sanguinem defluere facere, prout oportum esse visum fuerit, & ab ipsis partibus ulcus complectentibus, tum alias, tum si in tibia ulcus fuerit, aut in digito pedis, aut manus, magis quam si alicubi in alia corporis parte. Sanguine enim defluente, gracilescunt, sicciora sunt ac minora. Prohibet enim hoc maxime talia ulcera humectari. Deinde vero in omnibus putredo sanguinis ex sanguinis transmutatione fit, Confer autem post sanguinis defluxionem in talibus ulceribus

ribus etiam spongiam deligare densam, mollem, concisam, sicciorem quam humi- 35
diorem, aut super spongiam superne folia multa ponere. * At oleum, & quæcumque
4 mollia, aut oleosa sunt medicamenta, talibus ulceribus non conducunt, si non valde
jam ad sanitatem tendant. Neque ulceribus ex recenti vulnere oleum conducit, neque
mollientia, neque adiposa medicamenta, tum alias, tum quod ulcus amplores purga-
tione opus habet. Ut autem in summa dicam, oleo illitio facienda est, & in æstate, 40
& hyeme, in his, ad quæ talibus medicamentis opus habemus. Depurgatio ventris
deorsum plurimis ulceribus confert, & in vulneribus, quæ sunt in capite, & in
ventre, & in articulis, & in quibus corruptionis periculum est, & in his, quæ con-
fusa sunt, & in exedentibus, ac serpentibus, & alias inveteratis ulceribus. At ubi
deligare voles, pharmaca non prius imponere oportet, quam ubi valde siccum seceris 45
ulcus. Tunc vero apponere oportet, ulcus autem sæpe spongia detegere, & rutilis
linteum siccum, ac purum sæpe adhibere, atque sic imposto medicamento, quod con-
ferre videtur, deligare, aut non deligare. * Plerisque ulceribus tempus calidius com-
modus est hyeme, exceptis his, quæ in capite sunt, ac ventre, magis vero æqui-
dii tempus. Ulcera quæcumque probe, & prout oportet purgata sunt, semper 50
ad sicciorem modum germinationem faciunt. Hæc autem plerumque carne non superex-
crescunt. Si undecumque tandem os discesserit, aut usum, aut sectum, aut alio modo,
horum ulcerum cicatrices caviore sunt. Ulcera non purgata, non committi solent, et-
iamsi adducantur, neque sua sponte coeunt. Ubi circumscizæ ulceris partes inflam-
matae sunt, quamdiu durat inflammatio, ulcera coire non solent. Sed & ubi 55
circumscizæ partes denigratae fuerint, & sanguinis putredine, aut etiam varice, in-
fluxione sanguinis exhibente, neque hæc coire solent, si non circumscizæ ulce-
ris partes sanas seceris. Ex ulceribus rotunda si subcava fuerint, excidere opor-
tet undique in orbem eas, quæ discesserunt, aut omnia, aut ex dimidio circuli,
6 secundum longitudinem naturæ hominis. * In omni ulcere igne sacro acce-
dente, corpus purgationem facere oportet, in utram partem ulcers contulerit,
sive sursum, sive deorsum. Cui tumor obortus fuerit circa ulcus, ulcere non
inflammato, huc postea temporis progressu tumor puris subsideantem habet.

Quodcumque ulcus ex inflammatione tumidum non sedatur, dum alia, quæ si-
mul inflammari, ac tumescere cœperunt, sedantur, etiam hoc non coalescere peri- 65
culum est. Quæcumque vero ex casu, aut alio quopiam modo dissecantur, & con-
tenduntur, & intumescunt, ita ut vicinæ circumscizæ partes suppuratæ pus de tu-
moribus per ulcus egerant, in talibus quicquid cataplasmate opus habere visum
fuerit, non super ipsum ulcus cataplasma ponere oportet, sed super circumscizæ par-
tes, quo pus decedat, & indurata molliantur. Postquam autem mollita fuerint, & in- 70
flammatio sedata, spongiis super ea, quæ abscesserunt, deligatis compescito, ini-
tio a sana parte facta, atque ita procedendo. Superne vero super spongiam folia sint
multa. Quum vero compesci non poterit caro, quæ humida existit, in cassia est, ut
hanc ejicias. * Si sub profunda carne ulcus fuerit, ex utrisque & ex deligatione, &
7 ex eo quod insuper compressit, hoc sane incurvum subattollitur, & si quis id se-
cet specillo, si fieri poterit, ad fluxionem accommodatum ab ore ulcus rescicare o-
portet, ubi commodum tempus esse visum fuerit, atque ita curationem adhibere, qua-
licumque tandem indigere videbitur. Plerumque vero in omni ulcere, quod ventrem
habet, in directum ad visum conspicua sunt omnia, tumore non præsentē. Et si qui-
dem in ipso fuerit putredo, aut caro suberit humida, ac putrida, hoc ulcus & com- 80
plectentes ulcus partes, aspectu nigra sublivida erunt. Et in exedentibus ulce-
ribus, quæ parte phagedæna affuerit, vehementissimeque depauperantur, ac eda, ea
parte circumscizæ ulceris pars colorem habebit nigrum, sublividum. Cataplasmata tu-
morum, & inflammationis in circumscizis partibus sunt verbascum coctum, & tri-
folii folia cruda, & ligustri folia cocta, & polium. Si vero etiam purgari opus habue- 85
rit ulcus, omnia quidem etiam hæc purgant. Sed & fici, & oleæ folia, & marrubi-
um. Coquere autem oportet hæc omnia, & maxime viticem, & fici ac oleæ folia, &
mali punice folia similiter coquere oportet. Crudis vero his utendum est. Mal-
væ folia terito cum vino, & rutæ folia, & origani viridis. Omnibus his lini semen
torrefactum, ac tustum quamlevissime, ammiscere oportet. Ubi vero periculum est, 90
ignem sacrum in ulceribus oboriturum esse, statidis folia trita cruda cum lini semi-
ne imponento, aut lini semen solani, aut isatidis succo subactum imponento. * Quum
autem ulcus purum quidem fuerit, verum inflammatum est, & ulcus, & circumscizæ
item inflammatae partes, lentem vinum coctam, ac leviter tritam, oleo modico sub-
actam imponento, ac deligato, & rubi canini folia in aqua cocta, leviter trita im- 95
nito, lineo tenui subextento, puro, vinoque, ac oleo madesfacto. Et ubi committe-
re, ac coalescere ulcus voles, rubi canini folia velut lentem præparato. Nasturtium
item sauridion a lacerti similitudine appellatum, vinum, & lini semen tenuiter tri-
tum commiscitur. Et hæc, lini semen, & vitex crudus, & alumen melium, hæc ace-
ro subacta. Uvam albam immaturam per colum in vas æris rubri expressam, per 100
dies ad solem exponito, noctu autem tollito, ut ne irroretur. Per dies vero indefi-
nenter terito, ut æqualiter siccetur, & de æneo vase quamplurimum assuunt. Tanto
autem tempore ad solem exponere oportet, donec ad mellis crassitudinem de-

- venierit. Postea & hunc succum, & mel quamoptimum, & vinum dulce in aneam ollam infundito, ita tamen, ut prius resinam terebinthinam in vino coquas, donec dura fiat instar mellis cocti, & postea resinam eximas, & vinum affundas. Sit autem plurimum uvæ immaturæ succus. Secundo loco vinum. Tertio mel. Myrrham etiam statim quamoptimam, leviter tritam, eodem vino paulatim affuso diluito, & postea ipsam per se ipsam cum vino saepe agitando coquito, & ibi ad bonam crassitudinem devenisse videbitur, ad uvæ immaturæ succum affundito, & nixum optimum torrefactum sensim ad pharmacum ammisceto, & floris aris minus, quam nixi. Hæc postquam miscueris, coquito non minus tribus diebus, ignis fuculis non multis succensis, aut prunis, ut ne torreatur, & ubi hoc pharmacum illinitur, omnia, quæ imponuntur, sicca sunt, & ulcera non humectentur. * Utendum autem est hoc pharmaco ad ulcerata inveterata, ac recentia, & ad pudendi, & capitis, ac aurium ulcera. Aliud ad eadem ulcera. Pel bubulum siccum, mel quamoptimum, vinum album, in quo cocta sint lotiamenta, thus, myrrha æqualis, crocus æqualis, flos aris similiter. Ex liquidis autem vinum sit plurimum, deinde mel, paucissimum verofel. Aliud. Vinum, mel, oleum cedrinum. Sicca vero sint flos aris, myrrha, malicorium siccum. Aliud. Flos aris tostus dimidia parte, myrrhæ duæ partes dimidiæ, etoci partes tres, mel modicum, cum vino hæc torrentur. Aliud. Thuris pars, gallæ pars, croci tres. Hæc singula sicca quamlevissime terito, deinde mixta ad solem calidissimum, affuso uvæ immaturæ succo, donec viscosa fiant, per tres dies terito, postea vino austero, nigro, odorato paulatim affuso, diluito. Aliud. In vino dulci albo ilicis radices coquito, & ubi probe habere visum fuerit, de vino desinso duas partes sumito, & amurcæ olei quamsiccissimam partem unam. Postea agitando coquito, ut ne torrescant, lento igne, donec ad bonam crassitudinem deveniant. Aliud. Reliqua quidem eadem sint. Verum pro vino, acetum sit album, acerrimum, in quo tinctæ sint succidæ lænæ. Postea ammixta amurcæ coquito, & succum caprifici affundito, & alumen melum, & nixum, ac aris florem, utraq; tota ammisceto. Hoc magis priore ulcera purgat. Verum prius non minus resiccat. † Aliud. Lanæ succidas paucissima aqua tingito, deinde vini tertiam partem ad aquam misceto, ac coquito, donec bona provenerit crassitudo. Ex his recentia vulnera quamcicillissime supponari possunt. Aliud. Aron siccum inspergito, ac adaptato. Aliud. Fici, dum succulenta est, corticem viridem, in vino tritum immixtito: & sine vino, ipsum etiam cum melle. Aliud. Ad acetum, in quo cocta sunt lotiamenta: sit autem album: amurcam olivarum, & preis serum crudum ammisceto, & illinito, & infillato, & deligato sicca. Hoc recentia vulnera avertit, ne suppurentur: aut aceto abluito, & vino imbuta spongia extergito. Aliud. Plumbum tritum cum spodio cyprio levigatum inspergito. Et lotiamenta inspergito, & squamam aris, & chalcitidem cum are, & solam per se, & cum lotiamentis. Et alias, ubi siccis opus fuerit, talibus utendum est, & spodio Illyrico trito cum tamentis, & ipsis folis tamentis, & flore argenti solo, quamlevissime trito, & aristolochiam rasam, ac tritam leviter, inspergito. Aliud ad cruenta vulnera. Myrrha, thus, galla, ærugo, flos aris tostus, alumen Ægyptium tostum, cœnanthe, lanarum sordes, plumbago, horum singulorum æquale pondus diluitur cum vino velut superius, & reliqua præparatio sic eodem modo. Aliud. Acetum quamacerrimum album, mel, alumen Ægyptium, nixum optimum leviter tostum, fellis parum, simmel coquito. Hoc carnem superexcrecentem consumit, & cavat, & non mordet.
- 150 Aliud. Herba est parvis foliis prædita, cui nomen est Parthenium microphyllum. Hæc verrucas de pudendo aufert: & chalciris ex insula Melo cruda, & elaterium tenue siccum adstringit, & malicorium tenue siccum eodem modo. * Maxime autem replet tava, pura, herba Lagopyrus nomine: est autem tritico similis ubi arefcit, folio parvo velut olea, sed longiore: & marrubii folium cum oleæ foliis.
- 155 Aliud. Caricæ siccissimæ internam partem pinguem, mellis speciem referentem duabus portionibus, cum seminis lini tosti non admodum, ac triti quantenuissimæ portione. Aliud. Caricæ partem internam, & florem aris tenuem modicum, & fici succum. Aliud. Caricæ partem internam, chamæleonem nigrum, bubulum sel siccum. Aliud. Reliqua quidem eadem sint. Verum sicca, nascuntur tenue crudum, irio, utramque pari pondere, caricæ vero partes duæ sint, & feminis lini partes duæ, cum fici succo. Quum autem aliquorum pharmacorum uterus, splenia aceto imbuta super ne imposito, & spongia super splenia imposita deligato, & paulo magis apprimito. Si vero circumscissæ partes inflammatae fuerint, quicquid conferre visum fuerit, circumponito. Si liquido uti voles, etiam caricum pharmacum illinito, & velut supra scriptum est, deligato eodem modo. Est autem ex his pharmacum factum veratro nigro, sandaracha, squama aris, plumbo isto, cum multo sulphure, augmento, cantharide. Ex his, prout visum fuerit, componito, ac utitor. Diluuntur oleo cedrinum. Postquam vero satis fuerit illitum, pharmacum ejicito, & aron coctum, tritum imposito, aut siccum, tritum, oleo subactum. Et si sicco caricouti voles, liquida removere oportet, & pharmacum inspergere. Facit autem siccum ex veratro solo coctans, ac sandaracha. Aliud liquidum. Herba est, cujus solum simile est aro natura, verum album, lanuginosum, ad hederæ folii magnitudinem. Hæc herba cum vino imponitur.

- tur. Aut illicis partem eam, quæ est circum truncum, cum vino tritam imponito. Aliud. Uvæ immaturæ succus, acetum acerrimum, flos æris, nitrum, succus caprifici. Ad uvæ immaturæ succum alumen injecto tenuissime tritum, & in vas æris 175
12 devenerit, tollito. * Sicca ad cruenta vulnera hæc faciunt. Veratrum nigrum tenuissime tritum inspergitur, quandiu aliquid humoris inerit, ac depascensit. Deligatio vero eadem est, quæ in emplastris. Aliud. Salis grana siccissima in æneam ollam, aut fictilem novam immittito, magnitudine maxime æqualia, non magna, 180
& mel opimum dupla salis mensura, pro conjectura facta, ad silem affundito, deinde ollam prunis inponito, & dum totum combustum fuerit, finito. Postea extersio, ac expurgato per spongiam ulcere, inspergito, & velut prius deligato, & paulo magis compressito. Postridie vero qua parte non adhæserit pharmacum, inspergito, compressito, ac deligato. Ubi vero pharmacum discedere voles, acetum calidum affundito, donec discedat, & rursus eadem facito, si opus fuerit extherione per spon- 185
giam facta. Aliud siccum mordax. Misy quamlevissime tritum inspergito in ea, quæ humida sunt, ac putrida, & florem aris tenuem non penitus leviter tritum. Aliud siccum similiter mordax. Ubi spongia extersisti, lanas quammaxime succidas in testa exurito, face adnota, donec totas combusseris: hoc pharmacum leviter tritum inspergito, & eandem deligationem adhibeto. Aliud siccum ad eadem ulcera. Chamæ- 190
leo niger, alumen fici succo subactum, subigito autem tostum, & anchusam misceto. Aliud. Anagallis, & alumen Ægyptium tostum. Aliud. Pulvillum inspersilem Orchomenium inspergato. Cæterum ad nomas prosperendo depascentes alumen Ægyptium tostum, itenique Melum facit. Verum nitro rosso insperso prius præparare, 195
ac spongia extergere oportet. Facit & chalcitis tosta. Torrere autem oportet, donec flammæ speciem induat. Ad vetera ulcera in tibiis fientia, sunt autem sanguinolenta, & nigra, meliori florem tritum, melle subactum, cataplasmatris modo utere. At vero supra nervos dissectos, myrti sylvestris radices contusas, ac tribra- 200
tas, & oleo subactas deligato. Et herbam quinquæfolium: est autem alba, & lam-
guosa, & altior a terra, quam nigrum quinquæfolium: in oleo tritum deligato, & ter-
tia die exolvitur. His autem medicamentis in hyeme potius, quam æstate utendum est.
- 13 * Medicamenta mollientia, quæ etiam cicatrices pulchras faciunt. Scillæ in-
ternam partem mucosam terito, & resinam de picca, cum recenti adipe suillo, &
oleo modico, resinaque, ac cerusa modica. Et adipem anserinum, ac suillum recen- 205
tem purum, & oleum modicum, & scillam, & ceram alissimam. Aut scillam, &
oleum album, resinæ parum, ceram, adipem suillum veterem, ac recentem. Facit
& oleum, & ærum, & scilla, & resina: Sine autem duæ partes veteris adipis ad re-
centem. De reliquis autem quantum oportuerit esse visum fuerit. Adipem recen-
tem liquefactum in aliam ollam defundito, & plumbaginem levissime tritam, ac cri- 210
bratam commisceto, ac coquito, & primum agitato. Coquito autem, donec desibilant
in terram congelctur, deinde tollito, ac reliquum diffundito, præter lapidem sub-
dudentem, & resinam injecto, ac agitato, & modicum oleum cedrinum, & quod prius
diffusum, ac ablutum fuit, ammisceto. Porro in omnibus mollibus, in quibus resi-
nam amittites, ubi pharmacum ab igne abstuleris, in calidum adhuc resinam im- 215
mittito, ac agitato. Aliud. Adeps suillus veteris, & novus, & cera, & oleum;
Sicca vero, lori ramenta, thus, plumbago, thuris videlicet pars una, plumbagi-
nis una, & ramentorum lori una. Sint autem adipis veteris partes duæ, ceræ una, &
novi adipis una. Aut adipem solum veterem suillum, & cum ipso adipem capri-
num recentem quamminime cum membrana, sed purgatum, parum terito, aut con- 220
rundito, & oleum affundito, & plumbum cum spodio inspergito, & ramentorum lori
demidium. Aliud. Adeps caprinus, spodium, chalcitis cærulea, oleum.
- 14 * De Ambustis. Illicis radices coquere oportet teneras. Quarum si cortex
crassissimus est, ac viridissimus, confectum in tenues partes, vino albo affu-
so, lento igne coquito, donec ad bonam crassitudinem deveniat, ut illini possit. 225
Potest & in aqua coqui eodem modo. Aliud non mordax. Suillum adipem so-
lum veterem liquefactum illinito. Superne vero scillæ radicem dissectam imponi-
to, ac deligato. Postridie vero foveto, ac perfundito, & adipem suillum veterem
liquo, & ceram, ac oleum ammisceto, thus item, & lori ramenta, ac minimum:
hoc ubi illeversis, ari folia in vino, ac oleo cocta apponito, ac deligato. Aliud. Post- 230
quam suillo adipe illeversis vetustis, hastulæ regie radices in vino coctas, ac tritas
superillinito. Aliud. Adipem suillum veterem liquato, & resinam, ac birmem
ammisceto, & hæc linteo illita, ad ignem calefacta, imponito, ac deligato. Quum
in dorso ex plagis, aut alias ulcus factum fuerit, scilla cocta, trita, ac linteo illita
deligato. Postea vero adipem caprinum, & recentem suillum, & spodium, & oleum, 235
& thus illinito. * Tumores in pedibus fientes, & spore, & non sua sponte,
in quibus neque tumores, neque inflammatio a cataplasmatris sedatur: & si quis spon-
gias deliger, aut lanas, aut aliud quid super sanam partem, postea intumescent
sua sponte, ac inflammantur: infusio sanguinis per venas in causa est, si cui non
confusio causa est. Et si alicubi alia in corporis parte tale quid fiat, eadem ratio est. 240
Verum sanguinem detrahere oportet de venis præfectis influentibus, si conspi-

cux fuerint. * Sin minus, perturbare tumores oportet, profundioribus, ac frequen- 16
 tioribus vulnusculis impactis. Sed & in aliis omnibus, quæ perturbant, sic facere
 oportet, atque hoc acutissimis, ac tenuissimis serratibus. Quum vero sanguinem do-
 245 trahis, specillo ne valde premas, ut ne contusio accedat. Aceto autem perluto, &
 grumum sanguinis in hiatibus ne relinquo; & illito cruentis vulneribus destina-
 to medicamento, lanas succidas, carminatas, molles deligato, vino & oleo resper-
 sas. Et pertusam partem ager ita habeat, ut refluxus sit sanguinis, non defluxus; &
 omnino non humectet; & parum cibi capiat, & aquam bibat. Si vero ubi solvetis,
 250 fissuras repereris inflammatas, cataplasmata ex vitice, ac lini semine imposito. Si ve-
 ro ulcerata fuerint fissuræ, ac erupint, ad rem respiciens, & quod opus fuerit adhi-
 bens, de cætero curato. At ubi varix inest in tibia, aut conspicuus, aut in car-
 ne, & tibia est nigra, & videtur opus habere sanguine ab ipsa defluente; talia ne-
 quaquam perturbare oportet. Plerumque enim magna ulcera ex fissuris fiunt, propter
 255 variis influxum. Verum varicem ipsum alias atque alias compungere oportet, ubi
 oportumum esse visum fuerit. * Cæterum quum venam secueris, postquam sanguinem
 dimiseris, & fasciam solveris, & non sistatur, in contrariam partem habeat, quo re-
 fluxus sanguinis fiat, siue manus fuerit, siue crus, utpote sanguine retro fluente, atque
 ita tempus longius, aut brevis decumbens expectet. Postea ipsum sic habentem deliga-
 260 to, nullo grumo existente in fissura. Deinde splenium duplum vino imbutum apponi-
 to, & super ipsum lanam puram oleo imbutam. Nam etiam si influxus sangui-
 nis fuerit violentus, suppressio sit influentis. Et si grumo in fissura manente sic in-
 flammetur, suppuratur. Præsum autem, & potum plus, aut minus venam secare sine-
 re oportet, & aliquantum calefactum; & die calidiore, quam frigidiore. Si vero influat
 265 sanguis, cucurbitam affigere oportet, & si ablata cucurbita, multum sanguinis, aut sero-
 sus sanguis fluat, cito priusquam repleatur rursus affigere, & quod restat extrahe-
 re. Sin minus, grumi in fissuris inhaerent, & deinde ex ipsis inflammata ulcera fiunt.
 Aceto autem omnia talia perluiere oportet, & postea non humectare, neque in fissuras
 decumbere. Verum aliquo medicamento cruentis vulneribus destinato fissuras il-
 270 linere. Et quum infra genu, aut ad genu affigere cucurbitas oportuerit, stanti erecto,
 si stare potuerit, affigantur.

HIPPOCRATIS COI LIBER DE FISTULIS.

Argumentum in Librum sequentem.

1. *Fistularum generatio.*

2. *Fistula primum crescentes sunt rescedende.*

Agrotantis ex fistula curatio. Alia curatio.

3. *Intestini recti inflammatio. Causa huius morbi. Curatio.*

4. *Urine stillicidium unde. Sedes elapsa.*

5. *Intestini recti humectatio, & fauces fluere. Sedes, seu intestinorum rectum elapsum. Curatio.*

6. *Intestinum rectum prolapsum & sanguis profusus. Abscessus huius generantis causa. Intestini recti inflammatio. Curatio.*



ISTULÆ sunt quidem ex contusionibus, & tuberculis, sunt 1
 autem & ex remigatione, ac equitatione, quum in natibus congre-
 gatæ fuerit sanguis prope sedem. Putrescens enim distribu-
 tur ad molles partes, nimirum quum & intestinum rectum sit hu-
 midum, & caro mollis, in quam distribuitur, donec tuberculum
 7 eruperit, & deorsum ad rectum intestinum computruerit. Postquam
 autem hoc factum fuerit, in fistulam abit, ac fauce manat, & ster-
 cus per ipsam fluit, & flatus, & abominatio nitida. Ex contusionibus
 itaque fit fistula, ubi aliquis circa rectum intestinum locus contusus fuerit ex plaga, aut
 10 ex casu, aut vulnere, aut equitatione, aut remigatione, aut quæcumque talia sint.
 Congregatur enim sanguis. Putrescens autem suppuratur, a suppurato vero ea, quæ de tu-
 berculis dicta sunt, patitur. Primum igitur quum tale quoddam tuberculum nascens
 senserit, erudum quancitissime secare oportet, priusquam suppuretur, ad rectum inte-
 15 stinum. * Si vero jam agrotantem ex fistula allumpleris, alii caulem recentem accipe, a
 & homine supino reclinato, diductis cruribus altero hinc, altero illuc, caulem im-
 mitte, donec offendas ac impingas, & fistula profunditatem per caulem meire,
 & seclis radicem tenuissime tritam, aqua affusa, ad dies quatuor macerato, eamque
 aquam trium cyathorum mensura, melle amixto, ager bibat jejuniis. Cum hac
 etiam ascaridas purgato. Quicumque vero relictus fuerint non curati, moriuntur. Po-
 20 stea linteum byssinum tithymalli magni succo imbutum, flore aris tosto trito insper-
 so, in penicilli figuram intorque longitudine fistulæ æqualem, filo per summum peni-
 cillum transmissio, & rursus per summum caulem; & homine supino reclinato, ad-
 hibito catopere instrumeto sedem expandente, corrosam recti intestini partem
 inspi-

inspicio, & sic caulem immittito: & ubi in intestinum incidit, apprehensum retrahito, donec penicillus fuerit intusus, & superiori, & inferiori parti adaequatus. Postquam vero fuerit intusus, glandem corneam in intestinum indito, & pedice ex terra cimolia obliquo finito. Ubi vero ventrem exonerat, eximito, & rursus indito, donec ad quintum pervenerit diem. Sexta autem eximito, extrahens pernicillum ex carne, & alimen terito, ooque glandem expleto, & intestinum indito, ac finito, donec alumen liquidum fiat. Podicem vero myrrha illinito, donec coalescere visus fuerit. Alia curatio. Crudum linum tenuissimum accipito, & ad palmi longitudinem quincuplicato, & pilum equinum circumdato. Deinde facto specillo staupeo in summa parte perforato, & initio lini complicati in specillum immisso, specillum in fistulam demittito, & simul sinistrae manus digitum indicem in sedem indito. Ubi vero specillum contigerit digitum, inflexa summa specilli parte, initium lini, quod est in specillo, per digitum adducito: & specillum quidem rursus extrahito, lini vero initia bis aut ter connectito, & reliquam lini partem intortam ad nexum deligato. Postea vero dimissum negotia sua obito, iubeto. Ceterum quantum putrescente fistula de lino laxatur, tantum augere oportet, ac intorquere semper singulis diebus. Si vero linum cridum computrescat, penicillum fistula cortodatur, aliud linum ad pilum innecte, immitte, ac connecte. Pilus enim ea de causa ad crudum linum additur, quod non putrescat. Postquam vero fistula computruerit, spongiam mollem in tenuissima frusta concisam apponere oportet, deinde in fistulam quidem florem aris tostum mulem per specillum immittite. Spongiam vero nulle illinere, & subiecto digito indice sinistrae manus ultera protrudere, & appositam alteram spongiam deligare, eodem modo velut in haemorrhoidibus. Postridie vero exolvere, & aqua calida abluere, & cum spongia per sinistrae manus digitum fistulam purgare conari: & rursus aris florem immittite, ac spongiam deligare. Atque haec facere oportet per dies septenos. In his enim maxime tunica fistulae computrescit, de cetero vero, donec sanata fuerit, spongiam deligare. Nam dum per hunc modum fistula a spongia cogitur, ac explicatur, neque rursus concidere poterit, neque alia ipsius pars sanabitur, alia vero rursus complebitur, sed in seipsa tota sana erit. Verum in hac curatione multa aqua calida prolute oportet, & fame macerare. Si vero non corrosa fuerit fistula, specillo immisso, secato, donec diduxeris, & aris florem inspergito, & ad dies quinque finito. Deinde aquam calidam affundito, & potentiam aqua subactam superimponito, & betarum folia deligato. Ubi vero exciderit aris flos, & fistulae ulcus purum fuerit, velne priorem curato. Si vero in loco sit, ubi fieri id non possit, & profunda etiam sit fistula, flore aris, & myrrha, & nitro in urina dilutis collucto, & in fistula osculum plumbeum glandem indito, ut ne coalescat. Colluctus vero faciendus est, pennae fistula ad vesicam alligata, & fistula intro immissa, atque sic collutione inspisca. Verum sanus non fit, si non fecerit. * Si intestinum rectum inflammatum fuerit, & dolor habeat, & febris, & frequenter ad exonerandum alvum desiderat, & nihil egerat, & praest inflammatione sedes exiisse videatur, & aliquando urinae stillicidium corripit, hic morbus fit, quum pituita ex corpore ad intestinum rectum decubuerit. Conferunt autem calida. Quum enim haec adhibentur, pituitam attenuare, ac consumere possunt, & simul acrimonia sua salisam pituitam aquosam reddere, ut non sit ardor, neque morsus aliquis in intestino. Curare itaque oportet hoc modo. Aegrum in calidam aquam collocato, & trita grani cudi grana sexaginta in vini hemina, & olei hircina dimidia diluto, tepescato, & insundito. Haec & pituitam educunt, & sterces. Si vero in aqua non sedet, ova cocta in vino nigro odorato ad sedem apponito, calido quopiam inferne substrato, aut vesica aqua calida plena. Aut lini semen tostum, molitum, tritum, pari farina, in vino nigro odorato, & oleo ammixta, cataplasmatibus modo calidissime imponito. Aut hordeum, & alumen Aegyptium tritum misceito, & glandem oblongam effusinato, & ad ignem tepesciens digitis effingito, deinde summe tepidam effectam in sedem indito. Forissecus autem cerato obliuito, & allium in vino nigro diluto coctum pro cataplasmate imponito. Postquam vero exemeris, in aquam calidam collocato, & solani siccum, & anserinum ac suillum adipem, & chrysocolam, & resinam, & ceram albam commisceito, simulque liquefacito, & cum his illinito, & quamdiu inflammatio duraverit, alium coctum cataplasma adhibeto. Et si quidem ad haec a dolore liberetur, satis fit, sin minus, bibat pepulum, meconium album appellatum, aut aliud quoddam, quod pituitam purgat. Ex quamdiu durat inflammatio, edulis levibus nutriatur. * Urinae stillicidium ex his intelligitur. Vesica ex intestino recto calefens, caliditate pituitam adducit, a pituita vero urinae stillicidium fit. Si quidem igitur una cum morbo sedetur, solet enim plerumque ita fieri, satis est, sin minus, medicamenta ad urinae stillicidium destinata exhibeto. Si vero sedes elaboratur, fomento per mollem spongiam adhibito, & cochleam mico illito, e manibus deligatum suspendito ad modicum tempus, & redibit. Si vero amplius excidat, & non maneat intus, lacrum mollitudinis praecingito, & retrorsum fasciam ex cingulo submittito, & ubi sedem iusto protraxisti, spongiam mollem aqua calida, in qua loti ramenea cocta sunt, imbutam imponito.

ponito. Sed & de aqua ipsa ad sedem affundito, spongiam vero exprimito, le-
 95 alvum exonerare volet, inter tabulas angustissimas insidens id faciat. Si vero
 puer fuerit, intra mulieris pedes ad genua acclinatus. Dum autem ventrem e-
 nerat, crura extendat. Sic enim minime sedes exciderit. * At si intestinum re-
 ctum humidum fiat, & sanies defluat, fece vini ulti, & aqua ex myrti decocto ibi-
 luito, & adiantum sicum, tufum, cribratum inspergito. Si vero sanguis profluat, ab-
 100 lutione ex iisdem facta chalcitidem, & cupressi, aut cedri, aut pini, aut terebinti ra-
 menta inspergito, pari mensura de his ad chalcitidem ammixta. Forissecus autem ce-
 ratum crassum obliuio. Quum sedes, siue rectum intestinum exciderit, & in loco
 suo manere noluerit, silphium optimum, ac densissimum derafum tenue inspergi-
 to, sternutatorium medicamentum ad nares apponito, & hominem ad iram eci-
 105 cerbato. Aut ubi aqua calida abluisse, malicorium, & alumen, in vino albo tria,
 ad sedem affundito, deinde panniculos apponito, & femora per dies tres collig-
 gato, & jejune. Vinum autem bibat dulce. Si vero neque sic retro cedat, mini-
 mum cum melle illinat. * Intestinum rectum si procidat, & sanguis profluat, de
 ari radice detractum corticem in aqua coquito, deinde tritum farina ammixta calidum
 110 imponito. Aliud. Vitis sylvestris, quam aliqui pilothyrion vocant, radices te-
 nerrimas derafas in vino nigro meraco austero coquito, deinde tritas tepide im-
 ponito. Sed & fatinam ammisceto, & in vino albo, ac oleo subigito, & tepide
 imponito. Aliud. Cicute semen vino albo odorato infillato terito, deinde tepi-
 de de imposito. Si vero inflammatum fuerit, hederæ radicem in aqua coctam, le-
 115 viter tritam, ammixta farina optima, in vino albo subactam imponito, & oleum ad
 hæc ammisceto. Aliud. Mandragoræ radicem maxime viridem, sin minus, secatam
 viridem itaque locam, ac concisam, in vino diluto coquito, ac imposito: siccam vero
 tritam similiter imponito. Aliud. Cucumeris peponis internam partem leviter tri-
 tam imponito. Si vero dolor fiat, & inflammatum non sit, nitrum rubrum assa-
 120 to, ac leviter terito, & alumen, ac salem torreto, ac leviter terito, & pari mensu-
 ra singula misceto, deinde ad picem optimam ammisceto, & linteo illita apponito, ac
 deligato. Aliud. Capparis folia viridia tria, in marsupium coniecta, adalligato,
 & ubi urere videberis, austero, ac rursus apponito. Si vero folia non affuerint,
 corticem radicis capparis confusum, vino nigro subactum, eodem modo alligato. Hoc
 125 etiam ad splenis dolorem bonum est. Ex his cataplasmatibus, quæ quidem frigescent,
 fluere prohibent, quæ vero molliunt, ac calefaciunt, diffundunt, quæ in sese trahunt,
 siccant, & attenuant. Porro hic morbus fit, quum bilis & pituita ad hos locos decu-
 buerit. At recto intestino inflammato, medicamento, in quo resina, & oleum, & ce-
 ra, & plumbago, & adeps calidissimus commiscetur, illinere oportet.

HIPPOCRATIS CŌI LIBER DE HÆMORRHOIDIBUS.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 *Hæmorrhoidum generatio. Curatio.*
- 2 *Cognitio. Curatio, quæ post hæmorrhoidum
inflamem adhiberi solet.*
- 3 *Alia curatio. Alius modus.*
- 4 *Exuberantia penitus intra delitescens. Cur
sanguis non fluat in hæmorrhoidibus, ab-*

*lata exuberantia. Morsus, aut crura in
articulis resicata, sanguinem non fundunt;
supra vero, vel infra, fundunt.*

- 5 *Alius modus curationis hæmorrhoidum. Phleg-
mites.*
- 6 *Hæmorrhoidum per glandes curatio. Abul-
bris hæmorrhoidis curatio.*

HÆMORRHOIDUM morbus hoc modo fit. Quum bilis, aut pi-
 1 tuita ad venas recti intestini decubuerit, sanguinem, qui in ve-
 nis est, calefacit. Calefcentes autem venæ ex vicinis venulis sangui-
 nem attrahunt, & ubi replentur, interna sedis pars intumesceat, &
 5 & capita venarum supereminet, & partim dum a stercore exeunte com-
 primuntur, partim dum a coactavato sanguine cognuntur, sangui-
 nem ejaculantur: atque hoc maxime quidem una cum stercore, ali-
 quando vero etiam sine stercore. Curare autem oportet hoc modo. Primum eundem nosse
 oportet in quo loco sint hæmorrhoides. Rectum enim intestinum & secatum, &
 10 refecans, & consensu, & urens, & putrefaciens, etiam gravissima hæc esse vi-
 deantur, nihil læseris. Jubeo autem preparari ferrameota septem, aut octo, magnitu-
 dine palmi, crassitudine specilli crassi, ex summa parte reflexa ac lata velut in
 obolo parvo. Ex ubi priore die purgatorio medicamento purgasti, ea qua rem ag-
 gredieris urito, & homine supino reclinato, & pulvinari sub lumbos subiecto,
 sedem

sedem quammaxime per digitos foras extrahito, ferramenta candentia facito, ac
 urito, donec resiccaveris, & hoc ita ut ne contingas. Urere enim oportet, & nul-
 2 lam hemorrhoidem sine unctione sinere, sed omnes exurere. * Cognoscere autem hæ-
 morrhoidas non difficultur. Supereminet enim in internam recti intestini partem,
 velut uvæ acini, lividæ, & simul ut sedes extrahitur, sanguinem ejaculantur. Deti-
 neant autem aliqui ipsius caput & manus, dum stritur, ut ne moveantur: & dum u-
 20 ritur vociferetur, sedes enim magis inde eminet. Postquam vero inferis, lentes
 ac ervum coquito, & ex aqua trita imposito, ad quinque aut sex dies. Septima vero
 die spongiam mollem in tenuissima frusta concidito. Sit autem latitudo spon-
 giæ undiquaque sex digitorum, deinde super spongiam lineum tenue, ac leve, spong-
 iæ æquale, inelle illiū imposito, & postea subiecto digito indice sinistrae manus, 25
 mediam spongiam in sedem quampenicilline protrudito, deinde supra spongiam la-
 nam apponito, quo in sede quæta permaneat. Et laterum mollitudines præcingi-
 to, & retrorsum fasciam ex cingulo submittito, quam per media crura receptam, ad
 cingulum circa umbilicum deligato. At pharmacum de quo dixi, ad densam ac ro-
 bustam carnem faciendam, ac producendam deligatur, & non minus, quam vixini
 diebus hæc deligare oportet. Sorbenda autem est semel in die farina, aut milium, aut
 30 fursurum decoctum: & aqua bibenda. Si vero ad alvum exonerandam desideat, aqua
 calida proluo, & tertio quoque die lavet. Alia curatio. * Extractam quammaxime
 sedem, aqua calida perfundito, deinde summas hemorrhoidum partes præseca-
 to. Pharmacum autem ad sectionem præparatum sit hoc. In æneum vas mingito, & in
 35 urinam, æris florem tostum, tritum, levem inspergito, deinde diluito, ac uas agita-
 to, & in sole siccato. Ubi vero siccatum fuerit, eradito, terito, & levigarum ad anum
 apponito, & splenia oleo imbuta addito, ac spongiam supra deligato. Alius modus.
 Adnascitur ad venam sanguifluam extuberantem, velut mori fructus, & si qui-
 dem valde extra fuerit extuberantia, carnis rectorium circum ipsam nascitur. Ho-
 40 minem igitur flexis genibus in duo moraria sive excisos lapides locato, ac vi-
 deto. Comperiens enim inflatas partes inter nates circa sedem, sanguinem vero in-
 trinsecus procedere. Si itaque mollis sit, & sub rectorio cedat extuberantia, digi-
 to ipsam auferre oportet. Nihil enim plus difficultatis hæc res habet, quam si
 quis dum ovicula excoriat, digitum inter cutem, ac carnem adigat. Atque hæc in-
 45 terim dum loqueris, agro non animadvertente facito. Postquam autem extuberan-
 tiam abstuleris, necesse est sanguinis cursus ex tota detractione promanare. Itaque
 vino austero, in quo gallæ macerate sunt, cito abluere oportet: & vena san-
 guiflua una cum extuberantia peribit, & rectorium sedabitur, & quanto veni-
 50 flior affectio fuerit, tanto facilius sanatio erit. * Si vero penitus inus delinea-
 rit extuberantia, per catopertem inspicito, & ne a catoperte decipiaris videro.
 Dum enim aperitur, extuberantiam explanat; dum vero rursus contrahitur, recte
 ostendit. Auferre autem oportet, veratro nigro in anum sublito, deinde terra die
 auferre, ac vino austero infuso colluere. Cæterum quod sanguis non fluit,
 quum abstuleris extuberantiam, mirari non oportet. Neque enim si in articulis
 55 disseces manus aut crura, sanguis profluet. Si vero supra aut infra articulos seque-
 ris, cavas ac sanguifluas venas comperies: & difficile fuerit, ut expedite sistas.
 Sic etiam hemorrhoidem in sede, si supra aut infra extuberantiam detractionem
 feces, sanguis profluet. Si vero ipsam extuberantiam in connexu abstuleris, non
 profluet. Si quidem igitur ita sedatur, bene habet. Sin minus, urito, cavendo
 60 ut ne contingas ferro, sed prope admotis ferramentis resiccato, & florem æris ex
 urina apponito. * Alius modus curationis hemorrhoidum. Clysterem facere
 oportet, velut arundinem sepiariam, phragmiten appellatam, & in ipsum fer-
 ramentum probe congruum adaptare. Deinde indita in sedem clysteris fistula, fer-
 ramentum candens immittere, ac frequenter eximere, quo magis calefieri susti-
 65 neat, & neque ulcus ex calore habeat, & venæ resiccate sanæ hant. At vero si
 neque urere, neque resicare voles, ubi multa calida aqua proluxisti, & sedem ever-
 sam extraxisti, myrrham tritam, levigatam, & gallam, & alumen Ægyptium u-
 sum, una & dimidia ad reliqua parte, & melanteriæ tantundem accipe, atque siccis
 his utere. Hemorrhoidis enim ab his medicamentis decedet, velut corium combu-
 70 stum. Hæc facito, donec omnes extirpaveris. Et dimidia ehalcidis unctione pars
 idem est. it. * Si vero glandulis sanare voles, sepiæ testam, plumbaginis tertiam
 partem, butyrum, alumen, florem æris modicum, gallam, æruginem modicam com-
 misceto & mel coctum affundito, & formatam ex his glandem oblongiorem appo-
 nito, donec extirpaveris. Muliebrem hemorrhoidem hoc modo curato. Mul-
 75 ta calida rona proluo. In aqua vero odorata, velut est myrica trita coquito. De-
 inde spumam argenti tostam, & gallam misceto, & vinum album, & oleum, et an-
 seris adipem affundito, omniaque simul trita, post factam prolutionem, illinenda dato.
 Proluere vero oportet, sede quammaxime extracta.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE VISU.

Argumentum in Librum sequentem,

1 Oculi corrupti carulei fientes. Oculi maris speciem referentes. Oculorum color inter caruleum, & marinum medius.

2 Palpebra quam pro sua natura crassiores. Palpebra scabie laborantes.

3 Nyctalops. Oculi sani visum corruptentes.

4 Lippitudo annua, & popularis. Curatio.

- 1  CULI corrupti sponte quidem carulei fientes, derepente rales fiunt, & ubi facta fuerint, non est talium sanatio. Qui vero maris speciem referunt, paullatim per multum tempus procedendo corrumpuntur, & saepe altit oculus in multo tempore postea corruptus est. Huius caput purgare oportet, & venas urere. Et si quis ab initio curatus fuerit hoc modo, malum sedatur, & in deterius non procedit. At qui colorem inter caruleum, ac marinum medium referunt, si quidem puero tales fiant, ubi senior fir, sedantur. Si vero seniori septimum annum egresso fiant, melius videtur magna valde & splendida; & videt quidem procul, sed non clare; & si quid valde ad oculum admoverti, etiam hoc videt, aliud autem nihil. Confert autem huic capitis purgatio, & capitis ultiio. Sanguinem vero his detrahere non conducit, neque caruleo, neque maris speciem referenti. Et visum oculorum, oculo sano existente, in junioribus hominibus, tum semel, tum masculis, quicquam faciendo nihil iuvet, quamdiu adhuc augeat corpus. Quum autem non amplius augeat, ipsius oculi palpebras intuitus tadendo attenuato, & si opus esse visum fuerit, etiam ferramentis non admodum candentibus intrinsecus inurito. * Quum vero palpebras oculi raseris, lana mulesia, crispa, pura, circum fufum obvolvita, radito, ipsam oculi coronam vitando, ut ne ad chartilaginem usque peruras. Signum autem sufficientis rasura est, si non amplius splendidus sanguis exit, sed sanies cruenta, aut aquosa. Tunc vero liquido aliquo medicamento, in quo flos artis est, defricare oportet. Postea autem ubi & rationis, & isticionis emulsi exciderint, & ulcera purgata fuerint, ac germinaverint, fissuram per sinaput secare oportet, & quum sanguis desinuerit, medicamento cruentis vulneribus idoneo illinere. Deinde vero & huius, & omnium caput purgare operae pretium est. * Palpebrae si crassiores, quam pro natura fuerint, ex infirma parte carne, quantum potes, quamexpeditissime resecta, postea palpebram inurito, non candentibus ferramentis, vitando naturam pilorum, aut flore aris tosto tenui adstringito. Quum autem crusta exciderit, velut reliqua curato. Quum palpebrae scabie laborant, & pruritus habet, floris aris glebulam ad cotem terito, & ex ipso palpebram defricato. Et tunc squamam aris quamtemnuissime terito, deinde uvae imaturae succum excolorem affundito, ac leviter simul terito, & postea reliquum succum in vase aris rubri affundens, paullatim terito, donec crassitudo fiat velut alii intrinum, & ubi reficcatum fuerit medicamentum, leviter trito utere. Nyctalops medicamentum bibat deorsum purgans, & caput purgetur, & cervicem ejus quammaxime scarificato, & fame ad multum tempus premito. Ubi vero remiserit, unum aut duo frusta, prout maxima devorare potest, de hepate bubulo crudo in melle tincto exhibero. Si cui oculi, dum sani sunt, visum corrumpant, huic sectione, & insuper excoaratione in sinaput facta, os excindere, & aquam auferre oportet, sicque curare: & ita sani fiunt. * Ad lippitudinem annuam, ac popularem conducit purgatio capitis, & ventris inferni. Et si corpus habeat, sanguinis detractio ad quosdam ejusmodi dolores confert. Conferunt & cucurbitae circa venas affixae. Cibus, modicus panis, & aquae potus. Decumbat autem ager in renebris, procul a fumo, & igne, & aliis splendidis, atque hoc in obliquum, modo in dextram, modo in sinistram partem. Caput vero ne humectet, neque enim conducit. Cataplasma, si dolor non adest, verum velut ad fluxionem cohibendam, non confert, quum tumores sint doloris exortes. Verum post acria medicamenta, quae ad dolorem illinuntur, postquam dolor sedatus fuerit, ac separatus, post medicamenti illirinnem, tunc cataplasmata imponere conducit, si quod commodum fore visum fuerit. Nec vero ad multum tempus contenta intueri confert. Lachryma enim provocatur, quum non possit oculus ad splendida officio suo fungi. Sed neque ad multum tempus claudere oculos conducit, maxime si fluxionem calidam habeat. Lachryma enim suppressa, calefacit. Si vero fluxio non sit, cum pulvillo secco subliationem facere conducit.

HIPPOCRATIS COI EPISTOLÆ.

Argumentum in Librum sequentem.

- 1 *Anxietas spirituum magnum ac densum habet. Pestilens morbi grassationem naturalia auxilia non, sed ars ipsa, corporum mutationem indicans, curat.*
- 2 *Hippocratis genus & familia. Medicina ab Hippocrate ex parvis, ac vulgaribus ad magna est evecta. Hippocrates a Crisimide rege natus, ac Esculapio decimusoctavus, a Jove vigesimus. Hippocrates ab utroque femine a diis ortum habet. A quibus medicinam cognovit. Hippocrates aequalis cum diis bonis, & donaria consecutus est.*
- 3 *Consilio præstantem virum invenire difficile est.*
- 4 *Hippocrati sapientia quam auri potior fuit ratio.*
- 5 *Risus Democriti. Aerem Democrito esse idolis plenum.*
- 6 *Sapientia res est omnibus cognata.*
- 7 *Viri boni, & eruditi populi sunt munimenta. Artes, dona deorum, homines vero natura sunt opera. Artis opera libera esse debent. Scientia quatenus servare dicantur.*
- 8 *Avaritia. Anima morbi insania. Hippocrati censetur. Divitia, patria inimica.*
- 9 *Hofes servare, & amicos mercede sanare, aequale peccatum.*
- 10 *Atta bile periculis actiones & studia. Disciplinarum studiosi solitudinis & tranquillitatis amantes. Cupiditates malorum ministra. Mens ab externis curis agitata quiete reficitur.*
- 11 *Quatenus Democritus insania morbo laborare videatur.*
- 12 *Dolentia quantumvis multa, non tamen immodica paranda. Anno salubri, morbi minus infestans.*
- 13 *Mulier semper moderatore eget. Amicus quem parentes in custodienda uxore diliguntur.*
- 14 *Risus immodicus insania signum. In mundo res duæ precipuæ.*
- 15 *Hippocratis de Democrito somnium.*
- 16 *Peritatis cultus.*
- 17 *Medicina patrii nationi cognata. Cræteus radicifera.*
- 18 *Avaritia radix. Herbe montanae cur aquosus præstantes. Herbe lacustres quales. Dilatio ab omni arte aliena est.*
- 19 *Anima curatior. Periclitantium natura. Medico fines duo propositi.*
- 20 *Medicamentorum purgantium natura incerta.*
- 21 *Purgantes per veratrum semper sunt stabiliores. Atelampus.*

- 22 *Bilis causa furoris hominibus. Humana studia circa res inanes, ac nullo studio dignas versari.*
- 23 *Mundorum infinitates Democrito multa. Humanorum studiorum vanitas.*
- 24 *Vite omnes Thersisa sunt.*
- 25 *Omnium rerum vicissitudo. Successuum fortuna magnitudo periculosa.*
- 26 *Avaritia malorum omnium causa. Humani natura ad ceterorum animalium naturam collata.*
- 27 *Pœnia pharmata. Esculapius propter servatos homines fulmine ictus. Homo totus ex nativitate morbus est. Humana natura infirma.*
- 28 *Medicina contemptus unde. Peritatis cognitio nulla, neque ullum testimonium. Virtutis labor, solidis insania indicatur.*
- 29 *Veratrum. Aedico que in agrosis consideranda. Insania causa.*
- 30 *Quies cerebri sapientia in homine causa. Cerebri corruptio.*
- 31 *Humani erga medicum malevolentia. Aedico finem Hippocrates etiam senex non est consecutus.*
- 32 *Veratrum sumptuari quomodo preparandi. Atoxis corpora turbat. Veratrum quibus inimicum. Ex veratro convulsio. Purgatio sursum ac deorsum versus quibus conveniat. Pharmaca quibus vitanda.*
- 33 *Inflammationem in principio laborantibus pharmaca inimica. Veratrum quibus dandum, & quibus non.*
- 34 *Veratri purgatio per superiora, quam inferiora tutior. Sesamoides.*
- 35 *Geometria cognitio Aedico necessaria.*
- 36 *Dierum criticorum ratio & cognitio.*
- 37 *Medicina cognitio universo hominum generi necessaria. Sapientia cum medicina cognitio. Sapientia, presente sanitate, augetur.*
- 38 *Natura humana descriptio. Cerebrum. Pili. Oculi. Papilla. Nares. Labium. Mentum. Aures. Lingua. Gustus, & gula. Cor. Hepar & vesica cava. Bilia flava sedes. Penter. Intestina. Rentes. Omentum. Vesica. Uterus. Placens. Testiculi. Pubes. Crura & brachia.*
- 39 *Morborum universorum animalium genera duo. Febris convulsioni succedens.*
- 40 *Caput humorum morborum radix.*
- 41 *Decretum Atheniense. Hippocrates ob innumera sua in Græcos bene merita, magnis sacris publice ab Atheniensibus fuit initiatus.*
- 42 *Hippocratis oratio ad eam confitentis.*
- 43 *Hippocratis de Atheniensibus prolegomen.*
- 44 *Loci omnibus non eadem convenire auxilia.*
- 45 *Potestas, mala res.*

EPISTOLA I.

Rex Regum Magnus Artaxerxes, Pato gaudium.

- 1 **M**ORBUS pestilens appellatis, invasit exercitus nostros: &
 5 quum nos saepe multa fecerimus, nihil adhuc remisit. Quare
 magnopere, & per omnia tibi a me data dona, te rogo, ut aut
 aliquid ex natura tua excogitatum, aut aliquam ex arte adio-
 nem, aut aliquod alterius viri mederi potentis consilium, celer-
 10 rime ad nos mittas. Propulsa, oro, hoc malum. * Multa enim an-
 xietas populum corripuit, quæ spiritum magnum, ac densum
 habet. Non helligerantes debellamur, quum hostem habeamus bestiam illam ovilia
 devastantem. Sauciavir multos: ægre curabiles fecit: amara spicula immittit. Con-
 15 siliij inops sum. Non amplius habeo quod cum viris natura prudentibus consulam.
 Solve hæc omnia, neque nos bono tuo consilio destituas. Vale.

EPISTOLA II.

Patus, Regi Regum Magno Artaxerxe gaudium.

- 1 **N**ATURALIA auxilia pestilentis morbi popularem grassationem non solvunt.
 Qui enim ex natura sunt morbi, eos ipsa natura judicans sanat. Qui
 vero ex populari grassatione, eos ars curat, artificiose judicans corporum mutatio-
 nem. Hippocrates autem medicus curat hoc malum. * Et genere quidem est Dorien-
 5 sis, ex civitate vero Coi, patre Heraclida, qui filius fuit Hippocratis, qui Gnosidi-
 cis, qui Nebris, qui Sostati, qui Theodori, qui Cleomitræ, qui Chrisamidis.
 Hic divina natura prædixit est, & ex parvis, ac vulgaribus, ad magna ac artifi-
 ciosa, medicinam evehit. Est igitur divinus Hippocrates nonus quidem a Crisami-
 10 de rege, decimus autem & octavus ab Æsculapio, vigesimus vero a Jove: ex ma-
 tre vero Praxithea Phanaretis filia, ex familia Heraclidarum. Quare ex utroque
 semine a diis ortum habet divinus Hippocrates, ut qui a patre quidem Asclepia-
 des est, a matre vero Heraclides. Didicit autem artem cum a patre Heraclida, tum
 ab avo Hippocrate. Verum ab his quidem primum, velut verisimile est, in re me-
 dica initiatus est, quantum sane credibile est hos novisse. Universam vero artem ip-
 15 se seipsum docuit, divina natura usus, & in tantum animi industria progenito-
 res transgressus, quantum etiam artis præstantia eosdem superavit. Tollit autem non
 bestiarum genus, sed ferorum, ac agrestium morborum, per magnam terræ, ac maris
 partem Æsculapii auxilia, quemadmodum Triptolemus Cereis, semina, disper-
 gens. Proinde iustissime in multis terræ locis divinos honores etiam ipse conse-
 20 quutus est, & iisdem donariis cum Hercule, & Æsculapio ab Atheniensibus dignus
 factus est. Hunc ipsum ipse accersit, & auri atque argenti quantum voluerit, ipsi dare iube.
 Hic enim non unum modum curationis huius morbi novit. Hic est sanitatis pater, hic
 servator, hic dolorum curator. In summa, hic divinæ scientiæ princeps est. Vale.

EPISTOLA III.

Rex Regum Magnus Artaxerxes, Hyſtani Helleſponti Præfecto.

- 1 **H**IPPOCRATIS medici Coi ab Æsculapio originem ducentis, gloria artis etiam ad me
 pervenit. Dato igitur ipsi auri quantum voluerit, & reliqua abunde, quibus opus
 habet, & ipsum ad nos mittito. Nam optimatibus Persarum equalis erit. Et si quis
 5 alius bonus vir est in Europa, cum domus regis amicum facto, nihil divitiis parcens. *
 * Viros enim invenire, qui consilio præsent, non est facile. Vale.

EPISTOLA IV.

*Hyſtani Helleſponti Præfectus, Hippocrati ex Asclepiadis
 prognato gaudium.*

- 1 **M**AGNUS rex Artaxerxes te opus habet, & misit ad nos præfectos, iubens tibi
 argentum & aurum, & reliqua quibus opus habes, & quæcumque voles,
 dare, & brevi ad te mittere. Fore enim te operantibus Persarum aequalem. Tu
 itaque cito adis. Vale.

EPISTOLA V.

Hippocrates Medicus Hyſtaniſi Helleſponti Præſectio gaudium.

AD epistolam quam miſiſti, a Rege veniſſe adſerens, remitte Regi quæ dico, quam celerrime ſcribens: Quod & victu, & veſtitu, & domo, & omni ad vitam ſufficienti opulencia fruimur; Perſarum autem divitiis uti, fas mihi non eſt, neque barbaros homines a morbis liberare, qui hoſtes ſunt Græcorum. Vale,

EPISTOLA VI.

Hippocrates Demetrio ſaniſatem.

Perſarum Rex nos accerſivit, ignarus quod apud me major eſt ſapientie ratio, quam auri. Vale,

EPISTOLA VII.

Regi Regum meo magno domino Artaxerxe; Hyſtaniſi Helleſponti Præſectus gaudium.

QUAM miſiſti epistolam, jubens demittere ad Hippocratem Coim ab Æſculapio originem ducentem, demiſi. Sed & ab ipſo reſponſum tuli, quod ſcriptum tradidit, & ad domum tuam tranſmittere juſſit. Itaque ejus latorem ac nuntium Gymnaſaben Diſcorychen ad te miſi. Vale,

EPISTOLA VIII.

Rex Regum Magnus Artaxerxes Cois hæc dicit.

DATE meis nuntiis Hippocratem medicum malignis moribus prædium, & in me, & in Perſas petulantem ſe gerentem. Sin minus, cognoſcetes, etiam primi peccati poenam vos daturus eſſe. Urbem enim veſtram deſtutam, & inſulam diſtrectam, in pelagus convertam, ut in poſterum tempus nemo ſciat, an in hoc loco fuerit inſula, aut urbs Cois.

EPISTOLA IX.

Coorum reſponſum.

VILUM eſt populo, reſpondere nuntiis ab Artaxerxe miſſis. Coi nihil indignum facient, neque Merope, neque Hercule, neque Æſculapio. Quapropter omnes cives non dubunt Hippocratem, etiam ſi peſſima morte ſint interituri. Nam quum Darius & Xerxes epiſtolas ſcripſerint, & terram ac aquam a patribus noſtris petiverint, populus non dedit: quum eos ipſos ſe impetentes, ſimiliter velut alios homines, mortales eſſe videret. Et nunc idem reſponſum dat. A Cois diſcedite: quoniam Hippocratem in manus veſtras non dant. Renunciate igitur ipſi vos nuntii, quod neque Dei ipſi, noſtri negligentes erunt.

EPISTOLA X.

Senatus popuſque Abderitarum Hippocrati gaudium.

NUNC maxime urbi noſtræ in periculo verſatur vir noſter, o Hippocrates, qui & præſenti tempore & futuro ſemper gloria urbi ſperabatur. Neque nunc, o vos Dei omnes, nobis inuideatur. Hic præ multa, quæ detinet ipſum, ſapientia agrotat, ut timor non vulgaris ſit, ſi Democritus mente motus fuerit, revera urbem noſtram Abderitarum peſſimum ituram eſſe. * Etenim oblitus omnium, & primum ſui ipſius, vigilans & noctu & interdium, & ſingula parva, ac magna deridens, & totam vitam nihil eſſe putans, vitam tranſigit. Ducit aliquis uxorem, alius mercaturam exercet, alius concionatur, alius imperat, alius legarum agit, eligitur, abrogatur, agrotat, vulneratur, moritur. At hic ridet omnia, dum alios moſtos ac triſtes

- 10 fies, alios gaudentes videt. Quin & de his, quæ apud inferos sunt, hic vir perferatur, & hæc scribit. Et idolis ærem plenum esse dicit. Et volucrum voces intentis auribus explorat. Et sæpe noctu exsurgens, iolus cantilenas lentum canenti similis est. Et se aliquando in rerum immensitatem proficisci dicit, & Democritus esse similes sibi ipsi innumerabiles. Et corpus una cum mente corruptæis vivit. Hæc timentus o Hippocrates, ob hæc perturbati sumus. Quapropter nos serva, & patriæ nostræ consulturus cito adis, neque nos contempleris. Nam neque ita viles sumus: & in nobis testimonium situm est. Ob ipsum enim conservatum, & gloriam, & pecunias, & doctrinæ sanam consequeris, quamquam doctrinæ ratio multo potior apud te est, quam fortunæ. Attamen & hujus bona multa ac luculenta tibi a nobis obvenient. Etenim animæ Democriti gratia, etiam si urbs autem esset, non nostræ voluntati responderet, aut quacunque tandem re illi carendum esset. Leges nostras putamus ægorare, o Hippocrates, leges prævaricari. Adis optime vir, curaturus virum insignem. Non medicus, sed conditor, sacratorem tota Jonia murum nobis circumdabis. Civitatem, non virum curabis, & Senatui ægotantem, & ne eludatur periclitantem, aperies. Ipse legislator, ipse iudex, ipse princeps, ipse servator, & horum artifex advenies. Ob hæc te exspectamus o Hippocrates, æque hæcæiam fient, ubi veneris. Una civitas non ignobilis, imo tota Græcia rogat re, serva corpus sapientiæ. Quin potius ipsam apud te legationem agere puta doctrinam, ab hac prævaricatione liberari supplicitem. * Cognata equidem res est omnibus, velut apparet, sapientiæ. Verum his qui propius ipsam complexi sunt, velut nobis, etiam longe amplius. Et, sicut probe nosti, gratificaberis etiam futuro sæculo, si non destitueris Democritum propter veritatem, cujus primas se laurum esse sperat. Tuenim & genere, & arte conjunctus es Æsculapio. Hic vero Hercules est ex fratre nepos. A quo est & Abderus, quemadmodum omnino audivisti, cujus cognomen urbs nostra refert. Quare etiam illi grata fuerit Democriti sanatio. Quam igitur vides o Hippocrates, & populum, & vitum insignem, ad stupiditatem diffluentem, festina, rogamus, ad nos. Hæc ut etiam bona redundancia morbi existant. Quantum enim Democritus ad summam sapientiam generose pervenit, tantum nunc pariter periclitatur, ne mentis stupore & stoliditate affligatur. At reliquum vulgus Abderitarum, quod mansit absque eruditione, communem sanè sensum habet. Immo nunc prudentiores sunt ad sapientis morbum judicandum, qui prius desipuunt. Adis igitur cum Æsculapio patre. Adis cum Herculis filia Epione. Adis cum Æsculapii filia, qui ad Ilium militavit. Adis nunc Pæonias, adferens morbi medelas. Nunc terra radicibus, & herbis, & auxiliis floribus, infanque medicamentis fecunda est. Fenne igitur nunquam sensum producent neque terra, neque montium cacumina, quam nunc proferunt ea, quæ pertinent ad Democriti sanationem. Vale.

EPISTOLA XL

Hippocrates Senatui populoque Abderitarum gaudium.

- 1 C Ivis vester Amelesagoras venit in Co, & erat tunc in illa die Virgæ asumptio, & annua festivitas, ac publicus, velut nostis, conventus, & pompa sumptuosa fiebat, quam mos est eos, qui deo dicati sunt, ad Cyparissum dedicere. Quandoquidem autem & ex verbis, & ex aspectu, Amelesagoras festinare videbatur, credens, velut erat, rem ipsam urgere; epistolam vestram legi, & admiratus sum quod ob unum hominem, velut si unus homo esset ipsa civitas, turbati essis. * Et beati profecto sunt populi, qui sciunt bonos viros sua esse munimenta, & non turres, neque muros, sed sapientium virorum sapientia consilia. Ego vero, qui credo artes quidem esse Deorum dona, homines autem naturæ opera, (& ne ægre feratis viri Abderitæ) non vos puto, sed ipsam naturam me vocare, ad conservandum ipsius opus, quod periclitatur, ne præ morbo collabatur. Quare præ vobis ego nunc, naturæ ac Dii obediens, festino ægotantem Democritum sanare: si quidem sane & hoc morbus est, & non potius error vobis tenebras offundit: id quod opto, atque uniam sit hoc uberius vestræ benevolentie signum, quod etiam ad suspicionem turbamini. Argentum autem mihi venienti, neque natura, neque Deus promittere poterit. Quare neque vos viri Abderitæ cogatis, sed liberæ artis etiam opera libera esse sinatis. Qui vero mercedem capiunt, hi scientias servire cogunt, velut captivas facientes ipsas ex ipso libertate. Desinde, velut verisimile est, mentiri etiam poterint, velut de magno morbo; & negarint, velut de parvo; & polliciti non venerint, & rursus venerint non vocati. * Misera est profecto humana vita: quoniam per eam ipsam intolerabilis avaritia, velut hybernus ventus, distributa est ac penetravit. Ad quam utinam potius omnes medici convenissent, quo graviolem insaniam morbum curarent: quoniam quum morbus sit, & affligat, etiam laudatur. Ego vero arbitor etiam animæ morbos omnes viciemones esse insanias, quæ opinionibus quoddam ac imaginationes rationi inducunt. A quibus, qui per virtutem depurgatus est, la-

est, sanus evadit. Quod si ego omnino dītescere voluissē, viri Abderitæ, non utique decem talentorum gratia ad vos proficiscerer, sed ad Magnum accessissem Perfarum Regem, ubi Jotæ civitates humanis opibus refertæ mihi obtrixissent. sanassem autem illic ipsorum pestem. Verum denegavi, nimicam Græciæ regionem a malo morbo me velle liberare. Et ego, quantum in me fuisset, Barbaros expugnassem. Habuissē autem ignominiam ipsas a rege divitias, & opulentiam patriæ inimicam. Hæc vero mihi adfuerint, velut ei qui urbium Græciæ devastator esset. Non sunt divitiæ, undiquaque lucrari. Magna enim sunt sacra virtutis, quæ a iustitia non occulantur, sed manifesta existunt. Aut non æquale peccatum esse putatis, hostes servare, & amicos mercede sanare? * At non hoc modo se res nostræ habent, o Abderitæ. Non capio fructum ex morbis, neque libenter auidi Democritum mente motum esse. Qui live fanus est, amicus est: live ægrotat, curatus magis amicus erit. Audio autem ipsum gravibus ac solidis moribus præditum esse, & urbis vestræ ornamentum. Valet.

EPISTOLA XII.

Hippocrates Philopæmeni gaudium.

LEGATI, qui urbis epistolam mihi reddiderunt, etiam tuam tradiderunt. Et valde gavisus sum, & hospitium, & reliquum victum te promittente. Veniens autem bona fortuna, & meliore spe, velut arbitramur, accedemus, prout in literis est declaratum: quum non insaniam, sed quandam excellentem mentis sanitatem vir ille declaret, dum neque liberorum, neque uxoris, neque cognatorum, neque rei familiaris, neque omnino alicujus curam gerit, sed & diu & noctu apud seipsum consistit, & privatim vitam degit, plerumque in antris & solitudinibus, aut sub arborum umbris, aut in mollibus herbis, aut apud frequentia aquarum fluentia. * Contingunt igitur talia plerumque arta bile percitus. Tacturum enim aliquando sunt, & solitarii, ac deserti amantes, & rerum familiarium conspectum averfantur, alienum putantes. Nec vero dissimile vero est, etiam his qui circa disciplinas versantur, ab una erga sapientiam adfectione, alias curas exclusas esse. Quemadmodum enim famuli ac ancillæ in domibus tumultuantes, & seditionem agentes, ubi repente ipsis hera comparuit, consternati conquelescunt; sic etiam reliquæ in anima cupiditates maiorum sunt hominibus ministræ. Postquam autem sapientie conspectus seipsam ingesserit, reliquæ adfectiones velut famulæ discedunt. Non autem omnino insaniam antra & quietem expetunt, sed etiam hi qui humana negotia contemnuunt, ob tranquillitatis cupiditatem. Cum enim mens ab externis curis vexata, corpus reficere voluerit, tunc cito ipsum quieti tradit. Deinde recta exurgens, circumcirca veritatis regionem collustrat, in qua non est pater, non mater, non uxor, non liberi, non frater, non cognati, non famuli, non fortuna, non omnino quicquam ex his, quæ tumultum inducunt. Omnia autem perturbantia, exclusa sunt præ timore: & neque appropinquare audent præ reverentia eorum, quæ isthic habitant. * Habitant autem illam regionem, & artes, & virtutes omnis generis, & Dei, & demones, & senatus, & consilia. Et magnus solus in illa regione stellis multum mobilibus coronatus est: in quam fortassis etiam Democritus præ sapientia transmigravit. Deinde quum non videat amplius eos, qui sunt in urbe, utpote procul profectus; insaniam morbo laborare putatur, propter solitudinis amorem. Student autem Abderitæ argenti amorem & studium detergere, & in se manifestum facere, eo quod Democritum non intelligunt. At tu hospitium vobis, o amice Philopæmeni, præpara. Non enim volo perturbatæ urbi molestiam exhibere, quum veterem te proprium hospitem, veliri nostri, habeam. Vale.

EPISTOLA XIII.

Hippocrates Dionysio gaudium.

AUT in Halicarnasso me expecta, aut ipse ad me venire, o amice, festina. Per summam enim necessitatem abeundum est mihi in Abderam, Democriti causa, ad quem ægrotantem urbs me accersivit. Cæterum admiranda est hominum, o Dionysy, per consensum adfectio: velut una anima cum cive coægrotant. Quare mihi videntur etiam ipsi curatione opus habere. * Ego vero neque morbum ipsum esse puto, sed immodicam doctrinam: quæ revera non est immodica, sed ab idiotis putatur. Nam nunquam nociva est virtus immodica. Excellentia vero morbi opinionem de se præbet, propter judicantium imperitiam. Unusquisque enim ex his, quæ ipse non habet, iudicat ad, quod in alio abundat, superfluum esse. Sic sane etiam timidus fortitudinem immodestiam putat, & avarus magnanimitatem. Et omnis defectus, virtutis modetationem excedere putatur. Illum igitur ubi viderimus,

- cum prænotione hinc contingente, & ubi sermones ejus audiverimus, melius cognoscemus. Tu vero, o Dionysi, studio habe ut ipse accedas. Volo enim te in patria mea commorari donec rediero: quo & rerum nostrarum, & imperiis urbis nostræ curam geras. Nam haud scio quomodo ex casu contigit, ut saluber sit annus, & pristinam naturam habeat. Quare neque multi infestabunt morbi: attamen venito. Inhabitabis autem meam domum nimis quam opportunam, nimirum quum & uxor apud parentes maneat propter meam protectionem. * Attamen & illius res inspecta, quo pudice degat, & non ob viri absentiam, alios viros approbet. Honesta equidem ab initio fuit, & parentes bonos habuit. Patrem autem mirifice virilem, & malos valde odio habentem, egregie senem. Attamen semper opus habet mulier moderatore. Habet enim a natura in se lasciviam, quæ, nisi quotidie tescetur, velut arbores in materiæ multæ effusione exuberat. Ego vero amicam parentibus diligentem puro ad uxorem custodiendam. Non enim, velut illis, etiam hinc cohabitabit benevolentie affectio, per quam sæpe umbra admonitioni obceditur. In omnibus autem rebus prudentior est alienitas ab affectione, ut quæ minime a benevolentia infringatur, Vale.

EPISTOLA XIV.

Hippocrates Damageto gaudium.

- CUM apud te Rhodiessum, Damagete, vidi navem illam, cui Solis inscriptio erat, penitus pulchram, & in puppi probe instructam, & sufficientem carinam habentem. Habebat & transra multa, Et tu laudabas etiam in ipsa navigandi præstantiam, quod velox esset, & tuta, & ad inserviendum artificiosa. Et insuper prædicabas probum in ipsa navigationis cursum. Hanc mitte nobis, verum, si fieri potest, non remis, sed alia ad remigium instructam. Urget enim res ipsa, o amice, ut valde cito in Abderam navigem. Volo enim ægrotantem curare urbem, propter unum ægrotantem Democritum, si unquam viri fama ad aures tuas pervenit. De hoc patria dicit, quod insania additus sit. Ego autem cupio, immo magis opto, non re vera ipsam insanire, sed illos ita putare. Ridet, inquit, semper, & ridere non cessat in omnibus negotiis. Et hoc ipsis insanis signum esse videtur. Quare tuis in Rhodo amicis dicito, ut semper moderate se gerant, & non multum rideant, neque multum tristes sint, sed inter ambo hæc modum teneant, ut aliis comis esse videaris, aliis sollicitis, de virtute cogitans. Est profecto mali quiddam, dum ad singula ille ridet. * Si enim immodestia malum est; ea sane perpetua longe peior est. Et dicam sane ad ipsum: Democrite, & si quis ægrotat, & occiditur, & mortuus est, & obli-
getur, & quodvis malum ingruit: singula quæ sunt, materiam risus tibi præbent. Non autem repugnas Deo, si, quum duo sint in mundo, Gaudium & Tristitia, tu alterum ipsorum eiecisti? Beatus profecto fueris, (verum impossibile est) si neque mater tibi ægrotat, neque pater, neque postea liberi, aut uxor, aut amicus, sed propter tuum risum conservantur, penitus felix es. At si, dum ægrotant, rides, dum moriuntur, gaudes; & si quid mali audieris, exilararis; pessimus es o Democrite, & procul a te a sapientia. Si vero putas hæc ipsa neque mala esse, certe atra bile percitus es Democrite, periclitans ne & ipse Abderita sis: prudentior autem sit ipsa civitas. Ceterum de his exactius illic dicemus, Damagete. At vero navis etiam hoc tempus, quod hæc tibi scribo, remanet, Vale.

EPISTOLA XV.

Hippocrates Philopameni gaudium.

- * OGJEANS ac sollicitus de Democrito, illa ipsa nocte dormiens, sub ipsius aurora inirium, somnium mihi oblatum habui, ex quo puto nihil valde periculosi fore. Mirabiliter enim expegefactus sum. Videbar mihi videre Æsculapium ipsum coram, & iam ad ipsas Abderitarum portas aderamus. Æsculapius autem non ut imagines cum alias ostendunt, mitis ac blandus apparebat, sed habuit concitato, & aspectu horrendo. Sequebantur autem ipsam dracones reptilium generis immanes, longum tractum ducentes, & horribile quiddam velut in aëre, ac salicibus subulantes. Sequebantur & focii, pyxides medicamentarias probe obignatas gestantes. Deinde porrexit mihi manum Deus: quam ubi libentissime apprehendissem, rogabam ut simul mecum pergeret, & ne me in medendo destitueret. Verum is: Nihil, inquit, in præsens me opus habes; sed hæc immortalium ac mortalium communis Dea te peregrinum deducet. * Et ego conversus video mulierem pulchram ac magnam, simpliciter ornata, splendidam, cuius oculorum circuli puro lumine micabant, ut stellarum fulgorem putares. Et Deus quidem disparuit. Mulier veto illa apprehensum me manu, lento gradu benigniter per urbem ducebat.

bat. Et ubi prope donum essemus, in qua hospitium mihi paratum esse putabam, velut spectrum disparuit, hoc factem dicens: Cras te apud Democritum deprehendam. Cum vero iam se illa converteret: Rogo, inquam, optima femina, quamam es, & quo nomine vocari debes? Veritas, inquit illa. Ceterum quam accedentem vides (& derepente altera quidam mihi apparuit) neque ipsa mala videtur, audacior autem aspectu & concitator: Opinio, inquit, appellatur, & habitat apud Abderitas. Ego igitur ubi de somno surrexissem, mihi ipsi somnium interpretatus sum, quod non indigeret medico Democritus, quando sane ipse medendi Deus discessisset, velut qui medendi occasionem & materiam non haberet. Sed ipsa quidem veritas, quod Democritus sanus sit, apud Democritum manet. Opinio vero, quod Democritus agrotet, revera apud Abderitas habitat. Atque hæc vera esse, mihi Philopomen, credo, & sunt sane. Et non contemno somnia, maxime ubi etiam ordinem conservant. * Medicina autem & varicinatio valde cognatae sunt, quandoquidem & pater ambarum artium unus est Apollo progenitor noster, & præsentis & futuros morbos prædicans, & agrotos & agrotaturos sanans. Vale.

EPISTOLA XVI.

Hippocrates Crateva gaudium.

Scio te, o amice, optimum radifecam esse, & propter tuam ipsius exercitationem, & propter progenitorum gloriam, adeo ut in hac facultate, Cratevæ proavo minime cedas. Proinde nunc, si unquam alias, herbas collige, quot & quales poteris: urget enim necessitas: atque has mihi trans mitte, ad virum toti civitati comparandum, Abderitam quidem, venim Democritum. Agrotare enim ipsum dicunt, & purgatione valde opus habere, ut qui insania sit correptus. Non utemur fortassis medicamentis, quemadmodum etiam credo. Attamen undique instructum esse oportet. At vero rem herbariam apud te sæpe admiratus sum, quemadmodum etiam univerforum naturam ac constitutionem, & facerrimum terræ fundamentum, ex qua animalia, & plantæ, & alimenta, & medicamenta, & fortuna, & ipsæ divitiæ exoriuntur. Neque enim alias haberet ubi constitit Avaritia, neque sane Abderita nunc decem talentis inescasset me, pro medico mercenarium id declarantes. * Si vero possis Crateva amarum avaritiæ radicem excindere, ut nullæ ipsius reliquæ restent, probe scito, quod hominum una cum corporibus etiam animas agrotantes purgassemus. At hæc quidem vota sunt. Tu vero, quod fieri potest, nobis montanas maxime & in altis collibus nascentes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosioribus solidiores & aciores, propter terræ densitatem, & aeris tenuitatem. Nam quod attrahunt, frigidius est. Conare tamen, ut etiam de his quæ circa stagna nascuntur, & de palustribus, & fluvialibus, aut fontanis, flores colligas: quas sane debiles, & exsolutas, ac dulces succi esse scio. Omnia autem medicamenta, quæ succi & liquores fluidi sunt, in vitreis vasis ferantur, quæ vero folia, aut flores, aut radices sunt, in fictilibus novis probe obcuratis, ut neventis perstata, medicamenti vigorem, velut in animi deliquium collapsa, amittant. Ceterum statim nobis hæc mittito. Nam & tempus anni congruum est, & necessitas dictæ infanæ urget. Ab omni equidem arte aliena res est dilatio, verum maxime a Medicina, in qua dilatio est animæ periculum. * Curationum vero animæ sunt temporum opportunitates, quarum observatio finis est. Spero quidem sanum esse Democritum, etiam citra medelam. Si vero aliquis error naturæ, aut temporis, aut alterius alicuius causæ contingat: multa enim nos, qui mortales sumus, latene, utpote non omnino per veritatem corroboreatos: ad id quod obscurum est, omnem vim congregatam esse oportet. Non enim contentus est is, qui in periculo versatur, his quæ possimus, sed concupiscit etiam ea, quæ non possumus. Et semper ad duos fines nitimur, alterum hominis, alterum artis. Quorum alter obscurus est, alter scientiæ determinatus. Opus est autem in utrisque his etiam fortuna. * Iucerta enim est conjectura eorum, qui in purgationibus caute procedunt. Nam & stomachi addictionem veremur, & medicationis congruentiam ad naturam ignorare conjectamus. Non enim una & eadem est omnium natura, & aliud semper sibi ipsi decernens adimilare ac familiaris facit. Aliquando vero totum perdit. Sed & herbis multa reptilia venenum immitunt, & hiatu suo internæ ipsarum teneritudinis addictionem pro auxilio inspirant. Et huius rei ignorantia erit, nisi sane nota aliqua, aut macula, aut odor ferus & gravis, rei factæ indicationem fecerit. Deinde ipsa ars, propter fortunæ casum, a recte faciendo propolito aberrat. * Stabiliore autem semper sunt purgationes per veritatem, quibus etiam Melampus in Proci filiabus, & Anticyreus in Hercule usi esse narratur. Minime vero utemur nos illo aliquo ex his in Democrito: sed contingerit, opto, illi sapientia, efficacissimorum ac medicatissimorum pharmacorum finis. Vale.

EPISTOLA XVII.

Hippocrates Damageto gaudium.

1 **H**oc erat illud, Damagete, quod conjectabamus: non insanit Democritus, sed
 super omnia sapit, & nos sapientiores effecit, & per nos omnes homines.
 Remisi autem tibi amice revera *Aesculapeam* navem: cui cum solis signo etiam sanita-
 tis insigne apponito. Nam revera secundo numine vela fecit: & illa die in *Abderam*
 5 navigavit, qua scripseram ipsis, me perventurum esse. Omnes igitur ante portas con-
 gregatos invenimus, nos, velut verisimile est, expectantes, non viros solum, sed et-
 iam mulieres, insuperque senes & pueros, per deos, tristes, itemque infantes. Atque
 hiquidem sic habebant, velut ob *Democritum* insanientem. Ille vero sincere tunc in
 10 philosophando excellebat. Postquam autem me vidissent, visi sunt mihi paululum ad
 seipsos rediisse, & bonas spes ostentabant. At *Philopœmen* me ad hospitium ducere ge-
 stiebat; & hoc ab illis comprobabatur. Ego vero: O viri *Abderitæ*, inquam, nullum
 mihi majus operæ prætium est, quam *Democritum* videre. Illi vero hoc audito, collau-
 15 darunt, & gavisii sunt; & compendio duxit me per forum, partim sequentes, partim
 præcurrentes, alii ab utraque parte: *Serva*, clamantes, auxiliare, medicare. Et ego
 adhortabar ipsos ut confiderent, tamquam fortassis nihil esset mali, aut, si quid
 esset, modicum id esset, & correctu facile, consilii horis anni *Ereſis*. Et simul hæc
 20 dicebam. Neque enim procul erant ædes: immo neque tota civitas. Aderamus
 igitur: propinque enim muro erant, & me placide eo deducunt. At retro turrim
 collis erat altus, longis ac densis populis nigris umbrosus, unde *Democriti* habita-
 cula conspicebantur. Et ipse *Democritus* sub ampla, ac humilissima platano sede-
 25 bar, in veste crassa citra humeros desinente, solus, discalceatus, super lapidea se-
 de, valde pallidus ac macilentus, promissa barba. Juxta ipsum vero a dextra te-
 nus aqua per declivem colleem decurrens leniter resonabat. Erat autem delubrum quod-
 dam super illum colleem, quantum equidem conjectura aſſequor, *Nymphis* dicatum,
 30 sponte enatis vitibus circumdatum. Ipse vero cum multo ornatu super genibus li-
 brum habebat. Sed & alii quidam ex utraque parte adiacebant. Accumulata erant e-
 tiam animalia multa per totum reſecta. Et ipse aliquando concitate incumbens scri-
 bebatur, aliquando quiescebat, dum multumque se continens, & in seipso meditans. De-
 inde non longe post, his peractis, exsurgens deambulabat, & viscera animalium
 35 inspiciebat, & depositis ipsis digressus, rursus desidebat. At *Abderitæ* circumſtan-
 tes me tristes, & non procul a lachrymantibus oculis habentes: *Vides*, inquit,
Hippocrates, *Democriti* vitam, quam insanit, & neque quod vult novit, neque quod
 facit. Et quidam ex ipsis adhuc amplius ostendere volens ipsius insaniam, alta voce
 ploravit illarum mulierum ob filii mortem lamentantis. Deinde rursus cum gemitu eula-
 40 vit, personam agens viatoris, qui aliquid ex his, quæ portabat, amisit. Verum *De-*
mocritus cum hæc audisset, partim ridebat, partim eacinnis explodebat, & ni-
 hil amplius scribebat. Caput autem frequenter concutiebat. Ego vero: Vos, inquam,
 o *Abderitæ*, hic manete: ipse vero ubi & verbis, & corpori viri propior factus
 fuero, videroque ac audiero, cognoscam adfectionis veritatem. Et hæc loquutus, pla-
 45 cide descendebam. Erat autem locus ille asper ac declivis. Itaque vix me sufficiens
 penetravi. Cum autem appropinquaſſem, incidi in ipsum nescio quid, quasi ex nu-
 minis adſlatu & cum concitatione scribentem. Stabam igitur isthuc expectans tem-
 pus quietis ipsius. Ipse vero paullo post, intermisso scribendi impetu, & stilo scripto-
 rio deposito, respexit ad me accedentem, & salve, inquit, hospes. Et ego: Pluri-
 50 mum & tu, inquam, *Democrite* vir sapientissime. At ille, verecundans arbitror,
 quod non nomine me compellasset: Te autem, inquit, quo nomine vocabimur? Ignorantia
 enim tui nominis, causa erat cur te hospitem appellarem. *Hippocrates*, in-
 quam, medicus est mihi nomen. Is vero: *Asclepiadarum*, inquit, nobilitas, & magna
 sapientie tue in re medica gloria multum celebris etiam ad nos pervenit. Quid
 55 autem negotii, o amice, te huc perduxit? Inmo potius præ omnibus confide. *Vides*
 autem quod hæc sedes solitis instrata non est injucunda, viridis adhuc ac mol-
 lis, & ad insidendum lenior invidiosis fortunæ sellis. Cum autem consedissem, rur-
 sus inquit, Privaturne, aut publicum negotium agens huc pervenisti? Dic aperte;
 nam nos, quantum poterimus, adjuvabimus. Et ego: Quæ verâ causa est, inquam,
 60 tui gratia huc venio, ut sapientem virum conveniam. Habet autem causam patriam,
 cuius legatum ago. Ille vero: Hospitio itaque, inquit, primum utere nostro. Ego vero
 per omnia virum percontans, etiamsi jam mihi manifestum esset, ipsum non insani-
 re, *Philopœmenem*, inquam, nostri eivem vestrum? Etiam, inquit, valde: *Dæmonis*
 filium dicis, qui habitat apud *Hermæidem* fontem? Hunc ipsum, inquam, cuius ego
 sum ex patribus peculiaris amicus. At tu *Democrite* potiore me hospitio excipe,
 & primum sane quid sis hoc, quod hic scribis, dicito. Ille verò ubi paululum se
 continisset: De insaniam, inquit. Et ego: O rex *Jupiter*, inquam opportune profecto
 scribis contra civitatem. At ille: Qualem, inquit, civitatem *Hippocrates*? Ego vero:
 Nihil, inquam, o *Democrite*, sed haud scio quomodo hoc verbum mihi excidit. Verum
 quid

quid de infania scribis? Quid enim, inquit, aliud quam quid sit, & quomodo in ho-
minibus generetur, & quomodo allevetur. Nam animalia hæc, quæ vides, inquit, huius
gratia refecto, non quod odio habeam opera Dei, sed bilis naturam, ac sedem que-
rens. * Nosti enim quod hæc futuri hominum causa est, ubi numquam redundarit. In
omnibus equidem a natura meste, sed in quibusdam minus, in quibusdam amplius. At
immodestia ipsius morbi sunt, ipsa velut materia aliquando bona, aliquando mala
subiacente. Et ego, per Jovem, inquam, o Democrite, vere hæc & sapienter dicis.
Quare beatum te iudico, qui tanta quiete frueris. Nobis autem huius patricipes esse
non periculum est. Interrogante vero illo: Cur, o Hippocrates, periculum non est?
Quoniam, inquam, aut agri, aut res domesticæ, aut liberi, aut uxor, aut morbi,
aut mortes, aut famuli, aut nuptiæ, aut ejusmodi quædam, oportunitatem nobis com-
modam eripiunt. Hic sane vit ille ad solitam adfectionem delatus est, & valde effuse
risit, ac cachinnatus est. Et de cætero quiescebat. Et ego: Quid vero, inquam, De-
mocrite ridet? utrum bona quæ dixi, aut mala? Ille vero adhuc magis ridebat. Ex
Abdetræ de colle id videntes, partim capita sua cædebant, partim frontem. Alii ve-
ro capillos evehebant. Nam, velut postea dixerunt, amphorem, quam alias solitus ef-
fuset, risum effuderat. At vero, inquam, sapientium optime Democrite, cupio causam
huius tuæ adfectionis cognoscere: quo risu ego tibi dignus visus sum, aut ea, quæ
dixi: tu hoc cognito, a causa delistam, aut tu reprehensus, intempestivos risus co-
erceas. Ille vero: O Hercules, inquit, si me reprehendere potes, curationem perfices,
qualem nullam inquam, o Hippocrates. Et quomodo non reprehendaris, o optime?
Aut non absurdum te esse putas, dum rides hominis mortem, aut morbum, aut
mentis emotionem, aut insaniam, aut iram bilem, aut cædem, aut aliud quid pe-
jus? Aut vice versa nuptias, aut festivitates, aut liberorum procreationem, aut myste-
ria, aut magistratus, aut honores, aut aliud quid omnino boni? Nam quorum misereri
oportet, ea tu derides, & ob quæ letari conveniebat, ea itidem derides, adeo ut ne-
que bonum, neque malum apud te sit discretum. At ille: Hæc quidem, inquit, recte
dicis, o Hippocrates, sed non novisti risus nostri causam. Ubi vero cognoveris, satis scio
quod meum risum, inchoarem legationem accusationem, tue patriæ & tibi ipsi
auseres, & alios prudentes facere poteris. Et pro hoc sortalis me vicissim medicinam
docebis, ubi cognoveris quanto studio circa res nullo studio dignas versantes, &
ea quæ nullis pretii sunt facere conantes, omnes homines vitam consumunt, risu di-
gna tractantes. Ego vero, dic, inquam, per deos, numquid univ ersus mundus agropa-
re se non animadvertit? & non habet quo legationem demittat ad sui curationem? Quid
enim extra ipsum esse poterit? Ille vero excipiens: * Malitiam, inquit, sunt mundo-
rum infinitates, & nequaquam, o amice, divitem naturam maligne extemes. At hæc
quidem, inquam, Democrite, suo tempore docebis. Vereor enim ne forte dum infi-
nitatem recensere, ridere incipias. Scias autem nunc de tuo risu rationem vitæ te ced-
dere debere. Ille autem torve me intuitus: Duas, inquit, risus mei causas esse putas,
bona & mala. Ego autem unum hominem rideo, dementia quidem plenum, rectis
autem actionibus vacuum, in omnibus consiliis pueriliter, ac stulte se gerentem, &
nullius utilitatis gratia labores nunquam absolvendos tolerantem, suæ terræ &
infinitos recessus ex immodicis cupiditatibus penetrantem, argentum & aurum que-
rentem, & nunquam ab his adquirendis interquiescentem, sed semper circa
plura adipiscenda tumultuantem, quo ipse inferior non sit, & neque pudebat, si non
felix appellatur. Rideo item ipsum eo quod hiatus terræ effodit, manibus eorum
perquirens, qui partim a laxa irruente terra oppressi sunt, partim durissime in
hæc necessitate decedunt, in supplicio velut in patria permanent, argentum & aurum
inquirentes, vestigia pulveris ac ramenta perscrutantes, arenam aliam aliunde eru-
entes, & terræ venas exsiccantes, ad opulentiam semper glebas constantes, ex
matte terra hostiliter terram, quam tamen eadem sit, facientes, & hanc admirantes
pedibus calcant. Quanto vero risu dignum est, quod ærumnotam & occultam terram a-
mant, manifestam contumelia afficientes? Alii vero canesunt, alii equos: alii mul-
tam regionem circumcibentes, propriam sibi inferiunt: & molis impetare volentes,
neque sibi ipsis imperare possunt. Uxores dicunt, quas puillo post eiciunt. Amant, de-
inde odio habent. Cum magna cupiditate liberos generant, deinde adultos eci-
unt. Quæ est illa vana, ac absurda diligentia, nihil ab infania differens? Bellum in-
testinum gerunt, quietem non amplectentes. Reges alios deponunt, alios surrogant:
occidunt homines: terram fodientes, argentum quaerunt. Argento reperto, terram e-
mere volunt. Erupta terra, fructus vendunt: fructibus divenditis, rursus argentum ac-
cipiunt. In quos imitationibus versantur? in quanta malitia? dum opes non habent,
opes expetunt: dum habent, occultant, dissipant. Rideo, dum improbe agentes vi-
deo. Intendo risum, dum infelicitate agentes cerno. Veritatis enim leges transgre-
duntur: contentiones studio hostilem inter se litem habent, & cum fratribus, &
parentibus, & civibus: atque ad hæc, pro eiusmodi opibus, quarum nemo, ubi mor-
tius est, dominus est, se mutuo occidunt. Illicitam vitam degentes, amicorum ac pa-
triarum penuriam contemunt. Res indignas & inanimatas divitiarum loco habent:
pro universa opulenta statuas emunt, quoniam effigies ita expressa est, ut loqui vi-
deatur. Eos vero qui vere loquuntur, odio habent. Res insuper non-faciles expo-

- tunt, Nam continentem habitantes, mare cupiunt. Et rursus, cum in insulis sunt, continentem desiderant, & omnia perveniunt ad propriam cupiditatem. Et in bello quidem fortitudinem laudate videntur. Vincuntur autem quotidie a petulantia, ab avaritia, Ex omnibus adfectionibus agitantur. * Therfitæ vero vitæ omnes sunt. Cur vero meum risum reprehendisti, o Hippocrates? Non enim quispiam suam ipsius demeritiam, sed alius alterius deridet: hi quidem ebrios, cum ipsi sibi sobrii esse videntur; alii vero amantes, quin ipsi graviore morbo laborent: alii navigantes, alios, qui circa agriculturam occupati sunt. Non enim concordant neque artibus, neque operibus. Ego vero, hæc quidem, inquam, vera sunt, Democrite, neque alius aliquis convenientior sermo esse poterit ad mortalium miseriam declarandam; verum ipse res faciunt necessitatem, & domesticæ dispensationis, & navium fabricationis gratia, reliquæ item vitæ, in qua necesse est hominem esse. Non enim ad otium natura ipsam genuit. Ex his autem rursus ambitio effusa, multorum recte sentientem animam decipit, ut omnia quidem recte ac serio agere student, velut re certa, ac stabili futura. Non autem ita validi sunt, ut obsecrati prævidere possint. Si enim quis, o Democrite, uxorem ducens, separationem aut mortem timeret: aut quispiam liberos educans, ipsorum interitum: imo neque in agricultura, & navigatione, & regno, & magistratu, & omnibus quæ sunt in vita, iustus unquam de errore præsumpfit, sed unusquisque horum bona spe alitur, deteriorum vero ne meminit quidem: nunquid igitur risus tuus his minime convenit? At Democritus: Valde, inquit, tardo ingenio prædictus es, & longe a sententia mea abes, o Hippocrates, qui tranquillitatis & perturbationis modum non consideras, præ ignorantia. Si enim hæc ipsa prudenti mente disponent, & ipsi facile liberarentur, & meum risum levarent. Nunc autem, velut rebus in vita firmis, dementes illi superbiunt, ob ratiocinationis expertem mentem, inordinatum imperium suum agere discentes. * Sufficiens enim admonitio ipsis esset OMNIUM RERUM vicissitudo, quæ subitis mutationibus irruit, & derепente omnigenam circumrotationem inducit. At ipsi, velut hæc firma sit ac stabilis, oblii adfectionum assidue incidentium, aliter alias ea, quæ tristitia inferunt, cupientes, & quæ non conferunt, querentes, multis calamitatibus involvuntur. Si vero quis iuxta propriam facultatem omnia tacere cogitaret, stabilem sane vitam custodiret, seipsum cognoscens, & sui ipsius comparisonem clare considerans, & non cupiditatis studium in infinitum extendens, sed opulentiam naturam, & omnium nutriticem per sufficientiam intuens. Quemadmodum autem in optimo corporis habitu, adfectionum periculum manifestum est, ita successuum fortunæ magnitudo periculosa est. Insignes autem palam in infelicitatibus conspiciuntur. Alii vero velut proximorum facta non videntes, a propriis malefactis pereunt, tam manifesta, quam obscura non prævidentes, quum longam vitam exemplum habeant eorum, quæ sunt, & quæ non sunt, ex quibus etiam futurum considerare oportebat. Hæc sunt, quæ mihi risus materiam præbent, o dementes homines, pravitaris poenas pendentes, avaritiæ, insatiabilitatis, inimicitæ, insidiarum, doli, invidentiæ (difficile est enumerare multiplices malorum versutias, sunt enim infinite) & in his dolorosis versutiarum vicissim conversantes, & maligne sentientes. At virtutis apud ipsos modus est, id quod deterius est. Mendacii enim studium exercent, voluptatem confectantur, legibus non obediunt. Quidam vero ex ipsis prævidentiam in hominibus esse negat, ut qui neque visus, neque auditus participes sunt. Solus autem sensus hominis tecta intelligentia lucidus, & præsens & futurum prævidet. In omnibus dispendentiam habent, & rursus ad eadem accedunt, abnegata navigatione, navigant, rejecta agricultura, rursus agrum colunt, electa uxore, aliam inducunt, genitos sibi liberos sepeplint, & his sepultis, alios generant, ac rursus educant. Senectam optant, ad ipsam autem pervenientes, gemunt, in nullo retum statu constantem mentem habentes. Principes, ac Reges privatum prædicant, privatus autem regnum appetit. Qui reipublicæ magistratum gerit, artificem laudat, velut extra periculum constitutum; artifex autem illum, velut per omnia potentem. Rectam enim virtutis viam, puram & levem ac inoffensam non vident, quam nemo ingredi audeat. Fortunat autem in contrariam, difficilem & tortuosam, per aspera incidentes, lapsantes ac offendentes; plerique vero exidentes, anhelantes velut si qui persequatur, litigantes, moleculis corumpendi amore ardentes, per impudentiam indecti; alios avaritiæ morbus infinitus consumit; alii mutuo insidias struunt; alii ab ambitionis studio in aërem sublati, per malitiæ gravitatem in profundum perniciæ præcipites deferuntur. Quidam destruant, deinde rursus ædificant: largiuntur, deinde penitentia ducti, amicitia iura tollunt; malefici per inimicitiam cognationis inter bello impetrent. * Et horum omnium causa est Avaritia. Quia in re hi a pueris ludentibus differunt, apud quos consilium quidem iudicio caret; quod vero se forte fortuna obulit, id incunandum est. At vero in desiderijs quid brutis animantibus reliqui faciunt, quam quod intra sufficientiam ferre ipsi se continent? Quis enim leo antrum in terram occurrat? Quis taurus uberioris alimenti gratia depugnavit? Quam pardalim unquam insatiabilis cepit? Sic quidem aper, sed usque ad aquæ appetentiam. Lupus autem, devorato necessario alimento oblato, quiescit. Si dies ac noctes conjungat homo, non sentit con-

- vivandi satietatem. Et annuorum quidem temporum ordo terminus est beatus ad coitum; at homo perpetuo infano libidinis cetro stimulat. Quæro te, Hippocrates, non ridere debeo plorantem propter amorem, eo quod commodo suo exclusus est? maxime vero si quis periculum contemtor sit, & per præcipit, aut pelagi profunditates seratur, risum non extendam? Non ridebo autem eum, qui navem multis mercibus onustam demersit, deinde mari indignatur, quod ipsam plenam submergit? Ego quidem nequaquam mihi ridere video. Vellem autem potius aliquid mollesti contra ipsos excogitare. * At neque medicinam pro his esse oportere, neque aliam contra pœonia pharmaca præparantem. Atque huius rei documentum præbeat tibi tuus ille progenitor Æsculapius, qui dum servaret homines, fulminis ignis gratiam accepit. Non vides quod & ego malitiei pars sum, dum insaniz causam inquiro, animalia mactō, ac relecto? Oportebat autem ex hominibus causam perferriari. Non vides quod etiam ipse mundus odio in homines plenus est? Infinitas enim contra ipsum adfectiones accumulavit. Totus homo ex nativitate motus est. Dum educatur, inutilis est, & alienum auxilium implorat. Dum crescit, protervus, insipiens, pædagogus opus habens. Dum in vigore est, audax est. Dum decrevit, miserabilis, ubi labores suos imprudenter recolat ac iustat. Et maternis enim uteri inquinamentis talis prodit. Et propterea alii indignatione, ac immodica ira pleni, in calamitatibus, ac pugnis versantur, alii semper in adulteris & corruptis puellis, alii in ebrietatibus, alii in rerum alienarum cupiditatibus, alii in suis prodigendis. Utinam facultas esset nobis, universorum habitationes revelare, & nullum rerum in ipsis velamentum dimittere, atque ita ea, quæ intus aguntur, videre: videremus utique alios edentes, alios vomentes, alios suppliciis torquentes, alios pharmaca miscentes, alios insidias construentes, alios supputantes, alios gaudentes, alios plorantes, alios amicos accusantes, alios propter ambitionem amantes. Quamquam sint quedam actiones profundiores, quæ in animo occultantur. Et ex his quidam sunt juvenes, quidam senes: petentes, negantes, pauperes, opulenti: fame pressi, luxu gravati: sordidi, victi; alii delictis disfluente, famulitium magnum alentes; alii trucidantes; alii sepelientes; alii ea quæ habent contemnentes, & speratis possessionibus inhiantes; alii impudentes; alii parci; alii inexpleriles; alii occidentes; alii vapulantes; alii superbientes; alii vana gloria elati. Ex his aliqui apud equos spectatores consistunt; aliqui apud viros, aut canes, aut lapides, aut ligna, aut æs, aut picturas. Et aliqui legationibus, aliqui militiz, aliqui sacerdotiis præstant. Et alii coronas gestant, aliqui armati sunt, aliqui occiduntur. Singuli vero ex his sentunt partim ad pugnam navalem, partim ad militiam, partim ad rusticationem: alii ad onerarias naves, alii ad forum, alii ad concionem, alii ad theatrum, alii ad fugam, alii alio. Et rursus quidam ad voluptatem, delictaque, ac intemperantiam; quidam ad otium, ac locordiam. Quum igitur tot indignas, ac infelices animas videamus, quomodo non vitam ipsarum ejusmodi intemperantia præditam risu exhibeamus? * Quin & valde timco, neque medicinam tuam ipsis placere. Nam præ intemperantia omnia ipsis displiceant, & insaniam sapientiam putant. Profecto suspicor pleraque in scientia tua palam contumelia adici, aut propter invidiam, aut propter ingratitudinem. Agrotantes enim simul ut servantur, causam diis, aut fortunæ attribuant. Plerique vero tur nature hoc adscribentes, benefactorem odio habent, & parum abest ut indigne ferant, si debitores esse putentur. Sed & plerique artis ignorantiam in seipso habentes, & imperiti existentes, id quod melius est, purgant. Inter stupidos enim sunt suffragia, & neque agroti attestari volunt, neque ejusdem artis artifices testimonium præbere. Invidia enim obstat. Non autem inexpertus es tu talium iurare, imo probe scio, ob hæc te sæpe in memorabilibus adfectionibus accessum fuisse, & neque causam, aut invidiam libenter derisisti. Veritatis enim neque cognitio ulla est, neque ullum testimonium. Hæc autem cum diceret, subridebat, & mihi, o Damagete, divina specie apparebat, & velut qui priorem suam formam exuisset. Et ego: O magnifice Democrite, inquam, magna xenia & hospitalitatis tue munera in Co mecum auferam. Multa enim me sapientiz admiratione impleverit. Discedo enim veritatis tue præco, qui humanam naturam investigasti ac considerasti. Quum autem mentis meæ medelam a te acceperim, abeo nunc tempore hoc experiente, itemque corporis curatione. Græcæ vero, & deinceps, hoc loco rursus convenimus. Atque hæc loquutus, surrexi. Et ille paratus erat me sequi. Cum vero quidam accederet, haud scio unde, tradebat ipsi libros. Et ego concitatus festinavi, & ad Aberitas in specula me expectantis: Viri, inquam, pro legatione vestra ad me, magna fir vobis gratia. Vidi enim Democritum virum sapientissimum, qui solus potentissimus est homines prudentes facere. Hæc habui, Damagete, quæ de Democrito valde magna inquit lætitia tibi recensere volui. Vale.

EPISTOLA XVIII.

Democritus Hippocrati salutem.

1 **A**ccelasti ad nos velut insanos, o Hippocrates, veratrum nobis daturus, perſuaſus a viris ſtolidis, apud quos labor virtutis infania iudicatur. Tunc autem de mundi diſpoſitione, & de ſolis, ac aſtris celeſtibus ſcribebamus. Cum vero horum naturam cognoviſſes, quod omnia valde commodè eſſent creata, & quod procul ab infania, ac deſipientia abeſſent; meam quidem naturam laudaſti, deſipientes autem, & crudeles, ac ſurſoſos illos iudicaſti. Nam quæ ſimulacris per aërem vagantia nos decipiunt, quæ ſane mundus eſſe comprehenduntur, & viciffitudinem habentia creata ſunt; ea mens mea, naturam perſcrutata, vere in lucem produxit. Cuius rei teſtes ſunt libri a me conſcripti. Oportebat igitur te, o Hippo-
 10 crates, cum viris ejuſmodi prædictis minime congregi, ac convetiari, quorum mens ſuperficiaria & inconfans eſt. Si enim ab illis perſuaſus, mihi velut inſano veratrum bibendum dedidiſſes, prudentia infania facta fuiſſet, & artem tuam reprehendiſſent, velut quæ infaniz fuiſſet cauſa. * Veratrum enim ſanis datum, menti tenebras oſcundit. Infanis autem valde prodeſſe conſuevit. Arbitror equidem, ſi non
 15 deprehendiſſes me ſeribentem, verum recubentem, aut ſorte deambulantem, & mecum colloquentem, & nunc quidem indignantem, nunc vero ridentem, ob ea, quæ mente revolvam, & familiaribus me alloquentibus non attendentem, ſed cogitationem inſtantem, & mirum in modum ſpeculantem; putaſſes ſane Democritum, iuxta oculorum iudicium, ex his, quæ vididiſſes, infaniz imaginem præ ſe ferre. Oportet
 20 igitur medicum non ſolum viſu adfectiones iudicare, ſed etiam re ipſa, & rythmum ac conſonantias ut plurimum indagare, & utrum incipiat morbus, aut medium teneat aut deſinat, perſcrutari, & differentia, ac anni tempore & ætate obſervata, adfectionem curare, itemque totius corporis naturam conſiderare. Ex his enim omnibus facile morbum invenies. Porro remiſi ad te de infania tractationem a te conſcripſam. Vale.

EPISTOLA XIX.

Hippocratis Cui de infania ſcriptum.

1 * **Q**uemadmodum in libello de morbo ſacro dixi, infanienti neceſſe eſt præ humi-
 30 ditate cerebrum, in quo animæ ſunt opera, moveri, ubi videlicet humidus quam pro natura fuerit. Eo vero commoto, neque viſum, neque auditum quieſcere, ſed alias alia & videre, & audire, & lingua talia loqui, qualia ſingularis vicibus viderit, ac audierit. Quamdiu vero cerebrum quieſceat, tandum etiam homo ſapit. Sic autem corruptio cerebri a pituita, & bile. Utriuſque vero cognitio ſic contri-
 5 gitur. Etenim qui a pituita infanunt, quieti ſunt, & non vociferantur, neque tumultuantur. Qui vero a bile, percuſſores ſunt, & maleſci, ac non quieti. Et ſi quidem aſſidue infanant, hæ cauſæ ſunt. Si vero terrores & timores fuerint, a tranſmuta-
 10 tione ſunt, cerebro a bile caleſcente, quæ ad ipſum per venas ſanguinarias procedit. Cum autem bilis diſceſſerit rursus in venas, etiam corpus quieſcit. Triftatur autem & angitur homo, & præter temporis rationem obliſioſus fit, dum cerebrum a pituita perfrigeratur, & præter ſolitum morem compingitur. Poſtquam vero cerebrum derepente a bile calefactum fuerit, ſanguine in prædictis venis efferveſcente; inſomnia
 15 vident horrenda, & facies velut in vigilante flammeſcit, & oculi rubelcunt, & mens aliquid mali operati cogitat. Atque hoc in ſomno homo patitur. Cum autem ſanguis rursus ad venas diſperſus fuerit, quieſcit. Porro in quinto populatum morborum libro quemdam recensui, cui fiebat vocis interceptio, ignorantia, frequentes delirationes, & reſerſiones. Lingua autem dura, &, niſi colluſione uſus eſſet, loqui non
 20 poterat, & plerumque etiam valde amara. Venæ ſectio exſolvit, aquæ potus, aqua muſſa, veratrorum potiones. Hic ubi modicum tempus ſuperviſiſſet, mortuus eſt. Erat & alius quidam, quem, ubi noctu ad convivium progredereſet, timor tibiæz corripiebat, ubi audiret ipſam tibia-canentem. Interdum vero audiens, nihil patiebatur.

EPISTOLA XX.

Hippocrates Democrito ſalutem.

1 **A**rtis Mediæ recte facta, o Democrite, plerique e vulgo hominum non omni-
 31 no laudant, verum Diis ſæpe attribunt. * Si vero natura reſuſcitata perdidit eum, qui curatur, medicos reprehendunt, numen prætereuntes. Et ego ſane mihi videtur, maiorem reprehentionem quam honorem artis me aſſequutum eſſe. Ego enim
 ad fi-

ad finem medicinae non perveni, etiam si senex sim. Neque enim ipse inventor Aesculapius, sed & ipse in multis a seipso dissensit, quemadmodum nobis scriptorum libri tradiderunt. Proinde epistola a te ad nos missa, veratri medicinam reprehendebat. Inductus equidem sum, o Democrite, velut insaniienti veratrum daturus, non perscrutatus qualis quis tandem esses. Ubi vero tecum congressus, cognovi non per Jovem delipentiae opus, sed serine omni laude, ac commendatione dignum; valde laudavi naturam tuam, optimumque naturae, ac mundi interpretem te iudicavi. 10
Eos vero, qui me induxerunt ad te, velut insaniientes reprehendi. Nam ipsi medicamentorum opus habebant. Quamdoquidem igitur casus nos in idem conjunxit, recte feceris, si ad nos frequentius literas dederis, & libros a te conscriptos impertiveris. Misi autem etiam ipse tibi de veratri usu libellum. Vale. 15

EPISTOLA XXI.

Hippocratis de Veratri usu libellus.

- 32 * **H**IS, qui non facile rursus purgantur, ante potionem corpora praehumescere oportet ubi ubi alimento, & quere. Ubi vero quis bibit veratrum, ad morus corporum magis ducere, quam ad somnos. Declarat autem navigatio, quod morus corpora turbat. Cum veratrum magis ducere voles, corpora moveto. Veratrum periculosum est sanas carnes habentibus. Quicumque in pharmacorum potionibus non situnt, dum purgantur, non cessant purgari prius quam sitierint. Convulsio ex veratro, lethale. In nimia purgatione, convulsio, aut singulis succedens, malum. In turbationibus ventris, & vomitibus spontaneis, si quidem qualia purgari oportet, purgantur, conducit, & leviter ferunt: sin minus, vice versa. Quemadmodum autem in praenotionibus dixi, purgatio sursum versus commodat ei, in quo sine febre est cibi fastidium, aut stomachi punctura, aut vertigo, aut os amarum, & in summa doloribus supra septimum transversum. At deorsum versus, ubi sine febre est tormen, lumborum dolor, genuum gravitas, menses agere prodeuntes, dolores in partibus sub se pro transverso. Vitare vero oportet in pharmacorum potionibus eos, qui bona habent corpora, maxime autem nigros, & humida carne praeditos, sed & sublicos, & balbos, ac blēfos. * Quicumque vero inflammata in principio morbi, velut in libello 15 de pīfana dixi, statim medicamentis solvere aggrediuntur, hi de eo quidem, quod distentum est ac inflammatum, nihil auferunt. Neque enim remittit, qui crudus est adfectus; ea vero quae morbo resistunt, & sana sunt, consumunt. Corpore vero debili fiente, morbus superat, & immedicabile malum habent. Ceterum veratrum his dare oportet, quibus de capite fluxus fertur. Non autem dandum est peccore suppuratis. Neque medicamenta danda sunt decoloratis, raucosis, lienosis, exsanguibus, spirituosus & siccum sufficiens, fistulosus, flatuosus, & his qui praecordia, & latera, ac dorsum distenta habent, & torpentes, & obscure videntibus, & quibus aurium sonitus sunt, & urinae mearus impotentibus. Neque item morbo regio laborantibus, aut ventre debilibus, aut his qui sanguinis eruptiones, aut tubercula habent. 25
34 * Si vero medicandum esse videbitur, veratro securus sursum purga, deorsum vero non. Optimum autem his est victus rationem constituere. Quemadmodum autem in praedictionibus dixi, non sunt medicamenta danda his, qui nigra evomunt, neque cibum aversantibus, neque delirys & parum dormientibus, neque dolore vexatis, neque visum temerarium inelatum habentibus, neque tumefactis, neque vertiginosis, neque decoloratis, neque his qui in febre aestuosi sunt ac contracti. Sicut autem de pīfana dixi, sciamoides sursum purgat: portio eius est drachma dimidia in aceto mulso trita. Coinmifceatur etiam veratris tertiae potionis pars, & minus suffocet. Purgat item quartanas diuturnas, & diuturna febris lippia vexatos, & eos, in quibus non est sitis, neque excretio. Hos vero non ante tres hebdomadas. Aliquando etiam pleuriticos, ac volvulosos. Et sicut in muliebris morbis dixi, purgandum est etiam, si uteri purgatione opus habuerint. 30

EPISTOLA XXII.

Hippocrates ad Thessalum filium.

- 35 * **A**D cognoscendam geometriam, & numerorum scientiam, mi fili, multum studii adhibeto. Non enim solum vitam tuam illustrem, & ad multa commodam in humanarum rerum statu efficient, sed etiam animam acutorem, & clariorem reddent ad omnium, quorum usus in medicina exepitur, utilitatem consequendam. Etenim Geometriae cognitio, quae multiformis ac varia est, & omnia cum demonstratione transigit, utilis erit & ad osium suus, & ad exarticulationes, & reliquum membrorum ordinem. Nam ad multiplicem horum adfectionem, & articularum luxationum

xatorum repositione, & ossium contritorum refectione, & perforatione, & compositione, & exemptione, ac reliqua curatione, majore industria utitur quisque novem-
 10 rit qualis est locus, & quale est os, quod ex eo eluxatum est. At vero numerorum ratio & ad circuitus, & ad transmutationes febrium præter rationem sientes, & ad
 15 judicia ægrotantium, ac securitatis in morbis, sufficiens erit. * Præclara enim res est, 36
 tale ministerium in medicina habere, quod tibi partes intensionis, ac remissionis, cum
 ex parte inæquales fuerint, facile cognobiles exhibet, cetera errorem. Quapropter ad
 15 hujusmodi experientie facultatem pervenire sedulo stude, Vale.

EPISTOLA XXIII.

Democritus Hippocrati de Natura Humana.

1 * Omnes homines attem medicam nosse oportet, o Hippocrates, est enim res 37
 honesta simul ac utilis ad vitam, & ex his maxime eos, qui eruditionis ac
 eloquentie cognitionem habent. Nam sapientie cognitionem medicinæ sororem
 ac contrubernalem esse puro. Sapientia enim animam ab adfectibus liberat, medi-
 5 cina vero morbos a corporibus aufert. Augescit autem intelligentia, præsentis fan-
 10 titate, cujus providentiam habet, honestum est, eos qui recte sentiunt. At ubi cot-
 poris habitus ægrotat, neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditatio-
 nem. Morbus enim præsens animam vehementer obscurat, intelligentiam ad ad-
 10 fectionem per consensum ducens. * Ceterum naturæ humanæ descriptio, ejusmodi 38
 10 speculationem habet. Cerebrum quidem supremam corporis partem custodit,
 & securitatis tutelam sibi commissam habet, intra membranas nervosas cohabitans.
 Super quod duplicatum ossium naturæ necessariz firmatæ, dominum mentis
 custodem, ipsum cerebrum regunt. Pilorum decor est, cutem ornat. Oculorum vero
 15 vis viva in multiplici tunica latitans, ob humoris infanias, sub frontem in me-
 15 delam collocata est, & est videndi causa. Pupilla vero sincera, palpebræ margi-
 nem opportunitatis custodem sustinet. Duplices autem nates olfactum dissolcentes,
 oculorum vicinitatem dirimunt. Mollis veto labiorum contactus os circumplexans,
 verborum sensum, exactamque articulationem gubernans exhibet. Mentium autem in
 20 extremitatem desinens, ac lytx simile, dentium clavus coaptatum est. At sermonum
 20 receptacula aures opifex aperuit, in quibus dum est sermo, non ceteris temeti-
 tatis minister existit. Loquelæ mater lingua, aniuæ nuncius, gustum custodiens,
 25 minit dentium septis custodita est. Guttur autem, & gula inter se conjuncta, vi-
 cina sunt. Illud enim in viam spiritus, hæc in profundum ventris, alimentum demit-
 25 tur, large id propellens. Regium vero cor, cono ac pinæ nuci simile, iram nutrens,
 25 adversus omnes insidias thoracem induit. Frequenter autem statuum cavetæ, aere
 per ipsas etumpente, vocis causam statum pariunt. Quod vero sanguinem sup-
 30 peditat, & in alimentum transmutat, cum apicibus sæpe vena cava circumfluum,
 hepar est, concupiscentiz causa. Viridis autem bilis juxta hepar manens, ubi super-
 30 bullit, humani corporis corruptio est, & nocivus ac inutilis corporis hu-
 30 mani inquilinus. Veruntamen vice versa dormit, nullum negotium exhibens.
 Intet hæc autem medius omnia suscipiens venter chorium ducit, & accumbit, con-
 35 coctionem gubernans. Obnoxia vero ventris compositioni, per opificum convolu-
 ta, citum ventrem evolvuntur intestina, adsumptionis & excretionis causæ.
 35 Gemini autem thenes in coxis firmari, & pinguedine infecti, ab urinarum excretio-
 35 ne non sunt alieni. At dominus rotius ventris, qui omentum vocatur, rotum
 ventrem complectitur, solo splene excepto. Consequenter, nervosa vesica in co-
 35 xa osculum firmatum habens, venis complicatis, urinarum excretionis causa est.
 Huic autem vicina mater puerorum, vehemens illud malum, infinitatum ærumna-
 40 rum in muliere causa, uterus ipse latitat. Pylorus autem sive lanitor, ex coarum
 40 recessu emergens caro, nervis adstringitur. Verum de plenitudine naturæ ven-
 40 tris effundit, ex opificii providentia. Porro extra corpus peniles domum inco-
 40 lunt, ad generationem destinati, conditores testiculi, multis tunicis præditi. Jucun-
 dum ex venis ac nervis plicamentum est pubes, quæ urinarum effusionem facit, & ad
 45 coitus ministerium a natura creata est, & pubertatis apperentiam tegit. Crura
 45 vero & brachia, & extremæ partes his annexæ, totum ministerii principium coacer-
 varum habentes, tutum nervorum ministerium perficiunt. At vero incorporea in re-
 cessibus natura, omnifaria viscerum genera fabricavit. Quæ sane mors instans, cele-
 riter a ministerio quiescit reddit.

EPISTOLA XXIV.

Hippocrates Caus Demetrio Regi gaudium.

NOS equidem etiam prius, o Rex, studio habentes naturæ humanæ partes in 1
 summa considerare, has conscriptas quemadmodum voluisti demisimus. Nunc
 autem ea, quorum maxime studiosos esse oportet prudentes, partim a prioribus trans-
 sumpta, partim nunc per nos ipsos conscripta, tibi conscripsimus. Quæ si tu priorum
 morborum signis sentiens sequutus, & iisdem sæpe ulus fueris, per omne vitæ 5
 39 tempus morborum exors esse poteris. * Duo sunt morborum universorum anima-
 lium genera; alterum secundum genus, alterum secundum adfectionem, inter se dissi-
 milia. At vero concupiscentias iuxta alimentum ex subcontrariis cognoscēs, dum
 ea quæ evacuantur, indicant ea quæ plena sunt; & quæ implent, conjecturam præ-
 bent eorum quæ vacua sunt. Morbos autem omnes ex subcontrariis constitutos 10
 cognoscēs, & morbos a morbis fieri. In convulsionibus febris succedens, sistit
 morbum; capitis autem dolores, sanguis ex auribus erumpens, aut ex naribus. * Con-
 40 vulsiones omnibus morbis atræ bilis succedentes, atram bilem sedant. Et in sum-
 ma, radix humanorum morborum est caput, & maximi morbi ex hoc accedunt.
 Quum enim oti velut cucurbita medica incumbat, contingit, ut ipsum omnium 15
 eorum, quæ ingeruntur, superfluitates attrahat, & tenues humores. Oportet autem
 animum advertere, & peculiariter vivere, ubi te ipsum præparaveris in has par-
 tes, quo morbi accidentes nullum augmentum capiant, per curam diligentem & per
 bonum ordinem apud te sentient, ita ut neque rei veneræ intemperantia, neque di-
 versorum eduliorum incontinentia, neque somnis immodicis, inexercitato corpore 20
 utaris, sed signa in corpore contingentia sequaris, & uniuscujusque corporis occasio-
 nem conserves, quo morbum irruere parantem vites, & medelis, quas ego perscribo,
 utens, a morbis exors perseveres. Vale.

EPISTOLA XXV.

Decretum Asbeniensium.

Visum est, ac decretum Senatui & populo Atheniensium. Quandoquidem Hip- 1
 pocrates Caus medicus, & ab Asculapio originem ducens, magnam benevo-
 lentiam una cum salute Græcis ostendit, quando etiam peste a Barbaris Græ-
 ciam proficiscente, discipulis suis ad locos dimissis, indicavit quibus mede-
 5 cis uti oporteat, & accedentem pestem secure effugere, quo medicina Græcis da-
 ta, ipsorum agrotos tuto servaret. Sed & scripta sua de arte medica exacta edidit,
 multos esse volens medicos qui servare possent. Et Perlarum Rege ipsum accer-
 sente, & honores optimatibus Perlarum aequales promittente, & dona quacum-
 que tandem ipse Hippocrates vellet offerente, Barbari promissiones contem-
 10 pit, eo quod hostis & communis inimicus Græcis esset. Quo igitur appareat, po-
 pulum Atheniensium semper ea, quæ utilia sunt Græcis consulare, & ut gratiam
 condignam Hippocrati pro benefactis referat, visum est populo, ipsum publice
 magnis mysteriis initiare, quemadmodum Herculem filium Jovis, & coronare
 ipsum corona aurea mille aurcorum, & ipsam coronam Quinquaginta magnis Miner-
 væ festis, in certamine gymnico per præconem proclamare. Et licere omnibus Coo- 15
 rum liberis, ut Athenis pubescant, quemadmodum liberi Atheniensium: quandoqui-
 dem patria ipsorum hujusmodi virum genuit. Esse vero Hippocrati & vitam, & vi-
 ctum provium in Pritaneo per omnem vitam.

EPISTOLA XXVI.

Oratio Hippocratis ad aram consistentis.

OVos multi & multarum urbium habitatores, in magna dignitate constitu- 1
 ti, communi nomine Thessali, omnibus hominibus amara necessitas incum-
 bit, ut quæ a satis statuta sunt serant. Quapropter ego nunc cedens cum mea sobo-
 le, oleæ ramulis coronatus, ad Minervæ aram supplex consisto. Quis sim, igno-
 5 rantibus dicere oportet. Hippocrates, o viri, medicus Caus, non per piam & hone-
 stam causam, me ipsum & liberos meos vobis commendo. Cognoscitis me o plebs.
 Nam profecto vos estis viri mihi familiares, inter quos, ut verum dicam,
 inter plerisque vestrum & in multis urbibus vestris cognitus sum, ut in summa di-
 cam. At vero nomen meum longe ulterius, quam formæ meæ aspectus, processit.
 Atque

- 10 Atque hæc causa ex arte mca sanitatis, ac vitæ ortum habuisse videtur, quod non solum hominibus vestram regionem habitantibus, sed etiam multis Græcis vobis vicinis cognitus sum. Jam vero qua de causa tantum negotium opere peragendum adiumpsi, referam. * Athenienses male habebunt, q viri Thessali, qui Metropolim, ac patriam nostram Co devastantes, in servitutem redigunt ea, quæ libera sunt ex pro- 43
15 genitorum acquisitione, privatim sibi parta facientes: neque cognationem taverit, quæ ipsi est ab Apolline & Hercule, quæ sane ad Ænium & Sunium filios illorum pervenit, neque Herculis malorum domitoris beneficia mente recolunt, quæ ille communis & vobis & nobis bene faciens Deus in illos contulit. At vos per Jovem supplicationibus colendum, & per cognatos Deos egredimini, vindicate, liberate, propriæ
20 virtutis memores, & nihil ad gloriam vestram spectans intermittentes.

EPISTOLA XXVII.

Oratio Legati Thessali filii Hippocratis ad Athenienses.

- 1 C Onvenire arbitror, Viti Athenienses, constitutum apud vos, qui non omni multitudini cognitus est, primum indicare quis sit, & unde sit, postea vero reliquam orationem persequi. Mihi equidem pater est Hippocrates, qui quantum in medicina facultatem habeat, vos novistis. Nomen autem est Thessalus. Cognatus vero & ego sum non in postremis, neque paucis vestrum. Patria vero mihi est Cos, quæ quomodo vobis cognata sit ab antiquo, alii dicunt, qui in recensenda historia sunt præstantiores. Veni autem missus a patre, quatuor beneficia a nobis in vos collata prolatus. Primum quidem vetus quoddam, tempore progenitorum nostrorum, commune in omnes Amphictyonas, quorum vos non minima pars estis. Alterum vero illo adhuc majus, & ad plurimos Græcorum progressum. Atque hæc quidem urbis, & progenitorum meorum esse apparebunt. Tertium autem patris proprium est, & tantum, quantum nemo unius vir & vobis, & multis Græcis contulit. Postremum vero ex quatuor commune est patris & meum, & quod non ad plures, sed ad vos ipsos pervenit. Quod quidem priorum beneficiorum comparatione exiguum videri poterit, verum ad aliorum beneficia collatum, magnum est. Et sane huiusmodi beneficia sic habent, quemadmodum esse dixi, ut summam dicam. Oportet autem non solum dicere, sed etiam demonstrare quod vera sunt. Principium igitur sermonis, ipsum minorum nostrorum principium faciam. Vetustissima vero primum referam, in quibus fortassis longiora, ac alius repetita me dicere deprehenderitis. At quisquam vetus dici
10 expetit. Erat enim tempus quando Crisea gens erat, & habitabat quidem circa Pythium templum, terram vero habebat, quæ sane nunc Apollini consecrata est. Appellatur autem Criseus quidem campus, iuxta quem Locri habitant, & cui Melæna adiunt: Cirræus vero mons, cui Phocenses adjacent. Hi porro Crisei cum essent aliquando populosi, & fortes, & opulenti, his bonis ad malum usi sunt. Per insolentiam enim
15 multa horrenda ac iniqua facta perpetrarunt, in Deum impietatem execrantes, Delphos in servitutem redigentes, vicinos deprædantes, agricolas spoliantes, uxores ac liberos abducentes, & corpora ipsorum conspuantes. Qua de causa Amphictyones ita commoti, & exercitus in terram ipsorum iuncto, & ipsius pugna devictis, regionem devastarunt, & urbes expugnaverunt. Ubi sane illi, qui multa & impia perpetrarunt, misere accepti sunt, non minores poenas persolventes, quam ipsi aliis molestant. Felicitissimi vero ex ipsis fuerunt, qui intra manus hostium perierunt. Secundo loco, qui manu capti sunt, & quidam aliam regionem ac urbes transiverunt. Sua enim mala ob oculos non habuerunt. Qui vero ex caprivis isthic manserunt, infelicitissimi fuerunt, quicumque in sua ipsorum regione torquebantur. Nam cum uxoribus & libris, 20
25 agros & urbes igni tradi videbant. His vero adhuc peius debebant illi, qui intra moenia perseverabant, quando relata mala partim videbant, partim percunctabantur, plura veris audientes. Sic enim fieri solet. Et sane malam salutis spem habebant. Erat autem ipsi urbs prope hunc locum maxima, ubi nunc certamen equestre peragitur, cuius muros exfluxerant, & eos qui ex aliis urbibus transfugerant, exceperant. Inutilia vero eiecerant, & necessaria importaverant. Et cogitabant obsidionem sustinere, bona spe præditi, neque manuum pugna, neque longi temporis obsidione urbem capi posse. At vero Amphictyones tum alia devastarunt, tum ad hanc urbem præsidio constructo, & ad expugnationem præparato, reliquum exercitum per urbes dimiserunt. Temporis autem progressu, cum pestis exercitum ilapsa esset, & milites
30
35
40
45
50 ægrotarent, quidam vero etiam morerentur, alii vero, propter morbum, præsidium reliquissent; Amphictyones turbabantur. Et alii alia consultabant. Solet autem in rebus communibus sic fieri. Tandem vero ad strictionem moleste fetentes, & de bel-
lo desperantes, Deo rem commiserunt, & quid facere oporteret, interrogarunt. Ille vero bellum gerere iussit, & victores fore promittebat, si ad Co profecti, cervi
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
1085
1090
1095
1100
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1160
1165
1170
1175
1180
1185
1190
1195
1200
1205
1210
1215
1220
1225
1230
1235
1240
1245
1250
1255
1260
1265
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1305
1310
1315
1320
1325
1330
1335
1340
1345
1350
1355
1360
1365
1370
1375
1380
1385
1390
1395
1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1435
1440
1445
1450
1455
1460
1465
1470
1475
1480
1485
1490
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1525
1530
1535
1540
1545
1550
1555
1560
1565
1570
1575
1580
1585
1590
1595
1600
1605
1610
1615
1620
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1655
1660
1665
1670
1675
1680
1685
1690
1695
1700
1705
1710
1715
1720
1725
1730
1735
1740
1745
1750
1755
1760
1765
1770
1775
1780
1785
1790
1795
1800
1805
1810
1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915
1920
1925
1930
1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2070
2075
2080
2085
2090
2095
2100
2105
2110
2115
2120
2125
2130
2135
2140
2145
2150
2155
2160
2165
2170
2175
2180
2185
2190
2195
2200
2205
2210
2215
2220
2225
2230
2235
2240
2245
2250
2255
2260
2265
2270
2275
2280
2285
2290
2295
2300
2305
2310
2315
2320
2325
2330
2335
2340
2345
2350
2355
2360
2365
2370
2375
2380
2385
2390
2395
2400
2405
2410
2415
2420
2425
2430
2435
2440
2445
2450
2455
2460
2465
2470
2475
2480
2485
2490
2495
2500
2505
2510
2515
2520
2525
2530
2535
2540
2545
2550
2555
2560
2565
2570
2575
2580
2585
2590
2595
2600
2605
2610
2615
2620
2625
2630
2635
2640
2645
2650
2655
2660
2665
2670
2675
2680
2685
2690
2695
2700
2705
2710
2715
2720
2725
2730
2735
2740
2745
2750
2755
2760
2765
2770
2775
2780
2785
2790
2795
2800
2805
2810
2815
2820
2825
2830
2835
2840
2845
2850
2855
2860
2865
2870
2875
2880
2885
2890
2895
2900
2905
2910
2915
2920
2925
2930
2935
2940
2945
2950
2955
2960
2965
2970
2975
2980
2985
2990
2995
3000
3005
3010
3015
3020
3025
3030
3035
3040
3045
3050
3055
3060
3065
3070
3075
3080
3085
3090
3095
3100
3105
3110
3115
3120
3125
3130
3135
3140
3145
3150
3155
3160
3165
3170
3175
3180
3185
3190
3195
3200
3205
3210
3215
3220
3225
3230
3235
3240
3245
3250
3255
3260
3265
3270
3275
3280
3285
3290
3295
3300
3305
3310
3315
3320
3325
3330
3335
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3380
3385
3390
3395
3400
3405
3410
3415
3420
3425
3430
3435
3440
3445
3450
3455
3460
3465
3470
3475
3480
3485
3490
3495
3500
3505
3510
3515
3520
3525
3530
3535
3540
3545
3550
3555
3560
3565
3570
3575
3580
3585
3590
3595
3600
3605
3610
3615
3620
3625
3630
3635
3640
3645
3650
3655
3660
3665
3670
3675
3680
3685
3690
3695
3700
3705
3710
3715
3720
3725
3730
3735
3740
3745
3750
3755
3760
3765
3770
3775
3780
3785
3790
3795
3800
3805
3810
3815
3820
3825
3830
3835
3840
3845
3850
3855
3860
3865
3870
3875
3880
3885
3890
3895
3900
3905
3910
3915
3920
3925
3930
3935
3940
3945
3950
3955
3960
3965
3970
3975
3980
3985
3990
3995
4000
4005
4010
4015
4020
4025
4030
4035
4040
4045
4050
4055
4060
4065
4070
4075
4080
4085
4090
4095
4100
4105
4110
4115
4120
4125
4130
4135
4140
4145
4150
4155
4160
4165
4170
4175
4180
4185
4190
4195
4200
4205
4210
4215
4220
4225
4230
4235
4240
4245
4250
4255
4260
4265
4270
4275
4280
4285
4290
4295
4300
4305
4310
4315
4320
4325
4330
4335
4340
4345
4350
4355
4360
4365
4370
4375
4380
4385
4390
4395
4400
4405
4410
4415
4420
4425
4430
4435
4440
4445
4450
4455
4460
4465
4470
4475
4480
4485
4490
4495
4500
4505
4510
4515
4520
4525
4530
4535
4540
4545
4550
4555
4560
4565
4570
4575
4580
4585
4590
4595
4600
4605
4610
4615
4620
4625
4630
4635
4640
4645
4650
4655
4660
4665
4670
4675
4680
4685
4690
4695
4700
4705
4710
4715
4720
4725
4730
4735
4740
4745
4750
4755
4760
4765
4770
4775
4780
4785
4790
4795
4800
4805
4810
4815
4820
4825
4830
4835
4840
4845
4850
4855
4860
4865
4870
4875
4880
4885
4890
4895
4900
4905
4910
4915
4920
4925
4930
4935
4940
4945
4950
4955
4960
4965
4970
4975
4980
4985
4990
4995
5000
5005
5010
5015
5020
5025
5030
5035
5040
5045
5050
5055
5060
5065
5070
5075
5080
5085
5090
5095
5100
5105
5110
5115
5120
5125
5130
5135
5140
5145
5150
5155
5160
5165
5170
5175
5180
5185
5190
5195
5200
5205
5210
5215
5220
5225
5230
5235
5240
5245
5250
5255
5260
5265
5270
5275
5280
5285
5290
5295
5300
5305
5310
5315
5320
5325
5330
5335
5340
5345
5350
5355
5360
5365
5370
5375
5380
5385
5390
5395
5400
5405
5410
5415
5420
5425
5430
5435
5440
5445
5450
5455
5460
5465
5470
5475
5480
5485
5490
5495
5500
5505
5510
5515
5520
5525
5530
5535
5540
5545
5550
5555
5560
5565
5570
5575
5580
5585
5590
5595
5600
5605
5610
5615
5620
5625
5630
5635
5640
5645
5650
5655
5660
5665
5670
5675
5680
5685
5690
5695
5700
5705
5710
5715
5720
5725
5730
5735
5740
5745
5750
5755
5760
5765
5770
5775
5780
5785
5790
5795
5800
5805
5810
5815
5820
5825
5830
5835
5840
5845
5850
5855
5860
5865
5870
5875
5880
5885
5890
5895
5900
5905
5910
5915
5920
5925
5930
5935
5940
5945
5950
5955
5960
5965
5970
5975
5980
5985
5990
5995
6000
6005
6010
6015
6020
6025
6030
6035
6040
6045
6050
6055
6060
6065
6070
6075
6080
6085
6090
6095
6100
6105
6110
6115
6120
6125
6130
6135
6140
6145
6150
6155
6160
6165
6170
6175
6180
6185
6190
6195
6200
6205
6210
6215
6220
6225
6230
6235
6240
6245
6250
6255
6260
6265
6270
6275
6280
6285
6290
6295
6300
6305
6310
6315
6320
6325
6330
6335
6340
6345
6350
6355
6360
6365
6370
6375
6380
6385
6390
6395
6400
6405
6410
6415
6420
6425
6430
6435
6440
6445
6450
6455
6460
6465
6470
6475
6480
6485
6490
6495
6500
6505
6510
6515
6520
6525
6530
6535
6540
6545
6550
6555
6560
6565
6570
6575
6580
6585
6590
6595
6600
6605
6610
6615
6620
6625
6630
6635
6640
6645
6650
6655
6660
6665
6670
6675
6680
6685
6690
6695
6700
6705
6710
6715
6720
6725
6730
6735
6740
6745
6750
6755
6760
6765
6770
6775
6780
6785
6790
6795
6800
6805
6810
6815
6820
6825
6830
6835
6840
6845
6850
6855
6860
6865
6870
6875
6880
6885
6890
6895
6900
6905
6910
6915
6920
6925
6930
6935
6940
6945
6950
6955
6960
6965
6970
6975
6980
6985
6990
6995
7000
7005
7010
7015
7020
7025
7030
7035
7040
7045
7050
7055
7060
7065
7070
7075
7080
7085
7090
7095
7100
7105
7110
7115
7120
7125
7130
7135
7140
7145
7150
7155
7160
7165
7170
7175
7180
7185
7190
7195
7200
7205
7210
7215
7220
7225
7230
7235
7240
7245
7250
7255
7260
7265
7270
7275
7280
7285
7290
7295
7300
7305
7310
7315
7320
7325
7330
7335
7340
7345
7350
7355
7360
7365
7370
7375
7380
7385
7390
7395
7400
7405
7410
7415
7420
7425
7430
7435
7440
7445
7450
7455
7460
7465
7470
7475
7480
7485
7490
7495
7500
7505
7510
7515
7520
7525
7530
7535
7540
7545
7550
7555
7560
7565
7570
7575
7580
7585
7590
7595
7600
7605
7610
7615
7620
7625
7630
7635
7640
7645
7650
7655
7660
7665
7670
7675
7680
7685
7690
7695
7700
7705
7710
7715
7720
7725
7730
7735
7740
7745
7750
7755
7760
7765
7770
7775
7780
7785
7790
7795
7800
7805
7810
7815
7820
7825
7830
7835
7840
7845
7850
7855
7860
7865
7870
7875
7880
7885
7890
7895
7900
7905
7910
7915
7920
7925
7930
7935
7940
7945
7950
7955
7960
7965
7970
7975
7980
7985
7990
7995
8000
8005
8010
8015
8020
8025
8030
8035
8040
8045
8050
8055
8060
8065
8070
8075
8080
8085
8090
8095
8100
8105
8110
8115
8120
8125
8130
8135
8140
8145
8150
8155
8160
8165
8170
8175
8180
8185
8190
8195
8200
8205
8210
8215
8220
8225
8230
8235
8240
8245
8250
8255
8260
8265
8270
8275
8280
8285
8290
8295
8300
8305
8310
8315
8320
8325
8330
8335
8340
8345
8350
8355
8360
8365
8370
8375
8380
8385
8390
8395
8400
8405
8410
8415
8420
8425
8430
8435
8440
8445
8450
8455
8460
8465
8470
8475
8480
8485
8490
8495
8500
8505
8510
8515
8520
8525
8530
8535
8540
8545
8550
8555
8560
8565
8570
8575
8580
8585
8590
8595
8600
8605
8610
8615
8620
8625
8630
8635
8640
8645
8650
8655
8660
8665
8670
8675
8680
8685
8690
8695
8700
8705
8710
8715
8720
8725
8730
8735
8740
8745
8750
8755
8760
8765
8770
8775
8780
8785
8790
8795
8800
8805
8810
8815
8820
8825
8830
8835
8840
8845
8850
8855
8860
8865
8870
8875
8880
8885
8890
8895
8900
8905
8910
8915
8920
8925
8930
8935
8940
8945
8950
8955
8960
8965
8970
8975
8980
8985
8990
8995
9000
9005
9010
9015
9020
9025

eo tripodem depredarentur. Sin minus, urbem capi non posse. Ipsi vero, his auditis, & ad Co profecti, oraculum proposuerunt. Cum autem Coi dubitarent, & oraculum non intelligerent, surrexit vir genere quidem Alcibiades, progenitor autem noster, medicus vero Græcorum ejus temporis omnium confessione optimus: nomen autem ipsi erat Nebrius: qui oraculum dicere inquit, ut ad seipsum venirent. 55 Nam deus, inquit, admonuit vos, ut profecti ad Co, cervi filium in auxilium adducaris. Cos equidem hæc est. Cervorum autem filii Nebri appellantur, hoc est hinuli. Nebrius autem est mihi nomen. Quod vero aliud auxilium potius contigerit exercitui egrotanti, quam medicus? Et profecto non videtur mihi id consequens esse, quod in tantum divitis Græcos omnes superantes, Deus ad Co proficisci iusserit, & 60 autem numisma petere. Vtrum hoc oraculum in meam domum progreditur. Chrysos enim, hoc est aurum, vocatur masculus meus filius nati minimus. Est autem omnino & corporis specie, & animi virtute, quantum patri dicere licet, inter omnes cives præcellens. Ego quidem igitur, nisi vobis aliud videatur, & ipse proficiscar, & filium mecum adducam, nave quæ quinquaginta remis agatur instructa meis sumptibus & ministeriis medicis ac bellicis referta, quo in utramque partem auxilium feramus. Et hic quidem dixit: illi vero approbaverint, qui missi fuerunt. At Nebrius hic etiam virum Calydonium apud se educatum, in navem adsumpsit: de quo statim, ubi res tulerit, dicemus. Cum igitur pervenissent hi viri ad castra, deus gaudebat. Nam & mortes militum cessabant, & cum divina fortuna equus Eurylochi (qui 70 belli dux erat, Thestalus genere, & ex Heraclidis ortum ducens) canalem, per quem aqua in urbem ducebatur, ungula percussisset, ubi in pulvere volitari voluisset: Nebrius aquam medicamentis infecit, unde ventres Crisæorum corrupti sunt: & sane multum contulit ad hoc ut civitas caperetur. Atque hinc jam animi obsequium elari fuit, velut deo jam manifeste auxilium ferente. Cum autem impetus facerent, & præmia proponerent his qui primi muros conscendissent, certamen erat fortissimum, & urbs 75 capiebatur. Primus enim muros conscendit Chrysus, & turrim occupavit. Sequēbatur autem ipsum evestigio vir ille Calydonius, sub communi scuto auxilium ferens, de quo antea dixi. Et Chrysus quidem hasta percussus cecidit ex summa turri: percussus est autem a Mermode Lyci fratre, qui lapidibus obrutus mortuus est, cum in aditum irrupisset tripodem depredaturus. Hi igitur civitatem sic ceperunt: & Nebri auxilium cum Chryso, & secundum medicam, & secundum bellicam facultatem recte successit: & deus vera dixit, & quæ promiserat fecit. Quæ de causis Amphictyones Apollini quidem templum consecrarunt, quod nunc est in Delphis: & certamen gymnicum, ac equestre prius non peragentes, nunc peragunt: & Chisæorum regionem universam dicantur deo contributori, reddentes ea quæ dedit in eo, quod oraculum dedit. Et 85 Nebri filium Chrysum in circo equestri sepelierunt: & Delphis publice ipsi parentare præceperunt. Alcibiades vero in Co attributa est prudentia vaticinandi, quemadmodum his qui mittuntur ex urbibus ad sacrum Amphictyonum concilium: atque hoc Nebri gratia. Calydoniis autem ab illo viro & illo ministerio, etiam nunc in Delphis 90 primæ vaticinandi partes, & alimenta dantur. Vtrum redeo ad nostra. Nam quod vera dico, hinc clarum est. Cum enim pater & ego accessissemus, Amphictyones hæc renoverunt, & attribuerunt, & in columna descripta in Delphis dedicaverunt. Atque hujus quidem sermonis finis clare ostendit, nostros progenitores esse vestros benefactores. Cæterum hoc relicto, alium de iisdem, non eundem sermonem, adsumam. 95 Cum enim magnus ille rex cum Persis, & aliis Barbaris bellum gereret contra Græcos, qui aquam & terram non dedissent; patria nostra maluit in totum pessumdari, ut ne contra vos, & eos qui vobiscum sentirent, hostilia arma sumeret, & in navibus militarem expeditionem mitteret. Sed abnuvit, honestum quid & dignum patribus medicata, qui Gigantes & Heraclidæ esse dicuntur. Visum igitur est ipsis, 100 cum quatuor essent anni in insula, omnes relinquere, & ad montes confugere, & salutem tutari. Unde sane quid non mali obvenit: dum regio fuit devastata, & corpora libera mancipata, & hostili lege occisa, & urbs & alia munimenta, ac templa, ad favillam exusta. Insuper autem & filix Lygdamis Artemisia, circa partum victoriam datum est, omnia quæ reliqua essent expiscari ac exportare. At enim, velut apparet, 105 a diis non sumus neglecti: verum tempestatibus ingentibus exortis, & naves Artemisia omnes in periculo fuerunt, & multæ perierunt: & in exercitum ipsius multa fulmina inciderunt, quum insula nostra paucis fulminibus impeteretur. Dicitur etiam spectra Heroum mulieri conspecta esse. Quorum sane omnium timore perterrita, ab immedicabilibus cœptis destitit, amara confessione facta, quæ & relatu 110 amara est. Quare omittatur. Attribuiam autem & hic progenitoribus meis propriissime minime falsa, quod neque contra vos, neque contra Lacedæmonios, aliosque Græcorum socios, Coi voluntaria arma sumplerint: & quidem quum multi tum insulas, tum Asiam habitantes, cum Barbaris in bello conjuncti fuerint, nulla violentia coacti. Equidem præfecti urbis tunc fuerunt Cadmus & Hippolochus. Vtrum autem est, 115 & Cadum & Hippolochum meos progenitores esse. Nam Cadmus qui & Senatum regebat, matris meæ progenitor est. Hippolochus vero ex Alcibiadis quæ-

- quatus a Nembro, ejus auxilio Crisæi sunt devastati. Nos autem ex virili genere Asclepiade sumus. Quare & hoc bonum a progenitoribus nostris profectum amplectimur. Redeo ad Cadum. Hic sane vir adeo commodi Græcorum studiosus fuit, ut cum regio ab Artemisæ obfisione liberata esset, isthic relicta uxore, ac sobole, abiverit cum his qui eadem sentirent in Siciliam, quo Gelonem & fratres ejus prohiberet, ne amicitiam cum Barbaris contraherent contra Græcos. Perpetravit & alia multa egregia facta, quæ longius producere non est tempus. Atque hæc quidem & hujusmodi multa sunt publica progenitorum nostrorum in vos & alios Græcos beneficia. Nam deficit me dicendi facultas. Venio autem jam ad hoc, ut beneficium Hippocratis patris mei apud eos, qui id sciunt, producam; quod hoc modo recitans, vera dicere cognoscat. Cum pestis ex Barbaria adfueret, quæ supra Illyrios ac Pæonas sita est, & cum malum in hanc regionem venisset; harum gentium Reges ad famam medicam, quæ vera erat, & undiquaque processerat, & ad patrem meum, nuncios miserunt in Thessaliam (illic enim pater meus & prius, & nunc domum habet) vocantes ipsum ad auxilium ferendum. Et non solum argentum, & aurum, & alias opes se missuros esse receperunt, sed etiam reportaturum esse quacumque ipse vellet, si auxilium tulisset. Ipse vero cum interrogasset quales motus partiales fierent, & æstus, ac ventos, & caligines perscrutatus, itemque alia quæ habitus ex præstiti statim commovere solent; cum sane omnia didicisset, illos quidem retro discedere iussit, & nulla sibi facultatem esse ad illorum regionem proficiscendi, pronuntiavit. Verum ipse quacircumque Thessalis denunciare studuit, quibus modis malum accedens cavere, & medelam conscriptam per urbes proponebat. Me vero in Macedoniam demisit. Cum regibus enim Heracidanum, qui isthic imperium obtinent, paternæ nobis intercedit amicitia. Et ego quidem ibam a Thessalia eo, quo me pater iussit, auxilium his, qui isthic essent laturus. Injunctum autem mihi, ut etiam urbi vestræ opem ferrem. At fratrem meum Draconem ex Pagasis profectum, in Hellepontum navigare iussit, consimili consilio instructum, quali etiam ipse utebatur. * Non enim omnes loci eadem auxilia ferunt, eo quod non omnis ambiens non aer similis est. Polybium vero, qui filiam ipsius, meam autem sororem habet, & alios discipulos, ad alios aliorum conventus & vias profecturos emisit, quo quamplurimis opularetur. Postquam autem ipse res in Thessalia perfecit, ad vicinas gentes auxilium laturus proficiscebatur, & ad pylas profectus, Dorienfibus, & aliis, simulque Phocenfibus auxilium tulit. Et cum sane ad Delphos pervenisset, supplicationem Deo pro Græcis fecit, & sacrificio facto, iter ad Boeotos arripuit. Et cum istis opem tulisset, similiter ad vos processus est, & sufficientia vobis ad salutem, quæ sane nunc ego produco, ex animo penitus dixit. Arbitror autem multos vestrum nosse, quod vera dico. Non enim ita diu est, sed nonis hic est annus, quando abivi, & in Peloponnesum missus sum, isthic habitantibus opem laturus. At vero undiquaque nobis, & verbis, & re ipsa, dignus honor contigit, ut minime ponitear nos, quod non hunc cum quæstu ex Illyricis, ac Pæonibus oblato permutavimus. Verum præ reliquis civitatibus magna fuit quæ a vobis data sunt. Nam & res publica vestra alias excedit. Athenæ enim alius quiddam sunt aliis urbibus, quantum ad gloriam attinet. Et corona illa antea in vestro theatro patri imposta, ad summam emulationem ac felicitatem ipsum evexit. Sed & hoc beneficium superastis, dum & patrem, & me publice Cereris & Proserpinæ mysteriis, ac sacris initialistis. Atque hæc quidem tria sunt beneficia, quantum ego verbis consequi potui, & fracta voce proferre, urbis, & progenitorum, & patris mei, in vos simulque multos græcos. Quartum nunc dicere aggrediar, quod, velut antea dixi, in vos ego & pater meus collocavimus. Cum enim Alcibiadem emitteretis in Siciliam, multa quidem potentia, non autem ita multa, velut admiranda: & sermo in concione incidisset de Medico, quem exercitum sequi oporteret; pater meus progressus, me ad curanda corpora vestra se daturum esse promisit, propius sumptibus instructum, & citra metcedis exactiorem, quam diu classis abesset, parvipendens suam utilitatem, ut qui sibi persuasisset, hoc in vestrum commodum cessurum esse. Ego enim non solum res meas infumebam, id quod faciebam vobis inserviens, sed etiam ad alia magna opera destinatus fui. Et hoc minimum est ex his, quæ sum dicturus. Decevit enim pater ob me filium fortunæ fluctibus agitati, & in terra aliena, & in mari, & in periculis bellicis, & in ægri tudinibus, quæ his qui erroneam vitam degunt, magis accedere solent, quam his qui ordinatæ vitæ rationem habent. Novit enim beneficium beneficio metiri, & non velut qui aliquid emisset, contractu ex manu in manum facto semel, discedere. Et hic quidem talia præstitit. Ego vero, ut qui filius illius sum, nihil studi & artis prætermisi, auxilium ferens, & periclitatus vobiscum, si quando occasio tulisset. Et ad hæc ambo præstanda, neque morbus, neque additio, neque timor in mari, & intra hostium manus, me prohibuit. Testes autem hujus rei non alios aliquos, sed vos ipsos habeo. Quare si quis contradicere volens, is nihil timentus exsurgat. Verum non puto me mentiri. Cum autem hæc præstissem ad annos tres, & aurea corona coronatus, & adhuc pulchrius laudatus; domum redii ad nuptias, quo & artis, & generis nostri successores producerem. Et quæ quidem a civitate, a progenitoribus, a patre, & a me vobis obtigerunt, hæc sunt. Dictum est autem

quæ nos a vobis oblata tulimus. Arbitror autem multos e vobis admirari, quæ de
causâ hæc a me ex tam longinquo principio repetita sunt. Quo igitur & vos co-
gnoscatis, & mihi ea quæ cupio contingant, tempus est, ut hoc dicam. Pater
meus, o viri Athenienses, & ego petimus vos (sic enim liberos, & amicos loqui
debet, quo id, quod petunt ab amicis liberis, consequantur) contra patriam nostram
hostilia arma ne sumatis. Si vero oportet, quemadmodum fortassis oportet eos,
qui sua ipsorum causâ progressi sunt, etiam rogamus, ut ne nos, qui ejusmodi &
tam magna beneficia in vos priores contulimus, servorum loco habeatis. Insuper
autem (nam & sic dicere convenit) supplicamus, ut ne nostrâ faciatis vobis ipsis in
bello captiva, si contigerit ut multo inferiores superetis. Verum & hoc considerate, 195
quod fortuna alias alia cito versat, & aliquando magni parvis opus habuerunt, & for-
tes per debiles salutem adepti sunt. Puto autem clarum esse, ut ne clarissimum dicam,
quod ob unum virum non civitas, sed multa gentes jam quandoque utilitatem in rebus bel-
licis consequutæ sunt. Et ubi ars in pretio est, neque nos continere poteritis. Nam neque
ita viles ac contemnendi sumus, quemadmodum in vobis testimonium firum est. Verum 200
ab initio quidem Dei, unde genus nostrum esse gloriamur, Æsculapius & Hercules in
hominum utilitatem prognati sunt. Et hos propter virtutem, quam hic exercuerunt,
omnes Deorum loco habent. Urbs autem mea, & ego qui ad vos verba facio, ad ta-
les originem nostram referimus, quemadmodum sancti hominum traditiones habent. Un-
de profecto etiam pro Græcis ambo hæc parte, & in omni bono, ad ipsos tutandos 205
sterisse apparebimus. Non enim fabula sunt res ad Troiam gestæ, sed facta, in qui-
bus Cos cum insulis suis non minima, sed maxima ad ferendum auxilium existit. Sic
vero etiam Æsculapii filii, non arte solum, sed etiam armis, Græcis auxilium tulerunt.
Machaon equidem animam in Troade deposuit, quando, velut scriptores de his
prodentes dicunt, ex equo in Priami urbem venit. Proinde neque eo quod contri-
bules, neque eo quod ex auxiliatorum numero auxiliaret etiam ipsi Græci sumus, 210
nos injuria adfeceritis. Non in longum extendam sermonem, res Criseorum, aut
Persæ iterum repetendo, quando & ipsas audivistis, & in mandis magis sunt,
quam ea quæ paulo ante relatæ sunt. Quin & sic cogitate, minime plium esse benefa-
ctores injuria adficere. Nos autem benefactores esse, facta ipsa clamant. Ex qui-
bus patribus prognati esse videbimini (quemadmodum fabulatores dixerunt) si
injuria adficere, quam benigni esse malueritis? Neque enim amarulentis quic-
quam dicere volo. Illi enim, o viri Athenienses, Heraclidis quidem gratias repen-
derunt. Aliis autem multis, beneficio adfecti, vicissim auxilium sunt. Denique
profecto me dies longius narrantem, & ~~corroborantem~~ ^{quod} hominibus quanta 220
bona obvenerint, qui nihil de vobis bene meriti fuerunt. Circumspicite vos ipsos,
& me nullo dicente, considerate qualia perpetratis. Mala res est potestas, o
viri Athenienses. Non enim quæ sua sunt, mensura disponere novit. Sed & ur-
bes quasdam & gentes jam perdidit. Si vero ad alios velut in speculum respexerit-
is, videritis ipsi quæ facitis, & ego vera dico. Quin & lex nova est: Quicumque fe-
lici rerum successu confisus, non etiam ad rerum difficultates respicit. Non est 225
hoc vestrum, viri Athenienses. Multum enim etiam sic Deum tentaretis. Nullam vo-
bis injuriam intulimus. Si vero etiam intulimus, non armis, sed verbis judicemur.
Deprecamur autem vos etiam hoc, ut ne faciatis nos aliis gratiam debere, qui nobis
auxilium ferent, auxilium enim nobis ferent, si recte fecerint, & qui intra Thessaliam, 230
Argos, Lacedæmoniam, Macedoniam, sunt reges, & sicubi alii Heraclidæ, aut He-
raclidarum cognati habitant. Præstat citra violentiam, quam vi coactos facere quæ ju-
sta sunt. Non dico de insolenti adversum vos rebellionem; verum hoc vobis mani-
festum facio, quod multi nostri curam gerunt, aut caræ curam habebunt, nisi un-
diquaque de terra pertit, benignos adhuc esse homines. Ego quidem igitur, exi- 235
guæ enim mihi sunt ad dicendum vires, utpote qui aliarum rerum studio sim ad-
dictus, hic desinam. Rogo autem vos per hospites nostros, & per eos qui nobis
consilium esse consueverunt, & per Deos, & Heroas, ac gratias, quæ hominibus
ab hominibus contingunt, ut inimicitias quidem vestras adversum nos depona-
tis, ad amicitiam vero vos convertatis. Si enim non in vestra civitate hæc conseque- 240
mur, haud scio quo progressi, eorum, quæ cupimus, compotes fietis.

HIPPOCRATIS COI

LIBER DE HOMINIS STRUCTURA,

ad Perdiccam Macedonum Regem,

NICOLAO PETREJO CORCYRÆO

INTERPRETE.

Opus antea non editum.

Argumentum in Librum sequentem.

In hoc libello, brevi quidem, sed gravissimo, præter ea quæ de homine agit, totius anni temporum, tuendæ valetudinis egregia præcepta præscribit.

- 1 *Adundus ex quibus elementis, ex hisdem etiam constat homo. Humores quatuor, eorumque natura.*
- 2 *Arteria ac vena quibus differunt. Jecur, Ritus unde. Humores quatuor quid efficiant in homine.*
- 3 *Cerebri effectus, Reminiscencia, Oblivio, Phrenesis, Lethargus, Paralysis. Cerebrum purgantis.*
- 4 *Capitis passiones ex stomacho. Capitis futuræ tres. Capillorum color juxta varietatem humorum. Focis tonus a spiritu.*

- 5 *Jecur tripliciter digerit. Excrementorum ratio.*
- 6 *Sensus in homine quatuor. Fluor ex quatuor: cum quibusdam cussit. Feminarum lac & mensura.*
- 7 *Spina vertebrae numerus, costarum item, ac dentium. Stomachi emulatio. Intestinorum longitudo. Digitorum nomina.*
- 8 *Anni tempora quatuor, eorumque natura. Quæ vita hominis ratio singulis anni temporibus.*
- 9 *Vena sello quantopere conferat sanitati.*
- 10 *Medicinalis sphaera.*
- 11 *Pituita, sanguis, ac bilis quibus anni temporibus augentur, & quæ vita ratione servanda.*
- 12 *Anni in dies 365. colligitur.*

MUNDUS quatuor ex elementis consistit, igne, acre, terra, & aqua, calido videlicet, humido, frigido, & secco. Idem ex elementis quatuor totidemque humoribus & homo consistit, sanguine scilicet, pituita, flava, & atra bili. Et sanguis quidem aëri, pituita aquæ, flava autem bilis igni, atra vero terræ similatur. Sanguis enim gustu dulcis est: pituita, salsa: flava bilis amara: atra vero, acerosa, & flavescens. Sanguinis autem locus, & spiritus in corde est: a dextris quidem ejus sanguis, a sinistris vero spiritus consistit. Flava bilis in jecinore, atra in liene, pituitæ quidem in cerebro locus. Sanguis autem calidus, & humidus, pituita frigida & humida, flava bilis calida & secca, atra vero secca & frigida. * Arteriarum quidem a corde purum sanguinem, & spiritum recipiunt. Venæ autem & ipsæ a corde sanguinem sumunt, per quas corpori distribuitur. Sed jecur cordi sanguinem non præter veri fidem affatim suppeditat. Nam ignis absque materia permanere neutiquam potest. Quo fit nonnulli hominum semper quasi rideant, quidam vero tristescunt: hujus rei ex elementis causam esse dicimus. Qui enim puri sanguinis non inexpectes sunt, hi usquequaque ridet, & aspectu ac corpore floridi, necnon perspicui coloris existunt. Qui vero flavæ bilis participes sunt, desides, pusillanimes, pavidi, imbecillesque esse solent. Pituitosi vero merces, & frigidi sunt. * Reminisci autem, & esse prudentia prædium, ex cerebro inter calidum, frigidumque admodum temperato provenit. Oblivio vero, ex cerebri frigidityte procedit. Passio autem, quæ phrenesim nuncupatur, ex perituentibus scribis fit. Vaporibus enim, ex visceribus per doctum ad cerebrum emissis, ejus humidam arefcit, & homo mente capius efficitur: & cerebrum olco quocumque frigida qualitatibus per aures, vomitusque humectare oportet. Lethargus vero & ipse cerebri passio est: cum enim cerebrum frigidus humoribus repletum fuerit, hinc passio, quæ Lethargus appellatur, hominem occupat: & calefacientibus cerebro opulari expedit. Paralysis vero fit a frigido, crudoque humore, qui a cerebro demissus in oculum, sive in aliquam labiorum partem, seu in totam dimidiamve faciem descendit. Per nares cerebrum purgantia adhibere oportet, & extrinsecus isobrium contusum (herba est quæ & Maros, & Origanis dicitur) ignis suffitu seu cauteriis per aures applices. * Quæcumque autem passiones in capite fiunt, ex stomacho oriuntur, exempli causa: vomica, struma, dentium dolores, tonsilla, angina, suffocationes, anhelitus difficultas, & reliqua. Caput autem futuras habet tres: invenitur & solidum absque futuris caput, & hoc quidem humidum est. Crispos vero capillos habere, calidioris capitis signum est. At recti crines ex percavato qui in capite est humore

5 sunt. Flavedo capillorum ex flava bile, calvities vero ex caliditate provenit. Articulate vocis species tres habentur, gravis, acuta, & media: hæc a spiritu procedunt. * Jecur autem ipsum alimentum triplici digestionem in succum redigit. Ex prima digestionem cor alimentum qualitatem, saporem videlicet, suscipit, & puri sanguinis procreatio fit. Secundam digestionem jecur consumit, & corporis par- 43 tibus alimentum largitur, unde flavæ bilis constitutio fit. Liens vero ex sanguinis fece alitur, unde & melancholicum humorem constituit certum est. Cerebrum autem a stomacho humectatur, & pituita exuberantiam peragit. Tertia digestionem alimentum suppete in stomacho in succum vertitur, & tunc referatur janitor qui 45 ventriculus nuncupatur, quoniam transitus tantum facultatem subministrat. Inde alimentum in inferiorem ventrem demittitur. Alvus vero a pituita ciborum præbitis gratia oblectamentum sentit. Humidum autem excrementum per renes, ac seorsum ipsius excrementi meatus in vesicam, idest in pluram descendit, in vesicam enim aqua ingreditur. * Sensus in homine quinque habentur, visus, ol- 50 factus, auditus, gustus, & tactus. Nam visus ex æthere, olfactus ex aere, auditus ex igne, gustus ex humido, tactus vero ex terra fit. Homo autem ex quatuordecim quibusdam consistit, nervis, venis, arteriis, sanguine, spiritu, carne, adipe, chylagine, unguibus, ossibus, medullis, capillis, membranis, humoribus. Hotum autem, excretiones, maribus quidem siccis & humido excre- 55 mento, vomitibus, oculis, naribus, sputis, sudoribus, veneris, incertis meatibus, capillis & unguibus sunt. Foemina vero ad hæc duo adduntur, purgationes, lactis videlicet, & menstruum. Lac autem & eodem modo genitale semen hominis ex sanguine gignuntur, & hoc certum est: si enim homo genitali plus nimio utetur, sanguinem pro semine emittet. Similiter autem & femi- 60 næ, si plus nimio lactare cogentur, sanguis elicitur. * Spina autem hominis habet vertebrae xxiv. costas totidem. Deutes cum maxillaribus duo supra xxx. sunt anteriores autem dividentes, qui & secantes appellantur. Stomachus palmos habet quinque, intestina cubitos tresdecim. Nomina digitorum, Pollex, Index, Medius, Annularis, Auricularis. Ungues frigidi siccique temperamenti sunt. 65 * Anni vero tempora quatuor habentur, ver, æstas, autumnus, & hyems. Ver calidum & humidum est; ideo sanguinis in corpore incrementum fit. Æstas calida & siccis, ideo flavam auget bilem. Autumnus siccus & frigidus; ideo atram bilem, & saniem auget, sanies quidem sanguinea & aquosa est. Hyems vero pituitam in corpore adauget. Nam quatuor hominis elementa, id est, humores, 70 ad tempora quatuor dividuntur. Ideo salarem conversationem speculari, & affecti temperamentum, & ad hæc curationibus uti opus est. * Si enim verno tempore juvenis adversa premetur valetudine, sanguinis exuperantia causa paritur, quam per venæ sectionem emittere opus est. Et si pleuresi unius diei spatio, vel duorum, seu trium laboraverit, venæ sectione affecto opitulandum, priusquam ipsum 75 opprimat passio, & affecti vires deficiant. Homini vero venæ sectio perutilis est: & tempus quidem quo ipsa utendum, a Februario incipit: & rursus a Septembri principium sumendo, ad septimam ejusdem perducit. Æstate aliquo ægrotante, ad passionis purgamina adhibenda. * Si considerantes (o Rex) & aliorum curam agentes, quid ad vitæ rationem corporibus præstet, & quod congrue alimenta 80 suggerat, ac debito apponit ordini, non satis pro diligentia nostra, & qui humana aggrediuntur corpora, motbos deprehenderimus, nunc accuratius perspicientes, summumque describentes, medicinalem spheram ad te mittimus, per quam ægritudines, quæ humana corpora occupare solent, pernosce, & ad præsentem horam, ac decurrentis anni tempora, hujusmodi calamitatibus opitulari queas. 85 Si autem hæc ac curatus egeris, diu citra omnem adversam valetudinem per omne tempus vita frueris. Et si hæc quæ potissimum optime valetudini tuæ vim præbeant, quæque hominum generi conducant, peregeris, ita in omnibus te incolumem vitam deprehendes elegisse. Et quamvis ardua admodum spheræ ratio habeatur, eam tamen perscripam tibi præbimus. * A Vergiliarum occasu ad hyemale solstitium, dies xl. hoc est a xxi. Novembris, ad Decembris finem sunt. Hi quidem dies pituitam augent: balneis autem jejunis, sudores excitando, detergendoque, & veneris ac laboribus uteris. Ab hyemali solstitio, ad vernale æquinoctium, dies lxxxiv. a prima videlicet Januarii ad quintum supra xx. Martii hi dies humiditatem, & sanguinis exuberantiam peragunt: deambulationibus, & 95 siccis quæ ad victum pertinent, delictisque ac veneris, beneque alentibus utendum. A vernali æquinoctio, ad Vergiliarum ortum, dies xl. a xxv. Martii ad xxi. Maii hi dies sanguinem augent: redolenti vino, & veneris, ac laboribus uteris. * A Vergiliarum autem exortu ad æstivum solstitium, dies xlii. a pertiadecima Maii, ad xxiv. Junii, hi enim dies flavæ bilis augendæ facultatem obtinent, dulcibus & aquosis utendum, duendæ alvi cura agenda, & a veneris, ac laboribus abstinendum est. Ab æstivo vero solstitio, ad æquinoctium autumnale, dies xxii. ab xxiv. Junii, ad xxv. Septembris hi dies atram bilem augent: frigidis & aquosis, redolenti vino, ac salitis uti opus est, a veneris ve- 100 ro ab-

105 10 abstinendum censemus, Ab autumnali æquinoctio, ad Vergiliarum occasum;
 dies xii. a xiv. Septembris ad xii. Novembris; hi enim dies saniem augent,
 acetosis, acerbisque, & venereis, ac laboribus uti expediet. Si ad hæc obser-
 vanda curam, o Rex, impenderis, citra omnem tristitiam, doloremque in re-
 liquum vita frueris. * Hac se divisione sic habente, annus in dies quinque ac 12
 110 sexaginta supra trecentos colligitur.

HIPPOCRATIS COI OPERUM,
 quæ ad nos extant, omnium finis.

VENETIIS. MDCCXXXVI.

Excudebat JOANNES RADICIUS.





